

來源：0-12個月寶寶該有哪些聽力表現？提升聽覺靈敏度技巧與遊戲

零到十二個月寶寶該有哪些聽力表現？

零到二個月

開始留意人聲，對聲音產生反應，會移動身體或轉頭尋找聲音來源。

對父母的聲音會出現表情變化。

面對巨大聲響會有驚嚇的反應（如用力關門聲、拍手聲）。

淺睡時會被較大音量的說話聲或噪音干擾。

三到六個月

開始會對一些環境中的聲音表現出興趣（如電鈴聲、狗叫聲、電視聲等）。

對著他說話時，會發出聲音回應，或有眼神接觸。

餵奶時，會因突發的聲音而停止吸奶。

哭鬧時，聽見照顧者的聲音會安靜下來。

七到十二個月

聽覺範圍拓展，能聽見較遠的聲音，並開始以聲音作出回應。

開始牙牙學語，例如、等。

對自己的名字會有回應。

喜歡玩會發出聲音的玩具。

逐漸能理解簡單的語言指令，如「抱抱」、「不可以」、「掰掰」等。

日常促進寶寶聽覺發展的六個小技巧

聽覺是寶寶最早用來認識世界的重要感官之一，各種聲音刺激往往能引起他們的注意。瞭解發展階段後，爸媽也可以在日常生活中加入一些聽覺互動小技巧，幫助寶寶的感官成長。

一 面對面說話

建議與寶寶互動時，保持面對面、目光相視的交流，不僅有助於他們觀察嘴型與表情、促進語言學習，更能讓寶寶感受到專屬的愛與關注。

二 給予正向鼓勵

當寶寶對聲音有所反應時，以微笑、擁抱、言語等方式正向回應，有助強化他們對聲音的興趣與理解。

三 先以聲音而非視覺吸引注意

在寶寶看不到動作或物品的情況下，透過發出聲音來引起注意，訓練寶寶用聽覺來尋找聲音來源，而非視覺。

四 詞彙簡單、語調和緩

與寶寶對話時，盡量使用簡單明確的詞彙，說話時的語氣盡量緩慢且清楚。當他們回應時，模仿他們的聲音。就像在對話一樣，增進聽說雙向互動。刺激語言發展。

五 重複詞彙、強化理解

寶寶初期尚無法理解語意，透過不斷重複相同詞彙。搭配表情、聲調或實物對照，如指著杯子說「杯子」。有助於他們逐步建立語言與物品的連結。

六 無雜音的良好環境

重疊且複雜的聲音容易讓寶寶聽不清楚，長期下來可能導致寶寶忽略或無法準確辨識主要的聲音來源。有寶寶在時，最好關掉干擾的聲音，如電視、過於嘈雜的音樂。

有助於寶寶聽覺發展的五個小遊戲

遊戲一：躲貓貓，尋找聲音來源

適用月齡：二到六個月

準備各種有聲物，吸引寶寶注意力。家長可以在寶寶看不到的地方發出聲音，讓寶寶嘗試轉頭、尋找聲音方向，訓練聽覺定位能力。也可以玩「躲貓貓」的遊戲，家長躲起來後輕聲呼喚寶寶，再從不同方向出現，增進寶寶對聲音來源的敏感度。

遊戲二：，生活周遭的小探險

適用月齡：三到九個月

當聽見垃圾車音樂、開門聲或水流聲時，帶著寶寶一起去看看聲音的來源。例如走到窗邊看垃圾車、到門口迎接家人，讓寶寶將聲音與實際情境建立連結。增強對日常聲音的辨識與理解。

遊戲三：歡樂兒歌，唱唱跳跳

適用月齡：零到十二個月

兒歌韻律不只能逗寶寶開心，還有助於刺激左右腦聽神

經的發展，以及幫助寶寶發展聽覺記憶。

遊戲四：親子共讀

適用月齡：三到十二個月

找一本寶寶喜歡的繪本，坐在寶寶身邊，一起用溫柔的聲音講故事。建議搭配書中圖片指給寶寶看，幫助他理解故事內容，也促進語言和聽覺的發展。

遊戲五：玩具或圖卡時間

適用月齡：七到十二個月

準備大圖卡或玩具，和寶寶一起玩耍互動的同時，口頭說出物品名稱，幫助寶寶將聲音與實物連結。

黃金七十二小時做新生兒聽力篩檢，是掌握聽力發展的第一步

寶寶的聽覺發展，是語言學習的起點。為了幫助孩子把握聽語治療的黃金期，衛生福利部國民健康署補助新生兒於出生後三個月內進行聽力篩檢（一般會在出生後七十二小時內、由出生醫院主動安排檢查。完成聽力篩檢），並在《兒童健康手冊》中提供「嬰幼兒聽力簡易居家行為量表」。讓家長能在家中也能自我觀察、及早發現異常。

國健署提醒，家長在填寫「嬰幼兒聽力簡易居家行為量表」時，若有超過三項勾選「否」，就應儘速安排聽力篩檢。及時在寶寶出生三個月內進行確切診斷，並開始治療，把握治療黃金期，未來寶寶一樣能夠順利聽、說及開心唱歌！

來源：0-1歲遊戲重點：啟發五感 & 促進親子互動

零到一歲遊戲重點：啟發五感促進親子互動

零到一歲的寶寶正在用感官積極的探索世界，不管是一個眼神、一個聲音，都是引發他們學習的起點。本文將帶爸媽掌握零到一歲寶寶的發展關鍵，同時運用簡單又實用的親子遊戲，引導寶寶五感發展，加強親子關係。

零到一歲寶寶的發展特點

寶寶出生後，感官都已經具備接收能力，不過發展尚未成熟，因此需要透過更多的刺激來促進發展。讓我們先來了解零到一歲寶寶的成長特點。

零到三個月：

視覺還看不清楚，但聽覺已經靈敏，喜歡看高對比圖案或聽媽媽聲音。大多數時間仍然以吃睡為主。

四到六個月：

開始會翻身了，而且手眼協調能力更加進步，會主動抓握物品、把東西放進嘴巴探索。

七到九個月：

能坐、會爬，喜歡與爸媽做互動。活動力明顯大增，會用手敲打、搖晃物品。也開始理解因果關係，例如知道搖玩具會發出聲音。

十到十二個月：

不少孩子已能扶站甚至小走幾步，有些孩子也會說簡單的單字。例如會叫爸爸、媽媽，聽得懂簡單的指令。情感表達更豐富，會撒嬌示好。

爸媽可進行的親子遊戲及啟蒙重點

以下是針對不同月齡，設計適合親子互動遊戲，可幫助爸媽陪伴寶寶在玩樂中學習。

零到三個月：黑白追視遊戲

方式：爸媽準備一張黑白高對比圖卡（或自製簡單圖案），放在寶寶面前約二十公分距離，緩慢左右移動，引導寶寶用眼睛追視。同時可加入語言互動：「寶寶看這裡～」。

啟蒙重點：這個階段的寶寶對黑白對比特別敏感。透過追視訓練，有助於提升視覺發展與注意力集中。

四到六個月：觸摸不同材質布書遊戲

方式：準備多種觸感的布書（例如毛毛的、粗粗的、光滑的），爸媽把寶寶抱在身上，可以一邊翻頁一邊讓寶寶觸摸看看，並配合語言：「這個摸起來軟軟的耶！」

啟蒙重點：此階段寶寶手部控制能力進步，會想主動抓握、摸索。多樣材質刺激能豐富觸覺經驗，同時搭配對話也能增進寶寶的聽覺發展及將來的語言能力。

七到九個月：搖搖瓶互動遊戲

方式：用透明寶特瓶自製「搖搖瓶」，例如放入米粒、小鈴鐺、亮片等。或是直接使用寶寶的手搖鈴玩具，搖晃時發出聲音來吸引寶寶注意。然後鼓勵他自己搖搖看。

啟蒙重點：提升寶寶手部操作能力，而且能刺激聽覺發展、訓練雙手協調，同時也讓他從互動中學會模仿爸媽的動作。

十到十二個月：認識五官遊戲

方式：讓寶寶坐在你的對面，爸媽開始指著自己的五官。

同時也讓寶寶跟著進行，「這是眼睛。來眨眨眼；這是鼻子，來哼哼；這是嘴巴。來啾一下」。

啟蒙重點：這個階段的寶寶語言理解力快速發展，透過實際觸摸與視覺指認，能幫助他認識五官及身體部位，也可提升他的模仿能力與動作學習。

零到一歲寶寶玩具挑選指南

玩具不是越多越好，而是要適齡適性，同時注意使用的安全性。

安全優先：無小零件、不可拆解、無毒材質、無尖角、易清洗，可留意是否有台灣安全玩具標章或歐盟安全認證。

分齡建議：玩具應根據寶寶的年齡與發展能力分齡選擇，例如零到六個月以視覺、聽覺、觸覺刺激為主；七到十二個月可加入動作操作與因果概念，可以留意玩具建議的使用年齡。

少量、多樣、重互動：不必一次買太多玩具，寶寶的專注力有限。可以每次準備二到三種不同感官刺激的玩具交替使用，記得不是給寶寶玩具就好。重點是要與他多互動。

零到一歲是寶寶認識世界的「感官起點」，透過親子遊戲不僅能全面啟發五感，也能強化親子之間的情感交流。別擔心做得夠不夠好，爸媽的陪伴，就是寶寶最好的學習環境。

來源：0-3歲為語言發展黃金期！父母該如何營造促進語言發展的環境？

零到三歲為語言發展黃金期！父母該如何營造促進語言發展的環境？

從寶寶發出第一聲咿呀，到能說出完整句子，每一次的語言躍進都是認知發展里程碑。語言不僅是溝通的工具，也影響學習、情緒與社交能力。對零到三歲的嬰幼兒來說，若能掌握正確的互動方式。不但能促進語言發展，也能增進親子情感。

每個階段都精彩！寶寶各階段語言發展

寶寶的語言發展並非一蹴可幾，而是循序漸進的過程。

零到六個月時：

寶寶主要以哭聲來表達需求，並對聲音做出反應。漸漸地，寶寶會發出咿呀聲。甚至笑出聲音來，對周圍聲音也會有明顯反應。像是聽到主要照顧者的聲音會轉頭或睜大眼睛。這階段的寶寶雖然還無法說話，但大腦其實已開始辨識語音高低、長短與音調，是語言學習的啟蒙期。

六到十二個月時：

寶寶開始模仿成人語音，會發出「咿」、「啊」等簡單音節，同時他們對於簡單的指令如「拍拍手」會有反應，也會試著用聲音引起照顧者的注意。這階段親子的語言互動尤其重要，照顧者可透過對話與表情與之互動，讓寶寶能學習、模仿與理解語意。

十二到十八個月時：

孩子逐漸能說出單字，像是「爸」、「媽」、「水」，並理解簡單指令如「喝」，此時開始會以簡單的口語來作為表達需求和情緒的工具。

十八到二十四個月時：

孩子已能將兩個字組成簡單詞句，如「要吃」或「不要」，並可理解爸爸媽媽更複雜的指令，如把書本放到桌上。此階段的語言能力快速成長，寶寶開始能用語言與人互動，情感表達也更加豐富。

二十四到三十六個月時：

孩子已進入幼兒階段，語言表達能力明顯提升。可說出三字以上的組合句子，如「我想要喝水」、「這是我的玩具」。並理解多步驟指令，像是「先把玩具收好。再洗手吃飯」，此時的語言能力讓寶寶能更充分地與家人或同伴溝通。是建立社交能力的重要基礎。

並非只靠天賦！影響語言發展的先天與後天因素

影響寶寶語言發展的原因眾多，在先天因素部分。基因與生理因素影響大腦語言中樞的成熟度，有些寶寶天生語言中樞發育較慢。但這並不表示後續發展一定落後。後天因素則包括環境刺激、親子互動、健康狀況與社會文化背景，如果寶寶生活在語言刺激不足的環境，與成人互動少、缺乏聽故事、唱兒歌的機會，語言能力可能會發展得較緩慢。

許多研究都發現，親子互動是促進語言發展的關鍵。寶寶和照顧者的互動、對話與遊戲都能增進語言能力，也能加深情感聯繫；另外。寶寶的健康狀況也會影響語言學習，如聽力障礙與語言發展遲緩。可能需要專業評估與早期介入。家長可觀察寶寶對聲音的反應，是否能在聽到聲音之後做出反應、模仿聲音或辨識簡單指令等，若有異狀及早就診，把握黃金治療期。

另外有些寶寶雖然先天語言發展並無落後，但受限於社交障礙。導致不懂如何開始或結束對話，家長可透過角色扮演或模擬情境。引導寶寶學習社交語言技巧。

把握每一個互動瞬間～促進寶寶語言發展五技巧

零到三歲是語言發展的黃金期，親子的每一次對話與遊

戲，都是促進寶寶語言能力的養分。

一 多樣的語言刺激

爸媽可在互動中提供豐富、多樣的語言刺激，像是帶寶寶散步時，指著花朵說：「這是紅色的花，花的味道真香啊！」搭配生動表情，慢慢地寶寶也會開始模仿大人說話的語氣，並對語言產生興趣；或播放兒歌、故事、讓寶寶與同齡小孩互動等，也能增加語言刺激。

二 把握親子互動時間

許多研究皆認同，積極且有品質的親子互動是促進語言與情感發展的關鍵。在寶寶嘗試發聲說話時，照顧者盡可能給予溫暖回應。讓寶寶感受交流的樂趣，當寶寶如果開口說：「媽媽」。家長可以將語句拉長回應：「寶寶你在叫媽媽嗎？媽媽在這裡喔！」透過眼神交流、微笑與溫暖肢體接觸，都是增強記憶與增進語言學習的有效方法。

三 培養親子共讀習慣

親子共讀是嬰幼兒學習語言的最佳工具之一，家長可從孕期及零歲開始為寶寶朗讀繪本。零到三個月的寶寶聽到熟悉的聲音會有反應，當寶寶醒著時。家長可抱寶寶在懷裡或讓其坐在大腿上，用愉悅的聲音與他說話或說故事；六到十二個月的寶寶喜歡抓、捏或玩書。甚至放到嘴裡啃咬，爸媽不用限制孩子一定得乖乖坐好。可邊玩邊聽故事，或讓他們坐在腿上。在爸媽幫助下翻書。當寶寶開心時可能會咿咿呀呀的回應，甚至還會模仿大人的聲調及表情。

四 和孩子玩角色扮演遊戲

對嬰幼兒來說，遊戲與模仿是最自然的語言學習方式。隨著孩子年齡漸長，爸媽可透過角色扮演或玩具互動。以鼓勵表達而非過度糾正的語言溝通方式，儘可能給予肯定與鼓勵。讓孩子在輕鬆氣氛中學會表達，畢竟語言是寶寶認知世界的橋梁。也是情感交流的紐帶。

五 家長的陪伴與鼓勵

零到三歲是寶寶語言學習黃金期，透過日常親子互動、遊戲、閱讀，不僅可提升寶寶語言能力，也能增進親子感情。而孩子每一次的咿呀出聲，家長都應給予陪伴與鼓勵，讓寶寶從咿呀學語到勇敢開口表達。

守護孩子語言發展第一步！新生兒聽力篩檢應掌握「一千三百一十六原則」

聽力是語言發展的起點，若能及早發現孩子的聽力問題，並在六個月前接受聽語療育，孩子依舊可以擁有正常的語言發展及社會互動能力。若錯過黃金期，未來可能造成孩子語言發展障礙、學習困難，並影響情緒與社交。

在寶寶出生七十二小時內，會進行新生兒聽力篩檢，請掌握「一千三百一十六原則」：新生兒「出生一個月內」完成篩檢、「三個月內」診斷是否有聽損、「確診後一個月內」選配合適輔具、「六個月內」接受聽語療育。

來源：115年效期內母嬰親善醫療院所名單

一百一十五年效期內母嬰親善醫療院所名單

衛生福利部國民健康署參酌世界衛生組織及聯合國兒童基金會的「成功哺餵母乳的十大步驟」，進行國內母嬰親善醫院的推動，目的在創造一個讓母乳哺育成為常規的醫療照顧環境，給予每個嬰兒生命最好的開始。

母嬰親善醫院主要目標：

經由十個步驟的執行來改變醫院及產科機構

終止產科病房及醫院免費或低價提供母乳代用品的作法

母嬰親善醫療院所的十步驟：

一 有一正式文字的哺育母乳政策並和所有醫療人員溝通

二 訓練所有醫療人員施行這些政策之技巧

三 讓所有的孕婦知道哺育母乳之好處及如何餵奶

四 幫助產婦在生產半小時內開始哺育母乳

五 教導母親如何餵奶，以及在必須和嬰兒分開時，如何維持泌乳

六 除非有特殊需要，不要給嬰兒母乳之外的食物

七 實施每天二十四小時母嬰同室

八 鼓勵依嬰兒之需求餵奶

九 不要給予餵母乳之嬰兒人工奶嘴或安撫奶嘴

十 幫助建立哺育母乳支持團體，並於母親出院後轉介至該團體

全國一百一十五年效期內母嬰親善醫療院所總計一百四十四家。

來源：1歲前寶寶容易缺乏哪些營養素？怎麼從食物補充？

一歲前寶寶容易缺乏哪些營養素？怎麼從食物補充？

寶寶在成長過程中，需要攝取足夠的營養，才能夠支持身體發育和大腦發展。不過，有些關鍵營養素可能會因為營養不均衡而攝取不足。馬上來了解，一歲前寶寶最容易缺乏哪些營養素？又該如何透過飲食補充呢？

寶寶在零到一歲的階段，身高、體重會有顯著的成長，同時大腦發育、器官、肌肉等方面發展也相當快速。因此，這個階段攝取足夠的營養是很重要的。

一歲前嬰兒易缺乏的營養素有什麼？

一 鐵：

鐵的功能主要是負責幫紅血球運送氧氣，嬰兒出生前，母體會幫寶寶的身體儲存所需的鐵質，但這些鐵質在嬰兒出生後四到六個月後會逐漸消耗殆盡。因此寶寶六個月大之後，對鐵質的需求增加，單純依靠母乳可能無法完全滿足。

二 維生素：

維生素有助於鈣質吸收，能夠幫助骨骼與牙齒健康發展。母乳中的維生素含量較低，加上小寶寶比較少曬太陽，因此無法從陽光中自行合成足夠的維生素。

三：

是-DHA的一種，對寶寶的腦部與視覺發展極為重要。母乳中雖然含有，不過，會受限於母親本身的飲食內容。有些配方奶會添加，但並非所有品項都有添加。

四 鋅：

母乳中含有適量的鋅，但隨著寶寶成長，六個月後母乳中的鋅含量可能無法完全滿足寶寶需求，因此需要從食物中補充。

五 維生素十二：

維生素十二對於神經發展與紅血球製造非常重要，它主要存在於動物性食物中，如肉類、魚類、蛋和乳製品。如果寶寶飲食來源較單一，或是父母是素食者，寶寶容易有十二攝取不足的風險。

缺乏這些營養素可能對寶寶造成什麼影響？

當嬰兒缺乏這些營養素時，可能會影響身體機能的發展，甚至造成長期的健康問題。以下是缺乏上述營養素可能帶來的影響：

一 缺鐵可能導致貧血

如果寶寶缺乏鐵，可能會導致缺鐵性貧血，表現為臉色蒼

白、疲倦、食慾不振，甚至影響智力發展與專注力。缺鐵性貧血也可能讓寶寶的免疫力降低，較容易生病。

二 缺乏維生素可能影響骨骼發育

維生素不足會影響鈣質吸收，導致寶寶的骨骼發育不良，嚴重時可能會引起佝僂病。此外，缺乏維生素可能會影響免疫系統，使寶寶更容易受到感染。

三 缺乏可能影響腦部與視力發展

是腦部與視網膜發育的重要營養素，缺乏時可能會影響寶寶的學習能力、記憶力與視力發展，甚至影響認知功能。

四 缺鋅可能影響免疫力與生長

鋅缺乏的寶寶可能會生長遲緩、食慾不振、傷口癒合較慢，甚至免疫力較低，容易感染疾病。

五 缺乏維生素十二可能影響神經發育

長期缺乏維生素十二可能導致寶寶神經功能受損，影響寶寶的運動協調能力、語言發展和認知功能。此外，缺十二也可能引起貧血，使寶寶容易疲倦、虛弱。

如何從相關食物獲得營養素？

想幫助寶寶獲得充足的營養，可以透過適當的副食品來補充：

含有鐵質的食物

紅肉（牛肉、豬肉）、雞肝、深色蔬菜、豆類和蛋黃等，都是含有鐵質的食物。此外，可以搭配富含維生素的食物（如柑橘類、水果泥）來幫助鐵的吸收。

含有維生素的食物

除了讓寶寶適量曬太陽外，還可以從富含維生素的食物中獲取，如鮭魚、鯖魚、蛋黃與黑木耳、香菇等，或是添加維生素的米精或麥精。如果寶寶食物攝取不足，醫師也可能會建議補充維生素滴劑。

含有的食物

可以讓寶寶吃富含DHA的魚類，如鮭魚、鯖魚、沙丁魚或添加的配方奶。哺餵母乳的媽媽，本身可以多攝取含DHA的食物，以增加母乳中的含量。

含有鋅的食物

鋅含量高的食物包括紅肉、海鮮（牡蠣、蝦）、蛋、堅果與全穀類。

含有維生素十二的食物

動物性食物是主要來源，如魚、肉、蛋和乳製品。如果寶寶是純素飲食，應諮詢醫師是否需要補充十二營養品。

備製副食品時要注意什麼？

在幫寶寶準備副食品時，家長可以注意以下幾點：

循序漸進：

四到六個月開始添加副食品，從單一食材開始，再慢慢加入不同種類的食物，以便觀察是否有過敏反應。

均衡營養：

確保寶寶攝取到各種營養，不要只給單一類型的食物。

食材安全：

避免加工食品及過多調味料，並確保食材新鮮、衛生。

適當調整質地：

根據寶寶的成長階段，從泥狀食物逐漸過渡到較粗的質地，再慢慢進入半固體及固體食物。

透過均衡的飲食和適當的副食品安排，爸媽可以幫助寶寶獲得充足的營養，健康成長！

來源：4方法提升育兒品質

四方法提升育兒品質

蠟燭兩頭燒的新手爸媽們辛苦了！雖然已經很努力在工作與家庭間找出平衡，但接踵而來的挑戰，仍會讓人感到挫折而疲憊無力。建議你梳理出輕重緩急，才不會深陷「時間與體力不夠用」的泥沼，透過以下方式來提升與孩子相處的品質吧！

建立固定的家庭時間

在你的時間表中，找出可以和家人相處的固定時間。像是一起吃早餐或晚餐、傍晚接送孩子回家、週末早晨帶孩子買早餐兼公園放風等，在這段時光裡完全放下外在事物。全心投入家庭時間。

了解孩子發展的需求

爸爸可以多了解孩子各階段發展的重點是什麼，找出幫助孩子成長的技巧及資源，將有助提升育兒品質。

放下三人在心也在

和孩子及家人相處，需要「人在心也在」的陪伴，在與太太閒聊或討論事情時，請暫時放下手機吧！當你與孩子玩耍時，也請關掉電視、闔上電腦，把握和家人相處的珍貴時刻，全心投入！

一致性的教養觀

建議爸爸要和另一半有一致性的教養觀，這樣家庭經營能夠減少矛盾與衝突。意見不同時，彼此可以溝通討論。找到最適合雙方的共同規則。

延伸閱讀

「健康九九」-用愛教出快樂的孩子零到六歲正向教養手冊

來源：9~12個月寶寶開始會模仿大人嘟嘴、拍手？兒童發展篩檢對寶寶的重要性

九到十二個月寶寶開始會模仿大人嘟嘴、拍手？兒童發展篩檢對寶寶的重要性

寶寶出生後，每一項發展都在持續進行中。而每個階段也都會有一定的發展里程碑，平時照顧者可以藉由觀察。了解寶寶是否有發展落後的情形，並尋求專業醫師的幫助。適時給予孩子協助，讓發展落後對寶寶身心的影響降到最低。

寶寶出生後真的是「一暎大一寸」，不只身高、體重迅速成長。粗細動作、認知以及社會發展等，也有一定的發展里程碑。從會坐到會爬，九個月的寶寶也開始會嘟嘴、拍手。跟大人互動，每一個變化。總是讓媽咪驚喜連連。

不過在成長過程中，如果觀察到寶寶有些發展步驟明顯比同年齡落後。要有所警覺，及早接受篩檢評估。必要時由專業介入協助，讓發展落後帶來的影響降到最低。

九到十二個月寶寶除了會坐、會爬、會模仿，還會甚麼呢？

粗大、精細動作的進展

九到十二個月大的寶寶已經能由躺或趴的姿勢自己坐起來，並漸漸放手坐穩至少一分鐘。不會搖晃或跌倒，也開始試著往前移動或爬行至少三十公分距離。這個階段爸媽只要將雙手放在寶寶腋下稍加支撐，寶寶就能站得很挺。

爸媽也會發現寶寶已經會將玩具由一手換至另一手，而且不會掉落。隨著雙手抓握力道越來越強，也能從單手持續搖動玩具至少三下。到使用雙手分別抓取積木或小玩具。此外，因為對所有事物都很好奇。看到玩具按鍵、搖控器開關特別有興趣，每一個都想戳一戳。按看看。

認知及社會的發展

除了粗大以及精細動作的發展之外，認知和社會發展，也有相當程度的進步。例如寶寶可以一手各拿一個玩具相互敲打把玩。寶寶看著玩具積木掉落到視線外，眼神會去找。這階段也開始牙牙學語，跟他說話，他會用多種語音組合進行類溝通，非常可愛。

當媽咪呼喊寶寶名字或小名，他會發出聲音或有表情回應。在互動過程中，寶寶會看著大人。如果見到陌生人則會怕生或害羞。而這時候也開始想試著模仿大人做出嘟嘴、拍手等動作，並喜歡大人陪他玩--（躲貓貓）遊戲。

如何跟九到十二個月的寶寶互動？

寶寶精力越來越充沛，而且每天都想到處探索，爸爸媽媽該如何跟孩子互動？

一當寶寶用左手抓握小玩具時，媽咪可將玩具從寶寶中拿過來，移至寶寶右手邊，鼓勵引誘他用左手再拿一次。

二利用簡單的詞句，告訴寶寶你想要他做什麼。

三每天和寶寶說話、唱歌。

四讓寶寶學習選擇，例如香蕉或蘋果，或兩本最喜歡的書，只能其中擇一。

五讓寶寶有機會嘗試新食品，並允許他們用嘴巴或手觸摸食物，從過程中得到學習。

六教導寶寶如何用字彙，例如用手勢搭配言語。

七寶寶出生後，爸爸媽媽就可以開始唸故事書給他聽。以刺激認知及語言發展，可以用看圖講故事、自問自答方式。邊講邊觀察寶寶的反應，而孩子的笑容、咬書、拍打、撕書都是喜歡書的表現。

八寶寶開始有模仿的動作，爸爸媽媽可以抱著他，指著圖案說出物品或動物的名稱。

九跟寶寶一起玩躲貓貓遊戲。

寶寶發展是否落後？填寫健康手冊紀錄及定期接受篩檢的重要性

發展落後的原因

發展落後的原因大多是未知的，目前能被發現的原因約僅占二十至二十五。在已知的原因中，包括：營養、家庭環境刺激、基因突變、先天疾病、後天疾病等。遺傳和環境因素的影響最大，而每一個發展落後兒童可能存在一個

或多個病因。

如何發現寶寶發展落後？

多觀察寶寶的發展情形，並填寫兒童健康手冊中各年齡層的「家長紀錄事項」，依寶寶的實足月（年）齡，自行對照各年齡層的發展重點。

定期接受健康檢查及兒童發展篩檢，每次健檢及篩檢時，盡量多提供寶寶的狀況供醫師參考。

及早發現和篩檢的助益

零到三歲是兒童發展黃金期，任何異常若能及早發現，在三歲以前尋求協助，成效較好。及早診斷，接受適當療育，並透過醫療、教育、福利的介入，對寶寶未來造成的影響程度將能減到最低。

來源：A酸治療痘痘孕婦切勿自行使用

酸治療痘痘孕婦切勿自行使用

尋常性痤瘡，就是俗稱的青春痘，經常困擾著注重門面的年輕男女，尤其是正在發育的青少年。食藥署提醒，為了對抗惱人的青春痘，應該保持良好的清潔習慣與正常作息，尋求藥品治療也可以達到不錯的效果。其中A酸（；維生素A之酸類衍生物）可調節細胞角質化及發炎過程，活化細胞新生，是目前最常用來治療青春痘的藥品。

口服A酸製劑為處方藥，必須由醫師診治、開立處方才可取得，且因具致畸胎性，禁用於具生育能力的婦女。至於外用的A酸製劑，除了某些上市時間較短或濃度較高的藥品列為處方藥，其他外用A酸製劑（例如濃度不超過一之）則屬於指示藥品。食藥署建議，民眾可視自身狀況。若是嚴重或大面積痤瘡，應尋求專科醫師診治；輕度及小面積的痤瘡。則可至藥局向藥師諮詢，購買外用A酸指示藥品。

婦女使用A酸時應避孕，孕婦先洽醫師評估

使用A酸指示藥品前，必須詳閱藥品說明書。因有動物試驗顯示，懷孕婦女口服酸。可能導致胎兒有先天性異常風險；雖然外用酸製劑經皮膚吸收量微小，但其對孕間的安全性及有效性尚未被確立。因此建議婦女使用期間應避孕，孕婦或有計畫懷孕的婦女於使用前則應先洽醫師進行評估再行使用。

外用酸製劑建議一天擦一到二次，使用前應先用肥皂清洗患部皮膚、去除油脂，待乾燥十五到二十分鐘後再塗抹藥品。外用A酸的常見副作用為局部紅腫或脫皮，因此不適合塗抹在眼周或口、鼻等黏膜組織，也不可塗抹在損傷的皮膚或超過兩個手掌大的面積。值得注意的是，過量使用不但不會提高療效，反而可能增加副作用。

食藥署提醒，使用 A 酸後如有任何不適，應立即詢問醫師或藥師。同一部位使用七天後，若狀況無改善或更惡化，應停止使用並尋求專科醫師診治。唯有建立正確的用藥習慣與知識，不迷信偏方，才能確保健康，安心除痘更青春。

來源：requirements

一百
二到四

二到四

來源：「安胎」確保母胎平安

「安胎」確保母胎平安

若被醫師告知要安胎，孕媽咪別緊張，讓媽咪身體健康、寶寶平安誕生是現階段我們要努力的事，一起來安頓好自己和肚子裡的寶貝。

可能需要安胎的狀況

曾經早產

曾經因早產而安胎的孕婦，再次發生早產的機率也會提高。

雙胞胎妊娠

懷有雙胞胎，早產機率會提高。也因雙胞胎妊娠容易引發併發症，可依照醫師建議增加產檢次數。隨時注意胎兒狀況。

高危險妊娠

請定期檢查，遵循醫囑。注意休息，保持心情穩定。留意異常狀況及胎動。

子宮頸閉鎖不全

懷孕中期子宮頸因不明原因變薄、變短或擴張，合併羊膜由子宮頸滑出，而易造成胎兒提早分娩。

產前出血

需確認是因息肉或是前置胎盤所導致的出血情況。通常只要出血合併子宮收縮，建議就醫。沒有合併子宮收縮的出血，也須查明原因。

前置胎盤

此情況屬於高危險妊娠，一旦出血須立即就醫。也因為胎

盤位置較低，媽咪在日常生活中，要避免像是性行為、搬重物等粗重工作，減少出血的機率。

規則子宮收縮

一小時內出現六次以上的子宮收縮，或二十分鐘內收縮四次以上，且持續超過一小時，合併子宮頸變軟、擴張等。

早期破水

提早破水是早產重要原因，同時會增加母體胎兒感染風險，一般會考量感染風險及胎兒成熟度決定生產時機。

居家安胎注意五件事

孕媽咪在家中進行安胎，保持心情愉悅很重要，做可以讓自己放鬆心情的事情。

一如果沒有出現破水、陰道出血或子宮收縮等情況，可適時下床走走。

二應減少容易促使子宮收縮的動作，包含刺激乳頭、搬重物、頻繁上下樓梯等激烈活動。

三避免性行為及陰道灌洗。

四依照醫師指示按時服用藥物，並按時回診。如有任何疑問，隨時詢問專業醫療人員。

五注意有無早產現象，懷疑時儘速就醫確認，降低風險。

安胎期間家人這樣做

懷孕是每個家庭的大事，尤其在孕媽咪安胎期間。無論在生理或心理都承受著相當壓力，此時。家人給予良好的支持與照顧很重要。

伴侶請多關心孕媽咪，給她足夠的心理支持，讓她保持愉悅心情，安心休養。

按摩孕媽咪的肩膀、背部、小腿，舒緩身體及心情。

若家裡有其他需要照顧者，找幫手或協助妥善安排。

什麼狀況時需要住院安胎？

當孕媽咪出現以下情況，應立即就醫，醫師會視情況給予合適安胎藥物，降低早產帶來的風險。

早發性子宮收縮，口服藥物無法控制，或是有合併子宮頸擴張情形。

早期破水。

陰道出血。

其他高危險妊娠狀況，由臨床醫師來決定。

如使用安胎藥物出現不適症狀，請與醫師討論是否調整安胎藥物的使用。

安胎一定要臥床嗎？

在家安胎的孕媽咪，通常可以適度活動；在醫院安胎的孕媽咪，請諮詢您的婦產科醫師。

此外，如果需要臥床。也要動動手腳，防止肌肉無力及血栓產生。也可請另一半適度幫忙輕輕按摩。

延伸閱讀：【孕產婦關懷網站】懷孕了！什麼情況需要安胎？

來源：「臍帶護理教學」

「臍帶護理教學」

影片教導如何幫寶寶作臍帶護理，觀察寶寶臍帶變化。維持清潔與乾燥，預防感染。以促進臍帶早日脫落。

時間：每日沐浴後至少做一次臍帶護理；更換尿布時亦可消毒臍帶。

準備用物：七十五酒精、九十五酒精、無菌棉棒。

臍帶護理步驟：

一以小棉棒沾七十五酒精消毒，針對臍帶根部臍帶周圍皮膚由內向外環形消毒約二吋。

二以九十五酒精依上述方法重覆消毒一次。

注意事項：

一臍帶脫落時間：出生後平均七到十天臍帶會自然乾燥及脫落，可能因臍帶粗細造成脫落時間不定，最長可達一個月；掉落後臍帶根部仍會潮濕且可能會有滲血及滲液情形，請繼續消毒至完全乾燥即可。

二觀察臍帶周圍皮膚，若有紅、出血、潮濕、滲出物或惡臭味等疑似感染的症狀，請就醫治療。

三包尿布時無需刻意露出臍帶，避免造成衣物拉扯。

四肚臍處勿塗抹其他刺激物，如：萬金油、麻油、紫藥水等，避免過度刺激引起不適或引發感染。

來源：「順利」生產要知道的事

「順利」生產要知道的事

懷胎九月是一件辛苦的事，每位孕媽咪無不希望最後生產能順利，孕媽咪常會問的、會擔心的是生產時的疼痛，是不是開刀比較好還是自然產比較好

生產方式的選擇會建議在沒有特殊的理由、沒有特別的狀況下，一定是選擇陰道生產。因為陰道生產的過程中，寶寶經過產道的擠壓。會將寶寶在胸腔、肺裡的羊水擠壓出來，所以都是同一個週數選擇剖腹產的寶寶。發生呼吸窘迫的比例，會比以陰道生產的寶寶來的高。而且包括產後媽媽的復原、傷口疼痛、寶寶的照顧，陰道生產都遠優於剖腹生產。所以若沒有什麼特殊理由，建議還是不要開刀剖腹生產。

臨床經驗顯示，第一胎約八十五可採自然產，一般從規則陣痛到生產約需八至十二小時是正常範圍，第二胎通常可減少十三至一半的時間。產程順利與否，跟子宮收縮速度、胎兒頭部下降高度、陰道口何時全開等均有關；且即使不是難產到必須剖腹，也有部分產婦需要透過一些醫療介入來催生。

然而，孕婦順利生產並非只能靠醫師幫忙。事先採取自助的方法，把握「三不三要」原則。可以讓生產順利！孕婦事先可以透過下列原則幫助自己：

三「不」原則

一 懷孕晚期不喝人參茶：有些人認為孕婦生產很費力，要喝人參茶來補氣。然而人參其實會抑制子宮收縮，因此其實是安胎用。但生產是需要子宮收縮的，所以懷孕超過三十五周之後就不宜飲用。

二 控制體重，不要把胎兒養太大：父母都希望孩子頭好壯壯。但若出生前就頭好壯壯，反而容易難產。一般建議胎兒出生前體重，最好不要超過三千五百公克。

三 適當的產前運動，不要坐著不動：生產需要使力。尤其腹部、大腿和手臂很費力，因此孕婦不要都坐著不動。完全都不動會降低肌力。孕期適合的運動包括散步、走一些階梯，有些人甚至做孕婦瑜珈，要注意運動量必須是自己可負荷的程度。

三「要」原則

一要配合產檢：孕期過程每次產檢都很重要，幫助了解胎兒的狀態。尤其到了晚期，胎兒的姿勢會影響產程。一般若是趴著睡比較好生，若產檢發現寶寶是仰著睡。會建議進行一些輔助運動，透過重力調整寶寶的姿勢。

二要練習拉梅茲呼吸法：訓練用有效的呼吸和放鬆來反應子宮的收縮，以減少生產時的不適。鼓勵夫妻在懷孕晚期妊娠七到九個月一起學習，待產與分娩中才有協同的

作用。共同為孩子的出生而努力。

三要多跟胎兒溝通：雖然沒有實證，不過臨床上發現懷孕期間多跟胎兒說話。鼓勵他們乖乖在什麼時間點出來，這種講話方式透過聲波傳導。胎兒會有感覺的，對孕婦也有安定的心理作用。

接近生產期之前，會出現下列幾種徵象：

一輕鬆感：預產期前幾週，胎兒頭部會下降到骨盆腔。孕婦會有輕鬆感，通常食慾較好。呼吸較順暢。

二落紅或現血：子宮頸口漸開，子宮頸的粘液混合少許血液，從陰道口排出。

三陣痛或腰酸：因子宮收縮而造成的，會有下列特性：

一開始時為不規則疼痛，漸漸的轉變為規則，且隨著時間漸漸加長。

二疼痛的部位在整個腹部及背部，尤其是尾骨處有痠痛感。

三陣痛時子宮變得很硬，不痛時就變軟。

四不會因按摩或走動而減輕疼痛。

四破水由陰道流出多量液體：保護胎兒的羊膜破裂，羊水自陰道流出。此時不管有無陣痛，皆應減少走動。儘快到醫院。

若有下列任一生產徵兆，應儘速直接到產房：

一規則的陣痛：第一胎約七到八分鐘陣痛一次，第二胎含以上產婦規則陣痛即可待產。

二破水

三其他異常：如產前出血胎動減少等等。

來源：一次來兩個！懷雙胞胎，要注意哪些事情？

一次來兩個！懷雙胞胎，要注意哪些事情？

很多人聽到懷雙胞胎，覺得痛一次生兩個較省事。但醫師不這麼認為，懷雙胞胎妊娠併發症風險較高。到底有哪些危險？發生雙胞胎輸血症候群的機率有多少？孕媽咪營養攝取需要加倍嗎？該注意哪些事項呢？

年齡、家族、人工受孕，影響懷雙胞胎機率

到底懷雙胞胎的機率有多少？家族有雙胞胎，機率會比一般人高嗎？婦產科醫師認為，隨著懷孕年齡越來越大。懷雙胞胎的機率也有上升趨勢，機率約在一到三。為什麼

與年紀有關？主要因高齡婦女下視丘分泌的性腺刺激素會上升，刺激濾泡增生排出的卵子數增加，便提高懷雙胞胎的機率。此外，懷雙胞胎也和家族史有關，假如父母有一方是雙胞胎，女兒懷雙胞胎的機率會較高；而現今不孕症的夫妻在人工生殖技術的介入下懷雙胞胎的機會也增加。

懷雙胞胎媽咪，小心併發症風險

懷孕期間可能出現的併發症在懷雙胞胎的孕婦身上併發症風險會提高，對孕婦和胎兒都有影響，除了產下巨嬰及過期生產的風險低之外，孕期高風險的問題包括：

胎兒：早產的機率增加；生長遲滯情形，胎兒發育比較慢，體重較輕；先天性異常。

孕婦：要小心子癰前症、妊娠糖尿病。如果高齡又懷雙胞胎，併發症風險更高。因為高齡產婦本身就是高危險妊娠族群，加上雙胞胎。就要更小心。

同卵雙胞胎的雙胞胎輸血症候群機率較高

懷雙胞胎要注意可能出現雙胞胎輸血症候群，異卵雙胞胎發生輸血症候群的機率較低；同雙胞胎因血管血互相通。一個胎兒血灌注到另一個身上，變成一個長得大。一個發育小，但發育較大的胎兒反而有較高胎兒水腫及死亡的風險。同卵雙胞胎發生輸血症候群的機率約九到十五，若又是同一羊膜腔中的同卵雙胞胎發生率在六左右，但這類雙胞胎發生臍帶纏繞的風險較高，甚至可能出現連體嬰。

懷雙胞胎的媽咪，產檢要比一般孕婦密集。從懷孕一開始即建議每兩週產檢一次，一旦有出現併發症。必須每週接受一次產檢。

痛一次生兩個好處多？醫師不這麼認為

以醫學角度，對於懷雙胞胎認為沒有任何好處，反而會擔心一些併發症，不過很多媽媽覺得懷一次生兩個較省事。

至於是否能避免懷雙胞胎，自然懷孕防不勝防。無法事先避免，只能在人工受孕這部分做預防。由於技術越來越進步，已能夠一次只植入一顆胚胎。其他胚胎先冷凍，等沒成功。下次可以再用。或是懷孕早期檢查出多胞胎妊娠，可進行減胎手術，大約在懷孕十週左右進行。

懷雙胞胎媽咪，孕期生活要注意下列事項

營養攝取要比較多，卡路里比未懷孕時增加三成，要重視維生素、鐵、鈣的攝取。

因為擔心早產，所以整個孕期都要注意產兆，需留意幾個症狀：

一 早期破水，注意陰道是否有不正常的分泌物

二 不正常出血

三 規則宮縮

四 注意胎動

多休息，減少需要勞力的工作，避免過度勞累及激烈運動。

密切追蹤胎兒體重。

懷雙胞胎胎兒畸形風險較高，孕期最好做高層次超音波。

雙胞胎媽咪會有很大壓力及更多擔心，比較容易煩躁，甚至產後因為擔心照顧寶寶問題而出現憂鬱。此外，孕吐、貧血等機率較高，後期妊娠也容易出現特有的孕期皮膚紅疹，自己和家人都要加以留意。飲食方面建議請營養師指導，尤其鈣質、葉酸、鐵等攝取一定要夠。體重增加幅度可以較高，可增加十七到二十四公斤。孕婦專用維他命建議要補充，而且劑量要加倍。

媽咪最擔心的問題：早產、產後照顧壓力

懷雙胞胎需要安胎的機會較單胞胎高，希望盡量能懷孕超過三十四週生產。雙胞胎標準生產週數在懷孕三十六到三十八週生，不過這都是理想，很多孕媽咪都撐不到這樣的週數。另一方面因為懷兩個，後期比較不舒服。包括骨盆疼痛、橫膈膜受壓迫造成呼吸不順、腹脹、腰酸背痛等，這些症狀會比單胞胎媽咪更早出現。只能多變換姿勢、按摩以及使用托腹帶幫助緩解。

雙胞胎媽咪們大多自己知道早產風險高，這是她們最擔心的。臨床案例，一位懷雙胞胎媽媽在二十一週破水。安胎一陣子沒辦法，只好先將靠近破水處的寶寶生出來。寶寶留在肚子裡繼續安胎，一週後再生。所以雖是雙胞胎，出生日期卻不一樣。第一個出生，另一個寶寶能安多久很難預測，要看媽咪的體質，尤其要確保沒有感染。

生產方式部分，大多選擇剖腹產。不過若是靠子宮頸的寶寶是頭位，可以嘗試自然產。因為經過寶寶通過產道，使產道鬆弛。另一個（寶寶）無論何種胎位，自然生產都沒問題。其他較煩惱的問題就是產後照顧兩個寶寶的體力以及經濟上的壓力。

來源：一次整理哺乳期飲食疑問！各類營養該如何吃？

一次整理哺乳期飲食疑問！各類營養該如何吃？

哺乳有許多好處，但過程也充滿挑戰。包括媽咪產後胃口

不佳，吃不下。甚至為了確保母乳品質，得顧慮許多飲食禁忌。實在辛苦。今天帮大家一次性整理好哺乳期的營養觀念與飲食重點，讓妳不再四處查資料，輕鬆掌握該吃什麼、該注意什麼！

哺乳期食慾不振，會造成哪些問題？

母乳是寶寶成長的重要營養來源，但不少媽咪在產後會因為身體虛弱、作息混亂。出現胃口差、吃不下的情況，也因此擔心會不會影響母乳品質。甚至寶寶的發育。哺乳期食慾不振，會造成哪些問題？讓我們一起來了解。

問題一：母乳分泌量減少

當媽咪營養攝取不足時，最直接的影響就是「母乳分泌量會減少」。哺乳期每天大約需要比平時多攝取五百大卡熱量，總熱量建議約為二千三百大卡。如果熱量不足，不僅會影響乳汁分泌量，也會讓母乳濃度變得稀薄，讓寶寶喝不飽、更容易餓！

問題二：營養供應不足，影響寶寶免疫力

除了整體母乳的分泌量，也會導致寶寶無法從母乳中獲取足夠的蛋白質、脂肪、維生素等必需營養素，影響成長發育和免疫力。

問題三：產後體力不夠，更容易疲勞

產後身體需要足夠的營養來修復生產時的損傷，但胃口不佳會直接影響媽咪身體的復原速度和體力，還容易出現疲累、頭暈、臉色蒼白等情況。

問題四：影響腸胃功能，加劇便秘、腹脹

媽咪在產後因為荷爾蒙變化及子宮壓迫，導致腸道蠕動減慢。如果食慾不振，加上缺乏纖維、水分或活動量不足。更會加劇便秘、腹脹等腸胃問題。

產後媽咪一定要多多休息，如果食慾不振。建議採取少量多餐的方式進食，並補充關鍵營養素。幫助身體維持正常代謝機能，促進恢復與體力提升。

哺乳期關鍵營養素與飲食建議

在哺乳階段，媽咪最重要的任務就是「均衡飲食」。全穀雜糧類、奶類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、油脂缺一不可，不需為自己設定太多飲食限制。這樣才能讓身體儘快恢復。以下是哺乳階段所需要的重要營養素：

蛋白質：

除了每日應攝取的基礎量六十公克，哺乳媽咪應再增加十五到二十公克的蛋白質。且建議一半以上是高品質的蛋白質，像是牛奶、乳製品、蛋、肉、海鮮等。也可搭配如豆

漿、豆腐等植物性蛋白質。優質蛋白能有效幫助修復組織、製造乳汁與維持免疫力。

鈣質：

哺乳期每天建議攝取一千毫克鈣質，而搭配維生素能更有助吸收。牛奶、小魚干、蝦米、牡蠣、海藻、黑芝麻、豆腐、黃豆類製品等都是鈣質含量較高的食物。

鐵質：

產後二個月內，媽咪每天仍需要補充三十毫克鐵質，來彌補生產時的失血與哺乳所需。紅肉、蛋黃、肝臟、深綠色蔬菜等都富含鐵質，建議搭配維生素一起吃，能幫助吸收更有效！

維生素：

哺乳期間需攝取更多維生素、群、等，建議多攝取蔬菜水果、全穀類、乳品，幫助媽咪補足營養。

液體：

哺乳期間每天建議喝足二千五百到三千的水分，有助於乳汁分泌，也能預防脫水。白開水、牛奶、果汁等都是不錯的選擇。

哺乳期補水小原則

母乳的主要成分是水，每天哺乳會消耗大量水分。媽咪要注意，在哺乳期間。水分需求會比一般人更高！

白開水是最基本又安全的選擇，但補水不只一種方式。像是湯品、牛奶，或是天然蔬果汁、養生茶飲等。都能增加液體攝取，讓口味更豐富。也有助維持母乳品質與媽咪、寶寶的健康。

【健康又安全的選擇】

一 天然蔬果汁

天然的水果或蔬菜汁含有豐富維生素，最推薦「新鮮現打、不加糖」的蔬果汁，如蘋果汁、胡蘿蔔汁，健康又安心。但提醒媽咪要留意糖分攝取，避免高糖水果（像是葡萄、芒果）。

二 無糖豆漿

含有豐富植物性蛋白質和大豆異黃酮，有助於媽媽營養補充與乳汁分泌，提醒應選擇「無糖」或「微糖」。

三 牛奶或優格飲品

富含鈣質、蛋白質與益生菌的乳製品，有助於媽咪穩定消

化系統、維持腸道健康。挑選時建議選擇「鮮奶」或「低脂乳品」，並避免高糖優酪乳或含有人工香料的產品。

四 氣泡水

如果喝膩了白開水，想增添風味，可以選擇無糖氣泡水或添加水果切片的水，避免人工香料。

五 茶飲

適量飲用薏仁水、紅棗水、枸杞茶，不只能補充水分與維生素，也有助於產後調理與身體恢復。

六 溫熱湯品

魚湯、雞湯等富含營養的湯品，不僅暖胃補身，還能促進乳汁分泌。

【可以但要注意的選擇】

一 咖啡

可以適量攝取，每日三百毫克咖啡因為上限，且在飲用後六十分鐘後再哺餵母乳，對寶寶影響較小。如果發現寶寶出現躁動、睡眠障礙、哭鬧等情形，則建議停止飲用。

二 奶茶

市售奶茶含有咖啡因、糖分與奶精，容易影響母乳品質及寶寶健康。若偶爾想解饑，建議選擇無糖鮮奶茶，並以低咖啡因茶種（如部分烏龍茶、四季春）為優先。

哺乳期間可以吃辛辣食物嗎？

有些媽咪擔心哺乳期間吃太重口味，像是蒜頭、辣椒或各種沾醬，會讓母乳變味、寶寶不喜歡。其實沒錯，媽咪的飲食確實會讓乳汁味道產生變化，但只要寶寶能接受，就不用太擔心。味道變化不會影響健康，媽咪可以安心吃喜歡的食物喔！

總結來說，哺乳媽媽是可以吃辛辣食物的，只要觀察寶寶反應沒問題，就能正常哺餵。若寶寶出現腹瀉、脹氣或拒奶等情況，再適度調整飲食即可。

最後提醒每位哺乳中的媽咪，別讓飲食成為壓力來源。吃得開心，身體恢復得更快，母乳品質也會更穩定，未來更有力氣陪伴寶寶一起長大。除了菸酒等明顯有害物質，其他飲食其實不必太拘束。只要掌握「均衡、多元」的原則，就是給自己和寶寶最棒的照顧。

來源：三大產兆 陣痛 破水 落紅

三大產兆 陣痛 破水 落紅

伴侶要生了嗎？什麼時候要準備去醫院待產呢？當伴侶接近預產期，並出現以下三大產兆時。就需要注意了，出現產兆不代表馬上要去醫院。可參考以下建議。生產三大徵兆，不一定有固定的前後順序，也可能沒有落紅及破水，直接就是陣痛期。

陣痛

第一胎大約七到八分鐘出現一次規則性陣痛時，就可以準備去醫院，

第二胎以上則是規則收縮就必須提早到醫院，因為經產婦的產程比較快，生產時間也比較短。

破水

由陰道流出大量接近透明的液體，感覺是不自主的流出，可以先墊上護墊，盡快出發去醫院待產。

落紅或現血

少量落紅出現，並不代表馬上要生產，可以再等待規則陣痛或是破水的產兆出現再就醫。如果落紅出血量多，請立即至醫院檢查。

擔心去醫院時機不對，可先諮詢

一 如不確定是否該去醫院待產，二十四小時都可以撥打電話至待產醫院的產房，詢問值班護理人員或醫師意見。

二 如有出現其他異常，例如大出血、胎動減少等，請盡快至醫院就醫。

三 出發至醫院時，記得帶上必需用品，如證件、待產包等等，並隨時將其放在熟悉的位置。

來源：三歲至七歲 你會關心的事

三歲至七歲 你會關心的事

三至七歲 您會關心的事

給爸媽的叮嚀

尊重孩子並傾聽您孩子的需求。

幫助孩子為自己做事情。

教導孩子什麼是對的，什麼是錯的。

讓孩子養成吃早餐的習慣，三餐正常，避免孩子食用營養價值低的食物，如糖果、汽水類等。

與老師保持良好溝通，若您覺得孩子做得不是很好，可請老師幫忙評估；如果您認為孩子需要額外的幫助或輔導，可與老師討論。

教導孩子學會保護自己，不隨便和陌生人交談，遇到甚麼事情一定要告訴父母。

傾聽孩子每天在學校發生的事情，不管事情是好的還是壞的。

做一個讓孩子學習的好榜樣。

三歲半至四歲之間應至眼科接受視力檢查，以免錯過斜弱視的最佳治療時期，並建議用眼三十分鐘休息十分鐘、每天戶外活動一百二十分鐘以上，以預防近視發生。

如何和寶寶互動

幫助孩子處理憤怒，如憤怒的時候可走開或到別的地方去玩。

孩子開始需要上學，上課前帶孩子去看學校認識環境，並向老師打招呼。

陪伴孩子念書，可以帶孩子到圖書館，讓他們選擇自己想要的書籍。

讓孩子做家務，並期望他們完成工作。

常常擁抱與讚美孩子，例如他有良好的行為和在學校表現良好時。

教導您的孩子遠離危險地方，例如火爐、水池旁。

教導孩子不要讓陌生人碰觸身體或私處。

來源：下一胎備孕注意事項

下一胎備孕注意事項

即使有過前一胎生育經驗，在下一胎備孕時。依然會面臨不同的問題，請爸爸同樣得多花點心思。陪伴太太走過孕產期。

一

考量各方因素做好下一胎規劃

每對夫妻對於是否生下一胎都有不同的考量因素，有些人考量家中經濟想多等幾年再生；但有些人考量年齡問題，要把握生育黃金期盡快生下一胎。何時生下一胎，並沒有標準時間表，主要是夫妻間找出共識。

二

調整作息維持良好生活習慣

想要順利迎接下一胎來報到，建議從調整生活習慣與作息開始。如有抽菸、喝酒習慣的爸爸請戒除。伴侶應一起養成規律的運動習慣，例如跑步、騎車、有氧運動等。並避免熬夜、維持飲食均衡，有助改善身體循環及代謝。打造良好受孕體質。

三

想再孕卻遲遲沒有好消息

若雙方有規律性生活且經過一年以上仍未懷孕，建議找醫師諮詢，找出影響受孕的可能原因。

四

男女性都要留意高齡風險

提醒爸爸媽媽，高齡生育或許在經濟、育兒耐心方面比較成熟穩定。不過，男性、女性高齡懷孕都可能增加生育風險。所以，建議下一胎還是要掌握生育黃金期。

來源：不孕症簡介

不孕症簡介

何謂不孕症

在沒有避孕的情況下，經過十二個月以上的性生活，而沒有成功受孕，即稱為不孕症。年齡超過三十五歲的婦女，懷孕能力明顯下降，若超過半年無法受孕，可以考慮提早就診。

近年來人工生殖科技進步，提供不孕夫婦「重現生機」的希望與機會。但並非所有「不孕症」都須靠生殖科技才能成功「做人」，有些情況可能僅需做一般的檢查及治療或調適一下心理壓力。也可成功受孕。

提高受孕機率的因素：

一、養成健康的生活型態，有助於提高懷孕的機會

一避免菸、酒及藥物的濫用，以免影響精子、卵子的製造與成熟，導致不孕。

二調適工作、情緒及壓力，以減少排卵障礙、性慾減低、性功能失常、精子製造減少等現象。

三均衡營養，保持理想體重，避免過胖及過瘦。

四 遠離環境中高溫、化學及放射性物質等污染。

二、安全單純的性生活

一 單純的性關係及正確使用保險套，可減少感染性病與感染的機會。若陰道有異常分泌物、解尿或下腹疼痛等病菌或性病感染的症狀時，應趕緊就醫。如併發性病時，性伴侶應一同接受徹底治療。有部分性病，如披衣菌感染。多數沒有明顯的自覺症狀致不易發現，只有靠安全、單純的性關係。以及嚴格正確使用保險套才能減少感染的機會。

二 有效避孕，減少施行墮胎手術。避免併發症的發生；若尚未生育過，或短時間還要生育。則儘量不使用子宮內避孕器來避孕。

三、孕前檢查若發現異常因素，應儘早就醫。並定期追蹤，宜及早計畫生育。提防受孕能力受影響。

女性因素：

一 排卵功能異常及荷爾蒙失調。

二 子宮頸黏液分泌異常，使精子無法順利進入子宮腔內。

三 子宮腔結構異常，子宮內膜粘連或功能異常。

四 輸卵管因發炎或感染一定發炎、發炎不一定有感染造成粘連或阻塞。

五 腹腔內因素如子宮內膜異位症，或之前手術引起骨盆腔、卵巢、輸卵管感染粘連。

男性因素：

一 精液異常：精子數目減少、形狀異常或活動力減弱。

二 睪丸製造精子障礙：有先天性異常、染色體異常、荷爾蒙異常、感染性疾病、精索靜脈曲張、慢性疾病、外傷、環境毒素、睪丸腫瘤、藥物、吸菸影響等病因。

三 精子運輸系統異常：包括先天性無輸精管症或後天輸精管阻塞。

四 性功能障礙：如陽萎、早洩或無法射精、尿道下裂等。

四、維護精子的品質：

一 勿使陰囊長期曝露在高溫環境中，或長時間穿著緊身褲。

二 正確的使用保險套，以預防感染。若發現有泌尿生殖道的感染時，應提早就醫。以避免影響精子品質，或造成輸精管阻塞。而導致不孕。

五、適孕年齡勿蹉跎：女性與男性的生育能力係隨著年齡的增長而有下降的趨勢，女性理想生育年齡為二十歲至三十五歲。男性生殖能力也因年齡越大，精子數量則越少。接觸環境中污染物質越頻繁，使精子受損。導致基因產生突變的機會越大。近年來男性精子的平均數量已經大不如前，且有逐年減少的趨勢。因此夫妻若有不孕的困擾時，應儘快尋求不孕的治療，勿蹉跎歲月而錯過懷孕契機。接受不孕症治療前，應先安排相關檢查，找出不孕症原因再做處置是非常重要的！檢查項目可能包括：基礎體溫測量、精液分析、輸卵管通暢檢查、血液荷爾蒙檢驗、陰道超音波檢查、子宮鏡檢查、腹腔鏡檢查等。

不孕症的治療：

一 找出不孕原因做適當治療。

二 人工受孕：利用人工生殖技術來協助受孕的方法，包括「人工授精」及「試管嬰兒」兩大類。

一 人工授精：在妻子排卵的時候，將丈夫的精蟲取出洗滌之後，由子宮頸的開口將活動精蟲注射入子宮內，以提高受孕的過程。若無法進行同房的夫妻、精液輕度異常的男性、已嘗試簡單治療仍無法自然懷孕的不孕症夫妻、不明原因的不孕症或不孕有一段時間的夫婦，均可以考慮人工授精。

二 試管嬰兒：又稱體外授精及胚胎植入，會經過控制排卵。將體內卵子取出，在體外受精並分裂約二到五天形成胚胎。由陰道植入子宮內的過程。試管嬰兒的治療，女方因須接受較多的藥物注射，且須將卵子取出體外受精，形成胚胎後再植回母體子宮內。

提高懷孕機率的方法：

不孕症的病人只是不容易懷孕，並不一定不能自然懷孕。除了證實女性兩側輸卵管或男性兩側輸精管確定不通、或者卵子與精蟲完全沒辦法製造之外，有很多的案例，在未接受治療的狀況下，仍然能以下列方式協助夫妻自然懷孕：

一 解除工作及情緒的壓力。

二 控制良好體重勿過度肥胖及太瘦。

三 減少菸、酒、藥物的使用，減少熬夜、保持良好的身心健康，多攝取高蛋白與維他命的食物。

四 避免長期處在高溫的環境、避免穿著太緊的褲子、須持續運動，以維持精液品質。

五鼓勵適齡婚育把握時機，年齡與成功活產有密切關係。三十五歲前活產率大約二十五到三十，三十五到四十歲後約二十。到了四十歲後約為十以下。

六提早就醫：如果發現問題，不要害怕，可以與相關醫療機構洽詢，及早掌握治療時機。

不孕症是夫妻要共同面對的課題，彼此相互鼓勵支持是很重要的。與您信賴的醫師合作，先排除所有懷孕障礙。在這過程中，夫妻雙方都要投入相當的時間、金錢與精力，應該要先有心理準備。夫妻兩人一起去檢查，男、女單獨或雙方有問題，均可能造成不孕，因此夫妻雙方都應即早做檢查。

來源：乙型鏈球菌篩檢：預防新生兒早發型敗血症

乙型鏈球菌篩檢：預防新生兒早發型敗血症

乙型鏈球菌篩檢：

預防新生兒早發型敗血症

人類的腸胃道及生殖泌尿道常見的細菌。約十八到二十的孕婦產道帶有此細菌。

檢查方法為在孕媽咪的陰道及肛門採樣後進行培養，約一週即可知道結果。

經篩檢確知為陽性時，醫師會進一步評估，並於待產時提供預防性之抗生素治療，以降低新生兒感染。

如未篩檢及治療，可能導致新生兒肺炎、腦膜炎、敗血症等重大併發症。

來源：乳房念珠菌感染有什麼症狀？

乳房念珠菌感染有什麼症狀？

念珠菌是一種常見的黴菌，其種類約為八十幾種，最常造成人體感染的是白色念珠菌（*Candida albicans*），喜歡生長在溫熱、陰暗、潮濕的環境如嘴巴、陰道、皮膚的皺摺、胸罩中。白色念珠菌由小寶寶期就存在在我們人體的表面皮膚、腸道、以及口腔內，正常情況下，其存在的量不多，而且與其它人體的各種正常細菌保持平衡。

念珠菌感染常見的症狀：

您的乳頭疼痛，有灼熱感。會癢，乳頭皮膚略呈紅色或粉紅色。亮亮的。

當在整個餵奶過程中，或餵完寶寶吃奶後。乳房深部有抽痛的感覺，有的媽媽描述乳房深部有類似針刺的灼熱感

及疼痛感覺。會延伸到媽媽的背部和肩膀，餵完奶後疼痛仍會持續。有人在噴乳反射時疼痛更劇烈。

寶寶口腔黏膜如舌背、夾黏膜及硬顎有像乳塊狀的白色斑塊（鵝口瘡），不易從黏膜上除去，通常不會引起疼痛或不適，但有可能會影響食慾。發生原因可能是被消毒不當的奶嘴或媽媽不乾淨的手或乳房所感染，另外營養不良的寶寶也較容易感染。

改善的方法：

用藥

使用抗黴菌藥膏十萬或懸浮液藥水在餵奶後塗在乳頭上，一天四次。在患處好後繼續治療七天。

消毒

在居家環境方面，如果寶寶有使用安撫奶嘴或人工奶嘴。或拿入口中咬的玩具，會接觸乳房的擠奶器配件。一天以煮沸消毒五分鐘方式消毒一次。

溢乳墊及寶寶尿布需勤更換，最好每次餵奶後就換一次溢乳墊。

穿戴棉質的胸罩，每天用熱水清洗胸罩及布質的乳墊，洗淨後需放在陽光下曬。

洗澡所使用的上半身與下半身的毛巾需分開，並常常清洗及曬太陽。

飲食

減少甜食的攝取，多食用優格類、蔓越莓及大蒜食品，可以減少念珠菌的過度滋生。

文中所提到的用藥，需諮詢醫師使用方式。如果使用以上方法，症狀仍未改善。仍需進一步尋求醫療諮詢。

來源：乳房硬塊及乳腺炎

乳房硬塊及乳腺炎

脹奶的時候，乳腺內充滿奶水。因此乳房會好像有硬塊，但不會有紅腫熱痛的情況；一旦奶水移出後。硬塊會消失。如果哺乳或擠奶後，硬塊仍在，而且有紅腫熱痛的情況，要考慮有輸乳管阻塞或乳腺炎的可能。乳腺管阻塞通常會有局部疼痛的硬塊，這上面的皮膚可能會泛紅。但是媽媽不會有明顯發燒也不會有不適的感覺。

乳腺炎除了局部非常疼痛的硬塊，皮膚發紅外，媽媽還會有發燒，及疲憊的感覺。

處理方式：

最重要的方法是讓阻塞在乳腺管的乳汁流出來。

一 注意是不是寶寶含乳含得不好、注意衣服是否太緊尤其是太緊的胸罩或是因為躺著壓到乳房造成的壓力、餵奶時手指不要壓到乳暈，而阻塞奶流、如果乳房大而下垂，且阻塞的部分是在乳房下面部分時。可試著在餵奶時，提高乳房，以幫助乳房下面部分的奶水被吸出來。（或使用一小毛巾捲成一小捲軸墊在乳房下）

二 持續哺乳，不論原因為何。多餵奶，媽媽要多休息。減少餵奶之外的事情。在任何寶寶想吃的時後就餵他。如果媽媽真的很不想餵發炎的一側，也一定要將奶水擠出來，才能改善症狀。每餐以不同姿勢餵食。可以吸出乳房不同部份的奶水。調整餵奶的姿勢，讓寶寶的下巴正對著硬塊處，可以幫助阻塞處奶水的排出。

三 按摩，當寶寶吸吮時，輕柔地按摩乳房硬塊周圍。

四 冷溫敷，兩餐餵食中間冷敷可以減輕疼痛，在餵奶前可以溫敷，幫助奶水容易被吸出來。（不建議大力搓揉硬塊部位）

五 感染未改善請即刻就醫。

通常阻塞的奶水被排出後，輸乳管阻塞、乳腺炎會在一天內改善。如果症狀非常嚴重，已經有明顯的發燒三十八以上。疲憊症狀，或是乳頭也有破皮皸裂的狀況。乳房表面皮膚發紅發熱或是症狀在奶水被排出後二十四小時內仍未改善時，即需要尋求醫療協助。

來源：乳房腫脹的原因及預防

乳房腫脹的原因及預防

產後頭幾天，當母親分泌奶水增加時，她會覺得乳房熱，重且硬。然而她的奶水流出順暢，可以看到奶水由乳頭滴出，這是正常的脹奶。

有時脹奶會有硬塊；母親所需要的做法就是讓嬰兒多吸奶以移出奶水，在餵奶後、重及硬的感覺或硬塊都會減輕。乳房會較軟，感覺較舒服。在幾天之後，母親的乳房會適應嬰兒的需求較不會脹奶。但母親不應該認為是她的乳汁開始減少。

乳房腫脹是乳房過度充盈，有一部份是因為奶水未被有效移出，一部份是組織液及血液的增加。因為水腫的關係，乳房會看起來發亮，母親也會覺得乳房疼痛。當乳房腫脹時，因為乳房內液體壓力的增加，加上催產素反射作用的降低，會使奶水流出更不順暢。乳頭也會因為皮膚緊繃，看起來平平的。而當乳頭因為緊繃而變平時，嬰兒就不易含住它來吸出奶水。也比較容易因為含乳姿勢不佳，而造成媽媽的乳頭疼痛及破皮。有時乳房腫脹會合併

皮膚發紅及發燒，若持續密集餵奶或規律將奶水排出，這種發燒通常在二十四小時內就自動退燒。

造成乳房腫脹的原因除了奶水很多之外，通常是因為太晚開始餵母乳、嬰兒含乳房含的不好或是限制吃奶的次數及餵奶時間長短所造成的。因此預防乳房腫脹的不二法門是：

一產後儘早讓寶寶開始吃母乳。

二確定寶寶以正確的吸吮姿勢含住乳房。

三在寶寶想吃奶的時候就餵奶，每天至少八到十二次的餵奶次數。

治療乳房腫脹的根本之道就是移出奶水，如果奶水沒有移出。就可能產生乳腺炎，形成乳房膿瘍。奶水的製造也會減少，所以不要建議母親停止哺乳。

一如果嬰兒可以吸吮，就應經常餵奶。調整抱嬰兒的姿勢使他含得更好，讓他可以有效地吸吮。而不會傷害乳頭。

二如果嬰兒無法吸吮，可以用手擠或是用擠奶器，有時只需要擠出一點奶水，使乳房軟得讓嬰兒含得住就可以餵奶了。

三維持乳房舒適，在餵奶前可以依媽媽自己的感覺選擇冷敷或溫敷。使用冷敷的話，要注意不要碰到乳暈附近，以避免降低噴乳反射。過度的熱敷有時反而會使血管充血腫脹，所以在餵奶前使用不要超過三到五分鐘。在兩餐餵奶中間或餵奶之後可以冷敷乳房如：使用冷凍蔬果包或冷毛巾，減少疼痛。

四刺激催產素反射，讓奶水流出。

一餵奶前溫水淋浴或泡澡。

二按摩頸、肩、背部，幫助母親放鬆。

三刺激乳頭皮膚或輕柔的按摩乳房。

四選擇舒適、能支撐手臂並提供可足夠支持背部的椅子，或舒適的躺下來餵奶。

五媽媽穿戴合適的胸罩。

六避免高油脂食物。

來源：乳汁與飲食

乳汁與飲食

「卵磷脂通乳」的說法，是加拿大著名的母乳哺餵專家提

出「卵磷脂可預防乳腺阻塞」，因卵磷脂可用來降低母乳中乳汁的黏性（脂肪結塊或過濃，增加在母乳中不飽和脂肪酸的比例。根據研究指出，卵磷脂具有乳化作用。可以減少乳汁過於濃稠，有效預防乳腺阻塞情況。但不同體質者食用相同的食物，都可能會顯現不同的效果。因此目前並無相關研究證實補充卵磷脂可促進乳汁分泌或通乳。

從營養學的角度來看，青木瓜的白色乳汁含膠質及纖維質。膳食纖維有助健胃整腸，而青木瓜本身含有的纖維也有助排便。對胃腸吸收也有幫助。排骨、豬腳這類富含油脂、蛋白質的食物，以及水分都有助於乳汁分泌。而木瓜酵素，可以幫助蛋白質消化、吸收。從這角度看，若要說青木瓜排骨、豬腳湯有助於乳汁分泌。某種程度上確實說得通。研究發現，木瓜含有的木瓜酵素。可以幫助蛋白質消化、吸收，它含有的纖維。還能健胃整腸，幫助排便。不只如此，木瓜裡含有的異黃酮類物質。對荷爾蒙分泌有幫助，坊間的青木瓜四物飲。四物本身有助補血，若對於血虛型的母乳媽媽青木瓜四物飲是比青木瓜燉排骨還來得方便又有效。但青木瓜本身能不能豐胸、催乳，必須要有更多的科學證據來證明。

促進奶水分泌的方法，還是要有效的乳汁移出。藉由親餵或擠奶的方法，媽媽有充足的睡眠及愉快心情。才是增加分泌乳汁的不二法門。

來源：乳腺暢通五訣竅

乳腺暢通五訣竅

當寶寶吸吮媽媽的乳房時，會刺激媽媽泌乳激素的產生。讓乳房分泌寶寶需要的奶水，寶寶吸吮得多。媽媽的奶水產生就多，如果寶寶無法親餵時。媽媽依寶寶需求擇定時間持續將奶水擠出來，乳房才會持續分泌奶水。

訣竅一 早期肌膚接觸 早期吸吮

生產後即可和寶寶有直接的肌膚接觸，醫護人員將寶寶放在媽媽胸前，沒有包布或衣服的相隔。寶寶會學習觸摸並學習吸吮乳房，刺激媽媽體內泌乳激素以及催產素的產生，有助於奶

水分泌以及子宮收縮。

訣竅二 不限次數依寶寶需求哺乳

只要寶寶想吃就應該餵奶，經常且不限時間的餵奶可刺激奶水分泌，持續移出奶水也可減少乳房腫脹的情形。

訣竅三 左右輪流持續哺乳擠乳

寶寶吸完一邊乳房，如果寶寶還想吃。再給他吸另一邊的乳房，除可讓寶寶吃到足夠的後奶。比較有飽足感，且兩

邊乳房都受到刺激持續製造奶水。無法親餵時，擠奶可以緩解脹奶情形也是持續刺激泌乳的方法。

訣竅四確保寶寶含乳姿勢正確

寶寶在吸吮乳房時必須含住乳頭和大部分的乳暈，下巴貼緊乳房，留意寶寶是否有深而慢的吸吮，如此才可有效吸吮奶水。

訣竅五舒適環境與寬鬆衣物

選擇舒適安靜的環境，也可藉由輕柔的音樂讓媽媽和寶寶身心愉快。日常衣著上應穿戴適當胸罩支持並保護乳房，避免因摩擦發生破皮現象與胸罩壓迫乳房造成的壓力。

來源：亮黃燈！注意懷孕期危險徵兆

亮黃燈！注意懷孕期危險徵兆

懷孕期間如果出現下列任何一種症狀時，應該立即就醫！

陰道出血不管量多少

持續或劇烈的頭痛

持續或劇烈的腹痛

持續或嚴重

噁心、嘔吐

突然發冷發熱

視力模糊

臉部和手部浮腫

尿量明顯變少或小便時

有疼痛或灼熱感

胎動停止或比

平常活動量少一半

陰道有水樣分泌物

不停流出懷疑為破水

持續的腰痠與

腹部變硬

來源：人「生」大事旅行手札

人「生」大事旅行手札

「人『生』大事旅行手札」，引導讀者思考人生歷程中，可能遭遇的生育及養育相關問題，手冊包含五大亮點：

漫畫風格圖文並茂：手冊採漫畫風格設計，將人生比喻為一趟旅程。以漫畫人物作為主角，各章均以短篇故事開頭。並以圖片搭配貼近生活的對話進行情境式引導，吸引青少年閱讀。

內容豐富淺顯易懂：內容包含生育自主決定、建立穩定的親密關係、精卵知識庫、懷孕的過程、常見的避孕措施、育兒的旅程及生育友善資源等，並以方式提供延伸閱讀資訊。

打破都市傳說：坊間流傳許多關於生育的都市傳說，往往會誤導民眾進行錯誤的生育決策，手冊中收錄了數則常見的都市傳說，加以破除並提供正確的相關衛教資訊。

過來人經驗談：透過已有生育經驗、正在決定是否生育，以及充分與伴侶討論後，決定生育或不生育的過來人經驗，協助讀者得以更加帶入其自身生育決策的情境。

填空式互動內容：每個人都擁有獨一無二的人生，也都保有生育自主權。並沒有單一公式可以套用，故手冊中提供許多留白互動內容。邀請讀者與手冊中的主角一起繪製專屬於自己的生育規劃藍圖。

來源：什麼是羊膜穿刺檢查？

什麼是羊膜穿刺檢查？

什麼是羊膜穿刺檢查羊水檢查

胎兒在羊膜腔中長大，而羊膜腔中的羊水具有提供胎兒養分及保護胎兒的功用。羊水是由媽媽的血清滲透液和胎兒的尿液所形成，其中有胎兒的皮屑、分泌物和代謝物質因此可透過羊膜穿刺抽取羊水。利用羊水裡的胎兒細胞進行染色體、基因或生化的檢查，來了解胎兒有無先天性疾病或染色體異常。準確率達九十九以上，以早期發現胎兒異常。並及早接受相關諮詢與醫療服務。

什麼時候適合做羊膜穿刺檢查

懷孕十六到十八週時羊膜腔內，具有足夠的羊水容量約二百到三百。此時羊水中的活性細胞比較多，細胞培養的成功率較高。是進行羊膜穿刺的最佳時機。

羊膜穿刺檢查如何操作，穿刺後需要注意什麼

一施行羊膜穿刺不需要麻醉，穿刺過程大約需要五到十

五分鐘。由經驗豐富的醫師在超音波監視引導下，利用長細針。穿過孕婦腹部、子宮進入羊膜腔，抽取二十羊水。並於抽取當天送至羊水分析實驗室進行細胞培養。

二羊膜穿刺抽取羊水結束，穿刺處會以無菌敷料覆蓋。醫師會再以超音波觀察胎兒的活動情形，同時孕婦在適當休息後。即可回家。

三返家後應多休息、避免提重物、劇烈運動及旅行，還要注意是否有腹部隱隱作痛、劇痛、陰道出血、羊水流出或不明原因的發燒，若有這些現象需隨時與醫師聯絡及返院檢查。

羊膜穿刺會影響胎兒嗎

孕婦接受羊膜穿刺檢查後造成流產的比例約一千四百，針對胎兒傷害的情況很少。因現在都是在超音波指引下進行操作檢查；部分孕婦約有一到二可能感覺子宮收縮疼痛、陰道少量出血或羊水滲出情形，只要遵照醫囑多休息就可恢復；但若是出血或羊水滲出量增加。就要儘速回診就醫。

孕婦什麼樣情況需要做羊膜穿刺檢查

女性的卵細胞，在其出生時都已減數分裂。由於年紀所引起的卵細胞或卵巢老化的結果就是卵子的品質變差，產生基因突變的機率也會增加。所以較有可能產下先天性異常的胎兒。也就是年齡愈高，出生唐氏症的機率愈大。舉例來說，若以二十五到二十九歲與三十五到三十九歲的年齡層的懷孕婦女相較，後者生出唐氏症比率約高五十五倍。孕婦年齡與染色體異常的相關性，其發生率與胎次無關，所以高齡孕婦應該要做羊膜穿刺檢查。

孕婦若符合下列任一種情況，建議做羊膜穿刺檢查：

一百三十四歲以上孕婦。

二曾生育過先天異常兒者。

三本人或配偶有遺傳性疾病者。

四家族有遺傳性疾病者。

五其他可能生育先天異常兒之高危險群者。（如：經超音波或孕婦血清篩檢胎兒有異常可能者。

來源：伴侶也懷孕中

伴侶也懷孕中

當另一半感受到即將要當爸爸時，也會和孕媽咪一樣產生焦慮、嘔吐等害喜的症狀。沒錯！伴侶也會害喜確有一事，醫學上稱為「擬娩症候群」。

伴侶請您這麼做

換個角度來看，不論伴侶是否有擬娩症候群，都應該設身處地為孕媽咪著想，兩人一起攜手走過這二百八十天的孕產旅程。伴侶不只是助手，而是和孕媽咪一樣重要的生產隊友！

一起參與產檢

瞭解懷孕及生產的資訊

注意孕期營養均衡

改善生活不良習慣

參加爸媽教室、生產準備課程

準備孕產、育兒用品

討論生產、哺乳及育兒計畫

若是生產時伴侶無法到場，記得產前尋找可以陪伴生產的隊友。可能是親人、好友或閨蜜，一起參與產前課程與準備。瞭解您的生產計畫。

來源：做試管懷孕成功率高？了解試管嬰兒4問及補助辦法

做試管懷孕成功率高？了解試管嬰兒四問及補助辦法

晚婚、晚孕情況在台灣越來越普遍，夫妻一旦錯過生育黃金期，可能就需要借助人工生殖的力量，來完成做爸媽的夢想。在人工生殖技術中，「試管嬰兒」最常被提出討論。有人認為，試管嬰兒成功率比較高。是不是選擇這個療程，比較容易懷孕？試管嬰兒適合所有不孕夫妻嗎？

試管嬰兒如何進行？

與人工受孕相比，試管嬰兒療程較為繁瑣，花費也會比較高。一般會建議，經歷人工授精失敗，雙方存在較複雜的生殖問題，像是男性精蟲數過低、女性雙側輸卵管阻塞、卵巢功能衰退等經醫師評估後比較適合進行試管嬰兒的夫妻。

試管嬰兒屬於體外受精，須將卵子及精子分別取出後。透過技術結合成受精卵，再放回女性體內。進行步驟如下：

一 女性月經來的第二到三天看診，抽血檢查荷爾蒙數值。透過陰道超音波檢查濾泡，施打排卵針。加速濾泡生長。

二 施打排卵針的過程，須定期回診，確認荷爾蒙指數及濾泡生長狀況，並依照實情況調整用藥。

三約在月經第十四到十六天進行取卵。女性於取卵前兩天施打破卵針，男性須禁慾三到五天。在取卵當天取精，專業人員運用技術。將卵子及精子結合成受精卵。

四受精卵會在胚胎培養箱培養約五天左右，再植入女性子宮。女性需要搭配服用黃體素，維持子宮穩定度。增加胚胎著床的成功率，植入後約十四天左右可驗孕確認。

試管嬰兒

一：選擇試管嬰兒，成功率比較高？

倘若夫妻還很年輕，身體狀況良好。生殖方面沒有太嚴重的問題，通常醫師會建議先從服用排卵藥。算好排卵期，嘗試自然懷孕。或是先試試人工授精。並不是所有不孕夫妻，都需要做到試管嬰兒，醫師必須透過一連串的詳細檢查，才能為不孕夫妻評估最適合的療程方式。

二：植入胚胎越多，越容易成功？

根據一百一十年人工生殖施行結果分析報告資料顯示，植入單一胚胎，和植入兩或三個胚胎的成功率差不多。胚胎植入的顆數越多，懷上多胞胎的機率也會增加。可能會提高孕產婦發生併發症，以及胎兒早產、低出生體重的風險。目前還是鼓勵降低胚胎植入數（單胚胎植入），以確保母嬰的健康。

三：透過試管嬰兒療程懷上的寶寶比較不健康？

根據研究顯示，試管嬰兒與自然懷孕的寶寶。未來的發展沒有差別，反而是夫妻雙方的年齡。會是影響胎兒健康的關鍵之一。以女性來說，年紀越大。卵子越少，品質也會開始下降。胎兒染色體異常及流產的風險也會上升；男性四十歲以後的精子染色體異常率也會增加，不易與卵子結合。因此，如有做人計畫，夫妻還是越早準備越好！

四：試管嬰兒可以挑性別嗎？

依據國內相關醫療法規，嚴禁懷孕進行性別篩檢。且基於醫學理由，醫師也不能以任何形式揭露胎兒性別。除非其他醫療必要，像是性聯遺傳疾病等。無論進行哪一種人工生殖法，都不能有胎兒性別篩選，或是性別選擇性墮胎。

試管嬰兒補助對象及資格

進行試管嬰兒是條很辛苦的路，特別是女性。需要反覆經歷取卵植入的過程，還要承受內心的壓力。而這些藥劑的費用，也會讓人有所擔憂。為了減輕不孕夫妻經濟上的負擔，

國健署自二零二五年十一月一日起實施「不孕症補

助三十」方案，針對不同年齡與療程次數提供更高額補助。

補助資格：

夫妻至少一方具中華民國國籍，並完成國內結婚登記。

妻子年齡未滿四十五歲。

經醫師診斷需進行體外受精（試管嬰兒）療程。

向國健署指定之特約人工生殖機構申請。

補助次數：

未滿三十九歲者：每胎最多補助六次。

三十九歲至未滿四十五歲者：每胎最多補助三次。

資料來源／國民健康署

補助金額：

每胎首次申請：未滿三十九歲者最高補助十五萬元；三十九歲至未滿四十五歲者最高補助十三萬元。

每胎第二、三次申請：未滿三十九歲者最高補助十萬元；三十九歲至未滿四十五歲者最高補助八萬元。

每胎第四到六次（僅限未滿四十歲）：每次最高補助六萬元。

低收入戶與中低收入戶：每次最高補助仍維持十五萬元。

若實際支出金額未達補助上限，則依實際支出金額核實補助。

來源：健康子宮，綻放女人光彩！子宮日常保養8大重點

健康子宮，綻放女人光彩！子宮日常保養八大重點

子宮與女性的青春、美麗、健康息息相關！當月經失調、疼痛難耐時，你是否才會注意到子宮的重要性？女性朋友在日常生活中就要重視子宮健康，才能預防各種疾病的發生。馬上來學習呵護子宮的八大保養訣竅，綻放女人光彩！

子宮是女性身體裡的神奇殿堂

子宮，是女性身體裡神奇의殿堂，它不僅能孕育新生命，更與女性整體健康息息相關。想要知道子宮是否健康，月經是非常重要的參考指標。

當女性朋友月經出現異常，例如週期紊亂、經痛難耐、經血量過多或過少等，都可能是子宮出現問題，應及時就醫檢查。

不可輕忽的警訊！子宮常見疾病

一 子宮肌瘤

子宮肌瘤是女性最常見的良性腫瘤。大多數子宮肌瘤不會有明顯症狀，不過，當腫瘤太大或位置不佳時，可能會導致經痛、經血過多、經期延長等問題。如果是比較小且無症狀的肌瘤，通常建議定期追蹤，如果肌瘤太大或影響生活時，則建議藥物或手術治療。

二 子宮內膜異位症

子宮內膜異位症是指子宮內膜組織異常生長在子宮腔外，例如卵巢、輸卵管或骨盆腔等處。子宮內膜異位症可能導致經痛、性交疼痛，甚至造成不孕。而發生在子宮肌肉層時，叫做子宮肌腺症。可能導致經血量過多。治療方式包括止痛藥、荷爾蒙療法或手術，若影響生育時，可能需要考慮採用試管嬰兒的生殖技術。

三 子宮頸癌

子宮頸癌主要由人類乳突病毒（ HPV ）感染引起，初期通常無症狀，因此，可能被忽略。子宮頸癌的治療方式，需依期數而決定，主要包括錐狀切除術、手術、放射治療、化學治療及標靶治療等。早期發現的子宮頸癌存活率極高，安全性行為、定期抹片檢查及接種疫苗是預防的最佳對策！

女性必知！子宮保養八大重點

一 規律作息，避免熬夜：

請盡量避免熬夜，保持良好的生活作息。有助荷爾蒙正常分泌，此外。充足睡眠能讓身體獲得充分修復，提升免疫力。為子宮健康提供強而有力的後盾。

二 維持適當體重：

肥胖會影響雌激素的分泌，也可能提高子宮內膜增生及子宮肌瘤。甚至子宮內膜癌的風險，所以。維持適當體重，對於子宮健康也有幫助。

三 適度運動，促進循環：

運動可以促進身體的新陳代謝，提高免疫力，讓身體更加有活力，也使子宮更健康。建議每週至少進行一百五十分鐘的中等強度有氧運動，例如快走、游泳、騎自行車等。

四 定期子宮頸抹片檢查：

六分鐘護一生，建議有過性行為的女性朋友，至少每三年應接受一次子宮頸抹片檢查，可及早發現異常。一百一十四年開始，政府針對子宮頸癌也擴大篩檢服務。二十五到二十九歲女性，每三年補助一次子宮頸抹片檢查；三十歲以上則每年一次。女性朋友可多加利用。

除此之外也可同時安排婦科檢查，能進一步了解是否有子宮肌瘤、子宮內膜異位症等問題。

五 避免亂吃成分不明的保健食品：

有些保健食品可能含有類似雌激素成分，長期或過量攝取會導致體內荷爾蒙失衡。尤其是患有子宮肌瘤、子宮內膜異位症等疾病的女性，在選擇保健食品時。請諮詢專業醫師或營養師、藥師的意見。

六 有月經異常問題請就醫：

如果有出現月經週期突然改變、經血量突然增加或減少、經痛突然加劇、非經期出血等，可能是子宮疾病所出現的症狀。應該要及時就醫，切勿自行診斷或延誤就醫。以免錯過最佳治療時機。

七 注意經期衛生：

經期時請勤換衛生棉，多喝水。避免過度勞累，並選擇透氣、舒適的衛生棉。保持私密處的清潔及乾爽。

八 減少壓力，調節情緒：

壓力會影響內分泌，導致月經不規則或造成子宮健康問題，可透過閱讀、深呼吸或放鬆活動來舒緩壓力。

重視子宮健康及問題，不只是擁有良好的生活品質，更是守護女性健康與幸福的常見關鍵。透過定期抹片檢查、注意經期衛生、維持良好生活習慣等方式來保養子宮，為自己打造一個健康、自信、美好的未來！

來源：健康小常識-不和腸病毒打交道

健康小常識 -不和腸病毒打交道

不和腸病毒打交道

腸病毒感染症是臺灣的季節性流行疾病，但全年都有感染個案發生，患者以五歲以下幼兒為主，尤其三歲以下幼兒為腸病毒感染併發重症的高危險群。

腸病毒感染途徑

腸病毒的傳染性極強，可經由腸胃道（糞-口、水或食物污染）、呼吸道飛沫、咳嗽或打噴嚏，也可經由接觸病人的皮

膚水泡潰瘍液體而感染。

新生兒在生產過程中接觸到母親產道分泌物，或是接觸母親的血液及呼吸道分泌物，也可能感染；出生後的感染源可能來自母親及其他人。

感染腸病毒常見症狀

大多數腸病毒感染沒有症狀，或類似一般感冒。有時會引起較特殊的臨床表現，常見的有手足口病、疱疹性咽峽炎等，可以至衛生福利部疾病管制署網站（）點選傳染病介紹中有關腸病毒感染併發重症的說明。

新生兒感染後，少數會出現心肌炎、肝炎、腦炎、血小板下降、多發性器官衰竭等敗血症徵候，甚至死亡。

腸病毒重症前兆病徵

在發病後七天內，出現下列病徵，應及早至大醫院就醫，包括：嗜睡、意識不清、活動力降低、手腳無力、肌躍型抽搐有如受到驚嚇的肢體抽動、持續嘔吐、不發燒時心跳加快或呼吸急促等症狀。

預防腸病毒的方法

勤於正確洗手，注意咳嗽禮節，保持良好個人衛生習慣。

注意環境衛生及居家環境良好通風。

儘量避免出入擁擠之公共場所，或與疑似病患接觸。

注意營養、均衡飲食、運動及充足的睡眠，都可以增強免疫力；餵食母乳，也可提高嬰兒抵抗力。

在摟抱、親吻或餵食幼兒前，務必更衣洗手。

若幼童經診斷感染腸病毒時，最好讓病童請假在家休息至少一星期（原則上建議以發病日起算），以避免傳給他人。

孕產婦在生產前後，如有發燒、上呼吸道感染、腹瀉、肋肌痛等疑似腸病毒感染症狀。產後應加強在接觸嬰兒前後的洗手、戴口罩及個人衛生，並建議在症狀緩解前。儘量避免接觸新生兒。另請家長留意新生兒的健康狀態，一旦發現新生兒出現發燒、活動力下降、喝奶量變少等情形，應儘速就醫。

當嬰兒有不明原因的發燒、精神活力變差時，應立即就醫，如曾有接觸到發燒或腸病毒感染的患者，也應主動告知醫師。

來源：健康小常識-兒童常見疾病及處理

健康小常識 -兒童常見疾病及處理

兒童常見疾病及處理

小兒腹瀉及嘔吐、呼吸道感染、上呼吸道感染、哮喘、中耳感染、細支氣管炎、肺炎、腦膜炎及敗血症等是兒童常見疾病，以下提供一些預防警訊，供家長參考。

小兒腹瀉及嘔吐

腹瀉對寶寶而言是嚴重的疾病，如果腹瀉帶走體內大量的水分及電解質，就會脫水、電解質不平衡，嚴重的話會危及寶寶生命。因此，適時地補充水分及電解質非常重要！

如果寶寶出現下列情形之一，請儘速就醫

:

食慾不振

非常口渴

在一到二小時內就解了數次水樣便，換了數次尿布

換下來的尿布帶血

不尋常地躁動不安

頻繁嘔吐

眼窩或是前囟門凹陷以及口乾

發燒

持續腹瀉超過二十四小時

注意！寶寶腹瀉或嘔吐時請務必這樣做

在腹瀉症狀一開始，就必須給予足夠的水分。來補充流失的水分，最好可選用小兒腹瀉專用的口服電解質水溶液；先給予清淡的食物。等到狀況穩定下來再給予營養的食物。

母乳寶寶，請增加母乳哺餵次數；若是以嬰兒配方食品哺餵的寶寶，可如同往常給予補充液體，例如：煮沸過且已快速冷卻的水。

除非有醫師的建議，否則小兒腹瀉時萬萬不可自行投予任何藥物。

只要寶寶因為拉肚子而更換尿布，就替寶寶補充水分，可使用奶瓶、杯子或湯匙等工具給予。

勤換尿布，保持臀部清潔乾燥，適時擦上少量凡士林保護皮膚，以避免紅臀、尿布疹的產生。

假如寶寶嘔吐，請勿馬上餵食，需等候十分鐘再替寶寶潤濕嘴唇。

補充額外的水分，需持續至止瀉，期間通常是三到五天。

請勿給寶寶飲用含糖飲料，例如果汁或碳酸飲料（包含檸檬水），因為這些飲料可能會使寶寶的腹瀉情形變得更嚴重。

六個月以上的寶寶腹瀉時，仍可以給予食物，因為食物可以減緩腹瀉情形，並增強寶寶體力。

腹瀉的預防

餵哺母乳，母乳是無菌且安全無虞的。

烹調食物至滾熱，保存食物時器皿要保持清潔且加蓋，並冷藏保存。避免生熟食共用砧板並分開存放，以免交叉汙染。

每個人如廁後及接觸寶寶前都必須先洗手，換尿布後也必須清潔雙手。

如果寶寶使用嬰兒配方食品，沖泡前需以肥皂與清水充分清洗雙手。建議以煮沸後的開水在攝氏七十度左右沖泡，然後放置或冷卻至適當溫度後再餵食。並於降溫後儘快食用，以避免放置過久滋生細菌。

詢問您的醫師關於奶瓶及奶嘴消毒方式的建議，所有用來泡嬰兒配方食品的器具都必須保持清潔，奶粉及副食品勺匙避免放置於罐中，應另外存放並經常清洗、保持乾燥。哺餵的器具必須洗淨消毒包含母乳哺餵的任何器具，奶瓶及奶嘴外的器具每使用三個月就須徹底清潔及沖洗一次。

呼吸道感染

呼吸道感染是孩童就醫最常見的問題，多數為病毒感染所致。最重要的預防之道就是多洗手、減少出入人多的公共場所或與病人接觸的機會，並且讓孩子多運動、吃飽、睡足，身體保持良好狀況。

上呼吸道感染

一般俗稱的「感冒」，由病毒感染引起，主要症狀為咳嗽、鼻塞、流鼻水、發燒、食慾不佳，有時伴隨嘔吐、拉肚子。

通常症狀在三、五天後就改善，就醫的主要目的是確定是否為單純的感冒，檢查有無併發症。

哮吼

哮吼是指喉部會厭下與氣管出現發炎腫脹，並且併發呼吸窘迫。

哮吼發生時，孩子的咳嗽聲會變得嘶啞，嚴重時伴隨呼吸困難。

中耳感染

中耳感染通常是病毒感染的細菌合併症，會造成中耳不適。

中耳感染的孩子，可能會有以下特徵

:

觸摸或拉耳朵，且煩躁哭鬧

單邊耳朵看起來紅紅的，而且發熱發燒

食慾不振嘔吐、腹瀉，或者上吐下瀉

細支氣管炎

多發生於兩歲以下的幼兒，為病毒感染引起細小氣管發炎阻塞所導致的症狀，主要的病毒之一為呼吸道融合病毒。

症狀開始像一般的感冒，隨後出現呼吸急促、哮喘、厭食等現象，有些會有嘔吐、腹瀉，大多數約一週左右會改善。

若出現呼吸變快、合併胸部凹陷、鼻孔隨著呼吸而煽動、無法進食時，有必要安排住院，給予氧氣和點滴注射。

肺炎

初期與感冒的症狀相似，不過肺炎可能會出現較嚴重的症狀，像是發燒較高、較多天，呼吸急促、疲倦、胸痛、胸凹等。

若判斷為細菌性肺炎，應接受適當的抗生素治療。

小提示

孩子哮吼發生時

:

讓身體保持溫暖。

多補充水分，可以從飲水或奶類中補充。

若出現呼吸困難，請立即就醫。

若是哮喘情況沒有改善，也請您向醫師求助。

孩子罹患中耳炎時

:

不要用棉花棒清潔耳道，這可能會造成傷害或疼痛。

帶孩子尋求醫療協助。

腦膜炎及敗血症

腦膜炎：發生在覆蓋腦及脊髓膜的感染或發炎，感染可來自細菌或病毒；敗血症：細菌進入血液系統所引起的嚴重感染。嬰幼兒的腦膜炎常合併敗血症發生，而敗血症可能會伴隨腦膜炎一起出現或者單獨出現。

腦膜炎及敗血症可能出現以下症狀，但不是每個患者都會同時出現所有的症狀，而且症狀發生的順序沒有一定的規律

:

活動力下降

痙攣或抽搐

情緒變得焦躁，被抱起時會尖叫或呻吟

劇烈頭痛

嘔吐或拒絕進食

頭上前凶門出現緊繃膨出

身體僵硬、抽搐動作或癱軟，無精神

頸部僵硬

皮膚蒼白或出現紫斑

出現紅色、棕色或紫色皮疹，或是皮膚上有黑色斑塊

手腳發冷並顫抖

發高燒

持續發燒威脅心臟的川崎症

川崎症（）是一種原因不明的全身血管發炎症候群，臺灣

每年有將近一千位個案，大多侵犯五歲以下兒童。最主要的併發症，是造成供應心臟血流的冠狀動脈病變，可能導致後遺症或死亡。川崎症是可以被治療的，確定診斷後儘快使用靜脈注射免疫球蛋白，可以大大地降低心臟併發症的發生率。

典型症狀包括

:

發燒（耳溫三十八）超過五天。

雙眼發紅。

嘴唇發紅乾裂、草莓舌、咽部發紅。

頸部淋巴腺腫大。

皮疹、卡介苗注射部位紅腫、肛門周圍發紅脫皮。

急性期手掌與腳掌紅腫，恢復期手指與腳趾脫皮。

來源：健康小常識-早期療育成效佳

健康小常識-早期療育成效佳

早期療育成效佳

孩子進入小學就讀前，身體不斷成長。其神經、智能也會同步發展，在認知、語言、動作、社會適應行為或情緒等各方面。形成一定的發展，比如：什麼時候會爬、會走、會對爸爸媽媽微笑、會開口叫「爸爸媽媽」、會開始怕陌生人、喜歡玩躲貓貓或辦家家酒等…如果有些發展步驟沒有跟上正常發展。我們就稱為「發展遲緩」。

兒童早期療育愈早進行成效愈好

過去家長多數存有「大雞慢啼」的觀念，以為孩子慢慢就會趕上，但事實上年幼的孩子神經系統可塑性較大。因此，有發展遲緩現象的兒童應當及早接受早期療育，其黃金時間是在三歲之前，介入成效較好。

如果不能提早給予這些嬰幼兒協助，可能影響其後續的神經智能發展。因此，早期療育對孩子的身心健康十分重要！

較容易出現發展遲緩的高風險群

如果寶寶是早產兒、出生低體重出生體重二千五百、有先天性異常、腦部疾病或受傷、或是母親懷孕期間曾接觸過菸酒藥品，家族近親有視聽覺障礙、智能不足、精神異常等，寶寶較容易發展遲緩，家長應特別留意觀察。

造成兒童發展遲緩的原因很多，專業團隊在評估時會給

予仔細的評量。孩子如有疑似發展遲緩的症狀，家長應隨時帶孩子就醫。以儘速確診及轉介早期療育。

如何早期發現孩子的發展問題

家長平日應多加觀察寶寶的發展步驟，同時定期帶孩子接受健康檢查及兒童發展篩檢。

家長應定期觀察並填寫兒童健康手冊中各年齡層之「家長紀錄事項」，及寶寶成長的發展步驟，並在每次健檢及兒童發展篩檢時，提供寶寶的狀況給醫師作參考。

家長可依寶寶的實足月（年）齡，自行對照各年齡層的發展重點。

來源：健康小常識-發燒的正確處置

健康小常識-發燒的正確處置

發燒是兒童生病最常見的症狀表現之一，但發燒未必就是疾病引起。發燒可以促進免疫功能，貿然退燒未必有助孩子的健康。應把握正確處理原則，避免不當的退燒方法。才能夠協助孩子康復。

關於發燒現象

發燒的定義為身體內部中心體溫三十八。

人體生病引起的發炎反應會讓體溫的定位點提高，所以造成發燒現象。

開始發燒時，身體會感到發寒、四肢冰冷，這是體溫定位點上升的結果。

一旦體溫提高到定位點之後，四肢會變溫熱，也不會有明顯怕冷的感覺。

發燒一段時間或使用退燒藥以後，體溫定位點下降，身體可能會覺得熱，並開始流汗退燒。

如何測量體溫

肛溫最接近身體內部的中心體溫，耳溫與肛溫的相關性很高，但三個月以下嬰兒的耳溫與中心體溫的相關性較差。

口溫與腋溫平均比肛溫低，腋溫平均比口溫低。

一個月以下或體重很低的新生兒，不適合量肛溫與耳溫，可考慮量腋溫或背溫。

重新認識發燒的影響

適度發燒可以提升免疫系統的效能，有研究顯示退燒藥

會壓抑身體免疫反應，反而可能延緩疾病的康復。

人體對發炎反應引起的發燒有調控機制，所以一般不會超過四十一。

有些家長擔心如果不積極退燒，孩子的體溫可能一直往上飆高，其實人體的體溫調控機制不會讓體溫無限上升。坊間孩子腦子燒壞的傳說，其實是孩子罹患腦炎、腦膜炎等疾病而留下神經後遺症，與發燒無直接因果關係。

必須注意的危險病徵

有無發燒和體溫高低都不一定能代表疾病嚴重程度。兒童生病時，重要的是觀察有無重症危險病徵，如果有下列情形就必須儘速就醫。

三個月以下嬰兒出現發燒症狀

持續頭痛與嘔吐

尿量大幅減少

皮膚出現紫斑

哭泣時沒有眼淚

未發燒時呼吸急促、呼吸困難、吸氣時胸壁凹陷

咳痰有血絲

呼吸暫停

心跳速度太慢、心跳不規則

頸部僵硬

痙攣、肌抽躍（肌肉不自主快速抽動，像觸電一樣）肢體麻痺、感覺異常

無法正常活動，例如不能、爬樓梯、走小段路便會很喘

意識不清、持續昏睡、未發燒時躁動不安、眼神呆滯

嘴唇、手指、腳趾發黑

退燒的時機

如果體溫並未太高也未引起特殊不舒服，尤其體溫並未超過三十九的時候，不需要積極退燒。

要注意的是，發燒對下列病人會產生較大的不良影響，所以當體溫超過三十八，就可考慮積極退燒：

慢性肺病

併發心臟衰竭之心臟病或發紺性心臟病

曾有熱性痙攣或癲癇發作

嚴重的神經肌肉疾病

慢性貧血

糖尿病與其他代謝異常（例如先天酵素缺乏）

其他因為發燒而有特殊不適症狀

正確的退燒方法

各種退燒藥物中，除了阿斯匹靈不可用於十八歲以下兒童，其他口服與塞劑之退燒藥均可於必要時適量使用。

單純注射點滴並沒有退燒效果。

冰枕、溫水拭浴等物理退燒法，並不會改變發炎反應引起體溫定位點的異常上升現象，所以不會有退燒效果，反而可能造成發燒兒童額外的代謝負擔。

衣服穿太多、中暑等產熱與散熱失調的情形也會造成發燒現象，但此時身體的體溫定位點其實是正常的，在這種情況下使用物理退燒法才會有些幫助。

發燒的後續照顧

部分家長認為吃退燒藥以後如果又燒起來，就表示醫師開的藥沒有效，所以會去找其他醫師。事實上，各種退燒藥的效果都只能維持幾個小時，目的在暫時緩解病人的不適。如果疾病的過程還沒有結束，退燒以後又燒起來是很常見的現象。

常見的呼吸道或腸胃道病毒感染，有些可能持續發燒達七天或甚至更久，家長必須注意孩子有無出現上述所列的危險病徵，並持續遵從醫囑追蹤治療。

來源：健康小常識-腸絞痛

健康小常識-腸絞痛

有些寶寶在十天到三個月大時會在傍晚或半夜的時候哭鬧，令父母手足無措且神經緊張，腸絞痛是可能的原因之一。目前腸絞痛發生的原因尚不清楚，每個寶寶發生的情況也有所不同，以下處理原則提供父母參考。

腸絞痛最常發生在何時

腸絞痛通常發生在十天至三個月大的寶寶。約二十的寶寶在第二週至第四週大時開始出現腸絞痛狀況，高峰期

大約在六週大時。

腸絞痛的寶寶會在傍晚或半夜的時候哭鬧，雖然感覺有餓卻拒絕吸奶，因為哭鬧而臉部漲紅，並高舉他的大腿或脹氣放屁。

腸絞痛寶寶的哭鬧很難安撫，一天可能出現三個小時。之後慢慢降低至一天約一到二個小時，直到三到四個月大時狀況開始消失。最晚持續到六個月大。

腸絞痛發生的原因

寶寶腸絞痛發生原因不明，有可能是寶寶受到某種刺激、情緒無法得到安撫，也可能是寶寶神經系統尚未發育成熟。

少數的腸絞痛是牛奶蛋白過敏所造成。

重要的是，腸絞痛需要和疝氣等急症鑑別。當寶寶發生腸絞痛時，兒科醫師會先判斷寶寶哭鬧的原因。是不是因為其他需治療的疾病所引起。

如何改善腸絞痛

腸絞痛發生原因未明，每個寶寶發生的情況亦有所不同。沒有一種方法可以適用所有寶寶，下列方法父母可多管齊下。以便改善寶寶的症狀：

關於哺餵，母乳媽媽自己可嘗試減少食用乳製品、咖啡因、洋蔥、甘藍菜（包心菜），和其他可能引起腸絞痛的食物；嬰兒配方食品寶寶則可和醫師討論是否需要改變餵食種類。

不要過量哺餵寶寶，嘗試將餵奶的間隔拉長至少二到二十五小時。

帶寶寶散步來安撫他。

輕搖寶寶，帶他到另一個沒人的房間或可以聽到烘衣機／洗衣機、電風扇等會發出規律低沉聲音的家電旁邊。穩定節奏的輕搖及聲音可以幫助寶寶入睡，但不可以直接把寶寶放在洗衣機或烘衣機上面。

奶嘴有安撫作用，如果寶寶願意吃奶嘴，可以嘗試給予寶寶吸吮奶嘴。

讓寶寶趴著，橫跨在成人雙腿上。並輕輕拍撫他的背，這樣可以讓寶寶腹部受壓力。幫助他舒服點。

抱直寶寶可讓其胃腸順利把氣體排出；另外，可於孩子的腹部，擦拭一層薄薄的嬰幼兒專用脹氣膏或腹部按摩。

將寶寶裹在大的薄毯裡，讓他感覺到安全感及溫暖；但一定要注意避免呼吸道阻塞，或是造成體溫過高。

來源：先生應該如何陪伴太太生產

先生應該如何陪伴太太生產

生產改革行動聯盟（以下簡稱生動盟）於二千零一十五年七月進行「父親或準父親陪產經驗和態度意見調查」：發現有八成的爸爸或準爸爸會認為應該要陪產，而陪產的三大理由為「給予妻子或伴侶心理上的支持」九百一十一、「和妻子或伴侶共享寶寶出生的喜悅」七百四十一、「親自迎接寶寶的誕生」七百二十四。可是即使男性陪產的意願很高，但若缺乏準備與引導，不但無法有效地陪產，對於伴侶在陣痛時可能會不知所措。

台灣社會有許多像是男性陪產會陽痿、見血休克的迷思，問卷調查結果僅有不到五的男性表示不陪產，主要理由是「擔心造成日後心理與生理上的影響」（二百五十五）、和「妻子與伴侶拒絕」（二百五十五），其次則是「對於生產情景的恐懼感」（二百一十三）、「醫院診所不鼓勵」（二百一十三）。然而，有實際陪產經驗的爸爸大多數（八百六十八）都表示陪產能增進夫妻的親密關係、或丈夫的性能力並未受到影響。並留言指出：「了解老婆是多辛苦的生小孩，感情會更好。更珍惜對方為自己的付出。」、「性關係一樣好，而且因為參與生產的過程，更愛老婆。」

國內外研究指出準爸爸在待產過程中全程參與、充分陪伴，能降低產婦無助及痛苦。並可增強日後照顧新生兒及育兒自信心、增進親子家庭關係，生產改革行動聯盟提出準爸爸的陪產教育。終結爸爸在產房裡的無助、無聊、無奈的陪產經驗，提供陪產時的教戰守則。共同創造正向經驗，協助準父親做更完整的陪產準備。一起迎接新生命的來臨：

一在懷孕階段夫妻兩人共同參與雙親教室，學習了解生產歷程的生理與心理變化。才不會因為待產時的巨大轉變而恐慌，也能清楚判斷產婦的需求。充分溝通，了解伴侶偏好的鼓勵模式。

二做個全方位的陪產者，先生多給產婦鼓勵。加強心理建設，在待產過程可以提供媽媽身體舒適的方法。包括擦汗、擁抱、肢體按摩、擦拭身體、更換產墊及衣服、協助如廁、扶助妻子走動及休息等。除非不得已，勿讓太太獨處感到孤獨。加油打氣和甜言蜜語不可少，配合身體接觸。多說一些鼓勵及讚美的話。

三在醫護人員指示範圍內，提供開水、流質或易消化食物補給品。協助太太保持正確的生產姿勢，運用節奏性口令。在陣痛來臨時，幫助太太達到適當的呼吸及用力。最好一起同步跟著做；由於不安以及害怕，產婦在待產中可能會失控或哭叫等。此時先生的支持及言語鼓勵非常重要。

四共同迎接寶寶誕生，在醫護人員的協助下，共同參與檢查新生兒的外觀，並立即協助媽媽在分娩後即刻與新生兒做第一次肌膚接觸。

生產過程夫妻倆人都是主體，缺一不可。這也是準爸爸陪產最大的意義，透過男性在陪產時建立的自信。能讓他在未來育兒更有自信。

來源：兒童常見呼吸道疾病及處理

兒童常見呼吸道疾病及處理

呼吸道感染

孩童就醫最常見的問題，多數為病毒感染所致。最重要的預防之道就是多洗手、減少出入人多的公共場所或與病人接觸的機會。並且讓孩子多運動、吃飽、睡足，身體保持良好狀況。

上呼吸道感染

一般俗稱的『感冒』，由病毒感染引起的，主要症狀就是咳嗽、鼻塞、流鼻水、發燒、食慾不佳，有時伴有嘔吐、拉肚子。

通常症狀在三、五天後就改善，就醫的主要目的是確定是否為單純的感冒，檢查有無併發症。

哮吼

指喉部會厭下與氣管出現發炎腫脹，並且併發呼吸窘迫。

哮吼發生時，孩子的咳嗽聲會變得嘶啞，嚴重時伴隨呼吸困難。

小提示：孩子哮吼發生時：

讓他的身體保持溫暖。

多補充水分，可以從飲水或奶類中補充。

若出現呼吸困難，請立即就醫。

若是哮吼情況沒有改善，也請您向醫師求助。

細支氣管炎

多發生於兩歲以下的幼兒，為病毒感染引起細小氣管發炎阻塞所導致的症狀。主要的病毒之一為呼吸道融合病毒。

症狀開始像一般的感冒，隨後出現呼吸急促、哮喘、厭食等現象，有些會有嘔吐、腹瀉，大多數約一週左右會改善。

若出現呼吸變快、合併胸部凹陷、鼻孔隨著呼吸而煽動、

無法進食時，有必要安排住院，給予氧氣和點滴注射。

肺炎

初期與感冒的症狀相似，不過肺炎可能會出現較嚴重的症狀，像是發燒較高、較多天，呼吸急促、疲倦、胸痛、胸凹等。

若判斷為細菌性肺炎，應接受適當的抗生素治療。

新生兒鼻腔內血管豐富、鼻腔狹小、鼻毛稀疏，外界微小物質，如棉絮、灰塵、冷風等刺激物，刺激鼻粘膜引起打噴嚏。所以請觀察看看寶寶打噴嚏之前的環境，例如更換衣物、床單被子移動，棉絮灰塵揚起。轉換空間或剛洗完澡接觸到冷空氣刺激，類似上述狀況而出現打噴嚏。鼻腔是呼吸道的門，在感受刺激物時，為了快速排出而打噴嚏的保護反應。所以當寶寶偶爾出現打噴嚏時，家長不需要過於擔心。除非合併有出現其他症狀，如咳嗽、鼻塞、流鼻水、發燒、食慾不佳。有時伴有嘔吐、拉肚子等情形，則需就醫由兒科醫師診治。

正常的鼻腔黏膜和呼吸道黏膜，會產生一些分泌物。目的是維持呼吸道的濕潤與運作，這些分泌物經由吞嚥口水、咳嗽、打噴涕清除掉。一般情況下不會感覺它的存在，但是小寶寶因鼻孔小、鼻腔也較小。稍有分泌物囤積就產生鼻塞的聲音；而喉頭、呼吸道也是一樣，口徑較小、軟骨較軟；再加上呼吸系統尚未成熟。排出分泌物的能力不夠，所以在稍有分泌物堆積時。隨呼吸振動鼻腔或喉嚨就發出呼嚕呼嚕的聲音，嚴格來說這不是「痰」。是正常現象，隨年齡增長會自動改善。但若有咳嗽不停或鼻水、鼻涕很多時，需就醫診治。

來源：初乳和成熟乳都一樣有營養？

初乳和成熟乳都一樣有營養？

依乳汁成分可分為三個時間階段：分娩後五天內分泌的乳汁叫「初乳」()；產後五百二十天左右的奶水叫做「轉型乳」或「過渡乳」；之後分泌的乳汁叫「成熟乳」。不同階段的乳汁，各適合不同年齡的嬰幼兒需要。從初乳到轉型乳，奶水成分的變動較大；當發展到成熟乳階段時，其成分變得較為穩定。

初乳奠定健康基礎

懷孕中後期開始，到產後的頭幾天，乳腺組織在泌乳第一期所泌出的奶水（初乳）相當重要，這有助於新生兒適應子宮外的生活。

一般來說，初乳顏色發黃、質地濃稠。但因為每個媽媽的身體狀況不同，有時初乳可能會呈藍色、綠色或粉紅色；有些時候。媽媽左、右邊的乳房所分泌的初乳顏色也不完全相同，皆屬正常；且當寶寶一出生時。初乳已經在媽媽乳房內形成，即能夠滿足出生後剛開始的營養所需。

初乳足夠提供新生兒營養所需，因此在嬰兒開始吸吮母乳前。不需要給予任何飲料或食物，例如配方奶。以免造成身體負擔，反而還可能增加過敏與感染的機會。並減少乳汁的分泌。

成熟乳營養成分穩定

隨著寶寶成長，媽媽提供的乳汁也從初乳逐漸轉變為成熟乳。成熟乳的奶水量是最多的，乳房可明顯感覺到乳水充盈感，媽媽有時可看到乳汁流出的現象。

成熟乳富含適合寶寶的蛋白質、脂肪、乳糖、維生素和礦物質等，乳汁成分較穩定，皆能滿足嬰幼兒需求。

母乳顏色白稀一樣有營養

一般而言，初乳比較濃稠，約一週到二十天後的成熟乳可能顏色就比較清。同一餐中，前面的奶水比較清，後面的奶水因為脂肪多，可能比較白而濃。有些民眾已經習慣配方奶的濃稠度，因此會誤認為母乳看起來稀稀、水水的，好像沒什麼營養的樣子。實際上，母乳可以完全提供寶寶前六個月所需要的營養，而且營養遠比配方奶來的完整。母乳是寶寶天然的食物，所含的蛋白質、脂肪及醣類較易吸收消化，並有免疫球蛋白、促進腦細胞發育物質如長鏈多元不飽和脂肪酸和，會因著寶寶不同時期的需求而有變化

成熟乳看起來較初乳清淡些，但其營養成分正足以應對每個寶寶的需求。只要媽媽的營養及水分補充得足夠，攝取均衡飲食。不需要擔心寶寶所吃到的母乳營養不足。在寶寶六個月左右再搭配富含鐵質的副食品，母乳仍可以是嬰兒生長重要的營養來源。

來源：別再說我奶水不夠

別再說我奶水不夠

妳是否常聽到「妳的乳房小」、「妳的身體不好」、「妳吃得不夠營養」、「妳的寶寶一直哭鬧」、「寶寶常常要吃奶是不是因為沒吃飽」這麼多的問句來質疑妳的奶水夠嗎？

奶水夠不夠是大部分哺乳媽媽及周圍親友常有的質疑，尤其是新手媽媽，因較不了解如何解讀新生兒的需求，壓力其實不小。

媽媽的初乳很重要，在嬰兒出生後二十四小時內的初乳是很營養的，只要十五就能帶給嬰兒二天的營養。

而乳房的大小，媽媽的飲食攝取量及營養狀況，與媽媽的奶水量沒有什麼相關性。

坊間流傳可促進泌乳的食物或花草茶，湯品。如花生豬腳

魚湯…等，因文化及個人體質不同。效果會不一樣，但須注意的是使用促進泌乳食物的同時。媽媽仍需要多擠奶或多餵奶才能有提升奶量的效果。

寶寶吸多少，媽媽就產生多少

當寶寶吸吮媽媽的乳房時，就會傳遞信息到媽媽的大腦裡，產生荷爾蒙的變化，讓乳房製造寶寶需要的奶水。

奶水吸出越多，奶水分泌越通暢

寶寶吸出愈多，奶水就繼續分泌愈多。如果寶寶因故和媽媽分開時，媽媽一定要兩、三個小時就將奶水擠出來刺激乳房，乳房才會持續分泌奶水。

疲憊與壓力

當媽媽在哺乳過程中有太多的壓力、太疲憊、失去自信或充滿懷疑時，而這樣的供需原理就很難順利地運行，這時更需要周遭的人來關心及提供支持，對媽媽將更有幫助。

奶水不足的表徵

一出生兩週後體重還沒有恢復到出生體重

二五天大的寶寶一天排尿少於六次，且顏色很深

三五天大的寶寶兩天沒有解大便

*小叮嚀

一注意媽媽與寶寶的哺乳姿勢是否舒適恰當、含乳方式是否正確、觀察寶寶想吃奶的反應、吸吮的節奏及吃到的表現等，同時給予寶寶學習的機會，寶寶習慣了自然就會正常吸吮。

二媽媽一直擔心奶水不足的心理壓力，反而會抑制泌乳功能。所以哺餵時放鬆心情，並且相信自己能成功。是十分重要的。

三週遭環境的支持與否，是成功哺乳的關鍵因素。尤其是家人的支持與配合；職場上則應加強與同事及主管間的溝通；列舉政府的推行政策及國內外研究實證，也是說服他人的辦法；最重要的。是媽媽堅持純母乳哺育的決心。

何時應該求助

當嬰兒含著乳房就睡著或者一直含著乳房不放；抱開沒多久就哭。

何時應該馬上就醫尋求哺乳協助

嬰兒含著乳房就睡著，沒有喝奶且不會醒來；嬰兒只有非常快速淺淺的吸吮；在三天之後尿尿次數仍不多；三到四天後仍只有深綠黑黏便排出。

寶寶常常要喝奶，這樣是奶水不夠的關係嗎？

正常足月新生兒的胃容量不大，少量多餐是很正常的現象。初乳的分泌量不多但是富含營養，每一到三小時喝一次。而且寶寶有強，深而慢的吸吮。可聽到寶寶的吞嚥聲，表示寶寶有喝到奶。同時可以由寶寶的排泄狀況知道進食量是否足夠。

來源：別讓產前出血影響妳的好孕氣

別讓產前出血影響妳的好孕氣

在確認懷孕後，出現陰道出血。可說是懷孕正常與否的重要指標，為了確保母胎安全。無論出血量多少，都應詳加檢查找出原因。尤其是特殊狀況下的產前出血，有時更合併了一些致命的危機。因此辨別產前出血的原因，就顯得格外重要。

正常情況下，除了足月懷孕在生產前的子宮頸擴張與撕裂的小血管所造成的落紅現象之外，整個懷孕過程中發生的陰道出血都是不正常的，應該立即就醫避免影響母胎健康。

在懷孕早期的陰道出血原因各有不同，常見的有下列狀況：

一先兆性流產：發生於懷孕早期。主要症狀為下腹悶痛、腰酸、背痛，合併有陰道出血。此時應該接受超音波檢查，瞭解胚胎的狀況例如胚囊的著床位置、胚胎心跳等。治療包括安胎藥物黃體素的使用以及臥床休息與避免過度勞累，並密切觀察出血現象。尤其是前次有早產病史者，更應小心。

二流產：當陰道出血及合併妊娠組織的排出，且超音波檢查發現已無子宮內懷孕的證據時稱之。此時治療方式是使用藥物或手術的方式讓剩餘的妊娠組織完全排出，儘快止住出血。並避免進一步發生感染的現象。

三子宮外孕：指受精卵不是著床在子宮內的正常位置，最常見的發生部位是輸卵管，不過也有可能著床於子宮頸、子宮角、卵巢，甚至腹腔內等。主要症狀為下腹痛、陰道出血等，有點類似先兆性流產，但子宮外孕破裂造成內出血時，腹痛漸漸加劇。如果內出血過多則有休克而危及生命安全，所以利用超音波檢查來鑑別是有必要的，在確認懷孕時，也別忘了有同時合併子宮外孕的可能。另外也可以抽血檢查血液中人類絨毛激素（ HCG ）值的變化來判斷，這樣的檢查可以在超音波還看不到胚囊時，幫忙做為診斷的依據。儘早診斷及治療是處置子宮外孕的最重要原則，因為任何的延遲治療都有可能造成子宮外孕破裂

出血，導致休克的可能。

四異常的受孕：受精卵只發育出胚囊而沒有胚胎稱作萎縮卵，胎死腹中，葡萄胎。此時應盡快讓妊娠組織排出，以免造成感染或凝血機制異常。

來源：剖腹產媽咪如何順利哺餵母乳呢

剖腹產媽咪如何順利哺餵母乳呢

剖腹產媽咪想要哺餵母乳，但卻擔心手術傷口疼痛影響哺乳，到底該怎麼做呢

其實，只要掌握哺乳技巧，親餵並沒有那麼困難喔！妳可以用枕頭墊在背後，身體採側臥姿勢。讓身體放鬆，腹部可蓋上毯子或厚毛巾。避免寶寶不慎踢到傷口；接著讓寶寶側臥在妳的胸前進行哺乳，不僅姿勢穩定。也能減少對傷口的碰觸，讓整個哺乳過程更舒適安心。

哺乳技巧：媽咪與寶寶採面對面的姿勢，媽咪輕柔地引導寶寶張大嘴。含住乳頭與部分乳暈，確定含乳姿勢正確後。就能開始親餵！

貼心提醒：別把乳頭直接塞在寶寶嘴巴裡，才能降低因含乳不正確，導致乳頭破皮的情況喔！

來源：卡介苗接種資訊

卡介苗接種資訊

接種的目的

預防重於治療，接種卡介苗可避免幼童發生結核性腦膜炎及粟粒性結核病。研究顯示，未接種卡介苗的幼童罹患結核性腦膜炎是約有接種者的四十七倍。此類疾病若未及早診治會造成腦脊髓等不可逆病變無法自理生活、智商受損等並伴隨約二十到四十的致死率。

宜何時接種

若無接種禁忌症的嬰幼兒，宜於出生滿五個月建議接種時間為出生滿五到八個月，至遲一歲前完成。

接種後可能的不良反應：

常見但不嚴重的不良反應：局部膿瘍、淋巴結炎等。

不常見但較嚴重的不良反應：骨炎骨髓炎、瀰漫性卡介苗感染等發生於嚴重先天性免疫缺損的嬰幼兒。

五歲以前要注意的事：

幼童如果出現局部含腋下膿瘍腫脹等疑似卡介苗不良反應時，宜提醒醫師將卡介苗接種因素納入評估；或洽地

方衛生局所協助轉介醫院小兒科診治或請小兒科醫師進行會診，以便進一步釐清病因。疑似確認因接種卡介苗受傷害者，可透過接種地衛生局的說明與協助，申請預防接種受害救濟。

接種前：請先確認父母雙方家人沒有疑似先天性免疫缺失之家族史如幼年因不明原因感染而死亡。另對於後天免疫不全病毒感染母親所生之嬰幼兒，請諮詢感染科醫師後，始得接種。

接種時：出生滿五到八個月之嬰兒活動力佳，故須妥善固定嬰兒。以利進行卡介苗皮內注射，請家屬配合工作人員的專業指導。讓注射過程順利完成。

接種後：注射部位平均一到二週後開始發紅，形成小紅結節，微有痛癢但不發燒。平均三週時會開始腫脹，約有四分之三的接種者腫脹小於一公分。平均六週開始有一半以上接種者會形成膿瘍或潰爛。平均四個月開始結痂，平均二至三個月會自動癒合結痂，留下一個淡紅色小疤痕，經過一段時間後會變成膚色。請家屬定期為嬰兒修剪指甲；膿瘍或有分泌物時，得以乾紗布覆蓋接種部位並以膠帶固定。若紗布潮濕或有分泌物沾黏時應更換；或穿著有袖的衣服，以避免嬰兒抓傷接種部位。引發不必要的感染。

來源：原本是親餵要開始上班了，寶寶不吸奶瓶要怎麼辦？

原本是親餵要開始上班了，寶寶不吸奶瓶要怎麼辦？

不要因為您將回去上班而急於在頭幾週給寶寶使用奶瓶，有些寶寶知道媽媽在旁邊而不願意吸食奶瓶，但媽媽不在的時候，寶寶很自然的能從照顧的保母那裡接受奶瓶。若寶寶不願意吸奶瓶，可暫時用杯子做為餵食器。

最好在媽媽上班之前能找到支持母乳哺餵的保母，和保母溝通你的哺乳計畫。如果可以，讓保母和寶寶提早相處熟悉一點。需向保母解釋寶寶需要一段時間來接受奶瓶餵食。

倘若寶寶不願意吸奶瓶，可以：

一用奶瓶在寶寶還沒餓之前先餵食。

二用奶瓶餵食時，拿媽媽的衣服包裹著寶寶。

三不要將奶嘴放入寶寶的口中，把奶嘴放在寶寶的嘴邊，讓孩子自己尋找奶嘴，主動含入嘴裡。

四試著把奶嘴用溫水沖，讓它和人體溫度相近。

五讓寶寶試用不同形狀、大小、材質的奶嘴，並調整奶嘴洞的大小。

六試著用不同的姿勢餵食寶寶，例如有些寶寶喜歡吸奶

瓶時，讓餵食的人把腳抬高。

七有些則不喜歡看著保母的臉，喜歡背向著保母較願意吸奶瓶。

八試著抱抱他、搖搖他、走一走等，使寶寶安靜下來。

九練習餵食奶瓶時，請家裡人代勞。

十在寶寶睡著時，把奶瓶放入他的嘴中。

十一繼續嘗試，但當寶寶仍然拒絕吸食奶瓶時，可用杯子、湯匙或滴管餵食。

來源：受虐性腦傷

受虐性腦傷

受虐性腦傷俗稱嬰兒搖晃症候群，()是指劇烈且快速地來回搖晃嬰兒或將嬰兒頭部直接衝撞堅硬的平面時。所造成的腦部受傷，由於這種腦部傷害。較常是孩子受虐造成，常發生在三歲以下兒童。尤其是小於六個月的嬰兒。

因嬰幼兒頸部肌肉較柔弱支撐力不好，當照顧者不耐嬰兒哭鬧不停且無法安撫而動怒。用力搖晃嬰兒企圖阻止哭鬧，腦組織在短時間內快速晃動。造成顱內或眼內血管破裂，如：硬腦膜下出血或蜘蛛網膜下腔出血、視網膜出血及腦水腫。可能出現的症狀包括：嗜睡、急躁不安、抽筋、意識不清、嘔吐、食慾不振、呼吸困難等。

哭是嬰兒和大人溝通的一種方式，寶寶哭鬧的原因很多。譬如肚子餓、尿布濕了、尿布疹痛癢、發燒、急性中耳炎、嬰兒腸絞痛…等，有時包布或衣服穿的太多、太熱也會引起不適而哭鬧。當遇到嬰兒哭鬧不停時，先觀察有無飢餓、尿濕或發燒的現象。適當的安撫如將寶貝用包巾舒適地包著，抱著他走一走。可輕拍他的背，給安撫奶嘴或讓寶寶吸吮自己的手。或許寶寶會安靜下來。

再次叮嚀家長，在抱孩子或與孩子玩耍時一定要保護他的頭頸部。尤其是六個月以下的嬰兒，並告知幫忙照顧您小寶寶的托育人員保母或親友。讓他們了解搖晃嬰兒的危險性，不可以用力搖晃寶寶及抱著寶寶用力旋轉、不可以將寶寶拋到床上或甩耳光；一但發生應儘速送醫。由醫護人員給予適當的治療，因致命率高且容易有後遺症。甚至造成永久性傷害或導致寶寶死亡。在就診時不要因為困窘或罪惡感不敢告知醫師，及早的診治有助於避免無法挽回的結果，更能減少後遺症的發生。

來源：口腔保健知多少

口腔保健知多少

兒童口腔衛生清潔

兒童在起床後、三餐飯後或吃完東西後（如：喝完母乳或牛奶、飲料及果汁、麥片及果泥、其它副食品等），以及晚上睡覺前都應該要用含氟濃度一千以上牙膏清潔牙齒。或至少一天刷兩次含氟濃度一千以上的牙膏。

在寶寶零到六個月大未長牙前，進食後應該用紗布擦拭口腔（包括牙床、黏膜及舌頭）。六個月到一歲半左右乳門齒長出後，可開始用含氟濃度一千以上牙膏清潔牙齒。根據國際指引，刷完含氟濃度一千以上的牙膏後。其實要減量漱口，防齲（蛀）效果會更好。所以即使不會漱口的或一歲以下的小朋友，只要控制牙膏量就好。三歲以前米粒大小的量，三歲以上碗豆大小的量。

幫孩子刷牙時，要讓寶寶的頭部有所倚靠。並選在安全明亮的地方，例如坐在沙發、地毯或床上等。可讓寶寶枕在家長的大腿上，為保護寶寶的牙齦。所以刷牙的力量要輕柔。

固定刷牙的方法、時間、順序，讓孩子習慣固定的潔牙方式。此外，可搭配遊戲、音樂等來增加潔牙樂趣。

牙刷的使用方法

牙刷應選擇軟毛小頭的牙刷，且每三個月至半年更換一次。

刷牙時，牙刷刷毛朝向牙齦約四十五度，且要同時涵蓋牙齒與一些牙齦。刷上排牙齒時刷毛朝上，刷下排牙齒時刷毛朝下。每次以二顆牙齒為單位來回輕刷至少十次，並清潔到牙齒的每一面。

兒童刷牙順序：先刷右邊的頰側面咬合面舌側面，接著左邊的頰側面咬合面舌側面，最後刷上下門牙的唇側面舌側面。

牙線的使用方法

牙線主要是輔助牙刷的功能，可以去除牙縫中的食物殘渣與牙菌斑。最好能夠每天使用，至少睡前使用一次牙線（棒）清潔齒列。

牙線使用時，先拉出約四十五公分的牙線（長如手臂）。纏繞在雙手中指第二指節，比出手槍姿勢。以雙手姆指及食指打直撐住牙線，約留下一公分牙線（或視兒童口內大小作調整）。並將牙線拉成字型，使牙線緊貼牙面上下刮。

牙齒保健康，二要二不：

一要：睡前一定要刷牙，一天至少刷兩次。

二要：要有「氟」，包括使用含氟量一千以上含氟牙膏、每

半年接受牙醫師塗氟及口腔檢查。

一不：不要傷害牙齒；少甜食，多漱口，絕對不要含奶瓶睡覺。

二不：不要以口餵食，家長們自己咀嚼過的食物不要再餵食寶寶。

來源：可以不要「吃全餐」嗎？

可以不要「吃全餐」嗎？

懷孕到接近預產期時，要選擇什麼要的生產方式呢？

可以不要「吃全餐」嗎？

影片連結：四 -

來源：和0~1歲寶寶共讀一書是有趣的玩具

和零到一歲寶寶共讀一書是有趣的玩具

跟嬰幼兒共讀，剛開始會有一點挫折。寶寶不會照我們想要的方式「看書」，他可能把書咬一咬就放一邊。或許看完封面頁就走人，或是把書推走……但是。當你很懂孩子時，從發展角度來理解。其實，寶寶正在用他所有的能力來跟書互動、玩書、探索書。

書，對孩子來說，就像是一個有趣的玩具。他會以各種方式來探索，用手翻書探索。感受書的質感、溫度、柔軟度……這些還不夠，他還會咬咬看。用他神經最靈敏的舌頭來感覺。請爸媽先放下「翻一頁念一頁」的閱讀成見，允許孩子用他的方式來「玩書」。孩子正在發展感知覺能力，他的五種感官就是訊息的接收器。跟書產生互動，這些資訊會傳達到大腦整合後。孩子慢慢發現，喔！這是書，原來書長這樣，跟其他玩具不同，書可以一頁一頁看。

配合孩子的身心發展來玩書

以一歲以下的嬰幼兒共讀為例，配合寶寶的身心發展，可以細分成三個階段來談：

【新生兒～四個月－聆聽和注視與他人互動】

這個年紀的寶寶，眼中的世界還有點模糊。看書時，十到二十五公分是最好的距離。選書的原則是，圖樣大一點。輪廓清楚的，顏色鮮明或高反差的黑白色系。可刺激孩子的視覺，像《白看黑》《黑看白》。這個年紀聽覺特別靈敏，對高低起伏的音調有反應。開始會轉向熟悉的聲音，爸媽跟寶寶講話、講故事。唱兒歌《早安晚安》，對寶寶來說。不只是聽覺的刺激、發展語言的基礎，還能活化寶寶腦神經元。

【四個月～八個月－探索聲音與動作】

這時候的寶寶喜歡抓握，也越來越會抓東西。時常抓起來啃一啃，或是把東西往外丟。提供寶寶不同觸感的布書、塑膠書，像《好玩的東西》《小魚嚕啦啦》讓他來抓握或感覺（像這類的觸摸感官書。讓寶寶擁有專屬的書，會比較衛生）。或者是附上兒歌的《打開傘》，讓共讀的經驗更豐富。

【八個月～十二個月－主動探索，參與閱讀】

這時的寶寶開始很像在「看書」，不過因為開始有移動能力，靜態的共讀感覺會減少。這個過渡時期，爸媽可能需要拿著書，配合寶寶的移動，或是忍耐他把書搬來搬去的舉動。提供和寶寶有相同生活經驗的故事書，主角最好跟他同齡。像是《小寶寶翻翻書》，或是玩視覺追蹤的《小金魚逃走了》。會讓寶寶有興趣一讀再讀。

看圖說畫，促進語言與認知發展

一歲以下，寶寶的專注力。可能就是轉眼的三秒鐘，當你翻到第二頁時。他的專注力就剛好結束了。這代表爸媽沒辦法從第一個畫面，讀到第二個畫面，你所打開的任何一頁，都能形成親子的互動：這是一隻小熊、一隻小狗。讓寶寶把聽到的話和眼前的畫面，一次又一次的連結後。十次、二十次後，當你講到那個聲音符號時。他的眼睛很自然的就會盯著那個畫面看，甚至開始主動用手指頭指它。

這就是語言的開始，透過和爸媽的互動。寶寶會把無意義的發聲，「命名」成有意義的東西。像眼睛、鼻子、嘴巴、爸爸、媽媽……，認知也伴隨著語言而來。比方，當我們跟孩子說「狗」。孩子只聽到一個聲音，接下來他還需要在書上或是真實場景認出狗來。才是語言和認知的完整結合，逐步建構出認識世界的各種概念來。

換個念法，讓故事書百讀不厭

當寶寶有越來越多共讀的經驗後，比方說共讀《棕色的熊、棕色的熊、你在看什麼？》，從一開始的看圖說畫。棕色的熊、紅色的鳥、黃色的鴨子、綠色的青蛙……反覆反覆的講，讓孩子知道每翻一頁。都會有動物出現，爸媽可以嘗試逐字念書給他聽。等到孩子一兩歲後，念故事時還可以讓孩子試著接句子。「綠色的～」 「青蛙」讓孩子來接句，接下來。換成他說顏色……。這類看似簡單，情節重複的故事書。很適合小小孩，當他非常清楚每一頁打開會有非常喜歡的東西出現。參與故事情節的發生，會讓小小孩有一種滿足感和成就感。

閱讀，能豐富孩子的感官探索經驗，促進語言和認知發展，及早建立孩子對圖書和閱讀的喜好。你為孩子念的故事和兒歌，都會成為他生命中的溫暖回憶。我任教大學的「大孩子」們，雖然已經二十歲了。每當我念到他們小時候聽過的故事時，仍然會眼睛一亮。想起故事的情節，回

想起當初是誰念故事給自己聽。

閱讀，是一種愛的傳承。寶寶一出生後，就可以開始共讀了。請珍惜孩子拿書叫你念書的任務，珍重一本書讀上一千次的差事，孩子一轉眼就長大了，這段甜蜜的親子共讀時間真的很短暫。

本文由信誼基金會授權轉載

來源：和1~2歲寶寶共讀—讓書中世界變得更好玩

和一到二歲寶寶共讀—讓書中世界變得更好玩

一歲之後的孩子開始走路，這是成長史上很重要的里程碑，代表他可以自己到想去的地方，更有機會認識這個充滿樂趣的廣大世界。只是原先喜歡坐在爸媽懷裡聽故事的孩子，似乎變得不那麼喜歡閱讀了……

學步兒是怎麼「看」書的

一旦孩子可以獨自行走了，你會發現，他變得很喜歡搬書。他會把書一本一本從書架或書籃裡拿出來，丟了滿地，然後再一本一本放回去。另外，他不要跟著故事情節順序翻頁，而喜歡自己快速地翻書，所以會覺得他不太有耐心。

對這個時期的孩子來說，他發現生活中有更多好玩的事。對周遭環境的探索總是令他興奮無比，醒著的時候總是不停地動來動去。不太容易讓他乖乖坐在身邊，因為對他來說。書中的世界已經不能完全滿足他了，他必須有實際的冒險。因此，和這個時期的孩子共讀。往往只有在書的吸引力比行動的樂趣還要大時，他才有可能回到你的懷中看書。所以在這個階段，維持孩子對書的興趣將是最重要的事。

引起孩子對書的興趣

為了維持孩子閱讀的興趣，爸媽最重要的任務就是一選擇能夠吸引孩子的書。這個階段孩子的身心發展有很多驚人的進步，也能嘗試自己做很多事情。所以書中的內容要與孩子的生活息息相關，這樣孩子看到書裡的主角。就好像看到了自己一樣，而能引起他的共鳴。

此外，一歲多的孩子越來越會說話，他會從說單字到能說出兩個名詞的簡單句子。所以，當你在念故事或兒歌時，他可能會跟著你念出句子的最後一個字，或是重複念出一、兩個字詞。因此，有趣的故事和朗朗上口的兒歌也能夠吸引他的注意。增加孩子和書的互動，也能讓他對書感興趣。像是你可以請孩子拿書裡的食物假裝餵你一口，或是和他一起學書裡的貓咪伸懶腰。如果書裡有選擇或猜謎的遊戲，這個年齡的孩子也會特別喜歡。

此外，這個時期的孩子，因為每天都會遇到很多好玩的事，會變得比較不容易入睡。他需要睡前儀式這段轉換的

時間，讓他從興奮狀態進入休息狀態，閱讀也是一種很好的睡前活動，你可以在這個時候和他分享親密的共讀時光。

和一到二歲孩子的共讀訣竅

總而言之，只要順著孩子的興趣和發展，對他來說，閱讀還是充滿樂趣的。你可以這樣做：

這個階段的孩子喜歡展現自我的能力，當你們共讀時。你可以讓他自己挑選想讀哪本書、想從哪裡開始看起，他會覺得自己可以掌控閱讀的步調。而更喜愛閱讀。

一歲之後，孩子對書裡的主角很有興趣。讓他閱讀和生活經驗相近的圖畫書，像是《小雷和波波生活故事》。就像看到自己在書裡頭探險；而有韻的兒歌對於正在學說話的孩子來說也很有吸引力，閱讀《打開傘》、《牛來了》這些書裡的念謠。可以讓他對語音、字詞和語法有初步認識。

一歲半前後的孩子，喜歡辨識圖片並加以命名。因此共讀時，除了閱讀故事的內容。你還可以問問孩子畫面的東西是什麼，或是什麼東西在哪裡。滿足孩子喜歡命名的行為。

喜歡觀察圖片中的細節，也是這個階段孩子的閱讀特色。你可以和孩子閱讀畫面有較多細節或視覺辨識類的圖畫書，例如：《抱抱》、《小金魚逃走了》，會讓他覺得充滿挑戰的樂趣。

最後，多邀請爸爸或其他人和孩子共讀，因為每個人有著不同的知識背景和語言表達方式，孩子可以透過和不同人的共讀而收穫更多。

本文由信誼基金會授權轉載

來源：和尿布說掰掰~如廁訓練

和尿布說掰掰~如廁訓練

嬰兒的大小便是靠反射動作，完全無法自己控制；二至三歲間。生理上已成熟到可以隨意控制大小便的肌肉，幼兒就能學會在內急時。不需要提醒，自己走向馬桶。脫下褲子大小便，之後再穿好褲子。這就是所謂完成「如廁訓練」了。能夠揮別尿布，真是孩子人生中的一大步！

順利完成如廁訓練的正確心態

孩子揮別尿布是遲早的事，家長不必太急躁，應保持輕鬆愉快的態度，像是跟孩子玩遊戲似的完成訓練。

如果遇到阻力，勿跟孩子硬拗，可包回尿布等一、兩個星期後再試，如廁訓練終會成功的。

孩子失誤時，以有點惋惜的態度。告訴他下次想尿或解便的時候，趕快告訴大人。大人會幫助他。然後幫他清理乾淨，並請他幫點小忙，例如把髒尿布丟進垃圾桶等，勿責罵或體罰孩子。家長強烈的情緒反應常常是訓練失敗的主要原因。

即使已經成功的達成訓練，孩子仍會有幾個月的時間偶有「意外」發生，這是正常現象。勿苛責孩子，冷靜、淡然處理即可。

開始訓練的良好時機

一歲半至二歲之間，通常男孩會較女孩慢一些。

以下現象表示孩子已準備好了

感覺得到膀胱脹和便意（例如突然安靜下來、臉部表情改變、跳腳、蹲下、拉扯褲子或用語言、手勢告訴大人）。

尿濕了或解便了，會有所表示或讓大人知道。

喜歡換上乾淨的尿布。

瞭解「尿尿」、「嗯嗯」、「臭臭」、「便便」、「馬桶」、「乾的」、「乾淨」、「濕的」、「髒」的意思。

看過同性別的大人或孩子（如手足）使用馬桶，知道馬桶是做什麼用的。

會自己拉下及拉上褲子。

訓練成功的訣竅

買了小馬桶後，先將它放在孩子常遊戲的地方。鼓勵他常常坐在上面，時間長短不拘。讓孩子逐漸熟悉它，視它為所有物。

注意孩子想小便或大便的跡象，或利用午睡剛睡醒或是飯後二十到三十分鐘的好時機。帶他到小馬桶處，鼓勵他脫下尿布坐上去。尿（或便）在裡面。

當孩子已經有一半的機率成功時，可以開始不穿尿布，改穿寬鬆的褲子，讓他練習自己拉下、拉上褲子。尿布只在午睡或夜裡才使用。

小技巧幫大忙

唸一、兩本有關如廁訓練的故事書給孩子聽。

讓孩子跟一、二位已經達成訓練的孩子一起玩，並看著別的孩子使用小馬桶。

不要選擇孩子正處於反抗期或生病時開始訓練。

不要一直嘮嘮叨叨的提醒、催促孩子，只有在他顯示出有尿意或便意時才帶他去坐小馬桶。

不要強制孩子坐上小馬桶；孩子不想坐了，就應該讓他起來；即使孩子未抗拒，坐了五分鐘還解不出來，也應該讓他起來。

孩子肯合作就應該誇獎他，如果解出。更應同時給予精神鼓勵和實質上的獎勵（如外出散步、貼紙等），可以有效的提高成功機率。不要怕物質獎勵寵壞孩子。

來源：哪些情況不適合哺乳

哪些情況不適合哺乳

母乳哺育的禁忌：

母親：

一 人類免疫不全病毒（）反應陽性愛滋病患者未治療者

二 人類嗜淋巴球病毒感染

三 使用抗癌症藥物

四 使用放射性同位素物質 --依半衰期而定須暫停哺乳數小時至數天

五 藥物濫用

嬰兒：

一 半乳糖血症

二 楓漿尿症

三 苯酮尿症

下列情況仍可持續哺餵母乳：

一 型肝炎

二 型肝炎

三 型肝炎非急性期

四 急性傳染性疾病

五 傳染性結核病

六 接受抗結核菌藥物治療兩週以上

七 疱疹病毒只要乳房沒有病兆

八 水痘，水泡皆結痂後

九 乳腺炎，乳房膿瘍

十 大多數的藥物

十一 抽菸

十二 酒精，不超過每天每公斤體重一公克

十三 環境污染及輻射物質

來源：哺乳媽媽用藥應注意事項

哺乳媽媽用藥應注意事項

流感是一種由流感病毒所引起的急性呼吸道疾病，病毒是以空氣為媒介。靠飛沫或接觸傳染，所以即使媽媽感冒了。寶寶是不會經由奶水而感染的，不過。由於它會經由說話和咳嗽傳染，所以最好能戴口罩來餵奶。至於媽媽若需服用藥物治療，哺餵母乳並不是禁忌。不必擔心，如果真的害怕吃藥會影響嬰兒。則可以請教醫師。

母親生病時母乳中的抗體對嬰兒是最好的保護，反而是如果停止母乳哺育。嬰兒仍可能接觸到環境中讓母親生病的細菌或病毒，卻沒有乳汁中的抗體保護。導致更高的感染率。

在哺乳期間的媽媽擔憂接種疫苗後，病毒會經由乳汁分泌而讓嬰幼兒喝到有病毒的母乳。以目前研究證據顯示，哺乳並不會影響疫苗效力。也不會影響嬰幼兒，大多數疫苗還沒有被證明會分泌到母乳中。所以讓哺乳婦女接種疫苗，但仍有些疫苗沒有在哺乳期中進行臨床試驗。所以在施打前仍需與醫師或藥師討論後再接種。

藥物的使用時機在於，如果哺乳時間相當固定。基本上在哺乳後立即服用藥物，讓藥物濃度盡快達到頂點後。代謝出體外，下一次哺餵時。藥物濃度通常是較低、較安全的；或是服用藥物之前，先把乳汁擠出來備用。或在寶寶睡覺時趕快吃藥，也是一種方式。

一般常用的藥物分泌到乳汁的量很少，不容易對寶寶造成影響。但是抗癌藥、荷爾蒙藥物、放射線藥、或某些精神科用藥必須小心。藥物使用的方式及劑量一定要確實遵循醫師的建議，不要自行增量減量。藥物的效用並不全是隨著劑量的增加而提昇，有時超過安全劑量反而有危險性；但若自行減量。也可能造成藥物效果降低，甚至沒有療效。

另外，媽媽應該事先了解藥物可能產生的副作用。例如：胃痛、腹瀉、頭痛等，像在使用較傳統的抗組織胺後。可能

造成嗜睡，對於這些嗜睡的副作用。當媽媽服用後，請注意因藥物造成過度熟睡。在無意間轉身壓傷寶寶的可能。

並非所有藥物都會分泌到乳汁一般而言，分子小、高脂溶性的藥品。比較容易通過乳腺而分泌到乳汁中，而與蛋白質結合力較弱的藥物。亦比較容易從母體游離出現在乳汁中。因此，雖然所有藥物都會分泌到乳汁。但藥物在體內代謝後分泌到乳汁中的量，以母親服用藥物的劑量來說。大約只有五十一左右的劑量可藉由乳汁進入寶寶體內，對寶寶的影響可以說微乎其微。但寶寶如果尚未滿月仍須多加注意。

由此可知，能否進入乳汁。與藥物本身性質有關，像是感冒藥、胃藥是不用擔心有什麼影響。酸痛貼布或藥膏等等外用藥的影響則更小，藥物只在局部發揮作用。很少進入人體血液循環中。若因為服用一些藥物，被告知要停餵母乳，應要求醫師開立別種較安全的替代藥物，幾乎都可以找到較安全的替代藥物。如果開藥的醫師無法接受這樣的作法，媽媽應尋求第二個醫師的意見，但不要急著停餵母乳。如果真的因為用藥而停餵母乳了，要記得持續擠奶，以維持泌乳。

來源：哺乳媽媽用藥有什麼禁忌？

哺乳媽媽用藥有什麼禁忌？

哺乳媽媽禁止使用的藥物

大多數的藥物只要掌握用藥原則，對哺乳的影響性都不大；哺乳期間一定不能使用的藥物。包含毒品、「免疫抑制劑」（本身有細胞毒性的藥物）以及放射性藥物，若是因為療程需要使用上述藥物的話。媽媽就一定不能哺乳。例如化療患者即是最明顯的例子，因化療用藥中含細胞毒性。會阻斷人體細胞代謝，對母乳寶寶產生不好的影響。其他像是：

一 抑制泌乳藥物（如：，減少泌乳而影響寶寶生長）

二 古柯鹼（）

三 抗癌藥物

四 免疫抑制劑

五 偏頭痛藥之

六 鋰鹽（）

七 抗凝劑

也都是哺乳媽媽應須禁用的藥物。

此外像麻醉性止痛劑（如嗎啡、可待因）及抗焦慮劑（鎮靜

劑)容易造成寶寶活力減弱，含雌性激素或黃體素之避孕藥容易減少奶量，都可能影響寶寶生長，所以也必須謹慎使用。

愛滋媽咪可不可親餵母乳？

基本上，依據台灣疾病管制署建議。罹患愛滋病的媽咪避免餵食母乳，因此必須飲用配方奶。也可在醫師協助下申請母乳庫的愛心母乳來哺育寶寶。

肝炎媽媽仍可哺餵母乳

型肝炎並非體液或血液傳染，所以不會透過乳汁傳染。型肝炎型肝炎傳染途徑則為血液或體液，但目前的證據顯示。寶寶並不會因為母乳而受到感染，患有肝及肝的媽媽可繼續哺餵母乳不需任何中斷。美國疾病管制局、兒科醫學會、婦產科醫學會皆支持此一結論。然而，當媽媽有乳頭龜裂或出血時，建議應暫時中斷哺乳直到癒合。但要記得持續擠奶，以維持泌乳。

另外，國內高風險新生兒在出生二十四小時內接受型肝炎免疫球蛋白，並且在半年內完成第二、三劑疫苗注射，已可提供相當完整的保護。

應避免酒精性飲料及藥物

哺乳媽媽應避免使用含有酒精性成分之飲料或藥物，否則寶寶將會有嗜睡、口水多、身高生長減緩、體重增加減緩之現象。若以媽媽體重計算，每天每公斤超過一公克純酒精時。媽媽的噴乳反射也將減弱。

來源：哺乳期間可以照X光嗎？

哺乳期間可以照光嗎？

一般情況下，光。核磁共振造影，電腦斷層。血管攝影，超音波或乳房攝影檢查。母親不需要中斷母乳哺餵。光-與電腦斷層屬於較短波長的電磁輻射，僅在圖像被攝取時存在，不會累積在人體與母乳中。這些檢查不影響哺餵母乳。若是攝影檢查需使用到顯影劑，只要顯影劑無任何放射性同位素，仍不影響母乳哺餵。

而做核子醫學檢查如骨骼心肌灌注甲狀腺檢查等，則須依放射性藥物種類。由醫師評估暫停哺乳所需時間，依放射性藥物不同。停留在身體的時間也會有所差異數小時或數天，絕大部分使用的放射性藥物經過兩個半衰期一個半衰期為六小時。約七十五放射性物質會排出體外。

來源：哺乳期飲食

哺乳期飲食

母乳的成分會隨著嬰兒的需求而自動改變，維生素、礦物質以及保護性化合物都十分豐富；科學家至今還無法製

造出能與母乳媲美的配方奶。母親在哺乳期增加特定某種食物的攝取量是否會增加母乳的製造量仍不確定，提供母親補充的食物可改善本身的營養狀況，並確定她的母乳中有足夠的營養素。

哺乳媽媽每天會多消耗約五百大卡的熱量，水分及蛋白質應加強補充，一般而言，哺乳期間蛋白質等六大營養素及水分、維生素、礦物質都需均衡攝食。哺乳期間也建議多補充不同顏色的蔬果，達到均衡飲食，除非發現寶寶對某種特定食物過敏，才須特別控制飲食。母乳哺育食物攝取建議

一肚子餓就吃，口渴就喝；在哺乳期不要刻意減重；低熱量飲食小於一千八百大卡可能會影響乳汁分泌。哺乳媽媽如果遵守「餓了就吃」的原則，大多數人的體重都會逐漸減下來，在前四到六個月平均每個月約可減六到八公斤。但如果有些哺乳媽媽希望能快速減重，也要在產後二個月後才開始，每個月減重不要超過二公斤，這樣比較不會影響哺乳及身體健康。

二多攝取水份、湯汁等液體，每天應攝取二千到三千水分，以利生成足夠的乳汁。

三攝取全穀雜糧類及蔬菜、水果，可以獲取維生素、礦物質及膳食纖維，促進腸蠕動以預防便秘。

四選擇優良蛋白質及適量油脂，如豆魚肉蛋類、奶類。都是很好的營養來源，並可獲得鈣質及鐵質。而母乳中油脂提供母乳五十的熱量，若哺乳媽媽吃的太清淡。也會影響母乳品質。

五適度日曬，且多食用富含維生素的食物，如魚類、雞蛋、乳品、菇蕈類黑木耳、香菇等。

六減少或避免攝取下列食物：

一菸、酒、咖啡與濃茶，哺乳媽媽一天的咖啡因攝取量以三百毫克為上限，相當於二杯卡布其諾咖啡，以免影響母乳的味道使寶寶的情緒躁動和作息改變。

二脂肪含量多的食物，如肥肉、油炸食物等。

三煙燻加工食物，如：醃肉、鹹蛋、鹹魚、火腿、豆腐乳等。

四高熱量食物，如：糖果、可樂、汽水等。

素食哺乳媽媽飲食建議：對於素食的哺乳媽媽來說，在食物的攝取上。將會受到一些限制，因此可適當補充綜合維生素與。以免缺乏維生素十二，造成惡性貧血、神經發育不良等問題。而豆製品也是素食媽媽主要的蛋白質營養來源，選擇豆製品時應避免油炸類。例如油豆腐、炸豆皮、花干、素肉等高油脂、低營養價值的產品，應該多吃豆腐、豆干、豆漿、豆包等黃豆製品。並適量搭配堅果類；堅果類除了能提供油脂及部分蛋白質外，也提供一些微量

營養素如鎂、磷、鉀等礦物質。亦是維生素含量豐富的食物來源。

另外因為維生素十二主要存在肉、魚、蛋和乳品類等動物性食物，所以吃全素的孕哺婦女可多食用味噌、健素糖、酵母粉等維生素十二含量高的素食或額外服用維生素十二補充劑。營養狀況較差的孕哺婦女，應該及早請醫師、營養師評估營養狀況，早日改善偏差的營養問題。

來源：喝麻油雞酒可以餵奶嗎？

喝麻油雞酒可以餵奶嗎？

美國疾病管制與預防中心不建議哺乳母親飲用酒精飲料，但也發現若一天飲用一份酒精標準單位的飲料一，對哺乳影響不大，前提是母親喝到含酒精飲料至少要等二小時後才能哺乳。依據美國的指引一份酒精標準單位的飲料可能是一罐三百五十的五酒精濃度啤酒、一杯一百五十的十二酒精濃度紅酒或一小杯四十四的四十烈酒。即便如此，仍不建議哺乳母親飲用酒精飲料，因為會影響母親判斷與能否安全照顧寶寶的風險。

東方人傳統產後常用「米酒」入藥膳燉煮，目的是為了藉助酒的「熱性」燉出藥材的療效，因而建議：

一如仍使用酒精入菜，需建議調整烹煮方式，以去除料理食物中的酒精含量。一般而言，血中酒精濃度在飲用後二小時內應避免在此時哺乳，以減少對嬰幼兒的影響。

二儘量改用不含酒精的調理添加物，烹調富含容易吸收的高蛋白質食物以調養產後身體。

來源：回到職場前，該做什麼準備？

回到職場前，該做什麼準備？

對於想要維持母乳的媽媽來說，在上班前的一個星期。除了親餵之外，要先預擠乳汁。並且嘗試在一天當中，讓寶寶一至二餐使用親餵以外的方式喝奶。觀察他的接受情況如何，再決定上班時間。請照顧者使用何種方式餵奶。

銷假前的準備

另外，練習擠奶也很重要。不管是使用擠奶器或是手擠，在擠奶前先嘗試刺激噴乳反射。像是看著寶寶的照片、聽寶寶聲音的錄音、聞或觸摸寶寶的衣服，運用所有感官專心和聽、聞及想到寶寶。都有機會促進噴乳反射。有些媽媽太過心急，擠乳時的方法又不對。反而會造成乳頭受傷，建議媽媽慢慢來、放鬆心情。以免欲速則不達。

和照顧者討論如何餵寶寶喝奶

無論白天是交給保母、長輩或其他親戚朋友照顧，媽媽可

以先將孩子的飲食睡眠習慣紀錄在冊子裡，讓照顧者早點了解孩子想要吃或睡的徵兆。由於母乳冰凍過後回溫若喝不完就要丟棄，不能再次冷藏回溫給寶寶喝。因此要大概估算寶寶一次要喝多少，由於每個孩子的氣質個性不同。要慢慢觀察與調適寶寶想喝的量，不要勉強逼他喝。強迫餵食可能讓孩子對食物的印象不好，日後副食品的接受度也會受到影響。

來源：國小學前健康檢查與入學準備

國小學前健康檢查與入學準備

孩子上小學前，家長如果能讓其先養成基本的生活自理、自我表達、情緒行為表現等能力，對其入學後的學習適應和發展將會有很大的幫忙。而入國小前的健康檢查、發展評估及相關醫學建議，有助於了解學生入學後，在學習上可能遭遇到的困難，因此意義重大。

【入國小前健康檢查的意義】

進入小學前的健康檢查、發展評估以及相關醫學建議，有助於讓家長、學校老師或健康照護人員（如學校護理師）了解學生入學後，在學習上可能遭遇到的困難，以及解決問題的個人需求。例如，部分心臟病、氣喘、糖尿病、腎臟病或其他特定疾病的學生上體育課時，不適合進行劇烈運動。

身心障礙的學生在學習環境的適應以及整體學習障礙的克服上，可能需要更多的協助。必要時可報請各地方政府，透過正式鑑定、安置與輔導程序。接受適時適切的特殊教育及其相關協助措施。

【入國小的準備】

生活自理能力

能靈活使用餐具。

能在餐後收拾自己的餐具。

能遵守用餐禮儀，如不邊吃邊說話或亂丟食物殘渣等。

能整理服裝、儀容，以及餐後擦嘴巴、漱口、洗手等。

能穿脫衣服、襪子、鞋子及整理衣物，例如放、摺、疊、掛。

能使用蹲、坐馬桶。

能遵守如廁禮節及衛生習慣，如敲門、擦拭、沖水、洗手。

自我表達能力

能以自己的詞彙，清楚發音來表達生活需求。

能以動作、手勢或其他肢體語言來幫助陳述。

能注意傾聽別人說話，並表達是否聽懂。

能理解較為冗長或複雜的應對語句。

情緒行為表現

能適度紓解情緒，能表達喜、怒、哀、樂。

能表達適當的社會行為，避免不當的退縮或攻擊行為。

能跟別人和諧互動溝通。

【家長為孩子入學前所做的其他教育準備】

備妥子女各項資料，拜訪學校、老師。

詢問學校、老師相關學習及配合方式。

教導子女認識學校環境及教室方位。

教導子女在校園中行的安全知能與技巧。

教導子女熟悉教室內的佈置、動線及座位。

教導子女辨識自己上學常需攜帶的文具、用品。

來源：坐月子不能流淚、不能看書報、電視、滑手機，會影響視力！

坐月子不能流淚、不能看書報、電視、滑手機，會影響視力

長輩叮嚀在坐月子期間要「顧目瞞」，產婦不能流淚、不可以看電視、看書，會傷眼睛、視力退化。主要是希望產婦能盡量多休息，保持愉快的心情，以盡快恢復媽咪的健康為主。

現今三產品如、智慧型手機的光線亮度如同手電筒一般，近距離用三產品看電影或玩遊戲。容易造成眼睛長時間的強光照射，及盯著小螢幕。對焦過久造成眼睛睫狀肌的過度使用而產生肌肉痠麻、脹痛、痙攣等現象，會讓媽媽感覺不舒服。甚至頭痛。而且專注手機過久，眼睛強烈的受光。會改變身體褪黑激素的產生，擾亂身體正常睡眠及品質。使體內荷爾蒙紊亂，影響產後身體恢復。建議產婦在坐月子期間要盡量少看電視及書報，並注意光線充足。保持三十五到四十五公分距離，每三十分鐘便要讓眼睛休息十分鐘。好讓眼睛有充分的休息時間。

來源：坐月子時，不可以洗頭、洗澡嗎！

坐月子時，不可以洗頭、洗澡嗎

坐月子期間不可以碰水、洗澡、洗頭相信這是很多人都曾聽過的古老的規矩，都說這些不能做，很令人傷腦筋。其實這種觀念是基於過去的生活環境和醫療水準不足衍生而來的。剛生產完的產婦身體較為虛弱；再加上以前的生活環境中沒有足夠的換洗衣物，也沒有熱水器和吹風機。洗澡需要大費周章地準備熱水，洗完也無法馬上將頭髮吹乾。因此洗澡對於已經極為虛弱的產婦來說可能不太適當。

但以目前便利的環境來說，自然產後只要體力恢復可下床走動。應可沐浴；剖腹產傷口只要沒有感染並使用防水材質的傷口敷料，亦可在產後三到五天淋浴清潔身體。沐浴可促進身體清潔對於舒適度及心情有助益，只要沐浴後迅速擦乾吹乾即可。

產後一個月內只要健康情況允許，可以洗頭、梳頭，提醒注意以下幾點：

一洗頭時用指腹按摩頭皮，洗完後立即擦乾，避免受冷氣吹襲。

二洗頭時的水溫要避免過冷或過燙，建議控制在體溫上下，基本上以頭皮不會覺得燙的程度為準。

三一般產婦在產後頭髮較油，也容易掉頭髮，要使用溫和的洗髮用品洗頭。

四洗完頭後，在頭髮未乾時不可馬上睡覺，避免受寒引起頭痛或身體不適。

來源：坐月子期間不能外出吹到風，會筋骨酸痛！

坐月子期間不能外出吹到風，會筋骨酸痛

傳統坐月子觀念要求產婦不可外出吹到風、要多臥床休息等，認為這段期間的行為對產婦身體的恢復以及日後長期的健康狀況影響非常大，以避免造成落下頭痛、筋骨酸痛等病根。

由於產後生理機能會將多餘的體液轉化為汗由皮膚排泄或轉化為尿液排出，所以產後婦女多汗、多尿是正常生理變化。多汗微濕的皮膚處在低冷或多風的環境，容易受風寒。所以應避免冷風直吹，注意及時擦乾汗液、更換汗濕的衣服。保持身體乾爽。

產婦要出外散步或運動，應該特別注意保暖；也應該要盡量避免接觸已經感冒或罹患傳染病的病人。

來源：坐月子的方式及事先安排

坐月子的方式及事先安排

產後坐月子是重要大事，夫妻可以選擇在家坐月子，由家

人幫忙、訂月子料理外送餐、請月嫂等，或去產後護理之家接受照護服務。坐月子的方式因需求不同，而有不同的選擇，建議爸爸及早和伴侶進行討論，並事先做好安排及規劃。

選擇在家坐月子：

一 考量月子餐的準備，要由家人料理或是訂料理外送。

二 留意因為照顧小孩而誤餐，食物在室溫下放太久可能會變質。

三 如由家人幫忙，可事先協調如何分工照顧媽媽及小孩。

四 建議考慮與長輩坐月子觀點是否相同，以避免觀點不同產生磨擦。

五 月嫂需要事先預約，並溝通好月嫂提供的服務內容。

選擇產後護理之家：

一 通常建議懷孕四個月後，就可以提早找尋產後護理之家。

二 除了留意環境設備及是否合法立案機構，也可以觀察人員服務是否細心。

三 建議地點不要離爸爸上班的公司、住家或是主要照顧者太遠，可減少交通時間。

來源：培養嬰幼兒良好的飲食習慣

培養嬰幼兒良好的飲食習慣

高熱量低營養的過度飲食內容及缺乏運動的靜態生活，是造成肥胖的主要原因。良好的飲食習慣，能使孩子攝取充足、均衡的營養。父母以身作則，陪伴孩子養成健康生活型態。透過聰明吃、快樂動，教導孩子學習選擇健康飲食。養成動態生活習慣，可以為國家未來主人翁預約一個健康的未來。

養成嬰幼兒良好飲食習慣

用餐有一定的地點。餵副食品時讓寶寶坐穩，一歲以後，將高腳椅放在餐桌邊，安排與其他家人一同進食。

尊重寶寶的胃口，不強迫餵食。若孩子吃不完，下次可將食物減少。

一歲到一歲半之間為黃金訓練期，讓寶寶學習自己用湯匙吃飯。

孩子會自己吃飯以後，一次給予他少量的食物；吃完了還

要的話，才再給他。

維持進餐時的愉悅氣氛，讓孩子參與餐桌上的談話。

三歲後可以開始規定一些簡單的餐桌禮節，孩子遵循時應常給予誇獎。

規定合理的用餐時間（一般而言約為三十分鐘），時間到了或全家人都已經吃完了，就請孩子下桌。

三餐之間可提供點心！但宜在正餐前二小時吃完，量不要多，選擇有營養的食物，避免高油、高糖、高鹽及重口味的食物或零食。牛奶、蛋、豆花、蔬果、麵包等都是可以選擇的好點心。

引發孩子對食物的興趣！藉著與孩子一起進食、購物、看電視、看書等機會，介紹及討論各類食物。採購與製作準備食物時，也可邀請孩子參與。

來源：培養寶寶的動態生活習慣

培養寶寶的動態生活習慣

養成孩子動態生活習慣

盡量培養幼兒及學齡前兒童從事中等費力的身體活動如丟球遊戲、帶動唱等。另每天應安排約一小時可分段中等費力至費力的活動如跳舞、玩球比賽、爬上爬下、跑來跑去的活動。

六個月以下的嬰兒每天應有身體俯臥活動的親子遊戲時間，但睡眠時則不可俯臥以避免增加嬰兒猝死機率。

不要限制孩子身體活動的機會，例如。非用餐時間，不要將孩子固定在餐椅上。在安全範圍內，盡量讓孩子增加身體活動量。

孩子二歲以前不要觀看電視或電子用品螢幕，二歲以後每日不要超過一小時。切勿在幼兒房放置電視，避免長期久坐增加肥胖的風險。且易受電視食品廣告影響。

依孩子不同年齡，每天早睡早起的習慣，維持充分的睡眠時間。

避免兒童肥胖

根據研究指出，肥胖兒童有二分之一的機率變成肥胖成人。肥胖青少年變成肥胖成年人的機率更高，達三分之二。未來都是血管疾病、糖尿病等慢性疾病的潛在病患。

了解嬰幼兒體重及身高生長情形，於每次健康檢查時。應計算身體質量指數，簡稱。並與醫師討論。

當孩子身體質量指數被定義為“體重過重或肥胖”時，請

參閱兒童衛教手冊第三十到三十二頁。下載網址十三億二千四百三十一萬五千三百五十，應尋求醫師或營養師建議。儘速調整生活作息，避免增加相關慢性疾病的風險。

小提示

的計算方式：體重公斤身高二公尺

例如：三歲孩子體重為十八公斤、身高為一百公分十八公斤十二公尺十八

來源：外籍媽媽的小孩是否也能接受兒童預防保健服務？

外籍媽媽的小孩是否也能接受兒童預防保健服務？

只要小朋友領有健保卡和黃卡，即可接受兒童預防保健服務。

根據全民健康保險法規定，如父母一方為中華民國籍，則新生兒即為本國籍，申報戶籍並取得健保卡及黃卡後即可接受預防保健服務。

如父母皆為外國籍，並依規定投保，則可於領取居留證明後參加健保，待領取健保卡及黃卡後即可接受預防保健服務。如新生兒出生六十天內尚未領有健保卡，則可依附父母接受兒童預防保健第一次預防保健。

來源：多胞胎也能順利哺乳

多胞胎也能順利哺乳

一次迎接兩個以上的新生命對新手或老手父母來說，都是特別的生命經驗，喜悅是雙倍以上，責任與勞苦也是雙倍以上。許多雙胞胎或多胞胎的媽媽也想給孩子們最好的禮物母乳，卻很擔心自己是否能夠做到，也想知道如何為哺乳多胞胎做好準備。以下就要說明多胞胎哺乳時常見的擔憂與因應之道喔

我的奶水夠兩個或更多孩子吃飽嗎

這是最常被家長們提到的擔心，其實若了解泌乳原理就會知道。奶量製造的最主要關鍵就是「移出量」，只要母親能夠依照寶寶需求哺乳或擠乳。移出嬰兒所需的奶量，身體就會製造出嬰兒需要的奶水量。就像其他哺乳類動物狗、貓、老鼠…經常一次產下多胞胎，但只要母親願意讓嬰兒「無限暢飲」，奶水量就會依照嬰兒的需求分泌出來，讓每一個新生兒都喝到足夠的奶水。

我該直接哺乳或是擠出母乳用奶瓶餵食呢

健康足月新生兒從出生後就會自己找到乳房含上並開始吸吮，這是正常新生兒的本能。稱為乳房爬行，建議每位家長可上網看過影片。瞭解尋找乳房吸吮乳汁是孩子天

生的本能，我們不該剝奪其正常發展過程。所以只要寶寶與母親的狀況均無大礙，建議從一開始就與嬰兒肌膚接觸，讓嬰兒發揮本能吸吮乳房。

但是多胞胎母親或嬰兒會面臨較多的醫療狀況，例如嬰兒早產與相關併發症、出生體重過輕、母親子癲症、妊娠糖尿病、剖腹生產比例增加…等等。這些狀況可能單獨出現，也可能合併發生，讓直接哺乳可能無法順利如願。若必須面臨母嬰分離的狀況，建議母親從身體狀況許可或產後六小時之內就開始用手擠乳，方能建立與維持泌乳。之後若狀況許可建議儘早開始練習肌膚接觸與哺乳。

我該一次同時餵兩個孩子或是輪流餵奶怎麼決定先餵誰呢

基本上這是一個沒有標準答案的問題，可能每次狀況都不同，需要經常觀察與調整。通常我會給家長的建議是「保持彈性」，見機行事，見招拆招就好，不用特別拘泥固定做法。每個孩子的個性不同，有人注重吃。有人注重睡，有人注重玩。花時間觀察出每個孩子的特性後磨合，會比強硬制定作息來的容易。

有些媽媽採取同時哺乳的方式為自己爭取一些休息時間，每次寶想吃時也把寶抱來喝奶；有些媽媽採取一次餵一個寶寶。另一位寶寶由家人或照顧者瓶餵；有些媽媽白天餵寶，晚上餵寶。過幾天再交換，只要媽媽與寶寶們適應。以上都是可以參考的做法。

若媽媽的奶量不足以提供多位寶寶需求時，建議每位寶寶都採部分母乳部分配方奶的餵食方式，讓每位寶寶都能喝到母乳中的抗體與生長因子，達到部分哺乳的好處。

多胞胎家長常見的困擾有哪些以及如何避免呢

照顧多胞胎需要的時間、金錢與精力都比單胞胎增加許多，常見的困擾是睡眠不足或是精疲力盡，沒時間吃飯或休息等等。若對照顧新生兒不熟悉，初期的手忙腳亂或是照顧上的挫折，也經常是家長抱怨的困擾。建議家長事前儲備足夠的照顧人手，家人與照顧者之間分配好工作事項。例如有人負責採買、有人負責烹飪或準備食物、有人負責照顧嬰兒、有人負責家務整理…等等，產前把需要的工作列出明細。產後分工合作，互相支援。並運用正確的協助資源如孕產婦關懷諮詢專線八百到八百七十-八百七十、母乳哺育支持團體等，才能縮短照顧多胞胎的磨合期。

另外請家長爭取自己的休息時間，孩子睡了儘快跟著睡，練習一邊哺乳一邊吃飯、喝水、聊天或做簡單家事等。

結論

多胞胎的家庭甜蜜滿滿，責任也滿滿。建議家長從產前就與其他家長多互動，了解迎接新生兒的大小事。預先規

劃產後育兒人手安排與工作分配，也找好產後協助的資源。請媽媽相信自己，訂好哺乳的計畫與目標，多胞胎的家庭也可以擁有愉快的哺乳生活喔

來源：多胞胎寶寶的母乳哺育須知

多胞胎寶寶的母乳哺育須知

您的家庭即將同時有二或二個以上的寶寶加入，您一定懷著期待又擔心的心情吧！

多胞胎家庭所面臨的挑戰比一般家庭是加倍很多的，因為家庭後續將面臨同時照顧較多孩子所需更多的體力和金錢需求、睡眠時間減少及中斷、情緒調適困難、忙於照顧孩子而減少了與社會的互動等問題。在哺乳的部分，您需要周遭親友團大量的支持與鼓勵，使您相信自己是可以成功哺餵多胞胎。您在產前即應準備產後的生活規劃，產前尋找專業人員配合您家庭的個別性，討論您所需的協助及支持。

產前哺餵母乳準備

了解寶寶可能的餵食方式、型態及哺乳頻率的重要性，執行產檯的肌膚接觸。親子同室，儘早開始哺乳。學習如何觀察寶寶要吃奶的表徵、含乳是否正確、如何知道寶寶有得到足夠的奶水等技巧。

列出可提供協助的人員名單

當家中突然有兩個以上的新生兒，吃會不同時間，哭也不同時間，睡也不同時間。爸爸需積極的參與其中，雖然爸爸無法哺乳，但還是可以分擔其他事務如換尿布、幫寶寶洗澡、料理家務或是照顧大孩子。

除此之外夫妻之間可以建立一合作模式如您在餵其中一個寶寶時，爸爸可以利用這時間幫另一個寶寶洗澡或安撫睡覺。有時爸爸白天是需要上班的，除了爸爸之外再找其他人協助是必要的，爸爸上班時其他人可以接替爸爸的工作。尤其寶寶開始添加副食品之後，若有人可以協助讓您有喘息的機會，將使您能更輕鬆的哺乳及適應照顧兩個以上的寶寶。

和家人討論哺餵母乳以及施行的方式取得家人的支持及承諾哺餵母乳的決心。

參加母乳哺育支持團體

藉由團體媽媽對媽媽之間的支持及協助增進您哺餵母乳的信心及能力。

練習多胞胎的哺乳姿勢

剛開始哺乳的姿勢需要幾次的練習還有其他人的幫助，您需要一些時間可以練習，當您的技巧熟練之後，自然能

舒服的哺乳。首先在產後的頭幾天，您可以嚐試先學會一次哺餵一個。確定孩子的含乳姿勢是正確並有得到足夠奶水，之後再試著同時餵兩個。這時使用枕頭或環型的餵奶枕支托可以有幫助，不過當您已抱一個餵奶時。您需要有人可以協助再抱另一個來接近乳房，所以您產後還未出院前。可以請專業人員教會您的家人如何協助您。

多胞胎的餵食順序

可以就當時狀況有些彈性決定同時餵或輪流餵。不過夜間您若可以同時餵寶寶即可多爭取一點睡眠的休息時間。若是情況許可，其中一個寶寶醒了要吃奶，協助的人可以幫忙另一個寶寶換尿布喚醒他一起吃奶，鼓勵孩子嚐試建立夜間一起吃奶的節奏。

有時每一個寶寶都吃固定一邊，有時兩個輪流吃兩邊乳房。有時雙胞胎中一個比較體弱，您需確定較弱的寶寶有得到足夠的奶水，必要時您可將奶水擠出來給寶寶杯餵，出院後遇到困難一定要尋求專業人員的支持及協助。

若是三胞胎則需要協助媽媽訂立一套餵奶的輪流規則表，例如第一餐和先一起吃兩邊。兩個餵完再餵；第二餐和先一起吃兩邊，兩個餵完再餵；第三餐和先一起吃兩邊。兩個餵完再餵，以此規則輪流。有些媽媽選擇是擠出奶水或用配方奶餵食第三個寶寶，需注意的是使用配方奶將會減少母乳的製造，須審慎考量。

來源：多點關心認識周產期憂鬱

多點關心認識周產期憂鬱

新生命降臨，原本應該是充滿喜悅的事，但有時周產期憂鬱卻會悄悄找上門，讓媽咪的心情蒙上一層陰影。

為什麼會發生周產期憂鬱？

孕產媽媽身心的重大變化，加上照顧胎兒及新生兒的壓力，生活步調的混亂，都可能讓準媽咪及媽咪的心情低落。一般產後情緒起伏通常在三到四天後開始出現，並於二週內陸續消失，這樣的狀況很常見，如果沒有影響日常生活就不用太擔心。

然而爸爸若察覺伴侶情緒不穩定的時間越來越長，請提高警覺，「時常情緒低落」、「沒來由的哭泣與自責」、「不斷陳述負面想法」等症狀若持續半年至一年，這些是典型的周產期憂鬱症狀。周產期憂鬱往往牽涉到生理、心理、家庭、社會等諸多層面，可以善用「愛丁堡產後憂鬱量表共十題」自行評估憂鬱指數。超過標準時，請帶伴侶接受專業醫師或心理師的協助。盡早治療對產婦會更好。

您可以成為伴侶的支持力量

當伴侶出現情緒低落，爸爸可以這樣說：「我發現妳最近

常偷偷掉淚」、「哪裡不舒服可以告訴我」，讓太太抒發情緒、訴說憂慮。也可以多分擔家務和育兒工作，給予伴侶喘息的空間。如果仍未改善，請陪同伴侶尋求專業醫療協助。

而您本身因為看見伴侶的辛苦，也可能產生焦慮情緒。除了留意伴侶情緒，如果發現自己的身心出現異常狀況。可尋求其他家人協助。別忘了，您也需要尋求專業醫師或心理師的協助。

來源：女孩男孩一樣好，生來都是寶

女孩男孩一樣好，生來都是寶

隨著文化的變遷，民主意識的抬頭，兩性平權、實質平等的時代也已悄然到來。在家族生命的延續或對孩子未來成就的期許上，你會因為孩子性別的不同而有所差異嗎？提供下面訊息給準父母參考：

女性也可傳宗接代！

一 男女結婚後可繼續保有原來姓氏，無需再冠夫姓。

二 子女姓氏可由父母書面約定從父姓或母姓。

三 女性與男性具有平等的家產繼承權利，女兒的應繼分也和兒子應繼分完全相同。

四 祭祀公業條例自二千零八年七月一日起施行，已摒棄過去排除女性繼承宗祧的習俗，展現男女的平權意識。

五 在喪葬禮儀中，女性也可以擔任主奠者及主持捧斗、執幡等儀式，傳承家族血緣。

孩子未來的成就無關性別！

一 「性別平等教育法」：讓女性與男性皆有平等受教育之權利。

二 「性別工作平等法」：保障女性工作權之平等，消除性別歧視。

三 女性勞動參與率、專業技術人員比率、管理及經理人員比率不斷提升；國會議員和民意代表中女性席次比例，及女性公務人員進入決策階層比率亦提高。

女孩男孩都是寶！

父母和孩子之間的親情連結跟子女性別並無關聯，長久情感的親密互動，才是真正讓父母感到「有女、有子萬事足」之關鍵。

為了幫助更多胎兒平安的出生，不要因性別而被放棄，請您一起來守護！

來源：奶水分泌是人體自然現象與機制（單張海報宣導影片）

奶水分泌是人體自然現象與機制

奶水分泌係自媽媽懷孕後，即開始運作的人體自然現象。

身體會產生兩個重要的賀爾蒙，幫助奶水分泌。當寶寶吸吮乳房時，首先是透過乳頭神經傳導刺激「腦下垂體」。分泌「泌乳激素」，經過血液抵達乳房。促進乳腺細胞分泌母乳；泌乳激素在產後第一週效果最好，所以產後應盡早開始頻繁的餵奶或是以手擠奶頻繁刺激乳房。提高泌乳激素的產奶能力。再者透過神經傳導刺激「腦下垂體」分泌「催產素」，經過血液抵達乳房。刺激乳腺管周圍皮膚細胞，讓肌肉收縮。奶水順暢流出，稱為「催產素反射」或「排乳反射」；催產素明顯受到心情的影響。媽媽心情愉快、獲得家人支持等正面情緒，「愛的賀爾蒙」催產素分泌會增加。奶水就會順暢流出。

來源：好孕多一碘 發育沒缺碘

好孕多一碘 發育沒缺碘

碘是人體必需的礦物質營養素，但是人體無法自行合成，因此需要每天攝取足夠的碘，才能維持正常生理機能。

育齡婦女計畫懷孕時，就要特別注意碘的攝取，足夠的碘營養才可以供給胎兒發育。孕婦缺乏碘，胎兒發育也會受阻。造成新生兒生長遲滯、神經發育不全，甚至提高胎兒流產、畸形等風險。且也可能出現新生兒呆小症、聾啞與認知功能障礙。

孕婦與哺乳的女性應以碘鹽取代一般食鹽，並適量攝取含碘食物，如海帶、紫菜等海藻類食物，並應與醫師討論是否需要服用補充劑強化碘營養的攝取。

懷孕的媽咪每日建議攝取二百二十五微克的碘；哺乳的媽咪每日建議攝取二百五十微克的碘。

特別提醒，含碘鹽適合一般民眾，若患有甲狀腺相關疾病，需先徵詢專業醫師之意見。

【餐餐選碘鹽，讓健康、聰明零缺碘】碘營養手冊另開新視窗

碘營養-育齡期婦女懶人包 碘營養-育齡期婦女懶人包另開新視窗

碘營養-育齡期婦海報 碘營養-育齡期婦海報下載另開新視窗

來源：如何因應情緒低落或產後憂鬱症

如何因應情緒低落或產後憂鬱症

一 自我生活調適・尋求支持與協助

產後情緒低落（），通常在產後的三到四天發生，而第五天達最明顯；通常產後兩週內就會消失。大部分的個案只需要家屬、朋友多予照顧與支持即可恢復。因此，我們建議新手媽媽照顧新生兒時，需利用嬰兒睡眠時，多讓自己的身體獲得適度休息。不要陷入過度疲憊或睡眠不足的狀態。由於產後媽媽照顧嬰兒時，其體力耗費甚大，所以儘可能由其他家人分擔及減輕產後媽媽的家事清潔等勞力工作，同時提醒產後媽媽不要過分要求清潔。如果可以的話，每天可以撥出一小段時間外出散步。給自己一些喘息休息的機會，同時應適度的向家人或親朋好友說出您的感受。並尋求他們的幫忙。如果可能的話，也可以跟其他產後媽媽分享彼此的經驗與心情，將能得到相當的幫忙。

二 尋求醫療與心理衛生資源

如果產後情緒低落的症狀一直無法改善，甚至持續時間長達兩個禮拜以上時，建議應立即尋求協助。您可至各醫療院所婦產科、家庭醫學科、小兒科或精神科（身心科）尋求協助，或可洽請各縣市衛生局社區心理衛生中心尋求相關心理衛生服務資源。對於產後憂鬱症（）的治療，通常及早診斷及早治療時，越容易成功治癒。如果有產後憂鬱症時，切勿慌張，通常醫師會給予抗憂鬱藥物，並輔以會談諮商或進一步給予心理治療。此時，如果需要持續哺餵母乳者，可與您的醫師密切討論用藥成分及劑量。

三 積極接受診療・避免病症加重

雖產後精神病（）發生率約為千分之一或千分之二，如果發生嚴重產後精神病（）時。產後媽媽除了會出現情緒激動不穩定、哭泣、個性行為改變之外，甚至會出現妄想或幻覺現象。有些還會出現誤認嬰兒已死亡或被掉包等幻覺，根據國外統計產後精神病約有五的自殺率及四的殺嬰率。必須接受積極治療，以免造成不幸。

結語

透過上述產後憂鬱症的介紹，能讓孕期、產後媽媽及家人們辨識產後媽媽是否處於高風險狀態，進而予以尋求家人支持及醫療照護。此外，大部分的產後媽媽都會有輕微產後憂鬱現象。而這些不舒服的症狀，可在家人及朋友的關懷與支持下可以很快的獲得緩解。所以不要羞於表達自己的情感，一旦出現症狀加重或久久不能改善時。應立即協同家人尋求醫療的幫助。

產後憂鬱症如果能夠及早發現，及早治療。其預後是良好的，不要擔心自己會受到家人或朋友的歧視。很多人都願意幫助您渡過難關的。

給家屬的一段話

產後憂鬱或產後憂鬱症可能常被忽視或不自覺，因此常無法得到家人或親友即時的支持及抒發。我們希望透過產後憂鬱症介紹，讓家屬們了解。經由一些簡單的對談聊天，給予傾聽、陪伴及支持。是能讓產後媽媽們自在的談敘個人想法及感受，並讓其情緒獲得抒發。同時，產後媽媽在照顧新生兒時。需耗費相當的體力，也常致睡眠不足。因此，所有的家人應該去分擔照顧新生兒及家庭勞務。減輕產後媽媽的身體負擔；平時多關心產後媽媽，如果發現有產後憂鬱的現象且長時間無法緩解。甚至加重時，應立即尋求醫療協助。

來源：如何幫寶寶洗澡

如何幫寶寶洗澡

洗澡前，先放冷水再放熱水，並確認門窗留有通風口，水溫保持在三十七到三十八間。準備寶寶洗澡用品，如：寶寶專用沐浴乳、毛巾、紗布巾等，且換洗衣物與尿布應放在就近的位置以方便拿取，接著就可按下面的步驟幫寶寶洗澡了：

一脫掉寶寶身上衣服並以衣物或浴巾蓋在身上。

二沾濕毛巾或紗布巾，從寶寶內眼擦向外眼並清潔鼻孔、耳朵和臉部。

三用少量沐浴乳輕搓頭髮。沖水前須用手指壓蓋住寶寶耳朵，避免水流到耳朵裡。

四簡單擦乾頭髮後，在寶寶身上先拍點水以適應水溫。

五讓寶寶枕在前臂，且手要抓著寶寶的腋下及手臂，再將寶寶臀部放入澡盆中。

六用少量寶寶專用沐浴乳塗抹身體，注意脖子、腋下、大腿、股溝處等皺褶部位，再沖水洗淨。

七用浴巾包好擦乾，迅速幫寶寶包尿布穿上衣服。

八清洗屁屁時，女寶寶由前方尿道口處往後清洗到肛門處。男寶寶包皮向後推，與陰囊的皺摺處。請輕柔清洗乾淨。

切記，即便水很淺也不可獨自留寶寶在澡盆裡。

來源：如何提高受孕的機率

如何提高受孕的機率

提高受孕機率的方法

受孕是許多夫婦希望實現的重要目標，但有時候這個過

程可能會面臨挑戰。瞭解如何提高受孕機率，可以幫助您更有信心地朝著這一目標努力。本文將從多個角度探討提高受孕機率的方法，包括了解排卵週期、改善生活習慣、飲食調整、壓力管理、健康檢查與治療選項等。

一、了解排卵週期

一 排卵的重要性

受孕的關鍵在於女性的排卵過程。排卵是指卵巢釋放成熟卵子的過程，通常每月一次。卵子在被釋放後，僅在大約二十四小時內具有受精能力，而精子在女性生殖道內可以存活約三到五天。因此，瞭解並掌握排卵週期，能夠幫助夫婦在最佳時機進行性交，提高受孕機率。

二 如何計算排卵期

排卵期通常發生在下次月經開始前約十四天。然而實際的日期差距會因個體差異而有所不同。以下是幾種計算排卵期的方法：

日曆法

：記錄過去幾個月的月經週期，計算平均週期長度，然後推算出排卵期。這種方法適用於週期規律的女性。

體溫法

：基礎體溫在排卵後會略有上升。每天早晨醒來時測量體溫，記錄下來，觀察體溫變化，以推斷排卵時間。

排卵試紙

：市面上有各種排卵試紙，可以檢測尿液中促黃體產生素（ LH ）的濃度。峰值通常在排卵前二十四到三十六小時出現。

頸黏液觀察法

：排卵期時，頸黏液會變得更加清澈、滑潤，類似生蛋白狀態。通過觀察頸黏液的變化，可以判斷排卵期。

三 排卵期性交的重要性

在排卵前幾天以及排卵當天進行性交，是提高受孕機率的關鍵。由於精子在女性生殖道內可以存活幾天，選擇在排卵前三至五天以及排卵當天進行性交，能夠增加精子與卵子相遇的機會。

二、改善生活習慣

一 維持健康體重

體重過輕或過重都可能影響排卵和受孕機率。維持適當

的體重，有助於調節激素荷爾蒙濃度，促進正常的排卵週期。以下是一些建議：

體重過輕：可能導致月經不規則或停止，影響排卵。增加攝取營養，保持均衡飲食，有助於恢復正常體重和排卵。

體重過重：可能導致多囊卵巢綜合症（PCOS）等疾病，影響排卵。通過飲食控制和運動，減輕體重，有助於恢復正常排卵。

二 飲食調整

均衡的飲食對於生殖健康至關重要。以下是一些飲食建議：

攝取足夠的葉酸：葉酸有助於預防胎兒神經管缺陷。葉酸豐富的食物包括綠葉蔬菜、豆類、堅果和全穀類。

攝取優質蛋白質：包括魚、雞肉、豆腐和豆類，有助於維持激素平衡。

攝取健康脂肪：如Omega-3脂肪酸，存在於魚類、亞麻籽和堅果中，有助於調節激素濃度。

限制加工食品和糖分攝入：過多的加工食品和糖分可能導致體重增加和激素失衡，影響排卵。

三 適度運動

適度的運動有助於維持健康體重、減少壓力和促進血液循環，對生殖健康有益。然而，過度運動可能導致體重過輕或月經不規則，因此應保持適度。

四 戒菸限酒

戒菸：吸菸對女性及男性之生殖系統有害，可能導致卵子及精子品質下降，增加不孕的風險。戒菸有助於改善精卵品質和整體健康。

限酒：過量飲酒可能影響激素濃度和生殖功能。建議女性在嘗試受孕期間限制酒精攝入，保持適量。

三、管理壓力

一 壓力對生殖健康的影響

長期壓力可能導致激素失衡，影響排卵和生殖功能。壓力過大可能導致月經不規則或停止，降低受孕機率。

二 壓力管理方法

放鬆技巧：如深呼吸、冥想和瑜伽，有助於降低壓力。

運動：適度運動可以釋放內啡肽腦內啡，改善情緒，減輕

壓力。

充足睡眠：保持良好的睡眠習慣，有助於身心健康，減少壓力。

尋求支援：與家人、朋友或專業心理諮詢師交流，有助於緩解壓力。

四、健康檢查與治療

一 預備性健康檢查

在嘗試受孕前，建議進行全面的健康檢查，包括：

婦科檢查：檢查子宮、卵巢的健康狀況，排除結構異常或疾病。

血液檢查：檢查激素濃度、甲狀腺功能等，確保生殖系統正常。

傳染病篩檢：檢查是否有性傳染病，避免傳染給伴侶或胎兒。

二 常見生育問題及治療

多囊卵巢綜合症（）：是一種常見的內分泌疾病，影響排卵。治療方法包括藥物治療（如克羅米芬）、生活方式調整（如減重和運動）等。

子宮內膜異位症：子宮內膜組織生長在子宮外，可能導致疼痛和不孕。治療方法包括藥物治療和手術。

輸卵管問題：輸卵管阻塞或損傷可能影響受精。治療方法包括手術修復或輔助生殖技術（如體外受精）。

男性不育：男性精子品質和數量問題也會影響受孕。建議男性進行精液分析，根據結果進行治療。

三 輔助生殖技術（）

當自然受孕困難時，輔助生殖技術可以提供幫助。常見的方法包括：

體外受精（試管嬰兒，）：將卵子和精子在實驗室環境下結合，形成胚胎後移植到子宮內。

人工授精（）：將處理過的精子直接注入女性子宮內，提高精子與卵子相遇的機會。

卵子或精子捐贈：當夫妻雙方有生殖問題時，可能需要使用捐贈的卵子或精子。

五、其他考量因素

一年齡的影響

女性的生育能力隨著年齡的增長而下降，特別是在三十五歲之後。男性的生育能力也可能隨著年齡增長而減弱。瞭解年齡對生育的影響，有助於及早採取措施。

二遺傳因素

某些遺傳疾病可能影響生育能力。在計畫懷孕前，建議進行遺傳諮詢，瞭解可能的遺傳風險，並採取因應措施。

三環境因素

環境中的有害物質（如重金屬、農藥、化學物質）可能影響生殖健康。建議避免接觸有害物質，保持健康的生活環境。

六、情感與心理支援

嘗試受孕的過程可能伴隨著壓力、焦慮和失望。保持積極的心態和良好的情感支援，有助於減少壓力，促進身心健康。以下是一些建議：

與伴侶保持溝通：開放和誠實地交流感受，有助於增進彼此理解和支援。

尋求支援團體：參加相關的支援團體或論壇，與有相似經歷的人交流，分享經驗和建議。

尋求專業心理諮商：當情緒壓力過大時，尋求專業心理諮詢師的幫助，有助於處理負面情緒。

七、總結

提高受孕機率是一個多方面的過程，涉及生理、心理和生活方式等多個因素。以下是一些關鍵要點的總結：

瞭解並掌握排卵週期：確定最佳受孕時機，增加精子與卵子相遇的機會。

改善生活習慣：保持健康體重、均衡飲食、適度運動、戒菸戒酒，有助於提升生殖健康。

管理壓力：採取有效的壓力管理方法，維持心理健康，促進身心和諧。

定期健康檢查：及早發現並治療可能影響受孕的健康問題。

考慮輔助生殖技術：在自然受孕困難時，考慮尋求專業醫療幫助，採用適當的輔助生殖技術。

保持積極心態：面對受孕過程中的挑戰，保持積極和耐心。

的心態，有助於減少壓力，促進受孕。

每對夫婦的情況都是獨特的，無法一概而論。建議在嘗試受孕前，與醫療專業人員進行詳細諮詢，根據個人情況制定最適合的計畫。通過綜合運用上述方法，您將有更大的機會實現受孕的目標，迎接新生命的到來。

來源：如何沖調嬰兒配方奶粉，讓您在家用奶瓶哺餵

如何沖調嬰兒配方奶粉，讓您在家用奶瓶哺餵

母乳是最佳餵養方式

世界衛生組織建議新生兒在前六個月內應純母乳哺育。完全使用母乳哺餵的嬰兒，將為其成長、發展和健康打下堅實的基礎。不能進行母乳哺餵的嬰兒必須有合適的母乳替代品，例如嬰兒配方奶粉。

最新安全建議

嬰兒配方奶全非完全無菌。它可能含有細菌會導致嬰兒發生嚴重疾病，正確的沖調和保存嬰兒配方奶粉，可以有效地降低患病風險。

要如何以最安全的方法使用奶瓶沖調嬰兒配方奶粉呢

清潔、消毒與存放：在使用前對所有用於哺餵及沖調奶粉的器具例如，奶瓶、奶嘴和瓶蓋進行徹底地清潔和消毒是非常重要的，對器具進行清潔和消毒可以殺滅餵哺時滋生的致病菌，防止嬰兒患病。

一 清潔

第一步：用香皂和水清洗雙手，然後用乾淨的毛巾擦乾。

第二步：在熱水中徹底清洗所有哺餵和沖調器具。使用乾淨的瓶刷和奶嘴刷擦洗瓶子和奶嘴內外，確保清除各個死角殘留的奶液。

第三步：在乾淨的水中徹底沖洗。

二 消毒

使用市面上的消毒器遵照廠商的說明，或者在鍋中用沸水滾煮，對清潔後的器具進行消毒

第一步：在大鍋中注水。

第二步：將清洗後的哺餵和沖調器具放入水中。確保器具完全沒入水中，內部沒有殘存的氣泡。

第三步：蓋上鍋蓋，煮至沸騰，注意水不能燒乾。

第四步：在您需要使用哺餵工具時再打開鍋蓋。

三 存 放

清洗並擦乾雙手，然後接觸消毒過的器具。建議您使用消毒過的鑷子來取用這些器具。如果您要提前從消毒器中取出沖調和哺餵工具，請將它們放在乾淨的地方並蓋好。當您提前從消毒器中取出奶瓶時，請切記把奶瓶全部組裝好。這可以防止瓶子內部，以及瓶嘴的內外再次受到污染。

如何 用 奶 瓶 沖 調

第一步：對沖調奶粉的桌面進行清潔和消毒。

第二步：用肥皂和水清洗雙手，然後用乾淨的或使用後即丟的毛巾擦乾。

第三步：煮些乾淨的水，如果使用自動電爐，請等到電爐自動斷電。如果使用鍋子煮水，請確保將水煮至沸騰。

第四步：閱讀配方奶包裝上的說明，了解開水與奶粉的調配比例。多於或少於說明的份量都可能使嬰兒患病。

第五步：請小心被燙傷，將適量的開水倒入乾淨且消毒過的奶瓶中，水溫不得低於七十，並且煮開後不能閒置三十分鐘。

第六步：將精確份量的配方奶添加到奶瓶的開水中。奶粉勺匙應避免置於罐中，應另外存放並經常清洗、保持乾燥。

第七步：輕微搖動或轉動奶瓶，使其充分混合。

第八步：握住奶杯放在水龍頭上沖洗，或者將奶瓶放在盛放了冷水或冰水的容器中，迅速將其冷卻到適合哺餵的溫度。這樣，您就不會污染到乳汁，但要確保冷卻水的水平面低於瓶蓋。

第九步：使用乾淨的或用後即丟的毛巾擦乾瓶子表面。

第十步：將少量乳汁滴到您的手腕內側，以便檢查溫度。應該感覺起來是溫熱，而不是燙。如果感覺到燙，那就繼續冷卻，然後再哺餵。

第十一步：哺餵嬰兒。

第十二步：兩小時內未能吃完的乳汁應全部倒掉。警告：切勿使用微波爐沖調或加熱乳汁。微波爐並非均勻加熱。物體會產生「熱點」，這可能燙傷嬰兒的口腔。

我可以把沖調好的奶存放起來，以備後用嗎

最安全的方法是每次餵乳時都沖調新鮮的乳汁，然後立

即哺餵，這是因為沖調好的乳汁為細菌的繁殖提供了理想的條件，特別是在室溫下保存時。如果您需要提前沖調乳汁以備後用，它們應在單獨的奶瓶中沖調，快速冷卻，然後放在冰箱中溫度不超過五。二十四小時內未用完的冷凍乳汁應全部倒掉。警告：如果您沒有冰箱，那麼提前沖調乳汁並不安全，一定在需要時再沖調新鮮的乳汁。

如何加熱低溫保存的奶水

當您需要的時候再從冰箱裡拿出奶瓶。

加熱時間不要超過十五分鐘，您可以將奶杯放置在盛有溫水的容器中，但要確保水的高度不要超過杯頂。偶爾搖晃或轉動一下奶瓶，確保加熱均勻。

將少量乳汁滴到您的手腕內側，以便檢查溫度。應該感覺起來是溫熱，而不是燙。

兩小時內未能吃完的加熱乳汁應全部倒掉。

警告：切勿使用微波爐沖調或加熱乳汁。微波爐並非均勻加熱。物體會產生「熱點」，這可能燙傷嬰兒的口腔。

我在旅行時，我可以隨身帶著預先沖調好的乳汁嗎

可以。但請確保轉移乳汁前對其進行冷藏，並且在轉移途中也要一直冷藏。這可以將延緩或停止有害細菌的滋生。

正常沖調奶粉，快速冷卻，然後放在冰箱中（溫度不超過五）。

在您出發之前，迅速從冰箱中取出奶瓶，然後放在裝有冰塊的冰袋中。

之後再將奶瓶存放在目的地的冰箱中，或者在需要時加熱乳汁。如果您的行程超過兩小時，您可能無法一直冷藏預先沖調的乳汁。在這種情況下，您應該在需要時再沖調奶粉。在乾淨的、消過毒的容器中帶上幾份配方奶粉，在需要時使用不低於七十的開水按正常方法沖調奶粉。

如果我暫時沒有開水我該怎麼辦

最安全的沖調方法是使用燒開的開水，然後再冷卻到不低於七十。

如果您暫時沒有開水，您可以使用經消毒的液態嬰兒配方乳汁。

或者，您也可以使用新鮮、乾淨的室溫水沖調，然後馬上食用。

使用七十以下的溫水沖調的乳汁應即刻食用，不得存放。

以備後用。

兩小時後剩餘的乳汁請全部倒掉。

來源：如何知道寶寶吃飽了

如何知道寶寶吃飽了

當寶寶吸吮媽媽的乳房時，就會傳遞信息到媽媽的大腦裡，產生荷爾蒙的變化，讓乳房製造寶寶需要的奶水。因此，寶寶吸出愈多，奶水就繼續分泌愈多。由於每位寶寶的喝奶量及腸胃狀況都不同，依寶寶需求餵食吸吮媽媽的乳房。寶寶不僅獲得最好的營養，也得到最適當的奶量。所以經由親餵的寶寶無須太擔心會吃不飽。真正吃到奶的表現，在吸奶過程中寶寶嘴巴張得很大。一開始可能吸吮的速度很快（一秒鐘兩三次），但是當奶水開始流出，寶寶真的吸到奶水時，吸吮的動作會變慢（大約為一秒一次）。如果寶寶吸吮的動作一直持續很快的話，表示他並沒有真正吸到奶水。當寶寶真得吃飽後會自己鬆口放開乳房。

母乳較配方奶容易消化吸收，寶寶出生後，只要「想吃就餵」，並由寶寶決定吃奶的時間長短。媽媽不需要受限哺乳的時間長短及頻率喔！新生兒的餵食可能較不規律，頭一、兩天可能會只吃幾餐；幾天後可能又變得吃的很勤。每個寶寶都是不同的個體，但是大多數都會在一、兩週後發展出自己的規律性。每個寶寶吸吮時間的差異性很大，大部分為五至二十分鐘，但是也有的要三十至四十分鐘，其實媽媽不需要太在意時間的長短。研究發現，慢慢吸吮的寶寶與吃很快的寶寶所獲得的奶水總量是相同的。如果一個吸奶動作較慢的寶寶在吸奶時被提早抱離開媽媽，他反而會沒有獲得足夠的奶水量。

另對於愛睡的寶寶，您需每二到三小時主動鼓勵寶寶起來喝奶。寶寶常有哭鬧情形，需要評估寶寶是否有其他需求，和有沒有吃飽不一定有關係。

直接母乳哺育時，無法直接看出嬰兒從乳房吃到多少的乳汁，可依下列幾點判斷嬰兒得到足夠母乳的表徵。

一觀察小便量，通常在二十四小時內排出六到八次清澈的尿，正常一天約六片含以上的濕尿布。

二尿液顏色：顏色清澈或呈淡黃色

三嬰兒出生後頭六個月，體重每週約增加一百二十五公克，或每月可增加五百公克至一公斤。

同時，觀察寶寶的體重成長曲線第四天起，寶寶的體重會每天逐漸增加，十到十四天後體重會從生理性脫水回復到出生時的體重以及排泄狀況知道是否有獲得足夠的奶水。檢查嬰兒的尿量是有用而快速的檢查，觀察體重增加情況，是可靠的表徵。

來源：如何避免媽媽手

如何避免媽媽手

『媽媽手』為一狹窄性肌腱滑膜炎，主要是在大拇指側邊靠近手腕處。有兩條肌肉分別是外展拇長肌及伸拇短肌的肌腱會經過這一個空間狹小的淺溝，當肌腱發炎或者周遭的滑膜發炎時。會因腫脹而導致空間更顯狹小，此時。肌腱的滑動將因空間狹小而受阻，造成大拇指及拇指側的手腕疼痛。即為所謂的『媽媽手』。主要因媽媽在長時間抱小孩、哺餵母乳，擠母奶的動作，常容易出現手腕過度彎曲、大拇指過度用力外展等不正確施力方式所致。

「預防勝於治療」是身體健康的不變法則

當生理不適時，心情也無法放鬆，進而對乳汁分泌造成不小的影響。因此，媽媽親餵時。一定要保持令自己覺得舒服的姿勢，避免姿勢不當易造成對肩膀與手腕的傷害。進而影響哺乳心情。

肩膀與手腕放鬆

由於哺餵母乳、照顧寶寶是一份長期工作，媽媽也要懂得保護自己，最直接的就是預防「媽媽手」上身。由於擠乳或抱小孩的動作，是長時間維持在同一個姿勢。而不少媽媽總不自覺地讓手腕與手呈將近九十度的狀態，時間一久。容易造成俗稱「媽媽手」的「腕隧道症候群」，媽媽抱小孩或擠乳時。肩膀應放鬆，手腕部分也自然放鬆。不要彎曲呈九十度，不妨戴上護腕。以保護手腕的神經與韌帶免於受傷害。

趴著擠乳不吃力

至於擠乳的媽媽該怎麼保持令人放鬆的姿勢？媽媽可以在桌上擺一個枕頭墊著頭部，身體往前傾。乳房自然下垂，肩膀輕鬆保持直線。然後，一手拿著擠乳器接著流出的乳汁。這樣的姿勢不只讓乳汁更容易順勢流出，同時，也能讓自己處於休息狀態。當然，丈夫若能站在身後為太太按摩肩膀。相信太太的心情一定更快樂，更容易放鬆而刺激噴乳反射。製造出更多的奶水。

預防媽媽手有撇步

簡單的運動可用來預防媽媽手：在家中找一面牆壁，以正側面站著。手與身體呈平行，貼在牆壁上儘量朝上伸展。手指部分則不斷往上爬，讓肩膀與手腕的肌肉透過伸展達到放鬆效果。利用空檔時間做，對於預防媽媽手頗有助益。

來源：妊娠糖尿孕婦不擔心 健保給付血糖試紙助控糖

妊娠糖尿孕婦不擔心 健保給付血糖試紙助控糖

由於懷孕期間母體過高的血糖會透過胎盤影響胎兒，而造成胎兒過大、新生兒低血糖、黃疸、肩難產等風險，也

可能增加孕婦產後發生典型糖尿病之風險喔！

當孕婦被診斷出妊娠糖尿病，飲食需特別注意；並且需要以血糖測試控制血糖。

國民健康署自一百一十年七月一日特別於第二十四到二十八週新增妊娠糖尿病篩檢。藉由篩檢能協助孕媽咪早期發現症狀，並早期介入治療！

健保署為了讓孕媽咪們安心待產，自一百一十年十二月一日起。健保給付懷孕二十八週含以上被診斷出妊娠糖尿病的孕婦，每天以五片血糖試紙為上限。每次一個月的份量為原則，給付至生產為止。預計每年約有一萬二千名孕婦受惠。

來源：妊娠糖尿病對孕婦及胎兒的影響

妊娠糖尿病對孕婦及胎兒的影響

妊娠糖尿病（）是孕期最常見的內分泌異常疾病之一，通常在妊娠中期或晚期被診斷。這種糖尿病會影響孕婦和胎兒的健康，需要及時處理和管理。本文將進一步介紹妊娠糖尿病對孕婦和胎兒的影響、風險、管理策略及預防方法，幫助了解和應對這一常見的孕期間題。

妊娠糖尿病概述

妊娠糖尿病指的是在孕期首次出現的糖尿病。其特點是血糖水準升高，但並不足以診斷為第二型糖尿病。這種狀況通常在孕期結束後會自行改善，但若不加以管理，可能會對孕婦和胎兒造成嚴重影響。

妊娠糖尿病的影響

對孕婦的影響

高血糖和糖尿病併發症：

妊娠糖尿病使孕婦面臨高血糖的風險。若控制不佳，可能導致孕婦出現糖尿病相關併發症，如尿路感染、酮症酸中毒等。

孕期高血壓和先兆子癲前症：

妊娠糖尿病增加了孕婦患高血壓和先兆子癲前症的風險，這些狀況可能導致孕婦和胎兒健康問題，包括早產和胎兒生長受限。

產後糖尿病風險：

擁有妊娠糖尿病的孕婦在產後有更高的風險發展為第二型糖尿病。約五十到七十的孕婦在未來的某個時期可能會出現糖尿病。

分娩過程中的風險：

妊娠糖尿病可能增加分娩過程中的併發症風險，包括難產、剖腹產和產後出血。

對胎兒的影響

胎兒體重增加：高血糖可導致胎兒體重大幅增加（巨嬰症），進而增加分娩困難的風險，並可能需要剖腹產。

早產風險：妊娠糖尿病使胎兒面臨早產的風險，因為可能需要提前引產或剖腹產以保護母嬰健康。

呼吸窘迫綜合症：巨嬰症胎兒可能在出生後面臨呼吸窘迫綜合症，因為他們的肺部發育可能不完全。

低血糖：出生後，受妊娠糖尿病影響的胎兒可能會出現低血糖，這可能需要即時的醫療處理來穩定血糖濃度。

黃疸：高血糖增加了新生兒黃疸的風險，這是一種由於膽紅素積累造成的皮膚和眼睛發黃的情況。

未來健康風險：這些新生兒可能面臨更高的糖尿病和肥胖風險。

妊娠糖尿病的診斷

妊娠糖尿病的診斷通常在孕期中期進行。診斷過程包括：

口服葡萄糖耐量測試（OGTT）：這是一種測試孕婦在空腹和飲用含糖飲料後的血糖值。通常在二十四至二十八週進行，若三次抽血中有一次超標即被診斷為有妊娠糖尿病。

糖尿病風險評估：醫生會根據孕婦的風險因素，如體重、家族病史和過去的妊娠歷史，進行初步評估和篩檢。

妊娠糖尿病的管理

飲食調整：

控制血糖：遵循營養師或醫生制定的飲食計畫，選擇低升糖指數的食物，控制碳水化合物的攝取量，並增加膳食纖維。

定時定量：每天進餐均衡，避免過多的糖分和飽和脂肪，並確保餐餐包含蛋白質和複合碳水化合物。

運動：

適度運動：定期進行輕度至中等強度的運動，如散步、游泳或孕婦瑜伽，有助於控制血糖值並促進整體健康。

運動計劃：應根據醫生的建議制定運動計畫，並在運動過程中密切監測血糖值。

血糖監測：

家庭血糖監測：使用血糖儀定期檢測血糖值，根據測試結果調整飲食和運動計劃。

醫療追蹤：定期到醫療機構進行血糖監測和醫生評估，確保血糖值在安全範圍內。

藥物治療：

胰島素注射：如果飲食和運動無法有效控制血糖，醫生可能會建議使用胰島素注射來穩定血糖值。

口服藥物：在某些情況下，醫生可能會開具口服降血糖藥物，但這需要謹慎使用並遵循醫生指導。

產前護理：

定期產檢：定期進行產前檢查，以監控胎兒的健康和發育情況。必要時，醫生會安排超音波檢查和胎兒監測。

分娩計畫：與醫生討論分娩計畫，了解可能的分娩方式和應對策略。

妊娠糖尿病的預防

維持健康體重：

控制體重：孕前保持健康體重，孕期避免體重過度增加。有助於降低妊娠糖尿病的風險。

均衡飲食：

營養飲食：在孕期前保持均衡飲食，避免高糖和高脂肪的食物。增加水果、蔬菜和全穀類的攝取。

定期運動：

孕前定期進行運動，有助於維持健康的血糖值。

早期篩檢：

風險評估：有糖尿病家族史或其他風險因素的孕婦應早期進行糖尿病篩檢，及早發現並管理血糖問題。

總結

妊娠糖尿病對孕婦和胎兒的健康有著多方面的影響，需要仔細管理和監控。通過適當的飲食調整、運動、血糖監測和醫療追蹤，可以有效控制血糖值，減少併發症的風險。

。國民健康署提供十四次公費產檢，其中包括在懷孕第二十四到二十八週補助的妊娠糖尿病篩檢，妊娠糖尿病的管理不僅涉及孕婦的健康，還關乎胎兒的正常發育。因此，了解其影響、風險和管理策略，是確保健康孕期和健康寶寶的重要步驟。希望本文能夠幫助孕婦和家庭更好地理解 and 應對妊娠糖尿病，促進健康的孕期和分娩。

來源：妊娠紋預防勝於治療

妊娠紋預防勝於治療

妊娠紋預防勝於治療

妊娠紋是懷孕過程中，見證媽媽的偉大光芒的印記。如果您不希望妊娠紋出現，提早預防會比事後治療更有效！尋求專業的診療，也是避免妊娠紋發生的方法之一。

四方法將妊娠紋出現機率降到最低

一體重控制：體重增加過快或過多，妊娠紋出現的機率也會跟著提高。

二均衡飲食：蛋白質中的膠原蛋白是維持肌膚彈性的重要成分，因此均衡的飲食不可少。

三適度運動：多運動有助於促進血液循環、伸展及增加肌肉比例，並維持肌膚彈性。

四按摩肌膚：妊娠紋出現常常伴隨皮膚乾癢，適當塗抹乳液並做按摩，滋潤肌膚的同時也提升肌膚彈性。

來源：分娩階段伴侶可以做的事

分娩階段伴侶可以做的事

第一產程規律陣痛到子宮頸全開

陪伴在孕媽咪身邊和她多說說話、多鼓勵她分散疼痛注意力也可以運用按摩音樂等方式幫助她舒緩不適。

第二產程子宮頸全開到胎兒娩出

輕撫孕媽咪的頭、臉告訴她做得很好繼續加油緊握她的手和她一起用力及放鬆

第三產程胎兒娩出到胎盤娩出

協助抱起寶寶讓媽咪與寶寶進行肌膚接觸好好表達感謝與媽咪一同感受新生命誕生的喜悅

從規則陣痛直到胎兒及胎盤娩出，每個人生產所需時間有個別差異，平均初產婦約十四到十六小時，第二胎含以上產婦約七到八小時

延伸閱讀

「台灣生育改革行動聯盟」-孕產十堂課一千零二十生動盟的孕產十堂課

來源：媽咪哺餵母乳爸爸角色很重要

媽咪哺餵母乳爸爸角色很重要

哺餵母乳是讓寶寶獲得優質營養的方法之一，也能促進媽咪的健康。雖然哺乳的過程爸爸無法代勞，依然可以從旁給予媽咪重要的情緒支持和實質協助。

伴侶的共識最重要

夫妻可提前溝通與討論哺乳計畫，而哺乳這件事，須尊重哺乳者本身的意願。如果媽咪碰到挫折或因健康、工作因素而無法持續哺乳或純母乳哺餵，可能產生極大精神壓力。請爸爸告訴伴侶，她已經做得很好。是最好的媽咪了，她的選擇你都尊重、支持。

每日攝取均衡飲食

哺乳期間，攝取充足的蛋白質、均衡營養、補充水分非常重要，另外像是牛奶、豆漿、鱸魚、蛤蜊、黑麥汁、桂圓、芝麻等食物都可以嘗試看看，爸爸可以為伴侶準備適合的食物。

半夜擠奶的貼心舉動

為了避免乳腺阻塞、引發乳腺炎，媽咪約每一到四個小時就要親餵或擠奶，其中一次的時間點會落在半夜。若半夜發現伴侶已悄悄起身，盡可能跟著起來為她開盞小夜燈、備好哺乳枕、幫忙按摩肩膀或倒杯溫水，讓太太感到自己並不孤單。如事前已有分工不須起床，則仍需表達關心，例如「辛苦你了！」、「有需要就叫我」。

哺乳困擾可求助專家

泌乳期可能發生奶水太多、奶水不足、乳腺堵塞，甚至發生乳腺炎等困擾。哺乳問題可運用多元管道，包括：醫療院所-哺乳諮詢專線或母乳諮詢門診；電話諮詢-孕產婦關懷諮詢專線八百到八百七十-八百七十及網路資訊-孕產婦關懷網站。若太太出現倦怠感、發燒，有可能是乳腺炎的症狀，請帶太太就醫治療。

無法以母乳完全哺餵應使用嬰兒配方奶

當媽咪因為醫療或是其他原因無法完全母乳哺餵時，在嬰兒一歲前應該使用嬰兒配方奶。請諮詢兒科醫師，並注意安全衛生及正確的沖泡使用方式。尤其是嬰兒配方奶粉非無菌，它可能含有細菌。務必以攝氏七十度以上水溫沖調。可在有信譽的商店購買經衛生福利部食品藥物

管理署查驗登記許可之嬰兒配方食品，勿購買來路不明之產品。

家務分工的調整

媽咪哺乳跟擠乳的時間平均花費三十至六十分鐘，而且一天需要進行數次，嚴重影響生活的品質。原本的家事分工要重新規劃，爸爸應主動負責更多家事，或者負責調度其他人力共同完成。

巧妙應對家人的建議

迎接新生命是家中大事，家人可能會急著想要分享育兒建議。這時爸爸可以扮演好緩衝的角色，適度與家人溝通，表達你對太太的支持。

來源：媽咪感冒、胃不舒服怎麼辦？孕期用藥安全及日常緩解方式

媽咪感冒、胃不舒服怎麼辦？孕期用藥安全及日常緩解方式

孕期需要用藥時，謹記三守則

懷孕過程長達十個月，這當中免不了有時需要用到藥物來治療疾病的時候。但孕期用藥不比未孕前，必須更加謹慎。因為有些藥物會透過胎盤進入胎兒體內，影響胎兒發育。所以孕期若有用藥需求時，必須謹記下面三守則：

一 就醫主動告知醫師已懷孕：

若孕期需要用藥，無論是內服或外用藥，務必於就醫時主動向醫師、藥師說明懷孕狀況，方能依據孕期週數及母胎安全做整體評估。

二 慢性用藥不可自行停藥：

例如氣喘、糖尿病、癲癇、紅斑性狼瘡、高血壓等慢性病，若已有穩定用藥療程。不可自行停止或增減藥物，在準備或得知懷孕時。記得先諮詢醫師或藥師，經醫師專業評估後決定。

三 避免標示不清、誇大療效或來路不明產品：

坊間的偏方、網路推薦的療效藥產品，往往未經科學驗證，孕媽咪應避免使用來路不明、標示不清的產品。除此之外，也不可自行購買成藥服用。

孕期用藥應從藥物安全性及孕周做通盤考量

藥物安全性

孕期用藥影響程度及範圍，與懷孕週數有很大的關係，嚴重可能使胎兒的心臟、神經系統，以及腦部、四肢、五官等等造成傷害或缺陷。所以從備孕開始至懷孕後的用藥

，醫師多半會根據「藥物性質、使用劑量、孕周與給藥方式」等做通盤考量。在孕婦用藥安全分級方面，食藥署及國內醫療普遍採用美國（美國食品藥物管理局）的、、、五級藥物分類，以方便臨床判斷用藥風險。

不過美國食品藥物管理局於二千零一十五年改以新式藥品標示，取代上述的孕婦用藥安全分級，而兩者差別在哪呢？舊有孕婦用藥分級的描述，有較多無法證實或無對照組的部分。且因為有些藥品用在不同孕期週數，其安全性未必一樣。若以分級定義其藥品在孕婦使用的安全性上，也不盡然正確。因此當孕婦需要用藥，應與醫師討論用藥之利弊，不可單以字母之分級而自行使用或停止使用藥物。

而新式藥品標示以更詳盡的文字仿單，載明包括：藥品對於懷孕暴露（分娩與生產），以及哺乳期、生殖的影響，更具有指引價值。譬如有一些藥品可能會蓄積在體內長達一段時間，儘管停藥也可能影響胎兒；而有些藥品會使男性精子異常。有致畸風險，若藥品標示更加完整。在用藥時即能有更適切的相對應做法。

不過在新制度之前上市的藥物，未必皆修改成新式藥品標示方式，因此原本的懷孕安全用藥分級仍具有參考價值。

媽咪懷孕週數

孕期除了用藥時會以藥物安全分級作為開立考量外，還會依照媽咪的懷孕週期做一併評估，因為不同時期的胚胎，對藥物的反應也有不同。以下針對懷孕週數、胚胎發育狀況，其藥物的影響作說明：

著床前期（受精後七天）：

藥物作用可能導致「全有或全無」，也就是胚胎可能無法存活或完全未受影響。

胚胎前期（受精後二週）：

胚胎開始分化，而藥物對尚未分化的胚胎組織影響較小。

胚胎期－器官形成期（二週-三個月）：

是畸形風險最高的時期，此階段應儘量避免使用藥物。

胎兒期－功能發展期（三到九個月後）：

大結構畸形較不會發生，但仍可能影響到胎兒的中樞神經系統。

懷孕末期：

藥物通過胎盤的通透率增加，同時也要避免易引起子宮

收縮及血液凝集的藥物，以免引發早產或新生兒黃疸。

孕期感冒、胃部不適，非藥物緩解方式

孕期遇到感冒、胃部不適症狀時該怎麼辦？雖然孕期用藥需要考量較多，但也別諱疾忌醫、耽誤病情，有必要用藥時應就醫，經由醫師診斷、評估後開立藥物服用。除此之外，也可以搭配以下日常生活緩解方式：

感冒症狀改善方法：

多喝溫水、充分休息、保持空氣流通，並注意營養以提升免疫力，可補充含有維生素的蔬果、蛋白質食物。如果孕媽咪有鼻塞等症狀，也可用溫毛巾熱敷鼻子來緩解。

胃食道逆流／火燒心改善方法：

避免一次吃太多，可嘗試一天五至六餐的少量多餐進食法，同時避免食用辛辣、油炸等刺激性食物。另外建議，用餐時細嚼慢嚥、不搭配飲品（可於餐與餐中間再喝水），然後餐後不要馬上躺下，睡前幾小時內也應避免進食。

用專業與關懷，守護孕媽咪與胎兒健康

懷孕並不是「不准吃任何藥」，而是要選擇「對母胎都更安全的方式」。用藥安全分級制度與專業醫療評估，都是為了保護胎兒與孕媽咪的健康。必須用藥時，必需與醫師、藥師討論。選擇在分級與臨床經驗上皆屬較安全的選項，對於來路不明的偏方、藥草、活性疫苗等。孕期都應避免。

綜合以上敘述，守護孕媽咪及胎兒健康的第一原則。即有不適症狀先向醫師、藥師說明懷孕狀況，並遵守用藥指示。包括服用次數、方法、劑量等，後續同步觀察自己身體復原狀況。孕期多一份小心，就能對胎兒健康多一份保障。

來源：媽媽親餵不適症狀的處置

媽媽親餵不適症狀的處置

造成媽媽乳頭疼痛，最常的原因是寶寶含得好。可能是因過早使用人工奶嘴或以奶瓶餵食，太晚開始哺育母乳。或乳房腫脹等造成寶寶好含住乳房。

如果寶寶含得好，在他吸吮時會將乳頭進又出，小嘴會摩擦乳房的皮膚，讓媽媽的乳頭非常痛。若持續以此一方式吸吮的話，會傷害乳頭皮膚，而造成破皮皸。

如果寶寶吸吮時讓媽媽覺得痛時，可能是寶寶含乳方式不對，這時應小心的把乳頭自寶寶口中退出，再讓寶寶重新含乳。另一種情形是媽媽餵完奶後，立刻穿上內衣。讓乳頭經常處於潮濕狀態，這樣下次寶寶再吸乳頭時。可能容易導致乳頭破皮。

乳頭痠痛如何處理：

一 改善寶寶的含奶姿勢

試著由不痛的那邊先餵奶，也可以更換餵奶姿勢，乳房乳暈受壓點不同，也可分散疼痛處的壓力。

以乳頭輕觸寶寶的上嘴唇，由一端的嘴角到另一端。等寶寶張大嘴巴時，抱寶寶含上乳房。此時寶寶下巴緊貼著乳房，上下嘴唇外翻，下唇比上唇覆蓋較多的乳暈。

二 增加哺乳次數，觀察及熟悉寶寶想吸奶的暗示，勿等到寶寶很餓，大哭才餵奶。寶寶一有想吃奶的表現，就餵奶。寶寶吸吮力道不會過猛，當您要引導孩子正確含乳時。寶寶會更配合您。

三 乳房腫脹厲害時，乳暈組織腫脹、皮膚繃緊，比較沒有延展性，容易增加寶寶含乳的困難度。這時餵奶前擠出一些奶水，待乳暈變軟後，再讓寶寶含住乳房，有助寶寶正確的含乳。

四 停止使用人工奶瓶、奶嘴，吸吮奶瓶奶嘴的方式與吸吮乳房是不同的，新生寶寶學習吸吮乳房技巧還未成熟，人工奶瓶、奶嘴的介入會影響寶寶吸吮乳房的興趣及含乳正確性。

乳頭因為親餵破皮仍然是可以餵母奶的，而破皮的解決方法如下：

一 暫時停餵一、二餐，以手擠乳或吸乳器將乳汁吸出，再用滴管或杯餵來餵食寶寶。

二 可以試著由比較不痛那一側開始餵奶，也可以更換餵奶的姿勢，讓寶寶含乳房的部位不一樣，比較不會痛。

三 餵完奶後，可將奶水塗抹在受傷乳頭上，即具消毒及癒合的功用。

四 餵奶後掀開胸罩，讓乳頭維持通風，即是在兩餐餵奶中可儘量讓乳頭暴露於空氣中。

五 乳房清洗一天不要超過兩次，避免用香皂或毛巾用力摩擦。

六 避免在乳頭及乳暈處塗抹含藥的乳液或是軟膏。

七 不要在嬰兒還在吸乳時，就把他抱開，讓嬰兒自己鬆開乳房。如果母親必須終止餵食，請將手指輕輕伸入嬰兒口中，讓他自己鬆開。

八 在處理乳房破皮問題時，應保持雙手乾淨衛生，以免將細菌帶到傷口，造成感染。

九預防重於治療。改善寶寶吸含乳暈的姿勢，以正確的姿勢含好。

「草莓奶」是因為乳頭或乳暈裂傷、滲血，擠出了混有血液的母乳。

乳汁帶血的原因可能是吸乳器吸力開太強導致，因為力道太大、或不熟悉吸乳器用法。一開始就把吸乳器吸力開到最大，或連續擠奶一、二個小時。乳房被持續強力擠壓而受傷，還有一部分是由於乳腺炎所造成。提醒媽咪，如果連續兩週斷斷續續出現血奶，表示乳房可能有其他問題，建議可至乳房外科就診。混了血的母乳是可以讓寶寶喝的。不過建議當餐喝掉，不要再冷藏或冷凍！

來源：嬰兒乳糖不耐症

嬰兒乳糖不耐症

乳品是嬰幼兒主要的營養來源，寶寶在嬰幼兒時期也常有拉肚子、腹脹、哭鬧不安。體重增加緩慢等症狀，不少爸媽為了寶寶穿梭在各大藥局。詢問尋找適合的奶粉或益生菌，也常常為了這些症狀就醫尋求醫師的建議。在診間常常會被問到一個問題，「我的寶寶一天大便十幾次，一直哭鬧，是不是乳糖不耐症」

乳糖是甚麼，要如何消化

乳糖是一種由葡萄糖和半乳糖組成的雙糖，是哺乳動物乳主要的碳水化合物。乳糖的吸收需要小腸刷狀緣中的乳糖酶來裂解連接兩個單糖的之間的鍵結。任何原因造成乳糖酶缺乏就會有乳糖不耐症

為什麼會產生乳糖不耐症，會有甚麼症狀

無法消化掉的乳糖會進入大腸，大腸中的細菌分解乳糖會產生額外的液體和氣體，這種額外的液體和氣體會刺激腸道而導致乳糖不耐受症狀，包含腹瀉、腹痛和脹氣。

乳糖不耐症有哪些分類

乳糖不耐主要可以分為四種類型

一發育性乳糖酶缺乏

在早產兒中，小腸在出生後短時間內無法產生足夠的乳糖酶來代謝乳糖。會隨著嬰兒年齡的增長而改善。

二先天性的乳糖酶缺乏

是很罕見的遺傳疾病，小腸從出生開始就很少或根本無法產生乳糖酶。

三 非持續性分泌乳糖酶

嬰兒期後小腸產生的乳糖酶隨著年齡的增長而降低。乳糖不耐受的症狀可能到童年後期、青少年時期或成年才會出現。也稱為原發性乳糖酶缺乏，影響將近七十的全球人口。

四 續發性乳糖酶缺乏

腸胃道感染、或其他損害小腸的病症（例如克隆氏症或乳糜瀉等等）可能會導致其產生的乳糖酶減少，進而產生乳糖不耐受的症狀。

寶寶哭鬧不安又拉肚子，還有甚麼可能原因

在嬰幼兒如果有腹瀉腹痛的情形，除了乳糖不耐症以外。更需要去排除牛奶過敏的原因，牛奶過敏是由於免疫系統對牛奶或奶製品中的蛋白質過度反應而引起。除了腸道的表現以外，隨著免疫系統攻擊的部位不同就會產生不同的症狀。如紅疹，鼻炎或氣喘等症狀。牛奶過敏最常出現在出生後第一年，而乳糖不耐症其實通常出現的時間較晚，很少在兩歲以內發生。

如果確定是乳糖不耐症，要怎麼處置

如果小孩確定是乳糖不耐症，治療上最重要的就是避免攝取過多的乳糖。可以考慮使用無乳糖或低乳糖奶，視年紀可以考慮使用其他乳糖含量較低的飲品。如優酪乳，優格或燕麥奶等等。但乳糖不耐症在嬰幼兒發生的機會較低，如果寶寶臨床上有哭鬧不安。腹脹腹痛或持續稀水便情形，不要貿然隨意更換奶品。建議尋求小兒科醫師的幫忙，做出最正確的診斷及治療。

來源：嬰兒副食品添加

嬰兒副食品添加

嬰兒六個月大左右，神經及腸胃道的發展開始適合嘗試他種食物及餵食方式。純母乳哺育到六個月後必需添加副食品，比四個月後添加副食品的寶寶。其消化道感染較少；寶寶生長發育不受影響；母親產後體重恢復較快、自然避孕較久（即月經較慢來）；滿六個月後再添加副食品，對寶寶在傳染病的抵抗力和媽媽本身的恢復上都比較好。也未有證據顯示它比提早添加有什麼壞處。

何時開始給寶寶添加副食品建議：寶寶出生後四個月矯正年齡內不宜添加副食品，副食品於純母乳哺育滿六個月後即需添加。其中若有以下狀況，可經醫師專業評估後。提早在滿四個月後開始添加：

一奶水量明顯降低、純母乳哺餵到六個月有困難、寶寶顯得吃不飽。

二 寶寶出現厭奶但沒生病或其他原因。

三 寶寶有主動要求其他食物的表現看大人吃其他食物時很有興趣，伸手來抓、抓了放嘴巴。

四 寶寶的神經發展已準備好了，如：頸部挺了。可以扶持維持坐姿且咀嚼時頭不會晃動，以湯匙餵食食物時。舌頭不會一直將食物頂出。

添加副食品，是指添加母乳以外的食物來搭配母乳，而不是指斷奶、停止餵母乳或是用配方奶取代母乳。

添加副食品的訣竅：

一 每次只添加一種新食物，由少量（一到二湯匙）開始。逐漸增加，觀察三到五天。如無長紅疹、腹瀉、嘔吐等症狀，則可繼續餵食。若出現以上的反應，則應暫停該食物一到二個月後再嘗試，或向醫師諮詢。

二 添加副食品應從優先給予較不易引起過敏的嬰兒米精或嬰兒米粉開始，再依序添加嬰兒麥精或嬰兒麥粉、蔬菜類、水果類、肉類，建議由口味淡的食物開始。

三 使用過的食物可重複使用，若寶寶可以接受穀類，添加蔬菜時，可將穀類和蔬菜混合食用。

四 請選擇強化鐵質的嬰兒專用米精而非市售米麴，米精應以水或奶調成糊狀餵食。

五 開始餵食糊狀食物（如米糊、果泥等）時，應以湯匙餵食，避免將副食品加入奶瓶內與奶混和，以奶瓶餵食。

六 選在寶寶較餓的時候餵食（例如吃奶前一小時）較易成功，下一餐何時吃奶可視副食品吃了多少而作彈性調整。

七 餵食時應抱起寶寶，面對面餵食；寶寶會坐了以後，則應讓他坐穩以確保安全，勿追逐餵食。

八 若寶寶拒絕張口、將頭轉開或哭鬧起來時，勿強迫餵食；可暫停一到二星期後再試。

九 若寶寶僅露出皺眉和嫌惡的表情，並未明顯推拒時。可能只是不習慣新食物，應多嘗試幾次。讓他習慣，勿輕易放棄。

十 餵食時的氣氛應保持輕鬆愉快，如果吃飽了就應該停止，不要強迫寶寶將準備的食物全部吃完。

添加副食品要注意

一 稀飯是很好的半固體食物，但僅用大骨湯煮的稀飯，營養和熱量均不足，必須添加其他食物（如蔬菜、根莖類、

蛋黃、肉類等)在內。

二 製作副食品時應注意衛生，毋須添加人工調味品如鹽、糖，口味儘量清淡為主。

三 市售罐裝嬰兒食品應避免選用添加有澱粉等賦形劑的產品，以免攝取不必要的熱量。購買時應注意有效期限及適用年齡，一旦打開後就必需冷藏，且儘速食用完畢。

四 寶寶的大便中若出現未消化的食物，如豆子或玉米的皮、蔬菜的纖維等，都是正常的，不必因此停止餵食。

五 奶類可提供豐富的鈣質及蛋白質，但一般鮮奶含鐵質不足，且容易受到污染或引起過敏，因此建議一歲以後才可飲用全脂牛奶或乳製品。

六 副食品應均衡攝取，避免偏食導致某些營養素缺乏或不足。

七 未添加副食品前，除非天氣很熱、流很多汗，一般不需要額外再給予水分，以免影響奶量攝取。

八 寶寶吃副食品可以訓練寶寶不同的攝食方式及咀嚼吞嚥能力，所以正確的方式應該是調成糊狀，以湯匙一口一口慢慢餵寶寶吃，讓寶寶適應餐具進食。

寶寶副食品添加應避免提供以下食物：

十一歲以下的寶寶不可餵食蜂蜜，因為蜂蜜中易有肉毒桿菌孢子。一歲以下寶寶因免疫系統及腸道菌叢尚未健全，應避免食用蜂蜜。如果造成肉毒桿菌毒素中毒恐引發呼吸衰竭；另帶皮蔬果如胡蘿蔔可能沾染泥土，應澈底清洗及去皮。且澈底加熱，再提供嬰兒食用。減少肉毒桿菌中毒的風險。

二 避免給予硬且圓的食物，易導致寶寶噎住，如堅果、葡萄、果凍或糖果。

三 不提供八寶粉散、珍珠粉、退胎水、紅嬰水與偏方給寶寶食用。

來源：嬰兒有口水疹，該怎麼辦

嬰兒有口水疹，該怎麼辦

嬰兒四個月後，唾液腺逐漸發育成熟。七到九個月長牙時期，刺激口分泌增加。因寶寶吞嚥動作還不成熟，又喜歡把手或物品放在嘴裡又啃又舔的來獲得滿足。就容易出現口水流不停的狀況。當過多口水長時間停留在嘴唇邊緣或臉頰上，皮膚不斷接觸唾液而過於潮濕。再加上口水中消化酵素的刺激，導致發炎、起疹子。就是俗稱的口水疹，也是濕疹問題的一種。口水疹主要好發於兩頰、下巴、脖子，甚至胸口、手等唾液容易接觸到的部位，常見的症狀有皮膚泛紅、紅色細微小疹子、微粗不平滑的觸

感、甚至有水泡、脫皮…等。

當寶寶出現口水疹問題時，該如何處理？

一、症狀輕微：

若出現輕微紅疹，可視寶寶流口水的情況。拿乾毛巾輕輕按壓吸乾寶寶的口水即可，注意不可大力擦拭。也避免頻繁地擦，以免反讓寶寶嬌嫩的皮膚受損。視需要使用嬰兒圍兜，並隨時更換濕衣服或圍兜。也可在患處塗抹少量的嬰兒防護霜或凡士林，阻隔口水持續刺激皮膚；若紅疹問題無持續擴散。則無需就醫。

二、症狀嚴重：

若寶寶口水疹問題持續惡化，則建議及早就醫。一般而言，用藥三到五天即可明顯改善；若用藥超過一週仍未見效。建議立即回診，請醫師檢視病況。或進一步診斷是否有其他細菌感染問題。

針對口水疹最有效的措施就是保持寶寶的皮膚清潔和乾燥，並注意口腔和周圍環境的衛生。當口水流下來時，輕柔按壓吸乾。減少摩擦或刺激皮膚，並適時的塗抹乳液；在洗澡的時候。可使用溫和、不刺激的沐浴用品；隨時更換寶寶的圍兜、衣物、床單等物品。

口水疹的範圍一般是局部的，長時間未改善可能範圍會逐漸擴大。當症狀持續一週沒改善，且越來越紅、範圍越來越大時，應就醫尋求專業兒科醫師的協助，評估是否需要使用藥物治療。大部分寶貝在二歲之前，隨著口腔發展，逐漸有效地控制吞嚥動作，流口水的情況會漸漸趨緩。

台灣傳統習俗中，嬰兒在四個月大時。會有所謂「收涎」儀式，是用長繩串起一串餅乾。掛在寶寶脖子上，請親朋好友們依序剝下餅。在寶寶嘴角或下巴抹一下，意義在於幫寶寶停止流口水。不過，寶寶並不會因為「收涎」的儀式就不流口水。

來源：嬰兒餵食需添加益生菌嗎？

嬰兒餵食需添加益生菌嗎？

希望家裡的寶寶能健健康康長大，是天下所有父母親的期盼。所以家中有新生命誕生，從新生兒寶寶出生後的哺餵。就是爸爸媽媽重大決定的開始。台灣因為推動母嬰親善醫院與推廣母乳哺育多年，大部分的父母親都知道新生兒出生後餵母乳最好。即使不餵母乳餵配方奶，也會精挑細選想給寶寶最好的營養來源。讓他她們能健康發育與成長。在兒科門診包括預防注射與健康檢查門診看診多年，我發現有很多父母親還是會擔心自己寶寶的生長發育會不會不如人？也有不少父母親覺得寶寶容易腹脹、嘔吐或腹瀉，擔心寶寶腸道功能是不是不好？也有父母因為害怕寶寶會有過敏，來詢問可不可以添加什麼營

養素以增強免疫力？這些疑問最後都會討論到：嬰兒餵食需不需要添加益生菌呢？今天就經由這篇文章，來和大家談談這個問題。

事實上，新生兒一出生之後。腸道裡就存在著許多的益生菌，包括比菲德氏菌（或稱作雙歧桿菌。）和乳酸菌（）等，這些益生菌在嬰幼兒腸道裡形成益生菌叢。可以促進腸道健康，幫助嬰幼兒保持良好的腸胃消化吸收功能。也能維持腸道黏膜保護屏障而進一步提升免疫保護力。如果新生兒出生就開始餵食母乳，腸道裡的益生菌叢會更加活躍繁殖，成為寶寶腸道健康的最佳「守護神」！

為什麼餵母乳的嬰幼兒腸道裡的益生菌會占優勢，真正的機轉雖然不是百分百清楚。但是母乳的成分中含有許多母乳寡糖，簡稱。乳白蛋白（-），及乳鐵蛋白等。都是促進益生菌繁殖生長的益生質（或稱益生元，）。這些重要物質，或許正是母乳提供給寶寶腸內好菌活躍繁盛的重要關鍵！所以說，餵母乳的寶寶不需要額外補充餵食益生菌。

因為配方奶是由牛奶、羊奶或大豆等調配出來的「母乳代用品」，所以當然無法像母乳一樣含有各種益生質，讓嬰幼兒腸道益生菌叢穩定存在。研究顯示純配方奶哺餵的嬰兒與母乳哺餵的嬰兒比起來，糞便裡有很多非益生菌的大腸桿菌、困難梭狀芽孢桿菌、和脆弱類桿菌（）。相較於哺餵母乳的嬰幼兒，餵配方奶的寶寶腸道內益生菌數量普遍少了許多。所以哺餵配方奶的嬰幼兒，就比較需要考慮給予益生菌補充。

現在有一些配方奶調整配方，開始加入益生菌，希望藉此增加喝配方奶的寶寶腸道的益菌量。但是這種類型的配方奶標榜需用四十的溫水沖泡，不建議用高於七十水溫來泡奶，這和世界衛生組織與台灣兒科醫學會所建議的泡奶安全溫度有所牴觸。使用低於七十水溫泡奶，沒有辦法殺死奶粉中可能存在的壞菌（如阪崎腸桿菌），嬰幼兒喝了這樣子泡出來的配方奶，恐怕有嚴重感染的疑慮。

總結來說，哺餵母乳的嬰幼兒不需要費心添加益生菌。至於哺餵配方奶的嬰兒，如果要添加益生菌。建議父母親還是要諮詢專業新生兒醫師或兒科醫師，在充分討論了解寶寶的狀況後。再依照個別需求來添加合適的益生菌哦！

來源：嬰兒黃金九色卡為何那麼重要？可以看出哪些問題？

嬰兒黃金九色卡為何那麼重要？可以看出哪些問題？

當爸媽翻閱《兒童健康手冊》時，可能會注意到有一頁列出了「九種不同顏色的寶寶大便」。先別急著翻過去！這張「嬰兒黃金九色卡」，其實是觀察寶寶肝膽健康的重要工具，能幫助爸媽及早發現異常徵兆，爭取最佳治療時機。

並非只有拉肚子、便秘才是異常排便的警訊，事實上，大便顏色同樣藏著健康密碼。尤其剛出生的新生兒，爸媽可藉由每天幫其換尿布時，順便「觀察大便」，為寶寶的健康好好把關。

解密黃金九色卡：膽道閉鎖的重要線索

《兒童健康手冊》裡的「嬰兒黃金九色卡」，即為嬰兒大便辨識卡。直接列出九種新生兒常見的糞便顏色，爸媽只需要用肉眼觀察、比對即可。簡單又實用。

這張色卡最大用意，是協助家長及早發現新生兒是否有肝膽疾病。像是膽道閉鎖，如果能在寶寶出生後立刻察覺、即時介入治療。能降低孩子日後引發肝臟疾病的風險。

膽道閉鎖是新生兒常見且嚴重的肝膽疾病之一。正常情況下，膽道負責將膽汁從肝臟運送到腸道。幫助消化與代謝廢物；若膽道阻塞，膽汁就會滯留在肝臟。使糞便顏色呈現灰白色或淡黃色，因此糞便顏色是觀察新生兒膽道閉鎖的重要指標。

別緊張，黃疸不等於罹患膽道閉鎖！

膽道閉鎖寶寶除了糞便顏色異常，還可能出現膚色與眼白發黃，也就是「黃疸」現象。不過爸媽也別太慌張，並非寶寶有黃疸現象就是罹患膽道閉鎖，因為更常見的是新生兒生理性黃疸，而母乳性黃疸則是導致黃疸持續較久的常見原因之一：

生理性黃疸

有些家長會發現寶寶在出生後二到三天左右，皮膚跟眼睛出現逐漸泛黃的現象。擔心是否為膽道閉鎖所引起，但其實剛出生的寶寶。可能因為肝臟功能尚未發育完全，出現生理性黃疸所致。通常在出生後第一到三天出現、第四到五天達高峰、第七到十天逐漸下降，約二週內便會消退。

母乳性黃疸

除了生理性黃疸外，也有所謂的「母乳性黃疸」。這個狀況會發生在喝母乳的寶寶身上，他們的黃疸期可能比較長，但黃疸數值通常不高。

膽道閉鎖寶寶常被誤以為是母乳性黃疸而延誤治療。但不同的是，母乳性黃疸的寶寶。其糞便顏色通常不太會異常，且膽道閉鎖寶寶的黃疸現象不會自行改善。便便顏色也持續偏淺，此時就應立即就醫。

如何使用黃金九色卡：淡黃、灰白要注意

所以寶寶出生後，爸媽到底該怎麼做呢？出生後二週內是

關鍵的觀察期；如果是喝母乳的寶寶，則將觀察期拉長至一個月。爸爸媽媽可依循下列二步驟來檢視寶寶的身體狀況：

一看膚色與眼白：

顏色是否逐漸恢復正常。

二比對黃金九色卡：

在日光或白色燈光下，將寶寶大便與色卡對照。

由於膽汁為黃色或綠色，如果肝臟分泌的膽汁能順利排出，和大便混合後基本上會呈現出黃色或綠色的大便（請參考兒童健康手冊

「嬰兒黃金九色卡」編號七至九號），此為正常狀況。如果膽汁滯留在肝臟，寶寶糞便中沒有膽汁混合，則會呈現淡黃色或灰白色（請參考兒童健康手冊「嬰兒黃金九色卡」編號一至六號），此為異常狀況。

有異常速就醫，把握黃金治療期

假如寶寶出生後二週至一個月內，持續有黃疸現象。且便便顏色不太正常，呈現灰白或淡黃。就應儘快就醫檢查。醫師會檢測血液中「直接膽紅素」占「總膽紅素」比例，若超過四十。代表膽汁可能滯留，則需進一步安排影像檢查。確認是否為膽道閉鎖。

膽道閉鎖最佳治療時間在出生後六十天內，由於膽道閉鎖是導致兒童換肝的主因，若延誤治療，約五到六成最終會因肝硬化必須接受肝臟移植。因此愈早發現、愈早手術，寶寶恢復健康的機率就越高，甚至能延後或避免肝臟移植，而目前手術也是唯一的治療方式。

嬰兒黃金九色卡雖然只是一張小小的色卡，卻是爸媽守護寶寶肝膽健康的重要工具。每天換尿布時多觀察、比對，能幫你在第一時間發現異常，為寶寶爭取最寶貴的治療時機。

來源：嬰幼、兒童期每日膳食營養素

嬰幼、兒童期每日膳食營養素

嬰幼兒每日膳食營養素：

蛋白質

依據第八版國人膳食營養素參考攝取量建議，動物性蛋白在總蛋白質中的比例，一歲以下的嬰兒以佔二十三以上為宜。

礦物質

碘：人體所需的碘大部分來自飲食，建議選擇加碘鹽取代一般鹽（但嬰兒副食品不建議添加鹽等調味料），並適量攝取含碘高的食物，例如海苔、海魚等食物。

鐵：幼兒容易缺乏鐵質，應養成均衡飲食習慣，並多吃深色蔬菜、豆類、每天一個蛋、適當攝取含鐵質高的紅肉；富含鐵質的副食品可在四到六個月時開始添加。

鈣：含鈣質豐富的食物，除了鮮乳和乳製品之外，可考慮高鈣豆製品，如傳統豆腐、豆干、凍豆腐及豆干絲等；二歲以下兒童不宜飲用低脂或脫脂乳。

鎂：因為鎂為葉綠素組成份之一，因此鎂多存在於富含葉綠素的蔬菜中，如：菠菜、莧菜及甘藍菜。而胚芽、全穀類之麩皮、核果類、種子類及香蕉亦為鎂之豐富飲食來源。

鋅：全穀類、乳品、蛋、魚貝類、瘦肉、堅果均含豐富的鋅。

嬰幼兒膳食營養素參考攝取量

*本表摘錄自依據第八版國人膳食營養素參考攝取量建議

*表中未標明足夠攝取量值者，即為建議攝取量值。

*年齡係以足歲計算

小提示：

一建議攝取量值：是指滿足特定年齡層及性別的健康人群中九十七到九十八的人一日所需要的攝取量。

二足夠攝取量：當研究數據不足，無法訂出平均需要量。因而無法求出建議攝取量時，則以能滿足健康人群中每一個人為原則。以實驗或觀察流行病學之數據估算出的攝取量稱之為足夠攝取量。

維生素

維生素：動物肝臟、蛋黃為富含維生素之食物；深綠色與深黃紅色蔬果富含胡蘿蔔素，可轉化成維生素。

維生素：嬰兒缺乏維生素易導致佝僂症。人體需要的維生素，可來自食物或皮膚經日照自行合成。台灣雖地處亞熱帶，但國人因氣溫、空氣汙染等因素日曬時間有限，且母乳中的維生素含量較低，使食物成為重要的維生素來源。魚類、添加維生素的乳品為國內重要的維生素食物來源，考量部分大型魚類（如：鯊、旗、鮪、油魚等）有蓄積較高濃度甲基汞之情形，對嬰幼兒神經發育可能造成危害。建議均衡攝食各式魚類，減量攝取大型魚類。除在飲食中納入維生素含量豐富的食物，亦可避開紫外線強烈之時段帶孩子到戶外活動曬太陽。若有需要宜諮詢小兒科

醫師評估補充的需要性。

維生素：維生素：深綠色蔬菜、蛋黃、堅果、種子、穀類胚芽、植物油等為含量較高的食物。

維生素：新鮮水果（如芭樂、柳丁、橘子、奇異果等）含量豐富。

維生素一：維生素一、六與菸鹼素：全穀類、大豆、乳品、堅果、瘦肉、肝臟等含量豐富。

維生素二：大部分的植物及動物組織皆含有維生素二，其中牛奶、乳製品及強化穀類含量豐富。肉類、動物之內臟及綠色蔬菜亦是維生素二之良好來源。

維生素十二：主要來源為動物性食品，例如：蛋、乳品、肉類含量豐富；素食者若選擇蛋奶素則較不須擔憂缺乏問題。

葉酸：綠色蔬菜、肝臟、豆類及水果（柑橘類）都是葉酸含量較豐富的食物來源。

嬰幼兒膳食營養素參考攝取量

*本表摘錄自依據第八版國人膳食營養素參考攝取量建議

*表中未標明足夠攝取量值者，即為建議攝取量值。

*年齡係以足歲計算。

來源：嬰幼兒意外事故防制-汽車安全座椅的重要

嬰幼兒意外事故防制-汽車安全座椅的重要

帶寶寶外出怎樣做最安全答案是正確使用汽車安全座椅

交通部於一百零九年九月一日實施新修正的「小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法」，小型車附載幼童行駛於道路時，應將幼童依下列規定方式安置於安全椅

一年齡在二歲以下者，應安置於車輛後座之攜帶式嬰兒床或後向幼童用座椅，予以束縛或定位。

二年齡逾二歲至四歲以下且體重在十八公斤以下者，應坐於車輛後座之幼童用座椅，予以束縛或定位，並優先選用後向幼童用座椅為宜。

三每一安全椅以乘坐一位幼童為限，並應依安全椅產品檢附之說明書所示方式，確實將安全椅與汽車座椅連接穩固，並符合安全椅產品所允許之身高或體重限制。

四若孩子年齡在四至十二歲或體重逾十八公斤至三十六

公斤以下，交通部提醒應坐於車輛後座，並依汽車駕駛人及乘客繫安全帶實施及宣導辦法規定使用安全帶。

行車時使用安全座椅可降低兒童頸部七十三衝擊力、減少七十一死亡率，後向乘坐的安全性提高七十五。

「後、安、固、指」四口訣兼顧舒適與安全

市面上安全座椅的形式多樣，該如何確定正確使用安全座椅呢？國民健康署提供您以下四個簡單好記的小口訣，讓您第一次使用就上手！

「後」：只安裝於「後」座，並選用「後」向式安全座椅

「安」：請依循各廠牌說明書「安」裝安全座椅

「固」：安裝完成後必須確認安全座椅穩「固」不搖晃

「指」：確認寶寶繫緊安全帶並保留一「指」寬的空隙

提醒您，不單獨將寶寶留在車內

因為緊閉門窗的車子，在大熱天車內溫度就可能高達五十四到六十度。對熱度比較敏感的嬰幼兒，即使只是短暫時間留置其中。也會受到嚴重熱傷害。並且依兒童及少年福利與權益保障法第五十一條規定，六歲以下或有需要特別看護的兒童。不可讓他獨處，違反者。主管機關命其接受四小時以上、五十小時以下之親職教育輔導，同時道路交通安全管理條例第三十一條也有規定汽車駕駛人將六歲以下或需要特別看護兒童單獨留置車內者。處新台幣三千元罰鍰，並施以四小時交通安全講習。

來源：嬰幼兒的成長發展里程碑月齡別指南

嬰幼兒的成長發展里程碑月齡別指南

寶寶剛出生是如此的柔軟，無自主能力需要爸爸媽媽的照顧。而經過兩三年的時間，就可以自己跑步、講話、表達自己。這一段奧秘的旅途，我們可以看到每一階段孩子的成長發展。但哪些動作是寶寶在此年紀該做到的里程碑呢

我們一一介紹孩子平均的月齡發展

零到三個月

此時的寶寶又被稱為還在第四孕期，吃睡作息未固定，也是父母最辛苦的時候。他們脖子由軟到了三個月慢慢變硬趴在爸媽身上可以抬頭約六十度，而聽覺是有反應的，眼神也可以追視，逗他會笑。睡眠作息，預期可分辨晝夜，白天小睡不超過三小時，夜晚大睡四到六小時。

四到六個月

開始會翻身了，在扶著的狀態下可坐著坐在爸媽大腿上靠著，此時也有抓東西就口的能力，所以副食品可以嘗試介入。會發出咿咿呀呀的聲音表達喜好

六到九個月

此時的孩子，粗動作的進步幅度大。從翻身，坐得穩。到匍匐爬行或是高跪爬，也會抓握玩具敲打。爸爸媽媽開始要準備地墊、圍欄和玩具，居家安全也非常的重要，因為寶寶翻身墜落，或是頭撞到桌椅都是此時常見的意外事件。

九到十二個月

開始會爬行，扶著站立，甚至放手站立；而細動作可以雙手並用玩玩具，可以用手指抓取細小的東西而非手掌抓取。也開始會有物體恆存的概念，所以認人、認生、分離焦慮也大多在此時發生。

表達能力越來越好，會有手勢要求抱抱，也對自己的小名有反應。

這個時候的寶寶實在很可愛。

一到十五歲

一歲之後，脫離嬰兒期。除了主食從奶類轉為固體食物之外，開始會放手走。到一歲半左右是會走得穩並且能在平地小跑步。手的功能更加精細，比如能轉開蓋子，用拳頭抓筆亂畫。

最大的成長進步是說話，從咿咿呀呀的外星語開始有等聲音，也聽得懂簡單動作指令，比如拍手、拜拜、給我。到了一歲半應該可以說有意義的詞彙比如對著媽媽叫媽媽，而不只是只發出的音大約五個，比如爸爸、媽媽、捏捏奶、車車。

十五到二歲

走路很穩了，觀察重點為他的步態是否正常，如果仍會腳寬大於肩寬或是手需要張開才能保持平衡，那可能有張力過低的現象。

精細動作比如翻硬頁書，疊兩塊積木。

認知語言部份，能指認五官在哪裡，講有意義的詞彙大概十個以上。大部分都能溝通，跟他講甚麼他都能懂。

二到三歲

可以雙腳離地跳躍，牽著或扶著上下樓梯。功能性動作是可以獨自使用湯匙舀起食物放入嘴巴，我們能夠允許食物少量撒出，所以照顧者不要因為害怕髒亂而剝奪孩子

練習的機會。

社會發展部分，會有假扮的玩法。同時也能共感別人的情緒，比如別人在難過生氣的時候。會有關注的反應，如果沒有。可能要評估是否有自閉的可能。

要特別提出來的是情緒發展部分，二歲多的孩子。可能因為情緒表達開始變得複雜，但無法精確表達。往往會因為不如他意，而反應激烈的大聲吼叫、亂丟東西、甚至在地上打滾或咬人踢人

是因為幼兒急於展現自己的獨立能力，卻每天都發現自己能力不及所帶來的挫折與無奈。也是為什麼我們會說二歲多的孩子豬狗嫌，甚麼都”不要不要”。

此時照顧者盡量保持心情穩定，幫助孩子說出他們的想法，比如”你是因為拿不到那個東西在生氣嗎”更能讓孩子了解這些情緒，和如何表達自己。

三到四歲

粗動作我們可以看的是單手過肩丟球，大都能丟超過二公尺的距離，精細動作積木已經可以排成”田”字的立體形狀。

社會發展方面，可以和同儕一起玩，能遵守遊戲規則，漸漸能知道社會運作的方式比如出門前要穿鞋鞋、吃飯前要洗洗手

以上分類非兒童發展篩檢量表的分類

最後提醒大家，國健署從一百一十三年七月開始推動兒童發展篩檢。由透過訓練醫師來做理學檢查、行為觀察的標準化篩檢量表，希望能幫助爸媽理解孩子的發展里程碑及是否需要轉介做早療。都是政府補助的計畫無須另外付費，爸爸媽媽能把握機會。和透過訓練醫師一同了解孩子吧

來源：子宮頸癌防治-愛自己篇

子宮頸癌防治-愛自己篇

六分鐘可以做什麼

可以享受一杯手沖咖啡

放鬆自己可以做完深蹲運動健康自己

可以聽首喜歡的歌療癒自己

政府提供二十五歲至二十九歲婦女每三年一次、三十歲以上婦女每年一次子宮頸抹片檢查，建議二十五歲以上的婦女每三年至少檢查一次

六分鐘護一生

請定期做子宮頸抹片檢查

來源：孕前健康檢查

孕前健康檢查

準備懷孕的，要如何知道自己身體狀況已經準備好孕育下一代，可以透過孕前健康檢查改善生育品質，降低懷孕時的風險。

孕前健康檢查的目的

幫助計劃要懷孕的準爸爸準媽媽們，在懷孕前提早發現潛在的遺傳疾病，給予適當的治療、或是延後懷孕的計劃，確定將身體和心理都調適到最佳狀態後再懷孕。

孕前健康檢查的說明

檢查項目

一 女性：血液常規、尿液檢查、德國麻疹抗體篩檢、水痘抗體、梅毒篩檢（）、愛滋病篩檢、甲狀腺刺激素及紅斑性狼瘡。

二 男性：血液常規、尿液檢查、梅毒篩檢、愛滋病篩檢及精液檢查。

注意事項

透過孕前健康檢查，可幫助雙方於孕前了解本身之健康狀況。經檢查後發現異常，可於孕前尋求婦產科專科醫師進行相關產前遺傳諮詢。做進一步治療或準備。

缺乏德國麻疹或水痘抗體者，建議施打疫苗三個月後再準備懷孕，降低孕期遭受感染之機會。

梅毒血清呈陽性，需做梅毒螺旋體血球凝集試驗（）確診後，施打抗生素治療。

紅斑性狼瘡與甲狀

腺功能異常者，需尋求專科醫生的諮詢後，配合藥物控制，確認穩定後再考慮懷孕。

懷孕是每對夫妻所期待的事情，孕前健康檢查可以有效提早發現懷孕期間可能發生的疾病。提早預防，提早治療。也可降低懷孕期間突然發生的不適及衝擊，為了下一代的健康。請先從自己做起。目前遺傳疾病的檢查，建議有臨床症狀。或是家族史疾病，特別懷疑某一項遺傳疾病才做檢查。就不同的疾病作不同的分析，無法每一種疾病都去做。如果您有這方面的需求，請到有遺傳諮詢的門

診就診。

來源：孕婦B型肝炎篩檢

孕婦型肝炎篩檢

一型肝炎下稱肝病毒主要是經由血液或體液傳染，其途徑包括垂直感染及水平感染。垂直感染是經由帶原的母親在生產前後，將肝病毒傳染給新生兒，臺灣早期尚未使用疫苗前，有四十到五十的帶原者都是經此途徑傳染造成。

二新生兒感染肝約九十會成為慢性帶原者，其後引致肝硬化與肝癌之發生率亦大幅升高。為阻斷母嬰垂直傳染，現行除全面對新生兒實施肝疫苗接種。並針對媽媽為肝表面抗原陽性的新生兒，於出生二十四小時內儘速注射一劑肝免疫球蛋白及依時程完成三劑肝疫苗。可阻斷九十的母嬰垂直傳染。惟約有十的新生兒仍會被感染，新生兒應於滿一歲時檢測及肝表面抗體，以評估是否具抗體、需追加疫苗或進追蹤檢查等措施。

三針對陽性的孕婦，應至消化系專科門診檢測追蹤。如血中肝病毒量一百零六，建議可於懷孕滿二十七週後使用抗病毒藥物進行治療健保給付。可以再降低九十的新生兒感染肝的機率。

四健保署有推動「型肝炎帶原者及型肝炎感染者醫療給付改善方案」，以使慢性肝炎患者獲得積極治療之機會。因此肝表面抗原或抗原陽性的準媽媽，產後請依專科醫師的建議，定期進行相關追蹤檢查。

來源：孕婦乙型鏈球菌篩檢衛教單張

孕婦乙型鏈球菌篩檢衛教單張

乙型鏈球菌是什麼？

乙型鏈球菌存在於我們周遭的生活環境中，常出現於女性泌尿系統及生殖系統內，根據國內研究約十八到二十的孕婦產道帶有此細菌，新生兒可能會在生產過程中經由產道遭受感染。大部分孕婦不會感到不適，但新生兒若受到感染，可能導致肺炎、腦膜炎、敗血症等併發症，對新生兒健康是相當大的威脅。

乙型鏈球菌篩檢有補助嗎？

國民健康署自一百零一年四月十五日起全面補助孕婦乙型鏈球菌篩檢每例五百元的補助，懷孕婦女至有服務合約的院所受檢皆可獲得補助。乙型鏈球菌特約醫療院所名單，可上國民健康署孕產婦關懷網站的乙型鏈球菌專區查詢或至國民健康署官網。

乙型鏈球菌如何檢查？

醫師利用棉棒擦拭陰道外口、會陰處及肛門口進行採檢，準媽媽們不會感到疼痛不適。也不會影響胎兒健康，經過一週的培養過程即可知道結果。建議準媽媽於懷孕三十五至三十七週期間進行乙型鏈球菌的培養篩檢。

乙型鏈球菌篩檢結果陽性怎麼辦？

不需緊張，醫師會於產前採取相關治療措施。

如果孕婦經篩檢檢驗確知為乙型鏈球菌陽性時，為了預防新生兒乙型鏈球菌的感染，醫師會於待產時給予預防性的抗生素治療。

乙型鏈球菌有沒有疫苗？

目前並未有乙型鏈球菌的疫苗。

建議孕婦均需要接受乙型鏈球菌的篩檢，以確保孕產婦與新生兒的健康。

寶寶感染乙型鏈球菌會有什麼症狀？

並不是所有感染乙型鏈球菌的寶寶都會發病，受感染新生兒可能會有體溫過低、發燒、食慾減退、活動力不佳等狀況，較嚴重的會併發敗血症、肺炎、腦膜炎等問題。但乙型鏈球菌的感染也可能在出生數週或數月才出現延遲性感染，但是感染源則很難判斷是否為產婦。

剖腹產可以預防新生兒乙型鏈球菌感染嗎？

剖腹產不被用來預防新生兒的早發性乙型鏈球菌感染。

乙型鏈球菌是很普遍的細菌，雖然篩檢呈陽性反應可能會感染新生兒。但是只要經過待產時的抗生素治療，感染機率會大幅降低。產婦不需要因為感染帶原而刻意採取剖腹方式生產。

來源：孕婦乙型鏈球菌篩檢說明

孕婦乙型鏈球菌篩檢說明

乙型鏈球菌篩檢目的

乙型鏈球菌是人類的腸胃道及泌尿道常見的細菌；為周產期嚴重感染之主要致病菌。亦為導致新生兒細菌感染疾病中最常見之細菌。約有十八到二十孕婦產道帶有此一細菌。孕婦體內若帶有乙型鏈球菌而無進行篩檢和積極治療，則可能引起新生兒早發型乙型鏈球菌感染，可能進一步導致新生兒肺炎、腦膜炎、敗血症等重大併發症。經研究統計，新生兒感染乙型鏈球菌後導致神經系統後遺症者約十五；而新生兒感染死亡率約十至十三；早產兒感染死亡率高達二十。目前國際上預防新生兒早發型乙型鏈球菌感染症，主要採行之策略。以孕婦篩檢乙型鏈

球菌，及針對確知孕婦有乙型鏈球菌帶菌狀況時。於待產時使用預防性抗生素治療。

檢查方法與時程

依據實證及先進國家（如：美國、加拿大）經驗，建議針對孕婦在懷孕三十五至三十七週期間進行乙型鏈球菌的培養篩檢。其檢查方法，係由醫師在孕婦的陰道及肛門採樣後，再將檢體送至合格的檢驗單位進行培養。約於一週內即可知道孕婦有無乙型鏈球菌之帶菌。若孕婦於尚未接受乙型鏈球菌篩檢前，出現早期子宮收縮或胎膜早破現象而住院者。除接受常規治療外，亦應於住院時。依醫師專業意見考慮接受乙型鏈球菌篩檢或使用預防性抗生素治療。

檢查結果與預防

如果孕婦經篩檢檢驗確知為乙型鏈球菌陽性時，毋須擔心害怕；醫師會進一步評估及於待產時提供預防性之抗生素治療（可由健保給付），以降低新生兒感染。若孕婦曾有抗生素過敏經驗者，或懷孕期間有身體不適或疑問時，請告知並與醫師討論。國民健康署自一百零一年四月十五日起全面補助孕婦乙型鏈球菌篩檢每例五百元的補助，懷孕婦女至有服務合約的院所受檢皆可獲得補助。

來源：孕婦產檢項目-愛滋病毒篩檢

孕婦產檢項目-愛滋病毒篩檢

衛生福利部疾病管制署於九十四年起，於孕婦的產檢項目中增加愛滋病毒檢查。然如有感染風險情況時（如：有性病病史、從事性交易、使用成癮性藥物、多重性伴侶、孕婦的性伴侶是感染者或有風險行為等），可由婦產科醫師就臨床上判斷。增加檢驗次數。本項篩檢併同第一孕期產檢實施，以確保懷孕婦女及下一代的健康。為了寶寶的健康，建議每一位準媽媽接受篩檢：

一會透過母親懷孕胎盤、分娩過程和哺餵母乳等方式感染給寶寶。感染機率在十五到四十五之間。目前感染的愛滋寶寶，發現九成是因為媽媽在懷孕前不知道自己感染，因為沒有事前預防治療，造成寶寶感染。

二目前已有有效治療的藥物，可良好控制體內病毒量。感染者穩定接受治療，血液中的病毒量持續六個月以上達測不到。就不會透過性行為傳播，也大大降低母子垂直傳染的風險。

三依據聯合國愛滋病規劃署（）資料，透過預防性投藥、選擇適當生產方式和使用母乳替代品等預防措施，可將新生兒的感染機率由四十五大幅下降至二以下。經由第一線醫事人員持續追蹤管理懷孕個案，予以適當預防措施，以有效防範愛滋母子垂直感染之發生。如孕婦感染，政府提供相關服務如下：

一 免費醫療：

提供媽媽孕期愛滋治療藥物、產程中及產後提供寶寶預防性服藥。

二 照護措施：

免費提供母乳替代品，疑似感染的新生兒，於出生後六至十二小時即提供預防性治療，並提供專人關懷服藥及定期追蹤檢驗等服務。

四 並不會選擇特定對象，每一個婦女，甚至只有固定單一性伴侶的婦女，都有感染的危險而不自知。要求性伴侶使用保險套是女性的權利，請保護自己免於感染。另除了安全性行為外，使用暴露愛滋病毒前預防性投藥也可有效預防感染。透過使用藥物，使體內有足夠的藥物濃度來預防被感染。保護效果可達九十以上，目前疾病管制署持續推動公費計畫。提供對象包含愛滋感染者之配偶或伴侶及三十五歲含以下年輕族群，相關細節請參考疾病管制署全球資訊網傳染病與防疫專題傳染病介紹第三類法定傳染病人類免疫缺乏病毒愛滋病毒感染愛滋知識與預防篇暴露愛滋病毒「前」預防性投藥計畫服務。

五 藥癮者，切勿與他人共用針具、容器或是稀釋液，以免經由血液感染。

問：是什麼？

答：愛滋病毒；簡稱即是人類免疫缺乏病毒，俗稱愛滋病毒，人類感染後通常不會立刻發病，可能在感染後六個月甚至長達十年或更久才有症狀發生。這種病毒會使人類失去抵抗病原體的能力，甚至喪失生命。

問：是如何傳染？

答：

一 性行為傳染：未採防護措施的性行為。

二 血液感染：如輸血、共用針具、容器或是稀釋液。

三 母子垂直感染：懷孕、生產及哺乳。

問：如果有其他疑問或懷疑感染時，誰能幫助我？

答：

一 請撥打疾病管制署疫情通報及諮詢專線一千九百二十二，將有專人提供諮詢服務。

二 請上疾病管制署網站查詢。

來源：孕婦睡覺時會有手腳發麻現象怎麼辦？

孕婦睡覺時會有手腳發麻現象怎麼辦？

當末梢血液循環不良，加上脂肪軟組織增加。造成神經壓迫時，可能出現手腳發麻的情形。如果白天常用手部工作，也比較容易有這些現象。提醒均衡飲食不挑食，或者可以補充一些維生素群。平時要多活動活動手部，坐或是站都不宜太久。晚上也可以按摩手、腳，或泡溫水足浴。手腳麻的症狀在生產後會慢慢消失的。

來源：孕婦飲食一般飲食原則

孕婦飲食一般飲食原則

孕期所需的營養基本原則「均衡飲食」，每日份量分配建議如下：

奶類 --十五杯二百四十杯

豆魚蛋肉類 --六到七份一份約一兩

蔬菜 --三到四份以上一份約熟蔬菜半碗

水果 --三到四份

全穀雜糧類 --三到三十五碗

油脂與堅果種子類 --五份

一準備懷孕之女性，應將身體調整至健康狀態，並維持理想體重，以作為懷孕之準備。如對孕乳期飲食有疑問者，請洽詢醫師或營養師提供諮詢協助。

二體重：懷孕期間，孕婦體重應依懷孕前體重做適當調整。以增加十到十四公斤為宜，且須注意體重增加的速度。懷孕期間不適於減重。

三熱量：

一懷孕期的熱量攝取，建議，自懷孕第二期起，每日需增加三百大卡的熱量。但每個人每天的總熱量，需視孕婦的年齡、活動量、懷孕前的健康狀況及體重增加情形，而加以調整。

二哺乳婦熱量的需要建議，每日以增加五百大卡為宜。

四蛋白質：

一建議自懷孕第一期起，因胎兒開始發育，每日需額外增加十公克的蛋白質。蛋白質來源中一半以上來自高生物價（，）的蛋白質，如：低脂奶類製品、豆漿、豆腐、豆干等黃豆製品、魚、肉、蛋。

二哺乳期間每日母乳的分泌量在生產後二到三個月平均約達八百五十毫升，因乳汁含有十一的蛋白質。母乳提

供幼兒的蛋白質約十公克，所以建議哺乳婦每日應增加十五公克蛋白質的攝取。蛋白質來源中一半以上應來自高生物價蛋白質。

五懷孕哺乳期許多維生素及礦物質的需求量增加，孕產婦應均衡攝取六大類食物。多攝取深色蔬菜、全穀雜糧，且應主要來自天然食物。而非選擇單一營養素或礦物質補充劑，或可在醫師處方指導下補充孕婦專用的營養補充品。以補充孕期足夠的礦物質和維生素。

六 礦物質

一碘：婦女懷孕時碘嚴重不足時有可能會影響胎兒腦部發育，造成新生兒生長遲緩和神經發育不全。甚至增加嬰兒死亡率，孕婦碘建議二百二十五微克天。哺乳婦建議二百五十微克天，平常烹飪時選用加碘鹽；另外。適量攝取含碘量較豐富的天然食物，如：海帶、海藻等。

二鐵：懷孕時鐵質的需要量增加，孕期第一期及第二期建議攝取量十五毫克天。第三期與哺乳婦建議則增加攝取至四十五毫克天，鐵的補充除了供應孕婦本身及胎兒所需外。並大量貯存在胎兒體內，以供嬰兒出生後六個月內使用。孕期鐵營養不足可能對胎兒的腦部與精神症狀造成不良影響，鐵質豐富的食物，如：紅肉、深綠色蔬菜、豆類等。

三鈣：懷孕／哺乳期應攝取充足的鈣質，孕婦及哺乳婦鈣建議攝取一千毫克天，以滿足胎兒／嬰兒的生長和母體的需要。鈣質豐富的食物，如：低脂牛乳、乳製品、豆腐、深綠色蔬菜等。

四鈉：懷孕期間若有高血壓或水腫等症狀，則應限制鈉的攝取量。

五鎂：懷孕期間鎂攝取增加，可減少子癲前症與胎兒子宮內發育不全的發生率。孕婦鎂建議三百五十五毫克天，哺乳婦建議三百二十毫克天。富含於葉綠素的蔬菜中，如菠菜、莧菜及甘藍菜等。其他如胚芽、全穀類之麩皮、堅果種子類及香蕉等。

六鋅：孕婦的鋅營養狀態不足，可能會造成胎兒在子宮生長遲緩與神經管缺陷。孕婦與哺乳婦鋅建議攝取量為十五毫克天，動物性來源如肝臟、瘦肉、牡蠣，甲殼類的鋅含量高。

七其他：礦物質攝取量應達到國人膳食營養素參考攝取量，並且不超過其上限攝取量。

七維生素：懷孕及哺乳期間大部分維生素的需要量均增加。

一維生素一、二、六和菸鹼素的需要量是伴隨熱量及蛋白質的增加而升高。維生素一以小麥胚芽含量最豐富，此外，堅果、瘦豬肉、肝臟、大豆及其製品、奶粉亦是主要來

源；維生素二存在於大部分動植物組織，其中牛奶、乳製品及強化穀類含量最為豐富；維生素六於各種肉類、全穀類。富含菸鹼素的食物包含動物肝臟、牛肉、豬肉、雞肉、魚貝類、蛋、奶類、乳酪、糙米、胚芽米、酵母菌、香菇、紫菜等。

二維生素十二：母親維生素十二於缺乏或是不適當的狀態下，可能會導致胎兒神經管缺陷。維生素十二豐富的食物主要為動物性食物來源，其中肝臟、肉類等含量最為豐富。另外，對於全素者提醒。因維生素十二豐富的食物主要為動物性來源食物，全素者很不容易從飲食中攝取夠多的量。應特別注意維生素十二的補充，可多食用紫菜、紅毛苔、海帶等食物。並與醫師討論是否食用補充劑。

三其他：維生素攝取量應達到國人膳食營養素參考攝取量，並且不超過其上限攝取量。

八葉酸的重要性：

一葉酸跟胎兒發育有關，從受精卵、胚胎到形成胎兒都需補充。若缺乏可能導致胎兒腦及脊髓等先天性神經管缺陷、自發性流產、早產、出生體重過輕，孕婦疲倦、情緒低落等。建議育齡婦女每日攝取四百微克葉酸，準備懷孕婦女則在受孕前一個月至懷孕期間。每日攝取六百微克的葉酸，哺乳婦建議每日攝取五百微克的葉酸。以供自身與胎兒所需。

二葉酸廣泛存在於許多食物中，如：綠色蔬菜、肝臟、豆類及水果如柑橘類，都是豐富的來源，葉酸攝取建議應優先由天然食物中多樣攝取。如果在日常飲食中攝取不足，建議在醫師處方指導下，補充葉酸錠劑。

九食物的選擇要均衡，孕、乳婦應減少或避免攝取下列食物：

一菸、酒、咖啡與濃茶。建議孕媽咪在懷孕的最初三個月內要減少喝咖啡或茶的量，一般建議孕婦一天最多不能攝取超過二百毫克的咖啡因。但每個人體質不同，能否喝咖啡。以及懷孕期間的咖啡飲用量多少？還是詢問醫師、遵循醫囑比較保險。

二脂肪含量多的食物，如：肥肉、油炸食物等。

三煙燻加工食物，如：醃肉、鹹蛋、鹹魚、火腿、豆腐乳等。

四空熱量食物，如：糖果、可樂、汽水等。

十懷孕初期若有噁心、嘔吐等現象，應少量多餐及選擇低脂肪且無刺激性的食物。早晨醒來時，可吃些五穀類食物。如餅乾、饅頭等改善孕吐。在懷孕末期，避免碳水化合物及脂肪攝食過多，造成體脂肪增加。

十一不明來源的中藥非經合格中醫師確認用藥用量及用法者，應避免食用之。

來源：孕媽咪和胎兒的變化：懷孕中期

孕媽咪和胎兒的變化：懷孕中期

媽咪的變化

十三週後孕吐噁心感逐漸消失。

腹部開始明顯隆起。

出現腰痠背痛、陰道分泌物增加、腳抽筋、水腫、皮膚乾癢等不適。

第一胎大約在十六到二十週可以感受到胎動，第二胎會更早。

胎兒的成長

第十四週五官外形約略可辨識。

第十七到二十週肺部開始發育，腦部快速發展。

第二十一到二十四週開始練習呼吸動作，也會聽聲音。

第二十四週眼睛完全發育，到二十八週會睜眼和閉眼。

產檢時程

懷孕中期建議分別於第十六週、二十週、二十四週、二十八週，每一個月一次，共進行四次產檢。

飲食營養：

一建議每日需增加三百大卡的熱量，持續增加十公克的蛋白質。

二補足鈣、維生素的攝取；葉酸、鐵、碘、維生素十二也要持續補足。

運動規劃：

一運動原則如懷孕初期，現在開始也不嫌晚！

二留意運動姿勢，要避免過度彎曲或過度伸展。

三每週維持至少一百五十分鐘的身體活動。

四找家人陪伴，幫助運動更持久。

來源：孕媽咪和胎兒的變化：懷孕初期

孕媽咪和胎兒的變化：懷孕初期

懷孕初期未滿十三週

從驗孕棒上發現二條線的喜悅，一直到初次的產檢，真正確認自己的肚子裡多了一個寶貝！

媽咪的變化

月經該來卻還沒來時，看見驗孕棒有兩條線了！

易有孕吐、頻尿、頭暈、頭痛等不適。

胎兒的成長

第六到八週寶寶會出現心跳。

第九週各個器官、肌肉、神經開始發育。

第十一週可以看到寶寶脊柱的輪廓，脊柱神經開始生長。

第十二到十三週寶寶的外型已明顯可辨。

產檢時程

懷孕初期建議分別於第八週和第十二週，各進行一次產檢。

飲食營養：

一 熱量不用特別增加，蛋白質增加十公克。

二 整個孕期都要攝取足夠：葉酸、鐵、碘、維生素十二。

運動規劃：

一 有氧運動：如快走、游泳、孕婦瑜珈等。

二 肌力訓練：進行各部位的訓練，上肢下肢都要運動到。

三 骨盆底肌運動：初期就開始練習，預防漏尿及尿失禁。

四 每週維持至少一百五十分鐘的身體活動。

五 如有不適，應立即中止，尋求專業協助。

來源：孕媽咪和胎兒的變化：懷孕後期

孕媽咪和胎兒的變化：懷孕後期

懷孕後期二十九週以上

孕媽咪辛苦了！隨著寶寶的成長，各種不適症狀也逐漸增加，孕期正式進入倒數計時中。

媽咪的變化

體重持續增加，外形明顯可看出是孕婦。

乳房增大，乳暈變大，顏色加深。

可能有呼吸急促、恥骨痛、失眠、便秘、痔瘡的困擾。

靠近預產期通常子宮收縮情形會越來越頻繁。

胎兒的成長

第二十九到三十二週胎兒手腳更有力了。

第三十二到三十四週胎頭開始朝下，逐漸固定胎位。

第三十四週胎兒的身體構造大致完成，肺泡逐漸成熟。

距離預產期越來越近，寶寶隨時可能來報到！

產檢時程

建議於第三十、三十二、三十四、三十六週，每兩週一次產檢。

第三十七週開始每週進行產檢。

飲食營養：

一建議每日需增加三百大卡的熱量。

二額外增加十公克的蛋白質及三十毫克的鐵質。

三補足葉酸、碘、鐵、維生素十二及鈣的攝取。

運動規劃：

一不要因肚子變大而停止運動，後期也要持續運動。

二還沒有運動習慣的話，現在就是開始的好時機！

三注意自身的體力，沒問題再進行。

來源：孕媽咪的第一次胎動

孕媽咪的第一次胎動

第一次「胎動」！

孕媽咪大約在十六到二十週左右會有「第一次被寶寶踢到的感覺」！藉由奇妙的胎動，孕媽咪可以感覺到寶寶的活動，同時也是寶寶的健康象徵。

胎動是什麼感覺？

胎動的感覺因人而異，剛開始有點像是腸胃蠕動的感覺，隨著寶寶的成長陸續會感受到肚子裡的晃動或滾動，也可能看到寶寶手腳擠壓肚皮的形狀。

正常的胎動頻率？

健康的胎兒在媽咪的子宮內除睡眠外在肚子裡會有不斷的活動，只不過孕媽咪的感覺沒有那麼頻繁。通常靜下來的時候，或是晚上的胎動會比較明顯。

感受不到明顯胎動？

當孕媽咪發現胎動頻率減少時，可能是胎兒正在睡覺，可以輕拍肚子或吃點食物來喚醒寶寶，或待會再測。如果一天有二個小時以上都感受不到明顯的胎動，刺激後仍沒反應，建議就醫檢查。

來源：孕期3次超音波檢查可看出什麼？不同階段檢查項目與重點

孕期三次超音波檢查可看出什麼？不同階段檢查項目與重點

超音波是孕期重要的產檢項目，國民健康署將孕期超音波常規檢查增至三次。讓準爸媽能安心掌握胎兒每個階段的發育重點，不僅能確認胎兒狀況。也有助醫師提早發現風險、降低生產意外，讓孕媽咪的孕程和產程更順利。

孕期三次超音波時間

超音波檢查在整個孕期中，扮演著守護寶寶的重要角色。不但能監測胎兒的健康與成長，也協助婦產科醫師精準掌握孕媽咪和胎兒的狀況，進一步降低生產風險。

一般產檢使用的是二超音波，屬於非侵入性的安全檢查。自一百一十年七月一日起，國民健康署將產檢次數調整為十四次，常規超音波檢查也增至三次，分別在以下時間點進行：

第一次常規超音波檢查

時間：於第一次至第三次產檢之間，約在孕期八至十六週之間提供一次。

目的：確認是否為子宮內懷孕、胎兒心跳與週數、胚胎數目、胎兒大小和預產期等。

第二次常規超音波檢查

時間：於第四次至第七次產檢之間，約在孕期二十週前後提供一次。

目的：進一步觀察胎兒心跳、大小、結構發育、胎數、胎盤與羊水狀況。

第三次常規超音波檢查

時間：於第八次產檢起，約孕期三十二週之後提供一次。

目的：監測胎兒心跳、大小、胎盤位置、生長曲線、胎位與預估生產方式。

三次超音波檢查項目及評估標準為何？

透過這三次常規超音波，醫師可以評估

胎盤位置、羊水狀況、胎兒生長情形，觀察是否有明顯的結構異常。根據統計，約有六成的胎兒構造異常或器官疾病可在超音波檢查中被發現，有些疾病會在懷孕後期才浮現，或無法在單次檢查中立即判定。

檢查項目包括：

一 確認胎兒數目及有無心跳。

二 估計胎兒體重（透過頭徑、腹圍、腿骨長度測量）。

三 預估羊水量。

四 觀察胎位與胎盤位置。

五 評估子宮及卵巢狀況。

常見超音波檢查異常狀況有哪些？後續應做哪些處置？

若超音波檢查發現胎兒有重大異常，醫師會優先評估是否涉及染色體變異，並安排羊膜穿刺等進一步的檢查。此外，也會建議進行遺傳諮詢，依照個案狀況量身訂做後續處置計畫。

不過要注意，公費補助的常規超音波主要評估胎兒生長、胎位、羊水、胎盤與孕媽咪子宮、卵巢狀況。若寶寶有特殊異常，可在第十一週至十三週又六天之間。自費進行「胎兒頸部透明帶超音波檢查」。

這項檢查除了觀察頸部透明帶厚度，也能早期發現一些重大畸形，如無腦兒、肢體缺陷、嚴重心臟病等。或在二十週至二十四週之間，安排高層次超音波進一步檢查。

高層次超音波的篩檢重點：

最佳檢查時間：孕期二十週至二十四週。

檢查範圍：腦部、顏面、脊椎、胸腔、腹部、四肢、外生殖器、胎盤位置等器官。

優點：可篩檢出超過八成以上的胎兒結構異常。

超音波雖然是目前產前篩檢的重要工具，但仍有它的限制。例如，部分疾病要等到胎兒較大時，甚至出生後才會顯現，也無法透過超音波診斷染色體或基因異常、代謝異常、智力發展等。

不過，準爸媽不需要過度擔心，多數胎兒發育都是正常的。即使發現異常，也不代表一定要終止妊娠，因為胎兒異常有程度之分。有些可在胎兒階段透過手術改善，有些可等出生後治療，提早了解寶寶狀況，能幫助家人做出最有準備的選擇與照顧。

來源：孕期使用化粧保養品須知

孕期使用化粧保養品須知

一可能懷孕或確知已懷孕婦女不得染髮、燙髮，並避免使用指甲油、去光水或指甲彩繪品。燙髮藥劑目前並沒有證據顯示會對胎兒造成影響，不過染髮劑則是有不少的疑慮。染髮劑有許多種類，比較有疑慮的是效力較持久的染劑。這些藥劑常引起異位性皮膚炎、接觸性蕁麻疹、頭皮發炎、掉髮、膀胱炎等過敏反應。另外，一般染髮如果是想染成淺色、金色。就會用到雙氧水來脫色，國外研究發現。有加上雙氧水處理的染髮劑比較有致畸胎的可能性。懷孕時期染燙髮，雖然沒有發現明確造成胎兒影響的證據。但是這些藥劑畢竟還是有毒性的，所以在孕期如果要染燙髮。應該選擇合格的天然藥劑，並請美髮師不要將藥劑碰到頭皮。由於染燙頭髮並非生活必須，建議孕婦儘量避免，尤其在第一孕期（懷孕到第十二週滿）會較保險。

二請勿使用來路不明、標示不清及過度宣稱效果的化粧保養品。

三懷孕期間常因荷爾蒙變化長痘痘，此時化粧保養程序應儘量簡化並可輔以適當的外用抗痘產品，此外上粧時儘量以淡粧為主不建議濃粧豔抹。

四懷孕期間儘量不要使用顏色過重、香味過強及成分過度複雜的化粧保養品。

五懷孕期間臉上容易長斑而且原本斑點的顏色也會加深，此時應注意適當的防曬措施並輔以適合的純物理性防曬品。此外可以適度的使用一般美白保養品，但三合一退斑膏藥品（酸+對苯二酚+類固醇）則不適合用於懷孕期間。

六懷孕後期容易產生妊娠紋，有需要的話可以於懷孕中期之後，局部按摩並配合使用單純性高、滋潤度夠的保濕產品加以預防。

七 懷孕期間皮膚容易乾癢及長疹子，除了穿著透氣寬鬆的衣物、處於涼爽的環境以及使用溫和的沐浴產品外，如果情形嚴重應儘快到皮膚科求診，並依嚴重度高低輔以適當的藥物或保養品來治療處理。

八 懷孕期間可使用含果酸或水楊酸的化粧品，但不適合進行高濃度的化學換膚處理。

九 懷孕期間並不建議執行非急迫性的醫美處理（雷射、脈衝光、電波拉皮或電氣導入）或是整型手術（包括微整型），以免暴露到不必要的風險與問題。

十 如有蟹足腫體質的患者在生產手術前需事先與醫師討論，並於術後配合使用適當的輔助產品以預防明顯疤痕的產生。

來源：孕期使用藥品須知

孕 期 使 用 藥 品 須 知

懷孕或準備懷孕中，發生感冒、頭痛、不舒服等狀況必須要服用藥品、維生素或營養補充品時。都請先詢問醫師、藥師或營養師之專業建議，及參閱個別藥品仿單。避免不小心對胎兒造成危害。

孕 期 可 視 病 情 適 量 用 藥

有些孕媽咪即使身體很不舒服也不看醫生不吃藥，就怕藥品影響胎兒，這種錯誤觀念有時會帶來更大傷害！例如若感染流感症狀嚴重時，不用藥反而對胎兒影響更大。醫生評估用藥時會考慮用藥風險，並開立適合孕媽咪使用的藥品，讓疾病對孕媽咪及胎兒的影響降到最低。

懷孕不舒服還是要看病，記得提醒您的醫師，自己是懷孕的媽咪。

來源：孕期健康點心，聰明吃

孕 期 健 康 點 心 ， 聰 明 吃

賀爾蒙的改變與基礎代謝率的增加，孕媽咪比較容易覺得餓，是正常的！在正餐之外感覺餓的時候，請避免高熱量零食，可以從以下這些健康點心下手！準爸爸準媽媽一起聰明吃，健康又安心！

來源：孕期傳染病防治

孕 期 傳 染 病 防 治

孕媽咪在懷孕期間會經歷免疫力下降，使得面對病菌時相較於一般人來說更加脆弱，因此傳染病的防治不可輕忽。

茲卡病毒感染症

建議懷孕期間暫緩前往茲卡病毒感染症流行地區，若必須前往，請做好防蚊措施。自茲卡病毒感染症流行地區返國後，應自主健康監測至少二週，如出現疑似症狀請儘速就醫。

性伴侶若有茲卡病毒感染症流行地區旅遊史，無論是否出現疑似症狀，懷孕期間性行為應使用保險套。

主要經由蚊子傳播且沒有疫苗，避免被病媒蚊叮咬為首要。

型肝炎

病毒可能透過肝帶原的媽媽在生產前後，垂直傳染給新生兒，新生兒感染後約九十會成為慢性帶原者。

建議肝表面抗原（）陽性的孕婦加驗血中肝病毒量，病毒量一百零六屬高母嬰垂直傳染風險，請依消化系肝膽腸胃專科醫師評估後使用抗病毒藥物治療。

另媽媽為陽性的寶寶務必於出生後二十四小時內儘速注射一劑型肝炎免疫球蛋白及型肝炎疫苗，並依時程完成三劑型肝炎疫苗接種後，於滿一歲時帶至醫院進行及肝表面抗體（-）檢測，必要時可公費追加型肝炎疫苗。

防治肝感染，從媽媽肚子裡開始做起！

李斯特菌症 & 弓形蟲感染症

避免生飲生食，生熟食分開處理及保存並避免共用砧板。

避免食用即食肉類加工品、剩菜與生菜沙拉，或於食用前充分加熱。

生食肉品、蔬菜、海鮮習慣者、養寵物或生鮮肉品處理者等，建議諮詢婦產科醫師，並注意避免遭受感染。

若家有貓咪，孕期間請禁止家貓接觸流浪貓並避免收養新貓咪。從事農藝或處理貓砂請戴好手套，結束後脫下手套以肥皂、清水澈底清潔雙手。

蔬果洗淨，食物煮熟，預防感染。避免接觸來路不明的貓咪，注意個人衛生及勤洗手。

來源：孕期各項檢查在做什麼？

孕期各項檢查在做什麼？

各種檢查在做什麼？

產檢的目的在於定期檢查寶寶發育及孕媽咪身體狀況，提供預防性的醫療照護。瞭解各項產檢的內容，進一步掌握母嬰健康，讓每次產檢更有意義。

延伸閱讀：

【孕產婦關懷網站】孕婦型肝炎篩檢

【孕產婦關懷網站】梅毒篩檢為陽性該怎麼辦

【孕產婦關懷網站】孕婦免費愛滋病篩檢

【孕產婦關懷網站】孕期感染麻疹及德國麻疹的影響及預防

貧血檢驗早期發現，保障母嬰健康

台灣有十到二十孕媽咪在初期產檢時為貧血，在生產時更高達三十到四十。

孕期貧血可能造成胎兒過小、早產、發展遲緩、智力障礙等問題，並增加孕產婦心肺負擔、子宮收縮不良、難產、周產期憂鬱等發生機率。

貧血檢驗可及早發現孕媽咪貧血情形，透過均衡飲食。攝取營養素，或經醫師評估使用補充劑。可降低母胎相關併發症風險。

妊娠糖尿病篩檢檢查血糖，診斷疾病

妊娠糖尿病是高危險妊娠疾病之一，若孕媽咪在孕期血糖過高，可能造成胎兒過大、新生兒低血糖、早產、難產。

對於孕媽咪也有併發子癲前症與產後發生典型糖尿病的風險。

透過營養控制，運動及血糖監測，可減少不必要的生產併發症。

篩檢方式：

進行篩檢前，需禁食八小時。空腹喝下含有七十五克葡萄糖的糖水，進行耐糖試驗。這對於判別孕媽咪血糖檢驗數值的正確性甚為重要。

來源：孕期和伴侶溝通的技巧

孕期和伴侶溝通的技巧

孕育寶寶並不容易，挺著肚子時常反胃、頻尿便秘身體不適再加上荷爾蒙影響。孕婦難免情緒波動較大，可能一點小事就掉淚。或沒來由生氣。來！提供爸爸們一些簡單的說話術，帶出正能量，促進夫妻間良性溝通！

請不要說~為了寶寶好，你應該……

「為了寶寶好，應該控制體重」、「為了寶寶好。不要吃冰的」雖然大家都是為了寶寶好，但這些話帶有指責感。太太聽了可能不開心！建議直接將言語化為行動，為太太準備合適的食物，睡覺時間到，就安撫她睡覺幫忙關燈！

請不要說~你好像變胖了、你的肚子好像很大

當太太問你，她是否變得很胖。建議溫和回答：「這樣還好，很多孕婦都這樣」、「懷寶寶本來就會有些改變」。用正向、鼓勵的話語回應。但如果超出合理範圍，或伴侶對體重增加很在意，請回答：「沒關係，我們產檢時一起請教醫師」。

請不要說~你好像很愛哭、你有點歇斯底里

太太情緒起伏大的時候，多給她安慰、多給她擁抱。不要說：「你怎麼動不動就哭」，用行動代替語言幫她擦擦眼淚。太太有時只是想要說說話，不一定要得到答案。而當你覺得太太的情緒起伏大，你也無法負荷；或是你自己也產生過多負面情緒時，請記得可以求助專業諮商人員。在伴侶懷孕過程中，爸爸同樣會有壓力、焦慮情緒。請適時休息一下，並可以查閱「爸爸如何調適心理壓力」文章。找出調適心理壓力的技巧。

來源：孕期唐氏症篩檢介紹

孕期唐氏症篩檢介紹

唐氏症是一種最常見的染色體異常疾病，也是導致智能障礙的最主要病因；平均每八百位孕婦，就可能有一位會懷有唐氏症胎兒。唐氏症篩檢則是一種用來估計胎兒罹患唐氏症風險的檢測，若篩檢結果為高風險者，則建議應接受絨毛取樣或羊膜穿刺檢查，以確定胎兒是否為唐氏症患者。

現行的唐氏症篩檢有兩種方式，分別為：第一孕期（十一到十四週）母血唐氏症篩檢。以超音波檢查胎兒頸部透明帶和鼻樑骨，並抽取孕婦血液進行血清標誌分析。此項檢查可檢出八十二到八十七的唐氏兒。

第二孕期（十五到二十週）母血唐氏症篩檢，則是完全抽取孕婦血液進行血清標誌分析，此項檢查可檢出六十到八十三的唐氏兒。若篩檢機率一千二百七十可能性為高危險群，應進一步作羊膜穿刺，若篩檢機率一千二百七十可能性為低危險群，請按照時間產檢。

篩檢結果僅代表產下唐氏症寶寶的機率，並不是胎兒異常的診斷結果。若篩檢結果為陽性，準媽媽先不必慌張。與您的醫師討論進行進一步診斷性檢查，才能確定是否真有異常。

專家建議年齡滿三十四足歲之孕婦，曾生產過染色體異常胎兒。或家族成員有染色體異常者，可直接接受羊膜穿刺術檢查以診斷胎兒是否為唐氏症患者；而三十四歲以下的孕婦則可先接受兩種唐氏症篩檢之一。唐氏症篩檢結果若為高風險者，則應進一步接受絨毛取樣或羊膜穿刺檢查。以確定胎兒染色體是否異常。

若您對唐氏症與唐氏症篩檢有任何不明白之處，請與您的主治醫師討論，並遵從專業的醫療建議及指示。

來源：孕期性生活3好4不

孕期性生活三好四不

懷孕期間，難免會擔心親密行為影響到胎兒，其實懷孕期間，性生活仍然可以持續。只要夫妻提前溝通好應避免的動作，過程中出現任何不適就暫停，持續性生活能帶來良好的親密關係，也是孕期非常重要的一環！並希望爸爸能了解伴侶對於性的需求及想法，尊重彼此的感受。

三好

一親密行為能刺激荷爾蒙分泌，讓媽媽有被愛的幸福感。

二懷孕中期狀況最穩定，也是孕期性生活最舒服的階段。

三可以使用側臥式體位、正常體位、後背體位等，以舒適不壓迫為原則。

四不

一若孕婦正值陰道感染，應停止性行為。

二過程中請避免壓迫肚子，也要避免太過激烈。

三建議減少體內無套射精，因為精液中有前列腺素，可能誘發子宮收縮。

四有出血、嚴重宮縮、前置胎盤、子宮頸閉鎖不全、早產等風險時，應停止性行為。

來源：孕期性生活安全嗎

孕期性生活安全嗎

懷孕所造成的生理、解剖和情緒方面的改變，使得準父母對於孕期性生活有很多問題與擔憂。其實孕期性生活不需禁止，健康而適度的性生活可以增進夫妻的親密感情。但孕婦若曾有早產或流產症狀者，懷孕最初三個月及最後兩個月則宜暫停。若此次懷孕有子宮頸閉鎖不全、前

置胎盤，或目前尚未足月但有陰道出血及陣痛等情形者，則應禁止。

在性行為過程中，建議採取不壓迫腹部的體位。減少對腹中胎兒的壓迫，活動中可增加擁抱、親吻、愛撫等行為。以滿足夫妻彼此的性需求，若孕婦產生強烈收縮、不正常出血、嚴重下腹痛等。應停止性行為，儘快就醫。

此外，男性的精液通常不會發生細菌感染或子宮內的胎兒感染。若有感染的疑慮時，建議請先生戴上保險套。確保孕婦及胎兒的安全。

產後原則是惡露乾淨、子宮完全恢復才可行性生活，通常約在產後滿月左右。否則易感染或出血，如果在生產時作會陰切開術或陰道撕裂。傷口疼痛可能會超過一個星期，可能會被告知一段時間不能有性行為。產後哺乳期間夫妻之間仍可以享受正常性生活，但需要更多的良性溝通。

哺乳期媽媽較容易有陰道潤滑不足，也可能因為常規性的會陰切開術。造成傷口癒合處疼痛，而有性交疼痛的情形。可以於行房時考慮使用水性潤滑劑改善。如果行房時的溢奶造成困擾的話，行房前可以先餵寶寶，可以減少性行為時乳汁漏出；按壓乳頭也可能減少溢奶。

來源：孕期情緒管理：擺脫焦慮、保持心情愉快

孕期情緒管理：擺脫焦慮、保持心情愉快

孕期對於每位準媽媽來說，都是一段充滿期待和變化的特殊時光。這段期間不僅是身體上的巨大變化，情緒的波動也是常見的挑戰之一。從焦慮到興奮，從疲憊到愉悅，這些情緒的起伏會影響到孕期的健康和生活品質。因此，學會如何有效管理情緒，擺脫焦慮、保持心情愉快，對於孕婦來說至關重要。

一、了解孕期情緒波動的原因

孕期的情緒波動通常源於多方面的因素，包括荷爾蒙變化、身體變化、生活方式的調整以及對未來的擔憂等。以下是一些常見的情緒波動原因：

一 荷爾蒙變化：

孕期荷爾蒙水準的劇烈變化，如雌激素和孕激素的增加，會影響大腦的化學物質，進而影響情緒。例如，孕期荷爾蒙的變化可能導致情緒易怒或突然的情緒低落。

二 身體變化：

隨著胎兒的發育，孕婦的身體會經歷顯著的變化，如體重增加、身體不適等。這些變化可能會引發對自身形象的擔憂和不安。

三 生活方式調整：

孕期需要適應許多新的生活方式，如飲食調整、作息改變等。這些變化有時會帶來壓力和焦慮。

四 未來的擔憂：

對於即將成為母親的未來擔憂，包括對分娩的恐懼、育兒的挑戰、家庭經濟壓力等，都是孕婦常見的焦慮來源。

二、應對焦慮的策略

一 了解和接受情緒變化：

認識到孕期的情緒波動是正常的，接受這些情緒變化，有助於減少對自己的苛求。與醫生或心理諮詢師交流，了解情緒波動的天然性，能幫助孕婦更好地調整心態。

二 建立支援系統：

與伴侶、家人和朋友分享感受和擔憂。他們的支援和理解可以減輕焦慮。參加孕婦支援小組或孕期教育課程，也可以讓孕婦從其他準媽媽的經驗中獲得支援和安慰。

三 保持健康的生活方式：

均衡飲食：均衡的飲食能夠提供穩定的血糖值，幫助穩定情緒。

適量運動：適當的運動如散步、瑜伽和游泳，不僅能夠幫助緩解身體不適，還能釋放腦內啡，改善情緒。記得選擇合適的運動方式，並在專業指導下進行。

四 學會放鬆和冥想：

練習放鬆技巧如深呼吸、冥想和漸進性肌肉放鬆，可以減少壓力和焦慮。每天花些時間靜下心來，幫助自己放鬆，這對於孕婦的心理健康非常有益。

五 規劃和準備：

對即將到來的分娩和育兒做好充分準備，可以減少對未知的恐懼。閱讀相關書籍、參加孕期課程或與有經驗的母親交流，都能幫助孕婦更好地準備迎接新生命的到來。

三、保持心情愉快的實用方法

一 追求興趣愛好：

參與喜歡的活動可以提升心情。無論是閱讀、繪畫、聽音樂還是園藝，這些活動能讓孕婦享受平靜和愉悅的時光。

二 保持積極的社交活動：

與朋友和家人共度時光，分享快樂和興趣，可以讓孕婦感受到支援和快樂。即使孕期的體力有限，也可以選擇參加一些輕鬆的社交活動，保持社交連接。

三 設定小目標和獎勵：

設定一些小目標，並在達成時獎勵自己，可以提升自信和滿足感。這些小目標可以是完成一個小任務、完成一部小說或是達到健康飲食的目標等。

四 寫日記：

將感受和思緒寫下來，既能幫助釋放情緒，又能讓孕婦更清楚地了解自己內心的變化。日記也是一個記錄孕期經歷的好方式，未來回顧時會成為寶貴的回憶。

五 規劃未來的期待：

專注於對未來的美好期待，如準備寶寶的房間、挑選寶寶的名字等。這些積極的計劃和期待可以幫助孕婦保持心情愉快。

四、尋求專業幫助

有時孕期的情緒波動可能會超出自身的調節能力。若感到焦慮、憂鬱等情緒狀況嚴重影響到日常生活和健康，而且時間持續超過一到二週以上，應及時尋求專業幫助。心理師、產科醫生或身心科醫師可以提供專業的建議和治療方案，幫助孕婦更好地管理情緒。

五、總結

孕期的情緒管理是保持身心健康的重要一環。通過了解情緒波動的原因、採取有效的應對策略、保持積極的心態以及尋求專業幫助，可以更好地應對孕期的挑戰，擺脫焦慮及憂鬱，保持心情愉快。這不僅有助於幸福感，也會對胎兒的健康和發展產生積極影響。

記住，每位孕婦的經歷都是獨特的，找到最適合自己的情緒管理方法，讓自己在這段美好的旅程中充滿喜悅和期待。祝願所有準媽媽們孕期愉快，迎接新生命的到來。

來源：孕期想吐吃不下！害喜媽咪如何兼顧飲食營養？

孕期想吐吃不下！害喜媽咪如何兼顧飲食營養？

相信許多孕媽咪都經歷過「孕吐」這個大魔王，聞到味道就想吐、看到喜歡的食物卻吃不下。整天下來，進食的量相當少。實在讓人好難受……長時間下來，害喜媽咪的孕期營養真的足夠嗎？

根據統計，約有五十%~八十%的孕媽咪會出現孕吐反應。每位孕婦的嚴重程度不太相同，有些可能只會噁心、腹脹、食欲不振等。有些則會有明顯的嘔吐反應，甚至是演變成「妊娠劇吐症」。嚴重吐到脫水，需要就醫治療。

荷爾蒙、心理因素，都會導致孕吐

孕吐，又稱為害喜。之所以會發生孕吐，可能與體內的人類絨毛膜促性腺激素（ HCG ）濃度增加。以及新陳代謝改變有關，懷孕後。孕婦體內也會分泌黃體素來穩定子宮狀態，以減少子宮平滑肌的收縮。同時也會降低腸胃道平滑肌的蠕動，導致孕媽咪消化不良。便秘、反胃等情況。

而媽咪想吐的感覺，也會隨著體內荷爾蒙濃度的增加。而越來越明顯，通常會在懷孕十到十二週左右達到高峰。約在懷孕十六週後逐漸減少，媽咪們的症狀也會獲得緩解。只有少數媽咪會持續至懷孕中後期。

孕吐並非每位孕媽咪都會發生，通常像是體質較弱、情緒容易緊張的孕婦。孕吐情況也會比較明顯，另外像是甲狀腺亢進、多胞胎、葡萄胎、年齡較輕、較為肥胖。抑或是患有胃腸肝膽部分或生殖泌尿系統等相關疾病，也比較容易害喜。

如何緩解孕吐？

孕媽咪無法控制荷爾蒙的變化，但可以從日常生活中的一些小習慣，來緩解孕吐所帶來的不適。

一 少量多餐：

懷孕期間，腸胃道消化的速度會變慢。應避免一次吃進太多的食物，增加腸胃道的負擔。採少量多餐的方式，也要少吃不容易消化的食物。

二 乾濕分離：

喝入太多的湯湯水水，恐會快速增加飽足感。導致吃入的食物因吸水而過度膨脹導致嘔吐，建議飲食採取乾濕分離。先吃乾的食物，間隔半小時到一小時後。再喝湯或飲品。

三 避免長期空腹：

即使食欲不高、胃口不好，也要適時吃進少量的食物，避免空腹太久，胃酸過多而增加胃部不適。隨身攜帶蘇打餅乾、蜜餞、檸檬片等小點心，隨時為自己補充養分。

四 清淡飲食：

飲食內容儘量維持清淡口味，像是辛辣、高油、高熱量的食物。容易刺激腸胃系統，且不好消化。待在腸胃時間一長，也容易造成胃脹或想吐。

五 補充水分：

對於孕吐頻繁的孕媽咪，補充足夠的水分。有助於預防脫水，建議每日攝取量至少約一千五百。且分次補充，不要一口灌入。如果擔心水沒味道，也可以嘗試含有葡萄糖、鉀的運動飲料。可以一併補充電解質，或是加入水果片。增加風味。

六 放鬆心情：

懷孕是件開心的事，媽咪們平時可以多到戶外走動，促進腸胃消化，也能保持愉快的心情。

七 攝取維生素六：

維生素六是人體每天都需要的营养來源，可從天然穀物、魚、牛肉、牛奶中獲得。

不要強迫進食，攝取重點營養素即可

若吃什麼就吐什麼，媽咪們不免會擔心，寶寶會不會不夠營養？一般來說，孕吐多發生在懷孕初期。這階段的胎兒營養主要來自於卵黃囊，而不是母體本身。因此媽咪不必過於擔心，也不用強迫進食。依照自己的口味及習慣，調整飲食內容即可。

另外，懷孕初期。胎兒所需的熱量還不是很多，建議媽咪們應多攝取重點營養素。才不會增加太多的體重。像是富含蛋白質、鋅、葉酸、碘的食物可以比平常多吃一些，有助胎兒的發育。也別忘了在身體情況允許的情況下，多到戶外曬曬太陽。吸收維生素，為自己也为寶寶儲存良好的營養。

來源：孕期感染流感的風險及預防

孕期感染流感的風險及預防

流感（）是由流感病毒引起的急性呼吸道傳染病，主要是透過感染者咳嗽或打噴嚏所產生的飛沫將病毒傳播給其他人。尤其在密閉空間，由於空氣不流通。更容易造成病毒傳播。另外，因為流感病毒可在低溫潮濕的環境中存活數小時。故可短暫存活於物體表面，所以也可經由接觸傳染。如手接觸到污染物表面上的口沫或鼻涕等黏液，再碰觸自己的口、鼻或眼睛而感染。

由於流感病毒是經由飛沫及接觸傳染，可於人潮擁擠處快速傳播，流行期約為每年十一月至隔年三月。

潛伏期

典型流感的潛伏期約一到四天，一般為二天。

罹患流感的人，在發病前一天至症狀出現後的三到七天都可能會傳染給別人，而幼童的傳播期甚至可長達數十天。

發病症狀

感染主要症狀為發燒、頭痛、肌肉痛、疲倦、流鼻涕、喉嚨痛及咳嗽等，部分患者伴有腹瀉、嘔吐等症狀。多數患者在發病後一到二週會自行痊癒，少數患者可能出現嚴重併發症，常見為病毒性肺炎及細菌性肺炎，另外還包括中耳炎、腦炎、心肌炎及其他嚴重之繼發性感染等。高危險族群包括老年人、孕婦、五歲以下嬰幼兒及患有心、肺、腎臟及代謝性疾病等慢性病患者，或肥胖身體質量指數-三十及免疫功能不全者。

孕婦於懷孕期間生理狀態的改變，抵抗力不如孕前，會增加罹患流感後的併發症，也會提高早產及死產的機率。雖然流感病毒極少經由胎盤直接傳染胎兒，但是孕婦罹患流感仍可能對於胎兒有不利影響，包括胎兒神經管缺損、唇裂、水腦、先天性心臟病、自發性流產、早產、出生低體重等問題。

預防方式

一預防流感最有效的方法就是按時接種流感疫苗。懷孕婦女可於任一孕期接種，此外家人也建議一同接種流感疫苗。準備懷孕的婦女，亦可考慮於流行季來臨前或流行期自費接種疫苗。至於不宜施打的狀況，為孕婦本身有接種禁忌症，如已知對疫苗的成份有過敏者、過去注射曾經發生嚴重不良反應者，均不予接種。另外，要特別注意當發燒或正患有急性中重度疾病者，則應等病情穩定後再接種。

二勤洗手、維持手部清潔、不要用手直接碰觸眼睛、鼻子和嘴巴。

三注意呼吸道衛生及咳嗽禮節，戴口罩、打噴嚏時，應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替。

四生病時在家休養，有流感症狀立即就醫。並依醫囑服用藥物，保持室內空氣流通。降低病毒傳播機會。

五流感流行期間，減少出入公共場所或人多擁擠地方，注意疫區旅遊資訊。

六注意飲食均衡、適當運動及休息，以維護身體健康。

接種流感疫苗：

我國使用的流感疫苗係依據世界衛生組織預估每年北半球流行之流感病毒株製成流感疫苗，目前國內使用的流感疫苗是屬於不活化流感疫苗，孕婦可接種且為公費疫苗接種對象，可攜帶健保卡至醫療院所完成接種。接種

後約二到四週體內會產生抗體，抗體會透過臍帶，帶給胎兒保護力，並且能持續到出生六個月之久。若孕期不慎感染，至少可以減緩感染症狀及降低併發症的機率。

治療方法與就醫資訊：

孕婦就醫時應主動告知醫師懷孕情事，當疑似或確診罹患流感時，應立即就醫並依醫師指示使用流感抗病毒藥物治療，避免因等待檢驗結果或其他原因而有所延誤。目前疾病管制署提供的公費流感抗病毒藥劑使用對象中，即包含有孕婦經評估需及時用藥者。

在藥物的安全性方面，目前沒有任何研究顯示。孕婦使用流感抗病毒藥劑會增加自己或胎兒不良預後的風險，在懷孕動物的研究中。也證實流感抗病毒藥劑並無致畸胎性，因此。對於罹患流感之孕婦，使用流感抗病毒藥劑的好處大於可能的風險。建議孕婦如有流感症狀應儘速就醫，並依醫師評估及建議服用流感抗病毒藥劑。

來源：孕期感染麻疹及德國麻疹的影響及預防

孕期感染麻疹及德國麻疹的影響及預防

麻疹為麻疹病毒（*Measles virus*）引起的急性呼吸道傳染病，是傳染力極強的病毒性疾病，經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染。德國麻疹則為德國麻疹病毒（*Rubella virus*）引起，又稱「風疹」，也是一種傳染力很強的病毒性疾病，經由飛沫傳播或接觸到感染病人的鼻咽分泌物而傳染。

潛伏期：

麻疹自暴露麻疹病毒開始至出現症狀約七到十八天，自暴露病毒到出疹平均約十四天左右，有極少數個案可長達二十一天。

德國麻疹自暴露德國麻疹病毒開始至出現症狀約十四至二十一天。

傳染期：一般來說，麻疹病人在出疹的前、後四天內具有傳染力；德國麻疹在出疹前後七天內具有傳染力。

臨床症狀

麻疹發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽、以及發燒三到四天後口腔內頰側黏膜出現柯氏斑點（*Koplik spots*），再過二十四到四十八小時後典型的斑丘疹出現於耳後。再擴散至整個臉面，然後慢慢向下移至軀幹和四肢。皮疹在三到四天的時間內會覆蓋全身，並持續四到七天。皮疹退了以後，會出現鱗屑性脫皮及留下褐色沉著。但曾接種過麻疹疫苗的人感染後，症狀通常不典型。其初期臨床表徵可能只有發燒或出疹其中之一。較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎。

德國麻疹包括輕度發燒、出疹、疲倦、鼻咽炎、耳後淋巴結

明顯腫大，部分感染者會有關節炎或關節痛特別是年輕女性。一般感染德國麻疹的症狀較麻疹輕微，但婦女於懷孕初期感染德國麻疹病毒，極可能造成死胎、早產或出生嬰兒先天性缺陷。

麻疹與德國麻疹不相同，懷孕期間遭受感染對胎兒的影響也不同。

這份表格詳細對比了麻疹與德國麻疹在傳染力、潛伏期、症狀以及孕期感染影響等四個面向的差異。

在傳染力與疾病分類上，麻疹與德國麻疹兩者皆具有極高的傳染性，且在法定傳染病分類中，同樣都被歸類為第二類法定傳染病。

然而在潛伏期方面，兩者有明顯的時間差。麻疹的潛伏期較短，大約為七至十八天；德國麻疹的潛伏期則相對較長。需要十四至二十一天。

兩者在臨床症狀上雖然都會出現發燒、丘疹和結膜炎，但其他併發症狀有所不同。麻疹會伴隨咳嗽、鼻炎，最特殊的特徵是口腔內會出現科氏斑點（）；而德國麻疹則容易伴隨關節炎、關節痛，並且會出現急性的頸部或頭部淋巴腺腫大。

最後，在孕期感染對胎兒的影響上，兩者的危害程度與方向有顯著差異。孕婦若感染麻疹，目前雖然沒有研究證實會直接導致胎兒畸形，但會提高早產、流產和死胎的機率。相較之下，德國麻疹對胎兒的殺傷力更大。不僅可能導致死產、自然流產或胎兒主要器官受損，更極易引發嚴重的先天性缺陷。包含先天性耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足以及先天性心臟病等結構性問題。

孕婦於懷孕期間生理狀態的改變抵抗力不如孕前，感染麻疹病毒可能會影響孕婦及胎兒，根據美國疾病控制與預防中心（）的研究指出感染麻疹的孕婦會增加流產、死胎、早產的併發症。目前無充分證據顯示，孕婦感染麻疹會有明顯引起胎兒先天性畸形；一般來說，若孕期感染麻疹時，治療以支持療法以及避免併發如肺炎、腦炎、心臟衰竭等的發生。而孕婦在生產前若感染麻疹，則其產下的新生兒。尤其若是早產兒，較容易發生嚴重的麻疹感染並危及生命。建議其胎兒出生六天內接受免疫球蛋白注射。孕婦如果感染德國麻疹，病毒可以透過胎盤垂直傳染給胎兒。可能會造成死產、流產或胎兒主要器官受損，如先天性耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足及先天性心臟病等缺陷。統稱為先天性德國麻疹症候群，孕婦於懷孕最初十週內感染德國麻疹。出生的嬰兒有高達九十%的機率會有先天性缺陷。

對孕婦而言，如不確定自己是否具有麻疹、德國麻疹免疫力。可以先抽血檢測麻疹、德國麻疹抗體，若檢驗結果二者皆為陽性。則表示對麻疹及德國麻疹均具有免疫力；如果沒有抗體的孕婦，因孕期不能接種疫苗。則必須採預防措施，避免去人潮擁擠公共場所或取消到疫區旅遊。

以免感染麻疹、德國麻疹。

產後哺乳期間即可接種疫苗麻疹、腮腺炎、德國麻疹三合一疫苗，除可保護新生兒。也保護自己，目前沒證據顯示麻疹病毒會分泌至乳汁裡。因此可正常哺乳。

預防方法

一 孕期減少出入公共場所、避免到德國麻疹及麻疹流行地區、平時勤洗手，戴口罩。

二 檢測為德國麻疹抗體陰性的育齡婦女，可檢具抗體陰性證明於孕前或產後至可至各衛生所或指定之預防接種合約院所公費接種一劑疫苗，並記得在接種後四週內避免懷孕。如檢驗結果德國麻疹抗體陽性，但麻疹抗體陰性，則建議至提供自費疫苗接種服務之院所自費接種一劑疫苗。

三 幼兒應依常規預防接種時程於出生滿十二個月及滿五歲至入國小前各接種一劑疫苗。

來源：孕期搭機及旅遊風險停、看、聽

孕期搭機及旅遊風險停、看、聽

飛機上的濕度較低，容易使人體血液濃縮。妊娠期間由於生理性靜脈擴張，加上黃體素作用。發生血栓症的機會較高；搭機久坐也會對原本有下肢水腫、腹腔靜脈受到胎兒壓迫的孕婦，產生靜脈栓塞、早產的風險。另外，隨著飛行中的低艙壓狀態。增加心肺功能調適負荷，對於有心臟病、嚴重貧血、或是有其他高危險妊娠的孕婦。可能帶來風險！飛行旅程過度勞累也可能導致流產與早產的可能，由於飛機上無法提供良好的生產醫療環境，一旦發生破水、急產等，相當危險。臨床建議第三孕期不要搭飛機。

懷孕婦女，要注意搭機及旅遊風險，行前停、看、聽。

停

一 罹患鎌狀細胞貧血症之孕婦，胎兒可能發生嚴重缺氧。甚至導致死產、流產，或較容易發生血尿及腎小管血栓症狀。醫師建議絕對禁止於妊娠中期之後搭機。

二 懷孕早期有異常出血或下腹悶痛等流產症狀；過度勞累或長途奔波及航程較長的旅行，可能造成胎兒流產及早產的危險，不建議長途飛機旅遊。

三 旅行時也要注意適時休息，建議每二個小時停下來走一走及排空膀胱。

看

一 懷孕期間規劃旅遊前，儘可能先瞭解旅遊目的地過境

地區的醫療照護服務。

聽

一 如果計劃在國內或到國外旅遊時，請告知您的醫師，事先取得醫師開立的預產期證明書。聽從醫師建議注意行程不要太過緊湊，避免前往衛生條件不佳的地方。

二 最好有親友相伴，假使身體不適或需要提些重物，應有人幫忙協助。

三 搭機時避免長時間維持同一姿勢，造成血液循環不良，應經常移動及走動，維持適當周邊循環。開車旅行時也要注意適時休息，建議每二個小時停下來走一走及排空膀胱。建議孕婦旅行仍要注意行程不要太過緊湊，避免前往衛生條件不佳的地方。

來源：孕期施打疫苗保護寶寶-百日咳疫苗

孕期施打疫苗保護寶寶-百日咳疫苗

百日咳是一種急性呼吸道傳染性疾病，係透過飛沫或近距離接觸而感染。

小於六個月的寶寶是感染百日咳的高危險群，主要的感染源為親密照顧的媽媽及其他照顧者。新生兒一旦感染會產生咳嗽、嘔吐、呼吸困難等症狀，嚴重者造成休克，併發肺炎、腦病變甚至導致死亡。

為預防嬰幼兒感染百日咳，建議孕婦不論過去的破傷風、減量白喉混合疫苗或減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗接種史，每次懷孕應接種一劑百日咳疫苗，可在任何孕程接種自費。但為使母親抗體傳遞給嬰兒的接種效益最大化，建議於懷孕第二十八到三十六週接種；若懷孕時未接種，則應於生產後立即接種。另外，會照顧寶寶的其他家屬親人，也建議同時接種以保護新生兒。

來源：孕期服裝這樣穿

孕期服裝這樣穿

懷孕期間穿著舒適是準則，隨著寶寶越來越大，孕媽咪可能需要更大的胸罩、寬鬆的衣服，這些服裝通常也會持續穿到產後一段時間。

考量季節的變化

二百八十天的懷孕會歷經不同的季節，不用急著一次將孕期的衣服買齊，需要時再進行選購更符合效益。

輕便好穿脫的鞋子

水腫可能會讓腳變大！選擇透氣性佳、具有足夠支撐、可分散足底壓力、舒適度高的鞋款，幫助孕媽咪減輕足部負

擔。

包覆性佳的孕婦內衣

懷孕初期乳房就開始在為哺乳做準備，胸部會變大一到二個罩杯，選擇包覆性佳的孕婦內衣可以提供良好的支撐，讓孕媽咪感覺舒適。

來源：孕期朗讀~讓帶球走的日子很美好

孕期朗讀~讓帶球走的日子很美好

許多人都聽過胎教的重要，但胎教要怎麼進行呢

腦科學研究已知，胎兒寶寶透過聽覺的刺激。已經發展出語言的學習能力，所以即使是懷孕期。朗讀故事給寶寶聽，也能夠刺激寶寶大腦發展。促進日後語言發展和理解力，以及學習能力。這是每位準爸媽都能為寶寶做的事情

學者也觀察到，透過朗讀聲，還可以減低準爸媽自己的焦慮感。這就是最好的胎教

孕期朗讀，需要甚麼技巧，或是要選甚麼書嗎

一養成習慣，孕期朗讀最主要是在培養準爸媽朗讀的習慣，

二不一定要唸童書，可以選擇準爸媽自己喜歡的文章。

三不用特別的技巧，選個準爸媽能放鬆心情的時段。舒服地坐著，享受和寶寶在一起的感覺。自然地隨著故事情節朗讀，這樣的聲音就會很有情感。

四可以唸唱童謠，胎兒寶寶都會很喜歡。

五更建議常由準爸爸來朗讀，除了讓胎兒寶寶熟悉爸爸的聲音之外，還可以增加夫妻之間的情感。

對寶寶這麼好的東西，請儘早開始。那麼就從今天開始，請您們挑一本童書。故事書，或是自己喜歡的書。養成唸書給胎兒寶寶聽的習慣，也可以在摸著肚子和寶寶交流時講話時。將對寶寶的愛一起說給寶寶聽，這就是最棒的胎教

來源：孕期泡湯的重要提醒！

孕期泡湯的重要提醒

臨床研究發現，在懷孕期間。無論是哪種原因引起的體溫升高，如感染發熱、高溫作業、高溫水浴等。都會影響胎兒的生長發育，嚴重的會造成胎兒中樞神經系統、心臟血管系統的損傷或畸形。新生兒低體重或智能低下等。

特別是在懷孕早期，孕媽咪平時除了避免高溫環境。預防發生感冒等傳染性疾病以外，還要避免用過熱的水沐浴。沐浴的水溫以二十七到三十七為宜，洗澡時間不宜過長。建議每次的時間不超過二十分鐘，避免在浴缸裡長時間浸泡腹部。泡澡或泡湯會促進心跳加快、心輸出量增加、肌肉血管擴張、血壓降低，子宮胎盤血流量短時間減少，造成胎兒缺氧，胎兒腦細胞形成不可逆的永久性損害。

提醒您

孕期泡湯注意事項

【提醒一】避免在懷孕初期

因孕婦體溫持續過高，引起胎兒腦部、脊髓的神經系統發育異常，較常發生在妊娠早期，因此提醒孕媽咪在妊娠早期避免泡溫泉。

【提醒二】泡雙腿降低感染

婦女懷孕後，內分泌功能發生改變。陰道內具有滅菌作用的酸性分泌物減少，體內的免疫機能降低。此時如果泡大眾池、坐浴，易增加會陰部細菌或黴菌感染的機會。建議選擇水質優良的溫泉池，避開會陰部的方式，只泡雙腳；或是短時間淋浴的方式，來避免感染。

【提醒三】水溫三十七、時間十五分鐘

與體溫相當的水溫最適合孕媽咪。建議孕媽咪可泡個人池，水溫以二十七到三十七為宜，浸泡時間也不宜過久，約十五到二十分鐘左右。另外，泡冷泉（水溫二十以下）會使血管收縮，也不適合孕媽咪浸泡。

【提醒四】親友陪同

泡後起身要慢，以免血壓降低。造成昏倒或摔傷；溫泉池地面較為濕滑，需注意走動安全。避免滑倒摔傷、流產等。泡湯時，最好有親友陪伴同行。

【提醒五】高危險妊娠不宜泡湯

若為多胞胎或心臟功能不佳、有先天性或妊娠高血壓、糖尿病、前置胎盤等高危險妊娠的孕媽咪，建議不要泡湯或泡澡。因為高危險妊娠的孕媽咪，較容易早產、出血。對胎兒與母體都會有危險，不如等待生產完恢復後。再享受泡湯之樂。

【提醒六】若在泡湯後才知道已經懷孕，或常洗熱水澡的孕婦。應由專業的婦產科醫師即時作優生諮詢並定期產檢，接受超音波檢查。以便早期發現胎兒有無異常及追蹤胎兒的發展狀況，在醫師指導下服用維生素群及葉酸來預防神經系統缺損。

提醒孕媽咪一定要特別注意自己的體溫，保持在正常的狀況下，也才能保護胎兒的安全。

來源：孕期營養重點

孕 期 營 養 重 點

寶寶從綠豆大的胚胎日漸茁壯，健康均衡的飲食可帶給胎兒和母體健康。爸爸可以掌握以下重點，了解伴侶不同孕期階段的營養需求。

懷孕初期

選擇富含營養且均衡的食物，有助胎兒發育。

蛋黃、綠色蔬菜都是補足葉酸的良好來源。

選用加碘鹽及適量攝取含碘的食物。

全素食者需補充富含維生素十二的食物。

寶寶還在胚胎期，不需要特別增加熱量。孕吐食慾不佳也不勉強，如果孕吐症狀已影響日常生活。可請教醫師。

擔心孕吐造成脫水，可多補充水分並飲用流質的食物，例如：無加糖豆漿、鮮奶、無加糖優酪乳等來補充營養。

懷孕中期

從第二孕期開始，每天可增加三百大卡的熱量。

建議每日攝取一千毫克的鈣質及三百五十五毫克的鎂，有助母嬰健康，也可以預防小腿抽筋。

每天多曬太陽有助合成維生素或是每日補充至少四百的維生素。

懷孕後期

建議每日攝取四十五毫克的鐵質，多補充富含鐵質的食物，例如瘦的紅肉、豬肝、豬血等。

高熱量、高糖分、精製澱粉的食物都要控制，以免體重失控。

來源：孕期牙痛難耐該怎麼辦？

孕 期 牙 痛 難 耐 該 怎 麼 辦 ？

懷孕期間保持定期的口腔檢查，是維持口齒健康的不二法門。牙齒或牙齦疼痛，還是要請牙醫師幫忙檢查喔！

懷孕後期，孕媽咪的牙齒或牙齦疼痛。基本上還是會建議儘快就醫請牙醫師檢查，以舒緩疼痛和避免感染為首要治療目標。其餘進一步侵入性的治療，則會建議等到生產完後再進行完整的療程。

懷孕是莫大的歡喜和福氣，孕媽咪為了照顧自己和小寶貝，務必善用懷孕婦女牙結石清除的健保服務，並定期進行懷孕期間的口腔檢查。若察覺口腔健康狀態不穩定，請儘快就診。專業的牙醫師將能提供您最適切的建議及治療，孕期時。若有口腔相關用藥須諮詢您的牙醫師和藥師。

來源：孕期產檢項目建議指南：羊膜穿刺

孕期產檢項目建議指南：羊膜穿刺

羊膜穿刺檢測染色體異常疾病，最常見如唐氏症

在超音波引導下以細針抽取羊水，可以檢測出染色體數量，及早發現寶寶是否有唐氏症等遺傳性疾病。

唐氏症是一種最常見的染色體異常疾病，也是導致失能、肢體障礙及智能障礙的最主要病因。

政府補助高危險群孕婦羊膜穿刺費用，建議年齡滿三十四歲以上孕婦、曾生育過染色體異常胎兒、或家族成員有染色體異常者，可直接接受羊膜穿刺檢查，以診斷胎兒是否為唐氏症患者。

未滿三十四歲的孕婦可先接受唐氏症篩檢，篩檢結果若為高風險者，應進一步接受絨毛取樣或羊膜穿刺檢查，以確定胎兒染色體是否異常。

來源：孕期疫苗接種

孕期疫苗接種

孕期疫苗接種

孕期接種疫苗是保護母嬰健康的重要步驟。疫苗可提供免疫力，同時保護孕媽咪及胎兒免受感染，確保健康的懷孕生活。

流感

孕期生理狀況的改變，會增加流感的嚴重度與後遺症，因此建議孕婦接種流感疫苗。

孕婦接種流感疫苗，不僅保護自己與胎兒，也間接保護出生後六個月內的嬰兒。

孕婦及六個月內嬰兒之父母皆為公費流感疫苗接種對象，接種時程於每年十月以後實施。

家中其他成員以及照顧者，可以自費接種流感疫苗，避免疾病傳播。

任何孕期都可以接種流感疫苗。

延伸閱讀：【疾病管制署】流感疫苗資訊

疫苗

百日咳是一種急性呼吸道傳染性疾病，透過飛沫或近距離接觸而感染。

小於六個月的寶寶是感染百日咳的高危險群，主要的感染源為媽媽或其他照顧者。

為使母親百日咳抗體傳遞給嬰兒的接種效益最大化，建議於懷孕第二十八到三十六週接種，若懷孕時未接種，則應於生產後立即接種。

與嬰幼兒親密接觸的其他家屬親人，也建議在寶寶出生前施打疫苗，減少感染給嬰幼兒。

建議於孕期第二十八到三十六週自費接種。

來源：孕期皮膚問題多！保養3提醒，遠離乾癢危「肌」

孕期皮膚問題多！保養三提醒，遠離乾癢危「肌」

受到體內荷爾蒙波動的影響，許多女性自懷孕後，都會明顯感受到身體的各種改變，其中「皮膚問題」最讓人受不了！乾癢、黑色素沉澱、紅疹等陸續出現。想要減少這些皮膚困擾，保養三原則趕緊筆記起來。

女性在懷孕期間，情緒及荷爾蒙濃度變化，會對皮膚帶來或大或小的變化，以下列出三個常見的皮膚狀況

，並為孕媽咪帶來解決辦法：

一 色素沉澱

不少孕媽咪會發覺像是腋下、鼠蹊部、膝蓋、乳頭等部位，都會顏色變黑、觸感變粗的情況，甚至是臉部出現所謂的「孕斑」。這些狀況多與體內荷爾蒙變化有關，例如雌激素濃度升高。可能促使皮膚的黑色素細胞增多，導致身體部分部位黑色素沉澱。膚色變黑。

建議媽咪懷孕期間仍要維持防曬的習慣，並以物理性防曬較為妥當，像是外出穿著長袖衣物、配戴帽子、口罩等。如要選擇美白類保養品，成分以維生素為主，避免有害成分影響肚中胎兒。

二 乾燥搔癢

肌膚乾癢，是大多數孕媽咪面臨到的困擾。如孕前就有這類的肌膚狀況，懷孕後隨著身體新陳代謝變快。皮膚生長快速，更是會癢個不停。嚴重的話，還可能在皮膚上留下一道道抓痕。

面對乾癢，最簡單可先從調整飲食內容做起。應儘可能減少攝取油炸、高熱量、辛辣等刺激性食物；可挑選成分天然的乳液，早晚塗抹於肌膚上並按摩使肌膚有彈性。氣候乾冷時，也可加強使用保濕類產品。質地以油狀、膏狀為主，以降低搔癢不適感。倘若痛癢難耐，孕媽咪也不要害怕就醫，醫師能協助開立適合的藥物，讓孕媽咪安心使用。

三 妊娠紋

妊娠紋的生成，多與基因和體質有關。主要原因為肌膚遭受到過度的拉扯，導致皮膚的膠原蛋白及彈性纖維被破壞而斷裂。這些斷裂的疤痕復原後，就會在肌膚表面留下痕跡。這些痕跡就是妊娠紋。妊娠紋常出現的部位有腹部、胸部、臀部、大腿等。

由於妊娠紋一旦生成，要消除就很困難，因此預防工作顯得十分重要！首先是要做好體重管理，標準體位的孕婦。整個孕期體重增加應控制在十至十四公斤左右，而原本較重的孕婦。其增重應更少，而從懷孕初期。就要開始使用乳液、妊娠油等潤膚產品來塗抹，同時搭配輕柔的按摩。以增加肌膚彈性。

肌膚保養三提醒

愛美是女人的天性，想要維持孕前的好狀態，保養工作不能偷懶，以下提醒孕媽咪在進行肌膚保養時的三個要點：

一 產品成分要慎選

懷孕後的媽咪，在使用各種產品時，一定要特別留意成分組成，才不會在無形中增加胎兒的負擔。媽咪們在挑選時，不妨查看一下產品背後的成分表。以不含香精、色素、防腐劑等化學物質為主，成分越單純越好。如能直接選擇孕婦專用的類型更佳！不確定是否安全時，應請教產科醫師。

二 穿著衣物要留意

孕期肌膚較為敏感，在衣物的挑選上需要多留意。像是夏天氣溫高，針對皮膚容易癢、油脂分泌較多的媽咪。穿著衣物就要避免過於緊身，應選擇透氣、寬鬆且棉質的類型。所處環境也要維持舒服的溫度、濕度，以提高肌膚的舒適度。

三 不要害怕就醫

不要擔心藥物會影響胎兒，而不敢就醫，錯過黃金治療期，恐會加重肌膚狀況！倘若已經影響到日常生活，孕媽咪應找尋專業醫師的協助，確認病因，也能進一步確認自己的保養步驟是否正確。醫師都會提供最適合且安全的治療方法，孕媽咪可以放心，不要讓肌膚問題，破壞孕期好心情。

來源：孕期蕁麻疹

孕期蕁麻疹

「妊娠性蕁麻疹」正式名稱為「妊娠搔癢性蕁麻疹樣丘疹及斑塊」是一種懷孕期間發生的皮膚疾病。較容易發生在初產婦、多胞胎妊娠、胎兒體重過重，或懷孕體重增加太多的孕婦。好發於第三孕期左右。發生原因尚不明確，可能與家族遺傳史或孕婦過敏體質有關，但也有學界認為可能和肚皮撐大的張力有關。

妊娠性蕁麻疹的疹子會從肚臍周圍（肚皮張力最大處）開始，沿著妊娠紋生長，逐漸往胸部、軀幹及四肢延伸。初期多為丘疹，亦可能形成斑塊、水泡及類似蕁麻疹的病灶。妊娠性蕁麻疹不會對腹中的胎兒造成影響，反而是準媽媽癢得受不了時。會越抓越癢，還會造成破皮、發炎感染。建議應儘快尋求專業醫師治療，給予塗抹型的止癢藥膏局部使用。若蕁麻疹的分布範圍過大，醫師也會視情況並遵循孕期用藥規則。開立口服的抗組織胺等藥物，所以準媽媽勿諱疾就醫而影響到生活品質及睡眠。

妊娠性蕁麻疹孕婦的日常照護：

一 選擇透氣的衣物：

台灣悶熱潮濕的氣候是加重皮膚搔癢的因素之一，準媽媽可穿上棉製的衣物，除了有助於透氣，還能避免因摩擦刺激皮膚產生搔癢。

二 冰敷：

患部接觸到熱水，會加重搔癢情形。所以不宜用水溫過高的水洗澡，淋浴時以四十度以下的溫水輕輕沖洗肚皮即可；若真的癢到無法忍耐。不妨用濕毛巾或毛巾包冰枕，輕敷在發疹的部位。冰敷時間為十分鐘，間隔五到十分鐘再冰敷一次。以免造成凍傷。

三 減少接觸過敏原：

若準媽媽本身有過敏的病史，懷孕期間應避免暴露會引起過敏的食物、塵蟎等，以免加重皮膚過敏搔癢的情形，或影響到醫師對於妊娠性蕁麻疹的確診判斷。

四 塗擦保濕產品：

冬季的溼度和氣溫較低時，汗腺及油脂的分泌量會隨著減少。若受到冷空氣影響，皮膚就會產生乾燥或皸裂情形。因此，避免過度清潔。適當塗抹皮膚保濕產品，以防皮膚過度乾癢。

來源：孕期貧血三部曲-孕婦可以吃素嗎（影片）

孕期貧血三部曲-孕婦可以吃素嗎

參考影片：八千六百八十

吃素的人容易遇到什麼問題

什麼是巨球性貧血

吃素要怎麼補充營養

一多攝取植物性蛋白質

二飲食多樣化不單調

三依醫囑補充孕期營養品

來源：孕期貧血三部曲-孕期大補鐵！（影片）

孕期貧血三部曲-孕期大補鐵

參考影片：六到一百四十三

為什麼要補鐵

貧血對孕媽咪會有什麼影響

建議鐵的攝取量

可以從哪裡攝取鐵

孕期不貧血三點要注意：

一攝取足夠蛋白質與含鐵豐富的食物。

二搭配維生素豐富的食物，幫助鐵吸收。

三聽從醫囑適時補充鐵劑。

來源：孕期運動的好處及入門指南

孕期運動的好處及入門指南

孕期運動是孕婦維持身心健康的重要部分。適當的運動不僅能改善孕婦的體能和情緒，還對胎兒的發展具有積極介紹影響。然而，孕期運動需要根據個人的健康狀況和懷孕階段來調整。本文將探討孕期運動的好處、常見運

動類型、頻率建議以及特別注意事項，以幫助孕婦安全地進行運動，促進健康的孕期。

孕期運動的好處

提升心肺功能：

適度的有氧運動可以增強心肺功能，改善血液循環。這對孕婦來說尤為重要，因為它可以減少疲勞感並提高日常活動的耐力。

減少妊娠糖尿病和高血壓風險：

定期運動有助於控制血糖水平和血壓，從而降低妊娠糖尿病和妊娠高血壓的風險。

促進良好的睡眠：

運動有助於提高睡眠品質，減少孕期常見的失眠問題。適度的體力活動可以幫助放鬆身心，使孕婦更容易入睡和保持深度睡眠。

緩解腰背疼痛：

隨著孕期的推移，腹部變大會增加背部的負擔。運動可以增強核心肌群，提供更多支撐，從而緩解腰背疼痛。

改善心情，減少焦慮和抑鬱：

運動能促使身體釋放內啡肽，這是一種自然的「幸福激素」，有助於改善情緒，減少焦慮和抑鬱的症狀。

促進產後恢復：

孕期運動可以幫助孕婦在產後更快恢復體力，並且有助於恢復身體狀態。

常見的孕期運動類型

步行：

步行是一種低強度的有氧運動，非常適合孕婦。每週建議步行一百五十分鐘，每次二十至三十分鐘，能夠有效提升心肺功能而不會對關節造成過多壓力。

游泳：

游泳是一種全身運動，能夠減少對關節的壓力，並且有助於放鬆肌肉。水的浮力能夠減輕身體的負擔，讓孕婦在運動時感覺更舒適。

瑜伽：

孕婦瑜伽專為孕婦設計，可以幫助改善柔韌性、平衡和力

量。它還能幫助減輕壓力、緩解背部疼痛以及提高分娩的耐力。

普拉提：

普拉提專注於核心肌群的強化，對於孕婦來說，它可以幫助改善姿勢、增加核心穩定性，並且支援骨盆底肌群的健康。

低強度力量訓練：

使用輕重量的力量訓練可以增強肌肉力量和耐力，幫助孕婦保持適當的體重，並且提高產後的恢復速度。

靜態伸展：

靜態伸展可以幫助改善靈活性，減少肌肉緊張。這種運動類型適合孕婦在日常生活中進行，能夠緩解因孕期體重增加而產生的肌肉不適。

孕期運動頻率建議

第一孕期（未滿十三週）：

在第一孕期，孕婦可以較為輕鬆地進行運動。建議每週進行一百五十分鐘的中等強度有氧運動，這可以分為每天三十分鐘的運動。

第二孕期（十三周至未滿二十九週）：

在第二孕期，孕婦的身體會有更多的變化，因此運動量可以根據個人的感覺進行調整。建議每週繼續保持一百五十分鐘的中等強度有氧運動，並增加一些力量訓練和柔軟性訓練。

第三孕期（二十九週及以上）：

隨著孕期的推進，孕婦可能會感覺身體更加沉重。建議減少運動強度，但仍保持每週一百五十分鐘的運動量。以步行、游泳和輕量瑜伽為主，避免過於劇烈的運動。

孕期運動的特別注意事項

諮詢醫生：

在開始任何運動計畫之前，孕婦應該與醫生討論，特別是如果有高危險妊娠的情況。醫生可以根據個人的健康狀況給出專業的建議和指導。

注意身體訊號：

孕婦在運動過程中應該密切注意自身的身體反應。如果感覺到任何不適，如頭暈、胸痛、呼吸急促或腹部疼痛，應立即停止運動並尋求醫療幫助。

選擇適當的運動類型：

避免進行高強度、劇烈的運動或需要高平衡性的活動，如跑步、跳躍等。選擇低影響性的運動，如步行和游泳，更為安全。

保持水分和營養：

運動過程中要保持充足的水分，並且注意營養均衡。孕婦需要額外的營養支援，以保障自己和胎兒的健康。

穿著合適的運動裝：

選擇透氣、舒適的運動衣物和合適的運動鞋，以支援身體的舒適性和安全性。孕婦的腹部和乳房會隨著孕期增大，需要特別注意支撐。

避免長時間靜態：

長時間的靜態姿勢會導致血液循環不暢，建議在運動中適當休息，並進行伸展和活動，以促進血液循環。

總結

孕期運動對於孕婦和胎兒的健康有著眾多的好處。適當的運動可以提升孕婦的體能、改善心情、減少孕期不適，並且有助於產後恢復。選擇適合的運動類型，保持合理的運動頻率，並且注意特別的健康注意事項，可以確保孕婦在孕期安全、有效地進行運動。

每位孕婦的身體狀況和懷孕經驗都不同，因此在運動計劃的制定過程中，應根據個人的實際情況進行調整。最重要的是，保持良好的溝通和諮詢，以確保孕期的健康和 safety。希望本文能夠幫助孕婦了解運動的好處，並為孕期運動提供有價值的指導。

來源：孕期飲食指南：孕期均衡飲食，促進健康孕育

孕期飲食指南：孕期均衡飲食，促進健康孕育

孕期是一個關鍵的階段，良好的飲食習慣對孕婦和胎兒的健康至關重要。適當的營養攝取可以促進胎兒的正常發育，支援孕婦的身體需求，並幫助預防孕期併發症。本文將探討孕期飲食的核心原則、主要營養素的需求、常見的營養建議，以及如何制定一個營養均衡的飲食計劃，以助於健康孕育。

孕期飲食的核心原則

均衡飲食：孕期飲食應該涵蓋所有主要的食物類型，包括穀物、蛋白質、油脂、乳製品、水果和蔬菜。這樣可以確保攝取足夠的維生素、礦物質和其他必要的營養素。

多樣化食物：通過多樣化的食物選擇來達到營養均衡，避免過於單一的飲食習慣。這不僅能提供全面的營養，還能增加餐飲的樂趣。

適量攝取：控制食物的攝取量，避免過量進食。雖然孕期需要增加營養，但不需要過量進食，以免造成體重過度增加或其他健康問題。

避免危險食品：孕婦應避免食用生鮮或未煮熟的食物，如生魚片、半熟蛋等，以減少食物中毒的風險。某些食物和飲品如酒精和高咖啡因飲料也應該限制或避免。

主要營養素的需求

蛋白質：重要性：蛋白質是胎兒細胞生長和修復的基礎。它對於孕婦的體內組織建設和維護也至關重要。

來源：瘦肉、魚、豆類、雞蛋、奶製品和堅果等食物都是優質蛋白質的良好來源。一般人每日建議蛋白質為體重公斤乘以十一公克，建議孕婦每日攝取增加十公克若孕婦體重是五十公斤，孕期每日建議蛋白質攝取量即為六十五公克五千零一十一萬一千零六十五。

鐵質：

重要性：鐵質有助於製造血紅蛋白，防止貧血。孕婦在孕期需增加鐵質攝取量，以支援胎兒的血液需求。

來源：紅肉、家禽、魚類、豆類、深綠色葉菜和全穀類食品。為提高吸收，建議與富含維生素的食物一同攝取。懷孕初期每日建議攝取量十五毫克的鐵質，後期增加到四十五毫克。

鈣質：

重要性：鈣質對於胎兒的骨骼和牙齒發育至關重要，也有助於維持孕婦的骨骼健康。

來源：奶製品如牛奶、乳酪和優格，此外，深綠色蔬菜如菠菜和甘藍也含有鈣質。孕婦每日建議攝取一千毫克的鈣質。

葉酸：

重要性：葉酸對於胎兒的神經系統發育至關重要，可以幫助胎兒正常發育與成長及神經系統發展，預防神經管缺陷。

來源：深綠色蔬菜、柑橘類水果、豆類和全穀類食品。孕婦每日建議攝取六百微克的葉酸。

維生素：

重要性：維生素有助於鈣質的吸收，幫助生長發育，對骨骼健康至關重要。

來源：富含油脂的魚肉、蛋黃、強化維生素的乳品與豆漿。也可由曬太陽產生，建議露出臉、手臂、腿等部位。於上午十點到下午三點日照較強的時段，每周三到四次日曬十到十五分鐘。即可獲得足夠的維生素。

孕期飲食建議

制定飲食計劃：

餐次安排：建議一天三餐加兩次小吃，保持血糖穩定。每餐應包含多樣化的食物，並注意控制餐量。

均衡配餐：每餐應包含蛋白質、複合碳水化合物、健康脂肪和大量的蔬菜水果。例如，早餐可以選擇全麥麵包配蛋白質食物，午餐和晚餐可選擇含多種蔬菜的肉類或豆類餐點。

增加水分攝取：

飲水量：保持充足的水分攝取對於促進消化和維持健康至關重要。建議孕婦每日要喝足二千毫升的水分。

體重增加剛剛好：

監控體重：孕媽咪體重的增加要以個人的做對照，以為一百八十五到二百四十九為例，孕期平均增加一百一十五到十六公斤為宜。進一步的建議可與專業人員及醫師討論。

選擇低鹽和低糖食物：

減少鹽分：過多的鈉攝取可能會導致孕期高血壓，因此應選擇低鹽食物。

控制糖分：過多的糖分可能會增加妊娠糖尿病的風險，建議減少加工食品和甜食的攝取。

重視食品安全：

食品處理：確保食物充分煮熟，避免食用生食或未經消毒的食品，以降低食物中毒的風險。

清潔習慣：保持良好的手部和食物清潔習慣，避免交叉污染。

常見飲食困擾及解決方案

孕吐：

解決方案：選擇清淡易消化的食物，如全麥餅乾、蘋果、香蕉。避免油膩和辛辣食物，並且可以將餐量分為多次小餐，減少胃部不適。

便秘：

解決方案：增加膳食纖維的攝取，如全穀類、豆類和蔬菜。飲水量的增加也能有助於改善便秘問題。

食慾異常：

解決方案：如果有異常的食慾變化，如強烈的食物渴望，應儘量選擇健康的食物進行滿足。與醫生或營養師討論，以調整飲食計劃。

總結

孕期飲食對於孕婦和胎兒的健康有著深遠的影響。通過均衡飲食、合理安排餐次、適量攝取主要營養素、保持良好的飲食習慣，孕婦可以有效支援胎兒的正常發育，減少孕期併發症的風險。每位孕婦的需求和情況不同，因此，在制定飲食計畫時，應該根據個人的健康狀況和醫生的建議來進行調整。希望本文的指南能夠幫助孕婦在孕期保持營養均衡，促進健康孕育。

來源：孕期體重增加剛剛好！過重、過輕皆不宜

孕期體重增加剛剛好！過重、過輕皆不宜

體重增加剛剛好

孕媽咪體重的增加要以個人的做對照。以為一百八十五到二百四十九為例，孕期平均增加一百一十五到十六公斤為宜。如果是懷雙胞胎的孕媽咪增加建議為一百六十八到二百四十五公斤，請參考以上表格。進一步的建議請與專業人員及醫師討論。

孕媽咪體重過重或過輕對孕婦和胎兒都不好

過輕：孕媽咪營養不良，增加流產、早產的機率與出生嬰兒體重不足。

過重：可能帶來的影響包括妊娠糖尿病、子癲前症、流產、畸胎等。

來源：孕期體重過輕或過重對母嬰健康都有影響

孕期體重過輕或過重對母嬰健康都有影響

孕期體重過輕或過重都攸關母嬰健康，孕婦在懷孕期間應該要控制自己的體重增加，因為在不同的懷孕階段，胎兒成長都需要來自準媽媽的營養攝取。

如果孕婦體重過輕，會造成孕婦營養不良。也會增加流產、早產的機率與出生嬰兒體重不足，甚至增加新生兒死亡率。同時產後恢復也較差，所以不建議孕婦刻意節食及體重增加的太少。而體重增加太多—尤其超重二十以上，可能帶來的影響包括妊娠糖尿病、子癲前症、流產、畸胎等等機會都會比較高。體重增加過多的原因，常是在不知不覺中攝取過量澱粉類或含糖份過高的食物。如甜點、飲料或過量的水果等，易造成熱量過高但營養不均衡情形。影響胎兒發育。

建議整個懷孕過程，以增加十到十四公斤為宜，且須注意各個孕期體重增加的速度。孕期體重增加的調控基準，應參考婦女懷孕前的身體質量指數（，以下簡稱）值來計算。例如，懷孕前婦女小於一百八十五屬於體重過輕者。整個孕期建議增加約一百二十五到十八公斤，於第二、三孕期每週增加五到六公斤；在一百八十五到二百四十九之間者。則建議增加一百一十五到十六公斤，於第二、三孕期每週增加四到五公斤；孕前體重為過重或肥胖、在二十五到二百九十九者。則增加重量建議控制在七到一百一十五公斤；三十、肥胖的準媽媽，整個孕期建議控制在五到九公斤以下。因此，孕期適度增加體重，能幫助生產順利進行，降低因胎兒過大於生產引起的傷害。

準媽媽懷孕期間的體重合理的調控很重要，但過輕或過重對孕婦或胎兒都不好。最好從懷孕初期就瞭解如何正確攝取營養，合理調控孕期體重。孕期體重增加要依孕前體重、體質規劃好自己的飲食生活，均衡攝取營養、適度運動。注意增加的速度，可與醫師或衛教師討論諮詢。才能保障母子健康及生產順利

來源：孕產家庭夫妻關係的維護

孕產家庭夫妻關係的維護

懷孕、生產和照顧寶寶，對媽媽而言很辛苦；對爸爸而言。也很陌生而常常不知所措、無從幫起，所以新手媽媽和爸爸都可能壓力大到有產前或產後憂鬱。需要學習如何當爸媽和照顧人，這是個需要互相照顧學習的時刻。夫妻需要更有耐心來合作，才能互相扶持共度難關。

只是夫妻相處本來就不易，再加上寶寶報到變成複雜的關係，更需要花力氣去適應與經營。夫妻關係的維持是需要夫妻雙方多溝通，以減少衝突的產生。太太可以試著說出你的需求，明確清楚並且具體可行地告訴先生。他對你有多重要，你需要他。先生可以多多擁抱、拍拍太太，讓太太感受到你的愛，壓力才不會這麼大。多數太太都會希望先生多分擔一些家務、多一點時間待在家裡；所以更要多讚美先生幫忙做家事或照顧寶寶，先生得到肯定會願意再繼續做。

除此之外，其實最需要的是夫妻雙方的付出得到對方肯定，自己的付出與辛勞被看到、被稱讚；所以夫妻互相說出肯定支持話，就更能感受到彼此的愛。夫妻任何一方的

努力，都可能創造有寶寶後三人行親密生活的一個新起點。

來源：季節交替，孕媽咪過敏發作怎麼辦？

季節交替，孕媽咪過敏發作怎麼辦？

一到換季，天氣忽冷忽熱，惱人的過敏就找上門了！打噴嚏、鼻塞、皮膚癢，甚至氣喘發作，讓許多孕媽咪苦不堪言。懷孕期間，為了自己和寶寶的健康，如何聰明用藥、預防過敏顯得格外重要。

換季時，孕媽咪易發生的三大過敏疾病

懷孕期間常見的三大過敏疾病分別是鼻子過敏、皮膚過敏，以及氣喘。雖然孕期過敏不會直接影響胎兒，但媽媽如果長時間身體不舒服仍可能間接影響胎兒健康。因此，認識過敏疾病，是預防與應對的第一步。

一

鼻子過敏（過敏性鼻炎）

懷孕期間，荷爾蒙變化會使鼻黏膜更容易充血腫脹。有些孕媽咪可能會出現打噴嚏、流鼻水、鼻塞等症狀，這些不適可能影響睡眠品質、工作效率。進而降低整體生活品質。

二

皮膚過敏（異位性皮膚炎、蕁麻疹）

除了鼻子過敏，皮膚過敏也是孕媽咪常見的困擾。懷孕期間皮膚變得更加敏感，受到天氣變化、衣物材質不當、汗水刺激的影響，會出現紅疹、搔癢等症狀，甚至影響情緒。若孕媽咪本身患有異位性皮膚炎，孕期症狀也可能會加重。此外，接觸過敏原也可能突然引發蕁麻疹。

三

氣喘

若孕媽咪本身有氣喘病史，懷孕期間可能會發作，約有三成孕婦的氣喘會加重。氣喘發作時，會出現咳嗽、胸悶、呼吸困難等症狀，嚴重時甚至影響胎兒供氧，長期缺氧可能影響胎兒發育。

孕媽咪過敏怎麼治療？藥物

使用須知

孕期發生過敏時，應及時處理，避免症狀加重或影響生活品質。而孕媽咪們最關心的莫過於藥物的使用，因為孕媽咪總是會擔心，使用藥物會不會影響胎兒健康。其實，

只要遵照醫師的建議用藥，就可確保安全。

常見過敏治療方式

鼻子過敏：

醫師會開立對孕婦安全的鼻噴劑或口服

抗組織胺藥物，並建議使用生理食鹽水清潔鼻腔，以緩解鼻塞。

皮膚過敏：

醫師會開立外用類固醇藥膏或口服抗組織胺藥物來緩解搔癢與紅腫。日常保養則應加強保濕照護，維持皮膚屏障功能。

氣喘：

醫師會開立吸入型類固醇或支氣管擴張劑來控制氣喘，避免嚴重的呼吸困難。若對用藥仍有疑慮，媽咪可與醫師充分溝通。了解藥物的必要性與安全性，切勿因過度擔憂而延誤治療。反而導致更嚴重的情況。

如何預防孕期過敏發作？

食

減少食用容易引起過敏的食物，例如帶殼海鮮、堅果類、牛奶等。

選擇天然、新鮮的食物，避免加工食品與油炸物。

多攝取當季新鮮蔬菜水果，補充維生素，以提升身體抵抗力，減少感染。

衣

穿著棉質透氣、舒適的衣物，避免化學纖維刺激皮膚。

流汗時應擦乾汗水，如能及時洗澡更佳。

清洗衣物時，選用溫和洗衣精，避免殘留刺激物。

住

定期清潔居家環境，減少塵蟎與黴菌滋生，降低過敏原。

使用防蟎寢具，並以熱水清洗，減少塵蟎影響。

使用空氣清淨機，過濾空氣中的過敏原，保持室內空氣清新。

室內保持適當濕度，避免過於乾燥或潮濕，可使用除濕機

或加濕器調整。

保持充足的睡眠也很重要，良好的睡眠品質能幫助身體維持正常功能。

行

外出時避開花粉、灰塵、空氣污染嚴重的場所，減少接觸過敏原。

戴上口罩，減少吸入過敏原或冷空氣對鼻黏膜及氣管的刺激。

做好防曬措施，避免紫外線刺激，降低皮膚過敏風險。

適度運動、放鬆心情，調整免疫力，可降低過敏發作機率。

懷孕是場奇妙又充滿挑戰的旅程，季節交替帶來的過敏問題確實讓人頭疼，別擔心！只要掌握正確的知識，做好預防或及早適當治療事項，就能讓這段旅程更輕鬆愉快。當個聰明的孕媽咪，妥善照顧自己，和寶寶一起迎接健康、舒適的孕期吧！

來源：孩子睡眠不足 近視風險增9倍

孩子睡眠不足近視風險增九倍

對學童來說，過度用眼、睡眠不足等皆是導致近視的重要因素。充足睡眠對成長階段兒童可促進神經系統和腦部發育、安定情緒及放鬆全身肌肉，包含眼球肌肉的休息與組織修復等。故充足的睡眠是兒童近視防治的重要方法之一。依據美國國家睡眠基金會推薦的睡眠時間：學齡前兒童三到五歲為十到十三小時、國小學童六到十三歲為九到十一小時、青少年十四到十七歲則為八到十小時。

增加睡眠時間能降低近視風險

依據國民健康署一百零六年「兒童青少年視力監測調查」顯示，睡眠時間不足九小時比睡眠時間達九小時者。近視風險增加九百零四倍；然而，我國幼兒園幼童及國小學童睡眠時間八小時以下者佔十五。而國中生及高中生睡眠時間八小時以下者則高達八百九十五，其中有二百二十七甚至六小時以下。因此，家長應注意孩子是否有充足的睡眠。才能維護好視力。

家長的督促幫助孩子降低近視的威脅

父母對近視的防治行為，對於孩子罹患近視的比率有影響。研究結果指出，無近視的孩子。有五百零六的家長「經常總是」要求孩子晚上十點幼童為八、九點左右就上床睡覺，並注意孩童用眼環境、當孩子抱怨不舒服立刻帶他就醫、且讓孩子每日均衡飲食不偏食。但有近視的孩子

，只有約三十五的家長會如此；因此。家長採取積極行為有助孩子的視力保健。家長在幼兒園及國小階段就為孩子建立近視防治的生活型態，建議幼兒園孩子晚上九點前、學齡孩子十點前就寢，有充足的睡眠、均衡的營養外，也要注意用眼環境與適度限制孩子近距離用眼時間。多一分把關，就能幫助孩子從小養成護眼用眼的好習慣。

護眼一百二十三防治近視免煩惱

一 每年定期檢查視力一到二次，做好視力存款。

二 未滿二歲避免看螢幕，二歲以上每日不要超過一小時。

三 每日戶外一百二十分鐘以上，用眼三十分鐘休息十分鐘，早睡早起充分休息。

來源：孩子被診斷為異位性皮膚炎怎麼辦？從病因、診斷、治療到日常照護全解析

孩子被診斷為異位性皮膚炎怎麼辦？從病因、診斷、治療到日常照護全解析

季節交替時，常讓「異膚」寶寶苦不堪言。異位性皮膚炎可能造成孩子皮膚搔癢，甚至紅腫脫屑，不僅影響外貌，更影響生活品質。該如何治療並預防復發？

異位性皮膚炎是一種慢性、反覆搔癢發炎的皮膚疾病，也是常見的兒童過敏性疾病之一。台灣兒童盛行率不算低，且年紀越小罹患比例越高。雖然半數以上病人在五歲後能自行好轉，但仍有部分患者持續至成年，一輩子都受疾病所苦。

多重因素導致異位性皮膚炎

異位性皮膚炎並非單一原因造成的疾病，而可能是遺傳、皮膚障壁功能缺失、外在過敏原或刺激，以及免疫功能失調等多重因素共同影響。

遺傳基因

約七成患者有異位性皮膚炎家族史，若父母本身具過敏體質（如氣喘、過敏性鼻炎、濕疹等），子女自小罹患異位性皮膚炎的風險將大幅提高。

皮膚障壁功能缺失

研究也發現，異位性皮膚炎擁有特定基因變異。影響皮膚合成與維持天然保濕因子的能力，導致皮膚屏障功能受損。水分更容易流失。

外在過敏原或刺激

異膚患者因皮膚屏障功能較弱，對外在環境刺激特別敏感，容易因接觸過敏原或刺激物而誘發或加重症狀。常見

的過敏原包括：食物（如牛奶、蛋、豆類、花生、堅果類與有殼海鮮）及環境（塵蟎、動物皮屑、黴菌等）；刺激因子則有汗水、毛料衣物、乾燥氣候、化學清潔劑，以及情緒壓力。

免疫功能失調

在基因、皮膚屏障缺損與外在刺激的交互影響下，異膚患者的免疫系統更容易產生過度反應，進而誘發皮膚的過敏性發炎。

異位性皮膚炎常見症狀與併發症

異位性皮膚炎發作時，就好比萬隻螞蟥在身上爬，卻怎麼抓也無法止癢。若症狀加劇，皮膚甚至會破皮、流血或滲出組織液，嚴重影響患者生活品質。

常見臨床症狀包括：

一紅斑、丘疹、劇烈搔癢。

二皮膚破皮、脫屑、潰瘍，並流血／組織液。

三因發炎、搔癢而使皮膚變厚、粗糙，伴隨膚色黯沉且不均。

四典型好發部位如四肢關節處、臉頰、頭皮、耳部、頸部、軀幹，有時也會在眼周與口周等區域出現。

此外，異膚患者因皮膚發炎反應頻繁。也容易併發細菌或病毒感染，像是金黃色葡萄球菌或鏈球菌感染引起的毛囊炎、膿痂疹、及蜂窩性組織炎。以及併發單純性疱疹病毒感染。

如何診斷異位性皮膚炎？

異位性皮膚炎可能發生於任何年齡層，但以兒童為主，約有六十的患者在一歲以前就會出現症狀，是嬰幼兒常見的過敏性皮膚疾病之一。診斷主要依據臨床病史與皮膚表現：

皮膚搔癢

出現超過六個月以上慢性且反覆的皮膚炎、濕疹病灶

依年齡而異的典型皮膚症狀與發作位置

擁有家族過敏性體質，如過敏性鼻炎、異位性皮膚炎

異位性皮膚炎的多元化治療

長期以來，異位性皮膚炎患者常陷入「治療、復發、再治療、再復發」的惡性循環中。但隨著醫療進步，治療選擇趨於多元，甚至可從源頭抑制發炎與搔癢，為患者帶來更穩

定的控制成效。無論何種治療，核心目標都在於舒緩症狀、減少發炎與搔癢，並預防傷口惡化或細菌感染等併發症。

傳統藥物

抗組織胺：為主要治療藥物，可有效控制搔癢。

抗生素：僅於皮膚出現感染風險時使用。

類固醇（口服／外用）：可迅速抑制急性發炎、止癢及紅腫反應，緩解不適症狀。

口服免疫抑制劑：非類固醇藥，可抑制引起異膚的發炎細胞，但同時也影響其他血球和身體器官功能，造成一些副作用。

新一代治療

外用局部免疫抑制劑：不含類固醇的免疫調節藥物。

生物製劑：為注射針劑，透過精準阻斷特定發炎物質達到治療效果，不會抑制整體免疫系統。

口服小分子標靶藥：透過精準阻斷特定發炎物質達到治療效果，優點是不會抑制整體免疫系統。

異膚患者的日常照護

除了藥物治療，異位性皮膚炎的長期管理更仰賴日常生活中的照護與調整。養成良好的生活習慣，是控制病情、減少復發的關鍵。

一 飲食：

避免接觸易引起過敏的食物，少吃精緻零食，有助改善膚況、減少濕疹發作。

二 衣物選擇：

穿著以寬鬆棉質為主，避免羊毛、尼龍等刺激性布料，保持身體涼爽、減少流汗。

三 居家環境：

定期清潔寢具與環境，降低塵蟎、黴菌與灰塵等過敏原；夏季可待在空調涼爽處減少出汗。

四 肌膚保濕：

每日沐浴後可搭配濕敷、塗抹保濕劑、乳液，幫助鎖水、減緩乾癢症狀。

五 清潔產品：

使用溫和無香精、無色素，並標示適用於「敏感肌膚」的產品，避免刺激皮膚。

異位性皮膚炎雖然目前尚無法根治，但透過及時的診斷、正確的用藥與日常生活照護，大多數患者皆能有效控制病情、減少發作頻率。隨著治療科技持續演進，異膚患者也能擁有更安全、長效的治療選擇，重拾健康與生活品質。

來源：安全理想的離乳

安全理想的離乳

根據理論與各種研究顯示，人類嬰兒自然離乳時間約在二到三歲到六到七歲之間，離乳的時機是由母親與嬰兒自行決定的，我們應該尊重每位母親與嬰兒。基本上，在哺乳很順利的情況下。我們鼓勵母親持續哺乳到孩子自然離乳，當然若母親覺得哺乳已經造成困擾或不適。讓孩子逐漸離乳也是很合理的選擇。

哺乳母親可以先省略孩子最不想吃的那餐，避開孩子想吃奶的環境。在哺乳前先餵食適當的副食品，並由他人餵食等等。以一段時間逐漸減少餵奶次數是比較建議的方式。以漸進式的方式離乳對母親與孩子來說都有好處，孩子比較能接受，母親較不會有脹奶甚至乳腺炎的困擾，也比較有心理準備。也可與孩子約定好離乳時間，例如領紅包、放煙火或是生日那天。並在之前不斷預告，結果孩子果然在那天和平離乳。皆大歡喜想提醒大家的是，當孩子身心都準備好時。他自然就會完全離乳了，過於激烈的手段反而容易引起孩子的反彈。

如果已經哺育一段時間建立奶水量後的母親需要離乳時，建議母親先減少單次擠奶量。或另外一種常見的狀況是擠奶的母親擠奶量太大，希望下修擠奶量。若下修擠奶量一次太多，反而容易造成脹奶或乳腺阻塞的問題。

建議方法：

穿著較貼身且包覆佳的胸罩、避免刺激乳房、使用冷敷或敷高麗菜葉，並在需要時使用止痛藥。

用一個星期或更長的時間，逐漸減少哺乳或移除的奶水量，是最舒服的方法，也比較不會有脹奶或乳腺炎的困擾。

例如原本每次擠一百五十，請擠到一百三十就停止。過兩三天不會覺得太脹奶了，就改擠一百一十。依此原則慢慢減少。

選定某次最想停止的擠奶時間，逐漸減少擠奶量，通常擠奶量少於一百時可以停止該次擠奶。

在減少擠奶量的過程中，如果覺得乳房太脹不舒服。可以去廁所用手擠出少許奶水舒緩脹痛，過程中可以冷敷或敷高麗菜葉。減緩乳房脹痛。

媽媽也經常會問食療與退奶藥是否有幫忙目前對於離乳的食療並無實證研究，在臨床經驗中。韭菜的效果很普通，奶量大的媽媽大部分沒啥感覺；人蔘和炒麥芽是比較多媽媽認為有效的食療。乳汁製造與腦下垂體分泌的泌乳素有密切關係，研究指出麥芽有抑制泌乳素（ PRL ）的作用主因是含有麥角胺（ Erg ）、維生素六、生物鹼（ Alk ）等。生麥芽和炒麥芽都有退奶的效果，關鍵點在於量之多少。小劑量發奶，大劑量服用則退奶六十。但也不是萬靈丹，還是得配合上述越餵越少或越擠越少的減奶方法。生理上泌乳激素不可能因為吃了退奶藥或退奶食物就降到零，如果期望吃了退奶藥就不用處理脹奶的媽媽可能要失望了。已經在乳房中的奶水還是得移出或吸收掉，各種減少乳房腫脹的方法也得學會。

總之，希望每位媽媽找到適合自己的哺乳方式。不論是在哺乳的開始或結束時遇上狀況時，都利用正確安全的方式來處理。選擇正確的方法離乳，才能減少併發症的產生。

來源：寶寶一歲半至二歲 您會關心的事

寶寶一歲半至二歲 您會關心的事

給爸媽的叮嚀：

不要讓寶寶獨自在家裡或院子裡，尤其是靠近汽車的馬路上更是要看緊。

當寶寶抗拒您或去結交新朋友，這很正常，不用擔心。

每天陪伴寶寶，傾聽寶寶說話，了解他們的想法，尊重寶寶的意願。

幫助寶寶表達自己的感情與想法，教導他們記得自己的名字。

讓您的寶寶遠離爐子、滾燙的液體、火柴、打火機等危險用品，防止燙傷。

開始教導寶寶上廁所。

如何和寶寶互動：

二歲以下幼兒不看螢幕，二歲以上每天看螢幕不要超過一小時，有視覺異常症狀應看眼科醫師。看電視時需要在旁陪同並一起討論您所看到的，以引導寶寶思考。

您的寶寶可能會喜歡重複聽同樣的故事，可以停止一個故事讓他們學習動物的叫聲或是讓他們完成故事的其中

一部份。

注意您的寶寶如何回應新見面的朋友或新環境的情況。

不要取笑寶寶的恐懼，或使別人驚嚇您的寶寶。

幫助您的寶寶與其他孩子玩耍，但不要期望他會共享，這是正常的行為。

來源：寶寶三至七歲 您會關心的事

寶寶三至七歲 您會關心的事

給爸媽的叮嚀

:

尊重您的孩子並傾聽您孩子的需求。

教導您的孩子甚麼是對的，甚麼是錯的。

幫助您的孩子為自己做事情。

讓孩子養成吃早餐的習慣，三餐正常，避免孩子食用營養價值低的食物，如糖果、汽水類等。

與老師保持良好溝通，若您覺得孩子做得不是很好，可請老師幫忙評估；如果您認為孩子需要額外的幫助或輔導，可與老師討論。

教導您的孩子學會保護自己，不隨便和陌生人交談，遇到甚麼事情一定要告訴父母。

傾聽孩子每天在學校發生的事情，不管事情是好的還是壞的。

做一個讓孩子學習的好榜樣。

如何和孩子互動

:

幫助您的孩子處理憤怒，如憤怒的時候可走開或到別的地方去玩。

孩子開始需要上學，上課前帶孩子去看學校認識環境和跟老師打招呼。

陪伴孩子念書。

可以帶孩子到圖書館，讓他們選擇自己想要看的書籍。

讓您的孩子做家務，並期望他們完成工作。

常常擁抱與讚美您的孩子，如他有良好的行為和在學校表現良好時。

教導您的孩子遠離危險地方，如火爐、水池旁。

教導您的孩子不要讓陌生人碰觸身體或私處。

來源：寶寶二至三歲 您會關心的事
寶寶二至三歲 您會關心的事

給爸媽的叮嚀：

所有的家庭成員需達成共識，有相同的家庭規則，並鼓勵孩子良好的行為。

要注意，您的父母可能有不同的教育方式。

每當孩子靠近水的地方，包括水桶、水池、上廁所，應當提高警覺，在旁注意。

教導您的孩子如何管理憤怒的情緒，如獨處冷靜後才說話。

周末假日時參觀動物園、博物館和其他地方，幫助您的孩子學習。

確保家裡的窗戶不被孩子推開爬出，可在窗戶外安裝鐵架或讓孩子遠離窗邊。

讓您的孩子遠離爐子、滾燙的液體和浴室洗澡水、火柴、打火機等危險用品，防止燙傷。

如何和孩子互動：

進行戶外活動時，限制孩子在陽光下的時間，幫孩子戴上一頂帽子和擦防蚊液，做好保護措施。

您的孩子可能會要求讀同一本書一遍又一遍。養成孩子閱讀的習慣。

教導您的孩子在觸摸動物之前需要事先詢問。

到處都是讓孩子學習的機會，例如看到超級市場的水果招牌等都是教材。

讓您的孩子與其他幼兒一起玩耍，從而學習與他人相處。

來源：寶寶二至四個月 您會關心的事
寶寶二至四個月 您會關心的事

給爸媽的叮嚀：

有私人的時間。

與每個孩子有單獨相處的時間。

鼓勵另一半幫忙照顧寶寶。

如果有需要，選擇一個受過訓練且成熟負責的保母。

每天擁抱寶寶，對著寶寶唱歌與說話。

按摩寶寶使他容易入睡。

如何和寶寶互動：

保持日常生活習慣，如餵食、午睡和晚上睡覺的時間需固定。

午睡和晚上睡覺的時間，不管寶寶是醒著或是昏昏欲睡，都放在寶寶床上。

降低寶寶的床墊，使他坐起來也無法越過床欄，並應隨時保持床欄立起。

了解寶寶的喜惡。

鼓勵寶寶主動玩耍，如給寶寶鏡子或鮮豔的玩具，讓他們握著。

當寶寶哭鬧的時候，給寶寶一個奶嘴。

經常與寶寶說話。

來源：寶寶出生後必做的重要篩檢！新生兒先天性代謝異常疾病篩檢項目有哪些？

寶寶出生後必做的重要篩檢！新生兒先天性代謝異常疾病篩檢項目有哪些？

新生兒篩檢可及早發現無明顯症狀的代謝異常疾病，掌握治療時機，降低對健康與發展的影響，是寶寶出生後第一個、也是不可忽略的重要檢查。

新生兒篩檢何時做如何做？篩檢流程為何？

寶寶出生後，爸媽最關心的就是孩子是否健康。但有些先天性代謝異常疾病，在新生兒階段幾乎沒有明顯症狀。一旦症狀明顯時，往往病情已經發展。甚至可能造成無法逆轉的神經或身體損傷。

因此，透過新生兒篩檢機制，能及早發現這些不易察覺的代謝異常疾病，並在黃金時間內進行治療與控制。

新生兒篩檢時機做法

醫療院所會在寶寶出生後四十八小時，採集少量腳後跟血液，進行先天性代謝異常疾病的篩檢。衛福部國民健康署建議，應儘早在出生四十八小時內完成篩檢，別因擔心影響未來投保而延後，錯失早期發現與治療的機會。

新生兒篩檢流程

新生兒血液採集後，醫療院所會將樣本寄送至國民健康署指定的新生兒篩檢中心合約實驗室進行檢驗，篩檢結果通常可於兩週內得知。

同時提醒爸媽，在尚未收到篩檢結果前。請避免讓寶寶接觸禁丸（俗稱臭丸），也不要自行給寶寶服用任何藥物。以免影響健康。

政府補助的篩檢項目有哪些？常見的代謝性疾病介紹

目前政府補助的常規新生兒篩檢項目，共二十一種先天性代謝異常疾病，包括：

葡萄糖-六-磷酸鹽脫氫酶缺乏症

先天性甲狀腺低能症

先天性腎上腺增生症

中鏈醯輔酶去氫酶缺乏症

戊二酸血症第一型

苯酮尿症

異戊酸血症

甲基丙二酸血症

高胱胺酸尿症

楓漿尿症

半乳糖血症

瓜胺酸血症第型

瓜胺酸血症第型

三羥基三甲基戊二酸尿症

全羧化酶合成酶缺乏

丙酸血症

原發性肉鹼缺乏症

肉鹼棕櫚醯基轉移酶缺乏症第型

肉鹼棕櫚醯基轉移酶缺乏症第型

極長鏈醯輔酶去氫酶缺乏症

早發型戊二酸血症第型等

最常見的兩種疾病說明如下：

一 葡萄糖-六-磷酸鹽脫氫酶缺乏症（-六-缺乏症）

俗稱「蠶豆症」，是台灣常見的遺傳性疾病，大約每一百個寶寶中，就有三個可能患病。

這是由於寶寶體內紅血球的葡萄糖代謝出現異常，當接觸到特定物質時，像是：吃蠶豆、接觸茶丸、擦紫藥水或服用磺胺類、解熱鎮痛藥等，就容易引發急性溶血性貧血。

若未及時處理，可能會導致核黃疸，影響寶寶的腦部發育與智能，甚至有生命危險。

患有蠶豆症的寶寶，在剛出生時比一般寶寶更容易出現較嚴重的黃疸反應。如果寶寶在出生後幾天內黃疸明顯加劇，應該進一步檢查是否患有此症，才能及早預防後續風險。

二 先天性甲狀腺低能症

這是一種可能影響寶寶發育的先天性疾病，平均每三千個新生兒中，就有一個可能罹患。剛出生時大多看不出異狀，直到兩至三個月大後，才會陸續出現症狀。

造成這個疾病的原因，是寶寶體內缺乏甲狀腺荷爾蒙，影響腦部神經與身體發育。如果六個月大才開始治療，可能會導致智能障礙、身材矮小或發展遲緩。

但只要在出生後一至兩個月內及早發現，並開始補充甲狀腺素，大多孩子仍可擁有正常的智能與身體發育。因此，透過新生兒篩檢及早診斷，是守護寶寶健康的關鍵一步。

新生兒篩檢異常時，下一步該如何做？

當新生兒篩檢報告異常，醫療院所會通知家長返院複檢。此階段僅為「疑似陽性」，並非確診。這時，需要帶寶寶再進行抽血複檢。以進一步確認結果。初篩異常不等同罹病，確診需經由後續檢查判定；同樣的，即使結果為陰性，也不代表未來完全不會發病。

如果真的確診，只要儘早開始治療，大多可以把對寶寶健康和發展的影響降到最低。新生兒篩檢的目的，就是早發現、早處理、早安心。

來源：寶寶出生至二個月 您會關心的事

寶寶出生至二個月您會關心的事

給爸媽的叮嚀：

一當心情不好或連續幾天覺得好累時，記得找家人或朋友幫忙。

二在寶寶睡覺時，嘗試也跟著一起休息或睡覺，但須在不同床鋪。

三如果寶寶有哥哥姊姊，可以讓他們用安全的方式幫點小忙，並且也請爸媽分一點時間與大孩子單獨相處。

四如果有人提供給您不喜歡的建议，微笑稱謝就好。

五記得照顧好自己才有精力照顧寶寶。

六別忘了做產後檢查。

七如果要返回職場或校園，可以提前做規劃。

八幫助寶寶換尿布後應洗手。

九日光或白色燈光下仔細觀察寶寶皮膚及糞便的顏色，比對嬰兒黃金九色卡。

十從戶外或工作地返家，在摟抱、親吻或餵食小孩之前，務必更衣洗手。

如何和寶寶互動：

一可以開始每天玩與洗澡。

二可以溫柔地摸寶寶的頭或輕輕地搖他讓他覺得舒服。

三喝奶睡著時，可以拍他、換尿布，或脫掉一些衣服讓他醒來繼續喝。

四讓寶寶和您在同一個房間，在自己的小床裡仰睡，嬰兒床的床欄間隔要小於六公分，且床欄應保持拉起。

五寶寶是透過哭聲來表達情緒或是生理需求，而且寶寶在六到八週大時可能更會哭。寶寶哭時可以跟他說話、拍他、摸他、抱他，或輕輕搖他來安撫他。

來源：寶寶十個月至一歲半 您會關心的事

寶寶十個月至一歲半您會關心的事

給爸媽的叮嚀

設置簡單且短的規則，不要體罰或對寶寶大吼大叫。

要有耐心面對寶寶凌亂飲食和玩耍。要記得您的寶寶正在學習。

確保寶寶所在的地方安全。

確保每個人都關心寶寶，給予健康的食物。避免吃甜食，使用同樣的規則。維持紀律。

幫助寶寶上廁所，在換尿布後和飯前應洗手。

當寶寶表現良好時，請適時的讚美他；當表現不好時，請利用簡短且清楚的句子告知他。

母親為型肝炎表面抗原陽性的寶寶，應於出生滿十二個月大時進行型肝炎表面抗原及型肝炎表面抗體-等檢測。

如何和寶寶互動

讓寶寶學習選擇。給予兩個不錯的選擇，如香蕉或蘋果，或兩本最喜歡的書，只能其中擇一。

在新環境、新朋友面前，寶寶可能會感到焦慮不安，這是正常的，請安慰他們。

讓寶寶有機會嘗試新食品，並允許他們用嘴巴或手觸摸食物，從而學習。

不要期望寶寶會分享，他可能嘗試獨立並維護自身的利益，這時期是正常的表現，不用擔心。

教導寶寶不傷害其他人或動物，如不打人、不咬人。

教導您的寶寶如何用字彙，如用手勢搭配言語。

來源：寶寶咬乳頭的處理方式

寶寶咬乳頭的處理方式

親餵時被寶寶咬乳頭是非常疼痛且不舒服的經驗，媽媽在整個餵奶的過程中會非常緊張害怕寶寶是否會再咬乳頭，而無法放鬆的享受餵母乳的過程，通常這樣的情況並不需要離奶。您需釐清寶寶咬乳頭的原因給予正確的資訊及協助。

寶寶會咬乳頭有許多原因，大部分的原因是寶寶將要長出第一顆牙齒。或其他可能原因例如是：感冒或耳朵感染（使得寶寶吞嚥困難，鼻子塞住難以呼吸）。要吸引媽媽注意等。

下列的一些方法能減輕寶寶咬所致的疼痛，以協助您渡過這個過程，但是並不能馬上讓寶寶不咬您的乳頭。

您遇到這樣的狀況時需保持冷靜取代因疼痛而做出的劇烈反應，這樣會破壞您和寶寶之間親密關係。此時只需將寶寶往您的胸部攬，讓寶寶的鼻子被乳房稍悶住。他的嘴巴自然會張開。

此時檢查您的乳頭有無受傷，若受傷擠出乳汁塗於乳頭上，自然乾燥即可。

後續您可以試著做：

一 您可以以嚴肅的口氣而且持續地告訴寶寶不可以咬乳頭，咬乳頭媽媽的感覺是如何，並稍暫停此次哺乳。有的媽媽會於每次餵奶前提醒孩子不可以咬乳頭，如此反覆的與寶寶溝通，也能感受到不錯的效果。

二 教育孩子哪些東西可以咬，如：固齒器。毛巾，米餅。水果…等等，但媽媽的乳頭不可以咬。

三 若寶寶有感冒的狀況，建議媽媽採直立的方式餵奶，較能幫助寶寶呼吸，寶寶比較不會有咬乳頭的狀況。

四 若因長牙所引起的牙齦不舒服，可在餵奶前給予乾淨的冷毛巾，或冰涼的固齒器以緩和牙齦腫脹的不舒服。較大孩童可提供冰涼的副食品，例如：切塊的蘋果或梨子。

五 寶寶覺得您忽略他了，仔細想想在什麼狀況下寶寶容易咬乳頭。例如您一邊餵奶一邊做別的事，如講電話、與別人聊天。看電視等。這時孩子在提醒您，我在喝也需要同時和您有眼神和肢體的接觸。

六 當您有其他情緒壓力時，寶寶也會感受到。有的孩子也會以咬乳頭表現，此時媽媽需要給自己一點時間跟家人或好友談談。找出紓解壓力的方法。

七 當孩子還不想睡的時候，您要強制以餵奶讓寶寶睡覺時，寶寶也會咬乳頭。

來源：寶寶哭鬧如何安撫

寶寶哭鬧如何安撫

長輩總是叮嚀不要讓寶寶習慣被抱，哭的時候放回床上，避免寵壞孩子。然而這樣的方法卻使寶寶情緒更激動的哭鬧。大人們可以依照自己意願去滿足身心基本需求，但嬰兒無法自行取得，因此需要仰賴照顧者的給予，寶寶哭泣就是需求的發聲。嬰兒從出生起，就有對食物、對依附對象情感互動和反應環境安全的需要。若基本需求無法得到滿足，擔心會影響其心理健康。

嬰兒若經常處於高壓力狀態，如嚎哭、飢餓和尿濕時未被妥善處理。會促使嬰兒腦分泌壓力賀爾蒙，長期處於高警覺狀態。使神經路徑過度活躍帶來腦部生理改變，導致肌肉緊張、睡眠困難、容易受到驚嚇。更使照顧者難以安撫穩定嬰兒。

寶寶情緒不佳時，寶寶有能力讓自己冷靜並調整情緒，像是：吸吮自己的手、觸碰或撫摸自己的手腳、與您眼神交流或觸摸您。如果寶寶整晚持續哭鬧，可能是希望您在旁陪伴。擁抱並不會寵壞孩子，這樣做穩定寶寶心理安全感。哭鬧難以安撫的狀況才能改善。

以下提供一些安撫寶寶的技巧

當寶寶哭鬧時，請留意可能的問題及其需求，並給予適度的安撫。

不要劇烈搖晃寶寶。

輕聲細語跟寶寶說話並撫摸寶寶的背部，來緩和情緒。

如果寶寶已被安撫，勿逗留在寶寶的房間裡。

如果寶寶又醒來和哭鬧，請重複以上的步驟。

這段時間不要餵食、逗玩寶寶，才可以讓寶寶學習安撫自己的情緒並再次睡著。

隔天別忘了讚賞寶寶的努力。

在白天盡量覺察並多滿足孩子的各項需求，包括足夠進食量。擁抱、安撫及吸吮的需求，睡覺前提供一餐奶或副食品增加飽足感。並於睡覺前一到二小時多安撫寶寶。夜間爸爸的角色其實很重要，有些媽媽是餵完奶讓爸爸抱寶寶，搖搖他哄他入睡，半夜也是。藉由環境營造、夜間點小夜燈，或讓寶寶聽輕音樂等方式調整，待寶寶習慣後，再慢慢減少光線亮度及聲音。

來源：寶寶四至十個月 您會關心的事

寶寶四至十個月 您會關心的事

給爸媽的叮嚀：

需要有耐心地幫助寶寶學習獨自把食物吃完。

要堅持原則，禁止驚嚇或吆喝寶寶。

保持家裡安全，不要經常對寶寶說「不行」。

只有當寶寶可能會受傷或傷害到別人的時候，才說「不行」。

一次給予一種新食物，不要強迫寶寶進食，可以選擇不同稠度或能引起寶寶興趣的食物給寶寶吃，建議每天準備三餐和二到三次的點心給寶寶食用。

汽車安全座椅需後向式並置於後座，嚴禁置於前座。

如有疑慮或有困難無法解決時，請尋找外界的協助。

常用清水或紗布幫寶寶清洗口腔。

無卡介苗接種禁忌者，請於出生滿五個月建議於出生滿五到八個月完成卡介苗接種。

如何和寶寶互動：

為您的寶寶維持日常的生活習慣。

在睡前一個小時，可有溫馨的親子時間，也讓寶寶鎮定下來。

如果寶寶晚間醒來，在旁查看但不要把牠抱起。

注意寶寶的行為，這階段牠會探索家裡和外面的世界。

當把玩具拿開，寶寶會哭是很正常的，請保持冷靜。

給予寶寶玩球、玩具磚塊等適合該年齡層之安全玩具。

不要讓寶寶看電視和電腦等螢幕。

利用簡單的詞句，告訴寶寶您想要牠做什麼。

每天與寶寶說話和唱歌。

來源：寶寶夜間喝奶次數多，添加配方奶降低餵奶次數好嗎？

寶寶夜間喝奶次數多，添加配方奶降低餵奶次數好嗎？

夜間餵奶對乳汁的製造很有幫助，因為泌乳激素在晚上的濃度較高。有些寶寶在夜裡喝到母乳量是全天量的二十，如果寶寶需要在夜間吃奶而吃不到奶。可能會影響寶寶的生長。另外催產素與泌乳激素可以幫助正在餵母乳的媽媽放鬆，使她想睡。建議媽媽晚上仍需要依寶寶的需求餵奶，媽媽可以學習躺著餵奶，或隨著寶寶的睡眠時間調整自己的作息，亦能得到適當的休息。

在晚上添加配方奶或許會讓媽媽短暫地好睡些，但是寶寶可能在吃了配方奶後。反而不舒服而哭鬧，也容易影響寶寶直接吸吮乳房的意願。進而造成乳頭混淆。媽媽本身也會因為沒有餵奶而造成乳房腫脹不適，而且寶寶吸吮減少也會逐漸使奶水製造減少。

來源：寶寶對媽媽食物過敏的處理方式

寶 寶 對 媽 媽 食 物 過 敏 的 處 理 方 式

建議媽媽維持平常的進食型態（包括進食種類、量及次數），不要刻意吃大量的特定食物（如：把牛奶當開水喝）。寶寶可能對媽媽食物中一些蛋白質過敏。牛奶、豆、蛋及奶製品、麥、玉米、花生及堅果都可以造成上述問題。寶寶也可能在出生時喝過一兩餐配方奶，就產生對牛奶蛋白質的過敏。

判斷寶寶食物過敏的方式

寶寶哭鬧的原因很多，您需排除其他導致寶寶哭鬧的原因，其中有一項是對媽媽進食的食物過敏，但通常會有其他表現。通常在媽媽吃入某種特別的食物到三十分鐘到二十四小時內寶寶會有反應，包括：

無法解釋的長時間哭鬧，即使增加餵奶次數也無法安撫。

解血便、腹瀉。

濕疹、風疹塊（蕁麻疹）、紅疹。

咳嗽、喘鳴、鼻塞。

眼睛紅或癢。

如果媽媽第一次吃這種食物引起寶寶的反應，通常在停掉食物的二十四小時之後，寶寶的症狀就會改善。如果是平常就在吃的食物，暫停該食物二到三週後，寶寶症狀改善。

如果寶寶症狀改善，但是隔一段時間。當媽媽再進食相同食物，寶寶又出現相同的症狀時。才比較可以確定是對媽媽進食的食物產生反應。建議媽媽可以作一份食物日誌，詳實紀錄食物的項目和食用的時間，以及寶寶出現的症狀與出現的時間，作為推測食物過敏原的參考。

寶 寶 對 媽 媽 食 物 過 敏 的 處 理 方 式

唯一的方式就是媽媽暫停進食該種食物。如果是一種新的食物或是一下子吃很大量而讓寶寶產生反應者，寶寶的症狀可能在二到三天內就得到緩解。但是如果是媽媽平常就在吃的食物，可能至少需要二到三週的時間，寶寶的症狀才會改善。

牛奶及奶製品是我們最常看到引起寶寶過敏的食物，有的寶寶只要媽媽不喝牛奶三到四週後，症狀就明顯改善。有些對牛奶蛋白高度過敏的寶寶，媽媽可能要避免所有奶製品的食物。此時媽媽應注意鈣質的攝取。

有時少量的攝取（如優格、起司）及輪流的食譜（多種食物輪流間隔一段時間再吃）也可以減輕寶寶的症狀，且能

夠避免媽媽飲食上過度的限制。

來源：寶寶怕生怎麼辦？3招陪伴孩子度過怕生期

寶寶怕生怎麼辦？三招陪伴孩子度過怕生期

孩子看到陌生人不敢打招呼，只會嚎啕大哭。躲在爸媽背後，發生這樣的情況。讓爸媽當場感到不知所措、好尷尬……。「寶寶怕生」這個議題，相信是常見的育兒難題，爸媽們該如何陪伴孩子度過這段怕生時期呢？

六個月大開始會認人

當寶寶開始會認得主要照顧者時，對於較不熟悉的家人、朋友，或是陌生人，就會出現「怕生」的反應。隨著寶寶視覺及記憶力的發展，約在六個月大左右，才能看清楚主要照顧者的樣子，並透過聲音來幫助自己認人。當出現不常接觸的陌生人時，孩子就會對陌生人產生疑惑及焦慮。並經常以哭來表達情緒，或是看著陌生人呈現發呆狀態。又或者是埋頭躲進爸媽的懷裡。

然而，也不是所有的孩子都會經歷怕生階段。這與孩子的天生氣質比較有關係，倘若孩子本身對新的事物需要較長的時間才能接受。他們會需要多多觀察，確定自己是安全的。熟悉了，才會慢慢放下心中的戒備。開始與他人接觸，而這段怕生期最慢約會在二歲前結束。

三方法引導孩子度過怕生期

不過，爸媽們也別擔心。「怕生」是孩子很正常的發展階段，且小時候個性害羞。長大後也未必是個內向的孩子。以下提供爸媽三種簡單的方法，陪伴孩子度過這段時期：

方法一：建立熟悉度

這階段的孩子，本來就會比較依賴主要照顧者。爸媽們要多點耐心，先帶孩子多看看不同的對象。在旁邊慢慢引導他們，降低孩子內心的恐懼。

假如是有親友來訪，爸媽們可先讓親友了解。孩子怕生，太過熱情的靠近。可能會引起反效果，如此也不會讓親友們認為孩子沒禮貌。建議可先遠遠地跟孩子打招呼，等到見面時間比較長，孩子漸漸熟悉，彼此再增加互動會比較好。

方法二：要有一段適應期

如果是要帶孩子參加餐會或是各種團體活動，建議提早帶孩子到現場觀察。讓孩子先熟悉一下環境，爸媽也能大致說明等等可能碰到的人事物。讓孩子先做好心理準備。有了適應期，即可降低孩子內心的恐懼，也能避免出現哭鬧不止的情況發生。

方法三：增加安全感

在面對陌生他人時，孩子最需要的就是大人的陪伴！爸媽可以牽著孩子的手，上前與對方聊天打招呼，讓孩子感受到彼此之間的感情，也能提升孩子對對方的好感度。另外，讓孩子隨身攜帶安撫小物，例如玩偶、小被被等，也有助於孩子情緒的穩定。

孩子怕生哭鬧怎麼辦？

孩子若因為怕生，當場一直哭鬧，爸媽們該如何處理？建議先把孩子帶離現場，以穩定孩子的情緒為主。不要強迫孩子做不喜歡的事，爸媽要尊重並同理孩子的感受。他們會哭、會害怕都是正常的，以關心取代責備；事後可以與孩子聊聊當下的心情。以平靜堅定的態度，告訴孩子「慢慢練習。不要急，爸媽會陪在身邊。」

不過，要提醒爸媽。假如觀察到孩子在接觸陌生人時，出現像是摀手、冒冷汗、心跳過快、過度喘氣等情況。就有可能是不太尋常的焦慮反應，必要時可帶孩子給專業醫療人員診治。儘快找出原因，幫助孩子順利度過怕生期。

來源：寶寶拒吸乳房的原因

寶寶拒吸乳房的原因

寶寶拒吸乳房因年紀不同，所造成的原因也不一樣，需要您仔細觀察找出原因。

這段時間您需要多擁抱、撫觸寶寶並執行肌膚接觸，有些寶寶在半夢半醒時較願意吸吮乳房。有的媽媽覺得將孩子抱起來輕搖或漫步也有效，這需要一點耐心和時間。寶寶才會慢慢接受乳房，回復以往母子倆親密擁抱餵奶的狀況。

在寶寶表現想吃奶前，您可以尋找一個可以讓您舒適半坐臥的地方。如寬敞的沙發或床，床上可以用大棉被墊著。讓您的上半身維持三十度的半坐臥姿勢，媽媽上半身不穿或穿一件襯衫。不穿胸罩，寶寶只穿一件尿褲。讓寶寶直立趴在胸前，您一隻手托住寶寶的臀部、另一隻手托住寶寶的背部頸部及頭部。讓寶寶在乳房前搜尋，不急著讓寶寶就乳。您可以輕聲的鼓勵喝媽媽的喔！一隻手輕輕的輕觸他的背部，當寶寶有想吸奶時，讓寶寶移至乳房前，當您的寶寶準備好他自然會含住乳房吸吮。

寶寶拒絕乳房的幾種表現

一有時寶寶含住乳房，但是不吸吮或吞嚥，或是很無力的吸吮。

二有時當您試著餵寶寶吃母乳時，他一接近乳房就哭或掙扎。

三有時寶寶吸幾分鐘後就噎到或是哭著放開乳房，他可

能在一次餵食中發生好幾次這種情況。

四有時寶寶吸一邊乳房，但拒吃另一邊。

寶寶拒絕乳房的可能原因

一餵奶時間不對：比如寶寶仍想睡覺或是讓寶寶哭鬧很久才餵奶。

二寶寶生病或疼痛：例如餵奶時壓到頭部因為產鉗或真空吸出造成的瘀青處。因此當媽媽試著要餵他吃母乳時，他就大哭及抗拒。鼻塞或嘴巴痛念珠菌感染，或是較大寶寶長牙時。此時寶寶可能吸一下就停止，並哭鬧。耳朵發炎，吸奶時會使耳朵疼痛加劇而拒吸。

三有時餵母乳使寶寶不舒服或受挫折

曾經以奶瓶餵食或讓寶寶吸安撫奶嘴。

因為寶寶含乳不良或是乳房腫脹使寶寶不好含，沒有得到足夠的奶水。

寶寶在吸奶時曾有不好的經驗，例如媽媽或從旁幫助的人粗魯的壓寶寶的後腦勺，想要矯正寶寶的姿勢，這個壓力讓他想反抗。

喝奶時曾有巨大聲響的驚嚇。

長牙期寶寶喝奶時不小心咬到媽媽乳房時，媽媽因疼痛大叫而驚嚇到寶寶，或媽媽使用一些導致疼痛的處罰方式，訓練寶寶不可再咬乳房。

媽媽在餵奶時一直搖晃自己的乳房，或是拍打寶寶的背部，干擾他含住媽媽的乳房。

限制餵奶。比如只在固定的時間餵奶。

由於奶水過多，寶寶可能吸幾分鐘後，當奶陣來的時候，就噙到或哭著放開。

早期吸吮協調的困難。有些寶寶要花較多時間才學會吸奶

四有時可能因一邊乳房有乳腺炎使乳汁味道改變、或是一邊乳房形狀比較不一樣、奶水流速不同等問題，寶寶只拒吃一邊乳房。

讓寶寶沮喪而拒吃母乳的可能原因包括：

和媽媽分開，例如：當媽媽開始上班時。

新的照顧者，或太多照顧者。

家庭常規的改變，例如：搬家，拜訪親戚。

媽媽生病，或是乳房感染。

媽媽月經來潮或懷孕。

媽媽氣味的改變，例如：使用不同的香皂、香水，或是吃不同的食物。

媽媽用藥（如避孕藥），飲食（不喜歡某種食物的氣味）。

只是表面上但不是真的拒吃母乳

一一個新生兒尋找乳房時，他的頭由一邊轉到另一邊，好像在說不。

二四到八個月大的寶寶很容易分心，例如：當他們聽到聲音時，他們可能停止吸吮。

三在一歲後，寶寶可能自己離乳，這通常是一個漸進的過程。

來源：寶寶提早報到問題多！準媽媽如何辨別早產徵兆？

寶寶提早報到問題多！準媽媽如何辨別早產徵兆？

早產問題多，預防是最好的方法！準媽媽可透過分辨三大早產跡象，有徵兆時儘早就醫。並採用四種預防寶寶提早報到的方法，有助於胎兒順利待到足月。平安健康的誕生！

早產的原因及風險

所謂「早產」，指的是準媽媽於懷孕二十週至三十七週生產，胎兒在未足月的情況下出生。由於寶寶提早報到，許多器官尚未成熟，較容易發生問題，引發各種疾病的風險。

包括：呼吸窘迫症候群、開放性動脈導管、呼吸暫停、腦室內或腦週邊出血、壞死性腸炎、視網膜病變或其他感染等問題，尤其出生體重愈輕、懷孕週數愈少的早產兒，產生以上問題的風險越高。

至於寶寶為何早產？歸類可能有以下六種原因：

一子宮胎盤異常

如：胎盤早期剝離、前置胎盤、子宮畸形、子宮頸閉鎖不全、羊水過多或過少等。

二各種妊娠疾病

如：妊娠糖尿病、妊娠高血壓、子癲（癇）前症等。

三 孕 期 感 染 問 題

如：泌尿道感染、骨盆腔感染或其他細菌感染及發燒等。

四 孕 婦 身 體 因 素

如：高齡孕婦、前胎早產、懷孕中曾接受腹部手術等。

五 胎 兒 生 長 狀 況

如：胎兒先天疾病、胎兒過大、胎兒畸形、胎兒生長異常等。

六 雙 胞 或 多 胞 胎

胎兒的數量越多，早產機率越高。

孕媽咪如何分辨早產跡象？

懷孕未滿三十七週的孕婦，有以下情況出現，應立即就醫，以預防早產的發生。

一 頻 繁 子 宮 收 縮：

持續每十分鐘就有一次以上的宮縮，導致腹部悶痛或脹痛，或者陰道有壓迫感或腹部出現下垂感，休息一小時後仍無法改善。

二 陰 道 出 血：

懷孕時，陰道大量出血或少量持續性出血。

三 破 水：

陰道流出大量的水狀液體。

發生以上三情況的其中一種，都建議準媽媽趕緊前往醫院檢查，以免寶寶提早出生。

出 現 早 產 跡 象 時 的 處 置

當準媽媽發生子宮收縮的狀況，這個時候必須休息且密切注意。若持續超過一小時，必須就醫治療；若有合併陰道出血可能為早產徵兆。則需要立即就醫。

引起陰道出血的原因有很多，不一定是早產，但通常量越多越危險。量多或半夜，可至急診求診；如果少量出血，可到門診檢查。

至於如何分辨陰道分泌物和破水的不同？羊水較為清澈、無黏性，會持續流出，若為水狀分泌物，必須小心是否為破水。

懷孕時正常分泌物應為透明或微黃且帶有黏稠感，一如未煮過蛋清樣。若為細菌感染時分泌物為黃綠色或有臭味，應就醫以免引起子宮內感染。產生早期破水及早產等問題。

此外，經產婦因子宮頸比初產婦更容易擴張。常以便意感、腰痠表現早產徵兆，若無法分辨。應儘快就醫。

如何預防寶寶提早報到？

早產發生率約為五到十，卻占新生兒死亡的八十。若胎兒能在媽媽的子宮裡多待一些時間，不但可提高嬰兒的存活率。也能減少一些後遺症。懷孕時可調整生活習慣和活動，預防早產的發生：

一 戒除菸酒檳榔及藥物濫用

菸（含二手菸）、酒、檳榔會增加孕婦流產、早產、死產及出生低體重等風險，應戒除不良習慣，如：吸菸、酗酒、檳榔、使用成癮藥物等，避免增加早產的機率。

二 保持良好的孕期習慣

包括：均衡的營養、適當的增重，同時維持理想體重。並減少壓力來源，保持心情愉悅。避免精神上的不安與疲憊。

三 定時產前檢查

產檢時醫護人員可協助留意可能導致早產的情況，並給予適當處理。同時了解懷孕情形與認識早產徵兆，如有早產徵兆。立即就醫。

四 避免過度勞累與劇烈運動

避免過度疲勞、提重物，以及不必要的長途旅行。

早產兒除了死亡率較高，伴隨早產而來的各種急、慢性疾病。恐成孩子及父母一生的陰影，也常重擊整個家庭。更是社會沉重的負擔，透過以上四種預防早產方法。可幫助準媽媽降低早產的風險。

來源：寶寶照顧大小事

寶寶照顧大小事

寶寶照護大小事

有了寶寶後，爸媽的生活開始變得忙碌，每天都有大大小小的育兒之事。不用太緊張，實際操作多次後。便會熟能生巧，看著寶寶一天天成長。也會有滿滿的成就感及幸福感！

寶寶的飢餓訊號

寶寶不會說話，但寶寶並非只能用哭來表達需求。當寶寶肚子餓時，會有想要吃的舉動。像是蠕動、吐舌、嘟嘴、舔唇、吸手，或是主動轉頭尋乳。都是「飢餓訊號」的表現，爸媽可預先觀察這些反應。儘量不要等到寶寶大哭時再餵奶，恐會增加餵奶的難度。

把眼神放到寶寶身上，觀察、理解並回應寶寶飢餓或吃飽的訊息，讓寶寶和媽咪都能享受喝奶、餵奶的喜悅。

延伸閱讀：

【國民健康署】一寶寶求哺餵這樣做觀察寶寶表徵

寶寶有沒有吃飽？

想要確認寶寶有沒有吃飽，可透過寶寶的排尿情形來判斷：

第一到三天：尿量少，但每天會增加一些。

第四到六天：一天四到五次尿溼尿褲，每次尿量約二片乾尿褲的重量。

第六天以後：尿褲很溼且重，一天約有五、六次小便。

大便顏色觀察

透過嬰兒的大便，能透露出一些嬰兒可能存在的疾病，爸媽們可翻閱兒童健康手冊中的「嬰兒黃金九色卡」，正常的大便顏色應介於七號至九號之間（金黃色至墨綠色）。一旦發現寶寶大便顏色不對勁，建議儘早就醫檢查。

延伸閱讀：

【國民健康署】我的小孩大便正常嗎？

臍帶護理

請爸媽們依接生醫院之教導，進行臍帶護理。照顧原則是保持寶寶臍帶的乾淨與乾燥，讓寶寶穿著寬鬆衣物，並將尿布反摺，以保持臍部乾燥。臍帶通常約二週會自然脫落。發現異常如息肉、惡臭或紅腫等狀況，需尋求醫療協助。

延伸閱讀：

【孕產婦關懷網站】新生兒臍帶護理

【孕產婦關懷網站】照護新生兒必備五技巧

留意受虐性腦傷

目前醫學上已經摒棄「嬰兒搖晃症」這個易令人誤解的名詞，改稱為「受虐性腦傷」。通常是來自於劇烈重複搖晃嬰兒所導致，正常照顧下或與嬰兒玩耍而晃動到嬰兒的頭部。並不會造成嬰兒腦傷，家長不要給自己太大壓力。

延伸閱讀：

【孕產婦關懷網站】受虐性腦傷

【孕產婦關懷網站】事故傷害預防

來源：寶寶的睡眠習慣

寶寶的睡眠習慣

寶寶要適應子宮外的生活了，爸媽也要適應家裡的新成員，常常聽到爸媽訴說嬰兒日夜顛倒，造成頗多困擾。嬰兒一次可以多睡一點，讓爸媽可以多休息一會兒或多做一點想做的事是很多照顧者的期望。其實新生嬰兒並不是與生俱來就有和大人一樣的生活節奏，大部分的嬰兒約到六到九週。生理時鐘才會逐漸成熟，大部分爸媽的經驗是約嬰兒四個月大後生理時鐘的運作就比較順暢了。白天大部分的時間會較清醒，夜間大部分的時間處於睡眠狀態。

新生嬰兒的睡眠

一般嬰兒一天總睡眠約十六到十八小時，所有的嬰兒的需求都不相同。有些寶寶睡的多，有些睡的比較少。睡眠時間是零碎的。嬰兒的睡眠週期較成人短，會花比較多的時間在淺睡狀態，熟睡期約一到二小時。大部分的父母會發現，出生頭兩個月的嬰兒。一天之內可能某段時間會睡久一點，大約持續四到五小時。中間喝個奶又繼續睡；但某一段時間喝完奶後不睡覺，眼睛睜亮亮的。需要大人抱著陪伴，反覆的餵奶。持續個四到六小時後終於可以安穩的睡著，通常發生在半夜。也是很多新手爸媽覺得疲累最大的原因。

較大嬰兒的睡眠

因為夜間寶寶需求比較大，希望需求被滿足。寶寶的確在四到六個月後，在夜間的需求比較大，包括被抱、輕柔的搖搖、溫暖、吸吮等等。有些寶寶需要比較多的吸吮，藉由媽媽哺乳中的肌膚接觸。寶寶可以吸吮著媽媽的乳房，享受著與媽媽親密的互動過程。而爸爸也可以輕柔的將寶寶抱著靠近胸口，讓寶寶感受著身上溫暖的體溫。讓寶寶的情緒平復下來。

延長寶寶夜間睡眠時間

不同年紀的寶寶有不同的原因，會增加他夜間吸吮乳房的機會，如長牙期的牙齦的疼痛不舒服、過敏、鼻塞、耳朵

的感染、成長期腦部活動增加（如已學會發出聲音、翻身或爬行的孩子，常會藉著夜間練習練習）、情緒問題等。以上這些干擾會讓寶寶半夜容易醒來。若是已有一段時間習慣被某種方式安撫入睡，通常夜間醒來時孩子還會想要同樣的方式才能入睡。如果嬰兒睡前是以被抱、輕搖或餵奶的方式哄睡，他醒來時發現是睡在床上。情境為何不一樣，寶寶當然會發出聲音或以哭的方式要求照顧者再哄他入睡。也就是寶寶一定要喝奶瓶或吸著媽媽的乳房再度入睡。所以夜間常常醒來的原因需要靠媽媽和爸爸的敏銳的觀察力一一去發掘，舒緩孩子的不舒服後，大部分情形是可以改善的。

若是您排除掉寶寶一些生理的問題，爸媽可能想一下最近有哪些狀況影響了您的情緒。有些爸媽的經驗是當自己心情很不好、和其他家人關係緊張，也會影響寶寶。孩子的安全感受到影響，他會藉由多喝奶的方式安撫自己。以確定自己和爸媽的關係是緊密的。

如果寶寶夜間常常要奶喝，讓你和他的關係受到影響，這時是需要修正的時候了，因為這時期的孩子更需要一位輕鬆且愉快的母親和父親。有些爸媽的做法是白天盡量覺察並滿足孩子的各項需求，包括吃的足夠。被抱、安撫及吸吮的需求，在白天盡量多滿足寶寶。睡覺前給一餐副食品增加飽足感，並於睡覺前一到二小時多餵您的寶寶。夜間爸爸的角色其實很重要，有些媽媽是餵完奶讓爸爸去抱寶寶，搖搖他哄他入睡，半夜也是。

當孩子仍哭鬧拒絕時，也許您的寶寶在向您反應我還沒準備好呢！這時爸媽需要考慮，此時戒掉夜奶的決定是否適合自己和孩子？母職和父職這角色，有苦有甜。尤其是當半夜的爸媽，都很希望懷中這小寶貝趕快睡。很多爸媽的經驗是要寶寶半夜可以不起來可能是在一歲半後，有些一直要到兩歲後所有牙齒長齊才改善很多。所以很多爸媽常常找時間補眠，通常是白天有人代勞時。您可以小睡或是和寶寶一起午睡，補充一下精力。也會有幫助喔的！

來源：寶寶的體重與成長

寶寶的體重與成長

嬰兒出生一週後，體重不再往下降而開始回升；出生兩週之內恢復到出生體重；頭三個月每一週體重至少增加一百二十公克以上，就可以確定嬰兒吃到足夠的奶水了。

國民健康署採用世界衛生組織全球兒童生長曲線標準，編印零到七歲兒童生長曲線圖，使用方式如下：

一生長曲線圖摺頁正反兩面，分為男孩、女孩。身長（高）、體重與頭圍等三個生長指標之百分位圖，各有五條曲線。由上而下分別代表同年齡層之第九十七、八十五、五十五、三十分位。

二按寶寶性別，先找到橫向座標標示的寶寶足月年齡，再

對照縱向座標標示之身長身高、體重與頭圍數值，即可找到寶寶在同年齡層小孩的百分位。

三一般而言，嬰幼兒之生長指標若落在生長曲線圖第九十七及第三百分位兩線之間均屬正常，否則就要考慮該項生長指標有過高或過低之情形。

四提醒家長要注意的是，兒童的成長是連續性的。除觀察個別年齡的落點外，也應注意生長曲線的走勢。如果曲線變化超過上下一個區間時，需請醫師評估檢查。

兒童生長曲線圖的身長／身高圖，在二歲時的曲線有落差，主要是因為測量身長／身高的方法不同；二歲前是測量寶寶躺下時的身長，二歲後則是測量站立時的身高。

當孩子身體質量指數被定義為「體重過重或肥胖」時可參考衛生署食品藥物管理局公布之兒童與青少年肥胖定義，應尋求醫師或營養師建議，儘速調整生活作息，避免增加相關慢性疾病的風險。

當孩子會自己吃飯以後，需避免過度飲食。嬰幼兒與學童期飲食建議量，請參考行政院衛生署食品藥物管理局嬰兒、幼兒與學童一日飲食建議量。

兩餐中間盡量不要給予零食。

三餐間可提供點心但宜在正餐前二小時吃完，量不要太多。牛奶、蛋、蔬果等都是可以選擇的好點心避免高油、高糖、高鹽的點心或加工零食，以免攝取過多空熱量，且營養素不足食品，影響成長。

不喝含糖飲料多喝白開水。平日應以白開水補充孩子身體所需的水分；建議不應攝取市售各式含糖飲料、碳酸飲料、運動飲料、果汁飲料或發酵乳飲品等。

來源：寶寶篇 1歲11~12週：促進寶寶語言發展，媽咪要掌握的重點

寶寶篇 一歲十一到十二週：促進寶寶語言發展，媽咪要掌握的重點

整體發展

「媽媽、車車、狗狗…」媽咪有沒有發現寶寶會說的疊字變多了？而且可以聽懂要他拿球球等簡單指令，還會模仿大人說話，逗得家人超開心。

寶寶語言發展很重要喔！建議媽咪平時可以這樣做：

寶寶以動作表示需求時，像是比出手。指著玩偶，媽咪就說「寶寶要玩玩偶嗎」。讓動作跟語言有連結。

重複一遍寶寶說的話，再配合有點誇張的肢體動作，看他是不是越說越有興趣呢？

趁天氣好帶到戶外接觸更多事物，語言刺激會更多。

每個寶寶語言發展快慢不同，不要心急，不要跟別人比，更不要把「你真笨」掛在嘴上。

遊戲玩具

妳有沒有發現，寶寶真的非常愛聽故事喔！媽咪今天有沒有唸故事書給寶寶聽？唸故事書要從寶寶出生就開始，而且不要間斷！早點跟寶寶有聽的互動，對認知、語言發展、腦部發育都有幫助。寶寶滿一歲後，也可以利用指圖命名方式。就是手指著圖片，同時說出「香蕉、房子…」圖片中的物品名稱。鼓勵寶寶跟著模仿大人說一遍（仿說）。不用一定要什麼時間進行，持續多久也可以很彈性，但重點是媽咪要有耐心，持之以恆。

教養難題

餵寶寶吃飯已變成每天的惡夢！「餐椅坐不住，一口菜老是含在嘴裡。還得拿著玩具才肯賞臉…」，心累的媽咪要加油。別氣餒！掌握這幾個妙招，快速幫你擺脫餵飯夢魘：

一成不變的餐點大人都会膩，更別說是寶寶，所以要想辦法多點變化，也可以在料理中多加些色彩。有研究說紅色（胡蘿蔔）加黃色（玉米），對增加食慾有幫助，媽咪趕快試試！

寶寶才幾顆牙，不要指望咀嚼力像大人。所以煮軟爛一點，或是選擇像柴魚嫩豆腐。可以好入口、好消化。

不要一直強迫，好像少吃這口會長不高，其實只要生長曲線正常就沒問題。

飲食營養

寶寶小小的胃比較適合少量多餐，不只正餐。也要準備小點心，現在都講究最健康。今天先做道簡單的「烤起士馬鈴薯」，將馬鈴薯洗淨切成一公分厚片狀。把水煮滾，馬鈴薯放入。煮半熟後撈起，撥掉外皮。兩面抹點奶油，正面灑適量起士條。烤箱預熱放入，以一百八十度烤十五分鐘就大功告成。又香又好吃，是不是一點都不難？

來源：寶寶篇 1歲13~14週：寶寶開始學爬樓梯，爸爸媽媽如何引導？

寶寶篇 一歲十三到十四週：寶寶開始學爬樓梯，爸爸媽媽如何引導？

整體發展

寶寶不是才剛會站，怎麼一轉眼已經走的越來越穩。而且開始想學大人爬樓梯，看他身體不聽使喚。乾脆手腳一起來，說真的。實在蠻搞笑！爸爸媽媽可別再取笑寶寶用四肢爬樓梯，其實這動作對頸部神經和大小肌肉發展都

很有幫助喔！

然而寶寶學爬樓梯，爸爸媽媽最怕就是會不會摔下來，那麼，就先在家做個簡單的樓梯吧！用泡棉積木堆出幾個小階梯，引導寶寶從這端爬上，再從另一端下來。進展順利再實際走樓梯，而且爸爸媽媽最好站在身後抓住寶寶雙手慢慢上階梯，或者也可以到公園走溜滑梯的階梯來練習喔。

生病照護

爸爸媽媽應該有聽過奶瓶性齲齒吧？就是寶寶經常喝奶喝到睡著，長出來的牙齒到後來一整排變黑，然後一開口笑就看到黑黑的乳牙，這畫面光想就覺得恐怖吧？該怎麼預防呢？

爸爸媽媽帶寶寶看兒童牙科醫師了沒？如果沒有要趕快安排，一歲後每半年檢查一次，牙齒也要塗氟。另外餐後、睡前要刷牙。還有別再讓寶寶邊含奶瓶邊睡覺，因為奶類都有天然糖分。一旦附在牙齒表面，把口腔細菌養的肥肥胖胖。之後寶寶長出的牙就容易蛀光光。

自理能力

爸爸媽媽有沒有觀察到寶寶開始會用三根手指抓起葡萄乾？有些事已經越來越難不倒他，依照這階段寶寶的發展，可以讓他學習什麼能力呢？就來練習用食指按開關，像是電源開關、電梯、電鈴等，訓練食指的運用能力，能幫助他操作得更順暢喔！但可不要讓寶寶運用在滑平板上，這階段孩子並不適合使用三產品。

飲食營養

這不吃那也不吃，好不容易吃進嘴巴。味道不對就吐出來，照顧偏食的寶寶好像伺候老祖宗。爸爸媽媽真的一把火要燒到頭頂了！

爸爸媽媽先冷靜，喝杯水、深呼吸，然後用這幾招解決寶寶偏食問題：

多變換菜色，不要每天端出來的菜都一樣。也可以從顏色、擺盤中發揮創意，例如用飯捏出小熊形狀。當寶寶露出驚喜表情時，爸爸媽媽尾巴鐵定翹到頭上來。

爸爸媽媽多少會知道寶寶特別愛吃什麼，就把喜愛的食物混在一起，包入水餃或飯糰，不愛的食物先試著放一點再慢慢增加。

跟寶寶討論或介紹各種食物，另外，製作餐點時讓寶寶參與。

來源：寶寶篇 1歲15~16週：撕書是寶寶的探索方式

寶寶篇一歲十五到十六週：撕書是寶寶的探索方式

整體發展

正在享受陪寶寶共讀的時光，只不過轉身喝口水。一本「貴森森」的繪本居然被寶寶撕下一頁，看他笑呵呵的。完全無法體會媽咪的心正在淌血。但專家卻說，「撕書也是寶寶探索的一種方式」？

沒錯！寶寶手指運用越來越靈活，也會用手指翻書。並不斷重複，如果操控精細動作能力不夠成熟。也可能不小心撕下一角，這時候還可能被撕書的新奇聲音吸引。接著就越撕越起勁，甚至把撕下來的紙拿起來順便嚐看看。這確實是探索動作下的系列發展，也算是新能力，跟寶寶品性沒有關聯喔！

但新買的書一直被撕破也不行吧？媽咪可在共讀時試著告訴寶寶：「書裡面有好看的故事，撕壞就沒辦法看了喔！」平時可準備一疊廢紙跟寶寶玩撕紙遊戲。如果擔心昂貴的書再遭摧殘，也可為寶寶選擇布書、塑膠書或硬頁書等不易撕破的材質。

教養難題

記得寶寶七、八個月大的時候，有東西都會跟爸媽分享，最近變得越來越小氣，到底是跟誰學的呢？

寶寶一歲後開始不想跟別人分享，是因為已經有「分給別人自己就會犧牲」的認知。媽咪可用鼓勵方式，並以身作則引導寶寶，例如買餅乾回來，分給家人吃。絕對不能說「你不分享，我就…」威嚇的話語，這樣寶寶反而會把分享當作可怕的事。

生病照護

吃了早餐沒多久寶寶變得好安靜，摸額頭有點「夯夯」，有一種不祥預感。此時如果寶寶越來越燒，還是就醫確定是否為單純的感冒。

一般病毒引起的上呼吸道感染就是俗稱的感冒，會咳嗽、鼻塞、流鼻水、發燒、食慾不佳。有時伴隨嘔吐、拉肚子，只要精神、活動力正常。約三-五天會改善。媽咪照顧過程可能會擔心，不趕緊退燒，寶寶體溫會繼續往上飆，但其實人體體溫調控機制不會讓體溫無限升高喔！而且適度發燒可提高免疫系的效能。常聽說發高燒腦子容易燒壞，其實是罹患腦炎、腦膜炎等疾病而留下的神經後遺症，與發燒無直接關聯。

遊戲玩具

幫寶寶選擇玩具時，媽咪第一個想法是能讓他專心玩上一整天。不會一直吵我，媽咪。這根本不是重點喔！寶寶玩具應該要兼具啟發性、安全性，而且要有趣，像是積木、拼圖都具益智性；小球則具有趣味性。

挑選玩具時要注意幾個重點：

包裝或玩具本體上要有「安全玩具」標誌、經濟部標準檢驗局核發的「合格標識」，並有中文標示，載明玩具名稱、廠商名稱、地址、電話、統一編號、適用年齡及警語等。

玩具不能有尖端或銳利邊緣，若附有繩索，不能超過二十公分。

玩具或其配件大小，不能小於五十元硬幣。

仔細檢查零件是否容易脫落，以免誤食。

挑選騎乘類玩具，要檢查輪胎與車身間隙，以避免夾傷。

來源：寶寶篇 1歲5~6週：進入積極探索階段，媽咪的注意事項

寶寶篇 一歲五到六週：進入積極探索階段，媽咪的注意事項

教養難題

想要一定要到手才罷休，要不到就大哭大鬧。但一拿到手又馬上亂丟、亂摔，「寶寶根本是家中的小霸王。萬一拿到玻璃杯、危險物品，受傷怎麼辦！」面對不斷探索卻又無法分辨那些東西和行為很危險的寶寶，媽咪最好先把危險物品收好，包括玻璃製杯盤，以及刀叉、剪刀等。而寶寶因為得不到而“又番又盧”的時候可迅速拿出法寶，凡是新的或很久沒玩的玩具都可以，因為轉移注意力是不錯的方法喔！

自理能力

當寶寶在運用、協調雙手及手腕的能力漸漸成熟時，媽咪可以開始讓他學習自己洗手，從小養成習慣，建立衛生觀念。先準備大小適合寶寶能抓拿的小肥皂，引導過程耐心的提醒他「手掌、手背、指間、手腕都要搓洗乾淨」；再用毛巾擦乾，也要教他如何控制水龍頭水量，從外面回到家、飯前、飯後、上完廁所也都要提醒把手洗乾淨。

生病照護

媽咪對寶寶發燒、咳嗽、鼻塞、流鼻水等感冒症狀不陌生，但為什麼咳嗽越來越厲害，還有「咻咻」喘鳴聲？會不會有危險啊？先別胡思亂想，這可能是下呼吸道細支氣管發炎，大多數是因病毒感染引起，其中又以呼吸道融合病毒居多。

幼兒細支氣管非常細，所以一有發炎腫脹，症狀會比較嚴重。感染流感病毒有抗病毒藥物可治療，其他一般感冒則只能採症狀治療以緩解不適。照顧過程若寶寶食慾變差，可以採少量多餐方式餵食。並補充足夠水份，也要觀

察如果小便減少、嘴唇乾、哭時沒眼淚。表示有脫水現象，或是活動力明顯下降。就要趕緊就醫。

預防接種

媽咪每次帶寶寶打預防針總是“心驚驚”，就怕有不良反應。媽咪別擔心，疫苗都是經過長期研究和臨床試驗。以及通過層層實驗把關，安全性相當高。而且有很好的保護效果。寶寶出生滿十二到十五個月已經可以打第一劑型肝炎疫苗，施打後注射部位可能會紅、腫、疼痛。以及頭痛、發燒、肌痛、煩躁不安、食慾不振、腸胃不適等反應，會在幾天內恢復。如果症狀持續未改善，應儘速就醫處。

來源：寶寶篇 1歲7~8週：寶寶愛踮腳尖！

寶寶篇 一歲七到八週：寶寶愛踮腳尖

整體發展

自從寶寶開始踏出第一步，每天好像都在趕進度。步伐一天比一天穩，但為什麼走路老是踮腳尖。該不會神經發展出差錯？媽咪疑心病別太重，其實三歲前走路踮腳尖大部分是正常的。只有少數可能骨骼肌肉異常造成，此外。如果腳底肌肉力氣不夠，也可能用踮腳尖方式增加走路的力量。

媽咪可以怎麼做？

寶寶休息時，媽咪動動他的小腳板，能輕鬆往上翹應該就沒事。

讓寶寶赤腳走在安全的草地或沙灘，因為若是腳底感覺敏感的寶寶，踩地面可能感覺比較刺激，就會常踮起腳尖走。

比較要注意的是早產寶寶如果踮腳尖走路，再加上有其他動作發展遲緩現象，有可能是神經發展出問題，應該趕緊就醫檢查。

遊戲玩具

寶寶手指精細動作發展漸漸成熟，這時候可嘗試給他玩手抓拼圖板。最好選擇較規則的圖形，讓寶寶握著手抓板的把手時。能順利把拼圖放進凹槽裡，過程中媽咪應順便教寶寶「這是什麼顏色、形狀」。讓他對拼圖產生更大興趣。

教養難題

「照顧寶寶像在打仗，我寧可去上班！」媽咪邊抱怨邊想對策，要不乾脆給寶寶看手機、平板，好圖個清靜。三安撫效果驚人，但可是潛藏大危機喔！尤其藍光對眼睛很傷，寶寶視力發展未成熟。看久眼球肌肉容易疲乏，視覺追視能力降低。造成近視風險大增。拍球、看快速移動的東西

對視覺追視能力有幫助，但一直看電腦或手機。因為螢幕小，無法得到好的刺激。長期下來會影響追視能力以及手眼協調發展。

另外寶寶大腦發展未完全，常用三專注力、創造力及思考能力也會受影響。而一旦習慣用手指滑動螢幕，寫字、畫圖等精細動作的協調性也會變弱。所以趕快打消用三當保母的念頭吧！

飲食營養

一歲後寶寶飲食越來越多樣，為寶寶準備餐點是幸福的一件事，不過在準備餐點時，有些事項需要注意並加以避免：

少讓寶寶吃罐頭、醃漬物等，這些加工食品除了高鹽、高糖之外。多含一些添加物，對健康有負面影響。建議選新鮮、當季的天然食物。

避免以油炸方式烹煮，以免食物太油膩、不好消化，而且食物油炸過程因為高溫容易產生毒素，所以盡量用蒸、燉、煮的方式料理。

處理生、熟食不能共用砧板，以防食物受到污染。

蛋一定要煮全熟，蛋殼要洗乾淨。擦乾再打蛋，因為萬一有沙門氏菌污染。會引起嚴重食物中毒。

來源：寶寶篇 1歲9~10週：面對寶寶的分離焦慮，媽咪怎麼辦？

寶寶篇 一歲九到十週：面對寶寶的分離焦慮，媽咪怎麼辦？

教養難題

出去買東西請隔壁媽媽幫忙照顧，才十分鐘寶寶就哭得聲嘶力竭；連有時在家只不過上個廁所也會哭天喊地的…。寶寶怎麼這麼黏，媽咪真的都沒辦法喘口氣。感覺心好累！

其實，此時寶寶正進入分離焦慮的高峰期，媽咪應掌握這幾個原則，就不會束手無策：

上廁所或泡奶暫時離開，要讓寶寶隨時聽到自己聲音，對寶寶來說才有安全感。

給寶寶最愛且熟悉的毛毯或布偶，也是比較有安全感。

托給親友照顧前，先讓他們跟寶寶多接觸。

漸漸延長離開的時間，讓他習慣，且離開時用溫和語氣跟寶寶說！千萬別偷偷離開，以免讓他失去信任感。

自理能力

一歲以後寶寶可以訓練自己用水杯喝水，以促進口唇的能力。訓練時，媽咪也拿起杯子示範。而且要跟其他訓練一樣，把「你好棒！」掛嘴上，不能強迫，以免讓寶寶反感。可以先給學習水杯，挑選時注意手把和杯身要防滑，比較好握，而且也要防漏喔！

生病照護

寶寶兩三天沒嗯嗯，肚子好脹、沒食慾、活動力差又愛發脾氣，便便時用力到滿臉脹紅，媽咪看了真是又急又心疼啊！

寶寶便秘多屬功能性便秘，所謂功能性便秘是指非疾病、藥物引起，主要和飲食作息比較相關，媽咪可以先從以下這幾項著手：

固定排便時間，過程要專心，不要邊玩玩具邊“大大”。

每天纖維素要足夠，蔬菜、水果、糙米、胚芽米等都有幫助。

一定要喝水，如果不愛喝水，把水裝在有喜歡圖案的水杯裡，可以增加寶寶喝水意願。

寶寶仰躺著時，媽咪用手掌根部採順時鐘方向。沿肚臍週圍按摩寶寶腹部，促進腸胃蠕動。這麼做也有幫助，記住不可用脹氣膏。用乳液即可。

適度的油脂會有幫助，烹調時加入好的油。像是橄欖油、苦茶油等，可以幫助滋潤腸道。促進腸胃蠕動。

預防接種

寶寶出生滿十五個月要準備接種第一劑日本腦炎疫苗喔！以前總共要打四劑，現在因為順應使用趨勢。已改用細胞培養製程的活性減毒日本腦炎疫苗，只要打二劑。保護力一樣好，而且能減少媽咪往返醫療院所的次數以及負擔喔！

活性減毒疫苗的接種時程為出生滿十五個月接種第一劑，間隔十二個月接種第二劑，採皮下注射，二歲以下嬰幼兒建議在大腿前外側注射。接種後注射部位會疼痛、紅、腫，少數在接種後三到七天可能有輕微或中度全身無力、肌痛、易怒、食慾不振、發燒、頭痛等症狀，但多會在幾天內恢復，不用擔心。如果症狀持續未改善，要儘速就醫。

除了日本腦炎疫苗外，滿十二到十五個月應接種的疫苗還有十三價結合型肺炎鏈球菌疫苗之第三劑。以及型肝炎疫苗第一劑，提醒尚未帶寶寶接種的爸媽。可以盡快預約疫苗接種。

來源：寶寶篇 第10週：與寶寶互動要小心，避免嬰兒搖晃症候群

寶 寶 篇 第 十 週 ： 與 寶 寶 互 動 要 小 心 ， 避 免 嬰 兒 搖 晃 症 候 群

生 長 發 展 狀 況

寶 寶 出 生 二 個 半 月 了 ， 這 時 候 頭 頸 部 的 肌 肉 又 更 有 力 一 些 。 當 抱 著 寶 寶 趴 在 身 上 或 是 床 上 時 ， 他 的 頭 可 以 微 微 抬 起 。 胸 部 和 肩 膀 也 會 跟 著 抬 起 ， 因 此 這 時 候 可 以 玩 抬 頭 遊 戲 。 像 是 讓 孩 子 趴 著 ， 拿 玩 具 在 前 面 逗 他 。 對 日 後 的 坐 姿 、 爬 行 等 粗 動 作 都 有 幫 助 。

此 外 ， 這 時 孩 子 的 視 力 又 更 進 一 步 。 雖 然 視 力 範 圍 仍 停 留 在 約 二 十 到 三 十 公 分 ， 但 可 對 人 們 和 物 品 產 生 立 體 感 。 會 注 意 人 們 和 物 品 的 構 造 與 深 度 ， 因 此 這 時 候 多 和 寶 寶 玩 認 人 臉 遊 戲 。 像 是 靠 近 逗 弄 寶 寶 ， 並 多 做 各 種 表 情 。 訓 練 視 力 和 認 知 能 力 。

哺 乳 疑 難

「產後肚子還是肉肉的怎麼辦？」、「怎樣才能恢復孕前身材？」當生下小寶貝後，除了享受新生命帶來的喜悅，卻有另一個隱憂，也就是該如何恢復孕前身材。

不過事實上媽咪不必太擔心，雖然哺乳期間每天要比孕前多攝取五百大卡的熱量。但乳汁原料是來自於哺乳期及孕期間攝取的營養，因此哺乳媽咪即使不刻意減重。也能靠著均衡飲食、哺餵母乳，消耗產前增加的體重。逐漸恢復身材。

疾 病 特 殊 護 理

寶 寶 稚 嫩 的 皮 膚 怎 麼 有 一 顆 紅 色 的 小 點 呢 ？ 而 且 隨 著 時 間 越 來 越 久 ， 卻 演 變 成 大 顆 、 鮮 紅 色 的 瘤 ， 媽 咪 看 了 鐵 定 很 擔 心 ， 這 到 底 是 怎 麼 回 事 呢 ？

原來這是「草莓型血管瘤」，發生率大約二%。主要是因為血管內皮細胞不正常增生所引起，通常在出生後二到三週會冒出。一開始像小丘疹一樣，但幾週後會快速明顯變大。一般來說在三到九歲就會自行消退，雖然不會對日常生活造成影響。但是目前的建議可以考慮早點接受治療，發現時就可以尋找專科醫師做充分的討論與評估。來決定未來治療的方式。

照 顧 生 活 作 息

相信爸媽都有聽過一個名詞叫「嬰兒搖晃症候群」，它指的是嬰兒在短時間內遭到劇烈搖晃、旋轉或拋接等危險動作，並出現嗜睡、急躁不安、抽筋、意識受損、嘔吐、食慾不振、呼吸異常等情形。

因此爸媽在照顧小寶寶時應該避免上述的危險動作，和孩子互動時要輕聲細語、緩和的搖晃和安撫，才能讓孩子健康長大喔～

來源：寶寶篇 第11週：預防嬰兒窒息，寶寶身上勿懸掛物品

寶 寶 篇 第 十 一 週 ： 預 防 嬰 兒 窒 息 ， 寶 寶 身 上 勿 懸 掛 物 品

生 長 發 展 狀 況

寶 寶 出 生 來 到 第 十 一 週 ， 不 僅 重 量 變 得 更 沉 了 一 些 。 與 寶 寶 互 動 時 ， 他 的 回 應 更 多 喔 。 而 且 也 會 主 動 看 著 大 人 ， 關 注 大 人 正 在 做 什 麼 。 和 他 說 話 也 會 仔 細 聆 聽 ， 因 此 爸 媽 可 以 多 和 孩 子 說 話 、 唱 歌 。 甚 至 加 強 抑 揚 頓 挫 ， 訓 練 孩 子 的 聽 力 和 語 言 發 展 。

哺 乳 疑 難

母 乳 的 好 處 多 多 ， 不 只 可 以 提 供 抗 體 保 護 寶 寶 。 營 養 也 完 整 ， 成 分 也 好 吸 收 。 而 且 當 中 具 有 免 疫 調 節 的 功 能 ， 可 以 降 低 孩 子 過 敏 機 率 ； 此 外 。 媽 媽 可 能 會 有 疑 問 ， 自 己 的 食 物 需 不 需 要 刻 意 避 開 常 見 的 過 敏 原 ？ 像 是 蛋 、 奶 、 海 鮮 等 ， 答 案 是 不 用 ， 除 非 媽 媽 自 己 吃 了 食 物 或 是 寶 寶 喝 了 母 奶 以 後 出 現 過 敏 症 狀 ， 才 需 要 避 免 這 些 特 定 的 食 物 。

疾 病 特 殊 護 理

小 嬰 兒 的 指 甲 相 當 軟 ， 手 腳 也 喜 歡 揮 舞 。 一 不 小 心 就 會 抓 傷 自 己 的 臉 ， 因 此 定 期 幫 寶 貝 修 剪 指 甲 就 很 重 要 。 修 剪 方 式 如 下 ：

準 備 物 品 ： 新 生 兒 指 甲 剪 、 銼 刀

修 剪 步 驟 ：

一 一 手 握 住 寶 寶 的 手 ， 另 一 手 開 始 剪

二 從 中 間 開 始 剪 ， 再 修 剪 兩 側

三 用 銼 刀 將 銳 利 處 磨 光 滑

其 中 ， 從 指 甲 中 間 部 位 開 始 剪 是 因 為 可 以 先 大 略 決 定 出 指 甲 修 剪 長 度 。 避 免 剪 太 短 ， 而 若 是 不 小 心 剪 傷 手 指 也 別 太 擔 心 。 可 用 衛 生 紙 或 紗 布 加 壓 止 血 ， 再 用 紗 布 包 覆 起 來 即 可 。 之 後 要 注 意 是 否 有 傷 口 感 染 的 情 形 ， 如 果 有 就 需 要 請 醫 師 處 理 。

親 子 互 動

這 時 候 的 寶 寶 不 論 在 認 知 和 聽 力 發 展 都 更 進 一 步 ， 因 此 爸 媽 也 可 多 拿 一 些 玩 具 和 寶 寶 互 動 。 像 是 音 樂 鈴 、 色 彩 豐 富 的 玩 具 等 ， 並 可 以 固 定 在 孩 子 的 遊 戲 床 上 。 透 過 緩 速 的 移 動 訓 練 寶 寶 追 視 ； 同 時 媽 咪 也 可 以 在 一 旁 跟 著 音 樂 一 起 唱 歌 ， 透 過 寶 寶 轉 頭 尋 找 音 源 訓 練 聽 覺 。

照 顧 生 活 作 息

小寶寶年紀小，即使遇到不舒服的事也無法明確表達，因此爸媽更需要仔細做好生活照護喔～

其中不可在嬰兒身上或身邊放至任何懸線，像是懸掛奶嘴、項鍊、平安符、窗簾繩或玩具吊繩等。因為這類細線物品很可能在孩子睡著或翻身時，不慎發生纏繞、窒息等意外。建議爸媽如果有相關需求，像是安撫奶嘴就在孩子醒著時使用。睡著時記得取下；平安符則可用透明小夾鏈袋裝著，黏在嬰兒床邊。

來源：寶寶篇 第12週：寶寶脹氣？可先從飲食調整

寶寶篇第十二週：寶寶脹氣？可先從飲食調整

生長發展狀況

寶寶出生三個月囉！這時候男寶寶身長約五百七十五到六十五公分，體重約五十一到八公斤。頭圍約三百八十二到四百二十四公分；女寶寶身長約五十六到六十四公分，體重約四十五到七十二公斤。頭圍約三百七十一到四十二公分，此時寶寶發展有大進展。他們會開始出現試圖翻身的動作，像是頭、胸部一直嘗試抬起。雙手雙腳也一直舉起、搖晃，這時爸媽可以利用玩具吸引寶寶翻身。促進肢體發展。

哺乳疑難

「小孩胖嘟嘟的，看起來真的好可愛。」不過爸媽曉得嗎？當孩子小時候胖，將來肥胖的機率也相對增加。因此從小養成良好飲食習慣相當重要，而哺乳可以降低兒童肥胖發生率。它有助於寶寶發展自我調節食慾，避免日後過度餵食和肥胖。

疾病特殊護理

相信爸媽都有類似經驗，當孩子在大哭或是喝完奶後。肚子就鼓鼓的，輕輕敲打還會發出「咚咚咚」的聲音。原來這是脹氣。

脹氣是嬰兒時期常見的狀況，常見原因包括過度哭鬧、奶水消化不良、吸吮太快。其中若是寶寶過度哭鬧需盡快安撫孩子；奶水消化不良則可先從媽咪飲食做調整，包括減少食用易脹氣食物。像是豆類、洋蔥等，若是配方奶寶寶則須從奶粉做調整；而吸吮太快則可能是因為孩子餓太久。因此再調整餵奶時機即可。

不過要注意的是，若是寶寶有脹氣。且出現食慾不振、腹瀉、便秘、頻繁嘔吐等現象，則要進一步就醫檢查是不是腸胃出現狀況。應盡快治療喔～

親子互動

這時候的寶寶相較於剛出生視力發展又更進一步，不僅

影像變得更立體，也能分辨出更多顏色和明暗，因此這時候媽咪可以拿彩色的布書、繪本進行親子共讀。

此外，由於這時候寶寶年紀尚小。語言和認知都還在發展當中，因此媽咪在挑選讀物時可選擇簡單、有重複性對話的幼幼書。像是「你吃飽了嗎？」、「你想睡了嗎？」等，透過這些對話加強孩子的認知發展、建立相關生活詞彙，為未來學習生活自理做基礎。

照顧生活作息

寶寶很愛爸爸，也很喜歡黏著爸爸，但是爸爸身上總是有股濃濃的菸味嗎？

家庭是孩子生長最重要的環境，若是家中有人吸菸。難免會暴露在二手菸、三手菸的環境下，且嬰兒呼吸速度快。若長期處於二手菸環境中容易罹患支氣管炎、肺炎、咽喉炎等；而三手菸指的是吸菸時在環境中殘留的汙染物，不僅會附著在牆壁、沙發、衣服、玩具等。還有可能會沾染到皮膚或是不小心吃下肚，也會增加寶寶變成氣喘或罹患呼吸道疾病的機率。

因此若是家中有人吸菸應盡快戒菸，若戒斷不易應該尋求專業戒菸資源，還給孩子一個無菸害的環境喔～

來源：寶寶篇 第13週：善用育兒好物，外出哺餵母乳更方便

寶寶篇第十三週：善用育兒好物，外出哺餵母乳更方便

生長發展狀況

寶寶出生來到第十三週，這時候孩子不再喜歡只是躺在床上。而是想要嘗試翻身和俯臥，此外。比起躺著和趴著，孩子更喜歡被抱著。因為這樣視野更高更廣，也較容易與他人互動。這時候爸媽可以將孩子抱直直的、練習頸椎肌肉，並注意時間不要太久即可。

哺乳疑難

隨著寶寶越來越大，也可以逐漸帶出門，但外出時媽咪常會有疑慮，像是會不會沒地方哺乳？會不會手忙腳亂？但媽咪不用擔心，政府立法通過公共場所母乳哺育條例。媽咪可以在公共場所哺乳，且很多公共場所也設有哺乳室。媽咪們可以選擇到哺乳室哺乳或擠奶。

除此之外，若是仍在外面找不到哺乳室時也可以透過一些育兒好物幫助哺乳。像是哺乳衣、哺乳背巾等，不過要小心的是利用哺乳衣或背巾時要留些縫隙讓孩子呼吸。才不會過於悶熱造成不適喔～

疾病特殊護理

寶寶靜靜的躺著，但呼吸時卻很急促且有喘鳴聲，讓媽咪擔心不已，原來寶寶是感染了「呼吸道融合病毒（）」。

是一種副黏液病毒，常引起下呼吸道感染。症狀包括咳嗽、流鼻水、打噴嚏、發燒等，好發於二歲以下嬰幼兒。尤其又以早產兒最容易感染，因為它的感染途徑為飛沫傳染與接觸傳染。因此爸媽須注意環境衛生、勤洗手，並避免出入人口擁擠處。增加寶寶的抵抗力。

照顧生活作息

接觸大自然好處多，不僅可以刺激感官發展。也有助於感覺統合，因此天氣晴朗時不妨帶孩子到戶外走走。以下也列舉行程規劃與準備物品，爸媽可以再依自身需求做調整喔～

行程規劃

：按照天氣和季節做安排，例如：春天野餐、夏天玩水、秋天賞楓、冬天走訪古蹟等。建議一天一到二個行程即可，且需考量孩子作息、爸媽體力。一開始不宜太長，當孩子適應外出後再慢慢拉長時間。

準備物品

：哺乳巾、背巾、推車、雨具、安撫玩具、尿布、替換衣物、常備藥物、防曬防蚊用品，年紀較大的寶寶則需準備點心、水等。

來源：寶寶篇 第14週：在家就能玩，寶寶趴姿遊戲

寶寶篇 第十四週：在家就能玩，寶寶趴姿遊戲

生長發展狀況

寶寶出生來到第十四週，這時候視覺發展又更進一步。可以看到約二到三公尺的人事物，且聚焦速度變快。能辨識人臉、認得照顧者面孔以及熟悉的物品，而此時新事物也比舊事物更能引起寶貝的注意力。因此可以嘗試拿新玩具給孩子玩，他們會主動去觸摸與感受喔～

哺乳疑難

上班族媽咪返回職場一個多月了，還適應白天上班、下班哺乳的生活嗎？但部分寶寶可能會因為白天習慣瓶餵，晚上反而不喜歡親餵，出現乳頭混淆的情形。

這時候媽咪可以再重新與寶寶建立親密關係，例如增加肌膚接觸、將母乳滴幾滴在乳頭上。引導孩子吸奶，當孩子有尋乳反應時就哺餵。如果抗拒時則下一次再試，不要刻意勉強寶寶。幾次之後就可以順利親餵囉！

預防接種檢查

每年秋冬是流行性感冒的流行季節，它是由流感病毒引起的急性呼吸道感染疾病，由於每年流行的病毒株不同，因此需每年進行疫苗接種才能有效預防。

但因為六個月以下寶寶的免疫力尚未成熟，若是提早施打效果也不佳。因此還不能施打，雖然孩子不能接種。但六個月以下嬰兒的父母可以接種公費流感疫苗，透過增強自身免疫力間接保護孩子的健康。

疾病特殊護理

寶寶包著尿布模樣看起來好可愛，但一翻開來，屁屁怎麼出現紅腫、脫屑的情形呢？媽咪，寶寶是得了尿布疹啦！尿布疹成因包括尿便過度刺激肌膚、細菌或黴菌感染、包覆過於悶熱等引起。

當孩子出現尿布疹情形需先就醫，醫師會開立相關藥膏給予塗抹。平時也須頻繁更換尿布，水洗後就先晾屁屁。讓屁股保持乾爽，還有也可以用輕拍的方式吸乾水份。避免用濕紙巾用力擦拭，此外也可選擇材質較親膚、透氣的尿布。

親子互動

這時候寶寶可以靠自己的力量抬頭約四十五度，因此爸媽可以跟孩子玩趴姿遊戲。方式很簡單，只要先準備一個會滾動的有聲玩具。像是彩球或是圓形音樂鈴等，放在地墊上讓寶寶跟著玩具移動視線。訓練視覺和聽覺發展。

照顧生活作息

帶寶寶出遊，手推車也是不可或缺的育兒用品，而選擇手推車時須注意三個重點，包括：

一 有無符合安全認證：挑選時須注意是否有「商品檢驗合格」標誌

二 適用年齡與公斤數：手推車都會註明適用年齡與公斤數，爸媽可依孩子生長狀況做選擇

三 平時使用狀況：若媽咪得常常一人收合推車，這時候是否容易快速收起以及輕便度等，是需考量的重點之一。

來源：寶寶篇 第15週：寶寶哇哇哭？常見5種哭聲分類

寶寶篇第十五週：寶寶哇哇哭？常見五種哭聲分類

生長發展狀況

寶寶出生第十五週，就快要四個月囉！這時候寶寶脖子漸漸較有力氣，還有。此時他們手會自動張開，想要抓握物品。也會主動對照顧者露出親切的微笑。

哺乳疑難

媽咪返回職場近兩個月，事業家庭兩頭燒。媽咪們可能會感到心有餘而力不足，母乳量因此下降。這時候別氣餒，先尋求專業協助。例如調整飲食、擠奶頻率等，但若是奶量仍然不足。可以諮詢兒科醫師，選擇適合寶寶食用的哺餵方式。

預防接種

如果嬰幼兒因父母親之工作或居住地等因素，需要和父母親一同往返台灣與其他國家，可能面臨各國使用之疫苗種類及接種時程不同之問題。為確保嬰幼兒於國內外能有效接種常規疫苗，家長可預先了解目的國之預防接種建議。提早與醫師討論可於當地接種之疫苗種類及接種時程，回國後將備妥之幼兒接種紀錄一併攜至預防接種合約醫療院所。接續完成其他疫苗接種，以完整幼兒的免疫保護力喔！

小兒腹瀉特殊護理

腹瀉對寶寶而言是嚴重的疾病，如果腹瀉帶走體內大量的水分及電解質，就會脫水、電解質不平衡，嚴重的話會危及寶寶生命。如果寶寶出現食慾不振、在一到二小時內就解了數次水樣便且換了數次尿布、頻繁嘔吐、換下來的尿布帶血、持續腹瀉超過二十四小時等症狀，請儘速就醫。

在腹瀉症狀一開始，就必須給予足夠的水分。來補充流失的水分，最好可選用小兒腹瀉專用的口服電解質水溶液；先給予清淡的食物。等到狀況穩定下來再給予營養的食物；除非有醫師的建議，否則小兒腹瀉時萬萬不可自行投予任何藥物。

詳細內容請參閱兒童衛教手冊五十七

親子互動

這時候寶寶已經會辨識人臉，因此可以跟他玩認識自己的遊戲。只要準備一面鏡子就能進行，帶寶寶照鏡子時可以帶著他探索身上的各部位。像是眼睛、鼻子、嘴巴，並拉著他的手觸摸自己的五官和身體。透過不斷重複相關詞彙與動作，加強孩子對身體各部位與詞彙的連結。並促進認知發展，為日後自我認同發展打下基礎。

照顧生活作息

隨著寶寶越來越大，哭聲特徵也越來越鮮明，爸媽可以依據不同哭聲回應孩子需求，常見狀況有以下五種：

一肚子餓：嬰兒肚子餓時，聲音又短又急，並且有規律性，就像是在呼喊肚子餓。

二吃太飽：吃太飽時，寶寶除了會把頭撇開，也會出現哭鬧、躁動不安、想嘔吐的動作。

三 想睡覺：想睡時會間歇性啼哭，雙手會想揉眼睛，抱著時頭部也會往媽媽懷中翻覆。

四 尿布濕：尿布濕的時候，尿便會刺激屁股。寶寶通常感到不適而哭鬧，而爸媽也會聞到臭臭的味道。這時幫孩子清潔完屁屁後就會停止哭泣了。

五 生病：當孩子生病時通常會哭鬧不已，且怎麼哄都沒有用，這時就要檢查寶寶是不是哪裡不舒服，必要時需就醫檢查。

來源：寶寶篇 第16週：寶寶無法輕鬆含乳或喝奶？

寶寶篇第十六週：寶寶無法輕鬆含乳或喝奶？

生長發展狀況

寶寶出生來到四個月，這時候男寶寶身長約六十到六十八公分。體重約五十三到八十三公斤，頭圍約三百九十二到四十四公分；女寶寶身長約五十八到六十六公分。體重約五到八公斤，頭圍約三百八十一到四十三公分。視力、認知發展也更進一步，不但可以區分出明顯的顏色。對鮮豔色彩也有興趣，並能發現事件的因果關係。例如：搖鈴鐺會發出聲音。

哺乳疑難

妳的寶貝喝奶狀況還順利嗎？除了依照孩子需求進行哺餵，有瓶餵的寶寶也需注意清潔與消毒，記得選用海綿或是專用奶瓶刷輕柔刷洗，並搭配嬰兒食器專用清潔劑。

而消毒方式主要有三種，爸媽需依照奶瓶材質和使用習慣進行消毒。第一種是熱水煮沸消毒，藉由高溫達到殺菌作用；第二種是使用紫外線消毒鍋。利用紫外線殺菌消毒；第三種是蒸氣消毒鍋，藉由高溫殺菌原理。利用蒸氣達到消毒殺菌效果。

預防接種檢查

寶寶這時候沒有常規疫苗接種，不過下一週滿四個月時將施打十三價結合型肺炎鏈球菌疫苗第二劑。以及白喉、破傷風、非細胞性百日咳、型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗第二劑，爸媽屆時可觀察孩子有無不適現象。若是紅腫持續三到五天仍未退去，或是有發燒、精神不濟的狀況應回診檢查喔！

疾病特殊護理

媽媽是否覺得每次餵奶都很辛苦，寶寶總是無法輕鬆含乳或喝奶，仔細一看原來是舌繫帶過短。如果孩子的舌頭看起來不太靈活，伸出來也無法超過下嘴唇時。建議要帶至兒科門診評估，如果會影響飲食甚至是語言發展。則

要考慮進行外科手術，而舌繫帶手術傷口一到二週就可癒合。通常恢復狀況也良好，因此不必太擔心喔～

照顧生活作息

媽媽返回職場，孩子轉成部分瓶餵後不適應，出現嗆奶、吐奶的狀況嗎？其實這可能是孩子對於吸吮和吞嚥的動作不熟悉，以下列出常見狀況：

一 嗆奶：原因主要是孩子喝奶喝過快，嘴內奶水還沒吞下去就趕緊喝下一口。因此被嗆到，此時宜先暫停餵奶。並清除口鼻內奶水，以免呼吸道阻塞喔～

二 吐奶：常見原因包括過度餵食、腸胃不適，其中過度餵食會使腸胃負擔加大。當胃內壓力增加就會將食物反流排出；而腸胃不適可能是孩子對奶粉成份敏感，爸媽可先調整奶量和頻率。若仍未改善則須和兒科醫師討論是否需換奶喔～

三 溢奶：常見原因包括孩子腸胃系統不成熟，因此無法完全消化就會溢出來。或奶嘴孔洞太大以至於無法完全吸收而溢奶，這時須調整餵奶速度。且喝完後讓孩子採取半直立姿勢來改善溢奶狀況喔～

來源：寶寶篇 第17週：如何分辨寶寶穿得夠暖嗎？

寶寶篇第十七週：如何分辨寶寶穿得夠暖嗎？

生長發展狀況

寶寶出生四個月又一週，這時候將寶寶抱直。他的脖子可以自然豎直，頭頸部也可保持在中央。爸媽只需撐好頭頸部就好。此外，這時寶貝的注意力增加，不僅會主動想玩玩具，拿到玩具時也可自己玩約一分鐘呢～

哺乳疑難

寶寶有大小餐的問題，有時甚至完全不想喝奶嗎？這樣真的很讓人擔心會不會吃不飽、長不大，原來是因為孩子到了「厭奶期」了，這時可以透過以下三招改善：

一 少量多餐：爸媽可調整餵奶次數，並平均分攤奶量，若有大小餐也可在下一餐補回。

二 增加活動量：孩子越來越大，體力也比剛出生好，因此可增加活動量，提升飢餓感。

三 良好用餐氣氛：孩子這時逐漸對外界感到好奇，因此餵奶時盡量找一處沒有過多干擾的地方。讓孩子可以專心喝奶，並且以鼓勵取代強迫。讓孩子覺得喝奶沒壓力。

預防接種檢查

寶寶滿四個月後可以進行第三次的兒童預防保健檢查，

補助時程是四到九個月，而這時也到了施打十三價結合型肺炎鏈球菌疫苗第二劑，以及白喉、破傷風、非細胞性百日咳、型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗第二劑的時間。如果尚未自費口服輪狀疫苗的寶寶，可以在此時口服第一劑，已經在兩個月時口服第一劑輪狀病毒的寶寶，可以在這個時候口服第二劑。

第三次兒童預防保健服務項目包括：

身體診察：身長、體重、頭圍、營養狀態、一般檢查、眼位、瞳孔及固視能力、髖關節篩檢、疝氣、隱睪、外生殖器、對聲音之反應、心雜音、口腔檢查

餵食狀況：餵食方法、副食品添加

發展診察：翻身、伸手拿東西、對聲音敏銳、用手拿開蓋在臉上的手帕（四到八個月）、會爬、扶站、表達「再見」、發音（八到九個月）

牙齒塗氟：每半年一次（須由牙醫師執行）

疾病特殊護理

寶寶的皮膚怎麼看起來不太光滑，還有點發紅、脫屑。當心孩子可能有異位性皮膚炎，它是一種慢性反覆發生的皮膚炎。症狀包括皮膚搔癢、紅腫等。

異位性皮膚炎發生原因主要有三種：

一遺傳：父母雙方可能有蕁麻疹、過敏性鼻炎或是氣喘的狀況，生出的孩子也會有較高的機率有異位性皮膚炎。

二環境：部分過敏原會引起異位性皮膚炎，像是塵蟎、灰塵、黴菌等。而天氣過於乾燥潮濕也是原因之一，因此應定期打掃環境、用五十五度熱水清洗寢具。維持室內溼度五十到六十以及良好空氣品質，避免二手菸、燒香等。才能降低疾病發生率。

三飲食：部分帶殼海鮮、堅果、奶蛋類等也可能誘發異位性皮膚炎發作，若已知孩子對這些食物過敏應該暫停給予喔～

親子互動

這時候寶寶不論在肢體或認知發展上都更進一步，因此媽咪可以跟孩子玩「包春捲遊戲」，遊戲方式如下：

準備物品：一條毛毯

步驟一：先將毛毯鋪在平面上

步驟二：將寶寶放在毛毯最側邊，並且開始包覆寶寶到最尾端

步驟三：再從最尾端開始將寶寶翻回來

包春捲遊戲可以幫助感覺統合，媽咪一邊包孩子時也可一邊輕按孩子身體，達到觸覺刺激的效果。

照顧生活作息

孩子總是穿太多衣服而汗流浹背，甚至起疹子嗎？其實寶寶體溫比成人高，因此不需要穿太多衣服，不過到底該穿幾件衣服呢？

爸媽可以透過摸摸孩子的頸背來判斷，若是摸起來溫溫的、沒有流汗。就表示穿得剛剛好；若是摸起來很涼，就再多加衣服保暖；反之。若摸起來很燙，甚至出汗。就要減少衣服囉！

來源：寶寶篇 第18週：寶寶便秘了！注意飲食攝取

寶寶篇第十八週：寶寶便秘了！注意飲食攝取

生長發展狀況

寶寶出生來到第十八週，這時候孩子也會更想要翻身。爸媽可以在一旁幫忙推屁股和身體，而當孩子俯臥時。也會用兩隻前臂將頭撐高至九十度、頭部也能抬高；此外，這時候孩子也會認得安撫聲。當哭鬧時安撫寶寶，孩子會自己控制情緒。慢慢停止哭泣。

哺乳疑難

寶貝這時候有出現厭奶嗎？如果餵奶仍然不順、媽媽奶量明顯降低、寶寶吃不飽，加上純餵母乳到六個月有困難，四個月之後可以和兒科醫師討論，孩子是否考慮逐步添加副食品。

不過要注意的是，若是要在這時候添加副食品。須注意孩子的生理狀況是不是準備好了，包括脖子可以自然挺直、可以扶穩維持坐姿、在大人吃飯時。露出想吃的表情，以湯匙餵食時舌頭不會一直將食物頂出等。才可以逐步添加副食品囉！

疾病特殊護理

孩子的便便狀況常是爸媽頭痛的問題之一，尤其便秘讓人煩惱，常見便秘症狀包括排便次數大幅減少、糞便形狀變得乾硬以及排便費力且困難。

嬰兒期的便秘原因包括母乳轉換配方奶、開始吃副食品，其中當孩子開始喝配方奶可以觀察是不是孩子對成分不適。又或是腸胃功能不成熟引起，並且與兒科醫師討論需不需要換奶；另外當孩子開始吃副食品時要注意水分和纖維質的攝取。孩子適應一段期間應該就可以漸漸改善囉！

親子互動

這時候寶寶的神經反射、肌肉、骨骼等發展都有大幅成長，因此可以玩的物品也變得更多元化囉！這時候可以選擇以下類型的玩具促進感覺統合發展：

一 彩色布書：爸媽可選擇色彩鮮豔、不同材質的布書，一邊親子共讀，一邊刺激孩子的觸覺。

二 手搖鈴：手搖鈴可以訓練孩子抓握能力，發出的鈴聲也能刺激聽覺發展喔！

三 安撫玩偶：安撫玩偶不僅好摸好抱，更可提供親密感，爸媽可以利用安撫娃娃和孩子互動，增加安全感。

照顧生活作息

孩子這時候漸漸可以分得出日夜作息，因此也可開始減少半夜餵奶頻率。以及訓練睡過夜，這樣不僅親子間都可以有較好的睡眠品質。白天精神也會比較好，爸媽可參考以下方式進行訓練：

一 睡前奶加量：降低孩子半夜討奶的狀況，但若寶寶容易溢吐奶，可能較不適合，因為會增加溢奶和窒息風險

二 調整白天睡覺時間：白天睡眠時間約二次，每次約一到二小時

三 夜間穿吸收力強的尿布：降低半夜因為尿布濕醒來的機率

四 持續睡眠儀式：透過按摩、睡前說故事等培養睡眠氛圍

來源：寶寶篇 第19週：19週的寶寶，會認人嗎？

寶寶篇第十九週：十九週的寶寶，會認人嗎？

生長發展狀況

這時候，寶寶已經接近五個月大。當媽咪逗寶寶玩的時候，寶寶開始會微笑。媽咪用手指輕戳寶寶的肚子，有些寶寶還會笑得很開心。寶寶的小手與小腳，越來越有力氣。開心時，寶寶會蹬蹬小腳。生氣時，寶寶說不定會舉起小手手拍打東西。當看到媽咪，寶寶除了微笑。還會想要找媽咪玩，或想要媽咪抱抱。這表示寶寶開始會認人了。但也是有些寶寶面對不熟的人或者陌生人，會有些緊張，記得給寶寶一些時間適應。

哺乳疑難

媽咪在哺餵母乳的階段，難免會感冒、生病，此時可能會擔心如果感冒了，還能繼續餵母乳嗎？實際上，大部分的

感冒病毒是透過飛沫傳播，寶寶不會因喝母乳而感染。甚至，此時持續哺餵母乳，寶寶反而可以得到抗體。不過，由於病毒會經由說話、咳嗽傳染，因此建議媽咪可以戴著口罩餵。-

另有一些媽咪可能擔心，如果感冒服用感冒藥，藥物成分會不會殘留於母乳之中，對寶寶產生影響？這點請媽咪放寬心，其實大部分的感冒藥物不會藉由母乳哺餵而傷害寶寶。若媽咪有疑慮，就醫時可以主動向醫師告知正在哺餵母乳，請醫師避開不適合的藥物，就能降低不必要的潛在風險喔。

還有，如果進入流感季，媽咪也要去記得注射流感疫苗，以降低得到流感的機率。媽咪也要了解，流感疫苗並不會影響嬰幼兒，也不會因為在哺乳，就影響流感疫苗效力。

疾病特殊護理

喝配方奶的寶寶，會比較容易便秘嗎？事實上，配方奶的鐵質含量常常比母乳多。所以寶寶的大便就會偏硬，加上配方奶進入寶寶腸道的時候。吸收較不完全，相較於喝母乳。會有較多殘留物質，當其中的水分被吸收。糞便又積在腸道比較久，水分被吸愈乾。寶寶就越容易便秘。

寶寶如果排便不順，或甚至好幾天沒有。媽咪看到寶寶不舒服的樣子，應該會很心疼。到底可以怎麼幫寶寶緩解呢？

一母乳寶寶通常不會有便秘問題，請讓寶寶持續喝母乳，這樣做有助於排便。

二若是喝配方奶的寶寶，建議在詢問醫師後，看看能否轉換配方奶種類或品牌。

三媽咪可以輕輕以順時針方向按摩寶寶的肚子，以促進腸胃蠕動。

要特別注意的是，當寶寶除了便秘。還合併如：腹痛、嘔吐或發燒等其他症狀，可能不是單純便秘。背後或許還有其他原因，請媽咪要盡速帶寶寶就醫！

來源：寶寶篇 第1週：母乳含免疫球蛋白 提供寶貝完善營養

寶寶篇第一週：母乳含免疫球蛋白提供寶貝完善營養

生長發展狀況

期待好久，小寶貝終於誕生了！媽咪知道嗎？以足月新生兒來說，男寶寶第一週身長約四百五十二到五百三十二公分。體重約二十五到四十二公斤，頭圍約三十二到三十七公分；女寶寶身長約四十六到五十三公分。體重約二十五到四十二公斤，頭圍約三十二到三百五十二公分。但出生七天內，體重會因為生理性脫水而下降五到八%。之

後七到十天左右會再慢慢恢復至出生體重，而這些都是正常的。請不要擔心。

另外爸媽一定好奇，孩子這時可以看多遠呢？其實呀！小寶寶視力尚未發育完全，第一週視力範圍約二十到三十公分，大概只分得出明暗、黑白，聽力部分則可辨別熟悉者聲音。

哺乳疑難

親愛的媽咪，母乳是妳給寶寶的第一個禮物。當中含有蛋白質、脂肪、醣類等營養素，不僅較容易消化吸收。當中所含的免疫球蛋白等因子更無法被配方奶取代。但由於新生兒胃容量小，屬於少量多餐期。因此媽咪會比較辛苦，當寶寶有需求時就要餵奶。之後才能成功哺餵母乳喔。

預防接種檢查

寶寶出生的第一年，媽咪最需要注意的就是寶寶的預防接種時間囉！剛出生時，二十四小時內需接種的疫苗如下：

一型肝炎免疫球蛋白（一劑）：若母親為型肝炎表面抗原（抗原）陽性，應施打型肝炎免疫球蛋白以預防母嬰垂直感染型肝炎

二型肝炎疫苗（第一劑）：預防型肝炎感染

另外，有兩項檢查，很建議新生兒做喔！媽咪可以跟孩子的爸好好了解一下。

一新生兒先天性代謝異常疾病篩檢：政府有補助，主要為了提早發現早期症狀不明顯的疾病，例如：蠶豆症、半乳糖血症等。

二新生兒聽力篩檢：政府有補助，主要是為了初步確認聽力程度，並及早發現異常與治療。

疾病特殊護理

出院時，護理人員教媽咪的臍帶消毒方法還記得嗎？這時候還要持續幫寶寶清潔、消毒臍帶直到脫落喔～消毒的方式如下：

準備物品：

一百七十五%濃度酒精（消毒效果）

二百九十五%濃度酒精（乾燥效果）

三無菌棉花棒

四無菌紗布

五 透 氣 膠 帶

步 驟：

一 媽咪先清洗雙手

二 用手指撐開寶寶肚臍，露出臍帶

三 以棉花棒沾濕七十五%酒精，仔細由內而外擦拭，順序從臍帶根部、臍帶、周圍皮膚

四 以棉花棒沾濕九十五%酒精，由內而外擦拭，利用酒精達到乾燥效果

五 用紗布蓋住寶寶肚臍，並用透氣膠帶固定就完成囉

照 顧 生 活 作 息

新生兒軟綿綿的，幫他洗澡心驚驚嗎？這時寶寶的頭頸部尚未發育成熟，身體也較柔軟。因此洗澡時要採用橄欖球式抱法，托住寶寶身體。並保護好頭頸部，洗澡原則和步驟如下：

原 則：

一 從上到下

二 從大面積到小皺褶處

步 驟：

一 先洗臉、洗頭

二 洗身體

三 洗皺褶處與生殖器

人人都說嬰兒一眠大一吋，這句話一點也沒錯。媽咪會發現，寶寶一天可以睡十六到二十個小時左右。但睡眠時間不固定，此時爸媽可以營造良好睡眠環境、建立白天和晚上的分別。並在每晚固定睡前時間安撫寶寶或進行按摩，培養良好睡眠習慣。

來源：寶寶篇 第20週：寶寶的髖關節發育是否正常？

寶 寶 篇 第 二 十 週：寶 寶 的 髖 關 節 發 育 是 否 正 常？

生 長

發 展 狀 況

寶 寶 進 入 五 個 月 大，媽 咪 只 要 比 對 寶 寶 出 生 的 紀 錄 就 會

發現。寶寶身高是出生的兩倍多，男寶的身高多在六百一十九到六百九十九公分。體重在一十一到九十二公斤之間，女寶的身高則在五百九十九到六百八十二公分。體重的範圍在五十五到八十七公斤。

媽咪看到寶寶「一眠大一寸」，雖然都會很高興。但是要小心，寶寶體重如果像氣球般膨脹太快。長大可能有肥胖問題喔，所以會建議寶寶在六個月之前多喝母乳。長大後比較可以維持健康身材，這或許也是媽咪給孩子最好的禮物喔！

預防接種

檢查

寶寶滿五個月後就要注射卡介苗，以減少結核病傷害。

寶寶出生滿五個月以後（必須超過五個月），就可以注射卡介苗。很多爸媽可能會問：為什麼寶寶需要接種卡介苗呢？事實上，寶寶注射卡介苗。可以幫助預防嚴重結核病，有資料發現。沒有接種卡介苗的寶寶，比施打疫苗者得到結核性腦膜炎高出四十七倍。因此當寶寶出生滿五個月到八個月，要記得帶寶寶注射卡介苗。最晚要在一歲前完成注射，若寶寶長期住在結核病發生率很高的地區。或者大人即將帶寶寶前往結核病高盛行的國家旅行、探親，可以和醫師討論。必要時，可提前注射卡介苗。以遠離結核病威脅。

疾病

特殊護理

媽咪幫寶寶換尿布時，如果發現寶寶的大腿不容易被往外展。稍微用力硬把他的腳往外展了，可能會疼痛。寶寶就開始大哭，這時要懷疑可能是「發展性髖關節發育不良」。媽咪聽到「發展性髖關節發育不良」這種專業名詞，一定會嚇一跳，想著：「這是什麼疾病？會不會影響寶寶生長、走路？會不會好啊？要不要開刀？」事實上，這種問題只要在寶寶六個月大之前趕快發現，多數寶寶接受吊帶矯治後就可以恢復正常，開刀機會並不高。

如果要觀察寶寶有沒有「發展性髖關節發育不良」，可以觀察以下四項指標：

一 寶寶躺下來的時候，讓寶寶的膝蓋彎曲。這時候用兩手輕輕把寶寶大腿往外張開，看看有沒有其中一腳往外張開的角度特別小。且稍微往外拉開一點，寶寶就痛到哇哇大哭。

二 當寶寶平躺時，同樣也是讓寶寶膝蓋彎曲。照顧的人可以比較左右兩腳的膝蓋位置，理論上。兩腳膝蓋位置會在同一水平線，如果有一腳的膝蓋位置特別低。代表有長短腳，那隻腳的髖關節可能已經鬆脫。一定要盡快就醫檢查。

三照顧的人如果發現寶寶的髖關節在動來動去的時候有聲響，那也代表需要就醫，接受進一步的檢查。

四兩側大腿內側或臀部的皮膚皺褶不對稱。

來源：寶寶篇 第21週：寶寶手部細動作的觀察重點

寶寶篇第二十一週：寶寶手部細動作的觀察重點

生長

發展狀況

寶寶滿二十一週了，這個階段媽咪會發現。寶寶不只手手、腳腳的肌肉越來越有力，頭圍也隨身體尺寸變大。而男寶的頭圍大概在四百零三到四百四十八公分之間，女寶的頭圍則是在三百九十到四百三十六公分之間。這時候，寶寶沒事會認真看著自己的手手。媽咪會觀察到寶寶的手部細動作和過去很不一樣，寶寶手掌已經會自動張開。不再像以前一樣，一天到晚緊握拳頭。所以這時候，建議別再讓孩子整天戴著小手套，或整天把小寶寶包在包巾裡，要讓寶寶多活動手腳。

在寶寶五個多月的時候，視力發展大約為一。當寶寶近距離看到一些東西，可以看得很清楚。就會用手去觸碰，但東西稍微拿遠一點。寶寶就只能夠辨識顏色與區塊，雖然看得見東西。但整體就是呈現一種朦朧美。

親子互動

寶寶的雙手活動越來越靈活囉，在這時候。媽咪可以和寶寶玩玩手指謠遊戲，口中一邊輕輕唸唱著：「大拇哥、二姆弟…」。一邊溫柔撫摸寶寶小手，按歌謠順序。一一鬆開手指頭，接著。再將手指一根根收起來，合攏成為小拳頭。幫助寶寶訓練一下手掌開合與抓握能力。

另外，如果想幫寶寶訓練視力發展。媽咪可以在寶寶醒著的時候，於床的周圍放些可讓寶寶抓一下、拉一下的玩具。訓練寶寶用手去碰觸這些玩具，不過要小心一點的地方在於。要避免寶寶被勒到，或抓拉力道過大而遭彈擊、受傷。最保險的方法是大人要陪著寶寶玩耍，當寶寶要睡覺了。這些玩具就要收起來，千萬不可以繼續放在寶寶的床上。以免造成意外。

照顧

生活作息

寶寶大哭的時候，大人可以輕聲細語和寶寶說話，並摸摸寶寶的後背，幫助寶寶緩和情緒。爸媽要知道，寶寶不會說話。所以只好用哭泣的方式和大人溝通，所以寶寶很需要家人耐心安撫。大人在這時候，千萬不要將寶寶劇烈

搖晃、旋轉。或把寶寶重摔到床上，如果照顧的人無法控制情緒。就要向親友、其他人尋求支援。

如果對寶寶劇烈搖晃，就會引起嬰兒搖晃症候群。症狀包括嗜睡、急躁不安、抽筋、嘔吐、食慾不振、意識受損與呼吸異常等，當出現這些症狀。就要趕快看醫師，千萬不要因為感覺丟臉、有罪惡感而不敢告訴醫師。早點說實話，才能挽救寶寶生命。並減少發生嚴重後遺症的機會。

來源：寶寶篇 第22週：五個月寶寶的視覺發展

寶寶篇第二十二週：五個月寶寶的視覺發展

生長發展狀況

寶寶最近一直注視著妳跟孩子的爸嗎？滿二十二週後，視力更好的他。眼神更加靈活了，這時常會想觀看眼前或照顧的人在做什麼。尤其當爸媽走到眼前，寶寶還會不自覺地露出開心微笑。

這個階段多數寶寶都會翻身了。除此之外，媽咪在寶寶眼前走來走去的時候。寶寶的眼睛常會跟著媽咪的身影移動；當寶寶與照顧的人面對面，除了可以持續注視大人的臉。也會對眼前這個人感到興趣。媽咪要記得，這是非常重要的觀察重點。如果寶寶對媽咪或眼前的人一點都不感興趣，也無法持續注視別人的臉。建議應讓醫師看看，才能釐清狀況。

照顧生活作息

寶寶到了二十二週，媽咪也許也會注意到。寶寶的視覺與聽覺能力都越來越進步，這時候。如果要為寶寶選購玩具，可以選擇有多種顏色的玩具。如果玩具有聲光效果，也是不錯的選擇。可以增加寶寶視覺、聽覺的刺激，但要記住。玩具只是輔助，寶寶最重要的刺激。還是來自於爸媽的對話、陪玩與引導。另外也要提醒，現在孩子還未滿兩歲。所以不要讓寶寶看任何三螢幕，像手機、平板、電視等都不適合。寶寶的視力才不會受到傷害。-

寶寶在這階段，雙手有時會在胸口交叉，看起來像在玩手，但玩手的技巧還不是很好。此時，媽咪可以給寶寶一些不同材質的玩具、玩偶。也可以牽寶寶的手摸一摸，讓寶寶盡量精準接觸玩具滿一個地方。這樣也能帶來觸覺的刺激。還有，選擇玩具時，也要留意玩偶的眼珠、扣子或汽車小零件等是否牢固，以免這些小東西脫落而造成寶寶誤食的風險。

哺乳疑難

寶寶出生後五個月左右，仍然是以奶類為主要營養來源，有些媽咪可能擔心奶水營養不夠。對於這點，媽咪不要擔心，因為在這時候，母乳的營養價值還是可以供應寶寶需求。

當然，媽咪也要多注意自己的飲食是否均衡，這樣寶寶喝母乳時，也才會攝取到均衡營養。如果媽咪為全素，或是純素食者。可以多攝取一些酵母粉或含維生素十二的營養補充品，這樣才能攝取到足夠的維生素十二；如果媽咪吃的是蛋奶素。牛奶與雞蛋就含有維生素十二，平時可以適量攝取。以補充維生素十二。

來源：寶寶篇 第23週：正確抱姿可預防媽媽手

寶寶篇第二十三週：正確抱姿可預防媽媽手

生長

發展狀況

寶寶在二十三週大，也就是五個多月。近六個月大的時候，已經逐漸在學習翻身。這時候，寶寶的身體與雙腳已經可以像滾木一樣。從仰姿轉向趴姿。另外，如果寶寶總是朝同一方向翻身。常見有兩個因素，第一是環境因素造成。可能朝某一方向翻身，寶寶較能看到好聽、好玩的東西。或者媽咪習慣在某一側與寶寶互動，所以寶寶就會很習慣往那一側翻身。第二因素為寶寶的身體功能、結構所造成，譬如。寶寶身體某一側有傷口，或因傷口疤痕而肌肉攣縮。那一側就無法順利翻身，也有可能是寶寶某一側的肌肉張力比較差。所以習慣往另一側翻身。

當媽咪發現寶寶翻身老是翻向同一側，可以仔細觀察一下寶寶的翻身情形，並鼓勵寶寶輪流往左、往右兩方向翻身。布置嬰兒房時，若要擺設玩具、掛飾等環境刺激物。也要左右平衡，單手抱寶寶時。最好左右手交替，避免寶寶因同一側的刺激較多而只看同一方向。結果導致兩側肌肉力量不平均。當媽咪做了很多努力，寶寶還是只往同一方向翻身，此時會建議帶寶寶就醫，請醫師、物理治療師等專業人員評估寶寶的狀況。

還有，在訓練寶寶輪流兩側翻身的過程中。寶寶如果累了、哭了，就要暫時停止。等寶寶精神好、心情好的時候再來訓練，效果會比較好。

哺乳疑難

有些媽咪抱小孩抱到有媽媽手、腰酸背痛，但又會擔心，若這時候貼痠痛貼布，貼布藥物成分會不會影響餵母乳？寶寶喝母乳時，痠痛貼布成分會不會進入母乳當中？對於這點，媽咪請放心。一般常用的痠痛貼布成分都是非類固醇類的消炎藥，而藥物經由母乳餵給寶寶的量非常輕微。大多數專家都認為哺餵母乳的媽媽可以在醫師的指示下安心使用喔！

媽媽手的正式醫學名稱為「腕隧道症候群

」，媽咪如果想預防媽媽手。在擠母乳或抱小孩的時候，肩膀及手腕也要自然地放鬆。避免彎曲幅度過大，此時可

以考慮戴上護腕。保護手腕的神經、韌帶，並避免受傷。

照顧

生活作息

媽咪希望寶寶睡得好，就要注意一件事。當寶寶準備入睡時，就應該回到他們專屬的房間及嬰兒床。並把燈光轉暗、保持安靜。舉例來說，如果爸媽一邊抱著寶寶。一邊哄寶寶入睡，之後再讓寶寶回床上睡覺；或讓寶寶在小搖床、沙發或大床等處先睡著。大人再將寶寶抱回小床，這樣就不是很恰當。因為這些做法容易干擾寶寶睡眠，當寶寶淺睡時。馬上會感受到睡眠環境產生變化，此時寶寶就會醒過來。睡眠就會中斷。

此外，爸媽也可以為寶寶設定一套「睡眠儀式」。像換睡衣、說床前故事等，都可以納入睡眠儀式。當寶寶進行這些儀式，也就開始準備要睡覺。若要讓寶寶擁有規律的睡眠習慣，這樣做會很有幫助喲！

來源：寶寶篇 第24週：24週寶寶的長牙注意事項

寶寶篇 第二十四週：二十四週寶寶的長牙注意事項

生長發展狀況

出生二十四週的寶寶，有的已開始長乳牙了，且媽咪會發現，寶寶隨時都在透過身體、口腔、雙眼與小耳朵探索世界。看到任何東西，一抓起來。就往嘴巴塞，就算是拖鞋。也是放到嘴巴啃，把大人搞得緊張兮兮。所以爸媽與照顧的人一定要記得，電池、小物件或危險物品、藥品都要收好。不要讓寶寶輕易找到，免得寶寶亂吃、亂啃影響身體健康。

六個月大的孩子，男寶身高多介於六百三十六到七百一十六公分。體重為六十四公斤~九十七公斤，頭圍為四百一十到四百五十六公分；女寶身高則為六百一十五到七十公分。體重為五十八到九十二公斤，頭圍則為三百九十七到四百四十六公分。在這階段，媽咪如果拿搖鈴給寶寶。他們可能會捨不得放手，用手掌緊緊握住。緊握時間還可能超過一分鐘，而這其實正在訓練寶寶的抓握能力。

預防接種檢查

當寶寶滿六個月大之後，很重要的一件事，就是爸媽一定要找時間帶寶寶去接種疫苗喔！此階段應注射第三劑「型肝炎疫苗」與第三劑「白喉、破傷風、非細胞性百日咳、型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗」，這兩劑疫苗可以同時接種。也可以間隔一段時間，注射疫苗可以增加孩子的保護力。病毒才不會偷偷攻擊小孩的身體。

以型肝炎為例，注射後。很少會出現特殊反應，若是「白喉、破傷風、非細胞性百日咳、型嗜血桿菌及不活化小兒麻

痺五合一疫苗」。部分寶寶在接種後一到三天內，注射部位可能會紅腫、痠痛。寶寶偶爾會哭鬧不安，或產生疲倦、食慾不振、嘔吐等症狀。通常在二到三天後會恢復。至於不停啼哭或發高燒的情況較為少見，如果是嚴重過敏、昏睡或痙攣等嚴重不良反應。更是極為罕見，但媽咪若發現接種部位的紅腫現象持續擴大、持續發高燒達四十八小時以上。或產生嚴重症狀，建議盡速就醫。請醫師評估、處理。

副食品添加

遵照世界衛生組織之建議，寶寶純母乳哺育六個月，之後再添加副食品。但要注意的是，寶寶年齡若在六個月以上。不建議只有喝母乳，這時一定要補充適量的副食品。才不會產生營養不良危機。此外，這時寶寶體內儲存的鐵已消耗殆盡。一旦缺鐵，寶寶很容易就貧血。所以媽咪也要多注意寶寶的鐵質攝取，以下的「補鐵」小絕招就非常重要！

一若還沒開始吃副食品，可諮詢醫師後，看是否需讓寶寶補充口服鐵劑，避免貧血危機。

二如果開始吃副食品了，像強化鐵質的米精、麥精，都是很不錯的選擇。

三身體吸收鐵質，需要維生素幫忙。媽咪可把柳丁、芭樂等富含維生素的水果打成果泥，讓寶寶吃一些果泥。一方面可以讓寶寶吸收維生素，另一方面。寶寶也可以攝取到較多纖維質。

四可多準備深綠色蔬菜，深綠色蔬菜含較多的鐵質。

滿六個月後，寶寶也可以吃點紅肉、蛋黃與豬肝等含鐵食物。

來源：寶寶篇 第25週：25週寶寶的聽力發展

寶寶篇第二十五週：二十五週寶寶的聽力發展

生長

發展狀況

寶寶到了六個多月大時，媽咪可以觀察一下寶寶的聽力狀況。在這個時候，大人和寶寶說話時。寶寶偶爾會發出咿咿呀呀的聲音，眼神也會和大人有接觸。或者寶寶正在哭鬧，一聽到媽咪的聲音。可能就會安靜下來，這些都是代表寶寶聽力沒問題。而當周遭出現其他聲音，這些聲音來源又是在寶寶看不見的地方，多數寶寶就會被吸引，一直想找出聲音到底從哪裡來。

但要提醒一下，大人如果發現六、七個月大的寶寶對聲音反應時好時壞。這時只利用觀察方式並不準確，必須到專業的醫療院所。請專業人員運用專門的儀器檢查寶寶

聽力，才能了解寶寶是否有聽力受損問題。

預防接種

檢查

當寶寶滿六個月，這時如果遇到每年十月到隔年約二月的流感季，爸媽就可以帶寶寶去注射流感疫苗。寶寶若是第一次接種流感疫苗，需接種兩次，第一劑與第二劑的接種時間差距為四星期以上。

目前公費流感疫苗為四價流感疫苗，可預防兩型型流感病毒株與兩型型流感病毒株。因為可以預防四型流感病毒株，所以稱為「四價流感疫苗」。保護效果比過去傳統三價流感疫苗來得好，媽咪記得要記得帶寶寶打流感疫苗。以免寶寶遭受流感病毒襲擊。

疾病

特殊護理

寶寶拉肚子時，媽咪往往非常憂慮。此時務必讓寶寶補充足夠的水分，如果是母乳寶寶。這時候應該增加母乳哺餵次數；如果喝的是配方奶，則需要額外補充足夠水分。要讓寶寶喝的白開水，必須是經煮沸過的白開水。且水溫不宜過燙，至於要不要停喝配方奶或調整配方奶。可能需要和醫師進行討論。

面對寶寶腹瀉，媽咪千萬不可自行餵寶寶吃藥，請帶給醫師診治。在這個時刻，媽咪也不可以給寶寶喝含糖飲料，像果汁、碳酸飲料、檸檬水等，主要是因為這些飲料會讓寶寶腹瀉更嚴重。如果想預防腹瀉，可以哺餵母乳。且平常要多注意雙手清潔，寶寶的奶瓶、餐具要記得保持清潔。食物也要充分煮熟，這樣才能避免細菌、病毒入侵寶寶腸胃道。

來源：寶寶篇 第26週：如何協助26週寶寶坐得安穩？

寶寶篇第二十六週：如何協助二十六週寶寶坐得安穩？

生長

發展狀況

寶寶生長到了二十六週，也就是六個多月大。已經可以自己好好坐在有靠背的沙發上，媽咪這時候可以讓寶寶坐在自己的胸前。鼓勵寶寶做靠坐練習，剛開始寶寶可能坐不到幾秒就倒向旁邊。媽咪看到寶寶倒下來，不要太緊張。因為寶寶還不熟練，才會坐不穩。這是正常的現象，透過持續的練習。寶寶很快就會掌握訣竅，之後就會越坐越穩。坐的時候不再東倒西歪。

親子互動

媽咪如果希望刺激寶寶的認知、語言發展，可以多念故事書給寶寶聽。透過這樣的親子共讀，媽咪不只可以和寶寶密切互動。增進感情，寶寶未來的情緒控制能力與社會適應能力也會變好。

寶寶在六個多月大的時候，會對色彩鮮艷的圖像很感興趣。媽咪在親子共讀時可以準備柔軟的布書、有絨布等多種材質製成的童書，或者色彩明亮、可以發出聲響的童書。然後把寶寶抱在懷中，用溫柔的聲音念出童書內容。同時也可以牽著寶寶的手，感受一下書本材質的不同。讓寶寶除了有聽覺、視覺的刺激，也可以感受書本不同的觸感。在輕鬆的氛圍下，媽咪就可以和寶寶一起享受快樂的共讀時光。

哺乳疑難

寶寶六個月後，雖然已經開始吃副食品。媽咪還是可以讓寶寶繼續喝母乳，寶寶也可從喝母乳得到很多好處。像母乳可以提供寶寶三分之一所需熱量，還可以滿足寶寶一半以上的蛋白質需求。寶寶所需的維生素，九成以上也可從母乳獲得。但鐵的部分就需要額外補充。因此聯合國兒童基金會與世界衛生組織（）都鼓勵媽咪哺餵寶寶喝純母乳到六個月大，開始添加副食品後。媽咪還是可以繼續哺餵母乳，即使哺餵母乳至寶寶兩歲以上。母乳都還可以是寶寶重要的營養來源。

疾病 & 特殊護理

媽咪有時候會看到寶寶肚子鼓鼓的，可能會懷疑寶寶是不是脹氣？這邊要提醒一下爸爸、媽媽，當寶寶有腸胃問題時。除了肚子鼓鼓的，肚皮看起來很緊繃。食慾也會變差，身體可能還有其他不舒服的症狀。

但如果寶寶吃飽時，肚子鼓鼓的。敲敲寶寶的肚子，裡面好像有空氣。不見得就是代表寶寶脹氣、不舒服，只要寶寶精神與活動力都很正常。且沒有腹瀉、便秘或嘔吐的情況，摸寶寶肚子的時候。也沒有摸到硬塊，就不要太過擔心。等過一陣子，寶寶的肚子自然會恢復正常。或者媽咪也可以在寶寶肚臍周圍按摩，幫助消除脹氣。寶寶也會比較舒服。

來源：寶寶篇 第27週：寶寶出現W型坐姿，該糾正嗎？

寶寶篇第二十七週：寶寶出現型坐姿，該糾正嗎？

生長

發展狀況

寶寶二十七週了，媽咪會發現。寶寶越來越「坐有坐相」，原本只能靠在沙發上或靠在媽咪胸前坐著。背後必須要有支撐，椅子要有扶手。寶寶才會坐得好，現在寶寶就算一個人獨立坐在地上。背後沒有支撐，一樣也可以坐得很

穩。多數寶寶坐在地上的時候，雙腳是呈現環形。不過媽咪有時也會看到寶寶坐著，腳卻呈現形。看到這現象，不見得一定有問題。可能只是和寶寶的核心肌群、平衡感沒完全建立好有關，此時家長還是可以技巧性地調整孩子的坐姿。但是如果到了三歲，寶寶坐著而腿還是呈現形。而且幾乎不會採用其他坐姿，媽咪就要提高警覺。建議帶寶寶去醫院接受進一步檢查。

照顧

生活作息

寶寶六個多月後，乳牙一一冒出。乳牙長出來之後，媽咪可以用牙刷沾一層薄薄的含氟牙膏。然後用牙刷清潔寶寶的牙齒，要記得。不是只有牙齒需要清潔，其他如牙床、口腔黏膜與舌頭等處。也要用開水清潔乾淨；寶寶的乳白齒一長出來，清潔難度就會增加。清潔口腔時，更要留意有沒有死角沒清潔乾淨喔！

媽咪幫寶寶清潔牙齒時，還要注意以下幾點：

一幫寶寶清潔牙齒之前，一定要讓寶寶的頭有倚靠的地方，刷牙時，寶寶的頭才不會晃來晃去。

二環境要明亮、安全，像沙發、地毯和床上等，都很適合寶寶安穩倚靠。

三寶寶也可以把媽咪的大腿當枕頭，當寶寶把頭枕在媽咪的大腿，媽咪就可以安心幫寶寶清潔口腔，清潔口腔工作也才能面面俱到。

四寶寶的牙齦很脆弱，刷牙力道太用力。寶寶牙齦很容易出血、受傷，所以為寶寶刷牙的力量要輕柔一點。避免寶寶牙齦受到傷害。

副食品添加

寶寶六個月大的時候，飲食應該添加副食品。媽咪可以每次為寶寶添加一項新的副食品，建議先從一到二茶匙少量開始。之後以三至五日為單位，循序漸進增加副食品份量。並添加其他種類食物。

在這三至五天的觀察期，媽咪可以觀察一下寶寶吃下新的食物後有沒有出現腹瀉、嘔吐或皮膚起紅疹等過敏現象。如果沒有這些過敏現象，再逐步增加食物份量。或者再加入另一種食物，如果媽咪一次加入多種食物。就不會知道寶寶不舒服的背後元凶。當吃了某種新食物後，寶寶的身體非常不舒服，這時就要建議媽咪，暫時不要再讓寶寶吃這種食物。

此外，為寶寶選擇副食品時。可以從米精、麥精與煮得較稀的粥著手，這些穀類食物較不會引起過敏反應。但即便如此，寶寶吃穀類食物時。還是先從少量開始，再逐漸增加。

來源：寶寶篇 第28週：協助寶寶探索，可以怎麼做？

寶 寶 篇 第 二 十 八 週：協助 寶 寶 探 索，可 以 怎 麼 做？

生 長

發 展 狀 況

寶 寶 成 長 邁 入 二 十 八 週，也 就 是 大 約 七 個 月 大。在 這 時 期，男 寶 的 身 高 約 六 百 五 十 一 到 七 百 三 十 二 公 分。體 重 約 六 十 七 到 一 百 零 二 公 斤，頭 圍 為 四 百 一 十 七 到 四 百 六 十 三 公 分；女 寶 身 高 約 六 百 二 十 九 到 七 百 一 十 六 公 分。體 重 約 六 十 一 到 九 十 六 公 斤，頭 圍 則 大 約 為 四 百 零 四 到 四 百 五 十 三 公 分。

寶 寶 在 這 時 候，會 很 喜 歡 玩 自 己 的 手 手。可 能 雙 手 會 握 在 一 起，互 相 捏 一 捏 或 摸 一 摸。自 得 其 樂。當 寶 寶 接 觸 到 不 同 質 感 的 東 西，也 會 感 到 很 新 奇。就 會 想 要 一 直 摸，眼 睛 也 會 仔 細 觀 察 手 上 的 物 品。探 索 的 能 力 正 逐 漸 增 長。

照 顧

生 活 作 息

對 照 寶 寶 過 去 的 生 長 與 發 展 狀 況，媽 咪 如 果 發 現 寶 寶 的 身 高、體 重 的 百 分 位 都 在 往 下 掉。很 可 能 是 內 分 泌 或 一 些 遺 傳 問 題 引 起，像 缺 少 生 長 激 素 就 會 有 類 似 表 現。建 議 帶 寶 寶 看 一 下 醫 師，看 看 是 否 需 要 接 受 進 一 步 的 檢 查。

另 外，寶 寶 缺 乏 維 生 素 也 會 影 響 骨 骼 生 長。建 議 媽 咪 在 每 天 上 午 十 點 前 與 下 午 兩 點 後，陽 光 不 是 最 炙 熱 的 時 候 帶 寶 寶 去 曬 太 陽。或 諮 詢 醫 師 是 否 需 服 用 維 生 素 補 充 劑，幫 助 維 持 寶 寶 骨 骼 正 常 發 育。但 要 提 醒 一 下，帶 寶 寶 去 曬 太 陽 的 時 候。小 心 不 要 讓 寶 寶 曬 傷。

哺 乳 疑 難

二 十 八 週 大 的 寶 寶 多 數 已 經 長 了 牙 齒，喝 母 奶 時，如 果 用 牙 齒 咬 了 媽 咪 的 乳 頭，那 種 痛 真 的 讓 人 很 受 不 了。而 寶 寶 喝 母 奶 時 突 然 咬 媽 咪 的 乳 頭，背 後 有 許 多 原 因。常 見 原 因 為 寶 寶 正 在 長 牙，感 覺 牙 齦 癢 癢 的、有 點 不 舒 服。就 會 嘗 試 用 媽 媽 的 乳 頭 來 磨 牙；也 可 能 是 因 為 寶 寶 感 冒 或 耳 朵 受 感 染，鼻 子 塞 住 了。這 時 寶 寶 難 以 呼 吸，吞 嚥 也 有 點 困 難。吸 母 奶 時 也 可 能 會 不 小 心 咬 到 媽 咪 乳 頭。除 此 之 外，寶 寶 想 吸 引 媽 咪 注 意 或 只 因 為 好 玩，也 可 能 讓 妳 的 乳 頭 受 傷。

很 多 媽 咪 被 寶 寶 咬 了 乳 頭，第 一 時 間 會 痛 到 大 叫。甚 至 會 想 把 寶 寶 推 開，但 此 時 貿 然 推 開 寶 寶。媽 咪 乳 頭 很 容 易 受 傷，所 以 要 保 持 冷 靜。可 以 用 洗 淨 的 食 指 或 小 指 放 入 寶 寶 口 腔，讓 寶 寶 嘴 巴 離 開 乳 房。接 著 媽 咪 可 以 檢 查 一 下 乳 頭 有 沒 有 破 皮、受 傷，如 果 受 傷。可 以 擠 出 一 點 乳 汁，將 乳 汁 塗 抹 在 受 傷 處。可 以 減 輕 疼 痛 並 加 速 傷 口 復 原。此 外，媽 咪 也 要 嚴 肅 告 訴 寶 寶。不 可 以 咬 媽 咪 的 乳 頭，讓 寶 寶 了 解。這 樣 做 會 讓 媽 咪 受 傷，媽 咪 會 很 不 舒 服。相 信 多

說幾次後，寶寶咬乳頭的機率就會減少許多。

來源：寶寶篇 第29週：寶寶會爬時～家人應多注意環境安全

寶寶篇第二十九週：寶寶會爬時～家人應多注意環境安全

生長

發展狀況

很多寶寶到了二十九週，已經開始會爬了。可能正練習著用腹部貼地的方式匍匐前進，或者在爬行時四肢並用。媽咪看到寶寶會爬了，雖然很開心。但看到寶寶活動範圍變大了，移動速度更快。神經可能會很緊繃，因此更需要所有家人的支持與投入。

另外，還有一些寶寶在大動作的發展上「超前部署」，不想花太多時間爬行，在七個多月大就嘗試扶著東西站立。媽咪看到這種情形不用特別去壓抑或限制寶寶站立，因為寶寶要站起來。牽涉到體重與腿部肌肉的發展，寶寶間的個體差異很大。如果是寶寶自己想要站立，代表他／她的身體已經準備好了。媽咪只要在旁邊觀察、鼓勵，多注意週遭環境的安全性即可。

親子互動

過隧道

寶寶已經會爬了，媽咪如果想訓練一下寶寶的腰部和手、腳的肌肉與動作協調性。可以和寶寶玩「過隧道」的遊戲，就是準備一個紙箱。將前後兩邊開口，作為隧道出入口。接著，就可以鼓勵寶寶爬行穿越紙箱。

當寶寶在狹窄的紙箱內爬行，除了必須協調手腳力量，也必須保持身體平衡。此時，媽咪可以在旁邊和寶寶說說話。鼓勵寶寶爬出來，當寶寶爬出紙箱。第一眼看到媽咪的臉，就會感到很安心。

寶寶在地上爬行的時候，媽咪也要留意一下地板上有沒有銅板、鈕扣、小珠子、別針或螺絲釘等小東西。也要檢查玩具的小零件，像玩偶的眼珠等有沒有脫落。以免寶寶看到這些小東西就往嘴巴塞，或者塞住鼻孔。造成危險。

副食品添加

寶寶二十九週時，已經吃副食品了。這時，媽咪餵寶寶吃副食品的飲食份量。要怎麼拿捏呢？對於約七個月大的寶寶，一日飲食建議食物包含「母乳或嬰兒配方食品」、「全穀雜糧類」、「蔬菜類」、「水果類」與「豆魚肉蛋類」等五大類食物。

在「母乳或嬰兒配方食品」的攝取上，建議還是以母乳為主。如果是「全穀雜糧類」食物，寶寶一天的飲食建議量為

嬰兒米精、嬰兒麥精或稀飯四湯匙。若要餵寶寶吃蔬菜，建議一天吃一到二湯匙；水果的一天建議攝取量為果泥或鮮榨果汁。份量也是一到二湯匙（以上一湯匙的份量約為十五公克）。

若是要補充「豆魚肉蛋類」食物，媽咪可以嘗試給寶寶吃點蛋黃泥。剛開始先吃一小口，觀察寶寶的反應。如果沒有過敏現象，再逐步增加。建議一天蛋黃攝取量為半顆到一顆，但一天不要吃超過一顆蛋黃。在這階段，寶寶還是可以繼續喝母乳或配方奶，它們仍可提供熱量及營養上的需求，請媽咪不用擔心。

來源：寶寶篇 第2週：親子互動促進五感發展

寶寶篇第二週：親子互動促進五感發展

生長發展狀況

小寶貝出生第二週了！經過一週與寶寶的相處，相信媽咪應該更能掌握一些照顧的技巧。這個階段寶寶的眼睛可以隨目標移動，妳可以拿著玩具逗孩子，讓寶貝的小眼珠更加靈活。聽力方面除了可以辨別熟悉者聲音，對明顯聲響也會有反應喔！

哺乳疑難

隨著孩子誕生來到第二週，先跟爸媽說聲辛苦了！尤其母乳寶寶一天可能要餵八到十二次，頻率還不固定。這時妳可能會感覺無法好好休息，所以除了哺乳外。其他事物可以多勞爸爸幫忙。媽咪哺乳時，記得自己和寶寶的姿勢都要放鬆，並且讓寶寶面對自己的臉和胸部；其次寶寶吸吮時嘴巴要含得夠大，下巴貼著乳房才能順利吸吮喔～

如果妳的寶寶是餵配方奶的話，一天約餵六到八次。每天每公斤約需一百五十到一百八十的量，可平均分配於每一餐。但也不用太勉強孩子一定要喝完，原則上只要寶貝的生長曲線有穩定成長就可以囉！

預防接種檢查

上一週小寶貝挨了針，爸媽一定很心疼（淚）。不過別擔心，第二週沒有常規疫苗需要接種，但若是漏打出生時的型肝炎疫苗，則要盡快回診接種喔～

此外，第一週提到的「新生兒先天性代謝異常疾病篩檢」及「新生兒聽力篩檢」都可分別於出生一個月內與三個月內做篩檢，所以如果寶寶第一週還未篩檢，這時可以盡快安排喔～

疾病特殊護理

這時候媽咪仍要持續幫寶寶消毒、清潔臍帶直到脫落喔～此外，部分新生兒有黃疸情形。所以爸媽記得注意皮膚

清潔，並哺餵充足的奶水促進代謝。以及觀察呼吸、吸吮、大小便狀況，若仍顯得沒力氣應盡速就醫。另外也可透過《兒童健康手冊》嬰兒黃金九色卡，隨時觀測寶寶便便。注意有無出現灰白便，以早期診斷膽道閉鎖等疾病。

親子互動

這時期的寶寶喜歡被撫摸，因此爸媽可以在寶寶洗完澡或睡前進行嬰兒按摩。並多跟他們說說話，這樣可以刺激聽力、增加親密感；此外。從寶寶出生起就可以進行親子共讀，不僅可以增進親子關係。也有助於語言、認知等發展，爸媽可先從日常生活中的小圖卡、小布書進行共讀。也可無形中成為孩子成長的養分。

照顧生活作息

除了哺餵奶外，媽咪跟爸比都要學的是拍嗝的技巧。尤其如果寶寶採瓶餵，每次餵完奶都必須要拍嗝。因為瓶餵容易吸到空氣，可能會導致溢吐奶。方式主要有兩種：

一坐姿拍嗝：媽咪可以讓寶寶坐在妳的腿上，一手支撐寶寶頭頸部，另一手拱起呈三角形拍寶寶背部。

二直立拍嗝：媽咪將寶寶的頭頸靠在肩上，一手撐住寶寶下半身，另一手拱起呈三角形拍寶寶背部。

此外，好的睡眠習慣有賴於從小養成。所以這時仍需繼續幫寶寶營造良好環境，床內不擺放雜物、鬆軟物件。以及每次睡覺都仰睡、每晚進行睡眠儀式，包括建立每晚固定上床時間、哄睡方式。例如：播放輕柔音樂、說故事哄睡等，才能養出睡眠好習慣。

來源：寶寶篇 第30週：三十週大的寶寶雙手更靈敏了！

寶寶篇 第三十週：三十週大的寶寶雙手更靈敏了！

生長

發展狀況

寶寶在三十週大，不只已經開始爬行，在細動作的發展上，也有很大的進步喔！當寶寶躺在床上，媽咪拿著搖鈴、玩具逗寶寶玩的時候，他可能會伸出雙手，想要抓一下玩具。這時候的寶寶，雙手老是東抓西抓。可能順手一抓，把媽咪臉上的眼鏡扯下；當媽咪靠近時。寶寶也會摸摸媽咪的臉、鼻子，或隨手扯一下頭髮。非常調皮。

這時的寶寶如果臉上蓋著手帕，自己也有能力把手帕移開。不過要提醒一下媽咪，雖然寶寶已有能力拿掉臉上的手帕。但在睡覺的時候，若使用毛巾被或毛毯保暖。就只能覆蓋到寶寶胸部位置，千萬不要覆蓋在寶寶臉上。同時被子也不可過於厚重、鬆軟，才不會造成窒息或嬰兒猝死風險。

照顧

生活作息

媽咪多半希望自己孩子的頭型可以很好看，雖然知道寶寶仰睡是最安全的睡覺姿勢，但又不太希望寶寶因為長時間仰睡而把頭形睡扁，此時媽咪可以這樣做：

一 注意不要讓寶寶在睡覺時頭部固定偏向某一面。

二 多數寶寶喜歡朝門的方向看，隨時注意有哪些人進出，媽咪可以每星期將寶寶睡覺的床頭、床尾方向對調一次，寶寶就不會處在同一姿勢過久。

三 寶寶醒著的時候，媽咪可以讓寶寶有一段時間趴著玩耍。一天玩個幾次，避免寶寶後腦杓長時間受壓迫而變成扁頭。這樣做同時也可以訓練寶寶的頸部與肩膀肌肉力量。

疾病

特殊護理

此階段的寶寶很容易感染中耳炎，媽咪要多多注意喔！中耳炎大多是病毒性呼吸道感染的併發症。但寶寶這時還不會說話，媽咪怎麼會知道寶寶得了中耳炎？事實上，當寶寶得到了中耳炎，可能會有以下症狀：

一 常摸著耳朵或拉著耳朵，可能因為耳朵痛、耳鳴而心情煩躁、哭鬧不休。

二 有時會有聽力受損的狀況，對於大人說話、聲音刺激較沒有回應，或者因暈眩而不舒服哭鬧、恍神。

三 寶寶的耳朵可能出現分泌物。

當媽咪看到寶寶疑似中耳感染，千萬不要用棉花棒幫寶寶清潔耳道。因為這可能引起更大傷害、疼痛，且寶寶哭鬧或掙扎時。棉花棒也可能不小心戳到寶寶耳朵深處，因此這時建議媽咪趕快帶寶寶尋求醫療協助。交給專業醫師來處理，才不會越弄越糟。

來源：寶寶篇 第31週：如何知道寶寶視力是否正常？

寶寶篇 第三十一週：如何知道寶寶視力是否正常？

生長

發展狀況

寶寶到了三十一週，如果寶寶的聽力是正常的。現在可能已經在牙牙學語，或者發出一些「」、「」、「」的聲音。而且非常自得其樂，不只如此。這時候的寶寶也很喜歡玩會發

出不同聲音的玩具，聽到背後有聲音。也會轉頭看一下，探索聲音來源。但寶寶如果沒有回頭，也不代表就是聽力有問題。可能只是專心在玩，沒注意背後有聲音。媽咪可以多觀察，真的懷疑寶寶聽力有問題。應帶寶寶去醫院做聽力檢查，看看有沒有聽損現象。

這時候，寶寶的視力大約為二。看東西時，眼睛已可以聚焦於特定物品。當東西在移動，像貓咪、狗狗在旁邊走來走去。寶寶也會跟著轉頭，或者喬一下姿勢。讓視線更清楚。而這時候，媽咪也可以和寶寶玩捉迷藏、滾球之類的小遊戲，多刺激寶寶感官能力發展。

照顧

生活作息

寶寶的活動力越來越旺盛，有時明明應該要睡覺了。卻還是貪玩，這時候。因為很累，又很想玩。寶寶就會很「盧」、煩躁不安。如果想要孩子健康成長，就寢時間就不應該讓寶寶自己決定，而是媽咪要幫寶寶訂出一個合理的就寢時間，且要確實執行。

此外，前幾週我們也有提過。媽咪可以幫寶寶建立一套「睡眠儀式」，幫助寶寶放鬆心情。準備入睡。而「睡眠儀式」可以是「洗澡、換睡衣、喝水、上床、量耳溫、講故事、道晚安、關燈」，當寶寶習慣這套暗示該就寢的儀式，就比較可以順利入睡。

副食品添加

媽咪在烹調副食品的時候，可以用更簡便的方式，一次處理好大人跟寶寶的食物。譬如，媽咪可以選擇瘦肉、白菜、白米等大人、小孩都能吃的食物。將食物清洗、處理乾淨後，直接加水烹調成白菜瘦肉粥。但先不要加入鹽、味精、醬油等調味料，取出寶寶要食用的份量後。運用寶寶專用的刀具、砧板，或用食物調理機、攪拌棒將食物絞碎。這時就可以給寶寶食用；其餘的份量在進行調味後，便可以成為大人的食物。不過媽咪要記得，一次製作的份量不要太多，免得存放太久降低食物營養價值，且食物也會變得不好吃。

來源：寶寶篇 第32週：行動更敏捷的八個月大寶寶

寶寶篇第三十二週：行動更敏捷的八個月大寶寶

生長發展狀況

寶寶生長到了三十二週，也就是大約八個月大。在這時期，男寶的身高大約介於六百六十五到七百四十七公分。體重介於七到一百零五公斤，頭圍為四百二十二到四百六十九公分；女寶的身高介於六百四十三到七百三十二公分。體重在六十三到十公斤之間，頭圍則大約在四百零九到四百五十九公分的範圍。

媽咪會發現，小寶貝的行動力更好。移動身體的招式也變得更多，像坐在地上的時候。如果看到想要的東西，也可以移動身體。逐漸靠近這項東西；拿到東西之後，小寶寶可以將東西由一手換到另一手。雙手的動作也更為協調、靈活。

哺乳疑難

有些媽咪在哺餵母乳時期會想要染頭髮、燙頭髮，換一下髮型。讓自己看起來更漂亮，也更有精神。但是媽咪可能擔心染髮劑、燙髮劑對寶寶的健康造成影響，事實上。這些想法可能是多慮了。

目前，沒有任何研究數據發現媽咪在哺乳時期使用染髮劑、燙髮劑會對寶寶造成負面影響。主要原因在於，和其他使用在皮膚表面的藥品一樣。染髮劑、燙髮劑也都只用在皮膚的表面，因此吸收到體內的量可說是微乎其微。對喝母乳的寶寶，影響非常小。若媽咪的頭皮是健康而完整，染髮劑的吸收量會比頭皮有抓裂傷口時更少。

當媽咪在哺乳階段想燙髮、染髮，可以參考以下建議：

一 選擇專業、合格的美髮師。

二 對於正在哺乳這件事，需要主動告知美髮師。

三 洗頭時，動作要盡量輕柔，不要抓傷頭皮。

四 多選擇含天然成份的染髮、燙髮產品。

五 染髮、燙髮時，環境要注意通風。

六 請美髮師盡可能不要讓藥劑直接接觸頭皮。

疾病

特殊護理

寶寶那麼小，牙齒也沒有長多少顆，怎麼會蛀牙？媽咪一聽到寶寶會蛀牙，很可能產生這樣的疑惑，不要懷疑！寶寶長牙後，多數已經開始吃副食品。如果未養成清潔口腔的習慣，加上不的飲食習慣。很容易就會產生蛀牙，在醫學上。這稱為「幼兒早發性齲齒」。

寶寶會蛀牙，主要是因為口腔內的食物殘渣經細菌發酵，產生了酸性物質，進而侵蝕牙齒。寶寶剛開始蛀牙，多半發生在上顎前牙、後牙的咬合面。原本是白色斑點，後來就會轉變為褐色、黑色。甚至可能蛀出一個洞。

以下這些習慣，都容易造成寶寶蛀牙，要注意喔！

一一 一邊含著奶瓶喝奶，一邊入睡，或喝母乳時含著媽媽的乳頭入睡，便很容易蛀牙。

二 經常吃含糖飲料、含糖食物，也會增加蛀牙風險。

三 不良的含飯習慣，常讓細菌有可趁之機，可能進一步造成蛀牙。

要避免寶寶早早就出現蛀牙，除了每天幫寶寶清潔口腔，也可以使用含氟牙膏，降低蛀牙發生率。不只如此，媽咪也要帶寶寶定期檢查牙齒，還有，健康飲食也是非常重要！

來源：寶寶篇 第33週：如何與33週寶寶親子共讀？

寶寶篇第三十三週：如何與三十三週寶寶親子共讀？

生長

發展狀況

寶寶生長到了三十三週，已經八個多月大。媽咪會注意到，寶寶更有勇氣爭取自己想要的食物、玩具。媽咪在餵寶寶吃東西的時候，寶寶會張開嘴巴。或運用其他肢體動作表達自己很想吃這些食物，平常也會自己拿餅乾吃。這時候的媽咪看到寶寶想用手抓食物、玩食物，不用太過緊張。這是寶寶的成長歷程，媽咪要輕鬆看待。盡量用正面的教養方式加以引導。

親子互動

寶寶八個多月大的時候，已經開始想模仿大人說話與聲音語調。在這個時候，媽咪可以抱著孩子。一一指著書上的圖案，然後說出物品或動物的名稱。在這個時期，寶寶可能會丟書、吃書、咬書。或看到有趣的圖片就用手拍打，這些動作都是正常行為。寶寶透過這些行為來認識書本，且這些行為也可以幫助寶寶發展良好的感覺統合能力。因此媽咪不需刻意制止，建議繼續維持親子共讀習慣。

有些媽咪可能認為，寶寶年紀那麼小，聽得懂故事內容嗎？事實上，寶寶注意力集中的時間比較短。但聽覺特別敏銳，媽咪說故事的重點。不在於故事本身內容，而是要讓寶寶透過媽咪說故事的聲音、語調。感受到媽咪的關愛，寶寶的情緒也會更為穩定。另外，很多媽咪會將共讀列為寶寶睡前儀式的一環，如果能以溫暖、柔軟的聲音哄寶寶入眠，自己的情緒也能獲得沉澱的機會。

副食品添加

在這時候，寶寶已經進入副食品階段。應該已經嘗試了一些食物，但媽咪要注意。不是所有的食物都是適合寶寶，像含糖飲料、茶與含咖啡因食品就不太適合寶寶。

寶寶在兩餐喝奶時間的中間，可以喝點白開水。一方面可

滋潤口腔，另一方面也可以增加水分攝取。但這時候不要餵寶寶喝葡萄糖水、含糖飲料，因為寶寶喝葡萄糖水、含糖飲料後。一下就吃飽了，到了正餐時間。便不願意喝正餐奶水，吃其他副食品的意願也會大打折扣。這樣營養攝取就會受到影響，寶寶也會提早進入厭奶期。此外，當糖水長時間滯留口腔。寶寶的乳齒也會提早受破壞，且長時間喝含糖飲料。養成習慣，長大要改就會很困難。長久下來，也容易引起肥胖問題喔。

來源：寶寶篇 第34週：舒緩寶寶的長牙不適

寶寶篇第三十四週：舒緩寶寶的長牙不適

生長發展狀況

隨著坐得越來越穩且時間也逐漸變長，開始學習用身體來移動位置。他會盯著感興趣的玩具看，努力地挪動自己的小屁股去取得它，且可以自己玩更長的時間了。嬰兒期的寶寶可能坐成型，若二歲過後。寶寶總是坐成坐姿，媽咪就應該多提醒他。良好的坐姿應該是雙腿交叉向前的盤坐，或是兩腿往前伸直的姿勢喔！

此外，寶寶差不多開始爬行了。初期，大多是以同手同腳方式移動。每個寶寶的爬行姿勢都不太一樣，媽咪不需要刻意教導寶寶的姿勢。不管他是怎麼爬，寶寶不久之後就可以到處移動。

疾病特殊護理

媽咪要注意囉！當這個階段的寶寶不明原因發燒三、四天，但精神活力及食慾都還好。也可能有輕微咳嗽、流鼻涕之類的上呼吸道感染症狀。幾天後燒退了，身上出現如玫瑰色的紅斑或丘疹（大小約二到五公分），通常不會癢，也不會有水泡。此時醫師才能確診妳家的寶寶得了玫瑰疹！

起因於人類疱疹病毒第六型（-六）和第七型（-七）兩種病毒感染的玫瑰疹，多半發生在六個月～二歲的寶寶。整年都可能發生，通常會自然痊癒。不會留下後遺症。在發燒時，適時給予退燒藥並補充水分即可。玫瑰疹的診斷重於治療，請配合兒科醫師的檢查及追蹤，以免延誤治療喔～

照顧生活作息

我的寶寶怎麼還沒長牙？是鈣質不夠嗎？媽咪請別擔心～每個寶寶的長牙時間都不一樣，最早可能四個月就長了，最晚到一歲多（十三個月）才會冒出第一顆小乳牙。而大部分寶寶在二到三歲時，會長滿二十顆乳牙。

提醒媽咪的是，當寶寶長牙時。可能會有些腫脹不適，妳可以拿紗布巾沾水幫寶寶按摩牙床、給予固齒器及適合磨牙的食物（如：蘋果、芭樂）。藉以舒緩長牙的不舒服，當然別忘了清潔乳牙！

副食品添加

此階段的寶寶可能已經不喜歡糊糊的泥狀食物了，媽咪可以適時添加有顆粒狀、但不會太硬口感的食物，像是用叉子壓碎已煮軟的食物就是最簡單的作法，也可以藉此讓寶寶練習咀嚼。媽咪不用擔心寶寶沒長牙無法啃咬，他的牙床可是能夠咀嚼柔軟的食物了喔！

而當寶寶吃的副食品種類夠多、量也足夠時，可逐漸少一餐的奶。要提醒媽咪，副食品的攝取以均衡營養為目標，所以儘量在寶寶八個月大時，嚐遍各類食物。

來源：寶寶篇 第35週：寶寶爬行環境的佈置

寶寶篇 第三十五週：寶寶爬行環境的佈置

生長發展狀況

八個月寶寶的爬行動作會是肚子貼地板，好像匍匐前進一樣。當寶寶學會用手和膝蓋承重，就能肚子離地的爬行，再逐漸地以四肢對稱交替前進爬行。在順利地往前爬行之後，寶寶能夠四處探索，也能激發他的好奇心。因此，媽咪只要知道爬行的好處很多，儘可能地提供寶寶爬行的機會就好了～

哺乳疑難

不小心感染了登革熱的媽咪還可以餵食母乳嗎？根據目前可知的資料來看，大部分感染登革熱但不嚴重的媽咪，建議繼續餵。若有嚴重登革熱症狀的媽咪（如：出血熱或休克），則建議暫停。不過，每個人的狀況都不同，媽咪可個別諮詢感染科醫師及泌乳顧問，以找出適合的方式。

疾病特殊護理

寶寶咳嗽、流鼻水，還連續高燒三、五天了，是怎麼回事呢？當心是感染腺病毒！除了與感冒初期症狀類似，腺病毒還可能有眼睛紅、淋巴腫、扁桃腺化膿等症狀。感染腺病毒主要採支持性療法，適度給予退燒。媽咪要注意寶寶的水分補充，同時觀察寶寶是否會喘。對抗腺病毒用酒精乾洗手液是沒什麼效果，還是得用肥皂、清水洗手。而寶寶的玩具可使用稀釋過的漂白水來消毒。

親子互動

雖然寶寶很可愛，讓人很想一直抱著，但他已經需要練習爬行了喔！在寶寶精神狀態不錯的時候，先把寶寶放在地上。媽咪再到寶寶的前方，一邊拿著他喜歡的玩具。一邊喊著他的名字，誘導寶寶去碰觸。吸引他爬行，並學著控制爬行的方向。

媽咪也可以與寶寶一起坐在地上，讓他在妳的身上翻來

滾去、爬上爬下，或是跟著寶寶一起匍匐前進，讓他感受到爬行活動的有趣！

照顧生活作息

練習爬行的寶寶需要一個安全的爬行環境，媽咪可以用寶寶的高度來看看，就可以知道家裡哪裡需要注意了。

一厚度適中的地墊讓寶寶爬得更好！

二尖銳的桌角、櫃子角要有保護墊。

三插座要有防護蓋，以免誤觸觸電。

四地上保持乾淨，以免誤食小東西。

五家中若有樓梯，要加裝安全柵欄。

副食品添加

媽咪都知道均衡營養的重要性，但寶寶看到某幾樣食材，就會撇頭過去閉嘴不願意吃。對於寶寶不喜歡吃的食材，其實只要多接觸幾次，通常接受度就會提升。媽咪請別氣餒再多試幾次吧！

另外，許多媽咪擔心寶寶會過敏。因此餵副食品時總是避開海鮮、花生、蛋黃等易致敏食物，但其實研究證實。一歲前的副食品應該多樣化，除非寶寶吃了某些食物會過敏。否則不必特別限制易過敏的食物，這樣反而可以降低未來發生過敏的機會。但媽咪給予副食品時應注意，一次一樣新食物、連續幾天，觀察寶寶的反應，沒有問題後再嘗試另外一種。若寶寶出疹子、嘔吐、腹瀉，可能就是過敏了，應停止餵食並詢問醫師的意見。

來源：寶寶篇 第36週：給寶寶手指食物 自己動手吃！

寶寶篇第三十六週：給寶寶手指食物自己動手吃！

生長發展狀況

寶寶進入第九個月了！這個月男寶寶的身高大略介於六百七十八到七百六十三公分，體重約七十三到一百零九公斤，頭圍則是四百二十七到四百七十四公分。這個月女寶寶的身高大略介於六百五十七到七百四十八公分，體重約六十六到一百零四公斤，頭圍則是四百一十三到四百六十四公分。

而他的視野更廣、也更清晰了，且色彩概念已發展完全。會觀察身旁的東西，即便手上拿著玩具，眼睛還可以看其他地方。還會看立體的東西，對於距離、高度、寬度及深度有進一步的瞭解。

此外，寶寶的嗅覺能力在八個月之後就發展得差不多了，能夠分辨出不同氣味。媽咪可以準備幾種蔬菜水果給寶

寶看一看、摸一摸、聞一聞，刺激多種感官。

疾病特殊護理

寶寶生病時，不僅特別「歡」。連餵寶寶吃藥還像是打戰，真是辛苦媽咪了～但到底要怎麼餵藥。寶寶才會乖乖配合呢？

一媽咪可將寶寶抱在胸前，採半橫臥姿勢，切勿平躺，以免噎到。

二餵藥時，給予簡單指示，讓寶寶知道要吃藥了。

三餵藥器靠在寶寶的嘴角，再緩緩倒入。

四無論劑量多少，都要少量分次，不強迫灌食。

五避免搭配母乳或配方奶。

照顧生活作息

大約在第九個月時，媽咪可能會發現，寶寶的傍晚不再需要小睡了，白天從三次小睡剩下兩次。通常睡得比以前好，小睡作息更加穩定且更長一些。順利的話，寶寶也不會在夜晚醒來討奶喝（媽咪請歡呼～）。但也可能隨著寶寶的行動力變強，玩到捨不得小睡，使得夜晚難以入睡或是頻頻夜醒，變成惡性循環了！請媽咪儘量保持規律的生活作息，不僅讓寶寶有安全感、穩定情緒，媽咪也比較好安排自己的時間。

此外，在白天適時地讓寶寶曬些太陽（記得把手和腳露出來。增加陽光照射的表面積），不僅有助於夜間的睡眠。也幫助維生素的合成，藉此促進鈣質吸收。可調節免疫功能。

副食品添加

當媽咪在餵寶寶吃副食品時，他卻伸出小手來想要抓住湯匙？還想自己用手抓食物？提醒媽咪，這代表是時候給他「手指食物」了。讓寶寶自己動手吃，除了可以促進精細動作發展。還可增加進食樂趣！

只要是長條形、好抓取、口感軟的食物（避免又小又硬及顆粒狀的東西），都蠻適合做為寶寶的手指食物（當然還是要符合天然少添加的原則），包括：

一紅蘿蔔、南瓜、地瓜

二玉米筍、花椰菜

三香蕉、蘋果、芒果

四麵包、饅頭、餅乾、牙餅

五 蝴蝶麵、通心麵

來源：寶寶篇 第37週：陪著寶寶練習扶站

寶 寶 篇 第 三 十 七 週：陪 著 寶 寶 練 習 扶 站

生 長 發 展 狀 況

媽咪知道嗎？寶寶之前學趴、翻身、坐等動作，都是在為了接下來的站和走做準備。而九個月大的寶寶差不多可以扶著沙發、小桌子或椅子等家具而站起來，且通常能夠扶著家具站一段時間。只不過站立時，寶寶的身體會向前靠著家具。

疾 病 特 殊 護 理

當寶寶學會扶站之後，媽咪卻突然發現寶寶好像有型腿？站起來還外八？其實這通常是正常的生理現象，隨著寶寶的成長，就會自然地逐漸改善了。

嬰兒在胎兒期因母體內壓迫的關係，所以正常的新生兒，小腿會有些許內彎。當寶寶開始學站或走時，加上負重的關係（體重增加）會讓型腿更加厲害，尤其是在六到十二月大時。到了十八個月到二歲之間，腳會慢慢變直。型腿會持續修正，二歲時反而腳會有點往外彎。呈現型腿的情況，此情況在三到四歲時最明顯。之後隨著腳的發育健全，最晚在七到八歲會變回正常。

親 子 互 動

當寶寶能夠站起來，他的視野就變得不一樣，他會感到更加好奇，也會更好動。媽咪陪伴寶寶練習站立時，也要注意安全喔！

一 媽咪扶著寶寶的腋下，幫助寶寶從坐到站，讓寶寶知道站起來的感覺，也可訓練寶寶的腿部肌肉。

二 當寶寶站立時，媽咪可以在寶寶的身體前方放置像是桌子、椅子等穩固的物品，讓寶寶可以倚靠著來練習站立。

三 也可以讓寶寶的背靠著牆壁或沙發，背部有了支撐，他會站得較穩。

四 在寶寶扶站的家具上放個玩具，引起寶寶興趣，誘使他站立起來及持續較長時間。

照 顧 生 活 作 息

家中長輩平常都會開著電視，在寶寶還小的時候。媽咪可能覺得他們好像沒有特別反應，不過。現在他九個月多了，似乎發現了電視的存在。時不時盯著電視看，但這麼小的寶寶可以看電視嗎？答案是：二歲以下的寶寶是不適

合看電視的喔！

寶寶看電視看久了，不僅容易近視，也會減少與爸媽互動的時間，影響人格發展與人際關係。而讓寶寶看平面的螢幕，不利於空間立體感的發展。且螢幕的跳動畫面，將影響專注力的發展。所以無論是電視，還是手機、平板都不適合寶寶接觸！

副食品添加

隨著寶寶的副食品越吃越多，的攝取隨之減少，此時要特別注意額外補充水分。建議媽咪可以在餐後提供一些水給寶寶喝，也可以練習使用吸管和杯子。至於喝水量，可以透過觀察寶寶每日換尿布的次數與尿液量來判斷。

來源：寶寶篇 第38週：對抗塵蟎大作戰！

寶寶篇第三十八週：對抗塵蟎大作戰！

生長發展狀況

媽咪看得懂寶寶的手勢嗎？在還不能開口用語言表達想法之前，寶寶的「手指指示」就是重要的溝通方式！正在努力學習用手勢來展現自己想法的寶寶，一開始是「用手指指示」，他會用整隻小手，指著某個方向。

不過，差不多在九個月之後。隨著手指肌肉發展成熟，寶寶漸漸地學會「用手指指示」。伸直食指，具體地指著某個東西。

疾病特殊護理

媽咪您可知道切完肉、碰觸了雞蛋沒洗手就泡配方奶給寶寶喝，可能讓寶寶感染沙門氏菌！

寶寶會有噁心、嘔吐、腹瀉甚至解血便，伴隨發燒及腹部絞痛。通常發燒七十二小時內會好轉，但年幼寶寶可能較為嚴重。易因菌血症引發其他嚴重併發症。該怎麼預防寶寶感染沙門氏菌呢？

一 食物煮熟即可以殺滅。

二 生熟砧板分開避免交叉感染。

三 食材烹煮前要確實清洗乾淨。

四 母乳與其他食物分開冷藏保存。

五 媽咪寶寶都要勤洗手，尤其是換尿布後。

親子互動

當寶寶指著某個東西時，媽咪應該往那個方向看並回應他。可以直接告訴他所指東西的名稱，或是猜想他的想法

幫他說。像是「這是杯子～」、「你要玩球嗎？」媽咪這樣做可以讓寶寶感受到成功表達想法的成就感，也有助於提升說話意願及溝通，為將來學習語言事先做準備。

照顧生活作息

妳家的寶寶有過敏體質嗎？台灣有許多過敏寶寶，其中大多對於肉眼看不見的塵蟎過敏。對抗塵蟎，降低過敏的發生，媽咪可以這樣做！

一 定期打掃居家環境，避免人體皮屑、室內黴菌成為塵蟎的食物來源。

二 打開窗戶，讓室內保持環境通風，破壞塵蟎喜歡的悶熱潮溼環境。

三 離開房間時，可使用除濕機，使濕度維持在五十到六十%以下，可讓塵蟎脫水死亡。

四 善用防塵蟎的寢具，隔絕塵蟎入侵，並少用地毯、布窗簾、布沙發，減少塵蟎的棲息。

副食品添加

果汁算是健康營養的飲品嗎？既可以吃到水果，又能補充水分，可以給寶寶喝嗎？根據美國小兒科學會建議的是，未滿一歲的寶寶不宜喝果汁！

原因一 缺乏水果纖維的果汁，寶寶容易攝取過量而使熱量超標易導致肥胖，也可能因此減少奶量攝取，造成營養不良。此外，果汁通常口感偏甜，易提高偏食機率。

原因二 鮮榨果汁算是未消毒的生食，且自製果汁難以做到殺菌，恐引起腹瀉、脹氣。

原因三 果汁的含糖比例高，蛀牙風險跟著也高，對於寶寶的口腔來說並非好選擇。

來源：寶寶篇 第39週：舒緩鼻塞這樣做

寶寶篇第三十九週：舒緩鼻塞這樣做

生長發展狀況

九個月以上的寶寶似乎開始說話了！他可以發出聽起來好像是某些字句的音，且是有高低起伏的語氣和音調。再加上搭配手勢，妳的寶寶正在和妳「說話」（雖然媽咪無法完全聽得懂他的話語。但或許可以猜中幾分）。此時，媽咪可以即時用較誇張的聲音與表情來回應他，讓寶寶體驗說話的樂趣。

親子互動

想要與寶寶有更多對話的互動，一起看繪本是有趣又甜

蜜的選擇！選一本主題簡單的布書、硬頁書，把寶寶抱在懷裡。告訴他要讀書了，再指著圖案。以有高低起伏的語調說給寶寶聽（這樣可以吸引他的興趣）。

如果寶寶伸出小手想要自己翻，媽咪應鼓勵並協助寶寶自己看。或是當寶寶聽到媽咪說故事時，他發出聲音試著模仿，媽咪應適時給予回應。若寶寶表現出不耐煩、不想看的樣子，請不用勉強他，放下他讓他探索去吧！

疾病特殊護理

寶寶鼻塞了，睡都睡不好。看著寶寶呼吸不順，媽咪實在是好心疼。如何舒緩不適呢？

一洗澡後，鼻腔較濕潤時，幫寶寶使用吸鼻器吸出鼻涕來。

二睡覺時，墊高上半身，讓頭部保持較高，不要平躺較不會鼻塞。

想要提醒媽咪，二歲以下的寶寶不建議使用薄荷油等類似物質。除了可能會引起過敏以外，使用過量薄荷（油）醇與類似物質。可能引起嬰幼兒癲癇、意識障礙、呼吸抑制等神經不良反應。

照顧生活作息

寶寶哭著不願意坐汽座？

媽咪心想才幾分鐘的車程，車開慢一點，寶寶沒坐汽座，應該沒什麼關係吧？

為了安全，請堅持寶寶一定要坐在汽座上，並繫妥安全帶，才能開車！

兒童安全座椅新法規上路，新制延長規定使用「後向式」安全座椅的年齡至二歲，並建議四歲以前的小孩優先選擇後向式安全座椅。至於汽座應安置於後座，不可把安全座椅裝在副駕駛座。

副食品添加

寶寶才剛坐上餐椅沒吃幾口，就坐不住哎哎叫嗎？乖乖地坐在椅子上吃飯這件事是需要從小培養的。當寶寶不願意坐餐椅，媽咪可以先安撫與溝通，或是拿出新東西（餐具或玩具都可以）吸引寶寶的注意力。寶寶應該會有喜歡吃的食物，當吃這些東西時更應該要求他坐在餐椅上喔！

此外，用餐時間建議控制在三十分鐘以內。時間一到就把食物、餐具都收起來，讓知道寶寶吃飯是有時間限制的。若不需要肚子餓，就要在時間內吃完。當然也不要再在餐前餐後給予過多的水果、零食，形成錯誤的獎勵。

來源：寶寶篇 第3週：好睡秘訣這樣做！利用包巾增加安全感

寶 寶 篇 第 三 週：好睡秘訣這樣做！利用包巾增加安全感

生長發展狀況

隨著寶寶出生來到第三週，是不是覺得時間過得很慢，好像過了一輩子（笑）。這時候寶寶的視覺發展又更進一步，眼睛聚焦和追視能力逐漸成熟。媽咪可以在親餵時看著寶寶，並緩緩轉向另一邊。觀察寶寶的眼睛是否有跟著妳一起轉動，同時也練習追視。

哺乳疑難

寶寶出生第三週，媽媽哺餵母乳是否越來越上手呢？而這時寶寶也逐漸抓到吸吮的節奏，媽咪只要掌握「寶寶想吃就餵」的原則就好囉！

另外若是遇到孩子不吸奶時，原因可能是寶寶不餓或是還不習慣吸吮乳房。若是後者可以多嘗試肌膚接觸，讓寶寶經常有學習的機會。同時也要觀察孩子的進食量是否足夠，如果寶寶仍然不吸。就要需要尋求專業協助，找出原因才能改善喔～

預防接種檢查

第三週沒有常規疫苗接種和檢查，不過很快的下星期就是第四週，滿四週（滿月）時，爸媽記得空出時間帶寶寶去打預防針喔～

疾病特殊護理

這時候寶寶的臍帶已經脫落了，不過有些寶寶可能會出現臍疝氣。也就是所謂的凸肚臍，大多發生在早產兒和體重較輕的寶寶身上。這是因為寶寶的腹部肌肉較脆弱，出生時臍帶附近的肌肉沒有完全關閉。肌肉結構也沒有發育完整，以至於腹內組織從腹壁肌肉的缺損擠出來。形成臍疝氣。

不過爸媽不必過於擔心，隨著寶寶逐漸長大。大多在一到二歲時會逐漸消失，但若是孩子出現哭鬧不停、嘔吐。甚至疝氣處鼓起紅腫、變黑、發炎等，就要盡速就醫。

照顧生活作息

看著寶貝睡著時的臉龐是不是彷彿周圍都安靜下來了呢？不過除了看著孩子的睡臉，讓寶寶睡得更安穩也很重要喔～這時就要拿出育兒好物「包巾」。將寶寶包起來不僅可以提供安全感，也能讓孩子睡得更好。包巾步驟如下：

一將包巾轉成菱形，上方一角折下來變鑽石形

二將寶寶頭頸部放在鑽石形上方線條處

三一手固定寶寶左手，另一手從包巾右邊邊角往左包住寶寶肩膀，並將多餘部分塞到寶寶身體下方

四另一邊重複步驟三，並將多餘部分塞到寶寶身體下方

五整理身體下方布料，留一個手掌的空間再將包巾往身體方向拉上來，並用彈性綁帶固定寶寶

不過包寶寶時不要包太緊，露出雙手並讓呼吸保持順暢。或許寶寶會有一些驚嚇反射，但適度的驚嚇是一個自然現象。可以避免嬰兒猝死喔～

來源：寶寶篇 第40週：別再給寶寶一直吃泥狀食物了

寶寶篇 第四十週：別再給寶寶一直吃泥狀食物了

生長發展狀況

不知不覺寶寶已經十個月大了！這個月男寶寶的身高大略介於六十九到七十七公分，體重約七十五到一百一十二公斤，頭圍則是四十三到四十七公分。這個月女寶寶的身高大略介於六十九到七十六公分，體重約六十八到一百零七公斤，頭圍則是四十一到四十六公分。

隨著控制身體的能力越來越好，寶寶爬行時已不大容易碰撞，但媽咪仍應提供寶寶安全爬行及扶站的環境，讓他盡情地發現新世界。此外，寶寶能夠在嬰兒床裡從躺著變成坐著，或是扶著站起來。也可以把玩具放進或拿出盒子，手部動作發展進步不少了！

哺乳疑難

如果寶寶的副食品吃得蠻順利，且媽咪的泌乳量也逐漸減少。有些寶寶在這個時候會自然地不想喝奶，建議循序漸進地將餵奶的間隔時間慢慢拉長。且每次哺餵時間也要縮短，或許就可以順利地從母乳畢業了！

疾病特殊護理

寶寶發燒了，但除此之外。沒有咳嗽、流鼻涕等感冒症狀，也沒有腹瀉、嘔吐等腸胃道症狀。小心有可能是泌尿道感染！提醒媽咪，當寶寶不明原因發燒。或有膿尿、尿味異常、頻尿等症狀，就應該要提高警覺。倘若延誤治療，嚴重甚至可能造成敗血症或腎臟損傷。

該怎麼預防寶寶泌尿道感染？

一攝取足夠水分，並定時更換尿布，保持臀部乾爽。

二後的擦拭要由前往後，也就是由會陰部往肛門方向擦拭。

三包皮清潔方式要正確，將包皮輕輕往後推即可。

親子互動

即使你家的寶寶會扶著站立了，建議媽咪還是要儘量鼓勵寶寶爬行！除了拿他喜歡的玩具或食物來吸引之外，還可以在地上放著浴巾、坐墊或絨毛玩具當作障礙物，適時增加困難度，能給寶寶一些挑戰。

此外，趁著好天氣。帶著寶寶外出，放手讓他在沙池或草地上爬行（但要注意安全。避免地上隱藏尖銳物或碎石傷害寶寶），這種不一樣的新鮮觸感。可是有助於腦部發展的喔！

照顧生活作息

十個月的寶寶作息通常都蠻規律的，一天約有兩次的小睡（上午與下午各一次），小睡時間累積起來不要超過四小時，並避免於晚上六到八點小睡。而夜晚連續睡眠可達十到十二小時，建議晚上九點之前入睡，以提升睡眠品質。

副食品添加

此階段的寶寶大多長齊了上下排的門牙，已經可以吃固體、碎狀（約五公分大小）的食物，像是軟爛的米飯、切碎的麵條、小塊的土司。你的寶寶已經長大了，媽咪可別再給寶寶繼續吃泥狀食物了囉～

寶寶累積了幾個月的副食品經驗，能接受的料理更加多元了，媽咪可以嘗試更多菜色給寶寶吃囉！像是補充蛋白質的蒸肉餅、自己可以拿著吃的花椰菜雞肉飯糰、助消化的香煎南瓜捲，都是不錯的選擇。

來源：寶寶篇 第41週：副食品多變化可提升寶寶食慾

寶寶篇第四十一週：副食品多變化可提升寶寶食慾

生長發展狀況

妳的寶寶或許已經說出第一個字，可能是「爸爸」、「媽媽」。雖然才剛開始牙牙學語，已經能意會簡單的單詞與不同聲調代表的意義，甚至能使用某些詞語來表達他的意思。不過，每個寶寶的發展里程會有差異，媽咪也不用過於擔心。

疾病特殊護理

家中長輩是否常這樣對媽咪說：「讓寶寶哭一下沒關係啦！」但如果寶寶不是哭一會兒就停，而是越哭越用力。甚至一度喘不過氣來，突然停止呼吸。小心妳的寶寶可能是嬰兒摒息症！

好發於六個月至一到二歲的嬰兒摒息症，症狀大多輕微。且隨著呼吸調節系統逐漸發育成熟（約五歲），無需做特別治療。就會自行痊癒，但媽咪仍要小心。若寶寶頻繁發作，仍需至醫院檢查。

嬰兒摒息症的發生與寶寶天生的體質有關，平時無法預防。然而急性發作時建議媽咪可以這樣處理：

一 當寶寶哭鬧時，就先拿玩具安撫，或其他可轉移注意力的事。

二 以冰毛巾敷額頭，使寶寶情緒冷靜下來。

三 按壓人中穴、刮腳底板，藉以刺激寶寶恢復呼吸。

親子互動

媽咪可別以為寶寶還小聽不懂妳說的話，就不和他說話。反而應時常與寶寶交談，並帶入肢體動作，將有助於語言能力的發展。當寶寶發出聲音時，媽咪也要有適度的反應，以鼓勵他繼續說話。

此外，這個時期的寶寶會觀察爸媽及身邊人的一言一行。想要模仿你們的言語及動作，因此。媽咪要注意自己的言行舉止，給寶寶做一個良好的身教喔！

照顧生活作息

寶寶「愛睏」了，媽咪看到了嗎？當寶寶出現打哈欠、揉眼睛、動作與反應變慢等想睡癥兆，妳應立即將寶寶放上嬰兒床，讓寶寶自行入睡。如果你的寶寶因為愛玩而不想睡覺，媽咪可就要注意了！越累反而越不容易入睡，然後就要哭鬧一番，又哄又騙才能睡著。建議無論是白天小睡或夜晚長睡眠，都要有固定的時間，並以固定的方式讓寶寶入睡。

副食品添加

妳的寶寶對於自己的副食品總是吃沒幾口，就想要討大人的食物來吃嗎？此時，媽咪可以嘗試變化副食品的料理方式，或是使用天然食材來提味，藉以提升寶寶食慾。媽咪可能會想說是否能夠加些鹽巴來調味？由於寶寶器官尚未發展完全，建議一歲以下的寶寶儘量不加鹽，以免對寶寶腎臟造成負擔。

來源：寶寶篇 第42週：如何教寶寶收拾玩具？

寶寶篇 第四十二週：如何教寶寶收拾玩具？

生長發展狀況

十個月大的寶寶，手部操作技巧越來越成熟。且寶寶的對掌動作也出現了，可以開始使用兩個手指拿取更小的東西。

西。並帶動手眼協調及認知動作。且這個時候的寶寶喜歡模仿別人的動作，因此媽咪可以透過仿做引導寶寶生活自理，像是吃副食品時，請寶寶自己用手抓食物放進嘴裡、玩完玩具之後學著把玩具收拾在大籃子裡。

疾病特殊護理

一 反覆嘔吐、腹瀉，甚至一天可能水瀉十多次以上，妳家寶寶可能是感染諾羅病毒！透過糞口傳染的諾羅病毒傳染性強，病程較短，只要有一人中標，家人幾乎很難倖免。而且噴酒精對抗諾羅病毒是沒效的！唯有勤洗手且使用肥皂搭配正確洗手方式，出入公共場所及清理消毒病患之排泄物或嘔吐物時，戴口罩以避免飛沫傳染，才是有效的預防關鍵。

二 妳家的寶寶長了牙齒嗎？在寶寶萌發第一顆乳牙後，就應該做第一次的口腔檢查。並開始每六個月請牙醫師塗氟一次。如果寶寶有小牙齒，但吃完東西後沒有馬上刷牙，就容易出現蛀牙喔！還要提醒媽咪的是，當發現寶寶有二顆乳牙相鄰時，就可開始使用牙線幫寶寶潔牙了～

照顧生活作息

開始有移動能力、視野也更清楚的十個月大的好奇寶寶，很容易玩到不想睡覺，因此要避免在睡覺前玩得太。建議建立一連串規律的睡眠儀式，像是洗澡、喝奶、刷牙、說故事、道晚安。讓寶寶明白做完這些事就要睡覺，協助寶寶自然而然養成入睡認知；不過。習慣的建立需要一些時間，媽咪一定要有耐心才行。

寶寶都十個月大了，但頭髮看起來還是很少嗎？頭髮的生長情形與先天遺傳有關係。只要有持續生長，就是正常的！然而，長輩都說這是因為寶寶小時候沒有剃胎毛，剃了胎毛，頭髮才會長得好？這其實是沒有根據的說法！只是如果髮量多的寶寶，在夏季時也許可剪短頭髮。以預防新生兒皮膚濕疹；但若頭皮已長有濕疹的寶寶，則不建議剃髮。以免剃髮過程反而引起感染！

副食品添加

市售有許多寶寶副食品，只要加熱就可以讓寶寶吃。外出時只要帶著一包，就不用擔心寶寶的外食問題。但該怎麼挑選呢？

一 有品牌且通過檢驗的合格廠商較有保障。

二 標榜無添加的產品，讓寶寶吃得更安心。

三 注意有效期限及適用年齡，切勿貪求快過期的特價品。

另外，打開後的副食品最好一次吃完。如果真的吃不完，須趕緊放入冰箱冷藏（但已加熱過的必須丟棄），且於一天內食用完畢，再食用時記得要充分加熱。

來源：寶寶篇 第43週：被蚊蟲咬傷的居家護理法

寶 寶 篇 第 四 十 三 週 ： 被 蚊 蟲 咬 傷 的 居 家 護 理 法

生長發展狀況

隨著月齡增加，快要十一個月的寶寶發展有了頗大變化，可以自己從躺到坐、坐到爬、撐著沙發站立起來且越站越穩了，你的寶寶正在自己的小世界不斷地進步中！另外，寶寶瞭解物體恆存的概念。也能短暫地記得玩具剛剛出現在哪裡，因此對於被刻意藏起來的東西會去找出來。因為寶寶知道它就在那裡。

疾病特殊護理

寶寶被蚊子叮了，癢癢的感覺讓他一直抓抓抓，媽咪好心疼！但要小心傷口抓傷破皮感染，變成蜂窩性組織炎！到底該如何消腫止癢呢？

一把冰塊裝在塑膠袋裡，再用毛巾包裹冰敷患處。

二使用醫師開立的止癢藥物薄薄塗一層於患處。

三若是自行購買的止癢藥物，建議選擇有衛生署認證核可，且為嬰幼兒專用的較為安全。

親子互動

運用寶寶發展的物體恆存概念，媽咪可以和他玩躲貓貓的遊戲。最簡單的就是媽咪用手遮住臉，跟寶寶說媽咪不見了。再移開手掌；或是躲在沙發後面，再突然出現在寶寶面前。他會被妳逗得笑哈哈，甚至還會模仿妳躲起來。又笑嘻嘻地探出頭來喔！

另外還可以讓寶寶把玩具放進盒子、箱子、袋子等不同地方，再打開拿出來的遊戲。透過重複練習，相信寶寶會越來越得心應手，而且這些遊戲不需要特殊道具，在家隨時都可以玩！

照顧生活作息

有些媽咪覺得寶寶坐學步車（螃蟹車），除了可以固定他的活動範圍。還能夠學習走路，看起來是既安全又方便。但在國外，因學步車造成許多意外及死亡案例。多年前已全面禁止學步車的製作、行銷及廣告。除了安全問題，長時間使用學步車的寶寶。反而可能會學習到錯誤的走路方式，同時減少了練習爬行的機會。媽咪可要注意喔！

副食品添加

就像是睡眠儀式一樣，寶寶吃副食品也是要建立儀式！從洗手、坐到餐椅、圍上圍兜、擺好餐具…到吃完後收餐具、拿下圍兜、抱下餐椅、洗手等一連串固定動作，讓寶寶知道用餐不只是吃飯而已，這也是日後養成餐桌禮儀的起點。

此外，若想帶寶寶外出用餐。建議事先預約兒童友善餐廳，這樣的餐廳用餐環境會較適合寶寶。再帶幾樣玩具、繪本，當寶寶感覺無聊時。立馬找事給他做。還有，餐具、圍兜及食物剪刀都是讓用餐順利不可少的幫手。

來源：寶寶篇 第44週：赤腳走路訓練抓地力

寶寶篇第四十四週：赤腳走路訓練抓地力

生長發展狀況

你的寶寶十一個月大了！這個月男寶寶的身高大略介於七百零二到七十九公分，體重約七十七到一百一十五公斤，頭圍則是四百三十四到四百八十二公分。這個月女寶寶的身高大略介於六百八十一到七百七十六公分，體重約七到十一公斤，頭圍則是四百二十一到四百七十一公分。

這時候的寶寶可以不用扶著東西就能站著，還能夠站一會兒，甚至可以扶著家具、握著妳的手踏出幾步（他的表情可能是開心又有點緊張）。寶寶還能夠運用自己會的方式移動到想去的地方，譬如沒有東西扶的時候就先用爬的，看到可以扶的家具就站起來看一看再走個幾步，全家儼然是他探索的好所在！

哺乳疑難

媽咪還在哺乳嗎？如果妳還在親餵十一個月大寶寶，請儘可能地繼續下去，這可是有助於寶寶的身心發展！但如果這時候媽咪懷孕了，還可以餵母乳嗎？只要媽咪和寶寶都願意，繼續哺乳是沒問題的。不過，若媽咪懷孕期間容易有併發症或流產跡象，就要注意會因乳頭的過度刺激而造成早期宮縮現象喔！

疾病特殊護理

寶寶實在是好可愛啊，總是讓人忍不住想要親親他，但這樣可不行，小心因此染上「親吻病」！由病毒引起的親吻病，透過唾液或飛沫傳染，急性期通常會發燒五到七天、頭痛、肌肉痠痛、扁桃腺紅腫、頸部淋巴腺腫大、肝脾腫大等。目前沒有有效的治療方式，只能症狀治療。

雖然多數寶寶受到感染後，沒有症狀或症狀輕微。但仍建議親吻寶寶可以改親額頭、小手，還要提醒媽咪。大人幫寶寶咬食物，或是用沾過大人口水的筷子夾菜給寶寶。也都有可能中招喔！

照顧生活作息

在此階段的寶寶睡眠應該是更固定了，通常一天大約會有二次的小睡，每次約十五到二小時。每個寶寶的起床及入睡時間都有所差異，媽咪可以透過調整寶寶的小睡時

間，讓他的睡眠與妳的作息之間取得一個平衡，媽咪才不會太辛苦了喔！

當寶寶會扶站，甚至是扶著走時，媽咪有需要幫寶寶買鞋子嗎？對於剛開始學走路的寶寶來說，建議不用穿鞋，讓他赤腳走路，可訓練腳的抓地力及足踝關節的平衡反應。若是會到外面扶著走，才需要考慮穿著鞋子。

副食品添加

對於十一個月大的寶寶來說，副食品的份量可以比還要多。一天差不多可以吃到三次，如果寶寶吃得好。可以逐漸地讓副食品變成營養的主要攝取來源。這時候的寶寶可以接受只要用點力就能輕易咀嚼的口感，而大小約莫一公分左右。同時寶寶還喜歡自己抓來吃的食物，媽咪不妨每餐都添加一些手指食物，以增加進食意願～

來源：寶寶篇 第45週：如何幫寶寶戒奶嘴？

寶寶篇第四十五週：如何幫寶寶戒奶嘴？

生長發展狀況

剛出生抱在懷裡好小好小的寶寶，媽咪此時可能會驚奇地發現，原來寶寶已經不知不覺長到這麼大了！十一個月大寶寶的視覺更加敏銳了，即便妳在遠處他也能夠認得出來。會開心地對妳微笑、招招手，且對於環境的觀察力變得更好、對於新鮮的事物都很好奇。注意力能更集中，視線也跟得上快速移動的物體。

親子互動

媽咪可以陪這個階段的寶寶玩套圈圈、堆積木、塗鴉、敲敲打打、拼圖。即便是同一本書，妳可以說得再長一點、更豐富一些，並讓他自己動手翻翻書。還應該帶他到戶外去，接觸不同色彩，讓他直接用手觸碰，可以獲得更多的刺激喔！

疾病特殊護理

當寶寶發燒或嘔吐時，媽咪要特別注意寶寶是否脫水！這是因為寶寶的體型較小，身體內水分儲存量相對較少，同時因為保留水分的能力較差所致，嚴重脫水可能讓寶寶嗜睡、抽筋。而脫水過程可能很緩慢，也可能很快。當寶寶無精打采、嘴唇乾裂、排尿量減少、尿液呈深色、哭泣沒有眼淚、雙眼凹陷或頭頂囟門凹陷，就可能是中度以上的脫水了。

對於輕度脫水的寶寶，媽咪可以提供他少量多次的小兒電解質液（藥局可購得）。但若是中度、重度脫水，就得立即就醫治療。

照顧生活作息

妳家的寶寶是否非常依賴著奶嘴呢？開始要張嘴學說話的寶寶，若經常含著奶嘴，可是會影響發展的！有些媽咪會採取強硬的方法，直接把奶嘴丟了。不讓寶寶吸奶嘴，這樣做將會對寶寶造成蠻大的心理壓力。那麼該怎麼戒呢？

一 漸進地縮短頻率、次數及時間，讓寶寶慢慢地習慣沒有奶嘴的陪伴。建議從白天開始會比較容易成功。

二 提供固齒器、安撫巾或可以咬的玩偶來轉移注意力。還有媽咪陪伴說故事、玩玩具，也能讓寶寶忘了奶嘴。

三 找一個取代奶嘴的安撫物。妳可以陪孩子一起選購玩偶或毛毯，再告訴寶寶「以後睡覺時它會陪伴你」。

副食品添加

十一個月大的寶寶會以拳握方式拿著湯匙，但媽咪是否拿了家裡的湯匙就給寶寶用呢？選擇適合的餐具，可以讓寶寶吃起副食品時更加得心應手！

一 湯匙：湯匙面材質柔軟，才不會傷到寶寶牙齦。湯匙面的大小要隨著寶寶的食量更換適合的；而握把較粗的設計，方便寶寶自己拿。

二 餐碗：底部面積大或有防滑、吸盤設計，放在桌上較穩固。

三 水杯：兩側有彎曲握把設計，寶寶拿起水杯較不易滑落。

此外，還要提醒媽咪，提供給寶寶的餐具還要是無毒、耐高溫的材質，像是三百零四或三百一十六不鏽鋼。

來源：寶寶篇 第46週：打造良好免疫力 這樣做！

寶寶篇第四十六週：打造良好免疫力 這樣做！

生長發展狀況

十一個月大的寶寶會主動向聲源方向轉頭，代表他有辨別聲音方向的能力。隨著認知和語言能力持續發展，當他聽到熟悉的音樂會開心地搖頭晃腦、手舞足蹈。聽到熟悉的語彙會跟著咿呀學語，聽到妳哄他的聲音也會發出笑聲。代表他開始會出現有意義的反應了。

預防接種檢查

妳的寶寶在十一個月大時，不需要接種預防針。但在滿一歲之後先接種麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗及水痘疫苗，之後在十二到十五個月。再打十三價結合型肺炎鏈球菌疫苗以及型肝炎疫苗。而每年差不多到了十月都有公費流感疫苗，如果寶寶是第一次接種，四週後必須接種

第二劑流感疫苗。

親子互動

這個階段正是寶寶累積語彙、建立認知的關鍵期，媽咪應儘量給予多元的聽覺刺激。平時與寶寶相處時，儘可能地和他說話、唱歌，避免讓寶寶處於無聲世界。而媽咪應該儘量以具體、簡單並重複的語詞，像是這是小狗、小狗，來幫助寶寶學習。

要提醒媽咪的是，有時候妳可能一邊開著電視、一邊照顧寶寶。請注意電視的音量，避免聲音分貝數過大。進而影響寶寶的聽力喔～

疾病特殊護理

寶寶好像很容易生病，免疫力是不是不太好？其實寶寶的抗體仍在發展中，通常要到二歲以後才較為成熟。這時候，要如何保護寶寶，打造良好的免疫力呢？

一攝取均衡的營養，也就是多樣化飲食，十一個月大的寶寶可不能只喝了！

二保有充足的睡眠，十一個月大的寶寶建議九點前入睡，且一天總睡眠時間為十二到十五小時。

三按時接種預防針，藉由接種疫苗引起免疫反應，訓練免疫系統對抗病菌，增加免疫力。

照顧生活作息

在親餵、刷牙或是抱抱時，卻突然被寶寶咬了一口？其實他可能是因為長牙不適想要咬東西，媽咪可提供固齒器或磨牙的食物，讓寶寶知道想咬的時候可以藉由其他方式獲得緩解。

此外，十一個月大的寶寶是透過嘴巴來認識這個世界。這時候的他雖然不是故意要咬人的，但建議在咬人的當下。媽咪應認真且嚴肅地告訴他妳不喜歡這樣。如此一來，寶寶才懂得這樣是不對的行為。

副食品添加

最近寶寶的副食品吃得不太好嗎？是否因為口味沒有變化？其實只要媽咪動點小巧思，善用天然食材，也能夠為副食品增添風味。有了變化的副食品，可以讓寶寶吃得更開心！媽咪可以善用下列的提味小食材：

一提味：蔥、菇、蕃茄、芹菜、羅勒、香菜。

二甜味：蘋果、梨子、南瓜、洋蔥、玉米、高麗菜、地瓜。

三鹹味：蛤蜊、昆布、海帶、海帶芽、紫菜。

來源：寶寶篇 第47週：寶寶可以準備和大人一起用餐了

寶 寶 篇 第 四 十 七 週：寶 寶 可 以 準 備 和 大 人 一 起 用 餐 了

生長發展狀況

寶寶很快就要滿一歲了！此時妳的寶寶有可能可以放手走幾步了，這代表他又邁向另一個里程碑了！每個寶寶都有自己的發展步調，媽咪不需要心急催促，只要好好地陪著他就夠了。此外，寶寶知道每個事物都有個名字。當他看到某樣東西時，媽咪可以告訴寶寶這是什麼。一段時間後當媽咪問寶寶球在哪裡？他便能夠想一下，緩緩地爬或走過去，再拿過來給妳喔！

疾病特殊護理

嬰幼兒時期是視力發育的重要時期，但寶寶還不會說話。若有不舒服的感覺也說不出來，只能靠媽咪平時的仔細觀察。藉以及早發現，儘早治療。媽咪可以觀察：

一 眼睛外觀：

寶寶兩隻眼睛的大小、顏色及形狀是否正常且一致，瞳孔大小、形狀是否差不多、眼球位置是否正常、眼瞼有無下垂或眼周呈現紅色。

二 行為表現：

寶寶是否會畏光、揉眼睛、眨眼睛或流眼淚，或因手眼協調能力變差而經常碰撞跌倒。倘若寶寶看書或玩小玩具時，經常眯眯眼、皺眉、向前傾或歪頭，也可能是眼睛的問題。

照顧生活作息

每次說到要洗澡了，寶寶就猛搖頭，真的帶進去洗澡，就必定哭鬧不安嗎？請媽咪把洗澡變好玩，準備一些好玩的洗澡玩具或防水繪本給寶寶，分散他的注意力（趁著他在玩的時候，趕緊幫他洗）。或是幫寶寶洗澡時，唱著輕快的兒歌，教導寶寶身體的部位，讓洗澡等同於玩遊戲。而有些寶寶對水溫較敏感，媽咪也可以嘗試調整溫度喔～

此外，媽咪不要以為寶寶已經比較大了。能夠自己穩穩地坐在澡盆裡，突然發現小毛巾忘了拿。就獨留寶寶在浴室裡。這樣可不行！提醒媽咪，在幫寶寶洗澡之前。一定要把所需物品都準備好，且當寶寶在浴室時。媽咪也得全程陪同，才能避免遺憾發生！

副食品添加

快滿十二個月的寶寶也即將結束副食品階段，可以開始準備與大人一同在餐桌上吃飯了！媽咪應該怎麼幫助寶寶呢？

一 這個階段的寶寶好動又愛玩，請提供可以專心吃飯的

環境，把玩具、玩偶都收起來，才有可能好好的吃副食品。

二提供寶寶專屬的可愛餐具，可以提高他的進食意願與動機。

三不要在正餐之後，給寶寶太多的零食。

四寶寶真的肚子餓了再給他吃東西。如果他還不餓，可以延後吃飯的時間，不需要強迫禁食。

十二個月寶寶餵食時間參考表

八百吃副食品

一千喝奶

一千二百吃副食品

一千四百吃水果、喝奶

一千八百吃副食品

二千二百喝奶

來源：寶寶篇 第48週：小心！拉出寶寶的保母肘～

寶寶篇 第四十八週：小心！拉出寶寶的保母肘～

生長發展狀況

哇～寶寶滿周歲了！這個月男寶寶的身高大略介於七百一十三到八百零三公分，體重約七十八到一百一十八公斤（此時體重大約是出生時的三倍重），頭圍則是四百三十七到四百八十五公分。這個月女寶寶的身高大略介於六百九十二到七百八十九公分，體重約七十一到一百一十三公斤，頭圍則是四百二十三到四百七十五公分。接下來的成長速度將會趨緩，請媽咪不要過於擔心喔！

多數寶寶能說出第一個真正有意義的詞彙（通常是疊字），能夠有意義的叫爸爸、媽媽；會揮手表示再見；模仿或主動發出簡單聲音（如：汪汪）。比起新生兒來說，一歲寶寶的眼睛發育已較為成熟，視力已達一到二。通常一歲大的寶寶已經有了八顆乳牙，不過有些寶寶一顆牙齒也沒有，都屬於正常範圍喔！

預防接種檢查

寶寶滿一歲之後，共有四支預防針要接種。其中的水痘疫苗主要是為了預防具有高度傳染力的水痘病毒所引起的傳染病，倘若不幸感染水痘，初期會有類似感冒症狀，之後皮膚出現紅丘疹、水泡疹、膿泡疹而後結痂。也有可能併發嚴重的皮膚感染、疤痕、肺炎、腦炎。寶寶接種疫苗之後，可能會有輕微發燒、接種部位發紅疼痛或腫脹。也

可能出現類似水痘的水泡，但症狀大多比較輕微。而且復原也較快。

另外，提醒媽咪。當寶寶十個月到一歲半即可進行第四次兒童預防保健，且當寶寶長牙後就可以每半年塗氟一次。別忘了帶寶寶去喔！

親子互動

玩遊戲是一歲寶寶的生活重心，在家中可以把枕頭散亂在地上，請寶寶踩著枕頭或是繞過枕頭行走，都有助於訓練平衡能力。媽咪也可以和寶寶一起疊高積木，再一口氣推倒，寶寶一定會覺得很有趣的。

此外，有空應該帶寶寶外出走走。即便是住家附近的公園也可以擴展更多的生活經驗，像是摸起來冰冰的欄杆、踩起來有點軟軟刺刺的草地。都有助於寶寶探索環境，增加感覺動作的發展。

疾病特殊護理

媽咪可知道，當妳在和寶寶相處時。可能不經意的傷到寶寶：幫穿脫衣物時拉扯到手臂；看到寶寶快跌倒時，急忙抓住他的手；還有爸媽拉起孩子的手腕好像玩盪鞦韆。這些情況都很容易造成橈骨頭環狀韌帶移位，也就是俗稱的「保母肘」？

保母肘的治療採取徒手復位。只要沒有延誤就醫，絕大部份可以成功復位。提醒媽咪，平時應該避免突然地拉扯寶寶的手，尤其不要突然用力地拉起單手。如果寶寶曾發生過保母肘，則應該更要特別注意，因為受傷過的韌帶比較容易復發。

照顧生活作息

到了十二個月大，一天需要十二到十四小時睡眠時間，而白天的小睡可能減為一次，一次可能會睡兩個小時。如果時間差不多了，就應該喚醒寶寶，避免午覺時間過長，進而延後晚上的睡眠。也有的寶寶不想要睡午覺，如果寶寶夜晚睡眠時間充足、睡眠品質良好，且白天精神活力佳，也不需要強迫寶寶午睡喔！（但媽咪表示好累喔～）

副食品添加

一歲寶寶應該以固體食物為主食，奶類變副食品，中間再以水果當作是點心，也就是開始練習跟著大人吃三餐了！食物的軟硬度以寶寶的咀嚼吞嚥能力為主，可使用食物剪刀將之剪碎、剪小，也要避免容易噎到的食物（堅果、葡萄或生胡蘿蔔）。

特別留意的是，低鹽飲食不只限於副食品階段。而應該是長期習慣，千萬不要只有在吃副食品時以少鹽料理。一歲之後就跟著大人外食，完全忘了飲食的健康！還有吃完點心後，別忘了幫寶寶清潔口腔，尤其是剛冒出的小牙

齒，可得妥善照顧喔！

看更多：

嬰幼兒意外事故防制 -汽車安全座椅的重要

寶寶跌倒了怎麼辦？

嬰幼兒意外事故防制與居家安全

來源：寶寶篇 第4週：寶寶怎麼吐奶了！

寶寶篇第四週：寶寶怎麼吐奶了

生長發展狀況

寶寶即將滿月囉！這時除了與親朋好友分享喜悅，孩子的發展也很重要。這時候男寶寶身長約五十一到五十八公分，體重約三十二到五十四公斤。頭圍約三十五到三百九十六公分；女寶寶身長約五十到五十七公分，體重約三十一到五十二公斤。頭圍約三百四十二到三百八十九公分，而且臉也越來越圓潤。脫離剛出生皺巴巴的樣子。此外，這時候寶寶趴著時。骨盆會平貼於床面，頭可以略抬起。抱在身上時也會抬頭看著妳喔！

哺乳疑難

咦！寶寶喝奶時怎麼「溢奶」了？溢奶指的是寶寶在喝奶或是剛喝完時，嘴角流出少許的奶水。原因可能是喝奶時太急、或是有輕微胃食道逆流，不過通常不必擔心。只是要記得清潔口腔喔！

但如果是「吐奶」該怎麼辦呢？吐奶原因有許多，包括喝太多、生病、吸入過多空氣等等導致。爸媽可觀察寶寶狀況，如果吐奶量只有一點點。寶寶活動力也正常則不用太擔心，但若是湧泉式的吐奶或是綠色的嘔吐物或是活動力下降。就要趕緊尋求專業協助。

預防接種檢查

第四週還沒滿月，因此沒有常規的疫苗接種。但下星期孩子滿月、迎接第五週時要施打型肝炎疫苗第二劑，以及前往第一次的健兒門診。健兒門診檢查項目包括身體診察、餵食狀況、發展診察等，爸媽記得空出時間。帶孩子前往喔～

疾病特殊護理

從寶寶出生起就要做好口腔清潔囉！雖然還沒長牙，但是維護口腔環境相當重要。不僅可以從小養成清潔習慣，也能避免口腔內細菌滋生。清潔時機與方式如下：

清潔時機：早起、睡前、每次喝完奶後

準備物品：紗布巾、溫開水

清潔步驟：

一媽咪用溫開水浸濕紗布巾

二媽咪拿著紗布巾確實擦拭口腔，包括牙床上下左右、舌頭、口腔周圍

由於小寶寶通常會抗拒口腔清潔，因此爸媽需多費心。可以一人扶住孩子，另一人趕緊清潔。才能順利完成喔～

親子互動

媽咪感到疲累時是否想要按摩舒緩一下呢？寶寶也是一樣喔！透過按摩可以幫助情緒、身體放鬆，同時也能增進親子間的感情，以下介紹最基本的「從頭按到腳」按摩法：

從頭按到腳

介紹：把握從頭按到腳的原則，並且透過雙手輕按提供寶寶安全感。

步驟：

一媽咪從臉開始，輕輕的按壓寶寶的額頭、眉毛、臉頰、耳朵

二接著從上半身開始，依序從一直按到小手指，一手按完換另一手

三接著是身體部分，手掌放在寶寶胸前並且從中間往外畫圈

四再來是雙腿部分，輕輕的從大腿一直按到腳掌、腳趾，一腿按完換另一腿

五最後是按摩背部，從上到下一路輕輕按壓到屁股

照顧生活作息

當孩子滿月時就要準備做第一次的健兒門診和打預防針囉！所以這時候外出安全相當重要，二歲以下的嬰幼兒應坐在車輛後座。並使用攜帶式嬰兒提籃或是後向式安全座椅，並且要注意有無正確安裝和繫好安全帶。才能確實保護寶寶安全喔～

來源：寶寶篇 第5週：寶寶滿月，可進行第一次兒童預防保健檢查

寶寶篇第五週：寶寶滿月，可進行第一次兒童預防保健檢查

生長發展狀況

隨著寶寶生長來到第五週，這時寶寶會發出的聲音也較多。有的寶寶會發出咿咿呀呀，甚至逗他笑時也會發出聲音。這是語言發展的開始，爸媽可以多跟孩子說話、唱歌。刺激聽力和語言能力喔～

哺乳疑難

隨著哺餵母乳來到第五週，媽咪的奶水量還充足嗎？記得把握三大原則，包括：

一 均衡飲食

二 哺乳期不刻意減重

三 每天補充至少二千以上的水分

提醒媽咪哺乳期不要刻意減重喔！並且要多喝水，這是因為母乳的主要成分是水分。且均衡飲食才有原料以製造營養的乳汁，記得每天要比孕前多攝取五百大卡熱量。才能給予寶寶足夠的奶水。

預防接種檢查

寶寶滿月之後就要回診做第一次的「兒童預防保健」，也就是健兒門診，透過各項檢查了解孩子的健康狀態，項目如下：

身體診察：身長、體重、頭圍、營養狀態、一般檢查、瞳孔、對聲音之反應、唇顎裂、心雜音、疝氣、隱睪、外生殖器、髖關節篩檢

餵食狀況：餵食方法

發展診察：驚嚇反應、注視物體

此外，這時候也要接種型肝炎疫苗第二劑囉！爸媽可以在這時預約健兒門診，並提出打預防針的需求，一天完成各項檢查與疫苗接種。若是沒有及時施打可能會感染型肝炎，症狀包括發燒、噁心、黃疸、腹部不適等。

疾病特殊護理

相信發燒是不少新手爸媽最害怕遇到的狀況之一，尤其又以小寶寶最讓人擔心，發燒的定義如下：

耳溫、肛溫、額溫：攝氏三十八度以上

口溫：攝氏三百七十八度以上

腋溫：攝氏三百七十二度以上

當三個月以下嬰兒發燒時就應立即送醫就診，或是沒有發燒。卻有意識不清、哭泣時沒有眼淚、尿量大幅減少等狀況，也應該就診。千萬不要自行給予退燒藥或是做任何偏方而延誤就醫喔！

親子互動

這時候寶寶已經能略為抬頭了，所以爸比媽咪在家可以多讓孩子做抬頭運動。增強控制頭頸部和背部的力量～例如可以讓孩子趴在床上、遊戲墊上，或是讓寶寶趴在懷中。讓孩子跟自己面對面，透過抬頭訓練可以訓練頭頸部的肌肉。對於之後的翻身、坐、爬、站等都有幫助。

照顧生活作息

這時期的寶寶情緒主要是笑和哭，不論是笑出聲音或是哇哇的哭都是一種渴望獲得關注的訊息，所以爸媽可多關照寶寶的情緒感受，並給予良好的回應。

當孩子笑的時候可以讚美和逗弄，當孩子哭的時候則要關懷寶寶的狀況。像是是不是尿布濕了、肚子餓了等，除了滿足寶寶。也可透過關心的方式讓孩子練習調節情緒。

來源：寶寶篇 第6週：寶寶眼睛有分泌物？眼屎清潔的重要性

寶寶篇第六週：寶寶眼睛有分泌物？眼屎清潔的重要性

生長發展狀況

寶寶一天天的長大囉！這時候視覺發展也更進一步，他們的眼睛可以隨移動目標轉動九十度以上。部分寶寶的雙手可以碰在一起，且對人的臉孔特別感興趣。如果對他打招呼或是微笑，他也會挑起眉毛或是輕微動動小嘴。模樣可愛極了。

哺乳疑難

餵母乳的媽咪一定有這樣的疑問，到底要如何分辨寶寶吃飽沒？其實不管是寶寶肚子餓或是飽時，都可以透過一些外在表現察覺出來喔！這一週就要來說說如何分辨寶寶餓和飽喔～

當寶寶肚子餓時，通常會將手靠近嘴巴、舌頭也會伸出來，主動轉頭朝向媽咪並張開嘴巴，是不是很神奇呢！而當寶寶吃飽後通常會全身放鬆、減少吸吮，並且會推開或遠離乳房。也會滿足入睡，因此當孩子出現吃飽的徵兆。媽咪便可以慢慢的將寶寶放到床上睡覺。

疾病特殊護理

眼睛是靈魂之窗，清潔也相當重要。當眼睛表面遭到刺激或有灰塵就會產生分泌物，形成眼屎。清潔寶寶眼屎方

式如下：

準備物品：紗布巾、棉棒、溫開水

清潔步驟：

一 紗布巾沾濕溫開水

二 紗布巾由內而外將眼屎輕輕拭去

三 用棉棒將細微處清潔乾淨

照顧生活作息

寶寶常常煩躁不安、不容易安撫時該怎麼辦呢？這時候除了多擁抱寶寶或嘗試哺乳，也可給予安撫奶嘴，不過使用奶嘴時有幾點要注意喔～

注意事項如下：

一 每次使用後進行清潔：依據材質採用煮沸消毒或蒸氣消毒等

二 不過於依賴：奶嘴吸吮方式與乳房不同，若太常使用，可能會使寶寶出現乳頭混淆

三 第一個月不使用：寶寶出生第一個月時因為母乳哺育和媽咪奶水分泌都尚未完全順利，因此這時不建議使用，避免哺乳不順

來源：寶寶篇 第7週：抓握反射 寶寶的基本反射動作

寶寶篇 第七週：抓握反射 寶寶的基本反射動作

生長發展狀況

隨著寶寶出生來到第七週，媽咪也會發現寶寶的粗動作發展似乎更進一步了。除了會抬頭，爸媽拉扶著也能坐起。只有頭部會輕微的往後，這時只要從後方給予支撐。不過要注意的是，這時候還不能久坐。所以稍微拉起寶寶練習坐著後，也不要持續太久喔～

還有，爸媽有注意到嗎？當刺激寶寶的手掌時，他們會自動抓緊你妳的手指。這是一種自動的「抓握反射」，通常在出生到二個月時反應最強。爸媽可以跟孩子玩玩抓握遊戲，刺激反射和觸覺喔～

哺乳疑難

產後來到第七週，也意味著上班族媽咪五十六天的產假即將結束。準備返回職場了，回職場時記得先將母乳擠出。準備好寶寶白天要喝的量，並且冰在冰箱適當位置。避免與其他生鮮食品擺放在一起，以免產生氣味干擾。

此外，返回職場後至少每隔四小時要記得將奶水擠出並冰好。下班後再將母乳帶回，而媽咪們可根據和寶寶的哺乳習慣採用以下哺乳方式。讓銜接母乳更順利：

一 完全直接哺乳：上班時趁午休時哺乳，下班後趕緊回家哺乳

二 以奶瓶餵食母乳：將冰凍的母乳退冰加溫並倒入奶瓶餵食

三 上班時瓶餵母乳或配方奶，下班後直接哺乳

預防接種檢查

第七週也沒有常規疫苗接種喔！不過在第九週，也就是滿兩個月後就要打兩針，包括十三價結合型肺炎鏈球菌疫苗第一劑，以及白喉、破傷風、非細胞性百日咳、型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗第一劑。

這一週我們先來了解十三價結合型肺炎鏈球菌疫苗，肺炎鏈球菌是一種常見細菌。可能引起嚴重肺炎、敗血症、腦膜炎等，又以嬰幼兒為高危險群。透過定期接種可以讓身體產生防護力，避免嚴重感染。

疾病特殊護理

寶寶的鼻子較小、鼻道狹窄，加上鼻腔、鼻竇還未發育成熟。因此只要有一點點鼻水、鼻涕就容易塞住，過一段時間就會變成鼻屎。所以當媽咪發現，寶寶鼻塞嚴重、呼吸聲明顯。就要檢查鼻屎是不是過多，鼻子清潔方式如下：

方法一：使用濕毛巾溫敷鼻腔處，再將濕潤後的鼻屎挖出

方法二：將棉花棒用生理食鹽水浸濕，再深入鼻腔內輕輕挖出鼻屎

方法三：當鼻塞嚴重，可先滴入一兩滴生理食鹽水，再用小吸球或吸鼻器吸出

因為寶寶鼻子脆弱，因此清潔時需要處於濕潤狀態，動作要輕柔，避免處於乾燥狀態以及用力挖取喔～

親子互動

隨著寶寶長大，可以做的動作也越來越多。這時不妨多跟孩子進行肢體互動，像是拉扶坐起。或是躺著時動動小手小腳，也可搭配兒歌哼唱。同時刺激視覺、聽覺、觸覺和語言發展，幫助寶寶感覺統合喔～

照顧生活作息

當寶寶晚上不睡覺、一直哭鬧，爸媽該怎

麼辦呢？其實哭泣是孩子表達需求的一種方式，也許孩子這時尿布濕、肚子餓、環境太悶太熱等。這時先確認孩子可能的問題和需求，並給予適度安撫。如果都不是，也許寶寶只是需要父母愛的抱抱或陪伴。那麼可以輕聲細語跟寶寶說話並撫摸寶寶背部以緩和情緒。

若是爸媽疲倦了，也別太氣餒。可以尋求親友協助或是諮詢專業人士，千萬不要因為罪惡感或是不好意思。而陷入照顧寶寶疲憊的迴圈裡喔～

來源：寶寶篇 第8週：寶寶耳垢清潔這樣做

寶寶篇第八週：寶寶耳垢清潔這樣做

生長發展狀況

寶寶出生要滿兩個月囉！這時候男寶寶身長約五百四十五到六十二公分，體重約四十二到七公斤。頭圍約三十七到四百一十二公分；女寶寶身長約五十三到六十一公分，體重約四到六十五公斤。頭圍約三十六到四百零二公分，不僅拉扶坐起的動作更熟練。轉頭偏向音源的反應也更靈敏，逗寶寶也更容易微笑。因此媽咪可以拿著手搖鈴或安撫玩具陪寶寶玩喔～

哺乳疑難

從寶寶出生哺乳至今即將滿兩個月了，媽咪的哺餵狀況還順利嗎？若是感到乳房疼痛，可能是塞奶或乳腺炎引起。其中塞奶是因為乳腺內充滿奶水，因為沒有及時被擠出。所以乳汁滯留變得黏稠而塞住，若是經過數小時仍未哺餵或擠出就容易變成硬塊。甚至引起乳腺炎，這時媽咪不要再忍痛。應盡快尋求專業協助喔～

預防接種檢查

滿兩個月後，也就是下一週。孩子就要施打兩針疫苗，部分寶寶對疼痛較敏感。打針時可能會大哭，因此爸媽可以預先準備安撫玩具或抱抱孩子安撫情緒。另外當一打完針也可先帶離診間並找出新事物轉移寶寶注意力，降低疼痛感。

疾病特殊護理

不少爸媽會疑惑：「需不需要幫寶寶清耳垢？」在此之前我們先來了解耳垢的功用和迷思喔！

耳垢是耳朵皮脂腺及耳垢腺的分泌物，它具有殺菌和抑制黴菌的功能，還能預防異物進入與感染，因此可以說是耳朵的保護牆。但若是耳垢太多時該怎麼辦呢？原則上需要清理的狀況有以下三種：

一 寶寶耳朵不舒服

二 懷疑有中耳炎

三 外耳道發炎

當懷疑有上述情形時，就可帶至耳鼻喉科門診，由醫師利用專業器具做清理，一般不建議自行幫寶寶清除喔！這是因為家裡光線通常沒有院所明亮，且也沒有專業器具。若只是用棉花棒，可能會將耳垢往內推。反而沒有辦法清除，而若是用掏耳棒則可能不小心傷害寶寶稚嫩的耳朵。因此爸媽平時只須注意外耳廓的清潔即可。

照顧生活作息

相信爸媽都有聽過「嬰兒猝死症候群」，其中又以二到三個月的嬰兒為高危險群，它指的是一歲以下嬰兒突然死亡，且經過解剖等詳細檢查仍未找到原因。雖然目前還找不出直接原因，但爸媽可以透過各項預防來避免嬰兒猝死，包括：

十一歲以下每次睡眠都仰睡

二 哺餵母乳

三 嬰兒不與其他人同睡，建議與爸媽同房不同床

四 滿月後可考慮睡眠時使用奶嘴，奶嘴不可懸掛於嬰兒頸部或附著於嬰兒衣物上

五 不可讓嬰兒趴睡在父母或照顧者身上

六 棉被勿遮住嬰兒口鼻

七 十一歲以下不需要使用枕頭

八 嬰兒床表面必須堅實平整，不可有鬆軟物件，例如：枕頭、填充玩具等；以及勿讓嬰兒睡在沙發、椅子、墊子或趴睡在父母或照顧者身上。

九 避免環境過熱，勿穿著太多衣物與過度包裹嬰兒，另外沒有空調設備時，須注意通風。

十 無菸環境，勿讓任何人在嬰兒附近吸菸。

透過上述方法可以避免寶寶的呼吸道阻塞，並能減少嬰兒猝死的機率。

來源：寶寶篇 第9週：兒童預防保健檢查可與疫苗接種一併進行

寶寶篇 第九週：兒童預防保健檢查可與疫苗接種一併進行

生長發展狀況

寶寶出生來到第九週，爸媽可以持續跟孩子玩手掌抓握的遊戲。另外，三個月以下的寶寶用物品觸碰腳掌時。腳趾會反射性外張，稱為「巴金斯反射」。爸媽可以觀察看看孩子有沒有反射反應，可讓醫師當成評估孩子成長過程的依據喔～

哺乳疑難

媽咪哺餵母乳時，爸爸就無法參與育兒大小事嗎？其實不是喔！身為孩子的爸這時可以提供情緒和實質上的支持，包括安撫寶寶、做家事。甚至當媽咪哺餵母乳結束時也可以幫孩子拍嗝、換尿布等，透過實際行動表達體貼和愛。讓媽咪可以更順利的哺乳。

預防接種檢查

寶寶出生到第二個月時，就要準備做第二次的兒童預防保健檢查，補助時程是在二到四個月，檢查項目包括：

身體診察：身長、體重、頭圍、營養狀態、一般檢查、瞳孔及固視能力、肝脾腫大、髖關節篩檢、心雜音

餵食狀況：餵食方法

發展診察：抬頭、手掌張開、對人微笑

而這時也到了施打十三價結合型肺炎鏈球菌疫苗第一劑，以及白喉、破傷風、非細胞性百日咳、型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗第一劑的時間。

此外，這時也可自費口服輪狀病毒疫苗。輪狀病毒會引起腸胃炎，症狀包括嘔吐、腹瀉、發燒等。好發於五歲以下嬰幼兒，目前國內上市的廠牌有兩種。皆為口服疫苗，建議接種時程分別如下：

羅特律（二劑型）：出生滿二、四個月（最後一劑不得晚於出生後二十四週接種）

倫達停（三劑型）：出生滿二、四、六個月（最後一劑不得晚於出生後三十二週接種）

爸媽可以諮詢醫師，評估孩子的需求。可以在二個月施打常規疫苗時，一起口服。不需要額外約時間喔～

疾病特殊護理

小寶寶常常一到半夜就開始大哭嗎？但到了白天卻又恢復正常，這究竟是怎麼一回事呢？原來是腸絞痛。腸絞痛好發於十天至三個月大的寶寶，症狀主要是無緣無故哭鬧不休。發作時間主要在傍晚四點至晚上八點，以及半夜十二點左右。原因尚且不明，醫界推測的可能是腦部尚未成熟、自主神經過強、牛奶蛋白過敏、腸蠕動不正常、醃

耐受不全、吞嚥過多空氣等。

判斷孩子是否是腸絞痛可依據氏三百三十三準則，包括：

一 一天哭鬧至少三小時

二 每星期哭鬧至少三天

三 症狀持續超過三週

但腸絞痛須由兒科醫師來判別，排除其他病理性原因後才會做出診斷。但若出現孩子生長不良、嚴重嘔吐、嚴重脹氣、血便、活動力下降等，須趕緊就醫。以排除病理性問題。

此外，當孩子哭鬧時爸媽可以先安撫寶寶。曾有研究指出，哺乳媽咪食用牛奶、白菜、花椰菜、洋蔥和巧克力等食物。可能會增加寶寶腸絞痛的機率，媽媽可以考慮減少食用。並且幫寶寶按摩降低不適，而腸絞痛大多在三～四個月後就會逐漸消失。但若是沒有消失，或是症狀變得更加嚴重。就應就醫治療。

親子互動

這時候的寶寶手腳動作更靈活，因此爸媽可以幫孩子做伸展操。時機和方式不拘，只要在寶寶舒服的情況下進行即可。爸媽可以趁洗澡後一邊唱歌，一邊將孩子的小手舉高、拍拍手。或是拉抬小腳腳在空中踩腳踏車，透過變換不同姿勢促進骨骼和肌肉發展。

照顧生活作息

當寶寶越來越大，外出的機會也越來越多囉！此時可以利用背巾將寶寶背起外出，但使用前須注意以下三點：

一 依照建議體重使用背巾：背巾包裝都會有適用年齡，體重不足者不可使用

二 確定孩子的呼吸道暢通：背好寶寶後要注意口鼻是否保持暢通，沒有被摀住

三 注意彎曲身體位置：用背巾揹寶寶時不要彎曲腰部，應該彎曲腿部

另外，背巾使用步驟如下，正確使用背巾才能揹好寶寶喔～

一 將背巾套在自己身上，並理好位置

二 將寶寶橫抱起並靠近自己

三 讓寶寶橫躺在背巾中央，此時照顧者的一隻手仍在背巾內

四 另一手調整背巾垂布長度

五 再緩緩拉出自己的手

來源：寶寶篇1歲17~18週：讓愛塗鴉的寶寶盡情發揮

寶寶篇一歲十七到十八週：讓愛塗鴉的寶寶盡情發揮

整體發展

寶寶一歲後對鮮艷色彩很有興趣，買了畫筆、顏料。果然蠢蠢欲動，開始塗鴉。而且不只用手，連嘴巴、小腳也一起來。媽咪會發現，寶寶對畫出的東西感到很新奇。同一動作不斷重複，有時用嘴巴嚐嚐顏料味道。甚至往身上塗抹。藉由塗鴉過程，能讓寶寶手部肌肉操控感更成熟，而且能培養創造力、開發各項潛能，搞不好能培養出畢卡索呢！

不過媽咪很在意的是牆壁、地板會不會毀在寶寶手裡，只要選擇好清洗、天然材料製作的畫筆及顏料。給寶寶穿上防護罩衣，就沒問題。最後地上鋪些紙就能讓他盡情揮灑。

教養難題

只要寶寶醒著，家裡永遠像颱風過境。玩具收乾淨最多維持五分鐘，每天都在禱告。祈求寶寶會收玩具的那一天趕快到來。

其實媽咪可以開始訓練寶寶收玩具了！建議多花點心思，例如將各類玩具拍照印出來。貼在不同收納箱，引導寶寶一邊看照片。一邊幫玩具找到家。也可以告訴寶寶「把玩具收好，下次才可以繼續玩」，還有一個重點是「以身作則」，例如請爸爸把回家後襪子亂丟的習慣改掉。

遊戲玩具

好像每個寶寶對搔癢都會招架不住，笑到失控。其實不只是搔癢，也可以用不一樣的遊戲加強肌膚接觸刺激。例如用一根刷子，先刷寶寶手背、手指再到手心。接著刷腳趾、腳跟到腳心，讓寶寶體會不一樣的刺激。

自理能力

寶寶常拿起湯匙在碗裡攪啊攪的，應該可以教他用湯匙吃飯吧？「當寶寶會自己吃飯，我可以在旁邊悠哉喝咖啡。」沒那麼快啦！媽咪要知道，任何學習都要給時間，慢慢熟悉操作技巧。

這階段寶寶只會用整個拳頭握湯匙，鏟入食物中再拿起。灑的滿地是很正常的，媽咪不能責罵。要多給讚美，也不要看不下去乾脆直接餵他吃。如果怕弄髒可鋪報紙，並

且讓寶寶用圍兜兜，事後帶他一起善後，順便建立幫忙做家务的觀念。

飲食營養

媽咪也有不愛吃某種食物的時候，但別老在餐桌上嫌棄「苦瓜太苦，香菜根本就很臭…」這樣要怎麼培養寶寶好的飲食習慣？

培養寶寶一生適用的飲食習慣，要注意這幾個重點：

每天喝牛奶以補充鈣質、維生素D，但不要再將牛奶當主食。

蔬果含豐富維生素、礦物質及膳食纖維，所以要提高寶寶對蔬菜、水果的接受度，記得用餐時多說青菜的好。

一到二歲寶寶容易缺鐵質，可多吃紅肉、蛋黃、深色蔬菜。

少喝含糖或咖啡因飲料，白開水最好。

來源：寶寶篇1歲19~20週：寶寶發展有觀察重點

寶寶篇一歲十九到二十週：寶寶發展有觀察重點

整體發展

快一歲半的寶寶只會「嗯嗯~啊啊~」，連「爸爸、媽媽」都不會說，長輩說是“大雞慢啼”不用擔心，真的嗎？媽咪不用驚慌，但必須仔細觀察。萬一有發展遲緩問題，應及早請就醫評估。必要時可以安排早療，以免影響神經智能發展。

寶寶發展問題的觀察重點包括：

觀察發展步驟，並定期接受健檢。

填寫兒童健康手冊中各年齡層的記錄事項及發展步驟，健檢時給醫師參考。

對照各年齡層的發展重點，看是否差距太大。例如應該會說「抱抱、爸爸」等一、二個有意義的單字；十五個月大以後，可以不扶任何東西行走；已經會用姿勢向大人表達需求；媽咪在寶寶面前把玩具藏在手帕下。他會掀開找出來。

教養難題

故事講不到兩頁，寶寶便開始心不在焉。完全沒在聽，怎麼教都無法專心。媽咪誤會大了！一歲多寶寶專注力發展未成熟，每次只能維持幾分鐘的專注力，不能用大人的標準來評斷喔！而且寶寶經驗值不像大人多，容易被一些像是有聲光刺激活動吸引住，那是正在累積各種感覺，

以及增加經驗值的正常表現。

媽咪可以從玩遊戲累積寶寶操作經驗來提高專注力。很簡單，媽咪只要說「小貓」。寶寶就要回「喵喵」，教他做出相對應的反應。讓他跟你的注意力放在同一事物上，就能漸漸建立好的專注力。

生病照護

照顧單純感冒的寶寶難不倒媽咪，但萬一感染流感病毒就嚴重了。不但寶寶受苦，媽咪心疼。而且至少一個禮拜無法利用晚上時間追劇，是不是很慘？那麼，還沒打疫苗的寶寶，媽咪趕快安排！

感染流感的症狀比一般感冒嚴重，容易全身無力、頭痛、發燒。症狀發作較突然，痊癒的時間較長。還容易引起併發症，像是肺炎、腦炎、心肌炎等。流感有抗病毒藥物可治療，診斷確定後馬上投藥，可縮短不舒服時間。媽咪照顧時主要是注意補充水分、觀察併發症。而由於流感透過飛沫傳染，防範重點在勤洗手、注意咳嗽禮節。提醒每年定期施打流感疫苗，才能降低因流感引起之併發症與住院機率。

遊戲玩具

玩水、玩沙真的是小朋友無法抗拒的遊戲，無論在家用臉盆裝水給寶寶玩，或到海邊玩沙，半天都不喊累。寶寶能從接觸水以及捏塑沙的過程中，讓手指精細動作更成熟，藉此給他豐富的感官體驗。在玩水、玩沙前，可讓寶寶穿防髒圍兜。準備一些道具，包括：容器、鏟子等。記住過程中大人一定要在旁邊以確保安全。

來源：寶寶篇1歲1~2週：1歲寶寶的情緒問題

寶寶篇一歲一到二週：一歲寶寶的情緒問題

教養難題

寶寶圓滾滾的身子晃啊晃的學走路，像隻可愛小企鵝。媽咪眼中完全容不下別人，但是。天真無邪的寶寶突然愛哭鬧，還會丟東西。好難接受喔！

媽咪不需要因為這樣就崩潰，其實這是進入新的自我探索階段會有的行為。想看看，寶寶無法用語言表達心情。也不懂處理害羞、緊張等情緒，所以用哭鬧表現應該不為過吧？

既然不是故意，接著就想法子跟他溝通、引導，媽咪可以問：「寶寶為什麼生氣？」或拿出最愛的玩具陪寶寶一起玩，轉移他的注意力。媽咪也要管理好自己的情緒，不能動不動就發火。

遊戲及玩具

看到寶寶會用大拇指與食指拿東西，媽咪有沒有聯想到用簡單遊戲跟他玩，增加手指運作能力？

很簡單，先示範把玩具一個個撿起來放箱子裡。再引導寶寶學做一遍，不但有趣。寶寶也會有成就感，這時候媽咪記得一一說出玩具名稱。例如：這是車車、熊熊…，對刺激寶寶語言學習有加分作用。真的是一舉兩得呢！

生病照護

寶寶活動範圍越來越大，擋都擋不住。傷腦筋的是感染病毒機會也更高，寶寶因感染發高燒。有經驗的媽咪都知道惡夢又要開始了！如果持續幾天燒到攝氏四十度，同時有眼睛紅、佈滿血絲、扁桃腺腫，八九不離十，兇手就是腺病毒。

媽咪照顧時要注意水份的補充，等燒退了，寶寶又是生龍活虎。腺病毒會透過飛沫傳染，且大便中易有病毒殘存。所以爸媽自己及寶寶也要多注意衛生，勤洗手。並用稀釋漂白水消毒玩具，作法很簡單。用十漂白水加一公升水調配好，再用毛巾沾消毒水擦拭玩具。完成後放通風處吹乾即可。

預防接種

寶寶滿週歲了，媽咪有沒有持續注意預防接種的時間？要按時帶寶寶去施打喔！接下來在十二到十五個月將接種麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗、水痘疫苗、十三價肺炎鏈球菌疫苗、型肝炎疫苗，活性減毒日本腦炎疫苗（滿十五個月）讓我們來看看感染這兩種疾病有哪些危險性？

感染日本腦炎會怎樣？感染日本腦炎病毒多無症狀，少數有頭痛、發燒、急性腦膜炎或腦炎等症狀，嚴重可能死亡，接種疫苗是有效的防治方法。

感染型肝炎會怎樣？感染型肝炎病毒會疲倦、厭食、發燒、黃疸、尿顏色變濃、上腹疼痛，多數會自然痊癒。然後產生抗體，少數可能發生猛爆型肝炎。利用接種疫苗來預防是最保險的方法。

來源：寶寶篇1歲21~22週：語言刺激從生活中取材

寶寶篇一歲二十一到二十二週：語言刺激從生活中取材

整體發展

超過一歲五個月大的寶寶，這個階段雖然還只能用幾個單字表達，但是媽咪總是知道寶寶要什麼、想做什麼，真的是默契十足！而其實寶寶也能接收妳給他的指令喔！所以媽咪應該可以想想如何給他更多語言刺激。

媽咪不用刻意規劃或安排進度，只要從日常生活中進行，任何時候、任何東西都可以很自然的成為教材喔！例如

指著沙發告訴寶寶「這是黑色的沙發」，同時帶著他一起摸摸看。告訴他「摸起來軟軟的」；或是拿出香蕉，告訴寶寶「這是黃色的香蕉。吃起來甜甜的」，除了說。還可以加上動作和表情，例如吃到甜甜的香蕉可以表現出滿足的表情。

此時寶寶能用的詞彙有限，也無法給媽咪完整的回應。但媽咪千萬別心急，也不要輕易放棄。寶寶只是需要時間慢慢引導，就能朝向完整句子的表達發展。

教養難題

寶寶到現在整天還是離不開奶嘴嗎？媽咪趁他不注意收起來，結果就是一陣狂哭。這樣下去真怕牙齒長歪，甚至咬合功能受影響。專家說還可能降低學說話的意願，所以得想個辦法讓他放棄奶嘴。但才下定決心，家中長輩馬上拿出辣椒、綠油精想塗在奶嘴上，讓寶寶立刻戒掉，可是採用這麼激烈的手段可以嗎？

其實只要掌握以下幾個要領，戒除奶嘴沒有想像那麼困難：

找替代的物品，例如最愛的玩偶或毛巾安撫寶寶。

採漸進方式，從白天開始。盡量轉移注意力，例如陪他玩或帶去公園。讓他忘了吸奶嘴這件事，接著嘗試午睡時間不要給奶嘴。最後連晚上睡覺也要禁止。

自理能力

寶寶模仿力越來越強，什麼都想學大人，而且什麼都想自己來，所以這階段很適合訓練寶寶簡單自理能力喔！例如練習脫襪子、脫鞋子，這類練習也可以增加小肌肉靈活度以及手眼協調能力。大一點再學習穿襪子、穿鞋子，因為脫比穿來得容易。

剛開始技巧一定不好，可能只會用小蠻力亂扯。媽咪先做一遍給寶寶看，教他把手放襪筒再往下脫；鞋子也一樣。手放鞋後跟再向下脫。完成後順便教他把襪子放進洗衣籃。

預防接種

寶寶之前已接種三劑五合一疫苗，記得出生滿十八個月要再追加一劑喔！五合一疫苗主要在預防白喉、破傷風、百日咳、小兒麻痺以及侵襲性嗜血桿菌的感染，這些傳染病對幼兒都有極大危害，像白喉、百日咳的致死率就相當高，接種疫苗是最好的預防方式。

接種後建議在院所觀察至少三十分鐘，沒有任何不舒服再回家。之後一到三天在施打部位可能會出現紅腫、酸痛，偶爾會有哭鬧不安、疲倦、食慾不振或嘔吐等現象，不過約二到三天後會恢復，媽咪不用緊張。如果接種部位紅腫、硬塊一直退，或持續高燒，或是出現嚴重過敏反應，

就要儘速就醫。

來源：寶寶篇1歲23~24週：媽咪如何加強寶寶的語言學習？

寶寶篇一歲二十三到二十四週：媽咪如何加強寶寶的語言學習？

整體發展

要加強寶寶語言學習，圖卡也是一項選擇喔！接觸色彩豐富的圖卡，對寶寶視覺發展有很大幫助。此外，藉由圖卡引導寶寶學習。能讓他不斷累積經驗，進而跟生活做連結。提升對閱讀的興趣。

媽咪最好選擇厚一點的圖卡，寶寶比較容易翻閱。而且字體要大、要清楚，字數盡量少。檢查時要注意不能掉漆或聞起來有怪味。互動時可拿著圖卡問寶寶：「這東西像什麼？」不要直接說出答案，這樣才能給寶寶較多想像空間。

教養難題

寶寶活潑好動又不受控制，一個不小心就闖禍。更擔心的是無法分辨危險而受傷，教孩子分辨哪些東西有危險性。是媽咪需要花心思研究的課題，但是家裡東西那麼多。在寶寶眼中都很有吸引力，全都想摸摸看、玩玩看甚至吃吃看。該怎麼辦呢？

要打造一個安全的居家環境，首先要把所有危險物品收好，包括鈕扣、小珠子、銅板、別針等容易被幼兒誤食造成傷害的小物件；藥物、洗潔劑、殺蟲劑、洗髮精等危險的東西都要放到高處或鎖進櫥櫃、抽屜。地面要保持整潔，勿隨意堆放雜物。以免寶寶絆倒，風扇則要加裝防護網。插座不用的時候要裝上安全蓋。

接著再漸進式教導寶寶分辨哪些是危險物品，過程中假設媽咪說剪刀很危險。不要期待寶寶聽一兩次就記住，要不斷重複提醒。直到能記住家裡的規則，包括哪些能玩、哪些不可以碰。當寶寶忘記規定，走向危機物品時。趕快拿開，並再次提醒「很危險。不能摸！」當然也不能要求寶寶都不亂動或亂拿，所以要準備足夠的玩具，或是常安排戶外活動。

遊戲玩具

媽咪小時候一定玩過扮家家酒，不管哪個年代。家家酒都是很受歡迎的一項遊戲，而且玩家家酒能增加寶寶語言、智力發展。對將來社交能力也有助益。

既然玩家家酒好處這麼多，媽咪不妨將玩具箱中的娃娃、湯匙、杯子、盤子等拿出來。再搭配義大利麵、玉米片等現成的食物，好好陪寶寶玩。例如可以讓他扮演媽媽角色，料理食物並餵娃娃吃。不但有趣，對各項發展也都有益處喔！

自理能力

寶寶已經一歲半了，這陣子只要大人上廁所就要跟，有時他想尿尿也會拉褲子或扯尿布…。媽咪要注意囉！寶寶這些行為就代表可以開始慢慢做如廁訓練了！

媽咪可以參考下列幾個如廁訓練的要領，讓寶寶學習過程更順利：

先準備便盆椅，放在經常玩遊戲的地方，讓寶寶穿著褲子坐看看，熟悉並適應。

媽咪上廁所時，如果寶寶在旁邊看，要露出愉悅表情，讓他感覺上廁所是自然開心的事。

有些和上廁所相關的繪本，可以跟寶寶共讀，增加寶寶對自己上廁所的意願。

採漸進方式，不斷練習。寶寶學會自己上廁所需要很長時間，媽咪不能急，如果寶寶表現出抗拒時也不要勉強。

飲食營養

「聽說不管小孩還是寵物，只要被阿嬤養都是非胖不可！」肥胖確實是媽咪們關心的問題，有研究指出。兒童肥胖，長大後肥胖機率有五成。心血管、糖尿病等慢性病風險會比一般人高。

擔心寶寶成為小胖子，就要注意這幾個重點：

外食容易吃到重口味及油膩食物，要盡量避免。能自己煮最好，此外。也要少帶寶寶去速食店。

油炸、燒烤食物和甜食要少碰，含糖飲料也一樣，包括：奶茶、汽水等。

多食用蔬菜、水果、全穀食物、瘦肉、低脂魚、豆類、低脂乳製品等天然食物。

適當運動是預防肥胖的好方法。

睡眠不足會使代謝能力變差，增加肥胖機會。

有研究指出，看電視時間越長，越容易肥胖。

預防接種

寶寶出生已經滿十八個月，要再追加一劑五合一疫苗（白喉、破傷風、百日咳、小兒麻痺以及型嗜血桿菌）。如果出生滿十二個月已打了第一劑型肝炎疫苗，現在已間隔六個月，可以再打第二劑喔！

來源：寶寶篇1歲25~26週：玩積木對寶寶發展的好處

寶寶篇一歲二十五到二十六週：玩積木對寶寶發展的好處

教養難題

「吃飯不要玩玩具！」遵守不到三分鐘，寶寶又開始邊吃邊玩，到底該如何教他守規矩？媽咪請先了解一件事，身邊所有事物對一歲多寶寶都具有相當吸引力，所以才會不斷的想要探索，一轉眼就把媽咪的規定忘光光。其實不必為此生氣喔！

掌握幾個教養要點，可以讓寶寶習慣並遵守家裡的規定：

規則不能訂的太複雜，並給寶寶一些時間適應。

一旦訂了規則就要堅持，不能一變再變。

媽咪要不斷重複提醒，同時告訴寶寶為何要禁止，例如：「手伸進電風扇會受傷，所以不能碰。」

獎勵比懲罰有用，更重要的是絕不能用欺騙方式。例如：「如果你聽話，我明天就買玩具」。結果從沒兌現過，這樣很難讓寶寶繼續遵守規則。

媽咪自己也不能違規，如果要寶寶吃飯不能玩玩具，自己卻邊吃邊滑手機，寶寶會看在眼裡的。

遊戲玩具

一歲半寶寶已經會疊四、五個積木，而且比較不像以前拿到只會亂扔。現在手指抓握能力更純熟了，可以精確的把積木放在想放的位置。即使不小心倒了，也會再重新試試。並思考是否用不同角度擺放才不會倒。

雖然只是疊幾個積木，但可別小看這樣的進展喔！開始認真玩積木，意味著寶寶從感官遊戲、功能性遊戲進展到建構性遊戲，什麼是建構性遊戲？以玩積木為例子，用積木創造出一些東西（例如房子），而不再只是單純將積木往上疊，這就是建構性遊戲。玩積木能提升認知能力、專注力、創造力，並促進手眼協調，也有研究指出，玩積木能誘發寶寶的口語能力呢！

飲食營養

寶寶第一次進到廚房，眼睛睜得大大的。東看西瞧，這裡摸一下。那裡玩一下，好像發現新大陸。媽咪就讓他進廚房好好探索吧！尤其現在很流行親子共廚，藉此可以增加寶寶對進食各類食物的興趣。

畢竟寶寶還小，而且是第一次。先給他最簡單的任務，例如做披薩時。媽咪將需要的食材，包括：香菇、青椒、紅椒、洋蔥、小蕃茄、雞肉等先洗好切好。由寶寶負責放在餅皮

上（可以在大賣場買現成餅皮），再讓他幫忙灑些起司條。送進烤箱以二百度烤三十分鐘就大功告成。

過程中可以讓寶寶認識各種食材及餐具，並建立健康的飲食觀念，還能增進親子關係，真是一舉數得。等寶寶的「處女作」披薩上桌，他會很興奮，也很有成就感喔！

預防接種

寶寶除了接種公費疫苗之外，媽咪也可以和醫師討論接種自費疫苗。目的是讓保護力更好，例如打過一劑公費水痘疫苗。還是可能被傳染，台大醫院曾做過研究發現。打過公費水痘疫苗的孩子，每年仍有八百人出現水痘症狀。主要因為寶寶免疫力還處於發展階段。

水痘病毒是經由皮膚直接接觸、飛沫或空氣傳染，傳染力是腸病毒和流感的六倍之多。打第二劑能大幅降低被傳染的風險，所以建議寶寶在滿一歲已打了第一劑。寶寶四到六歲學齡前再自費打一劑最保險，可以提高體內水痘保護力。避免大班、小學時跟上班上的水痘流行。

來源：寶寶篇1歲27~28週：寶寶認知方面的新進展

寶寶篇一歲二十七到二十八週：寶寶認知方面的新進展

整體發展

一歲半的寶寶已經知道每樣東西都有自己的名字，所以隨時隨地會指這指那。要媽咪回答那是什麼，媽咪不要覺得厭煩。這表示寶寶的認知發展又向前邁出一大步喔！

媽咪不妨藉這機會好好跟他互動，除了有問必答之外，媽咪也可以主動指著寶寶耳朵，問：「這是什麼？」讓寶寶回答，或是問：「你的鼻子在哪裡？」因為這時候寶寶也大概知道身體各部位名稱。當然也可以加入圖片或繪本，例如拿出一些圖片，請寶寶找出太陽的圖片，他會按照指示找出來。

教養難題

「寶寶拿起我的手錶把玩，跟他說不行。不但不聽，還往地上丟。理智線瞬間差點斷掉！」一歲多寶寶有些行為讓人覺得很「故意」，更火的是看到媽咪生氣還會竊笑。

媽咪要知道寶寶會有這樣的行為，最主要是想引起大人關注，那麼到底要怎麼回應呢？這時候最好冷淡、沒表情，或表情嚴肅。將手錶拿走，並且跟寶寶說不行。他會覺得無趣，也可能感到緊張焦慮。之後就比較不會有類似行為。假如媽咪反應激烈，寶寶會覺得好玩，就會每天找碴，每天都想測試媽咪的底線。

生病照護

寶寶異位性皮膚炎又發作了，皮膚紅腫、脫屑。已經抓到

破皮，睡也睡不好。看了好心疼。異位性皮膚炎是三大過敏疾病之一，從嬰兒期開始臉部出現濕疹。之後擴大到四肢關節外側，再到關節、膝蓋內側。患處皮膚摸起來比一般人乾燥且粗糙。症狀嚴重必須就醫，使用藥物治療。

照顧異位性皮膚炎寶寶要很細心，主要重點有：

夏天盡量在冷氣房，以免流汗後使病情加重。

建議用中性或無香精肥皂幫寶寶洗澡，避免用沐浴乳。洗澡水溫不可過高，也不可過度清潔，以免將保護皮膚的水脂層洗掉。

洗澡後輕輕擦拭寶寶皮膚，不要來回搓，以免傷到皮膚。

保濕要比藥物來得重要，身體擦乾後，用異位性皮膚炎寶寶專用的乳液塗抹，提高皮膚的保濕效果。

給寶寶穿純棉質料的衣服，以增加吸汗效果，出汗後最好趕緊把汗擦乾，因為汗水會刺激皮膚。

家中避免使用地毯。

擔心食物引起過敏，可做飲食紀錄。若有食物一吃就過敏，先暫停。等治好再試，如果吃了還是發作。之後就要禁止。

自理能力

寶寶一歲半大概已經長出六、七顆牙，媽咪除了飯後睡前幫他刷牙之外，其實也可以嘗試讓寶寶學刷牙，早點建立口腔衛生的觀念。媽咪要記住，只要長牙就要用兒童牙刷刷牙。刷毛要柔軟、粗細適中，每三個月至半年更換一次牙刷。此外，最好使用幼兒含氟牙膏一千。三歲以下兒童使用時，可將薄薄一層塗在牙刷上。三到六歲寶寶使用牙膏的量，約碗豆般大小即可。即使寶寶不會吐出牙膏，也不用擔心吞下肚會影響身體。

刷牙時，刷毛朝向牙齦約四十五度。同時涵蓋牙齒和部分牙齦，要確實刷到牙齒的每一面。刷牙過程媽咪須耐心引導，並從旁協助。同時多稱讚寶寶，也可以搭配音樂增加刷牙樂趣。或平時用繪本、影片讓寶寶知道刷牙很重要。

來源：寶寶篇1歲29~30週：腹瀉寶寶的照顧重點

寶寶篇一歲二十九到三十週：腹瀉寶寶的照顧重點

教養難題

媽咪都知道要給寶寶愛的教育，但寶寶整天搗蛋、搞破壞。媽咪常會自問「如果用體罰，應該可以立即見效。就不需這麼累？」體罰雖然立即有效，但缺點可不少喔！

體罰會快速見效，其實是因為寶寶被打造成疼痛。進而感到害怕，這種狀況下。媽咪的告誡根本聽不進去，尤其此階段寶寶理解力還不夠。可能連錯在哪裡也不清楚，而且體罰會讓內心接收負面情緒而留下陰影。親子關係也會因此變得疏離，研究證實。經常用打罵方式，孩子長大較具攻擊性。

這麼多缺點，媽咪應該不會再有體罰寶寶的念頭吧？雖然用愛的教育需要一些時間才有成效，但不像體罰有許多隱憂。能給寶寶溫暖友善的學習環境，並給予規範，寶寶將來較有責任感，解決問題的能力也較好。不過並非完全放任，犯錯時可適度剝奪他的權力，例如提醒三次都沒做到把玩具收好，可罰他一小時內不能再玩玩具。而在訂定規範前，爸爸媽媽要先有共識，態度才能一致，教導過程則務必堅守原則。

生病照護

你我都有拉肚子經驗，嚴重時幾乎離不開馬桶。肚子絞痛、身體虛弱，大人都受不了。更何況幼兒，所以寶寶腹瀉可說是媽咪的一大惡夢！幼兒感染某些病菌以後，常常出現的症狀就是腹瀉，包括輪狀病毒、諾羅病毒以及沙門氏菌都會引發腸胃發炎，進而引起腹瀉。

媽咪照顧腹瀉寶寶要注意幾個重點：

開始腹瀉就要補充足夠水分，要持續到腹瀉停止。

可補充兒童專用電解質液，禁止喝含糖飲料，以免腹瀉更嚴重。

建議透過少量多餐的方式食用清淡飲食，避免過油或高糖分的食物。以免刺激腸道蠕動，加劇腹瀉的情況；但同時也必須注意營養的攝取。以幫助腸胃道細胞的修復。

另外，須特別注意個人衛生。經常且正確地洗手，尤其是家長自己本身。這樣才能避免照顧生病小孩過程中，自己也不小心染病。

不可自行給寶寶吃任何藥物。

假如出現食慾不振，一到二小時內解數次水樣便。腹瀉持續超過二十四小時，以及有頻繁嘔吐、發燒、血便等。要趕快就醫。

遊戲玩具

寶寶發展過程中不能缺親子共讀這一塊，而閱讀不一定要一成不變喔！媽咪可用對話式共讀，像玩遊戲一樣，在口語互動中讓寶寶對閱讀更有興趣。

媽咪可以這麼做：

不一定要買很多書，可以圖書館借。或買二手書以節省花費，重點在提供好的閱讀環境。營造樂趣。

過程不只是看或唸給寶寶聽，還要有互動。媽咪可從內容當中提出問題，再鼓勵寶寶回答。例如：「這是什麼？」寶寶：「是花」，媽咪：「答對了！」接著再說：「這是黃色的花」，讓寶寶學著說出完整句子。

不要嫌累而放取代親子共讀，因為親自陪伴及互動式共讀，會刺激寶寶前額葉的活動性，對認知、學習及語言能力發展都有很大幫助喔！

自理能力

「讓寶寶練習做家事，會不會太早？」其實不會，這階段寶寶愛模仿。可讓他學大人做點簡單家事，像是擦桌子、洗碗甚至只是幫忙拿抹布。從小養成習慣，讓他知道自己是家裡的一份子。而且以後比較能照顧自己，也較有責任感。

不過媽咪要以身作則，不能寶寶擦桌子，自己在一旁滑手機，如果能全家一起來更有歡樂氣氛。寶寶做不好不能生氣，如果不想做，也不要發怒喔！

來源：寶寶篇1歲31~32週：餵寶寶吃藥的訣竅

寶寶篇一歲三十一到三十二週：餵寶寶吃藥的訣竅

整體發展

才沒幾個月，寶寶從走路搖搖晃晃。到現在越走越穩，也不用大人牽著。可自己扶欄杆上幾個階梯，不只這些喔！最近又發現寶寶會小跑步，也出現簡單的跳躍動作。

跑、跳都能刺激寶寶的動作預測能力，訓練身體平衡感。也能讓認知發展更加健全，媽咪可以觀察發現。寶寶雖然只會跑上幾步，但已經會自己控制速度。並繞過障礙物。如果家裡空間夠，在安全無虞情況下可讓寶寶多練習，或到戶外讓他盡情的跑，同時練習雙腳跳。

不要怕寶寶跌倒而阻止，或出門怕他橫衝直撞就一直抱著。也不要覺得這時候帶出門比以前更累，而總是待在家裡。這樣都會阻礙寶寶鍛鍊的機會，如果寶寶發展受阻。之後去幼兒園發現比其他小朋友落後，比較容易畏縮。進而影響到人際關係。

教養難題

寶寶只要一生病，吃藥就成了大難題。以前還可以半強迫，現在力氣越來越大。不是藥還沒到口就被弄掉，就是吃了馬上吐出來。吃藥對寶寶是件可怕的事，到底有什麼辦法能讓寶寶乖乖吃藥？

媽咪用對方法，餵藥就不需像打仗一樣累，出生六個月前餵藥可用滴管，之後使用餵藥器或藥匙。建議媽咪平時可準備維他命，請寶寶餵媽咪吃藥，把藥放進嘴巴再喝水吞服，告訴寶寶：「我是不是很乖？媽咪吃了藥，咳嗽才會好喔！」過程要表露出開心的笑容，讓寶寶覺得吃藥並不可怕。如果很怕苦，可問醫生是否能加一些有甜味的食物一起吃，讓吃藥過程更順利。

遊戲玩具

寶寶整天忙個不停，而且只要聽到音樂。身體就扭啊扭的，還會煞有其事的啦啦啦…。跟著節拍哼上幾句沒人聽得懂的詞，媽咪真的被逗樂了！

這時候媽咪可以選幾首簡單童謠，跟寶寶一起玩音樂遊戲，對語言、情緒及自我表達等各方面的學習有很大幫助。例如大家很熟悉的「頭、耳、肩膀、膝、腳趾」（翻自童謠「倫敦鐵橋垮下來」），邊唱邊帶著寶寶配合動作，從音樂中得到樂趣，也可以更熟悉身體各部位名稱。另外像是「兩隻老虎」、「醜小鴨」等簡單易懂的童謠，也都很適合跟寶寶一起邊唱邊玩喔！

飲食營養

為寶寶打造一個安全的用餐環境，餐具的選擇也是重要一環，適合的餐具能讓寶寶有愉快的進食過程，也能從中獲得成就感。

媽咪該怎麼幫寶寶挑餐具呢？

安全無毒，通過檢驗合格。

湯匙以矽膠軟材質為佳，大一點的寶寶可使用不銹鋼材質。

湯匙深度隨寶寶成長做更換，剛開始淺一點較適合，等到完全能自己進食後，再換深一點的。

碗的底部有防滑或吸盤設計，可避免打翻，或選擇底面積較大的碗。

可以帶寶寶一起挑，讓他選自己喜歡的餐具。

來源：寶寶篇1歲33~34週：好玩的躲貓貓遊戲

寶寶篇一歲三十三到三十四週：好玩的躲貓貓遊戲

教養難題

寶寶明明很會走，為什麼到動物園還沒開始逛就吵著要抱抱，真的快把我累壞了！很會走的寶寶，外出走沒幾步就要討抱，可能原因與缺乏安全感或大人走太快，或是真的累了有關。

遇到這樣的狀況，媽咪可以這麼做：

如果缺乏安全感，例如突然有狗接近或處在陌生環境。抱抱能緩和寶寶緊張情緒，媽咪可以抱一段時間。再找好玩的事物吸引他下來走。

寶寶也有可能覺得自己走，看的視野沒有媽咪抱來得廣，所以一直想要媽咪抱。

假如真的累了，可使用推車。不過不能一出門就全程抱或使用推車，這樣依賴心會比較重，而且減少探索環境的機會。

假如因為大人走太快，讓寶寶老是跟不上，可以放慢腳步，或停下來等。也可以帶寶寶玩踩地磚遊戲，例如選擇踩哪個顏色的地磚走，以增加行走過程的樂趣。

遊戲玩具

媽咪有沒有發現，寶寶從出生到八個月這期間。媽咪用毛巾把東西蓋住，寶寶不會主動找。這是因為他認為看不到，就表示東西已經消失了；但到一歲後。會開始建立「物質恆存」概念，雖然東西被蓋住。但寶寶已經知道它還存在，而且會想把它找出來。

這時候不妨跟寶寶玩玩「躲貓貓」遊戲，例如寶寶正在玩玩具，媽咪把其中一個用帽子蓋起來，再問寶寶「玩具在哪裡？」他會把帽子拿開成功找到玩具，如果一時找不到。可讓玩具露出一部分，讓寶寶順利找到。並且要稱讚他。會掀開帽子找到玩具，表示寶寶認知能力更進步，此外，藉由「躲貓貓」遊戲對寶寶記憶力、空間感都有很大幫助喔！

自理能力

自從寶寶學會脫襪子，技巧已越來越好。而且一回家第一件事就是脫襪子，並且自己拿去放洗衣籃。媽咪越來越有信心，接著還可以教他什麼呢？媽咪可再教寶寶練習脫衣服、脫褲子，訓練小肌肉以及協調能力，並培養獨立的個性。

媽咪可用這幾個小撇步，讓寶寶更順利的學習脫衣服及脫褲子：

選寬鬆的短袖、短褲，材質有彈性比較好學。

媽咪先示範，動作要盡量放慢，之後讓他先做幾遍。

進行時教寶寶把手伸出袖子，把腿伸出褲管，順便教他「這是領子、袖子、拉鍊、鈕釦」。

如果想接著練習穿襪子，媽咪可以幫他穿到一半，再教他

把襪子拉上來；學穿褲子也可以這樣教。

飲食營養

爸爸上班忙，媽咪帶小孩也不輕鬆。偶爾也想吃外食讓自己稍微休息，但外食不像自己煮。可以兼顧營養、衛生，也比較不會增加肥胖機率。所以若想帶寶寶吃外食要注意哪些事項，才不會吃出問題？

注意以下事項，即使帶寶寶吃外食，也能吃的很健康：

烹調方式越簡單，越能吃出食物原味和營養，例如吃魚料理選擇清蒸，會比油炸更能吃的到魚的鮮甜。

選擇清蒸、燉、煮等方式烹調的食物，少吃油炸、炒、煎的食物，像是鹽酥雞、薯條等。

遵循天天五蔬果原則，才能攝取足夠的維生素、纖維素及礦物質，不能只偏愛肉類。另外，最好以全穀類、糙米飯等五穀根莖類為主食。

避免給寶寶喝現榨果汁以及奶茶、汽水等飲料。

如果要外帶回家吃，最好自備餐具比較環保、安全。

來源：寶寶篇1歲35~36週：寶寶需要更多語言刺激

寶寶篇一歲三十五到三十六週：寶寶需要更多語言刺激

整體發展

寶寶一歲以後，會說的單字越來越多。媽咪應該也會發現，這階段寶寶已經開始會說一兩句簡單句子。像是玩車車、狗狗叫，而且很愛重複大人說的話。

寶寶每天都有新進展，媽咪可以用這些方式給他更多語言刺激：

多互動，過程中媽咪說話盡量精簡。速度不能太快，多重複關鍵字。如果能配合一些手勢以及豐富表情會更好。

寶寶說話時，媽咪要耐心聽。並給予溫暖的回應，千萬不要急著幫他表達。例如寶寶指向水杯，媽咪不要馬上說「是不是要喝水？」以免阻礙寶寶語言發展。

當寶寶說出單詞或雙詞，媽咪可用完整簡單句回應。例如寶寶說「車車玩」，媽咪可回應「寶寶要玩車車」。讓他學習正確表達方式的句子。

多安排跟年齡大一點的孩子一起玩，或跟其他家庭共同出遊，增加語言刺激的機會。而即使平時走在路上，媽咪也可以隨手指某個事物，告訴寶寶這是什麼。

共讀或朗讀都能大量增加字彙量。

媽咪可能會認為早點送去托嬰中心可增加刺激，提早去托嬰中心反而要面對適應新環境的問題。

教養難題

「寶寶只要手閒著，就開始挖鼻孔。甚至吃鼻屎，有時還挖到流血。實在好髒、好噁心，阻止之後沒多久又開始」。媽咪一定很想問，寶寶到底是怎麼回事？

寶寶挖鼻孔可能有幾個原因，包括對鼻孔感到好奇。想要挖挖看，探索一下到底有多深；也可能因為感到緊張、焦慮。才會用挖鼻孔的舉動降低心裡的不安；還有一個重要原因就是鼻子過敏、感冒鼻塞、鼻子太乾，會覺得不舒服或卡卡的。才會想把鼻子裡的東西挖出來。

媽咪這樣做，讓寶寶不再一直挖鼻孔：

如果因為好奇或無聊，就讓他的的小手有事做。例如畫畫或堆積木，同時讓他知道挖鼻孔會受傷。並以圖片讓他了解。

看到寶寶挖鼻孔，不要一直批評好髒、沒禮貌，要用正向的方式加以引導。

如果是生理方面問題，例如因為鼻過敏產生黏液。鼻涕乾掉後卡在鼻孔讓他難受，而想要挖掉。媽咪要想辦法減輕過敏症狀，例如做好居家清潔、維持一定濕度（五十五%~六十%）使空氣濕潤。鼻子比較不會太乾。

也可以教寶寶用衛生紙擤鼻子。

假如挖到鼻子流血受傷，或緊張情緒一直持續，就要看醫生。

自理能力

「正在忙做晚餐，寶寶一直跟進跟出。像隻跟屁蟲」，既然寶寶老是想參一腳。就給他學做點簡單家事：幫忙擺餐具。

媽咪可以先告訴寶寶：「吃飯前要先準備碗筷，寶寶來幫忙」。再準備好碗、筷子、湯匙、紙巾，跟他說爸爸、媽媽、寶寶的座位在哪。接著教他把筷子分好，兩支一起。然後開始擺碗，湯匙、筷子放碗旁邊。再放紙巾。

要寶寶幫忙，應選擇耐摔餐具。餐桌不能太高，或墊個小椅子。媽咪從旁教導及協助。等一切都完成，全家坐好就可以開動，這時候寶寶應該很有成就感，也願意好好吃飯。鍛鍊寶寶做家事能力，讓他有參與感，將來較有責任感以及服務的精神。此時也可以順便教他算一下總共幾個人，接觸簡單的算數。

來源：寶寶篇1歲37~38週：陪寶寶玩丟球遊戲

寶寶篇一歲三十七到三十八週：陪寶寶玩丟球遊戲

整體發展

最近寶寶似乎對球特別感興趣，只要拿到球就超興奮。不管大球、小球、皮球、塑膠球，對他都很具有吸引力。從一歲前會用小手張開握著小球，到現在已經會丟球。會抱著球走路，真的進步很多。趁著好天氣，就帶著寶寶出門玩玩丟球、接球遊戲吧！

丟球能訓練寶寶手臂力量，促進手及全身的協調力；撿球可以刺激前庭覺發展，幫助維持身體的平衡能力。而在接球時，必須看球、找球。過程中還能讓專注力得到提升，既玩的開心有趣。又有助於整體發展。這階段寶寶站著玩丟球，技巧還不成熟。有時會覺得丟不準、接不準而心裡受挫，可先在家玩丟小抱枕。練習拋接，比較不會對球類遊戲有排斥感。

教養難題

「寶寶精力真的很充沛，只要帶到公園玩。就像脫韁野馬，沒有結束的時候。但是天黑也該回家了，卻怎麼也不想走。勉強帶回家一進門就哭不停」，媽媽好無奈。原本開心出門，卻臭著臉回家。到底如何讓玩到不想回家的寶寶乖乖收工？

建議媽咪先了解原因，是不是不常帶寶寶出去玩，所以一出門就沒有要回家的意願？或是寶寶個性較外向，較喜歡待在外面，也可能因為在家覺得無趣。

媽咪可以這樣處理，讓寶寶心甘情願回家：

出門前先說好玩多久要回家，慢慢建立時間概念。

回家允諾明天再出去玩，媽咪務必說到要做到。

有耐心疏導，例如可以說：「家裡的小熊玩偶在等你」，千萬不能大聲斥責，寶寶也有自尊心呢！

回家之前先預告，提醒：「再玩五分鐘就要回家」，不要一說就立刻走。

生病照護

腸病毒傳染力很強，越小的小孩得到。出現重症機會比較高，所以一提到腸病毒。媽咪就特別緊張。感染腸病毒可能會出現發燒、頭痛、腸胃不適等症狀，如果口腔有潰瘍、手腳或手掌、腳掌出現水泡。就是「手口足症」，如果只有後咽部口腔潰瘍。就是「咽峽炎」。

寶寶得到腸病毒常因為嘴巴潰瘍疼痛不想吃東西，此時可以讓他吃些布丁、豆花、冰淇淋等冰冷食物。較容易下嚥，並且要補充足夠水份。如果嗜睡叫不醒、持續嘔吐、抽

筋、心跳和呼吸加快，出現其中一個症狀。就要馬上送醫。

預防腸病毒，媽咪要注意這幾點：

平時要有良好衛生習慣，勤洗手，並注意居家環境的衛生清潔及通風。

玩具要經常清洗、消毒，酒精無法消滅腸病毒。建議用稀釋過的漂白水，作法是用十漂白水加一公升水調配好。再用毛巾沾消毒水擦拭玩具，完成後放通風處吹乾即可。

腸病毒高峰期，少去人多、空氣不流通的公共場所。

均衡飲食、適度運動及充足睡眠，可提昇寶寶免疫力，降低感染風險。

遊戲玩具

寶寶出生還在躺的階段，就常會揮著雙手。腳也會亂踢，等到開始會爬。一拿到東西就想搖搖看、敲敲看，對東西敲打發出的聲音很感興趣。快二歲的寶寶，可以跟他玩敲打遊戲。不只讓他認識各種聲音，也能培養音樂節奏感。同時訓練手以及手腕的協調力喔！

媽咪可利用家裡現有的用品充當玩具，包括：鍋子、杯子、碗盤等。材質可以是不鏽鋼、鐵、塑膠、木頭等等，排成一排。給寶寶一支小棍子，讓他一個一個敲。認識各種材質敲出來的聲音，之後讓寶寶背對著媽咪。媽咪敲打一下再問寶寶：「媽咪敲的是什麼？」當寶寶越來越有興趣，這時候也可以買圓鼓、鐵琴讓他玩，更添加一些樂趣。

來源：寶寶篇1歲39~40週：閱讀幫助寶寶迅速累積詞彙

寶寶篇一歲三十九到四十週：閱讀幫助寶寶迅速累積詞彙

整體發展

寶寶一歲開始，學習步調大幅度加快，詞彙迅速累積，媽咪一定要不間斷進行每天的親子共讀喔！越早接觸閱讀，對語言、文字的理解及運用能力。都有很大幫助，而且寶寶養成閱讀習慣。專注力較好，性格也較穩定。

在溫馨舒適的小角落陪寶寶一起閱讀，是最幸福的事。建議媽咪多重視閱讀環境，燈光盡量柔和。鋪塊小地毯比較能放鬆，再放些寶寶喜愛的玩偶、抱枕。並且記得把書籍擺在寶寶容易拿取的位置，可以提升寶寶對閱讀的興趣。

寶寶在不同階段，可以有不一樣的閱讀方式。例如快二歲的寶寶，很適合閱讀一些和生活有連結的內容。例如內容描述乖乖坐著吃飯、飯後記得要刷牙…。媽咪也發現寶寶會主動拿著書要媽咪唸，喜愛的書一看再看都不厭煩。

。媽咪要有耐心，而且不能以動態影片代替。以免影響專注力。

教養難題

最近寶寶只要一睡醒或被叫醒就哭個不停，開始發脾氣。看誰都不順眼，怎麼安撫也沒用。真搞不清楚是睡不好還是睡不夠？到底媽咪該如何消除寶寶的「起床氣」呢？

睡眠對每個階段的寶寶都很重要，睡眠不足脾氣容易變差。發怒的同時也波及家人，例如假日安排出遊。寶寶被叫醒哭鬧，得花時間安撫。整個出遊興致大受影響。

解決寶寶的「起床氣」，媽咪可以掌握幾個重點：

先從充足睡眠及好的睡眠品質著手。一到二歲寶寶一天要睡十二到十四小時，最好晚上九點前入睡，如果第二天要出遊，就寢時間最好更早。

睡眠儀式也很重要，睡前可以讓寶寶選擇要聽的音樂或要媽咪唸的繪本，以幫助入睡。

如果因為夜驚或夢魘影響睡眠品質，要多陪伴、安撫，給予安全感，讓他再度入睡。

遊戲玩具

買了玩具，回家玩沒幾次就膩了。花了大把銀子的玩具就晾在角落，真讓人心疼。乾脆想些點子自己做玩具，既省錢又能與眾不同。而且一樣能讓寶寶玩的開心。

如果剛好家裡有許多瓶瓶罐罐，洗乾淨後。可拿來當保齡球，再拿出寶寶玩的小球。開始跟他玩一場保齡球比賽，不但有趣。還能訓練寶寶手眼協調發展、促進空間知覺能力，以及鍛鍊手臂肌肉力量。

自理能力

一歲後寶寶在學習及模仿這方面可說火力全開，什麼都想自己嘗試、自己來。因此自理能力的訓練可以在這時候開始，洗澡也不例外。雖然要讓寶寶自己洗還要等上幾年，但凡事都要以漸進方式。一點一點慢慢訓練。

媽咪可以在幫寶寶洗澡的過程中，讓他了解洗澡順序、該洗的重點。同時教他如何抹肥皂，肥皂用在幾個容易髒的部位。包括頸部、腋下、胯下等，洗後要用水沖乾淨。步驟不能太馬虎，這樣才能讓寶寶真正學到重點。也可以給寶寶一塊小海棉刷自己身體。如果想邊洗邊玩，可以放玩具、洗澡書，讓洗澡變得更有趣。

飲食營養

「好不容易等到假日可以找個餐廳享受美食，結果寶寶在餐廳坐不住、到處奔跑。還不時大叫，還沒吃到美食就一

肚子火。而且要忍受別人的白眼，有夠崩潰！」媽咪要知道，寶寶的問題就出在沒學好「餐桌禮儀」。

「餐桌禮儀」是指吃飯時的行為規範，那麼，平時要如何訓練寶寶？以下幾點媽咪要好好記下來：

讓寶寶知道餐椅才是吃飯的地方，用餐時不能離開、亂跑或看電視、玩玩具。更不能有喊叫、拍桌、敲餐具等舉動，嘴裡有食物不可講話。告訴他「大家都在吃飯不可以做不好的行為」，當然媽咪自己也要遵守規則。

習慣一家人吃，並營造愉悅的用餐氣氛。

外出吃飯帶寶寶的餐具，讓他有熟悉感，較能順利用餐。

寶寶已吃固體食物，可以給多樣食物，讓他感受各種味道，這樣比較有食慾。

來源：寶寶篇1歲3~4週：寶寶從站到學走，邁入一個新的里程碑

寶寶篇一歲三到四週：寶寶從站到學走，邁入一個新的里程碑

整體發展

從坐到站，寶寶已經能扶著牆壁走。甚至放手走上幾步，自己覺得好神奇。而媽咪是不是正為了要抓住這歷史性一刻，手機拍個不停？

想引導寶寶走的好，不妨先讓他在家赤腳走走看，嘗試一段時間，寶寶更能掌握技巧喔！但要確保行走途徑無障礙而且很安全，並常說「你好棒！」過程難免會跌倒，不用緊張。也別過度保護，而且爸媽千萬不可跟同齡孩子比。如果老說隔壁小朋友多厲害，只會讓自己焦慮。寶寶也覺得壓力真大。

教養難題

媽咪最近腦海可能常閃過「真想把寶寶塞回肚子裡」的念頭，又怎麼了呢？原來寶寶才一歲居然會打人、咬人，這是怎麼回事呢？媽咪要了解寶寶好奇心越來越強，打人、咬人可能是探索外界的方式之一。或是想引起大人注意，而個性急躁的寶寶。也較容易有這類舉動。

爸媽先穩住自己情緒，了解寶寶需求，不可以打罵，因為你的行為寶寶隨時都在模仿喔！可試試讓寶寶抱著最愛的娃娃輕輕的摸，告訴他「打或咬，娃娃會受傷」。

遊戲玩具

寶寶愛把東西放容器內，也會將圓柱放插洞板內。這類精細動作能幫助視動協調能力發展，媽咪要知道寶寶學習新技巧。需要視覺運作，再加上協調的動作技巧一起配合。有些遊戲可以加強這方面的訓練，例如準備紙箱。割

出圓形、方形或其他形狀的小洞，讓寶寶把不同大小的球、不同形狀的積木從紙箱的洞塞入。這麼有趣，保證寶寶一整天都玩不膩呢！

自理能力

對於什麼都想嘗試自己來的寶寶，不要剝奪學習機會。試著讓他自己用毛巾擦臉、擦嘴巴，媽咪帶著一起做。養成好習慣，也能學會簡單自理能力。

飲食營養

一歲後寶寶不能停留在果泥、蔬菜泥的階段，要開始以固體食物為主。全穀雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、乳品、油脂與堅果種子等六大類食物都要均衡攝取，才能有足夠營養。長得頭好壯壯喔！建議媽咪食材的選擇以天然為主，而寶寶胃還小。無法一次吃太多，可在兩餐間以水果做為點心。例如蘋果、香蕉、奇異果等，都是很好的選擇。

來源：寶寶篇1歲41~42週：寶寶的社交發展

寶寶篇一歲四十一到四十二週：寶寶的社交發展

整體發展

「寶寶快二歲了，個性越來越活潑好動。在公園時，對其他寶寶在做什麼好像很感興趣。有時也想一起玩，是不是開始想交朋友呢？」

沒錯，這階段的寶寶在社交發展方面會漸漸萌芽。媽咪會發現寶寶的觀察力變強，會想在同個空間和其他寶寶玩。也許還不太懂得與人互動，只是偶而有交集。這就是所謂「平行遊戲」的階段，會出現早期社交能力。

要增進寶寶社交能力，媽咪不能急，也不要要有太高的要求，可以試試這幾種方法：

安排機會讓他認識同年紀孩子，多適應新的面孔，之後可以有固定玩伴，創造更多機會。

引導寶寶跟別人分享，例如把玩具借給其他小朋友，或輪流玩玩具，以及如何對待其他小朋友。

如果寶寶不願意，不要強迫一定得跟別人互動，只要跟他說其他小朋友正在玩什麼，再鼓勵一起玩。

讓寶寶認識人與人要如何交流，像是媽咪在跟朋友聊天互動，寶寶會特別注意觀察，慢慢學習如何與別人互動。

教養難題

別人家的孩子個性都很溫和，我們家的不但性子急、容易衝動。情緒起伏也很大，要不到想要的東西會發怒。自己做不好也會生氣，該怎麼治一治寶寶衝動又火爆的脾氣

呢？

有些寶寶脾氣一上來，就沒辦法好好聽大人說，有這類困擾的媽咪可以這麼做：

採取正向且溫柔、堅定的態度引導，讓寶寶大腦發展逐漸穩定，避免體罰，也不能用不好的字眼斥責。

教寶寶認識情緒標誌，例如告訴寶寶「你現在很生氣。你現在好快樂…」，認識自己的情緒。也學習如何自我控制，衝動能力控制好。將來會有較好的人際關係及社交能力。

從日常生活中訓練寶寶，例如找相關的繪本，告訴寶寶「不愛生氣的寶寶好可愛，你是可愛的寶寶嗎？」慢慢的，寶寶會有所改變。

如果寶寶堅持就是要某樣東西，要抑制他的衝動。告訴他：先把玩具收好再給你，之後等寶寶冷靜下來。再教他不可以那麼愛生氣。

生病照護

寶寶老是揉眼睛，不斷流淚。而且眼白、眼瞼發紅，還出現分泌物。媽咪這時候要懷疑是結膜炎造成，包括病毒、細菌、刺激物。都可能引起結膜炎，因此應該先看眼科醫師找出發炎原因再做處置。

媽咪要注意以下幾個事項：

細菌感染引起急性結膜炎，醫師會給予抗生素的眼藥水、藥膏。

如果病毒引起，由於傳染性強。注意大人和寶寶都要勤洗手，玩具也要清潔消毒。以防病毒再傳播出去。

如果是過敏性結膜炎，常會合併打噴嚏、流鼻水等鼻子過敏症狀。必須確定過敏原，避免再接觸。同時依照醫師指示接受治療。

自理能力

寶寶對所有家事都相當有興趣，但是很多家事對他而言會不會太難？像是摺衣服，可以教他嗎？寶寶學得來嗎？媽咪不用擔心，凡事都有第一次。就算複雜的家事，剛開始只要讓他接觸。並從旁協助，不要有什麼期望。就可以很輕鬆的邊玩邊學，總有一天會很熟練的。

摺衣服可以挑最簡單的手帕，用簡單的步驟教寶寶。告訴他「先左右，再上下摺」。有耐心的讓他多試幾次。襪子部分，可先教他配對。最好選圖案顏色差異大的襪子，會比較好分辨；配對好再教他從中間摺。複雜的摺法可以以後再教。如果襪子是反面的，可以請寶寶幫忙翻到正面找出圖案，他會覺得很有趣喔！

來源：寶寶篇1歲43~44週：寶寶的睡覺怪癖

寶 寶 篇 一 歲 四 十 三 到 四 十 四 週：寶 寶 的 睡 覺 怪 癖

整 體 發 展

寶 寶 精 細 動 作 發 展 的 越 來 越 好，較 有 難 度 的 動 作 好 像 也 難 不 倒 他。像 是 轉 瓶 蓋、拉 拉 鍊 等 等，這 些 動 作 對 促 進 手 部 肌 肉 靈 活 度 以 及 協 調 性 有 很 大 好 處。而 且 轉 的 動 作 在 生 活 中 幾 乎 每 天 會 用 到，除 了 瓶 蓋。還 包 括 轉 門 把、鑰 匙、水 龍 頭 等。

轉 瓶 蓋 必 須 依 賴 手 指 的 力 量，穩 定 抓 握 蓋 子。再 用 手 腕 轉 動，媽 咪 可 以 這 樣 做。讓 寶 寶 更 加 熟 練：

媽 咪 先 示 範 一 次，動 作 放 慢，寶 寶 如 果 還 不 熟 練，可 先 握 他 的 手 操 作 一 次。

訓 練 轉 開 動 作 時，瓶 蓋 不 能 鎖 太 緊，以 免 寶 寶 轉 不 開 而 失 去 自 信。

準 備 不 同 大 小 及 顏 色 的 瓶 子，將 瓶 蓋 取 下。依 大 小 做 排 列，讓 寶 寶 練 習 依 顏 色、大 小。將 瓶 蓋、瓶 子 做 配 對，培 養 秩 序 性 及 專 注 力。

過 程 中 也 可 以 教 寶 寶，這 瓶 子 是 用 來 裝 牛 奶、豆 漿、果 汁，讓 他 認 識 用 途。寶 寶 在 發 展 過 程 中，媽 咪 只 要 多 引 導，不 要 給 壓 力，他 就 能 按 照 自 己 的 步 調 慢 慢 成 長。

教 養 難 題

「每天哄寶 寶 睡，寶 寶 都 要 摸 或 拉 我 的 耳 朵 才 會 順 利 入 睡，這 到 底 是 什 麼 怪 毛 病 啊？」有 些 寶 寶 確 實 會 有 各 式 各 樣 的 睡 覺 怪 癖，例 如 吸 自 己 手 指。或 摸 媽 媽 頭 髮、大 腿、肚 子 等 等，可 能 和 缺 乏 安 全 感 有 關；或 在 拉 媽 咪 耳 朵 時。讓 他 感 到 舒 服；而 寶 寶 藉 由 吸 手 指 讓 自 己 得 到 安 穩，也 有 可 能 因 為 口 腔 期 未 得 到 滿 足 造 成。

媽 咪 不 要 為 此 感 到 煩 惱，只 要 未 造 成 其 他 人 的 困 擾，或 有 健 康 上 的 疑 慮（例 如 吸 手 指 的 衛 生 問 題），不 一 定 要 阻 止。媽 咪 可 以 跟 他 說：「你 拉 媽 咪 耳 朵，我 會 不 舒 服」，他 可 能 就 會 漸 漸 放 棄。

另 外 要 注 意，睡 前 盡 量 多 陪 伴、多 安 撫 寶 寶。或 白 天 增 加 活 動，讓 他 晚 上 容 易 入 睡。也 可 以 轉 換 他 的 注 意 力，例 如 買 新 的 玩 偶 給 他 抱 著 睡 覺。

遊 戲 玩 具

「寶 寶 搞 破 壞 的 能 力 真 的 越 來 越 強，新 買 的 玩 具 車 沒 兩 下 就 解 體，會 不 會 哪 天 把 家 給 拆 了？」媽 咪 不 要 太 浮 誇，其 實 這 是 寶 寶 精 細 動 作 發 展 中 的 一 個 提 升，應 該 開 心 才 對！這 時 候 不 妨 準 備 拆 裝 玩 具 好 好 鍛 鍊 他，同 時 能 提 升 空 間 智 能 與 手 眼 協 調 能 力。

拆裝玩具對大人或小孩都很有吸引力，媽咪在挑選和玩的過程中要注意幾個事項：

先了解寶寶能力，寶寶快二歲。媽咪卻買一個適合五歲寶寶玩的拆裝玩具，對他而言難度太高。反而沒興趣

注意玩具大小，零件部分盡量選擇比寶寶嘴巴大的，如果有小零件，一定要有大人陪著玩。

可以依寶寶興趣做選擇，例如很愛車子、飛機，那就盡量挑這類組裝玩具。

寶寶現階段可能只會拆解，或組裝一半就不想繼續。媽咪不要強迫，因為拆要比組裝容易。而即使只完成一半，別忘了給寶寶稱讚。

媽咪可以先自己玩一遍，以免寶寶玩到一半有問題，媽咪也不知如何幫忙。

不要因為寶寶組裝的慢或無法組裝出來，媽咪在一旁看不下去乾脆全部幫他完成。

來源：寶寶篇1歲45~46週：親近大自然 促進感官發展

寶寶篇一歲四十五到四十六週：親近大自然 促進感官發展

整體發展

媽咪有時候會覺得只在家中陪寶寶看圖片或繪本，好像缺少實際體驗，那麼就帶他接觸大自然吧！零到三歲寶寶感官發展相當快速，親近大自然能讓抽象圖片與實際經驗做連結，藉由外界大量刺激，讓寶寶各方面發展更有成效。

接觸大自然不但能享受親子同樂，更可以讓五感（視覺、觸覺、聽覺、嗅覺、味覺）得到刺激。多看動植物，不但視覺可以得到刺激。且透過看遠、看近，對視力也有幫助；寶寶的雙手觸碰各種植物、花草。可得到許多知識，也能建立愛護及珍惜大自然的觀念。

無論蟬、鳥、青蛙等叫聲，都會讓寶寶覺得新奇。無形中刺激聽覺，增加感知能力。也使童年生活更豐富；接觸大自然，聞聞花香、果香味道。可增加寶寶嗅覺靈敏度；如果到農場品嚐現採水果、蔬菜，則能夠促進味覺的開發。

幫寶寶洗澡

「我的寶寶很不愛洗澡，每天都要又哄又騙才能好好洗完澡，到底原因出在哪？」有些寶寶真的很排斥洗澡，可能嬰兒期有過不好經驗，例如洗澡時肥皂水進到眼睛、耳朵造成不舒服。有時候也可能是因為這階段寶寶自主性強，洗澡時間正是玩樂時間，讓他產生抗拒所引起。

媽咪可以選擇寶寶心情不錯，大人也很輕鬆的時刻幫他洗澡。最好能先預告，讓他做好心理準備。在過程中，可以唱歌給寶寶聽。或給洗澡書，以增加洗澡樂趣。平時可唸些相關主題的繪本給他聽，讓他知道要當個愛乾淨的寶寶。

遊戲玩具

精細動作是寶寶發展中重要的項目，有些遊戲對精細動作的提升很有幫助。例如串珠，媽咪選擇串珠一定要挑選比較大的。才不會造成寶寶誤吞。玩串珠的過程必須視覺系統及動作系統相互連結才能順利進行，而且要判斷位置的準確性，力氣的使用也要控制好，所以是很適合給這個階段寶寶玩的遊戲喔！

串珠遊戲怎麼玩？媽咪可以這樣做：

剛開始可用粗硬的繩子，也可以選擇鞋帶。再準備洞洞較大的物品，例如大的木珠。先慢慢引導寶寶怎麼玩。

當寶寶已經熟練了，可以讓他自己串。不過要注意繩子另一端要拉好，珠珠才不會掉。這部分媽咪可以從旁協助。

也可以用各種顏色吸管剪短讓寶寶串，或是用空心麵，花點心思取不同材料，還能增加遊戲的樂趣。

自理能力

聽說有孩子誤以為蘋果是從冰箱長出來，也許只是笑話。但是這也告訴我們，寶寶成長中需要多方面接觸增進常識。例如媽咪買菜時可以帶著寶寶，增加一些學習的機會喔！

買菜過程中，可以為寶寶介紹蔬菜、水果、海鮮等等。先找寶寶常吃的，像是小黃瓜、花椰菜、香蕉。讓他摸摸看，假如對其他蔬果很好奇。也可以讓他多認識，並讓寶寶說出這些蔬果摸起來的感覺。購買時使用自備環保袋，以身作則。從小建立環保概念，也可以準備小袋子。讓寶寶幫忙提點小東西。回家再一起清洗蔬果；飯菜擺上桌後，可以問寶寶料理中有幾種蔬菜，整個互動過程是不是很有趣？

飲食營養

每到年節或特殊節日，家中總免不了大魚大肉。而且親友聚在一起，寶寶特別興奮。大人吃什麼都要來一口，長輩也很愛餵這個、餵那個。幾天下來，稍不留意。寶寶很可能吃出問題。

遇到過年過節，媽咪要記住以下重點，才不會讓寶寶在飲食方面出狀況：

避免太油、太甜、太鹹的餐點，年菜很多加工食品也避免給寶寶吃。

禁止給寶寶吃年糕、湯圓等糯米製的應景食品，以免噎到，零食則要避免軟糖、果凍，這些也都很容易噎到。

可以選低糖、低鹽零食，例如米餅、自製南瓜餅。外面賣的一般海苔，鹽份多偏高。也盡量不要。

纖維質不足容易影響排便，年菜如果蔬菜太少，最好自己多準備，才能吃的均衡。

肉要去筋去皮，煮軟切碎再給寶寶吃，海鮮部分可以挑無刺的魚。

來源：寶寶篇1歲47~48週：2歲寶寶貓狗嫌的原因

寶寶篇一歲四十七到四十八週：二歲寶寶貓狗嫌的原因

整體發展

寶寶滿二歲了！又邁入新的里程碑，每天都是精力充沛、活力十足。而且寶寶平衡力、運動能力正在大幅進步中，越來越會跑步。也可以舉起一隻腳踢球喔！媽咪趕快趁好天氣，帶寶寶到戶外好好讓他發揮一下新技能。

這階段的寶寶要多給他不同功能的運動訓練，而且因為正值腦神經迴路發展的黃金期，較多刺激能使腦神經迴路發展更好，其中踢球就是很好的選擇。

帶寶寶到戶外玩踢球，首先要在安全場地進行。媽咪先把球放地上，讓寶寶前進、踢球；或是站在寶寶對面一起玩。過程中寶寶會注意球的動向，並移動腳步。訓練腳的靈活度及反應能力。比較要注意的是避免在大太陽底下或氣溫太高的環境下進行，過程要留意有流汗就要補充水份。

教養難題

「開心幫寶寶慶祝二歲生日，但是為什麼我的腦海中一直想到二歲以後就是進入貓狗都嫌棄的階段，是不是惡夢正要開始？」媽咪別緊張，了解這個階段寶寶的發展狀況，就不會老是有負面想法。

媽咪要知道的重點以及作法：

先了解寶寶正處於建立自我認知及獨立養成的階段，很想擁有獨立自主的機會。但礙於會說的詞彙有限，常常無法用有限的話表達他的想法。所以只要妳問什麼，他就回「不要！」這也不要，那也不要。感覺什麼都愛唱反調，因此才有「二歲孩子貓狗嫌」的說法。其實這是大腦正在加速發展的必經之路。

當寶寶說「不要！」不一定就是不要，或故意跟大人唱反調，有可能只是想回答「一定要嗎？」此時媽咪可以怎麼做呢？例如問寶寶要不要吃飯，他說不要，這時候可以改變問的方式，例如問「要吃飯？還是吃麵？」，讓寶寶做出選擇。

另外也要多陪伴、給寶寶足夠安全感。

生病照護

寶寶咳嗽咳不停，晚上也沒辦法好好睡，真的好心疼！孩子咳嗽是最令媽咪害怕的健康問題，尤其明明感冒好了卻還在咳。咳嗽原因很多，包括病毒、細菌感染、過敏引起、異物吸入、胃食道逆流等，必須就醫檢查找出原因。

寶寶咳嗽期間，媽咪照顧上要注意幾個重點：

如果呼吸道感染是病毒引起，要注意個人衛生，寶寶和主要照顧者都要勤洗手。

若是感冒超過十天以上還在咳嗽，要懷疑鼻竇炎、支氣管發炎、氣喘等原因，必須就醫請醫師診斷。

盡量避開灰塵、塵蟎等易引發過敏的過敏原，維持居家整潔，經常清洗寢具。

咳嗽嚴重到影響到睡眠，必要時由醫師評估給予適當藥物，千萬不可自行買藥給寶寶吃。

喝適量溫開水，並做好保暖，讓喉嚨維持濕潤，以降低咳嗽的頻率。

自理能力

寶寶現在凡事都想自己來，這真是一個適合訓練自理能力的時候。自理能力隨時都能訓練，但要持之以恆、反覆練習。才能使能力更純熟，而且從小建立好習慣。會比較有責任感，將來面對挑戰也比較不會退縮。

寶寶起床後第一件事就是跟著大人一起摺被子，剛開始媽咪可從旁協助。或跟寶寶一起合力摺他的小被子，例如兩人各抓被子兩個角。引導寶寶跟著媽咪做，剛開始可能摺的很零亂。不要因此就放棄，媽咪更不能因為看不慣。乾脆都自己來，這樣只會阻礙他的學習。摺好被子後就跟枕頭放在固定位置，而媽咪也要把自己的被子摺好，床弄整齊，給寶寶最好的示範。

來源：寶寶跌倒了怎麼辦？

寶寶跌倒了怎麼辦？

嬰幼兒童在成長過程中，摔落跌倒是常發生的意外。從會翻

身開始，到爬、站、走路。到跑、跳，隨著孩子日漸長大。摔落跌倒發生的機會只會愈來愈高！當嬰幼童從高處摔落下來，孩子的反應通常是嚎啕大哭，而家長則驚慌的想：需不需要看醫生、做檢查？擔心撞傷了哪裡？撞傷頭部會不會腦內出血？

提醒家長要保持鎮靜，不要驚慌，先檢查您的寶寶

若孩子有意識喪失，或暫時性的昏倒，表示可能有腦震盪的情形，需馬上就醫檢查。

再來檢查寶寶身體，若有傷口。流血，可以用乾淨的紗布或毛巾壓迫止血。並至急診處理傷口。剛撞到時，傷口腫脹屬於急性期階段。此時應冰敷消腫，大部分的瘀青、腫脹會隨著時間漸漸消退。約三至五天後，瘀青應可自然消退。坊間流傳各種消瘀青偏方，如在瘀青處塗抹沙拉油、豬油或是以熱雞蛋、鴨蛋熱敷傷口等。其實這些方法沒有醫學根據，因為油並不具有消腫、退瘀青療效。甚至若有傷口可能因蛋殼上的病菌或抹油而引發傷口感染。

如果骨折，會看到骨折處腫脹。若懷疑寶寶骨折，不要衝動急著抱起嬰幼童。務必馬上打電話叫救護車，由專業救護人員搬運病人盡快送醫。觀察嘔吐症狀，有些孩童撞到頭之後會有輕微的嘔吐。可能是驚嚇或是害怕的緣故；但是若孩子越吐越嚴重，則可能是腦壓上升的跡象。要趕快就醫。

另外，大孩子會自己說「頭痛」，也是一個需要小心的症狀；不可私自給孩子吃止痛藥，除非已經給醫師評估過允許使用。

最後，跌落後兩三天之內。持續觀察有無下列症狀：臉色蒼白、嘔吐、抽筋、意識不清、吃不下、昏睡不醒、活力不佳等情形，若有出現。就表示腦部可能有受傷跡象，必須立即送醫。

如果寶寶都正常，就不用擔心囉

寶寶跌倒撞到頭，父母最難過、自責。好在大部分寶寶都不會受到太嚴重的外傷，提醒家長運用兒童居家安全環境檢視手冊。檢視您的住家環境並及時改善，打造兒童安全成長的居家環境喔

來源：寶寶開始翻身、學坐了！爸媽要注意哪些事&怎麼協助？

寶寶開始翻身、學坐了！爸媽要注意哪些事&怎麼協助？

寶寶從翻身、學坐到開始爬行，每一步都是成長的重要里程碑。這些動作不只是「會了沒」，還關係到肌肉發展與神經協調。面對此階段的孩子，爸媽在日常照顧時該注意什麼細節？又有哪些小遊戲可以促進動作發展呢？

寶寶何時會翻身？

新生兒的成長速度驚人，每天都有新變化。衛生福利部國民健康署出版的《兒童健康手冊》中寫著，大約四至六個月大時，寶寶會開始練習翻身。那個階段的寶寶，身體和雙腳不時扭動。然後某個瞬間，突然從仰臥翻成俯臥。一舉成功！

翻身會使用到的能力有哪些？

寶寶翻身並不是隨意扭動身體和雙腳就能完成，而是一個循序漸進的過程，需要多個部位的肌肉與協調能力。究竟會用到哪些能力呢？

一 抬頭／搭配能力

：手臂支撐

寶寶翻身進入俯臥時，需要抬頭才能撐起上半身。約四個月大時，寶寶的手臂力量就會逐漸穩定。雙手可支撐身體抬高頭部。

二 側躺／搭配能力

：核心肌群

腹部和背部肌肉必須有足夠力量，才能讓身體穩定並協助轉動。當寶寶開始能扭轉身體，從仰躺變側躺時，就代表他的力量已經有一定基礎了。

三 轉頭／搭配能力

：頸部控制

良好的頸部控制是寶寶安全翻身的關鍵，能保護頭部不受傷，也讓翻身動作更順暢。

四 抬腿／搭配能力

：骨盆與下肢協調

當嬰兒在仰躺睡覺時會踢腿、將腳抬高或扭動身子，代表寶寶已經能夠出力，而寶寶翻身時，需要腿部踢動與骨盆轉動來協助身體完成翻轉。

寶寶學翻身，爸媽要注意的事

寶寶開始學翻身時，家長的陪伴和照護很重要。首先，要確保寶寶練習的環境安全。地面平整又不會太硬，周圍不要有尖銳物或硬物。避免翻身時撞到。寶貝練習翻身時，爸媽最好能全程在旁觀察，不要讓他們單獨待在床上或沙發上。

翻身是循序漸進的發展過程，不應催促或強迫寶寶，也不需要過度練習。這段時間，爸媽的耐心陪伴和細心觀察

，比任何方法都更重要，也能讓寶寶安全且快樂地學會翻身。

寶寶不太會翻身，可以進行哪些小運動？

寶寶在剛學習翻身時，動作還不夠熟練。無法馬上運用自如，但父母可以透過適當的引導與練習。幫助寶寶更快掌握這項能力，並促進四肢及頸部的肌肉發展。讓動作更靈活。

雙腳交叉法：將仰躺的寶寶雙腳輕輕交叉，給予一些輔助力量，幫助他完成翻身，讓寶寶熟悉身體轉動。

玩具引誘法：當寶寶採趴姿時，利用他感興趣的玩具吸引注意力，並緩慢移動到身體的一側，誘導寶寶主動轉動身體去觸碰。

被子支撐法：寶寶平躺時，在身體一側的背後放置小被子支撐，幫助身體保持傾斜姿勢，可增加翻轉成功率。

親子示範法：父母可以先親自示範翻身動作，然後引導寶寶模仿。

俯臥時間（）：在寶寶清醒時，讓他們趴在地上或爸媽身上，訓練上肢支撐能力。

寶寶大約多大開始學坐？

當寶寶能夠熟練翻身後，代表核心肌群與四肢肌肉的控制能力已經提升，這也為「學坐」打下了重要基礎。《兒童健康手冊》中寫著，寶寶通常在六個月左右。可以在有靠背的椅子上自己坐起；而到了六到七個月之間，多數寶寶已經能不依靠扶持。穩穩地坐好。

寶寶學坐運用到的能力

寶寶學坐其實是個全身性的發展過程，比起翻身，需要更多的肌群和協調能力一起合作，主要包括以下方面：

一維持上身直立／搭配能力：核心肌群

核心肌群（腹部、背部、腰部）的力量和穩定性，能幫助寶寶撐起上半身，維持坐姿不傾倒。

二頭部直立／搭配能力：頸部與頭部

寶寶需要能穩定抬頭和控制頸部，才能在坐姿中保持頭部直立，方便觀察周圍環境。

三支撐身體／搭配能力：上肢手臂和肩膀的肌肉會被用來支撐身體，特別是在剛學坐時，寶寶常會用手撐地保持平衡。

四穩定坐姿／搭配能力：下肢與骨盆協調平衡與感覺統合

腿部及骨盆的肌肉協調有助於穩定坐姿，也能在需要時調整重心，避免傾倒。同時眼睛、耳朵與前庭覺等感覺系統協作，也能幫助坐姿穩定。

寶寶學坐時，爸爸媽媽應注意的事

在寶寶學坐的過程中，環境的安全與舒適同樣重要。和翻身一樣，建議選擇平坦、無障礙的空間。讓寶寶在安全、舒適的環境中練習，家長也一定要陪在身旁。更注意不要將寶寶放在床鋪或沙發邊緣。

同時提醒爸媽，不要過早強迫寶寶坐起來，應依寶寶的發展階段，提供適度的協助與引導。

寶寶不太會坐起來，要怎麼幫他們？

寶寶剛開始學坐時，可能還無法穩定保持坐姿，父母可以透過一些方式幫助他們順利練習。

提供支撐：利用靠枕或抱枕支撐寶寶，讓他們慢慢適應坐姿。

腹部運動：多安排腹部活動，譬如讓寶寶躺著。然後爸媽可輕拉小胳膊慢慢協助讓寶寶坐起來，這個訓練頭頸部及腹部用力；或者也可以讓寶寶躺著抬腳。鍛鍊核心肌群。

互動遊戲：透過抓取玩具等遊戲，提高手眼協調與肌肉控制能力。

每個寶寶的成長步伐都不盡相同，從翻身、學坐到開始爬行，每一步都是肌肉發展、協調能力與感覺統合慢慢累積的結果。爸媽的耐心陪伴、安全引導，以及適度練習。能幫助寶寶順利掌握動作，也可促進肌肉與神經協調發展。讓寶寶在探索世界的同時更健康、更自信。

來源：寶寶需要喝水嗎

寶寶需要喝水嗎

一般來說，因母乳約九十的成分是水。哺餵母乳的寶寶不需額外喝水；配方奶粉依標示沖泡比例，是水分占八十七。奶粉占十三，可見喝配方奶也喝下許多水分。因此不論是哺餵母乳或是配方奶，只要每日總奶量攝取足夠。就可以獲得足夠的水分，所以不需要額外補充開水。除非寶寶因為發燒或特殊情形，擔心會有脫水的疑慮，則可適時補充水分。

平常的觀念都是多喝水比較好，但是對寶寶來說，其實「適當」喝水比較好。不是絕對不可以喝水，只是真的沒必要，希望寶寶所補充水分的來源是選擇「奶水」而非單純「純水白開水」或「葡萄糖水」。

來源：對抗蚊蟲、高溫！寶寶的夏日照護指南

對抗蚊蟲、高溫！寶寶的夏日照護指南

夏日是育兒家庭最喜歡的季節，可以盡情帶孩子外出進行踏青、戲水游泳等活動。不過夏日蚊蟲特別多，在外頭短短待上一段時間。孩子總是被叮得滿頭包，痛癢難耐。還有逐年攀升的高溫，也讓大人小孩直呼受不了～想要輕鬆度夏。爸媽要如何預防「蚊蟲」及「高溫」對孩子的傷害？

如何判斷孩子是太熱，還是中暑？

大人們都會把嬰幼兒包得緊緊的，擔心他們冷到，但其實孩子除了很怕冷，也很怕熱！這是因為孩子的體溫調節中樞尚未發育成熟，一旦環境溫度高於體溫。身體很難維持恆溫狀態，當體溫上升至三十六到三十七左右。身體難以散熱，孩子就可能出現熱過頭的情況。

那爸媽又該如何觀察，孩子是單純的過熱，還是中暑了？可先查看寶寶的體溫，如果體溫約落在三百七十五到三十八左右。不超過三十九，且沒有伴隨其他感冒症狀。則單純屬於過熱情況，常見於一歲以下的嬰兒。只要脫去寶寶身上多餘的衣物，調整室內溫度。保持涼爽，過熱情況就能緩解。

當寶寶的體溫高於三十九，合併其他症狀。像是脫水、頭痛、劇烈嘔吐，甚至是意識不清、昏厥等。極有可能是中暑，爸媽們務必儘快將寶寶送醫治療。避免造成更嚴重的後果。

四招預防熱傷害

年紀較小的嬰幼兒，除了體溫中樞系統還沒發育完全。再加上體內新陳代謝較快，體表水分蒸發的速度也快。排汗量增加，又沒能補充適量的水分時。就容易因為「熱」傷害到身體，出現不適症狀。別以為只有在戶外才會，空氣不流通的室內，以及密閉的車廂，都是導致孩子熱傷害的常見原因。以下提供爸媽四招預防熱傷害的方法：

一 穿著涼爽：

以長袖、針織纖維較密、透氣材質的衣物為主，不用有過多的包覆，參考大人穿著厚度即可。而不少爸媽會運用帽子來幫孩子遮陽，像是鴨舌帽、棒球帽等類型。因無法確實遮到耳朵及頸部，建議選擇寬邊帽。才能讓遮陽效果更加分。

二 防曬要做足：

提醒爸媽，避免在早上十點至下午二點出門。六個月大以下的孩子，還不適合各種防曬產品。建議運用帽子、衣物、陽傘等物品，並待在陰涼處。確保孩子不會熱過頭，手

推車上也應該要有遮陽罩。六個月大以上的寶寶，則可擦上防曬乳來防曬。

三 水分要足夠：

想要有效消暑，水分的補充非常重要。無論是待在室內或室外，都要適時攝取足夠的水分。但不建議給寶寶市售的含糖飲料，如果是想要喝冰水。也要特別注意適量即可，大量飲用可能會加速血管收縮。孩子可能會出現腹痛、咳嗽等狀況。若要知道孩子的水分攝取是否充足，可以觀察其尿量。新生兒一天約會換六到十次的尿布，一歲以內的孩子。約五到六次。

四 室內溫度不宜過低：

炎炎夏日，人人都想待在冷氣房。但也不是越冷越好，室內最佳的溫度建議調整在二十五到二十八度之間。感覺舒適涼爽即可。如此也能避免孩子一下子從高溫的室外進到低溫的屋內，溫度落差太大。血管突然收縮，血液循環不佳。出現頭暈、打噴嚏等不適症狀。

為何蚊蟲特別喜歡叮咬孩童？

每每到戶外，爸媽們有沒有發現。蚊蟲就是特別喜歡靠近孩子，孩子都被咬得大包小包。大人卻沒事！那是因為蚊子是靠嗅覺在尋找叮咬的對象，一般來說。體溫較高、易流汗、呼出的二氧化碳較多、新陳代謝較快者，較常成為蚊子叮咬的目標。而孩童符合多數條件。

戶外防蚊怎麼做？防蚊液又該怎麼選？

小小的蚊子叮咬傷口，在成人身上。可能一兩天就會痊癒，由於孩子的皮膚較脆弱又嬌嫩。蚊子所噴出的體液，恐會引發更嚴重的過敏反應。爸媽們，防蚊工作一定要做足！

在挑選防蚊液方面，目前核可的安全化學成分有（待乙妥／敵避）、（派卡瑞丁），以及三千五百三十五（伊默克），這三種藥劑皆能有效達到防蚊效果。成人能選用濃度五十%的防蚊藥劑，兩個月大以上的孩童。建議使用濃度為十%~三十%的防蚊產品，並要確實清洗乾淨。兩個月大以下的孩子，則都不適用。建議讓孩子穿著淺色的長衣、長褲、長襪，儘量不要讓皮膚曝露在空氣中。減少被蚊蟲叮咬。而含有（派卡瑞丁）和三千五百三十五（伊默克）的防蚊用品，根據目前的產品許可證，僅適用於二歲以上的孩童。

另外，也提醒爸媽。在使用防蚊液時，應該先噴在成人手上。再塗抹在孩子身上，並避開眼睛、嘴巴周圍。如皮膚有傷口或是其他過敏反應時，就不建議使用。避免加重皮膚問題。

來源：小兒腹瀉及嘔吐的處理

小兒腹瀉及嘔吐的處理

腹瀉對寶寶而言是嚴重的疾病，如果腹瀉帶走體內大量的水份及電解質，就會脫水、電解質不平衡，嚴重的話會危及寶寶生命。因此，適時地補充水份及電解質非常重要！

如果寶寶出現下列情形之一，請儘速帶寶寶就醫：

食慾不振

非常口渴

在一到二小時內就解了數次水樣便，換了數次尿布

換下來的尿布帶血

不尋常地躁動不安

頻繁嘔吐

眼窩或是前囟門凹陷以及口乾

發燒

持續腹瀉超過二十四小時

注意！寶寶腹瀉時請務必這樣做

在腹瀉症狀一開始，就必須給予足夠的水份，來補充流失的水份；先給予清淡的食物，等到狀況穩定下來再給予營養的食物。

母乳寶寶，請增加母乳哺餵次數；若是以配方奶哺餵的寶寶，可如同往常給予補充液體，例如：煮沸過且已快速冷卻的水。

除非有醫師的建議，否則小兒腹瀉時萬萬不可自行投予任何藥物。

只要寶寶因為拉肚子而更換尿布，就替寶寶補充水分，可使用奶瓶、杯子或湯匙等工具給予。

假如寶寶嘔吐，請勿馬上餵食，需等候十分鐘再替寶寶潤濕嘴唇。補充額外的水份，需持續至止瀉，期間通常是三到五天。

請勿給寶寶飲用含糖飲料，例如果汁或碳酸飲料（包含檸檬水），因為這些飲料可能會使寶寶的腹瀉情形變得更嚴重。

六個月以上的寶寶腹瀉時，仍可以給予食物，因為食物可以減緩腹瀉情形，並增強寶寶體力。

腹瀉的預防

餵哺母乳，母乳是無菌且安全無虞的。

烹調食物至滾熱，保存食物時器皿要保持清潔且加蓋，並冷藏保存。

每個人如廁後及接觸寶寶前都必須先洗手，換尿布後也必須清潔雙手。

如果寶寶使用配方奶，沖泡前須以肥皂與清水充分清洗雙手。建議以煮準後的開水在攝氏七十度左右沖泡，然後放置或冷卻至適當溫度後再餵食。並於降溫後儘快食用，以避免放置過久滋生細菌。

詢問您的醫師關於奶瓶及奶嘴消毒方式的建議，所有用來泡奶粉的器具都必須保持清潔，哺餵的器具必須洗淨消毒（包含母乳哺餵的任何器具），奶瓶及奶嘴外的器具每使用三個月就須徹底清潔及沖洗一次。

來源：小寶寶為什麼無法睡過夜？

小寶寶為什麼無法睡過夜？

很多爸媽對於寶寶的睡眠問題感到困擾，尤其是零到三個月新生兒時期。寶寶幾乎是睡睡醒醒，沒有固定的生理節奏。影響照護者夜間作息及睡眠時間。

請不要急於訓練小寶寶睡過夜

有些爸媽看到他人分享寶寶滿月後就能睡過夜的文章，造成不少焦慮感，會想著為什麼我的寶寶已經三、四個月大，甚至八、九個月都還無法睡過夜。

基本上寶寶出生的前三個月，請不要急於訓練他自行入睡或是睡過夜。這個時期的小寶寶，本來就是吃、睡、醒。爸媽只需要好好建立哺乳模式，並增加寶寶的安全感即可。等三到六個月後才考慮調整寶寶的睡眠習慣，慢慢拉長寶寶夜晚睡眠的時間。

睡眠問題沒有標準答案

每個寶寶都有自己的先天氣質，以及依附感需求程度。有些寶寶只要躺在熟悉小床很容易就能自行入睡，有些寶寶則要用經過很多程序才能睡著。

請爸媽放寬心，多觀察寶寶的喜好。為寶寶準備一個舒適、安全的睡眠環境，隨著月齡增長。寶寶夜晚睡眠時間就會逐漸拉長。

來源：小寶貝什麼情況下不能接種疫苗

小寶貝什麼情況下不能接種疫苗

常見父母因幼兒的小病不斷，而一再延遲疫苗接種。其實一般除發高燒及染患急性疾病，考量接種疫苗後的反應可能會影響病情的判斷不要接種外。如感冒已進入恢復期僅剩流鼻水等症狀，是可以接種的。如父母仍不放心，可提供寶寶健康或治療服藥狀況。接種前由醫師進行評估。而先前接種該項疫苗曾發生嚴重反應或未經治療的結核病患，亦列為接種禁忌。

此外，活性減毒疫苗（包括麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗、水痘疫苗、活性減毒日本腦炎疫苗）有下列禁忌與注意事項：

一 先天或後天免疫不全者或正接受免疫抑制劑治療者，使用十四天高劑量全身性皮質類固醇（服用類固醇者，請與醫師討論是否適合接種疫苗）。

二 染患嚴重疾病、感染人類免疫缺乏病毒、接受化學治療或營養不良致免疫力低下者。

三 接受血液製劑後與活性減毒疫苗應注意下列接種間隔：

- 一般肌肉注射免疫球蛋白或型肝炎免疫球蛋白，應間隔三個月。
- 輸過血或接受靜脈血液製品者，應間隔六個月（無須間隔）。麻疹個案接觸者，如施打預防性肌肉注射免疫球蛋白，則應間隔六個月以上再接種。
- 靜脈注射高劑量（一）免疫球蛋白，應間隔十一個月。

幼兒如有接受呼吸道融合病毒預防性單株抗體（），與各項疫苗無須間隔。

四 接種卡介苗尚有下列禁忌：對疫苗任何成分曾發生嚴重過敏反應者、嚴重濕疹與其他有明顯皮膚缺損的皮膚患者、免疫功能不全者、人類免疫缺乏病毒愛滋病毒感染者，無論是否有症狀。另，如有下列情況，應特別注意：

- 疑似結核病人及疑似被結核菌感染者，勿直接接種卡介苗。
- 發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。
- 麻疹及水痘感染，宜待復原期六週後再接種。
- 請父母確認父母雙方家人沒有疑似先天性免疫不全疾病之家族史，例如幼年因嚴重感染死亡。
- 母親為人類免疫缺乏病毒愛滋病毒感染者，其嬰幼兒應待追蹤至排除感染再接種卡介苗。

- 提早接種的嬰兒，體重應達二千五百公克以上。

- 接種後可能的不良反應：常見但不嚴重的不良反應：局部膿瘍、淋巴結炎等。不常見但嚴重的不良反應：骨炎骨髓炎、瀰漫性卡介苗感染等發生於嚴重先天性免疫缺損的嬰幼兒。

- 骨炎骨髓炎通常在施打卡介苗後數月至一年多後發生症狀，四肢骨受侵犯為主，可能導致局部腫脹、疼痛、跛行。懷疑時請尋求兒童感染科醫師診治。

- 嬰幼兒若有結核病接觸史，請先前往地方衛生主管機關或兒科進行潛伏結核感染評估與治療。

- 請盡量不要讓寶寶接觸可能的結核病患者如避免咳嗽中的親友來訪或照顧寶寶等。

來源：常見的嬰兒健康問題及處理方法

常見的嬰兒健康問題及處理方法

產後頭一年，也就是寶寶一歲以前。通常是照顧者最辛苦的一段時光，生活作息會改變。必須全然依賴著大人生存的嬰兒也是個最甜蜜卻又疲憊的負擔。

爸爸媽媽最擔心的是寶寶是否不健康，是否生病需要就醫，我們來介紹一下常見的嬰兒健康問題。

不明原因哭鬧-腸絞痛

腸絞痛是甚麼

嬰幼兒在三個月前很容易莫名其妙的哭鬧安撫不下來，造成新手爸媽的心理負擔和苦惱。如果排除掉生病發燒，不明原因的哭鬧就會被稱為是腸絞痛，其實腸絞痛是一種良性自限性疾病，會隨著時間的推移而緩解。家人怎麼看待哭鬧腸絞痛這件事，會影響到他們對孩子和醫療系統的互動。

照護方法

一安撫爸媽，了解這只是過渡重要

誠如上述，這段時間本來就是嬰兒哭泣高峰期，我們要確保孩子並沒有發燒或吐或是拉，那多嘗試安撫的技巧。鼓勵照顧者互相接手，獲得適當的休息，爸爸媽媽好，整個家庭才會好

二瓶餵的寶寶母乳或配方奶請使用”嬰兒主導瓶餵技巧”奶瓶盡量水平地面，並且分段餵食，可避免過度餵食。親餵的寶寶，媽媽試著調整親餵姿勢建議生物哺育法。並且找尋泌乳顧問的協助，是否有奶量過多。或是噴乳反射

太強的問題

三 安撫寶寶技巧

美國兒科醫師哈維卡普提出的五安撫法來提供寶寶安全感：

：以包巾將寶寶包覆，營造寶寶在媽媽子宮裡的感受，同時減少反射作用，讓寶寶睡得更安穩。

／：讓寶寶側臥或趴臥於爸媽手臂上。

：提供寶寶安撫奶嘴，讓寶寶透過吸吮得到安撫。

：抱著寶寶輕輕地搖、晃動，提醒爸媽，晃動幅度小，別過於劇烈。

：白噪音，比如吹風機。抽油煙機的聲音，好比在以宮內血流轟隆聲。寶寶會安靜下來。

補充：

有關包巾之使用，美國兒科醫學會表示。將嬰兒裹在包巾睡覺時，需讓寶寶仰躺在堅固平坦的表面上睡覺。並應觀察及確保寶寶在包巾中不會翻身，且應避免孩子趴著。以降低嬰兒猝死症和意外窒息之風險。另外，使用包巾時應確保寶寶的臀部可以移動且不會太緊，包裹得太緊的嬰兒可能會出現臀部問題，例如導致髖關節脫位或髖關節發育不良。

嬰兒大便稀且多

嬰兒腹瀉定義

腹瀉的定義為一天糞便量超過二十，這其實日常很難測量。通常我們會看是否有糞便性狀改變、頻率增加比如一天六到七次以上，量都比較多且偏水。或是帶有黏液或是血絲。

不過必須要注意的是，一般來說，在頭兩個月純哺乳寶寶大便次數比純配方奶餵食寶寶大便次數多。這是因為母乳中有很多成分及特性可以協助寶寶腸胃蠕動及消化吸收，比如含有低聚糖這種可溶性纖維素。具有「輕瀉」的特色，且母乳寶寶的腸道菌相以雙歧桿菌為多。所以母乳便多屬稀糊，帶有顆粒或酸味。甚至一吃就解，次數也偏多一天至少三到四次。都屬於正常現象。

照護方法

母乳寶寶大便多次多所正常，但如果已經太多次比如一天六到七次以上。量都比較多且偏水，如果是親餵的媽媽。會建議同一邊的乳房哺餵到寶寶鬆口為止，再換邊餵。才可以吃到脂肪量較多的奶水。

另外也可以注意媽媽的飲食，如果發現媽媽有食用奶製品。而寶寶開始有腹瀉、血絲或是嘔吐、皮膚發疹等現象，通常先暫停奶類攝取。待寶寶症狀緩解兩週後再少量嘗試加回。

發燒

發燒定義及注意事項

中心體溫三十八定義為發燒，而肛溫最接近中心體溫。大於三個月耳溫與肛溫類似，其實以方便性來說。以耳溫測量即可。但小於三個月的寶寶，耳溫不準。所以可量肛溫或腋溫，腋溫平均測量值低於中心體溫約八。若大於三百七十二即是發燒。不適於以肛溫與耳溫量體溫的新生兒，可考慮以此法測量體溫。

照護方法

爸媽除了隨時監測寶寶體溫（體溫超過三十八為發燒），建議可使用溫水坐浴。以溫水擦拭寶寶身體，若仍溫度仍居高不下。再讓寶寶吃退燒藥來緩解不適感，同時可觀察寶寶的精神活動力。以及是否還有其他症狀發生，例如：出現呼吸喘鳴聲、小便發出臭味等。當寶寶發燒超過三天或精神活動力不佳時，都建議就醫尋求診治。

必須要提醒的是，小於三個月的嬰兒若是發燒。因為免疫力較差的關係，必須要詳細的檢查抽血或是驗尿。要送到醫院或是急診就醫，不用再花時間帶去診所。

寶寶呼吸急促、咳嗽-細支氣管炎

照護方法

寶寶若已出現呼吸喘、急促症狀就得立刻就醫，通常醫院會收治住院。給予點滴並提供支氣管擴張劑的蒸氣治療，幫助改善症狀、減少寶寶住院天數。另外醫護人員也會教導爸媽協助寶寶拍痰；若醫師評估後，認為寶寶症狀較不嚴重。無須住院治療，則會交由爸媽帶回家照顧、持續觀察症狀、留意其精神活動力。並吃藥、進行拍痰，若家中有三合一的蒸氣瓶。也可以食鹽水或一般的水蒸氣讓寶寶吸，以減緩症狀。

來源：常見的高危險妊娠

常見的高危險妊娠

常見的高危險妊娠

認識孕期可能發生的併發症，在面對突發狀況時，與醫師討論做正確的準備與處理。

早產：出生越早，通常面臨問題較多

當寶寶在滿二十週未滿三十七週誕生，稱之為「早產」。

早產不是誰的錯，有五十的早產查不出原因。

早產徵兆要注意：子宮收縮、破水、陰道出血，發生上述情況應儘快就醫。

被醫師告知要安胎，孕媽咪別緊張，適度的安胎有益於寶寶的健康，是否持續安胎請與醫師討論。

瞭解更多早產及安胎相關資訊，請詳閱孕媽咪衛教手冊第五十頁「早產不是誰的錯」。

延伸閱讀：財團法人台灣早產兒基金會

延伸閱讀：【醫事司】「急救責任醫院」分

區名單

妊娠高血壓：血壓出現異常，勿掉以輕心！

可能影響胎盤血液提供，導致寶寶營養不足、早產或出生時體重較輕。

嚴重的子癲前症可能導致孕產婦腦出血、肺水腫、呼吸窘迫、腎功能衰竭、凝血功能異常、胎盤早期剝離……等風險增加。

平時注意血壓及胎動變化，避免產生壓力，同時配合醫囑和門診追蹤。

飲食方面注意飲食輸出入量、採高蛋白飲食、適當控制鹽分攝取。

靜脈及肺栓塞：孕產婦為血栓高危險群！

生理變化的影響之下，孕產婦血栓的機會比一般人高出八到十倍。

懷孕期間避免長期坐臥，產後盡早下床活動。

高風險患者宜穿著彈性襪，減少血栓形成的風險。

有靜脈血栓病史、血栓性疾病的孕媽咪，應該主動告知醫師，事前給予預防性抗凝血劑。

妊娠糖尿病：對媽咪和寶寶的健康構成威脅

第一種為懷孕前就已經知道是糖尿病患者。第二種是妊娠期間首度出現糖尿病明顯症狀者，或經「葡萄糖耐受試驗」判定為異常者。

會增加巨嬰、新生兒低血糖、新生兒黃疸、肩難產的風險

。提高剖腹產機率，多年後有半數的婦女會罹患第二型糖尿病。

建議孕媽咪與營養師共同協商飲食計畫，養成均衡的飲食習慣。

以每週運動一百五十分鐘為目標，培養固定運動的習慣。通常經由飲食及運動的調整就能維持血糖值在正常範圍。

*產前如確診為妊娠糖尿病，請於產後四至十二週回診，進行七十五克口服葡萄糖耐量試驗。

延伸閱讀：【孕產婦關懷網站】特殊孕媽咪飲食指引

癲癇：記得不要停藥喔！

大多數女性癲癇患者在懷孕期間痙攣的控制都可維持穩定不變。

懷孕期間要規律服用藥物，千萬不可自行停藥或減藥。

部分抗癲癇藥物會降低血中維生素的濃度，接近生產時請補充維生素。

氣喘：持續控制，減少症狀發生

避免過敏原（例如：二手菸、灰塵、動物毛屑等）是首要原則。

如果原本就有服用氣喘藥物，請和醫師討論懷孕期的用藥方式與劑量。

周產期憂鬱：正視問題，尋求協助

感覺心情鬱悶、無助無望、缺乏興趣與動力？甚至出現想不開、自殺或傷害嬰兒的念頭？

從懷孕到產後一年間出現比較嚴重的憂鬱症狀，醫學上稱為周產期憂鬱。

如出現上述症狀，不只是一般的情緒反應，是「生病」了，一定要尋求專業協助。

來源：常見避孕方式

常見避孕方式

如果爸爸媽媽還沒有準備好生育下一胎，那麼可以參考下列方式進行避孕。如果夫妻雙方已達共識決定不再生育，也可以考慮結紮方式，達到永久避孕。

提醒爸媽，哺乳期間同樣有懷孕的可能性。即使生理期尚未來報到，但可能已恢復排卵功能。所以，還是要做好完

善的避孕措施。

失敗率指使用此避孕方式一年，但仍然懷孕的機率。可能因個人體質或使用方式而不同，請諮詢您的醫師，選擇最適合的避孕方式。

不再生育時可進行男性或女性結紮手術

男性

將兩條輸精管結紮後切斷，使精子不能通過。手術簡單，不需住院。

男性結紮後，術後三個月需進行精液檢驗，確定精液內不含精蟲，才能確保有效避孕。未確認前仍需採取其他避孕方式。

女性

將兩條輸卵管結紮後切斷，使卵子不能通過。女性結紮手術相較男性結紮手術風險較高（需麻醉，且術後有三到七%發生子宮外孕的機率）。

來源：幸福的律動－胎動簡介

幸福的律動－胎動簡介

胎動是準媽媽感受到新生命的重要線索。隨著肚子裡寶寶的成長，寶寶開始會在媽媽子宮內伸伸手、踢踢腿，胎動會越來越明顯，頻率也會越來越密。初次懷孕的新手媽媽大約在十八到二十週以後會感覺到胎動，但是每個媽媽的身體狀況與感受力不一樣。懷孕初期的胎動，有些媽媽覺得像是腸胃蠕動。有些媽媽覺得像是肚皮抽筋，也有些媽媽較晚才會感覺到胎動。媽媽如果有任何疑問或是覺得不舒適，應與您的婦產科醫師進行諮詢，不要太過緊張。

胎動頻率在三十四週左右達到高峰

肚子裡寶寶的發育到二十八週後已經較為成熟，準媽媽會比較明顯感覺到寶寶在肚子裡拳打腳踢，胎動不只是寶寶生命力的表現，也可以藉由胎動的觀察來瞭解寶寶的發育與健康狀況。寶寶胎動的頻率隨著懷孕週數越來越頻繁，大約在三十四週左右達到高峰；三十六週之後因為寶寶越來越大、子宮裡的空間越來越小，所以寶寶的胎動情況會減緩。

準媽媽胎動自我監測方式

準媽媽可以自我進行胎動的監測，利用早、中、晚三個時段。飯後進行一個小時的胎動觀察記錄，如果一小時內測到三次以上的胎動代表寶寶情況良好。胎動能達十次以上更佳。如果是多處同時間的胎動只能算一次，需等到完全靜止後再進行計數。

胎動頻率異常

如果一個小時內胎動的次數少於三次，媽媽也不要過度緊張，胎兒有約二小時的睡眠週期。胎兒睡覺時間並不固定，如果暫時量不到胎動，可以進食或攝取飲料後再測。一般而言，夜間九點至凌晨一點是胎動的高峰期。如果在十二小時內都量不到胎動，或是當天胎動的情形。比平常大幅減少，建議媽媽可以與您的婦產科醫師聯絡。很多時候媽媽覺得胎動不正常，經醫師診斷後是正常。所以媽媽先不要緊張，醫師會以胎心監測器或者超音波的方式。確定寶寶的生命跡象。

來源：幼兒2歲 第10週：給孩子喝牛奶補充營養

幼兒二歲第十週：給孩子喝牛奶補充營養

教養難題

孩子動不動就發脾氣或是一不如意就哭鬧，讓父母傷透腦筋嗎？其實，二歲左右的孩子習慣以自我為中心。尤其集寵愛於一身的獨生子女，平時所有大人都以孩子為主角。凡事滿足他、順著他，久了孩子只要覺得不順心就生氣或哭鬧。

除了家人要慢慢改變對待孩子的態度外，當孩子失控哭鬧的當下。爸媽可以採取冷處理，不要硬碰硬。大聲責罵他或是不准他哭，而是冷靜告訴他。我們先到旁邊哭或是帶他暫時離開現場，等孩子冷靜下來。再教導他用說的方式來表達想法，孩子才會知道下次怎麼因應。並在適當時機給予安慰，而不是一哭鬧就立即安慰，以免孩子產生錯誤連結，以為就算做錯事只要哭鬧也可以獲得安慰原諒。

遊戲及玩具

對於孩子來說，好玩的玩具不一定是最貴的，有時候一個搖控器、一條繩子都會讓孩子玩得很開心！例如常見的紙箱就是很受孩子喜歡的免費玩具。

現在大家很常網路購物，家中或是商店隨手就能取得紙箱。如果是小一點的紙箱，媽媽可以穿一個洞綁上粗繩子。讓孩子當成拖車，放進娃娃在家中拖著走；如果是大一點的紙箱可以做成孩子的秘密小屋。幫他開個窗戶，一起畫上有趣的圖案。讓他藏在裡頭玩耍。等玩壞了再更換新的紙箱，就又有新玩具了。

飲食營養

二歲後的孩子還是要養成天天喝牛奶的習慣喔！不過牛奶是點心不是主食喔，不管是成長奶粉或鮮奶都可以。因為牛奶可幫助孩子補充鈣質、蛋白質等營養，如果還是習慣用奶瓶喝奶的孩子要戒掉奶瓶。改用學習杯或是一

般的杯子。

因為嬰幼兒容易缺乏鐵質，建議讓孩子多補充含鐵豐富的食物，例如：紅肉、魚肉、深綠色葉菜、蛋黃等。另外，維生素也可以促進鐵質吸收，每天也要讓孩子吃到水果。

預防接種

孩子出生滿二十七個月二歲三個月大時（與第一劑間隔一年）要準備接種日本腦炎疫苗第二劑。注射後可能發生的不良反應及因應方式為，注射部位疼痛、紅、腫；少數於接種後三到七天可能出現輕微或中度全身無力、肌痛、易怒、食慾不振、發燒、頭痛等症狀，會在數天內恢復。至於嚴重過敏、昏睡或痙攣等症狀則極為罕見，請不用擔心。如有特殊狀況或不舒服，請帶孩子就醫處。

來源：幼兒2歲 第12週：2歲半左右長完20顆乳牙

幼兒二歲第十二週：二歲半左右長完二十顆乳牙

教養難題

有些孩子到了二歲多還是非常黏人，只要媽媽離開一會。馬上哭得呼天搶地，這是因為分離焦慮的影響。每個孩子個性不同，有些孩子只要有人陪著就好。有些孩子則是非媽媽不可（或是固定照顧者）。

要改善孩子的分離焦慮，平常要安排練習的機會。例如告訴他媽媽要離開一會，請其他家人陪伴他。讓孩子有機會練習和其他人相處；或是讓他在客廳玩玩具，媽媽到廚房去做事。讓孩子習慣不一定眼前隨時都要有人出現。

而平時要讓他有足夠的安全感，讓他了解媽媽只是暫時離開，等下或是半天就會再回來。有事離開時要先告訴他，不要突然不告而別，或是用「你不聽話，媽媽就不要你」的方式來恐嚇孩子。

生病照護

乳牙健康可是會影響將來恆牙的發展，通常孩子二歲半左右會長完二十顆乳牙，上排十顆、下排十顆。如果有出現蛀牙問題，一定要及早處理。而且每隔半年要帶孩子定期看牙醫及塗氟，最好養成定期有看牙醫的習慣。不要等到牙痛才找醫師，這樣反而會讓孩子更排斥看牙醫喔！平時餐後及睡前記得使用含氟牙膏，幫孩子潔牙，兩顆牙齒的鄰接面，需使用牙線棒清潔。

自理能力

二歲的孩子已經有獨排在馬桶內的能力，所以白天可以嘗試開始戒尿布，發展出自行如廁的能力。家長應採循序漸進的訓練方式，只要孩子表現好就稱讚他，如果失敗不要嚴厲責罵他。

一 幫孩子準備小馬桶或是安裝兒童便座。可以帶孩子自己去挑選喜歡的樣式。

二 改穿學習褲，讓孩子白天漸進脫離尿布。

三 白天間隔適當的時間就帶孩子如廁，並鼓勵他如果想尿尿或便便要告訴大人。

四 只要孩子成功在馬桶上尿尿或便便就稱讚他或給予獎勵。

五 爸媽也可以示範如廁，讓孩子了解因為長大了，可以像大人一樣如廁。

預防接種

出生滿二十七個月二歲三個月大時，且與第一劑間隔一年，要準備帶孩子接種活性減毒的日本腦炎疫苗第二劑囉。接種後注射部位可能會有疼痛、紅腫現象或輕微發燒，幾天後就會改善。

來源：幼兒2歲 第14週：啊！孩子一生氣就開口咬人！

幼兒二歲第十四週：啊！孩子一生氣就開口咬人！

整體發展

二到三歲的孩子在認知發展上，普遍具有以下能力，包括可以正確指出至少六個身體部位，例如：頭、手、腳、眼、耳、鼻、嘴等。了解家中常見物品的名稱，例如電視、電話、垃圾桶等。

爸媽可以利用洗澡時間，一邊洗澡一邊向孩子介紹身體各個部位的名稱，也可以當成遊戲來考考孩子。平時可以請孩子協助做一些家事，例如關電視、丟垃圾，讓孩子更了解家中物品的名稱。

教養難題

二、三歲的孩子有時候一生氣會開口咬人，尤其是搶玩具時，搶不贏對方就開口咬人，讓父母很傷腦筋。這是因為孩子還沒辦法很好的控制情緒，語言能力也還不足，當無法滿足需求時，可能會選擇用咬人的方式來攻擊。

只要一看見孩子咬人，爸媽要馬上制止。然後堅定告訴他，不可以咬人。並讓他知道咬人會讓別人受傷或疼痛，請他向對方道歉。並告知他嘴巴是用來吃飯、說話，不是用來咬人的。可看狀況給予一些處罰，例如暫時不能玩這個玩具。或讓他離開現場去做爸媽要求的事情。

生病照護

中耳炎是幼兒很常發生的疾病，通常是感冒後出現的併發症。大一點的孩子可能會說自己耳朵痛、而比較小的兒童會用手去拉耳朵、煩躁哭鬧的現象。

如果確認是中耳炎，要依照醫師的指示服用抗生素治療。不可以自行停藥，才不會造成治療不完全。或產生抗藥性。另外，急性中耳炎可能會影響聽力，所以，要有耐心治療才能避免復發。

遊戲及玩具

二歲多的孩子適合為他準備顏色幾何配對積木或是彩色積木。幾何配對可以訓練孩子快速認識各種形狀及顏色，而彩色積木可以讓孩子發揮創意，堆疊他想像的畫面或物品。

這個階段主要還是以辨識、配對為主，訓練孩子對於顏色及形狀的認識。以及手眼協調性，另外。孩子大約可將四塊左右的積木排成火車狀或是堆疊起來，爸媽也可以讓他多練習。

來源：幼兒2歲 第16週：2~3歲可接受一次預防保健康檢查

幼兒二歲第十六週：二到三歲可接受一次預防保健康檢查

教養難題

爸媽是不是會覺得孩子一個人好像有點孤單，特別帶他去和朋友的孩子玩耍，可是卻發現孩子不會或是感覺不想和別人玩。其實二歲初的孩子，多半還不太懂得如何和別人一起玩。遇上比較大的孩子想邀他一起玩，他也可能只會看著別人玩。或是最後還是自己玩自己的。

家長不用太心急，因為這個階段的孩子屬於平行遊戲的階段（坐在一起。但你玩你的，我玩我的）。不太能理解團體遊戲的規則及指令，也不太知道與別人互動的技巧。他們可能會對觀察別人感興趣，但要再長大一些才能成為好的玩伴。

自理能力

二歲多的孩子已經有自己吃飯的自理能力，如果媽媽或家人還是習慣動手餵飯，要多讓孩子練習自己吃飯囉！因為能夠自己吃飯，不只是訓練自理能力，對於將來的手眼協調、握筆技巧、與認知學習也有幫助。

一準備適合孩子的湯匙、叉子和碗盤，如果怕不小心就打翻，可以找有吸盤設計的兒童餐盤。

二可幫孩子先將食物剪切成適合的大小，一開始不要裝太多食物，可以讓孩子比較快速自己吃完飯，會讓他更有成就感。

三準備好圍兜、地上可鋪報紙或塑膠地墊，食物難免會灑出來，媽媽要接受這是必經的過程。

四平常也可以用扮家家酒的方式，讓他用碗及湯匙去練習裝玩具或積木，可增加手的穩定度。

五孩子表現好的時候，也別忘了稱讚他喔。

健康檢查

孩子在二到三歲內可接受第六次的預防保健檢查，檢查項目包括：身體診察（身高、體重、營養狀態、一般檢查、眼睛檢查、心雜音、口腔檢查）、發展診察（會跑、脫鞋、拿筆亂畫、說出身體部位名稱）。請爸媽們可以安排適當的時間帶孩子去檢查，提醒爸媽們檢查前先填寫兒童健康手冊家長紀錄事項。如有任何育兒困擾也建議記錄下來，健檢時詢問醫師。

來源：幼兒2歲 第18週：不喝夜奶 讓孩子一覺到天明

幼兒二歲第十八週：不喝夜奶讓孩子一覺到天明

整體發展

睡得好、睡得夠，才能讓寶貝長得好。二歲多的孩子一天的總睡眠時間約十一到十四小時，晚上可以連續睡十到十二小時，白天需要再小睡一到二小時。

通常二歲多的孩子，如果沒有特殊狀況。例如感冒、過敏，可以一覺到天明。也不需要再喝夜奶，如果孩子還是有喝夜奶的習慣。可以採用以下方式來戒除。

教養難題

不喝夜奶的好處是孩子可以一覺到天明，連爸媽也可以睡得比較好，而且夜奶比較容易讓口腔滋生細菌，增加蛀牙的機會。

一此時孩子已經比較大可以溝通，白天經常告訴他半夜不用再起來喝奶了。

二睡前可以讓他再喝一次奶或吃一些小點心，並提醒他半夜要好好睡覺喔。

三如果半夜醒來可以先安撫或只讓孩子喝一點水，盡量不要再餵奶。

四睡眠環境要保持舒適涼爽，也能避免孩子因為太熱而中途醒來。

自理能力

二歲多的孩子已經有能力將一個杯子裡的水倒到另一個杯子，不會弄倒，同時也有能力用雙手握著杯子喝水，不會灑得全身濕。

手端杯子要有足夠的手臂穩定度及本體覺回饋，所以。媽媽平時可以讓孩子自己練習喝水，一開始杯子裡的水不要裝太滿。另外，也可以準備有握把的兒童杯。經常練習孩子就會拿得很穩。

飲食營養

孩子在正餐外可能會需要吃一些小點心，不過。糖份高的飲料、糖果、餅乾、炸薯條等並不是理想的點心食物，建議媽媽可以準備牛奶、豆漿、水果、水煮玉米、紅豆湯、三明治、烤地瓜、豆花、蒸蛋、蘇打餅乾等。比較有營養的食物來做為孩子的點心。

來源：幼兒2歲 第20週：孩子喜歡看書、聽故事

幼兒二歲第二十週：孩子喜歡看書、聽故事

教養難題

爸爸媽媽有沒有遇過，帶孩子出去玩。玩到完全不肯回家，尤其是去公園或是有同伴一起玩耍的地方。最後硬抓回家的結果就是一路狂哭！

這個階段的孩子特別喜歡去公園溜滑梯、玩水玩沙、去親子遊樂園，玩到欲罷不能是很常見的事。建議爸媽出門前先和孩子約法三章，例如玩到天快黑、該吃飯了就要回家。如果孩子不答應就不帶他出門，如果可以遵守約定。下次就再帶他來玩。

當遊戲或活動即將結束前十分鐘就先提醒他，雖然孩子還不知道十分鐘是多久，但要讓他知道再玩一會就要結束了。媽媽可以開始打包帶來的物品，時間快到時就站起來讓孩子知道該回去了。最後可以請孩子和其他小朋友說再見或是和「溜滑梯」說再見，建立準備回家的儀式感。孩子會更能夠接受該回家的約定。

遊戲及玩具

二歲多的孩子對於看書、聽故事會很感興趣，有時候他們會對某些故事特別喜歡。於是拿同一本故事書要媽媽反覆的說，媽媽除了每一次可以稍微加入不同的內容。也可以試著要求孩子接續故事。

可以依照孩子的喜好，多準備一些適合他的故事書或繪本。不過，這個階段的孩子動作有時會比較粗魯。可能不小心就會撕破書，媽媽可以和他一起把書修補好。並教他要愛惜書本。

自理能力

二歲的孩子已經有能力幫忙擦桌子，一開始可能擦得不太乾淨或是也可能有孩子堅持要擦得非常乾淨，只要孩子願意做，都可以給予鼓勵。

先為孩子準備一條抹布或是濕紙巾，然後讓他擦身高合適的矮桌子。例如玩具桌，孩子一開始大多是手拿著抹布。身體前後移動，在桌上做出上下擦拭的動作。這時可以教導孩子從左邊的桌緣開始擦起，再慢慢移向右邊。當整個桌面都擦拭過，再檢查看看有沒有髒髒的地方沒有擦乾淨。若遇到桌上有垃圾，例如紙屑、餅乾屑。就可以先教他丟到垃圾桶，若桌上有其他物品。也可以教導整理放在一個區塊，讓桌子出現完整桌面後。再進行擦拭。

飲食營養

為二到三歲的幼兒料理時要控制調味料的量，不要用大人的口味來添加。尤其要控制鹽分的添加，一至三歲建議每天不宜超過八百毫克的鈉。相當於二公克的鹽，所以。加工或醃製食物最好少吃。會建議爸媽多選天然、新鮮的香料來提升食物的味道，例如薑、蒜、蔥、洋蔥、檸檬、醋等，或是可利用新鮮蔬果製成芡汁或將有酸甜味的水果直接入菜。也可以利用天然食物熬煮出高湯再進行料理，避免讓孩子從小就吃「重鹹」。

來源：幼兒2歲 第22週：搶玩具紛爭又來了

幼兒二歲第二十二週：搶玩具紛爭又來了

整體發展

二歲多的孩子會有各種情緒變化，例如開心時會唱歌、手舞足蹈；生氣時會大哭、嘟嘴抗議。孩子對於某些人或物品喜好明顯，只要經常和孩子相處就會了解孩子的特定喜好。

這個階段的孩子有時情緒起伏大，前一刻還玩得好好的。一會就因為玩具操作不順心而生氣，孩子情緒控管不是很好。他需要再長大一些，才能學會理性面對問題。請媽媽多一些耐心等孩子長大。

教養難題

明明手上已經有玩具了，可是看旁邊小朋友好像玩得很高興，就想去搶別人的玩具，這個場景爸媽應該不陌生！孩子常會看上別的小朋友（或手足）的東西或是明明一開始都沒有人要玩某個玩具，結果其中一個去玩，另一個也非要來搶。

這個時候要和孩子溝通玩具所有權，讓孩子知道別人的東西要先詢問能不能借來玩。不可以直接去搶，如果他人同意了才可以玩。如果旁邊的孩子是完全陌生的小孩，那麼直接就告訴他。不可以隨意拿別人的東西。

如果是認識的兩個孩子（或手足）搶同一個玩具，就問雙方願不願意輪流一人玩十分鐘。如果兩個人都不肯退讓，就把玩具收起來。無法分享及等待就沒辦法玩，進而讓孩子學會分享。

生病照護

小孩總是活蹦亂跳，難免跌跌撞撞，如果不小心撞到頭部時，爸媽要特別留意。先觀察有沒有外傷，如果只是小擦傷、瘀傷，可以先冰敷並消毒擦藥，如果有較深的傷口就要請醫師處理。

另外，要密切觀察有沒有出現腦震盪的症狀。包括頭痛、頭暈、想吐、活動力下降，如果感覺孩子不對勁。還是要盡快就醫，由醫師判斷是否有其他的問題。也請定期檢測家中的居家安全，減少孩子發生意外的機會。

飲食營養

媽媽幫孩子準備食物的時候，經常會擔心太大口或咬不動。於是可能會把食物切得很細小或煮得太過軟爛，其實孩子的乳牙已具有咬碎、切斷食物的能力。媽媽要適量提供可以練習「咀嚼」的食物，來促進孩子咀嚼肌、牙齒、下顎的發育。

可以準備比較好咬的水果讓孩子自己叉來吃，例如小番茄、小蘋果、橘子、芭樂等，或是把肉類、各種蔬菜、蛋等切成適口大小，讓孩子練習咀嚼力。

來源：幼兒2歲 第24週：諾羅病毒 一人感染 全家中獎！

幼兒二歲第二十四週：諾羅病毒 一人感染全家中獎！

教養難題

「這是我的！」、「不可以玩」…不願意分享玩具，也是二歲多孩子很常見的狀況。對這個階段的孩子來說，他們還不是很能理解分享的意義，看見別的小朋友玩他的玩具，他會認為「我喜歡的東西被別人拿走或佔有」。

所以，希望孩子分享玩具之前。可以向他說明清楚，只是借別人玩等下就會還給他。也可以讓他向別人借玩具來玩，了解分享的過程。不過，如果是孩子手中正在玩的玩具。除非孩子願意否則也要尊重孩子還想玩的感受，或是告訴孩子等你玩好了再借別人。讓他樂意把玩具暫時分享出來。

生病照護

諾羅病毒是嬰幼兒常見引起急性腸胃炎原因之一，冬天到春天是主要流行季節。諾羅的傳染力相當強，往往一人感染。全家中獎！

感染諾羅病毒之後，會出現噁心、嘔吐、腹瀉的腸胃道症狀。嬰幼兒症狀會比大人來得嚴重，所以。除了就醫之外，也要多休息、暫時吃清淡的食物。注意讓孩子補充足夠水分，必要時需補充電解質。另外，家中的環境要做好清潔及消毒，也要加強勤洗手、平時要避免生食生飲。

遊戲及玩具

這個階段孩子對新奇的事物都充滿好奇心，爸媽可以多培養孩子的觀察力，例如帶孩子去公園找出不同顏色的花朵、去聞聞花和植物的味道。

也可以一起撿拾地上的種子、枯葉，讓孩子了解大自然的變化。如果確保草地沒碎石子或危險物，也可以帶孩子脫掉鞋子光腳走草地，這樣也能增進孩子的觸覺發展。

自理能力

其實孩子從小就喜歡玩揹包包、揹娃娃的遊戲，所以。二歲多的時候，如果要出門就可以訓練讓他揹包包。準備一個適合孩子身材的包包，包包內裝他外出時最常使用的物品。例如衛生紙、毛巾、一件上衣，一開始不要裝太重。否則孩子揹一會就會覺得累而不想揹。

等慢慢長大一些，再增加裡面的物品。例如玩具、水壺，也可以讓他決定要揹什麼。不過，要提醒他要帶揹得動的物品。而且練習把包包內的物品放整齊。

來源：幼兒2歲 第26週：孩子精力旺盛

幼兒二歲第二十六週：孩子精力旺盛

整體發展

二歲半左右的孩子已經可以理解大人簡單的一到二步驟指令，例如把蓋子拿過來，把餅乾盒蓋起來。此時，孩子大概會使用二百多個單詞。能辨認很多常見物品以及常見的人，會知道自己的名字。也知道別人在叫他。

但對於「你」、「我」、「他」還是會搞錯用法，例如媽媽會說這個給你。而當他想要某個物品時，可能不會說「給我」。還是一樣用「給你」來表達，只要慢慢教他。大概到三歲左右就會正確使用你我他。

教養難題

孩子的活動力似乎用不完，尤其有的孩子非常好動。只要睡飽起來就動個不停，甚至喜歡爬上爬下、跳來跳去。讓爸媽想問是不是過動兒。

其實二歲多的孩子充滿好奇心，加上精力旺盛，有些孩子又特別活潑好動，但好動不代表就是過動喔。所以，對於

天性好動的孩子，每天可以安排外出放電的時間，帶他出去跑跑跳跳、玩滑步車、玩球等。家中也要佈置一塊安全的玩耍場所，鋪上地墊。讓他在安全區域內玩耍，並要留意家中是否有危險的擺設。例如可能會攀爬櫃子或沙發、可能會傾倒的家具、尖銳的桌角、插座孔等等，請適時做一些調整。例如把家具固定靠牆，把桌角加上保護套、將不用插座封好。以免發生危險。

自理能力

洗手對大人來說，目的是保持衛生。對孩子來說，比較像玩水。所以，學習洗手孩子們會很喜歡。不過，還是要叮嚀孩子。洗手要正確而且不可以玩水，愛惜水資源。

首先幫孩子準備一個安全、適合身高的腳踏墊，讓他可以方便就打開水龍頭。接著教他按壓洗手乳或抹肥皂，再教他「內外夾弓大立腕」的步驟。不過，對二歲多的孩子要記好步驟其實有難度。媽媽可以告訴他小手要洗乾淨、搓一搓，洗一首生日快樂歌的時間。約二十秒，最後再沖水。洗完之後也要幫他準備一條毛巾，讓他把手擦乾。

每次吃飯前、如廁後、擤完鼻涕都請叮嚀孩子洗手，媽媽可以在一旁看看孩子步驟是否正確。多練習幾次，孩子很快就會掌握洗手的技巧。也會塑造好的生活習慣。

飲食營養

孩子要養成喝水的習慣，因為這階段的孩子活動量大，每天要讓他補充足夠的水份。體重在二十公斤內的兒童，喝水量簡單的算法是體重-一千零五十再加上一千。舉例：十五公斤的小朋友，一天喝水量約一千二百五十。這是包含所有食物的水份喔，例如白開水、牛奶、湯等。要注意的是多讓孩子喝白開水，不要養成喝糖水、果汁、含糖飲料的習慣。

媽媽也可以觀察孩子適當間隔時間是否有去尿尿，以及尿尿的顏色是否清淡、沒有異味，如果尿尿顏色很深、味道重，就可能是水份攝取不太夠。

來源：幼兒2歲 第28週：孩子已經有「配對」的能力

幼兒二歲第二十八週：孩子已經有「配對」的能力

二到三歲的孩子已經有「配對」的能力，例如不同顏色或圖案的襪子。他可以把相同的一對找出來，或是會看玩具的形狀進行配對。也會將水果和顏色圖卡進行配對。

所以，家長可以請孩子多幫忙要配對的家事。例如把鞋子一雙雙擺整齊、把筷子一雙雙放在桌子上，或是讓孩子玩簡單的拼圖。都可以訓練他的配對能力。

教養難題

家裡到處都是散落的玩具，要孩子收玩具不但不聽，竟然

又搬出更多玩具。其實，有時候孩子不一定是肯收玩具，而是不會收玩具。

首先媽媽應該設立出玩具的家，可以用不同的箱子或抽屜來分類。類別不要分太細，否則孩子會無法理解。高度必須考慮到小孩的身高，媽媽可以先陪孩子把不玩的玩具送回家。才可以再拿出新的玩具，每次要休息、睡覺的前十分鐘就提醒孩子準備收玩具了。讓他養成收玩具的習慣。如果孩子故意不肯收玩具，那媽媽可以先將某些玩具沒收，讓他知道如果不把玩具送回家，那玩具就會暫時消失不能玩。

生病照護

常見的過敏疾病有三大類，症狀出現在皮膚稱為異位性皮膚炎。發生於鼻子稱為過敏性鼻炎，在支氣管的部分則為氣喘。這三種症狀有可能會相互伴隨發生。

如果孩子經常有鼻塞、流鼻水、鼻子癢、打噴嚏的症狀，尤其是早上起床時，很會打噴嚏就要留意，這多半不是感冒而是過敏性鼻炎！預防過敏還是要從生活中改善，包括使用空氣清淨機、雨天使用除濕機。居家環境要避免塵蟎，留意日夜溫差大及寒冷氣候。外出時要做好保暖及戴口罩，症狀嚴重時還是要就醫治療。

飲食營養

孩子的腸胃功能及抵抗力還不像大人那麼好，所以，有些食物最好不要常吃或是讓孩子嘗試，例如生魚片、生雞蛋、夜市燒烤食物、市場涼拌菜、路邊攤的零食等。另外，如果無法確保食物是否新鮮，例如隔夜菜、在室溫放太久的牛奶，也不要讓孩子嘗試。

來源：幼兒2歲 第2週：2~3歲貓狗都嫌的年紀！

幼兒二歲第二週：二到三歲貓狗都嫌的年紀！

整體發展

二歲開始孩子又進入下一個重要的成長里程碑，媽媽在育兒上會有更多的驚喜，不過要面臨的挑戰也增加囉！這個階段的孩子已經走得很穩，會開始嘗試小跑步、跳躍、上下樓梯。如果孩子由大人牽著一隻手或自己扶著欄杆不敢也不懂得如何下樓梯，請爸媽留意有發展遲緩的可能性。另外，手部細動作更靈活了，會一頁頁翻書，也能堆疊二、三塊積木。所以，可以多讓孩子在戶外跑跑跳跳，增進他的肢體協調性。

語言及認知上也比一歲多更進步，會正確指認一、二樣圖片中的東西或動物，例如球、狗。而且會將兩個單字組合成短句來和大人溝通，例如「媽媽抱」、「看狗狗」、「爸爸拿」。爸媽能多和孩子聊天、看書，讓孩子獲得更多的語言刺激。

爸媽平時記得要做好兒童健康手冊的家長紀錄事項、健康檢查紀錄，如果未達標準，要請教醫師是否有發展問題喔！

教養難題

有人說二到三歲的小孩是貓狗都嫌的年紀！因為此時的孩子越來越有自己的主見，開始發展自主意識。看起來特別愛唱反調，尤其很多時候會把「不要」掛在嘴上。讓爸媽頗為頭痛。

其實這種看似叛逆是一種成長表現，當父母遇上孩子一直說不要或是不停搖頭時。可以用選擇的方式和他相處，直接給他二個選項。讓他二擇一，或是等他冷靜下來再繼續溝通。溫柔但堅持是此階段較為合適的教養方式。

生病照護

幼兒的視力保健很重要，未滿二歲幼兒盡量不要看螢幕（三產品），二歲後的兒童，爸媽也不要太頻繁讓他使用三產品喔。如果覺得幼兒視力有異常，應帶至眼科檢查。

視力保健守則給爸媽參考：

一 每日戶外活動二到三小時以上。

二 未滿二歲幼兒不看螢幕，二歲以上每日不要超過一小時。

三 用眼三十分鐘，休息十分鐘，並避免長時間近距離用眼。

四 看書或三螢幕持三十五到四十公分距離。

五 均衡飲食，天天五蔬果。

六 每年定期一到二次檢查視力。

遊戲及玩具

二歲大的孩子喜歡輕快的音樂及自由的肢體律動，可以播放音樂或是讓他看唱跳兒童節目，讓他跟著唱唱跳跳。

另外，媽媽也可以和他一起玩模仿動物的遊戲。準備常見的動物圖卡，輪流抽出一張之後。就要模仿抽出來的動物特色，例如兔子就把手放頭上蹲著跳、小狗就要發出汪汪叫、小鳥就要用手當翅膀做出鳥飛的動作。

來源：幼兒2歲 第30週：你家孩子也有老大情緒嗎

幼兒二歲第三十週：你家孩子也有老大情緒嗎

整體發展

二歲半之後孩子的雙腳已經很有力，除了走得很穩外。雙腳也有離地跳躍的能力喔，通常也會跑步。不過，偶爾跑太快還是可能跌倒。另外，孩子已經有能力蹲得很好，而且不用扶就可以從蹲的姿勢站起來。

如果覺得孩子平衡感不夠好，可以讓孩子多嘗試跨越障礙物或是走地上的線條，訓練孩子下肢的力量，或是多帶孩子去公園玩。孩子都很愛去公園玩沙、玩溜滑梯，沙子可以提供孩子觸覺刺激，而溜滑梯則可以訓練平衡感及腿力。但玩耍過程中爸媽要隨時留意孩子遊戲的安全，例如要排隊不可以推擠，也不可以刻意從高處跳下來，或是將沙子灑向別人的眼睛。

教養難題

你家孩子也有老大情結嗎？雖然很多爸媽在老二即將誕生前，就會告訴老大「那是你的弟弟或妹妹」、「弟弟或妹妹以後會陪你一起玩」。不過，老二出生之後。對老大來說還是要心理適應期，老大可能會感覺原本只愛他的父母被搶走了。或是常有人對他說，你要讓弟弟妹妹。也會讓他覺得不公平。

於是老大可能會有欺負弟弟、妹妹的行為，此時。父母不能只是責罵他，而是要說明弟弟妹妹還小會受傷。也盡量要讓老大有足夠的安全感及感受到父母的愛，引導他如何接觸弟弟妹妹。例如輕輕摸孩子、對孩子說話，告訴他弟弟妹妹非常喜歡他。同時讓孩子成為小幫手，在幫忙的過程獲得被肯定與價值感。就能慢慢地讓他接受弟弟妹妹。

遊戲及玩具

爸媽對孩子來說就是一個大玩具，孩子很喜歡掛在爸媽身上或是在爸媽身上爬來爬去。這時候你可以多陪孩子玩平衡感遊戲，例如讓孩子坐在大人的大腿上。大人稍扶著孩子兩側身體，開始抖動大腿讓孩子學習平衡。或是大人仰躺在地，膝蓋彎曲。讓孩子趴在大人的小腿上，玩飛機起飛的遊戲。這些肢體接觸及互動都會讓孩子很開心，也能增加親子關係。不過玩耍時要留意孩子的安全。

自理能力

擺碗筷可以訓練孩子配對以及數數的能力，同時還能讓孩子對於做家事有參與感，讓他學習幫忙做家事。

首先，先讓孩子去數餐桌上有幾份碗筷。然後媽媽可以先示範，一個碗要搭一雙筷子。如果家人習慣用不同的碗筷，也能讓孩子從功能性進行配對。例如他自己用的是學習碗、學習筷，讓孩子依座位把家人的碗筷放好。

比較熟練之後可以進階要求，要把一雙筷子整齊放好，然後每個人的碗也要放在適當的距離位置。

來源：幼兒2歲 第32週：孩子也有胃口不好的時候

幼兒二歲第三十二週：孩子也有胃口不好的時候

整體發展

二歲半到三歲孩子的手部精細動作更進步了，他會轉開瓶蓋、仿畫線條、用繩子串珠子、自己打開糖果包裝紙、能模仿別人做摺紙的動作。

如果孩子的手部能力比較弱，可以常常讓他練習扭轉瓶蓋、玩黏土，請他用黏土捏出長條型、搓成圓形、捏出動物的形狀，都可以訓練他的手部動作。平常讓孩子自己吃飯、自己收玩具也都是訓練手部靈活最好的活動。

教養難題

二歲多的孩子因為語言能力還不是很好，加上有的孩子挫折忍耐度比較低，稍有不順心就選擇哭來發洩。

建議父母應觀察孩子的脾氣，提前預防可能讓他失控的場景發生。例如感覺孩子快要哭鬧時，給他轉移目標的物品。或帶他離開現場，轉移他的注意力。讓他沒有機會被引爆哭點。

而當孩子哭鬧時，父母也不要太大的情緒起伏。或是馬上妥協他的要求，孩子是很聰明的。他們如果認為哭是有用的、哭會引起父母的關注，下一次也會選擇用哭來表達。父母可以稍微安慰後，嘗試帶他離開現場。也不用急著制止他不准哭，等他比較冷靜再和他溝通。告訴他如果不哭了我們可以來做什麼事，讓孩子有一個情緒轉折。或是給他一個新目標，就可以比較順利結束哭鬧的行為。

生病照護

不少六個月內的嬰兒，都會有「內斜視」的狀況（鬥雞眼），慢慢地比較大之後，這個問題就自然消失了。不過，如果孩子二歲後雙眼視線還是不平行。或是二到三歲後才開始出現斜視問題，或是經常會眯眼、歪頭、斜頸、低頭看東西。都要進一步帶孩子去做檢查。通常斜視有四種型態：內、外、上、下斜視。醫師需要依據孩子的症狀，採取戴眼鏡、戴眼罩遮蓋好眼、矯正訓練、外科手術等方式來治療。有些斜視如果沒有及早治療，可能會演變成弱視，而且較大之後也會影響人際關係。

飲食營養

孩子不一定每一餐胃口都會很好，就像大人有時天氣熱也吃不太下東西。所以，不用每餐都要求孩子一定要吃足

夠的食物。或是一定要吃完碗內的食物，如果孩子明顯不想吃了。父母就把食物收走，而且不要沒多久就又提供點心。否則孩子下一餐還是會吃不下。

來源：幼兒2歲 第34週：麥粒腫就是俗稱的長針眼

幼兒二歲第三十四週：麥粒腫就是俗稱的長針眼

教養難題

什麼事都想自己做，如果大人等不及幫忙做了。就會哭鬧抗議，非得讓他自己再做一次才罷休。這是因為二歲後，孩子越來越有自己的意識及個性。尤其是堅持度高的孩子更明顯。

如果在安全及合理的狀況下，那就讓孩子嘗試自己來。像是自己倒水、自己穿鞋子，如果爸媽很趕時間。也可以和孩子分工，分派事情給他。例如讓他去幫忙拿東西，然後父母趕快做完其他的事。但如果是危險的事，例如要自己過馬路。則要告訴他，要等你長大一點才行。可教導幼兒穿越馬路「停看聽」的正確交通行為，讓孩子來告訴爸媽。是不是變綠燈了，再一起手牽手過馬路。

生病照護

因為孩子抵抗力弱，又習慣用手揉眼睛，有時候就會出現麥粒腫，也就是俗稱的針眼。

如果發現小朋友眼皮紅腫時，要留意判別是麥粒腫或是蚊蟲叮咬。如果是麥粒腫請帶至眼科檢查，輕微發炎時通常醫師會使用含抗生素的眼藥水或藥膏來治療，必要時醫師會給予口服抗生素。如果已嚴重腫痛，甚至引發蜂窩性組織炎，醫師也會給予口服抗生素，並要考慮以局部手術將膿排出來。

要留意針眼會反覆發作，需教孩子勤洗手。少用手揉眼睛，也要避免讓孩子吃高油脂的油炸物。保持良好的生活作息。

飲食營養

如果孩子出現便秘困擾，就要增加水份的攝取，以及多吃蔬菜水果，尤其是有助排便的香蕉、木瓜、地瓜、芹菜、空心菜等。

每天也盡量養成定時排便的習慣，差不多時間就帶孩子去如廁。如果因為便秘想要讓孩子補充益生菌，最好先詢問醫師的意見。如果便秘多天都無法改善，還是要帶孩子去看醫師。依照醫師的指示使用軟便劑。避免孩子便便累積越來越乾硬，引起大便疼痛或是流血現象，以後反而容易因為害怕疼痛，更是憋便不如廁。

預防接種

每年大約十、十一月是流感疫苗的接種時期，請爸媽按時帶孩子接種。對於小於八歲的孩子，如果之前從來沒有打過流感疫苗。首次接種後間隔四週需施打第二劑，下年度開始只要接種一劑流感疫苗即可。因為每年流行的病毒株都會稍有不同，加上流感疫苗的保護效果通常不超過一年，因此每年均須接種一次。

來源：幼兒2歲 第36週：喜歡玩角色扮演的遊戲

幼兒二歲第三十六週：喜歡玩角色扮演的遊戲

來源：幼兒2歲 第38週：有些孩子天生就是慢郎中

幼兒二歲第三十八週：有些孩子天生就是慢郎中

整體發展

快三歲的孩子已經有不錯的自理能力了，如果之前已經有進行如廁訓練。此時，白天多半會主動說要尿尿或便便。不用再包尿布，而且會自行如廁。不過，晚上睡覺還是要包尿布。

另外，多數的孩子會自己穿脫沒有鞋帶的鞋子、可以用湯匙吃喝東西、會自己洗手並擦乾。如果孩子還是要大人幫忙穿衣服、鞋子，或是餵飯，那可能是缺乏訓練的機會，請爸媽可以多讓孩子有機會練習。

教養難題

有些孩子天生就是慢郎中，如果遇上急性子的父母，更是會覺得急死了！其實動作慢吞吞有時候是先天氣質，有的孩子就是慢條斯里。喜歡慢慢做事，不過有時候也要考慮是孩子的能力不足。例如咀嚼能力差，吃飯就會慢；手眼協調性差。收東西就會慢。

比較好的方式是父母也跟著慢下來，拉長等待孩子的時間。只要孩子有持續在動作，就不用一直催他快一點。但如果孩子是因為一直分心而慢下來，就可以提醒他要專心。或幫他排除分心的原因，例如關掉電視；如果是能力不足。則要透過日常的訓練，來增進他的能力。

自理能力

快滿三歲的孩子會自己穿上外套、恤等衣物，只是還會扣扣子，所以，爸媽可以開始教他學習扣扣子。若要練習扣扣子，一開始先找扣眼比較大或是大一點的扣子讓孩子練習。通常外套的扣子會比較大，剛開始不一定要穿著扣。也可以把衣服脫下來練習，要先教孩子學會對齊。之後再把扣子穿過扣眼，然後要用大拇指和食指把扣子拉過洞口。這個步驟對孩子來說是比較困難的，需要反覆練習。等練習順了，再讓孩子嘗試把衣服穿起來扣。

飲食營養

孩子偏挑食，媽媽會很苦惱！尤其有些孩子特別不愛吃青菜，不過。青菜對於孩子的健康很重要，所以。還是要用點技巧讓小孩習慣吃青菜。

例如可以用紅黃甜椒、小黃瓜、香菇，做出色彩豐富的蔬菜；也可以把蔬菜做成水餃、包子。或是將青菜和他喜歡的肉類一起炒。平常也可以帶孩子去買菜，請他為自己挑選想吃的青菜，回家之後也可以讓孩子洗菜，自己動手做就會對食物更有嘗試的意願。

來源：幼兒2歲 第40週：在家一條龍 出外一條蟲

幼兒二歲第四十週：在家一條龍出外一條蟲

教養難題

有些孩子是在家一條龍、出外一條蟲，明明在家裡活潑又搞笑。可是一出了門看見別的大人或小朋友，就變得很害羞。藏在大人身後不敢說話，也不敢和別的小朋友一起玩。

有些孩子的適應技巧不是很好，只有在他熟悉的地方及面對熟悉的人。才敢表現出活潑的一面，尤其是多數時間都待在家中。較少外出與人接觸的孩子更容易有此狀況，父母不用逼迫他一定要表現得很大方。可以讓他多花一些時間觀察環境、人，當他適應、感覺安心了。他就會嘗試去和別的小朋友說話或玩耍。平常也可以把握一些機會讓他和陌生人說話，例如去買東西時和別人說謝謝。

生病照護

沒有遇過熱痙攣狀況的家長，初次遇上時，幾乎是嚇掉半條命！孩子會突然倒地抽搐、眼球上吊、嘴唇發黑，伴隨體溫升高。兒童熱性痙攣通常發生在六個月到五歲之間，五到六歲之後就很少會再出現發燒性抽搐。

發作時要維持呼吸道通暢，抽搐當中會有牙關緊閉情形。不需要強行撬開孩童口腔塞入物品，此時先讓孩子側躺並保持呼吸道暢通。避免口水等分泌物嗆到，可以的話。用手機拍攝抽搐畫面並紀錄發作時間，可幫助醫師診斷。等待抽搐結束後再就醫，通常發作時間不會超過五分鐘。

如果就醫後確認為是熱性痙攣，家長就不用太擔心。因為這是良性的疾病，並不會造成腦部傷害。孩子比較大之後就不會再發生了。

自理能力

很多人都看過孩子睡覺起來，媽媽如果剛好有事在忙，孩子就這樣頂著一顆亂七八糟的頭髮走來走去。快三歲的孩子已經有能力自己梳頭，練習梳頭也可以培養孩子注

意自己的儀容。

首先幫孩子準備一個他照得到的鏡子及他方便拿取的梳子，讓孩子對著鏡子梳頭。可以教他要由上往下，可先從側面、後面。再梳瀏海，讓他了解每個方位都要梳到。可以照鏡子看看頭髮是否都梳順了。

如果是小女生也可以讓她嘗試夾髮夾，不過，髮夾要找彈力比較鬆、比較好夾的類型。

來源：幼兒2歲 第42週：為孩子選擇餐具的技巧

幼兒二歲第四十二週：為孩子選擇餐具的技巧

整體發展

如果有經常練習，孩子可能會從一唸到十了。甚至有孩子可以唸更多的數字，不過。這只是像背唐詩的概念，孩子還不是很懂得數量的意義。爸媽可以經常和孩子練習一個、二個、三個，搭配實體物，例如一支筆、二支筆、三支筆，孩子慢慢就會理解最基本的數量概念。

另外，二歲多的孩子，至少要有十個穩定使用的語詞，例如吃飯、不要、好、爸爸、媽媽、球球等。如果寶寶很少開口說話，使用語詞時也感覺有困難，就要留心發展問題。

遊戲及玩具

這個階段孩子喜歡玩角色扮演的遊戲，爸媽可以準備一些相關玩具。例如小廚房、醫師看診玩具、店員收銀玩具等，也可以經常對調不同的角色。例如有時孩子當店員，有時孩子演顧客。這樣不但會讓孩子更有想像力，也能在角色扮演中增進說話的能力。累積更多的生活認知。

自理能力

偶爾感冒或是過敏，孩子就會有流鼻涕的狀況。學會擦鼻涕及擤鼻涕非常重要，因為擤完鼻涕會讓孩子比較舒服。也能保持清潔衛生。

二歲半左右就可以教他擤鼻涕的技巧，剛開始可以讓孩子先練習用鼻子對著衛生紙吹氣，提醒孩子嘴巴閉起來，感受衛生紙被吹動的感覺。還有一個方法是將衛生紙搓成長條型，稍微塞進孩子的一個鼻孔裡。但要避免孩子吸入，大人的鼻孔也跟著塞一個。然後彼此面對面，告訴孩子子彈要發射了。直接示範用力將衛生紙擤出，讓孩子透過模仿。運用噴射衛生紙的遊戲方式學習擤鼻涕。

等抓到訣竅後，媽媽就可以幫他用衛生紙按住一邊的鼻子。再搭配「」的聲音，讓孩子更懂得用力。一開始沒辦法擤得很好，練習到三歲之後。多半就能學會自己擤鼻涕。

飲食營養

二歲前孩子吃飯主要還是使用湯匙、叉子，或是加上雙手。二歲半過後，就可以開始加入筷子。不過，一開始使用筷子對小孩來說有點像叉子的功用。他可能會用叉食物的方式來使用，爸媽也可以去購買適合孩子的學習筷回家練習。一般要到三、四歲後才會比較成功夾住食物，然後送進口中。

市面上有很多專門為孩子設計的餐具，家長在選擇上。首先要考慮材質的安全性，再留意設計是否符合孩子的手部操作。可以依孩子的喜好選擇可愛繽紛的圖案，另外。要留意餐具的耐熱性及微波功能。使用完後也要做好清潔，以免細菌滋生。

看更多：

有些孩子天生就是慢郎中

麥粒腫就是俗稱的長針眼

搶玩具紛爭又來了

啊！孩子一生氣就開口咬人！

來源：幼兒2歲 第44週：不要嘲笑孩子的害怕或擔憂

幼兒二歲第四十四週：不要嘲笑孩子的害怕或擔憂

教養難題

對大人來說，有些東西一看就知道是假的，自然不會害怕，例如裝扮的巫婆、穿上恐龍裝的人。可是對二、三歲的孩子，他們還不能完全分辨真假，即使大人告訴他那是假的，他還是會很害怕。

所以，不要嘲笑孩子的害怕或擔憂。也不要硬逼孩子接近他認為可怕的東西，因為對他來說。那是真實的恐怖。平時也不要故意嚇孩子，例如告訴他「警察等下會來把你抓走」、「巫婆會從衣櫥跑出來」等。

遊戲及玩具

媽媽可以準備四個碗，分別裝少量的紅豆、綠豆及黃豆，以及混了三個顏色豆的碗。遊戲方式可以有很多種，例如把混色豆分別用手指挑出來。送回他們原來的家，這樣可以訓練孩子的精細動作及辨別顏色的能力；也可以在媽媽的帶領下嘗試玩豆子數數的遊戲。不過孩子可以跟著數一到十，但還沒有辦法理解超過三個以上的數量。此階段孩子的專注力大約只有五到十分鐘，不用玩太久，只要孩子覺得不想玩了，就把豆子蓋好收起來。

飲食營養

果凍軟軟的，很多孩子喜歡吃。不過，果凍本身沒有什麼

營養。主要就是水、糖、增稠劑等，所以。還是不要太常吃比較健康。另外，吃果凍一定要特別注意安全，大人要確保孩子沒有在跑跳或嬉鬧中吃果凍，才不會發生窒息危險。如果不小心噎到，請立即用哈母立克方式來急救。

除了果凍之外，還有以下食物。爸媽也要特別留意窒息或噎到的風險，包括葡萄、花生堅果、麻糬、酸梅、軟糖、爆米花等。都最好在大人的視線範圍內吃完。

預防按種

為什麼打了疫苗還是會感冒？因為感冒有分普通感冒和流行性感冒，我們施打的是流感疫苗並不能預防普通感冒。另外，流感疫苗所包含的病毒株是目前最常流行的型別。有時候也可能會感染其他型別的流感。但是如果有打疫苗，才有保護效果，降低感染流感，也能減少併發重症的狀況喔。

來源：幼兒2歲 第4週：訓練孩子自己吃飯

幼兒二歲第四週：訓練孩子自己吃飯

教養難題

孩子二歲之後，爸媽會遇上大大小小的教養困擾，現在就來討論小孩老愛搞破壞這件事。像是玩玩具會用粗魯的方式，非要敲敲看或硬拆開某些部位。一下子就弄壞新買的玩具，或是對很多物品充滿好奇心。忍不住碰一下、拉一下，像個頑皮的搗蛋鬼。

搞破壞是正常兒童發展中常見的行為之一，孩子會想知道當他這樣做會發生什麼事。而在他的認知中並不太了解這些行為會將東西弄壞，所以。父母要適時機會教育，告訴孩子這樣做後果是什麼。什麼事情是不可以做的。不過，如果是不希望讓孩子弄壞的珍貴物品，最好的方式還是收起來，放在他拿不到或看不到的地方。另外，也要特別留藥品、清潔劑、殺蟲劑等危險物品，應置於高處或鎖在櫥櫃、抽屜內，以免孩子好奇不小心誤食或誤壓。

遊戲及玩具

二歲的孩子已經走得很好囉，此階段可以再加強手腳協調及身體平衡的活動。可以準備球類玩具或是滑步車等，多讓孩子在戶外丟球、追球。或是玩滑步車。

另外，在家裡也可以玩障礙賽遊戲。在地墊上放障礙物，例如放幾個枕頭讓孩子練習跨過或爬過障礙物。或是在地墊上放多個氣球，要孩子用腳踢開氣球。

自理能力

滿二歲的孩子通常已經有能力用湯匙吃飯、自己會脫下外套、鞋子、用水杯喝水。如果你的孩子還沒有這些能力，多半是因為缺少了練習機會。所以，爸媽要嘗試讓孩子

自己吃飯。即使會弄髒地板或衣服也沒關係，只要更換衣服或整理環境就好。平常也要讓孩子多練習脫外套或是褲子，如果有拉鏈或扣子爸媽可以先協助打開一部分。把剩下步驟讓孩子自己來。

此時，有些孩子精細動作還不是很穩定。所以，可能會發生打翻碗、弄倒水杯的狀況。爸媽要多鼓勵孩子，避免責罵。可以教孩子如何握好碗或杯子，讓他自理能力慢慢進步。

來源：幼兒2歲 第6週：腸病毒是父母的公敵！

幼兒二歲第六週：腸病毒是父母的公敵！

教養難題

有些家庭每到吃飯時間就像戰場，有的小孩一餐飯吃上一個小時、有的是邊吃邊玩。要大人追著餵、有的是很挑食，看見青菜就搖頭。該怎麼做才能讓孩子好好吃飯呢？

一 避免以食物作為幼兒行為表現的獎勵品。

二 要有良好的用餐習慣，讓幼兒坐高腳椅，並與家人一起用餐。

三 吃飯過程中不要一邊看電視或玩玩具，規定合理用餐時間。

四 吃飯氣氛要輕鬆，不要在吃飯時間責罵孩子，或是非要強迫孩子吃完全部食物。可讓孩子參與餐桌談話。

五 除了正餐外，平常時間盡量不要提供零食，餐前二小時內不宜提供點心。

六 要避免高鹽、高糖、高油等重口味食物。

七 每天要有足夠的活動量，孩子肚子餓了才会有食慾。

八 可以讓孩子幫忙洗菜、挑菜或帶他去買菜，讓他對食物感興趣，減少偏挑食的狀況。

生病照護

腸病毒是父母的公敵！五歲以下的孩子要特別留意腸病毒的危害，尤其如果出現以下重症的病徵，要盡快至大醫院就醫：一嗜睡、二意識不清、三活動力降低、四手腳無力、五肌躍型抽搐有如受到驚嚇的肢體抽動、六持續嘔吐、七不發燒時心跳加快或呼吸急促。

想要避免感染腸病毒，要正確勤洗手、注意環境衛生、注意營養、均衡飲食、運動及充足的睡眠，減少出入人多的公共場所、避免與病童接觸。

飲食營養

充足的營養是健康的基礎！從小就要讓孩子吃對營養，才能健康長大！一到三歲的幼兒每天都要攝取均衡的天然食物，避免食用太多有加食品添加物的加工品。

建議以全穀根莖類為主食，每天大約十五到二碗的量；豆魚蛋肉類每天要吃二到三份；蔬菜及水果每天各吃二份；油脂與堅果種子每天四份；每天喝兩杯牛奶。平時要讓孩子多喝白開水，少喝含糖或咖啡因的飲料。還有常吃油炸物及甜食會造成過胖與蛀牙、偏食的問題，爸媽也要特別留意喔！

來源：幼兒2歲 第8週：異位性皮膚炎 讓人好困擾

幼兒二歲第八週：異位性皮膚炎讓人好困擾

整體發展

二歲多的孩子已經有能力用單腳踢球囉，雖然不是每次都踢得很準或是很遠，爸媽可以多帶孩子去戶外玩踢球及丟球的活動，讓孩子身體協調性更好。另外，在手部動作方面。孩子能夠握筆畫出線條，但此時還沒辦法把直線畫得很直或是畫出圓圈。但可以為他準備紙筆，讓他自由塗鴉、隨意畫線。

另外，爸媽帶孩子外出時。最好避免使用機車或自行車搭載寶貝，尤其要留意不可在機車發動狀況下要把孩子留在車子。以免孩子催動油門。如果沒有自用車，可考慮搭乘大眾交通工具。如果是自己開車帶孩子出門，務必使用汽車安全座椅。並將座椅安置在後座。

教養難題

每個孩子個性都不相同，有些孩子在二歲多時。會明顯有怕生的行為，尤其是遇上陌生人就不願意開口說話。也不願意打招呼。

爸媽不用強迫孩子馬上和陌生親友說話，只要向親友說明孩子比較內向、慢熱即可。等客人回去後再告訴孩子，客人和他說話是想認識他。並向孩子介紹該位陌生人，例如是媽媽的同學朋友等等。減少孩子與陌生人的距離，並鼓勵孩子下次嘗試對人打招呼或是笑一個。慢慢增進孩子的自信心。

生病照護

過敏比例越來越多，不少孩子都有異位性皮膚炎的困擾，如果在急性發作期請找小兒過敏科或小兒皮膚科醫師治療才能避免症狀惡化喔！而日常照護上請留意以下技巧：

一不用太高溫的水洗澡，洗完澡及肌膚乾燥時要勤抹不含香精或酒精的乳液。

二 穿著吸汗透氣的棉質衣物。

三 避免汗水刺激，流汗後盡快擦拭汗水或洗澡。

四 請依醫師的指示使用藥物，不要隨意停藥或自己購買藥物幫孩子塗抹。

自理能力

此階段孩子多數有能力自己「脫掉」外套或是鞋襪，如果孩子還不太會「脫掉」。爸媽可以這樣做，例如每次洗澡前請孩子嘗試脫光全身的衣服。爸媽也可以示範如何拉開拉鏈，或是解開扣子的技巧。或是初期先幫孩子解開一半的扣子或衣物，剩下的讓孩子嘗試。增加成就感，外面回家後可讓孩子自己脫掉鞋襪。可以教孩子如何用手指拉開魔鬼粘。多給孩子一些鼓勵，孩子動作就會越來越流暢。

來源：幼兒2歲第46週：孩子有O型腿！？

幼兒二歲第四十六週：孩子有型腿？

教養難題

兩歲多的孩子到底能不能管教？長輩可能會說，「他還小。還不懂事，不要罵他。等他大一點就會聽話了」真的是這樣嗎？其實，二歲多的孩子已經可以溝通及思考。父母的管教並不是罵或打，而是透過日常機會教育。讓他知道什麼事可以做，什麼事不可做。

例如：不可以隨意打別人或是故意在牆上畫畫，媽媽可以說明。打人別人會痛；或是你可以畫在紙上，但不能畫在牆上。因為牆上會擦不掉。父母態度堅定的溝通，就是一種管教，孩子慢慢就會理解應遵守的規則。

生病照護

孩子三歲前，腿看起來都是胖胖的。會感覺有點型腿，這是正常的現象。三到四歲時會再轉變成型腿，有九十五的兒童到了入小學階段就會慢慢變直。無需特別治療。

不過，如果幼兒的型腿很嚴重。甚至感覺走路姿態很奇怪，或是兩腿外形不對稱。那麼要就醫檢查，或利用兒童健康檢查的時機請教醫師。

自理能力

學習穿衣服可以在夏天練習，因為夏天的衣服比較簡單。通常是一件恤及短褲，從簡單的服裝開始練習。孩子會學得更快。

一開始媽媽可以邊幫孩子穿衣，邊說明步驟。例如要先找

出恤正面圖案，把頭穿過領口。讓圖案在前面，再伸出右手、左手。然後拉好衣服。褲子也是一樣找出正面，然後穿過右腳、左腳，再拉上來。之後可以讓孩子自己練習，小訣竅是先幫他準備正面圖案很明顯的恤。而且尺寸稍大一些，練習穿褲子時可以讓他坐在小椅子。等褲腳套好了，再站起來拉好。

平常也可以和他一起玩穿衣服比賽，看誰穿得比較快。等基本的衣服練習熟悉後，再加入背心、外套。女孩子可以再進階洋裝，慢慢學會穿各種服裝。

來源：幼兒2歲第48週：恭喜孩子進入3歲了！

幼兒二歲第四十八週：恭喜孩子進入三歲了！

整體發展

恭喜孩子進入三歲了！媽媽會覺得孩子似乎長大了不少，不過。個性上還是頗固執，會有自己的想法。乖的時候很可愛，盧起來的時候。還是很讓人頭疼。

三歲的孩子肢體動作已經非常協調，跑得快、會雙腳跳，扶著把手可以輕鬆上下樓梯。手部動作也很靈活，畫圖更有邏輯性，線條也掌握得不錯。而且孩子模仿與學習能力很好，很快就能學會大人教他的事情。這個階段的孩子很好動，要小心把電器用品放置平穩不易傾倒，例如平面電視最好是採壁掛式，電線也要收藏在幼兒無法碰觸或拉動之處。另外，要特別留意將摺疊桌放置在幼兒無法接觸到的地方，以免發生夾傷意外。

教養難題

很多爸媽是雙薪家庭，如果因為工作繁忙或長輩住得比較遠，也可能選擇當假日父母，週一至週五把孩子交給保姆或長輩照顧。長久下來，爸媽可能會覺得孩子似乎和自己不太熟，出現親子疏離感。

建議爸媽每天都和孩子進行簡短視訊，讓孩子熟悉爸媽的模樣。到了假日就盡量接手全部的照護工作，包括吃飯、洗澡、換尿布等。爸媽也可以多帶孩子出去玩，增加彼此互動的機會。不過，要盡量保持孩子原來的生活步調。不要一到假日就作息不固定，另外。不要孩子要什麼就買什麼給他，以免孩子養成吵鬧就可以獲得的行為習慣。

自理能力

二到三歲的孩子已經有能力脫或拉掉襪子，如果孩子沒辦法自行脫下鞋襪請家長要注意。但自己穿上襪子要到接近三歲左右，一開始會出現沒有完全拉好襪子卡住的狀況。或是襪底和襪面穿反，不過只要慢慢練習。四歲左右就有能力整齊穿好。

首先幫孩子準備襪口不要太緊的襪子，襪子長度超過腳踝。孩子剛學穿襪子時，會嘗試直接把腳對準洞口再奮力

拉。這樣襪子比較容易被撐壞，媽媽可以示範。先教孩子分辨好前後面，有防滑顆粒是底部。再教孩子用手指拉皺一部分襪子，對準襪口再把襪子拉上來。拉上來之後要找一下腳跟的線或是請他看看兩邊高度有沒有對稱，做一下調整。只要多練習，再給予稱讚很快就能學會穿襪了。

飲食營養

良好吃飯習慣是以身作則，有些爸媽會覺得孩子偏挑食。其實自己也是某些菜根本就不吃，或是在餐桌上會忍不住批評某些食物很難吃。小孩就會學習這樣的態度，或是父母很愛吃零食、炸雞、飲料。但卻禁止孩子吃，這也會讓孩子產生混淆。

所以，爸媽想養成孩子良好吃飯習慣。也要調整自己的習慣，盡量做到飲食均衡、三餐定時、吃飯時保持心情愉快等。這樣孩子也會跟著父母的腳步建立好習慣。

來源：幼兒3歲 第44週：帶孩子運動時，需要適時補充水分

幼兒三歲第四十四週：帶孩子運動時，需要適時補充水分

生活提醒

孩子快要四歲了，運動對於孩子來說很重要，這個年紀可以鼓勵小孩騎腳踏車運動，騎腳踏車時有些地方要注意喔！

一騎腳踏車前，可帶領孩子做一些頸部、手腕與腳踝部位的暖身運動，幫助減少運動傷害。

二記得提醒孩子要定時、定量補充水分，每隔十五到二十分鐘可以稍微休息一下，即使當下沒感覺口渴，也要補充水分。

三以小孩的體力來說，每次騎腳踏車距離約三到五公里較為合適，等腳力練出來了再循序漸進拉長距離。

四基於安全考量要避免小孩車速過快，也可避免體力快速耗竭，導致運動後可能產生肌肉疲勞、抽筋或痠痛不適。

五騎車時要記得戴安全帽、護膝等防護用具，這樣才能保護頭部、關節。

飲食營養

炎炎夏日，小孩可能會因為天氣太熱而出現食慾不振。如果只是偶爾一、兩餐吃得少並沒有太大關係，如果胃口一直不好。家長可以嘗試以下方式來改善。

一可以烹調酸甜的料理菜色，同時嘗試水果入菜，讓菜色

看起來比較開胃好吃。

二 避免因為天氣炎熱就讓孩子喝含糖飲料，攝取糖份太多就不容易覺得肚子餓。

三 可以改為少量多餐方式，感覺餓了再吃飯也可以。

四 使用空調冷氣，舒適涼爽的環境也會讓人比較有胃口。

生病照護

孩子晚上睡覺時，有時可能出現「夜驚症」。就是半夜突然醒來哭鬧、尖叫，無論如何安撫都沒用。約十分鐘之後，小孩又再度入睡。第二天起床，小孩卻不記得這件事。

一般來說，夜驚症常發生在小朋友白天玩太累。或是睡眠品質不好的情況，所以。家長可留意白天玩耍要安排中間休息時間，下午也可以小睡一下。夜驚的問題就不會經常出現。

來源：幼兒3歲 第10週：訓練小孩自理能力 爸媽可以這樣做

幼兒三歲第十週：訓練小孩自理能力 爸媽可以這樣做

自理能力

三歲多的孩子，已經有很不錯的基本自理能力了。不過，如果孩子還是很依賴大人。家長可以做這些事：

一 如果要出門，可能提早讓孩子有時間準備，例如練習穿外套、穿襪子、鞋子。

二 交代完孩子做某件事後，爸媽可以離開現場，以免看到孩子做不好就忍不住代勞或是孩子做不好馬上要求大人幫忙。

三 當孩子完成一件事時，爸爸媽媽要多給予讚美、肯定，不要馬上去挑剔孩子做不好的小細節，例如衣服沒有穿整齊、襪子沒有對齊、桌子沒有擦乾淨。

陪伴孩子成長，爸爸媽媽要有耐心。要多給孩子時間練習，標準不要訂得過高。親子關係比較不會太過緊繃。

另外，孩子三歲多，父母也應該要觀察小孩是否會「自己解開扣子、脫掉衣服」？這是三到四歲發展警訊指標，如果這時還不會這動作，建議盡快帶孩子接受專業評估。

教養難題

有的孩子脾氣控制力差，很容易暴怒。只要生氣甚至會摔東西或打人，爸爸媽媽看到這幅景象。內心會非常憂慮，害怕孩子性格太偏激。

發生這種狀況時，爸爸媽媽當下要先制止孩子的行為。接著了解小孩為什麼要生氣，理解原因後。可以問孩子：「除了打人、摔東西，是不是還有其他的方式？」透過問答、分析和孩子進行討論，再教導孩子用理性的方式，例如用說的表達自己的不滿，或是生氣時先離開一會再來想想怎麼做。家長也可以反思看看，家中大人遇上事情時，是否也是同樣會用激烈的語氣或方式去解決，進而讓孩子模仿這樣的行為。

生活提醒

三歲的孩子好奇心非常旺盛，喜歡冒險。但常缺乏判斷力，且帶點衝動。有些事情，可能想到就去做。不會顧到後果，而且很喜歡攀爬、跳躍。尤其如果家中有大面的玻璃窗戶更要小心。

家有幼童，窗戶要設有護欄或安全鎖或加上鐵窗。且窗台高度不可以小於一百一十公分，十樓以上的樓層。窗台高度不得低於一百二十公分，窗戶旁邊不可以放床、椅子、桌子、矮櫃、箱子等可供攀爬的家具、物品。以免幼童爬到窗戶上，引發墜樓意外。

來源：幼兒3歲 第12週：小孩講話沒大沒小，怎麼辦呢？

幼兒三歲第十二週：小孩講話沒大沒小，怎麼辦呢？

教養難題

如果孩子和父母或其他長輩說話時，回應口氣總是不好、感覺沒大沒小，該怎麼辦？

大人的教養態度必須一致，面對孩子不禮貌的回應。所有大人必須在第一時間表達不可以這樣回話，而不是笑笑帶過。或是放任孩子更加大聲對大人說話，久了會讓孩子覺得對大人不禮貌是沒關係的。

如果孩子是因為感覺挫折、羞愧而惱羞成怒，大人可以引導孩子說出自己的感覺、想法，並鼓勵孩子面對自己的情緒，大人也從旁提供一些策略。平時也要和孩子說明，什麼是禮貌、為什麼和長輩說話要有禮節，讓孩子懂得尊重長輩以及如何與他人客氣互動的方式。

生活提醒

現在兒童體重過重、肥胖的問題越來越普遍，如果小小年紀就肥胖。長大後肥胖相關疾病風險會上升，除了飲食上的控制。帶領孩子從小就養成運動的好習慣，非常重要。

每天應安排孩子進行需要耗費體力的活動，像跳舞、玩球。或是可以爬上爬下、跑來跑去的活動，常去公園玩就是不錯的方式。另外，有機會時就讓孩子多走路。例如近距離的地方就走路不要搭車，每天至少活動時間達一小時。

。可以分段進行，養成運動及活動的好習慣。

生病照護

當孩子遇到呼吸道或腸胃道感染時，都可能出現發燒症狀，有時是燒了又退、退了又燒，會讓家長很緊張。

有的家長認為，孩子吃退燒藥後又繼續發燒。代表這個醫師開的藥沒有效果，就會去找其他醫師。事實上，退燒藥的效果只能維持數小時。主要作用是暫時舒緩孩子的不舒服，如果疾病的過程還在進行中。退燒後都有可能繼續燒起來。

所以家長必須要有耐心，如果只是感覺不舒服。但活動力、飲食狀況都良好，那麼就有耐心等待健康恢復。不要過度緊張反覆給予退燒藥物。如果孩子出現明顯食慾減退、活動力明顯下降、嗜睡、意識不清等，則要盡快再次就醫。

來源：幼兒3歲 第14週：3歲多的孩子口吃可以這樣做…

幼兒三歲第十四週：三歲多的孩子口吃可以這樣做…

整體發展

三歲多的孩子，口語表達多半已經很流暢。通常已經學會使用代名詞「你」、「我」、「他」，且能使用完整句子來表達。也可以和別人進行一問一答的對話。不過，爸爸、媽媽也要多留意。如果小孩到了這時候，還無法「說出一個顏色。並說出三個圖形名稱，像鞋子、飛機、魚等」。或者無法「和別人一問一答持續對話，使用二至三個單詞的短句。且回答內容切題」，代表有發展警訊。建議讓孩子接受進一步專業評估，以把握學習契機。

另外，有些孩子在這時候，可能會出現講話結巴、口吃的現象。當孩子講話結巴、口吃，家長可以觀察看看造成的原因。有些孩子是「正常發展性口吃」，就是還無法精準挑選適合的字彙。但又急著要說，所以產生口吃現象。發展性口吃好發於二到五歲的孩子，有家族史、男生較常見，且當孩子太累、太急也容易誘發口吃。不過通常六個月內會改善，若持續超過六個月或者年紀超過七歲仍持續口吃，建議語言治療，通常效果很好。

當孩子有發展性口吃，爸爸、媽媽可以這樣做：

一、避免開放性的問題；利用重述來肯定孩子的表述，減少孩子說話的壓力。

二、避免刻意矯正孩子的表述；耐心等待孩子說完，不要催促。

三、讓孩子知道口吃會慢慢改善，不要擔心。

四、請父母親放慢對孩子說話的速度。

五、多與孩子進行親子共讀，或多和孩子聊天、溝通，讓孩子更能掌握字彙的運用，增加孩子說話的自信心。

如果發現孩子口吃的頻率很高，且伴隨不停眨眼、表情扭曲。或掐自己大腿等特殊症狀，孩子變得更不敢說話。就要尋求專業的評估與治療，幫助孩子找出問題。

生活提醒

三歲多的孩子，如果在家突然找不到大人會很緊張，他們可能會想看看門外或窗外能不能看到大人的身影，不小心就可能發生墜樓意外。所以，爸媽一定要注意。千萬不能把孩子獨留在家中，有些家長可能會想只是去樓下買個早餐或倒個垃圾。一會就會回來，應該沒關係。事實上有很多憾事就是發生在短短的十、二十分鐘內。

另外，即使家中有大一點年紀的孩子。也不可以先將小寶寶交給例如六、七歲的哥哥或姊姊照顧一會，自己出門辦事。同樣有可能發生危險。

飲食營養

小孩需要均衡的營養，而蔬菜含有多種維生素、礦物質、膳食纖維等營養素。是很好的營養來源，不過有些小孩偏挑食。不喜歡吃蔬菜，這時大人這樣來引導孩子接受蔬菜的滋味。

先減少孩子對蔬菜的恐懼，比方說。可以先選擇菜味沒那麼重，且帶點甜味的蔬菜。像高麗菜、花椰菜就是很好的選擇，無論是炒高麗菜或放入湯中熬煮。都可以呈現出高麗菜的鮮甜，如此。小孩對蔬菜的抗拒就會大幅降低。再來是讓孩子一起去市場買菜，讓他認識各種常見的蔬菜，也可以讓他自己來選菜。必要時也可以加入一些肉類來調味，讓孩子習慣兩個食物都要一起均衡攝取。

來源：幼兒3歲 第16週：孩子看3C，時間要注意！

幼兒三歲第十六週：孩子看三，時間要注意！

進入幼兒園

相信怎麼幫孩子挑選一間適合的學校是多數父母的共同煩惱，目前幼兒園主要可分為公立幼兒園、非營利幼兒園、準公共幼兒園與私立幼兒園。爸媽可預先了解各項幼兒園的規範與特色，再一一挑選。以下也列出相關特點：

公立幼兒園

- 上學時間：約為七：三十到十六：三十，有寒暑假
- 教學方式：不分科，採主題式教學

- 主要收費項目：點心費、餐費、活動費等，學費可獲補助

非營利幼兒園

- 上學時間：約為七：三十到十六：三十，沒有寒暑假
- 教學方式：不分科，採主題式教學
- 主要收費項目：點心費、餐費、活動費等，學費可獲補助

準公共幼兒園

- 上學時間：約為七：三十到十六：三十，沒有寒暑假
- 教學方式：含有較多元的特色教學課程
- 主要收費項目：點心費、餐費、活動費等，學費可獲補助

私立幼兒園

- 上學時間：約為七：三十到十六：三十，沒有寒暑假
- 教學方式：含有較多元的特色教學課程
- 主要收費項目：學費、點心費、餐費、活動費等

生活提醒

三產品在日常生活當中非常普遍，許多爸爸媽媽會想，三歲多的孩子可以使用三產品嗎？面對孩子使用三產品，該注意哪些事項？

首先，孩子使用三產品時，一定要控制時間，父母也要針對三內容做好把關。如果是三歲多的孩子，每日看螢幕的時間不要超過一小時。且用眼三十分鐘，就要休息十分鐘。每日戶外活動超過一百二十分鐘以上，戶外時間增加。接觸三產品的時間自然就會減少，眼睛也會更健康。

生病照護

當孩子出現便秘困擾，滿肚子都是宿便，該怎麼做呢？除了鼓勵孩子攝取足夠的蔬菜、水果，增加纖維質攝取。並補充充足水分，還有一個小秘訣。就是可以用遊戲的方式帶著孩子進行「臀部走路法」，來幫助小孩腸胃的蠕動。

什麼叫「臀部走路法」？就是用臀部坐在地上，兩腳伸直向前。然後以左右搖擺的臀部的方式向前移動，這動作可以強化腹部與腸道的肌肉力量。讓宿便可以輕鬆地排出，可以改善便秘困擾。

來源：幼兒3歲 第18週：寶貝會尿床…半夜要叫起來噓噓嗎？

幼兒三歲第十八週：寶貝會尿床…半夜要叫起來噓噓嗎？

自理能力

孩子三歲多的時候，在白天多半都可以控制膀胱。但到了晚上，還是會有約四十的孩子面臨尿床困擾。孩子尿床時，除了要找出原因。大人心態上也要多鼓勵、少責罵，有些爸爸媽媽可能會疑惑。小孩會尿床，是否需要半夜叫孩子起床尿尿？

若半夜叫小孩起床尿尿，次數最多一次。主要是因為孩子在熟睡狀態，才會分泌抗利尿激素。若叫小孩起床尿尿過於頻繁，就會干擾小孩睡眠。導致抗利尿激素無法正常分泌，反而更容易尿床。

因此，必要的時候。還是建議孩子使用較大的兒童專用夜間尿布，可等再大一點再練習晚上不包尿布。這樣爸爸媽媽與孩子的壓力就不會那麼大，孩子也不用因為晚上反覆起床尿尿而干擾睡眠。

教養難題

當爸爸媽媽發現自己的孩子竟然會說謊，可能會很難過或生氣。但其實，一個人能夠說謊表示他具備一定的心智理解力與自我控制力。孩子說謊表示他長大了。

發現孩子說謊，首先要釐清孩子說謊的環境、動機與企圖。三歲多的孩子出現說謊行為，有時較像是試探或玩遊戲，想看看自己這樣的行為，大人會有什麼反應。另外，有時是小孩做錯事後誠實告知。結果被罵，下次遇到類似情況。小孩可能就會以說謊來閃避大人責罵。

所以察覺小孩有說謊行為，大人先不要急著「發脾氣」，可以這樣做：

一試著理性面對，幫助孩子逐步釐清當時情境。

二讓孩子了解，這樣的錯誤可能導致哪些後果，並讓孩子知道父母為何如此擔心、在意。

三讓孩子感受到雖然犯了錯，爸爸媽媽的愛並不會因此消失，鼓勵孩子要誠實。

生病照護

孩子流鼻血了嗎？常見原因包括挖鼻孔、鼻子太乾、過敏、病毒感染，或是不慎異物塞入等。如果常發生不明原因的流鼻血，或是血流時間過長，就要找醫師檢查確認原因。

流鼻血時請家長這樣處理：

一頭向前傾，不要後仰：用衛生紙或毛巾擋著，讓鼻血流出來，不要後仰讓血往鼻腔內流。

二 按住兩側鼻翼加壓止血：爸媽用拇指及食指按壓孩子鼻孔外的兩端，大約十分鐘。

三 冰敷鼻子：用冰敷袋或毛巾包冰塊直接冰敷鼻根、鼻頭處，可幫助血管收縮。

四 不要緊張：爸媽態度要鎮定，不要慌張，以免孩子血壓高，更難止血。

來源：幼兒3歲 第20週：家中手足有紛爭，爸媽可以這樣做！

幼兒三歲第二十週：家中手足有紛爭，爸媽可以這樣做！

教養難題

如果家中有兄弟姊妹，是否經常發生為了一件事吵成一團的狀況呢？爸爸媽媽必須不斷接受告狀，不斷排解糾紛，面對家中小孩常爭吵、比較或爭寵，爸爸媽媽可以怎麼做呢？

一 爭吵時，如果沒有危險性可先觀察與等待，嘗試讓孩子自己先解決紛爭，不要一有事大人就介入。

二 對待每個孩子都要盡量公平，不要總是要求大的要讓小的，而是讓哥哥姊姊願意主動幫弟妹，而弟妹也願意聽從哥哥姊姊的意見。

三 減少相互比較，尤其是雙胞胎更要避免彼此比較，多尊重孩子個人化差異

進入幼兒園

許多三歲小孩剛上幼兒園的時候，會出現分離焦慮、不肯上學的現象。可能一進幼兒園就大哭，吵著要回家。爸爸媽媽會覺得於心不忍，但又知道終究必須放手。才能讓孩子獨立上幼兒園。

一 建議爸媽，可以告訴孩子是去玩、去交朋友，不要強調去上學。

二 讓孩子攜帶著喜歡的娃娃或物品或爸媽的照片。

三 每天上學前明確告訴孩子何時來接他，讓他了解父母時間到了就會來接。

四 和老師多配合，詢問什麼樣的方式可以讓孩子更快適應。

五 如果超過二星期都沒辦法適應，再和老師討論看看是否半年後再嘗試入園。

六 可以在入學前幾個月，與孩子一起閱讀入學或是幼兒

園相關的繪本，讓孩子降低分離焦慮。

飲食營養

有些小孩吃飯慢，是因為觸覺敏感度比較高。這樣的孩子在吃飯時，常會分心。只要周遭有些風吹草動，便停止用餐。另一種常見的表現是挑食，這些孩子可能對某些食物的味道、口感特別排斥。另外部分孩子口腔內的肌肉張力低，較容易影響咀嚼肌的使用。造成口腔容易痠累，孩子就不喜歡咀嚼。

改善吃飯慢吞吞的方式有以下六項重點：

一平常可利用玩沙、按摩或踩草地等方式刺激孩子的副交感神經，讓孩子逐漸適應外界的刺激。

二吃飯前，至少讓孩子有三十分鐘以上的時間進行靜態活動緩和情緒。

三必要時引導孩子一起做菜，提高孩子享用食物的動機，一般來說，孩子通常會比較喜歡吃自己做的菜。

四訂立合理用餐時間，一般而言。約為三十到六十分鐘，當時間到了。可請孩子離開餐桌，去做別的事情。多鼓勵孩子把握時間用餐。

五增加口腔肌肉的練習，可以透過吹泡泡、吹風車、用吸管吸吮濃稠的果汁，或是嚼食孩子喜歡的食物。

六用餐時，要有固定的高腳椅，並應該小朋友坐穩，避免邊吃邊玩。

來源：幼兒3歲 第22週：孩子玩樂時爭先恐後怎麼辦？

幼兒三歲第二十二週：孩子玩樂時爭先恐後怎麼辦？

教養難題

有些孩子在公園玩，或者在做某些事情的時候，會因為求快而爭先恐後、急著插隊，這時候可能會引發混亂與爭吵。該如何教導自己的孩子要排隊、遵守順序？

一孩子一開始可能是因為太過興奮而忘記要排隊，此時，父母可以在一旁稍加提醒，不需要馬上大聲責罵。

二當孩子屢勸不聽的時候，可以請孩子到一旁。讓孩子成為最後一個，事後告訴孩子。不好好排隊就會更慢，和孩子分析結果、得失。讓孩子自行評估。

三必要時將孩子帶離現場，暫時禁止活動，讓孩子了解排隊、守秩序的重要性。

生活提醒

越來越多家庭到了假日會選擇去戶外享受露營、野炊的樂趣，讓孩子有機會到戶外活動。不過，要提防孩子因為玩太而跌倒、擦傷。甚至是出意外。

一 孩子一定要在大人的視線範圍內活動。

二 如果大人在搭帳棚、生火，一定要有一個成年人專心留意孩子的動向。

三 提醒孩子不要在營地亂跑、亂竄，以免遭鄰近帳篷的營繩、營釘絆倒。

四 大人可以準備一個哨子，當孩子跑離開視線的時候，可吹哨示警。

五 大人要教導孩子注意危險，例如不可以隨意碰觸火源、不可單獨去玩水。

六 大人開車帶孩子去戶外，要記得讓孩子坐安全座椅，座椅要固定，且要符合小孩身高、體重標準。

七 禁止讓兒童獨留在車內、池塘邊、河邊、海邊等危險區域。

生病照護

腸病毒感染是有季節性，好發族群為五歲以下的幼兒。孩子進入幼兒園後，腸病毒交叉感染是許多家長、幼兒園師生的大夢魘。如果同一班級在一週內有兩名以上孩童感染腸病毒，就要停課一星期。所以，一定要特別注意。

一 大人身上也可能帶有腸病毒，所以大人小孩都要落實勤洗手。大人工作回家後，務必先更衣洗手再接觸孩子。

二 如果孩子出現不舒服症狀，最好避免再將小孩送到幼兒園而造成病毒四處傳播。

三 多觀察孩子的口腔、手掌、腳掌、臀部或膝蓋是否有稍微突出的紅疹，一旦發現可疑跡象，一定要讓醫師進行鑑別診斷。

四 若孩子確診腸病毒，要立刻通知幼兒園園方，並讓孩子在家隔離一星期，園方也要進行全面性的消毒。

來源：幼兒3歲 第24週：小孩要不要吃營養補充品 三大觀察重點！

幼兒三歲第二十四週：小孩要不要吃營養補充品 三大觀察重點！

整體發展

一般來說，三歲多的孩子，視力多半在五到六。而弱視、斜視、近視、遠視與散光等，都是小孩常見視力問題。在六

歲前是治療斜視、弱視的關鍵期，所以。爸媽要留心孩子的視力發展。

有些視力問題一開始沒有明顯症狀，很容易輕忽，所以建議孩子在三歲半到四歲間應至眼科接受視力檢查，每年定期檢查視力一到二次。孩子接受視力檢查之前，爸爸媽媽可以先教孩子辨別「」、「」等標示。如果幼童無法理解，切勿強迫。眼科醫護人員會引導，也有儀器可以檢查。

此外，用眼三十分鐘，要休息十分鐘，且避免長時間近距離用眼。每天看螢幕不要超過一小時。

進入幼兒園

三歲多的孩子，有些已進入幼兒園。當孩子開始在幼兒園學習，媽媽難免會擔心幼兒園的小朋友較多。小孩會不會容易生病。這時，爸爸媽媽可以這樣做：

一要讓孩子吃得均衡、睡得好，增加自己的免疫力。

二教導孩子正確的洗手觀念。

三幫助孩子養成良好的衛生習慣。

四如果有感冒症狀最好請假在家休息。

另外，如果幼兒園或社區有舉辦體能活動。或是舉行親子趣味競賽，爸爸媽媽可以把握機會。多參加這類活動，除了和孩子創造美好回憶。更重要的是，也能培養運動習慣。讓孩子體會運動帶來的種種好處，生活型態會比較健康。

飲食營養

孩子瘦巴巴都長不高可以靠營養品彌補不足嗎？事實上孩子的營養補充仍需以天然食物為優先喔！但若對於孩子的營養補充有疑慮該怎麼辦呢？可依照以下幾點觀察，並尋求醫師評估，再讓孩子補充相關營養素：

一成長速度緩慢：成長曲線落在第三到九十七百分位之外，或是成長速度突然驟慢。

二生病：若孩子生病需先找出病因並對症下藥，之後可請醫師評估是否需額外補充營養品。

三嚴重偏挑食：若孩子食慾差、六大類食物攝取不足造成營養不均衡，可請醫師或營養師針對缺乏成分補充。

來源：幼兒3歲 第26週：孩子愛吃手怎麼辦？

幼兒三歲第二十六週：孩子愛吃手怎麼辦？

教養難題

孩子小的時候可能會有吃手的習慣，但如果到了三歲多還在吃手，爸爸媽媽該怎麼辦呢？首先要先找出可能的原因：

一 生理現象造成

二 焦慮情緒引起

三 吸引爸媽注意

四 上述行為衍生為習慣行為

如果是手指痛、指甲有皮屑等生理現象造成小孩吃手，就要幫助孩子改善這些生理因素。若是焦慮引起，透過良好品質的親子對話與傾聽。找出孩子焦慮的地方，陪伴孩子渡過與克服。降低因焦慮因素而吃手。

有些三歲多的孩子吃手是想吸引爸媽的注意，所以可以轉移孩子的注意力。例如請小孩幫忙拿點東西或做點家事，或陪伴孩子玩需要雙手動作的遊戲。像剪紙、玩黏土，都是很好的活動。如果孩子吃手時，也可以告訴他手太髒了或是手上會有細菌。如果吃了會生病喔！

生病照護

夏天時，要特別留意細菌性腸胃炎，多半會因為接觸受污染的食物、飲品而感染。

症狀包括腹瀉、噁心、嘔吐、腹痛、發燒等，有時會伴隨血便或黏液便，此時除了補充水分清淡飲食外，記得一定要就醫。如果症狀輕微可能會持續一、二天，嚴重時可能持續七至十天。平時飲用水最好要煮沸處理，避免飲用生水。而且不要讓孩子吃生食，如果無法確認食物新鮮。也最好不要讓孩子食用。飯前及如廁後，都要提醒孩子洗手。

另外，也不要摸蛋殼。蛋殼上面會有殘留的沙門氏菌，如果孩子摸了又沒有徹底洗手。又在吃手或吃東西的話，就有可能間接把細菌吃下肚。所以摸完雞蛋之後一定要洗手！

預防接種

每年十月就是流感疫苗開打的季節，爸媽記得按時帶孩子前往接種疫苗。八歲以下，初次接種時須間隔四週後施打第二劑。之後則每年施打一劑即可，不過為什麼每年都需要施打流感疫苗呢？這是因為流感病毒容易產生變異，幾乎每年的流行病毒株都略有不同，每年定期施打才能對抗相對應的病毒。

另外部分孩子施打後可能會產生注射部位疼痛、紅腫、輕微肌肉痠痛等狀況，但多數可於一到二天內恢復，若仍感到不適則需盡快就醫。

來源：幼兒3歲 第28週：3歲孩子建議的運動量

幼兒三歲第二十八週：三歲孩子建議的運動量

整體發展

當小孩到了三歲半之後，小肌肉發展越來越純熟，有些精細動作也可以做得很好。這時，孩子已經會拿筆模仿畫圈圈、畫直線，也會模仿別人做摺紙的動作。但如果發現小孩這些動作有點卡卡，小肌肉協調性似乎不夠，爸爸媽媽可以這樣幫助孩子。

可以讓小孩多玩黏土，像是用手掌將黏土壓扁。做成餅皮，上面再加上用手指搓成的小圓球。或是用手指捏成一長條一長條，像豆干一樣的形狀。多做幾個，就會做成一份黏土料理。

這項活動不僅可以提升動作的穩定性，也可以幫助發展手部小肌肉力量。但也提醒爸媽，如果發現小孩的進步有限。就要帶孩子接受專業評估，知道真正原因。這樣才能找到正確改善方法。

飲食營養

三歲多的孩子，一日蔬菜建議量為二份。一份蔬菜量為煮熟後約吃飯碗的半碗或一碟直徑十五公分的盤子份量，但如果是像莧菜、地瓜葉這種煮過後會收縮得比較小的蔬菜。則建議碗的比率要佔到三分之二，份量才會足夠。

蔬菜除了煮熟外，爸爸媽媽可能會想問，三歲多的小孩適合吃生菜嗎？生菜如果洗得不乾淨，容易有感染風險。像國外就曾發生生菜遭大腸桿菌污染事件，小孩腸胃比較敏感、脆弱。建議還是不要吃生菜比較好，可以等五歲後再考慮食用。若真的要吃，也要確保蔬菜的來源、避免農藥殘留及用飲用水清洗乾淨。

生活提醒

對於三歲多的孩子來說，運動是非常重要的。每天運動量建議為二到三小時，五歲後。中等費力以上的活動每日一小時。

要留意的是，小孩在幼兒時期如果做太多跑跳、舉重物等動作。容易產生慢性傷害，因此。無論是跑步、棒球、足球或游泳、體操、舞蹈等運動，都以啟發性為主。活動時間要適量為宜、循序漸進，爸爸媽媽不要太看重成果。重點是在培養小孩運動的習慣，不要過度操練。進行這些活動時，也要留意孩子的安全，例如是否有穿上球鞋、不可單獨一個人離開大人去游泳等。

來源：幼兒3歲 第2週：孩子3歲了！重要發展指標

幼兒三歲第二週：孩子三歲了！重要發展指標

整體發展

孩子終於進入了三歲，又邁入下一個新階段。這時候，媽咪會發現。孩子的很多動作都成熟許多，但對於三歲多的孩子。什麼動作是重要的觀察指標呢？建議媽咪可以觀察孩子上下樓梯的樣子。

這時，小孩即使沒有大人牽著、沒有扶著欄杆。也能自己一階一階的上下樓梯，還有一個很重要的發展警訊指標。就是孩子下樓梯走到最後一階時，他會有能力用雙腳跳下來。如果無法做到這點，就要趕快帶孩子接受專業評估。

在孩子三歲以前，父母平時就可以帶孩子練習跳的動作。例如像跳房子就是不錯的遊戲，如果父母發現孩子三歲時還是跳不好、平衡感很差。很容易就會跌倒，讓小孩接受專業評估。才能盡快找出背後原因，再針對不同原因進行介入、早療。

所以，請爸媽平時習慣做好兒童健康手冊的家長紀錄事項、健康檢查紀錄，如果未達標準，需請教醫師的意見。

教養建議

爸爸媽媽都希望小孩從小養成主動做事的習慣，將來學習態度上也可以更積極進取，而不是大人三催四請才開始動作，那要怎麼做呢？以下這些做法值得參考：

一爸爸媽媽可以閱讀兒童發展書籍，了解不同階段的成長及溝通方式，和孩子有良性的互動，也可以多鼓勵孩子嘗試新的事物。

二多增加孩子的自信心，培養孩子養成主動、積極的好習慣。

此外，三歲多的孩子常有一大堆的問題，很喜歡問「為什麼？」請爸媽不要忽視孩子的問題，可以引導孩子找尋答案。透過身教與言教，讓孩子體會學習的樂趣。孩子遇到問題時也比較不會退縮，也更能接受不同的挑戰。

進入幼兒園

孩子三歲了該上學了嗎？還是再大一點會比較好呢？其實孩子幾歲上幼兒園沒有標準答案，爸爸媽媽可以依自身的需求及觀察孩子的表現，再來做考慮，以下是七項觀察指標：

一經常一個人喊無聊，希望有人可以陪他玩

二孩子有能力與他人互動、對話、了解別人的意思

三孩子喜歡與同年齡的小孩交流、互動

四 孩子已具有基本的生活自理能力

五 詢問孩子是否想上學時，孩子是有意願的

六 家中已有哥哥姊姊在上學，可以到同一個幼兒園入學

七 察覺孩子有疑似發展遲緩的跡象時，可以借助幼兒園同儕的刺激。促進發展，但若經評估狀況較嚴重。就不建議先進幼兒園。

來源：幼兒3歲 第30週：孩子感染急性結膜炎，怎麼辦？

幼兒三歲第三十週：孩子感染急性結膜炎，怎麼辦？

進入幼兒園

小孩三歲多剛進入幼兒園，爸爸媽媽會想了解孩子在園內的狀況。這時候或許會想用等通訊軟體聯絡老師，不過。不知道是否恰當？其實幼兒園的老師一天要面對十多個孩子，而且需要專注力。所以，不建議用聯絡。老師也可能無法及時回覆，如果家長有需要溝通的問題。可以利用接孩子回家的時間和老師面對面討論。

此外，用等通訊軟體。因為是文字呈現，溝通方面可能缺少溫度。有時候打字太急也可能造成誤會，通常幼兒園都會有聯絡本。這也是一個家長可以利用的溝通管道。

生活提醒

爸爸媽媽都知道親子共讀的好處，與孩子一起讀書的時候。要記得幼童的專注力很短，可能讀一下書就分心。這時爸爸媽媽要有耐心，閱讀的方法、聲音也可以嘗試多轉變。孩子會更樂於參與，即使每天五到十分鐘也可以喔～

許多孩子會一直要求講同樣的故事，可能是很喜歡故事中的某些情節。重複閱讀，小孩更能深刻感受故事中的有趣情節。還有其中的意義，親子共讀的重點是「重質不重量」。就算重複說一樣的故事，也是有好處。重點在於，要讓孩子想要閱讀。也喜歡聽故事。

生病照護

孩子最近一直說眼睛不舒服，不但眼睛紅紅的，還有黃黃的分泌物，看了醫師後發現是急性結膜炎。

急性結膜炎主要是濾過性病毒所致，夏天帶孩子去游泳池或海水浴場玩水或是日常物品中接觸到病毒，都可能被感染。

預防方法就是多洗手、不要共用毛巾、盡量不要用手摸眼睛。然後要依醫師的指示點藥，不可以自行購買藥物來使用。擦拭眼睛分泌物時，要用紗布或衛生紙。用後就丟

棄，勿用手帕反覆擦。以免感染更嚴重。

來源：幼兒3歲 第32週：外出用餐注意事項

幼兒三歲第三十二週：外出用餐注意事項

整體發展

小孩過了三歲半，在「身邊處理與社會性」的發展上，已經可以自己穿衣服，也會和同伴一起玩遊戲。但有些孩子比較內向、害羞，很少和同伴一起玩遊戲，父母可以如何引導呢？

一般來說，內向、害羞的小孩如果想交朋友。需要一點暖身的時間，爸爸媽媽不要太過心急。可以安排一些活動，讓孩子有接觸同儕的機會。以尊重孩子的意願為前提，增加頻率。這樣自己的寶貝才能與較熟悉的小孩交朋友、建立友誼。

生活提醒

有些三歲半的孩子非常活潑、好動，所以在浴室洗澡、上廁所時，爸爸媽媽要提醒小孩注意以下六點：

一 在浴室的時候，不要嬉鬧、奔跑，動作要放慢

二 不可攀爬洗手台，也不要重壓洗手台。有些老舊洗手台下方沒有支撐，如果重壓。很容易垮掉、碎裂，造成危險。

三 洗澡時手一定要扶好，才不會跌倒。

四 浴缸、澡盆試水溫的時候，要用手稍微摸一下，而不是直接一腳就踩進水裡。

五 水龍頭、蓮蓬頭打開水的時候，要確保水溫是冷水或溫水。之後再做水溫調整，提醒孩子了解水溫如果一開始設在熱水。馬上打開有可能會燙傷。

六 留意浴室的止滑墊也可能還是會滑，移動時仍要小心。

七 即使浴缸裡的水很少，也絕對不可以讓孩子單獨留在浴室。

飲食營養

小孩在三歲後，爸爸媽媽就可以開始訂立簡單的餐桌禮儀。當孩子確實遵循的時候，可以誇獎他。帶小孩出門用餐，如果要選擇餐廳。建議考量以下幾點：

一 安全性：有些餐廳販售的是火鍋，或較為滾燙的菜餚。小孩不可在餐廳奔跑、玩耍，或者有些餐廳設有高價位裝飾品。也要提醒小孩不可隨意觸碰，避免引起毀損糾紛

。

二 衛生：小孩的腸胃道比較敏感、脆弱，所以環境是否衛生。是重要的考量點，點菜時。也要避免選擇生食類菜餚。另外，小孩的手若摸過雞蛋或生肉、生海鮮，一定要馬上洗手。

三 餐廳環境：餐廳環境太暗或者太羅曼蒂克的氣氛，並不適合小孩。因為小孩可能會不小心撞到物品，所以建議選擇寬敞、明亮的餐廳。會比較適合。

來源：幼兒3歲 第34週：教導孩子物品所有權的概念

幼兒三歲第三十四週：教導孩子物品所有權的概念

整體發展

三歲半後，小孩的語言和認知發展已經更進步了。可以精確表達東西是「你的」，還是「我的」。但有些孩子對「物權」的概念，還不是很清楚。看到喜歡的東西，即使不是自己的。也會想拿走，爸爸媽媽遇到這種狀況。該怎麼辦？

這時候，大人要教導孩子。每個物品都是有主人的喔～要教導孩子對於其他人的東西不可摸、隨意拿走，如果想借或想玩。要先有禮貌地詢問，如果別人不借。也要尊重對方。

此外，平常和孩子相處。也要尊重孩子對物品的所有權，讓孩子感覺自己的權益受到保障。大人本身要以身作則，孩子才不會無所適從。

生活提醒

每次為小孩選擇玩具，怎麼好像一下子就玩膩了，該怎麼為孩子挑選玩具？

孩子在不同階段，能力不同。適合的玩具當然也不一樣，爸媽可以看一下玩具的建議年齡。另外，同樣類型的玩具除非孩子喜歡或是想要收集一系列。否則不要買太多，購買玩具時也可以和孩子討論他是否喜歡。而在玩玩具過程中，爸媽也可以先思考一下有沒有不同的趣味玩法。引導孩子換個方式來玩。

生病照護

當孩子有異位性皮膚炎的問題，爸媽會很在意飲食問題，孩子有沒有什麼食物不能吃？

實際上，台灣的過敏兒。過敏因素多以環境為主，食物引起的過敏相對較少。如果小孩患有異位性皮膚炎，的確較容易有食物過敏的情況。常見容易誘發過敏的食物包括花生、牛奶、蛋、小麥與帶殼類海鮮、帶毛類的水果、堅果類（核桃、杏仁、巧克力等）等食物。

即使如此，家長也不需要因噎廢食。因為不是這些食物就一定會引起過敏，只要孩子吃過這些食物沒有出現異位性皮膚炎症狀或是急性蕁麻疹。這些食物就可以放心食用，仍有疑慮的話。可以諮詢專業的小兒過敏專科醫師。

來源：幼兒3歲 第36週：當孩子罵髒話，怎麼辦？

幼兒三歲第三十六週：當孩子罵髒話，怎麼辦？

教養難題

沒想到天真、可愛的小寶貝，竟然會罵髒話，當聽到小寶貝罵髒話，爸爸媽媽該怎麼教養呢？

有時候，三歲多的孩子罵髒話。只是想表達憤怒情緒，孩子不見得了解髒話真正的意思。爸爸媽媽要先釐清孩子真正想表達的意思，並了解髒話背後的情緒。可協助孩子處理情緒，像先走開。或先到別的地方冷靜一下。

爸爸媽媽可教導孩子以適當的語言方式表達，也要讓孩子知道。講髒話是沒禮貌的行為，若孩子偶爾講出口。爸爸媽媽可以用眼神、手勢制止，讓小孩覺得沒有新鮮感。或是爸媽不喜歡，慢慢就會改善。當然大人本身也要更加謹言慎行，以免孩子學習。

生活提醒

「小寶貝現在已經可以握筆寫字嗎？」許多爸爸媽媽可能有這樣的疑惑。事實上，小孩現在的手部小肌肉運用技巧、空間概念等。都還沒有完全發展成熟，所以還無法握筆寫字。但爸爸媽媽可以運用一些遊戲幫助小孩累積往後握筆寫字的能力。

可以運用「對話式共讀」技巧和小孩一邊閱讀繪本一邊聊天，然後引導小孩用手指順著閱讀繪本中的文字或圖畫前進，或者也可以玩紙上迷宮，用手指順著紙上迷宮闖關。另外，鼓勵孩子拿蠟筆、色筆等塗鴉，也是不錯的活動。

生病照護

當小孩不小心燙傷，皮膚出現水泡，這時水泡該不該弄破呢？如果水泡直徑小於一公分，多半是淺二度燙傷造成。不需要弄破，水泡會被身體自行吸收。但水泡如果超過七十二小時還沒有變小，也沒有被吸收。可至醫療院所評估治療。

來源：幼兒3歲 第38週：當孩子不睡覺可以這麼做

幼兒三歲第三十八週：當孩子不睡覺可以這麼做

教養難題

小孩隔天一大早就上幼兒園，卻經常不肯準時上床睡覺，讓人好頭痛。

三歲多的小孩不肯上床睡覺，除了貪玩。有時是因為孩子觀察到爸爸媽媽要他早點睡覺，但爸媽自己卻沒有同步就寢。他可能會覺得只有自己要先睡不公平。

想讓小孩準時睡覺，應注意以下五點：

一 孩子睡覺前，留意家庭氣氛是否非常忙亂？如果睡前過程很急促，孩子情緒也會很高漲，自然沒辦法安心睡覺。

二 睡覺前不要讓他再接觸三產品，包括看電視，以免睡眠受到干擾。

三 可帶孩子進行一些靜態活動，如有宗教信仰。可以在睡覺前禱告，或者聽些柔和的音樂、互道晚安等。氣氛沉靜下來，小孩較容易入睡。

四 建立睡眠儀式，例如：洗澡刷牙念故事睡覺。每個孩子家庭都可以有自己的睡眠儀式，讓孩子知道。唸完故事後就要睡覺了。

五 午睡不要睡太久以免影響晚上睡覺，還有白天多一點耗體力的戶外活動，晚上也許會比較好睡。

生活提醒

爸爸、媽媽要提醒孩子，不要接觸家中打火機或火源，以免發生失火意外，也最好將這些物品收好。事實上，燙傷意外不只發生在家中，家門外也隱藏燒燙傷危機！大人帶小孩到戶外時，要注意以下四項燒燙傷危機：

一 有些摩托車的排氣管很滾燙，爸爸媽媽帶小孩走在路上。或騎乘摩托車的時候，要留意摩托車的排氣管位置。以避免被排氣管高溫傷害。

二 如果去廟裡燒香、拜拜，要留意被燃燒的香戳到，也不要太靠近燒紙錢的地方，以免火星跑到小孩眼睛。

三 走在路上時，要注意有沒有人手上夾著燃燒的香菸。因為小朋友身高並不高，如果太靠近。香菸可能不慎碰到小朋友的眼睛、皮膚，非常危險。

四 夏天小孩去公園玩的時候，爸爸媽媽要先用手摸摸看溜滑梯或金屬遊具。了解遊具溫度，避免遊具已被曬到溫度過高。造成小孩燙傷危機。

預防接種

三歲的孩子除了要定期施打流感疫苗外，也需定期塗氟

喔！

目前衛生福利部補助未滿六歲兒童牙齒塗氟以降低蛀牙風險，爸媽定期帶孩子前往牙科診所做檢查。包括口腔清潔、檢查是否蛀牙、安排塗氟，而塗氟後半小時需避免飲食、漱口。才可以有效讓牙齒吸收氟化物。

來源：幼兒3歲 第40週：孩子的說話歷程指標？

幼兒三歲第四十週：孩子的說話歷程指標？

整體發展

一般來說，三到四歲的孩子已經可以和其他人持續進行一問一答的對話。問問題或回答問題的時候，可以用兩到三個單詞所組成的短句作為對話內容。且回答問題時，回覆的內容也都很切題。像詢問小孩：「你要去哪裡？」，小孩可能回答：「我要去找媽媽！」之類。

在孩子的生長歷程中，這也是一個重要的發展指標。如果三到四歲的孩子還沒有這樣的能力，建議除了多運用「對話式共讀」技巧與孩子一起閱讀繪本、練習對話。家長也需要帶孩子接受專業評估，以了解是否有語言發展問題。

進入幼兒園

「孩子明明就會自己上廁所，為什麼到幼兒園，卻還會尿褲子？」當爸爸媽媽發現小寶貝有這樣的問題，會覺得很困擾。如果小孩原本會上廁所，上幼兒園後行為卻倒退。爸爸媽媽不要責罵他，或表現出嫌惡、不耐煩。這樣容易造成小孩心理壓力，情況可能會更嚴重。爸爸媽媽可以先和老師討論孩子尿褲子的原因，思考一下孩子最近有沒有遇上新的壓力。或生活是否有重大變化，還是在幼兒園的時候曾經尿褲子被同學嘲笑。或是在意廁所不是很乾淨等，或是害怕想要尿尿卻不敢說。嘗試找出原因，再請老師多給予關懷。提醒孩子要定時如廁，如果不小心尿褲子了。老師也可以帶著小孩一起清理身體、衣物，並將地面清潔乾淨。盡量以平常心看待。

生病照護

三歲多的孩子喜歡蹦蹦跳跳，萬一不小心扭傷腳踝，該怎麼處理呢？

新觀念認為要採取，

屬於急性期

處理原則，

屬於恢復期

處理原則：

：保護，減少出血、再次受傷機率

：提高受傷部位肢體

-：避免使用消炎藥

：加壓，使用繃帶給患部壓力

：正確衛教觀念

：適當活動以促進復原

：保持樂觀心情

：保持血液循環暢通

：透過適當運動恢復關節活動能力

此外，輕度扭傷時建議應先冰敷。每次冰敷十分鐘，再移開二十分鐘。接著再重複動作，而六小時後就不再冰敷。不過若是扭傷較嚴重，記得要去找醫師評估是否有合併骨折現象以及開立緩解扭傷不適的藥物喔～

來源：幼兒3歲 第42週：學齡前孩子的才藝培養

幼兒三歲第四十二週：學齡前孩子的才藝培養

教養難題

孩子三歲多，感覺對畫畫很有興趣，不知道要不要送他去學畫；還是她很喜歡唱唱跳跳，要不要讓孩子去上律動課？

望子成龍、望女成鳳，有些父母會想著如果及早栽培，說不定將來會不同凡響，其實最後可能期望越高、失望越大。學齡前如果想讓孩子學才藝，建議抱持培養好奇心、了解孩子興趣、交朋友、增加活動量等角度出發，不要從「成果」、「表現」來要求孩子，以免造成壓力。

進入幼兒園

進入幼兒園孩子會交到新朋友，也喜歡和朋友做一樣的事、說相同的話，爸媽卻發現孩子學會了一些不好的行為。

建議爸媽可以先觀察一段時間，也詢問孩子為什麼會這樣說、或是這樣做。如果是不對的行為，例如：罵髒話。爸媽可以告訴孩子，這是不好的話。你要告訴好朋友不可以這樣說，如果狀況一直無法改善可以先和老師溝通看看。幫助孩子和他的朋友一起來解決問題。

如果實在無法改善，也可以請問老師是否讓孩子嘗試多

接觸別的小朋友，最後選擇才是考慮轉換班級或學校。

生活提醒

爸爸媽媽喜歡帶小孩去公園玩，尤其是玩溜滑梯，不過，在玩耍時有些細節要特別注意！

一玩溜滑梯之前，爸爸媽媽應該先看一下告示牌上的適合年齡建議。通常大人都不適宜，所以。請爸媽不要抱著孩子一起玩溜滑梯。

二爸媽要留意小孩的穿著，檢查看看衣服是否有細繩或連帽設計。避免這些細繩造成拉扯危機，如果有帶平安符或項鍊。也要小心繩子勾住的意外，建議穿合身、舒適、裝飾少的衣物。

三小孩玩溜滑梯的時候，大人要在一旁陪伴，如果是封閉式溜滑梯設計，要觀察小孩是否有順利溜下來。

四使用設施前先看一下有沒有損壞，像有沒有裂痕、滑梯平台會不會晃動，溜滑梯的溜面部分，也要檢查一下有沒有碎石子等危險物品。

五無論在公園或在家裡，都不可以讓小孩獨處，或讓未成年的孩子照顧小小孩。

來源：幼兒3歲 第46週：孩子發音不標準怎麼辦？

幼兒三歲第四十六週：孩子發音不標準怎麼辦？

整體發展

小孩到了三歲半至四歲，語言能力與口語發音已趨於成熟。當爸爸媽媽發現孩子講話仍然有「臭奶呆」（台語，發音不標準）。或者會突然停頓、重複發同一個單字，可能代表孩子的語言發展有些落差。爸爸媽媽在家裡也可以用一些小技巧來增進孩子的口語發音。

一讓孩子嘗試不同種類、口感的食物。

二可陪孩子玩吹泡泡或吹蠟燭的遊戲。

三教孩子用嘴唇、舌頭製造各種不同的聲音。

四常傾聽、陪孩子聊天，或進行對話式親子共讀。

如果構音技巧遲遲無法獲得改善，建議請醫師做評估。

生病照護

「小寶太愛吃糖果，結果乳牙蛀了好幾顆。以前去看過牙醫因為哭鬧不停，所以。爸媽也沒有好好再帶他去治療，沒想到竟然演變成蜂窩性組織炎。」

小孩如果蛀牙太嚴重，有可能會侵蝕到牙髓腔，造成牙髓發炎、壞死及細菌增生，導致局部膿瘍或蜂窩性組織炎。如果家長發現孩子蛀牙出現紅、腫、熱、痛，或是臉部出現腫脹等現象。一定要盡快就醫，蜂窩性組織炎沒有好好治療。甚至會引起敗血症。

平時除了要留意牙齒保健，也要定期檢查，不要等到蛀牙了才看醫師。如果孩子很怕看牙醫，也可以打聽看看比較有耐心的兒童牙醫。

生活提醒

帶孩子出門時，可以提醒孩子注意「馬路如虎口」，以及學習如何安全過馬路。

一等候三大步：等待過馬路的時候，不要太靠近人行道邊緣。應該往後退三大步，留一些安全距離。以免遭車子碰撞。

二起步三動作：要通過馬路的時候，教導孩子先往左邊看，再往右邊看，確認兩個方向都沒有車子過來再跟著大人前進。

三不可以突然放開大人的手：過馬路時，要牽著大人的手，不可以突然甩開大人的手向前衝。

四專心向前走：提醒小朋友觀察小綠人，看見小綠人時表示可以前進，而且過馬路時候要專心前進、不要嬉鬧。

來源：幼兒3歲 第48週：如何改善孩子忘東忘西的問題喔？

幼兒三歲第四十八週：如何改善孩子忘東忘西的問題喔？

教養難題

小孩老是忘東忘西，好像怎麼叮嚀都沒用。讓爸爸媽媽很傷腦筋，要如何讓孩子負起責任。不再忘東忘西。

一指令或要求要簡短扼要，每次下指令。句子只要一、二句，重點訊息不要太複雜。孩子才不會混淆、搞錯。

二外出時買東西時也可以請孩子幫助記一兩樣的物品，讓孩子學習記得事情。

三生活中養成一些固定的習慣，例如：東西要物歸原處、每天要整理玩具、回家後要先把衣服掛在小衣架上，讓孩子有良好的生活習慣，就不會一天到晚找不到東西。

四常忘記的東西就提醒孩子每次都要再次檢查及確認，例如：總是忘了帶水壺回家，就提醒孩子每天回家前要檢查一下水壺帶了沒。

在日常生活中，如果是剪刀等危險物品。也要提醒孩子注意安全，應盡量放置於高處或鎖在櫥櫃。

以免小孩忘記而亂放、亂用，造成危險。

生活提醒

帶小寶貝去公園玩盪鞦韆，是很開心的事情。不過要留意，盪鞦韆若方式不對。也可能產生意外傷害！

一要注意孩子的盪鞦韆高度與前後是否有障礙物，鞦韆前後、左右都要保持淨空。別人在盪鞦韆時，小朋友也不可從附近走過去。才不會被撞倒。

二家長要告訴小孩正確玩法，請小孩用正常的方式來玩鞦韆，避免兩個小朋友擠在一起盪或是改成左右搖晃的方式。

三家長要提醒孩子，玩盪鞦韆的時候，手一定要抓穩兩邊繩子或鍊子，不可突然放開或跳下來。

四家長幫小孩推鞦韆時，也要留意一下力道，避免擺動幅度過大。

飲食營養

「小孩吃宵夜，這樣好嗎？」、「如果小孩睡覺前肚子餓，吃什麼食物會比較好？」有些家長或許會有這樣的疑惑。

對於四歲的孩子而言，吃宵夜會影響腸胃消化、容易干擾睡眠。也可能因飲食過量造成肥胖風險，建議能免則免。不過，如果小孩很餓可以考慮吃以下幾種食物：

一 一杯溫牛奶。

二 富含纖維質的香蕉。

三 可以讓人產生飽足感的雜糧類食物，像一小塊烤地瓜或牛奶麥片等。

四 富含礦物質鈣、鎂的水果乾。

另外，要提醒小孩吃過宵夜後，要記得刷牙，才不會增加蛀牙風險。

來源：幼兒3歲 第4週：上幼兒園前需具備的四種基本能力

幼兒三歲第四週：上幼兒園前需具備的四種基本能力

整體發展

孩子三歲後平衡感會越來越好，爸爸媽媽會發現。孩子已經可以在不扶東西的狀態下用單腳站立幾秒，甚至可以

單腳跳。若孩子的平衡感不好，有什麼引導方法？

大人可以用遊戲的方式鼓勵孩子平衡感的練習，例如行走平衡木、走地上的線、跨越障礙物、跳過固定高度的繩索或是輪胎。或者在公園的時候，也可以讓孩子學習小馬跑跳的姿勢。讓孩子一邊走、一邊跳也能學習如何平衡身體，當平衡感變得更好。就可以嘗試騎三輪車、滑板車，這時要記得讓孩子戴上安全帽喔！

爸爸、媽媽要知道，小孩到了三歲多。能不能騎三輪車前進，是一項很重要的發展警訊指標。若發現小孩經過引導、鼓勵與練習後，平衡感還是一直很差。一直學不會踩三輪車或踩有輔助輪的腳踏車前進，那可能就是動作發展警訊。建議帶孩子接受醫師專業評估。

進入幼兒園

爸爸媽媽應該很好奇，三歲多的孩子如果準備要進入幼兒園，事先需要具備哪些能力？不少園長、老師認為，小孩在就讀幼兒園之前，應該要具備以下四種能力：

一與其他人溝通、表達需求的能力：如果孩子可以用語言表達自己的需求，像「我要尿尿！」、「我想媽媽！」等，幼兒園老師就能了解孩子的想法，協助幫忙解決問題，孩子適應幼兒園的時間也會比較短。

二基本生活自理的能力：像自己上廁所、用湯匙吃飯、穿脫寬鬆的衣服或是收拾用過的物品、椅子用過會靠好等，都屬於基本生活的能力。

三正常的作息與足夠的體力：小孩如果睡不飽、常遲到，生活作息混亂，就無法跟上幼兒園的學習進度，比較不容易融入團體。

四基本的認知能力：三歲以上的孩子如果可以辨別男女、顏色、輕重，並有一些簡單的數量、形狀概念。上幼兒園的時候，就會比較容易適應幼兒園生活。也較能理解幼兒園的生活規則。

飲食營養

小孩適量攝取乳製品，可以獲得鈣質等營養素。對生長很有好處，但孩子如果對奶類過敏。或因疾病因素無法喝牛奶、吃乳製品，該怎麼辦呢？這時可以選擇蝦米、小魚干、五香豆干、傳統豆腐、芥藍菜或綠豆芽等含鈣量較高的食物，另外也需注意維生素的攝取，維生素可促進鈣質的吸收，必要時也可以諮詢醫師建議做營養評估。

來源：幼兒3歲 第6週：觀察寶貝的「精細動作」熟練度

幼兒三歲第六週：觀察寶貝的「精細動作」熟練度

整體發展

看到三歲多的孩子玩積木時懂得將積木慢慢堆疊起來，或者會一頁一頁翻著圖畫書，還會畫圓形，就會感受到孩子在精細動作方面更加成長了。此外，這時候的孩子也已經會用湯匙吃東西，食物很少溢出來，也會拉拉鏈、扣扣子。

爸爸、媽媽也要注意，如果孩子到的三歲多。還不會用湯匙好好吃東西，食物常會溢出來。這就是發展警訊，一定要盡快帶孩子接受評估。不要延遲囉！

當發現孩子的精細動作還不夠穩定，爸爸媽媽也可以這麼做喔！在練習的過程中，孩子的精細動作會越來越熟練。

一 鼓勵孩子玩串珠、撿豆豆、貼貼紙、使用剪刀剪紙或摺紙。

二 讓孩子握筆練習畫直線、橫線、圓形。

三 平常可以請孩子一起做家事，像使用衣夾子夾衣服，或請孩子收拾玩具等。

教養難題

二、三歲的孩子，處在人生第一個叛逆期階段，有些孩子的情緒起伏很大，或者喜歡測試大人的底線。這些行為都讓爸爸媽媽很頭痛。面對孩子不斷出招，爸爸媽媽的回應就更需要智慧。

建議「責罵孩子時，把重點放在『行為』」。且可以協助孩子說出自己的需求與感受，此外。也可以給予孩子選擇的機會，給孩子一些時間去調整。或者讓孩子轉移注意力，讓彼此的壓力可以獲得紓解。如果禁止孩子做某些危險的事情，除了要溫和的堅持原則。也要告知禁止背後的原因，同時也要接納孩子的情緒。當孩子的情緒得到支持與接納，就會穩定許多。

生活提醒

這個階段的孩子，做事有時候很衝動。或是有點粗魯，例如看到桌上有好吃的食物。就會衝過去伸手抓，或是想要直接整碗端過來。所以，要特別小心燒燙傷的危險。最好不要使用長桌巾，如果有剛煮好的食物。也要告知孩子，這個非常燙要注意。平時也要提醒孩子，喝水或喝湯前。如果不確定冷熱，要先小口測試。才不會燙傷。

來源：幼兒3歲 第8週：遠離氣喘的四項要點

幼兒三歲第八週：遠離氣喘的四項要點

進入幼兒園

如果寶貝已經做好上幼兒園的準備，爸爸媽媽挑選幼兒

園的時候，可以注意以下八個重點：

一 安排適當的時間參觀

二 查詢評鑑與裁罰紀錄

三 了解上下學時間、學費與作息時間

四 了解學校的教學理念

五 確認班級師生比，要注意是否超收

六 觀察教室、廁所與廚房等活動空間配置

七 觀察幼兒園環境的安全性

八 觀察老師個性、品質與教學態度

飲食營養

孩子接觸的食物越來越多，尤其對不健康的零食、甜食特別有興趣。讓爸爸媽媽很頭痛，有什麼方法可以讓孩子不要太常吃這些零食、甜食。或是不要一出門就吵著要買零食、糖果？

首先，家中盡量不要存放這些食物，避免孩子隨手取得、隨口食用。此外，爸爸媽媽也要以身作則。不要自己邊看電視、聊天，就邊吃零食。對於孩子，也不要用品食當獎品。以免小孩受到零食、甜食的誘惑。平常外出時，可以幫孩子準備比較健康的點心，例如海苔、水果、吐司等，讓孩子降低買零食的慾望。

生病照護

不少孩子有氣喘的問題，以下六種情況隱含誘發氣喘危機，請家長要留心：

一 棉被、枕頭套與床墊等寢具經常超過二星期沒有清洗。

二 家中常堆放絨毛玩具

三 養貓、狗等寵物，而寵物在換毛期，或者寵物毛屑沒有定期清理

四 家中成員有抽菸的習慣

五 平常比較愛吃冰冷的食物

六 當天氣變化加劇，氣溫忽冷忽熱，沒有注意保暖

因此，想要避免孩子氣喘發作，應注意以下四點：

一 遠離過敏原，維持環境清潔：定期用攝氏五十五度的水

清洗寢具。不要堆放絨毛玩具，也盡量不要放置地毯。或使用布沙發。

二拒絕菸害：孩子若有氣喘體質，不管是二手菸或甚至接觸到三手菸，都很容易誘發氣喘，因此不要抽菸為宜。

三外出盡量戴口罩：讓有氣喘體質的孩子外出戴口罩，可以避免空氣汙染的刺激，也可避免因室內、室外溫差過大而刺激呼吸道，誘發氣喘。

四維持居家環境濕度在五十到六十%，以降低塵蟎黴菌等過敏原的孳生。

來源：幼兒B型肝炎追蹤檢查紀錄

幼兒型肝炎追蹤檢查紀錄

母親為型肝炎表面抗原（ $\circ$ ）陽性者，其寶寶應於出生後儘速注射一劑型肝炎免疫球蛋白（ $\circ$ ）及型肝炎疫苗。越早越好，不要晚於二十四小時。並應在完成第三劑型肝炎疫苗後，年齡滿十二個月大時進行型肝炎表面抗原（ $\circ$ ）及型肝炎表面抗體（ $-$ ）等檢測。若幼兒經檢驗已有抗體，則無需再接種。若無型肝炎表面抗原（陰性）及型肝炎表面抗體（ $-$ 陰性）者，可免費追加一劑型肝炎疫苗。一個月後再抽血檢驗抗體，若表面抗體仍為陰性。後續可於第一及第六個月提供公費疫苗接續完成第二、三劑。如經此補種仍無法產生抗體者，則無需再接種；但仍應採取型肝炎之相關預防措施，並定期追蹤型肝炎表面抗原（ $\circ$ ）之變化。

型肝炎表面抗原陽性之母親請攜帶孕婦健康手冊之「孕婦型肝炎檢查紀錄及追蹤表」等相關資料，提供臨床醫師，以為幼兒及 $-$ 檢測之參考資料。

型肝炎帶原者，若其肝功能正常，建議每六個月至一年追蹤一次；如肝功能異常，則由醫師決定其肝功能及超音波複檢時間。

來源：幼兒專責醫師制度「0-3歲幫您一起顧」

幼兒專責醫師制度「零到三歲幫您一起顧」

一百一十二年十一月一日起，新生兒全面納入幼兒專責醫師制度，由專責醫師來擔任寶寶的「醫療管家」！專責醫師會定期檢視零到三歲幼兒的生長發育與行為發展，並協助疫苗注射、預防保健、牙齒塗氟轉介等，提供全方位的整合性初級照護。

服務對象：未滿三歲之幼兒不分戶籍所在地、國籍就診時需攜健保卡、兒童健康手冊。

相關費用：不需支出額外費用惟醫療院所得酌收掛號費或政府尚未補助之自費疫苗費用另計。

幼兒專責醫師角色：擔任幼兒的「醫療管家」定期檢視幼

兒的生長發育與行為發展提供個人化的衛教及照護諮詢。

照顧範疇：預防保健、牙齒塗氟轉介等提供全方位的整合性初級照護。

特殊需求協助：協調轉介相關專業醫療院所提供早期療育、親職教養等資源必要時安排居家訪視。

如何選擇專責醫師：選擇平時看診熟悉或方便就診的醫療院所填寫家長通知函以獲得最適當的專業照護。

來源：幼兒為什麼不愛吃固體食物

幼兒為什麼不愛吃固體食物

一歲前後的寶寶常發生厭食情況，有些孩子在這個時期，會只喝奶不想吃固體食物，而出現明顯的「拒食」。寶寶長大後會對食物產生好惡，選擇也有其自我的主張。這些孩子中不乏精神活動力很好但生長遲緩，令父母十分擔心。因此尋求各種方法來改善，其中可能包括逼著孩子吃飯。但結果往往不如預期，有時反而造成親子關係緊張；幼兒期的拒食。除少數為生理因素引起，偏食和不愉快的用餐經驗常為主要原因。一方面可能是孩子過晚添加副食品，一方面是父母的餵食方式有問題。所以孩子習慣喝奶，而排斥固體食物。要改善這種情況，需從這兩種原因著手

一不要強迫餵食很多父母還會想依據嬰兒期時幾個小時餵一次奶，反而忽略孩子已經長大了。懂得自己是否餓了要吃東西，不要太過分注意小孩吃多少或吃了甚麼。吃多了不需太多的讚許，吃少了也不要太緊張或失望。讓小孩吃飯沒有壓力。

二用餐時要保持愉快的心情，讓他的食慾自然提升。孩子不吃，請將食物收起來，家中也不要存放太多零食讓孩子隨手可拿，當然也不要利用零食、甜點當作獎勵或要求孩子的條件。

三開始絕不能給他嫌惡的食物，過一段時間。待他胃口改善時，不動聲色的加上他較不拒絕的食物。或將他不喜歡的食材混在他喜歡的食物中，如將紅蘿蔔加在漢堡肉裡面。循序漸進；但當他仍然不喜歡吃時，亦不要勉強。免得再度使他厭食。上一餐不吃的東西，下一餐不要再為他準備。

四大人對食物不要給予好壞優劣之分，也不要讓小孩對一般食物抱有好壞的成見。

五增加食物的質地及種類依孩子喜好及吞嚥能力將食物準備成不同的口感和黏稠度，不要永遠都只有所有東西都煮在一起的排骨粥，可以增加軟麵條或將食物分開給予，可訓練孩子對食物味道的喜愛。

六 依據孩子的需求給食物，讓他自己吃，有時玩食物也是一種學習，不要吃不完就用餵的強迫吃掉。

七 孩子口渴時提供母乳或白開水，避免給予汽水、含糖飲料而影響佔據胃的空間。

總結

父母可依據上述建議改變飲食內容與形態，並可透過鼓勵、讚美孩子，提起孩子興趣而增加食量，必要時可適量補充礦物質（鐵、鈣等）和維生素。當孩子的食量減少十三以上或有身體不適時，才考慮找醫師處理。根據統計，一歲以內的嬰兒，約在四到六個月時會達到最高喝奶量，之後隨著副食品的添加而逐漸減少奶量。有些嬰兒，很早給予調味的副食品。或者因為好玩而餵以大人的飲食，但這些食物之口味較重。容易導致嬰兒口味改變，因此更會提早拒食。只要孩子有良好的活動力、正常的身高與體重成長，而且沒有發燒、嘔吐、腹瀉、貧血等症狀與徵候，父母不必太擔心。

來源：影響女性懷孕的子宮疾病：子宮肌瘤&子宮內膜異位症

影響女性懷孕的子宮疾病：子宮肌瘤子宮內膜異位症

子宮肌瘤是女性常見的骨盆腔腫瘤，雖然多屬良性，不過如果造成子宮內膜腔變形，恐影響胚胎著床。另一個好發於育齡女性的生殖系統疾病：子宮內膜異位症，也是不孕的因素之一。如果有子宮肌瘤、子宮內膜異位症，應積極就醫接受治療。不讓疾病影響懷孕計畫。

一 影響女性受孕疾病：子宮肌瘤

常見原因、症狀

造成子宮肌瘤的原因目前並不明確，但和生長激素、動情素的刺激，以及子宮長期處在緊張狀態等因素有關。常出現的症狀包括：

一月經過多、經期過長、經期疼痛：有子宮肌瘤的女性經期可能超過七天，經血量較多，甚至出現缺鐵性貧血，影響到生活、工作。不正常出血往往和肌瘤長的位置有關，例如長在子宮黏膜下，很容易導致異常出血。

二 骨盆壓迫造成不適：肌瘤長在特別位置，往前壓迫到膀胱可能引起頻尿。往後壓迫大腸，容易造成便秘。而壓迫到其他器官，也可能出現腫脹、悶痛情形。萬一子宮肌瘤造成子宮內膜腔變形，將影響胚胎著床而導致不孕。

如何治療？

由於子宮肌瘤多屬良性腫瘤，只要無任何症狀，定期接受超音波追蹤檢查即可。一旦出現症狀影響到生活，就要積極治療。子宮肌瘤的治療方式，會評估發生位置、大小

和個別生育需求等，再擬訂治療計畫。

例如，若肌瘤引起出血或疼痛，可能優先使用非荷爾蒙藥物或荷爾蒙抑制藥物緩解控制。若症狀嚴重，或藥物治療無效，以影響懷孕等情形，經醫師評估後可能須進行手術等其他治療方案。

二 影響女性受孕疾病：子宮內膜異位症

常見原因

子宮內膜異位症的原因至今仍無定論，不過大致常見的成因如下：

一 經血逆流：月經來潮子宮收縮時，除了把剝落的子宮內膜。經由子宮頸排出體外，少部分子宮內膜經輸卵管推進腹腔。如果在這些非子宮內膜正常的位置出現並生長就是子宮內膜異位症。因此子宮後側與卵巢是最常見的發病地點；另外，少部分子宮內膜組織則會經由子宮血管和淋巴管，帶到肺、鼻腔黏膜、淋巴結等其他器官，而形成子宮內膜異位症。

二 自體免疫缺損：經期中子宮內膜組織通常會被身體的白血球、淋巴球吞噬，少數女性因身體無法吸收過多子宮內膜組織，才讓這些組織附著在其它包括卵巢、輸卵管、大腸、膀胱、子宮直腸凹陷等組織上，形成子宮內膜異位症。

常見症狀

由於侵犯的組織位置不同，引起的症狀也有差異，常見症狀包括：

骨盆腔疼痛：發生位置在骨盆腔內的器官上，像是膀胱、直腸、卵巢，會出現骨盆腔疼痛、排卵性疼痛、大小便不適以及裡急後重。

局部腫脹疼痛：異位的內膜組織如果產生無法排出的經血，容易有明顯的局部腫脹及疼痛，較常見於卵巢內的子宮內膜異位症（巧克力囊腫）。

性交疼痛：可能造成性交疼痛以及性交後的點狀出血。

咳血、氣胸：極少數子宮內膜異位侵犯到肺臟組織，經期中有可能出現咳血、氣胸。

如何治療？

包括藥物、手術治療。藥物治療會使用非類固醇消炎止痛藥、口服或局部黃體素製劑、口服避孕藥等，以降低病灶的活性；手術則有機會痊癒。但再發機率很高，對於計畫懷孕的女性。手術治療有較高的懷孕機會。

治療後多久可懷孕？

子宮肌瘤手術後，建議至少半年時間讓子宮恢復。再懷孕，這樣可降低懷孕期子宮破裂風險。而在生產時，經醫師評估後。有可能會建議採剖腹產，以降低子宮破裂風險。子宮內膜異位症經過手術，沾黏已清除乾淨。術後半年到一年期間，病灶未再發生前。是懷孕的黃金期，建議把握術後這段時間受孕。

來源：待產包用品清單

待產包用品清單

身為呵護伴侶、照顧寶寶的最佳盟友，建議妊娠三十二週左右就可以著手準備待產包。

準備前請詢問生產的醫療院所，有提供哪些用品、哪些建議自備，以避免重複準備。

來源：待產時如何幫助伴侶減痛？

待產時如何幫助伴侶減痛？

陪產的伴侶除了參與產檢，也要主動了解懷孕、生產過程，和太太一起擬定生產計畫，將孕產視為伴侶倆的「人生大事」。

以下幾點建議提供爸爸陪產時參考

一 事先理解生產知識、生產過程、減痛技巧，避免在陪產當下不知所措，不了解自己可以做什麼。

二 自然產時，產婦可能會有極大的情緒轉變，請用正向話語來鼓勵她。

三 關照陪產者自身，待產的過程可能是幾個小時。也可能是好幾天，所以必須先照顧好自己。把握時間休息與進食。

四 陪產時請提醒並協助產婦放鬆，如伴侶為自然產。可利用參考下列六招技巧幫助伴侶減輕疼痛，前提是先詢問醫護人員。太太是否適宜下床。

六招幫助減輕產痛

請爸媽一起來認識常見的減輕產痛方法，並提醒您在使用前應與醫護人員討論。

第一招 改變姿勢

產婦未破水的情況下，先生可協助太太在床上改變較舒服姿勢或是下床活動。另外，也可以利用生產球來改變姿勢，例如：坐在球上、站姿靠在球上或跪姿趴在球上，以左右搖擺方式來放鬆身體、分散注意力。坐在產球上雙腳

必須張開，腰部保持直立。如此可增加骨盆開口，降低會陰部腫脹不適。減輕腰部痠痛，先生需隨時在側扶著太太或是幫太太按摩。

第二招按摩

當太太陣痛不適時，先生可用按摩用具，在太太的背部、腰部、腿部、肩頸部滾動，達到疼痛舒緩。如果用手幫太太按摩，可以使用乳液或按摩油。以整個手掌或大拇指或拳頭按壓，以太太覺得舒適的力道。揉捏、輕推等方式進行。

第三招淋浴、熱敷

在醫護人員許可下，先生可協助產婦沖個熱水澡或是幫產婦進行背部熱敷（請使用可以控制溫度的熱水袋，勿使用暖暖包以防燙傷）。可促進血液循環，減少肌肉的緊繃感，有助降低產痛的感受。

第四招音樂

音樂可以讓人放鬆，舒緩產痛壓力，先生可以準備產婦喜歡的音樂。如擔心影響旁人，可準備無線耳機。

第五招慢速且深層的呼吸

產婦覺得自己舒適的呼吸方式，就是適合的減痛呼吸法。呼吸時間沒有限制，可盡量使用慢速且深層的呼吸，不一定要經由鼻子或嘴巴。關鍵是利用專注呼吸來轉移疼痛感。另外，呼吸法建議搭配其他減痛方式，例如按摩、變換姿勢等，效果會比較明顯。

第六招減痛分娩

由麻醉科醫師執行，於硬脊膜外腔注射麻醉藥以進行止痛。讓下半身的神經傳導變慢及阻斷，達到鎮痛作用。一般施打的过程約十到三十分鐘。減痛分娩的時機因人而異，可與醫師討論，此項措施為自費項目，如有考慮進行減痛分娩建議事先詢問生產的醫療院所。

來源：從哄睡到自然入睡！寶寶階段性睡眠習慣養成，該如何做？

從哄睡到自然入睡！寶寶階段性睡眠習慣養成，該如何做？

對許多新手爸媽來說，如何讓寶寶好好睡覺，幾乎成了育兒的頭號難題。寶寶的睡眠不只影響自身成長發育，也連帶影響父母的休息與家庭生活品質。其實，哄睡不能單靠耐心與運氣。一切都有方法可循，爸媽可透過營造舒適合宜的睡眠環境、掌握適齡的自我入睡訓練時機。建立睡眠儀式，都能幫助寶寶逐漸學會自己乖乖睡覺。才能一眠大一吋。

哄寶寶睡覺不能靠運氣！環境、技巧缺一不可

新生兒的一天總睡眠時間約十六到十八小時，但每一個嬰兒的需求大不同。有的寶寶睡得多、有些睡得少，唯一相同的是睡眠時間偏向零碎。多數時候是在淺眠狀態，熟睡期約一到二小時。且隨著寶寶的年紀稍長，約四到六個月時。夜間睡眠需求也會變大，喜歡被溫暖的抱著、輕柔的搖搖。甚至獲得吸吮滿足。

父母在哄睡過程中，可以透過「環境」與「技巧」雙管齊下，達成事半功倍之效。

安眠環境

首先，要幫寶寶營造安全且舒適的睡眠環境。寶寶需要安穩的環境，避免過量燈光與噪音。亦可使用白噪音模擬子宮內的環境聲；臥室溫度建議保持在二十四度上下，避免過冷或過熱。寶寶與爸媽應維持同室不同床，讓寶寶仰睡在自己的嬰兒床上。床墊保持平坦，避免枕頭、棉被、娃娃玩具等可能造成窒息風險的物品。

哄睡技巧

新生兒對於規律的節奏反應較好，可輕拍寶寶的背部或溫柔撫摸。協助進入睡眠模式；部分寶寶必須透過吸吮得到安全感，可搭配使用安撫奶嘴。有助於緩和寶寶的情緒；另外也要避免讓寶寶過度勞累，當寶寶出現揉眼睛、打呵欠或躁動時就應開始哄睡。而不是等到寶寶哭鬧才開始。

配合寶寶階段性發展，逐步訓練自行入睡

很多爸爸、媽媽詢問何時可以訓練寶寶自己睡，其實自我入睡能力的養成，需要配合寶寶的發展階段。

寶寶二到三個月大開始

可先從夜裡盡量減少換尿布開始，當寶寶有響動時先不理睬。除非大哭，否則不必吵醒寶寶起床喝奶。且餵奶時也不要開大燈、不說話與玩，讓寶寶體會白天和晚上的不同。逐漸放棄夜間喝奶的習慣，先建立一覺睡到天亮的模式。

寶寶六個月大以後

六個月大以後的寶寶，可以開始練習自行入睡。訓練方式同樣採漸進式，可讓寶寶在尚清醒但昏昏欲睡狀態時放回嬰兒床。讓他學習在熟悉的環境中自然入睡，若過程中有哭鬧的情形。第一次哭爸媽可嘗試三分鐘後進房安撫；若安撫後寶寶再哭鬧，第二次可嘗試五分鐘後再進行安撫。然後慢慢延長靠近安撫的時間，且非必要時避免直接抱起。以免養成「非抱才睡」的依賴。

對寶寶來說，一致性的照顧方式也非常重要。無論是父母

或爺爺奶奶，照顧者都要遵守相同做法。避免前後不一讓寶寶感到混淆。若寶寶出現強烈抵抗反應，可放慢腳步，先從減少抱哄的次數，再逐步進展到自行入睡。這類訓練的重點在於幫助寶寶發展自我安撫的能力，照顧者應採取溫和且持之以恆的做法，多數寶寶都能在週歲內適應。

建立睡眠儀式很重要！打造寶寶安心入睡訊號

除了環境與技巧，睡眠儀式也是讓寶寶成功入睡的關鍵。所謂睡眠儀式是指一連串的固定活動，讓寶寶逐漸理解「現在要準備睡覺了」。固定流程可以包含洗澡、換上睡衣、刷牙、聽故事或輕柔的搖籃曲、調暗燈光，關鍵在於簡單與規律。當每天都用相同的順序進行，寶寶也能慢慢內化理解。進而縮短入睡時間。

另外要避免在睡前進行過於刺激的活動，如激烈的玩耍或強烈的聲光刺激。都會讓寶寶難以放鬆，爸媽可透過睡前的擁抱、按摩或輕聲說話。讓寶寶感受到安全感，進而放鬆身心準備入睡。這也有助於建立親子依附關係。研究也顯示，有規律的睡眠儀式能縮短寶寶入睡時間。減少夜間醒來次數，並提升整體睡眠品質。對父母來說，這也能建立可預期的作息。讓家庭生活更穩定。

堅定與耐心，才能逐步養成寶寶睡眠好習慣

由於每個寶寶的氣質不同，有些適應快。有些需要更多時間，各種睡眠儀式與方法固然重要。但父母的心態與耐心才是成敗關鍵，不要急於和其他寶寶比較。必須尊重孩子自己的步調，睡眠習慣的培養必須是日積月累、循序漸進。若家中有多位主要照顧者，最好事先溝通好共識與一致做法。避免給寶寶不同訊號。當父母過度疲累時特別容易失去耐心，應適度分工、尋求協助。

寶寶的睡眠習慣需要父母用心營造培養，從打造安心的睡眠環境、適齡的自我入睡訓練到建立規律的睡眠儀式。每一步都是為孩子未來的健康打下基礎，唯有當父母以穩定柔和的態度陪伴。並能堅持、有耐性，寶寶才能在充滿安全感的環境中。逐步學會自己睡覺。

來源：微笑心生活 健康SMILE

微笑心生活健康

沒有心理健康，就沒有真正的健康。透過簡單的「」口訣調適，或是心情溫度計簡式健康量表-五。來了解或紓緩「心情溫度」吧！

「」心理健康宣導摺頁四印刷版下載摺頁正面摺頁反面

「」口訣微笑五步驟憂愁拋腦後

-睡得好

養成良好作息，避免熬夜；充足且規律的睡眠，減輕疲憊感。

-常動動

多多嘗試放鬆、按摩、打坐、唱歌等釋放壓力的活動，透過規律運動增加血清素濃度，使心情愉悅。

-多交流

主動跟親朋好友聊天，讓心靈獲得紓壓，聆聽他人良好的建議與幫助。

-常關心愛微笑

熱心關懷身邊的人，保持微笑與正向的態度。

-健康吃

注意飲食均衡和健康，適量補充富有維生素群的食物如全穀米類、深綠色蔬菜、堅果等，有助於降低焦慮。

各縣市社區心理諮商服務一覽表另開新視窗更新時間：一百一十三到三-二十九

來源：想懷孕卻遲遲無法如願！人工受孕怎麼做呢？

想懷孕卻遲遲無法如願！人工受孕怎麼做呢？

懷孕生子看似簡單，對於部分夫妻來說，卻是一條漫漫長路。「想生卻生不出來」成為近年來夫妻常面臨到的課題，結婚多久沒懷孕算不孕？該做人工受孕（人工授精）嗎？這篇文章帶你一次了解！

不孕不能懷孕嗎？

結婚一年都沒懷孕，那就是不孕嗎？相信這是許多夫妻的疑問，不孕不等於「不能懷孕」。而是「不容易受孕」，不孕的定義。指的是夫妻在維持規律性生活（一週行房約一到二次），且沒有避孕的情況下。經過一年時間沒能懷孕，就能算是不孕。

如以女性的年齡來說，三十五歲以下的女性。有性生活沒避孕，超過一年都沒懷孕。可至不孕門診諮詢，而三十五歲以上。則是半年沒避孕也沒懷孕，就要儘快至門診檢查。

人工受孕（人工授精）如何進行？

針對前來諮詢的不孕夫妻，醫師會先了解夫妻的身體狀況。以及進行男女雙方不孕症的相關檢查；接著一般會建議先進行簡單的備孕方式，由醫師開立排卵藥、黃體素等輔助藥物。讓女性患者服用，並算好排卵期。夫妻即可

再嘗試自然懷孕。如果沒能成功，則需進一步選擇人工生殖方法，包含人工授精、試管嬰兒。本文就人工授精的步驟進行說明；至於試管嬰兒相關說明請見：做試管懷孕成功率高？了解試管嬰兒四問及補助辦法。

人工授精，其實就是坊間俗稱的人工受孕，哪些族群適合人工授精呢？像是不明原因的不孕、男性精蟲數太少或是活動力不佳、性功能障礙，女性有輕微的子宮內膜異位症、巧克力囊腫、多囊性卵巢等狀況。

人工授精屬於體內受精，進行步驟如下：

一 女性月經來的第一到五天，回診開始進行療程。服用排卵藥，部分女性需施打排卵針。促使濾泡長大。

二 定期回診，透過超音波觀察濾泡是否成長，同時配合抽血檢查。當濾泡夠大夠成熟，就能施打破卵針，體內三十六小時後會開始排卵。

三 女性排卵後的二十四到三十六小時進行人工授精療程。男性於人工授精當天取精，藉由技術將精液濃縮。

四 女性則由醫師在超音波的引導下，將濃縮後的精液，從女性陰道放進子宮內。全程像是進行內診一樣，不用麻醉。完成後女性休息約半小時即可，不影響日常生活。約十四天後可驗孕確認結果。

人工授精

一：月經週期不規律，如何計算療程時間？

只要每個月都有來月經，表示有排卵。才有機會受孕，不過有些女性存在多囊性卵巢等婦科疾病。月經週期不是很固定，無法精算出排卵期。這時會建議女性日常記錄月經週期、使用排卵試紙、測量基礎體溫等，在問診時把這些資訊提供給醫師，方便醫師規劃適合的治療時程，提高受孕率。

二：不敢自己打針怎麼辦？

談到人工生殖，對於頻繁地吃藥打針。多數女性就此打退堂鼓，尤其是要自己施打這些針劑。內心更是充滿恐懼。其實隨著科技的發達，這些針劑的施打痛感都降低很多，而且操作起來也相當便利，大多都不會影響到日常生活。同時，身旁家人的支持更是重要！假如還是無法克服恐懼，部分醫院及診所還是有提供幫忙施打的服務，不妨可先了解。

來源：愛EYE秘笈，護眼行動備忘錄

愛秘笈，護眼行動備忘錄

第一招：眼睛休息不忘記：

一 每天日間戶外活動建議二到三小時以上。

二 看電視或螢幕要遵守三千零一十原則，每三十分鐘休息十分鐘，每天總時數少於一小時。

三 下課時間務必走出教室外活動，或讓眼睛望遠休息至少十分鐘。

四 早睡早起，睡眠充足。

第二招：均衡飲食要做：

五 多攝取維生素、群、豐富的食物及深綠色蔬果。

六 日常飲食種類多樣化、不偏食。

第三招：閱讀習慣要養成：

七 每閱讀、寫字或其他近距活動三十到四十分鐘應休息十分鐘。

八 看書或拿筆寫字，保持三十五到四十公分的距離。

九 不在搖晃的車上閱讀，也不要躺著看書。

第四招：讀書環境要注意：

十 光線要充足，桌面及環境照度至少三百五十米燭光以上。

十一 書桌高度要讓手肘自然下垂平放，椅面要讓臀部坐滿，雙腳要踩到地。

十二 書桌光線不直接照射眼睛，習慣用右手寫字的人，檯燈放左前方，左撇子則在右前方。

第五招：拿筆、坐姿要正確：

十三 姿勢端正，兩肩放輕鬆，腰打直，不歪頭、不趴著。

十四 握筆由前三指來挺筆並帶筆運行，後二指要穩定。

第六招：定期檢查要知道：

十五 每年固定一到二次視力檢查。

十六 接到學校視力篩檢未達合格標準的通知，儘速至合格眼科醫師處接受複檢。

十七 遵照醫師指示配合矯治，定期回診追蹤。

來源：愛丁堡產後憂鬱量表 Edinburgh Postnatal Depression Scale

愛丁堡產後憂鬱量表

「愛丁堡產後憂鬱量表」是全世界公用評估孕期及產後檢測之量表。

懷孕時因荷爾蒙的變化，影響腦內神經傳導物質的變化，特別是「血清素」：可能產生焦慮跟憂鬱的狀況。

孕婦在第三孕期二十四到二十八週後到預產期當中，荷爾蒙會產生巨大的變化，且生產一到兩週內，荷爾蒙大幅下降。荷爾蒙的變化，帶動腦內神經傳導物質的變化，特別是「血清素」影響焦慮跟憂鬱產生。

大約七十到八十女性，在孕期及產後可能有短暫焦慮跟憂鬱狀態。且高達十%~二十%孕產婦，會產生重大的身心變化。產生焦慮或憂鬱症。其實輕微的孕期及產後憂鬱狀態，一般會自然消失，但要注意大概有三分之一可能衍發成憂鬱症。

若有些憂鬱症狀，可用以下量表評估：

先可用「孕婦健康手冊」之兩題的篩選題，若這兩題篩選題都回答「是」，

再用「心情溫度計」量表評估，此量表在網路或很多醫療院所、衛生局所都可取得。

「愛丁堡產後憂鬱量表」是全世界公用評估孕期及產後檢測之量表。雖然叫產後憂鬱量表，事實上可在孕期的二十四週到二十六週之後使用。使用上述量表評估情緒，是檢測過去七天狀況。非現在當下狀況，請憑感覺填。不要想太多，想太多的話就不太準了！

您或是您的親友可能有以上量表所提的狀況，我們能怎麼做呢

建議可與原來的婦產科、或新生兒科，或其他醫護專業人員求救，告知有這樣的狀況，他們可提供適當的轉介服務。

孕產婦憂鬱現象是常見的，八到九成有可能有憂鬱的短暫現象，且在產後一年間都有可能發生。但若持續超過兩週以上，可能真的要高度懷疑，是比例高達十分之一以上的孕產婦憂鬱症。這時我們一定要尋求專業的特別協助！

來源：愛的抱抱後遺症：爸爸媽媽肩頸、下背痛如何緩解與預防？

愛的抱抱後遺症：爸爸媽媽肩頸、下背痛如何緩解與預防？

看著懷中的寶寶睡得香甜，新手爸媽們一定很感動。可是在享受天倫之樂的同時，身體的痠痛也讓人體會什麼是甜蜜負擔。尤其是長時間抱寶寶造成的肩頸與下背痛，

是許多爸媽都可能會有的「痛苦」。一起來找出舒緩與預防之道，以免疼痛影響到日常生活。

爸爸媽媽肌肉痠痛的主因

寶寶在哭或是想睡的時候，都需要爸媽抱著輕搖安撫；為了讓寶寶好好喝奶。爸媽也常常會以寶寶的姿勢為主，而不自覺地彎腰駝背哺餵寶寶；或是頻繁地換尿布、洗澡。這些看似簡單的日常動作，也需要反覆彎腰、抬手。

一天下來，爸媽全身肌肉都會感到疲勞。此外，除了抱寶寶，經常還要提尿布、採買用品、扛嬰兒推車等重物，這些行為都會增加肩背的負擔。

日復一日的育兒工作，使爸爸、媽媽的肌肉累積疲勞，導致痠痛，甚至可能引發頸椎與腰椎的問題。若長期忽略這些不適，可能會影響日常生活及育兒體力。

肩頸、下背痠痛的成因與舒緩之道

肩頸痠痛的成因

肩頸痠痛的成因，主要是因為長時間低頭看寶寶或滑手機、長時間抱寶寶、哺乳姿勢不良，以及睡眠時枕頭高度不合適等，這些都可能對頸部和肩膀造成壓力。

舒緩之道

建議平時可以多熱敷，用熱毛巾或熱敷袋敷在肩頸部位。每次十五到二十分鐘，可以促進血液循環。放鬆肌肉。此外，簡單的伸展運動。如頭部轉動、前胸伸展，以及按摩肩頸。也都能有效緩解痠痛。若仍無法減緩肩頸痠痛時，建議尋求相關專業的協助。

下背痠痛的成因

下背痠痛的主因，多半是因為長時間或頻繁地彎腰抱寶寶、提重物姿勢不正確，以及壓力過大、情緒緊張所導致的肌肉緊繃。另外，因為照顧寶寶造成睡眠不足，身體沒有好好放鬆，也可能引起下背痠痛。

舒緩之道

熱敷或泡熱水澡可以舒緩下背痠痛，此外。可以從事如貓牛式伸展、屈膝抱胸等伸展運動，以及核心肌群和腿部肌力強化訓練。以減輕痠痛。抱寶寶或搬重物時，應採用彎曲膝蓋、深蹲的姿勢，利用腿部的力量慢慢站起來。若情況嚴重時，也應尋求相關專業的協助。

日常生活中如何預防痠痛再次發生？

一使用正確姿勢從事日常活動

從事日常活動時，保持正確姿勢都能減輕肌肉負擔。例如

，餵奶時。除了手臂要有支撐，後背也可以用抱枕支撐好；避免長時間維持在同一姿勢。如低頭滑手機、彎腰做家事或換尿布等。若需抱寶寶一段時間時，可多使用嬰兒揹帶，減少雙手及腰部的負擔。將寶寶從搖籃或床上抱起時，採取微蹲姿勢，而非彎腰。睡覺時，選擇硬度適中的床墊，側睡時可在兩腿間夾枕頭，減少腰部壓力。

二 定期伸展與運動

長時間維持同一姿勢，容易造成肌肉僵硬和疲勞。可以在每次做完家事或育兒活動後，進行肩頸和腰背部的伸展運動，以放鬆肌肉，並增加柔軟度。此外，強化全身的肌肉力量。實為根本解決之道，建議每天抽出十到十五分鐘運動。即使是簡單的瑜伽或利用自身體重強化肌力，如靠牆深蹲、扶牆伏地挺身等。都能讓身體更有力量，更能從容面對生活中的各種挑戰。

三 適時休息與放鬆

長時間的工作或育兒，容易讓身體處於緊繃狀態。可與家人協調育兒分工，讓自己每天都有一段休息時間，做些能讓自己身心放鬆的活動，例如泡個熱水澡、外出散步或是全身伸展活動筋骨等。

四 善用工具

善用嬰兒揹帶、哺乳枕、尿布台、手推車、搖籃床等輔助工具，讓育兒活動更加輕鬆舒適。例如，換尿布時使用高度適中的尿布台，可減少彎腰的次數；外出時盡量使用揹帶或嬰兒推車，減少長時間抱寶寶所帶來的負擔。

當身體已經出現輕微的痠痛感時，就要提醒自己多休息及放鬆，並請家人協助分擔照顧寶寶及家事。如果痠痛持續或已嚴重到影響日常生活，就應該尋求醫師或物理治療師的專業協助，以避免讓長期疼痛影響生活品質。

育兒雖然辛苦，但透過適當的調整與預防，爸媽們也能更輕鬆維持健康的身體，享受美好的親子時光！

來源：感染登革熱的媽媽可以餵母乳嗎

感染登革熱的媽媽可以餵母乳嗎

目前在世界衛生組織、美國尚沒有正式的官方資料對此做出建議，但大多數的其他研究資料或教科書中是建議繼續哺餵母乳。也有研究說母乳中的某些脂質可抑制登革熱病毒，只有一篇個案報告表示有媽媽跟新生兒都感染登革熱。而母乳中有驗到登革熱病毒，但是否真的是母乳傳染無法確定。只是有懷疑。

因此建議，若媽媽寶寶都有感染。要繼續餵，如果只有媽媽有。但不嚴重，也可繼續餵。如果媽媽很嚴重，例如出血性登革熱。但寶寶沒有，則可能先暫停哺餵直到媽媽康復再繼續餵。暫停的中間可把乳汁擠出維持泌乳，以免暫

停的時間造成奶量下降。

另外由於冷凍再解凍可以使一些病毒活性下降但在登革熱部分會下降多少目前不知道，因此若真的很擔心傳染給寶寶又很想餵。若不是出血性登革熱等嚴重疾病的媽媽，可考慮擠出母乳冷凍二十四小時後再解凍餵給寶寶。康復後恢復親餵，對於某些特殊病毒感染的媽媽。國外的衛生機關有建議這種做法，登革熱或許也可以比照。

整體而言大部分感染登革熱但不嚴重的媽媽，目前的資料傾向建議繼續餵。若無乳頭混淆的疑慮且寶寶可接受其他餵食方式，則可考慮暫時擠出後冷凍二十四小時後再餵。但並沒有任何官方資料建議只有這樣才能餵。嚴重登革熱疾病的媽媽，例如出血熱或休克。則建議暫停，可擠乳以維持泌乳。康復後繼續餵，但仍建議以媽媽可負荷的做法為主。每個人的狀況都可能有細節上的不同，若自己不清楚自己屬於什麼狀況時，仍建議個別諮詢感染科醫師及母乳哺育專業醫療人員，以找出適合個人的方式。

來源：懷孕3階段產檢時間表

懷孕三階段產檢時間表

懷孕三階段產檢時間表

國民健康署提供孕媽咪十四次產前檢查，從第一次產檢開始。每四週產檢一次，二十八週起每二週產檢一次。三十六週開始則為每週產檢一次。下表是十四次產檢的建議週數與檢查項目，再忙也要按時產檢，確保媽咪和胎兒都健康！

例行檢查項目內容

問診內容：不適症狀如出血、腹痛、頭痛、痙攣等。

身體檢查：體重、血壓、胎心音、胎位、水腫、靜脈曲張。

實驗室檢查：尿蛋白、尿糖。

血液常規包括：

白血球（）

紅血球（）

血小板（）

血球容積比（）

血色素（）

平均紅血球體積（）

孕婦產前健康照護衛教指導：第一次：懷孕初期；第二次：懷孕後期

懷孕初期母胎變化：

孕媽咪可能出現孕吐困擾。寶寶的五官、四肢、骨骼等重要器官逐步發展。

懷孕中期母胎變化：

孕吐減少，但可能有其他如頭痛、抽筋、水腫等孕期不適。寶寶的快速成長期，會開始感覺到胎動！

懷孕後期母胎變化：

可能有呼吸急促、恥骨痛、失眠、便秘、痔瘡的困擾。請留意產兆！三十七到四十二週均為正常生產期。

來源：懷孕中後期身體變化會造成甚麼問題

懷孕中後期身體變化會造成甚麼問題

懷孕中後期，準媽咪的肚子開始有明顯的隆起。行動有些微的不便，甚至還會腰酸背痛。恥骨疼痛的感覺。

造成原因包括：懷孕期間荷爾蒙變化，使關節變鬆；母親的身體重心改變。隨胎兒成長逐漸往前挪，加重腰椎、尾椎的負擔。使肌肉承受太多不當的拉扯；還有胎兒的頭進入骨盆中，快要生產前都有可能出現不規則的腹脹疼痛感。

因此建議準媽咪於白天活動時，可選擇適合自己的托腹帶減輕負擔，將重心往後調整。晚上平躺時，可在膝下墊個枕頭，或以特殊枕頭托住肚子。

必要時，還可施予適當的局部熱敷、按摩，做些強化腹肌的運動。

提醒準媽咪要避免長時間久站。後期可能會有主要是因為賀爾蒙使得骨頭關節鬆動還有胎兒的頭進入骨盆中，快要生產前都有可能出現不規則的腹脹疼痛感，若此時感到子宮下垂而造成的壓迫，可使用托腹帶減輕負擔並擺臥自己舒適的姿勢。

懷孕婦女因為體重增加，會增加脊椎負荷量，此時孕婦的身體若是往前傾，會造成韌帶、肌肉、關節面和骨盆底的負荷。因此孕婦在走路時，宜放慢腳步以減輕脊椎的負荷。若走累了，想休息時。也儘量坐在有垂直椅背的椅子為宜，儘量少坐在沙發上。

來源：懷孕中期常見小問題

懷孕中期常見小問題

一 腰痠背痛

因為子宮重量增加、姿勢改變及肌耐力不夠，導致腰痠背痛。

常見狀況

肚子漸漸變大，關節軟化、鬆弛，腰背負荷增加。

預防／處理方法

保持正確姿勢，背部平直，勿彎腰駝背。

坐下時椅背準備靠墊支撐背部；側睡時雙腿之間可夾抱枕幫助平衡。

使用托腹帶支持腹部，減輕背部負擔。選擇的托腹帶以舒適為原則。

避免拿重物、久站、久坐或太勞累。

可請伴侶協助按摩腰部及背部，以放鬆緊繃的肌肉並促進血液循環。

媽咪擔心的事，腰痠背痛到不行，怎麼辦？

可用熱敷來減緩症狀，適度的伸展及保持正確姿勢也很重要。然而，孕期養成規律的運動習慣以強化身體力量，更是避免出現腰痠背痛最佳良方。孕期腰痠背痛並非必然，如果經過以上方式舒緩，症狀仍然持續，建議就醫檢查與治療。

二 腳抽筋、水腫、靜脈曲張

骨盆腔壓力增加，造成下肢血液回流減少。

常見狀況

睡覺睡到一半，被腳抽筋痛醒！

傍晚時腳踝、腳丫明顯變粗、變大！

小腿出現蜘蛛絲網狀微血管。

預防／處理方法

避免維持同一個姿勢過久，尤其是久坐。記得四十到六十分鐘起身活動，踏踏步，做伸展。

適度運動如游泳、散步，增加肌耐力。

做好腿部保暖，不受寒。

如果嘗試上述方法後，腿部仍抽筋嚴重，請諮詢醫師或營養師是否需調整日常飲食或額外補充營養錠劑。

媽咪擔心的事，

好不容易睡著，又抽筋了！

快要抽筋時只要馬上變換姿勢就可以讓肌肉放鬆。抽筋的當下請伸直腿，將腳趾朝小腿方向反折，幫助小腿肌肉拉直。此外，睡前做伸展操或是熱敷、泡腳加上按摩，也有預防的效果。

三 皮膚乾癢

皮膚被撐開，皮膚變薄。

常見狀況

生理性皮膚癢，以肚皮發癢最常見。

預防／處理方法

穿著以寬鬆舒適為主，若有流汗要儘快擦乾。

不要用太熱的水洗澡，並選用溫和、成分單純的沐浴產品。

洗完澡後，做好皮膚保濕，建議選擇成分單純的保濕產品。

媽咪擔心的事，

肚子又大又癢，會不會長妊娠紋？

長妊娠紋與體質有關，體重增加太快則是影響因子之一，不只肚子，乳房、臀部、大腿也可能出現。妊娠紋是自然現象，孕媽咪應以平常心面對。

四 陰道分泌物增加

區分是正常的情況，還是陰道感染。

常見狀況

正常的分泌物為蛋清狀（透明稠狀），沒有明顯的味道。

分泌物為黃綠色或有臭味，就可能表示有感染。

預防／處理方法

如廁後衛生紙由陰部往肛門處擦拭，勿來回擦以防感染。

避免穿緊身褲及褲襪，穿透氣棉質內褲，少用護墊。

若有感染、搔癢、臭味等情形，應就醫治療。

媽咪擔心的事，

是「分泌物」還是「破水」

與分泌物最大的差別是羊水清澈、無黏性，通常會持續流出，分泌物則略為黏稠。若為破水請儘快就醫！

來源：懷孕中期搭飛機旅行的提醒

懷孕中期搭飛機旅行的提醒

乘飛機時，長時間坐在狹小的座位裡。血液在腿部滯留，增加血栓形成的風險。孕媽咪要留意。懷孕期間若計畫出國旅遊，請您留意以下事項：

一 請告知您的醫師旅遊地點、天數及計畫，並聽從醫師的建議。

二 避開傳染病流行地區，並儘可能先瞭解旅遊目的地及過境地區的醫療照護服務。

三 正常情況下，舒適穩定的懷孕中期（妊娠十三週～未滿二十九週）較適合到處走走。

四 短程航班會比中長程航班更適合懷孕期間的旅遊安排。

五 不同國家的航空公司對孕媽咪搭機規定各有不同，若懷孕週數較大，須依據各航空公司規定向醫師申請適航證明。

六 坐著的時候動動小腿、腳踝，情況允許時，三十分鐘～一小時就站起來走一走。

七 時間搭飛機易有血栓風險，建議穿著舒適寬鬆衣服、鞋子，有需要的話穿上醫療彈性襪。

八 旅遊時選擇安全的食物和飲料。不吃未煮熟的食物。

九 旅程有家人陪伴更安心。

來源：懷孕中期飲食營養重點

懷孕中期飲食營養重點

飲食營養重點

胎兒的加速成長期，孕媽咪要開始增加熱量的攝取。此外

，寶寶逐漸變大，可能壓迫媽咪的腸胃，纖維質與水分的攝取也很重要！

熱量三百大卡，蛋白質十公克

營養的需求日益增加，跟懷孕前相比，懷孕中期建議孕媽咪每天增加三百大卡的熱量。一片披薩、一塊炸雞就約三百大卡，一不小心就可能超過，請留意！

懷雙多胞胎須知

懷雙多胞胎可能面臨的問題、併發症風險比單胞胎複雜很多，孕期需要多一點照顧。對熱量與營養素的需求絕對不是直接乘二倍、乘三倍就可以，進一步的建議請與專業人員及醫師討論。

每日補足鈣、、維生素

除了鈣、及維生素，還有從懷孕初期就建議攝取的鐵和碘也要持續補充。

來源：懷孕中期：漸進式增加運動

懷孕中期：漸進式增加運動

漸進性增加運動

懷孕中期不適症狀趨緩，可以從已建立的運動習慣中，採漸進性的原則，增加時間、頻率或強度擇一。

若此時才開始運動也不嫌晚！開始的原則請參考懷孕初期。

孕媽咪今天運動了沒？

提升身體活動量

持續有氧運動

每週二天肌力訓練

維持骨盆底肌運動

漸進性運動原則，每次增加一個要素就足夠！

時間：如每天運動十五分鐘，逐漸增加至三十分鐘。

頻率：如每週三天，逐漸增加至每天。

強度：如低強度運動，逐漸增加至中強度。

中強度運動定義：呼吸及心跳比平常快一些，但還能順暢的對話。

使用科技產品如或運動手環來做自我記錄及監測，或找重要他人如伴侶、家人一起動起來，可以讓運動習慣更長久！

要避免的運動項目

避免會擠壓或碰撞到肚子的運動（籃球、足球等）、跌倒風險滑雪、衝浪等、壓力明顯改變（跳傘、潛水等）、舉重（諮詢醫師建議，孕前已有者可維持）。

要留意的運動姿勢

懷孕時因鬆弛素的分泌，使得韌帶較為鬆弛。對關節的支撐減少，應避免關節過度彎曲及伸展的運動。以防增加關節壓力及跌倒的發生。

孕期規律運動三大優點

一降低妊娠糖尿病、妊娠高血壓、子癲前症的發生率，有助懷孕期間的體重管理。

二讓孕媽咪順利生產，降低非計畫性剖腹產，及必須使用醫療介入協助生產的機率。

三研究證實，正確的運動不會導致流產或早產。並能減少周產期憂鬱症的發生。

來源：懷孕了!什麼情況需要安胎

懷孕了什麼情況需要安胎

一、甚麼情況下需要安胎

當發生子宮收縮頻繁、陰道出血、羊水破裂、持續下背痛、腹部強烈緊繃感、骨盆受壓迫感（覺得好像胎兒往下推）等不適症狀情況產生，此時最好的處理方式是臥床休息，如果情況持續發生無法藉由休息得到緩解，就需要就醫。

二、甚麼是安胎

安胎目的為「延長懷孕週數」，治療包括住院觀察、臥床休息、適當的產前照顧與安胎藥物的使用等。其中臥床休息，不僅可促進子宮胎盤間血液灌注量。亦可減少刺激子宮頸變軟、變薄和擴張的物理因子，而延長胎兒在母體生長時間。增加胎兒的成熟度，以避免早產。

三、什麼情況需要住院安胎

一早產性子宮收縮，口服藥物無法控制，或是有合併子宮頸擴張情形。

二早期破水。

三 陰道出血。

四 由臨床醫師來決定之情況如子癰前症、妊娠糖尿病。

四、居家安胎該怎麼做

一 臥床休息：一般返家後建議繼續臥床休息，若無破水、陰道出血或子宮收縮情形，可依身體狀況調整下床活動次數，減輕壓力及焦慮。

二 避免引起子宮收縮之活動：如刺激乳頭、從事粗重工作及激烈活動如搬重物、頻繁上下樓梯等或照顧家中較大的孩童及家事。

三 避免性生活及陰道灌洗。

四 注意有無早產現象，早產是指懷孕滿二十週至未滿三十七週生產者。尤其雙多胞胎懷孕常因子宮過度伸展，較容易引發早產。若出現下列情形，應盡速就醫降低早產風險

一一 小時內有六次以上或十到十五分鐘有一次的子宮收縮，休息三十分鐘仍無改善。收縮不一定有疼痛感，但肚子會變硬或有下墜感

二 類似月經來時的悶痛感或來之前的脹痛感

三 子宮與陰道的壓力，有下墜感或陰道有壓迫感

四 其他方法無法改善的下背痛

五 持續不斷的腹瀉或腹部絞痛

六 陰道水樣、黏液和血液樣分泌物增加

七 感覺胎動較平常減少一半以上

五 依醫生指示按時服用藥物，按時返診。

六 有任何問題可以向醫護人員諮詢。

以下是建議您預防早產的生活注意事項：

一 遠離吸菸、酗酒、檳榔及使用成癮藥物。

二 注意營養，維持理想體重。

三 適當運動很重要，可依醫護人員的評估及指導，進行合適運動。

四 按時產檢，認識早產徵兆。早產徵兆：陰道出血、腹部悶痛、持續子宮收縮、破水，應立即就醫。

五 選擇設有新生兒加護病房的醫療院所待產或生產。

如何預防早產及流產

一 不要攀高及提舉重物。

二 預防跌倒與損傷。

三 不要過度疲勞，避免不必要之長途旅行。

四 避免腹瀉或發燒。

五 保持愉快的心情。

六 曾經有早產、流產或子宮手術者，在懷孕早期及末期應暫停性生活。

七 定期產前檢查。

八 如有疾病應及早就醫，不亂服成藥。

來源：懷孕初期外出旅遊篇：孕期繫安全帶、泡溫泉須知

懷孕初期外出旅遊篇：孕期繫安全帶、泡溫泉須知

孕媽咪繫安全帶須知

孕媽咪應坐後座，並依各廠牌車主使用手冊正確繫妥安全帶。

繫安全帶時，腰帶盡量放低，貼緊臀骨處，避免撞擊時以腹部受力。

沒有不適症狀的孕媽咪，孕期別忘了適度外出活動，接觸大自然有益於健康與好心情！

孕期泡溫泉多留意

孕媽咪在泡溫泉時要謹慎，選擇溫度較低的泉池、只泡腳或多次休息，以避免身體過熱，同時確保大量的水分補充。由於每個孕媽咪的狀況不同，泡溫泉前請諮詢您的婦產科醫生。

懷孕初期、高危險妊娠或懷多胞胎的孕媽咪不建議泡溫泉。

孕媽咪泡溫泉時的水溫不超過三十九度。

泡湯一次不超過十分鐘。

和另一半或家人一起

泡更安心。

環境安全要注意，避免因濕滑而跌倒。

空氣保持流通，避免在密閉場所泡湯。

肩頸、雙手、膝蓋建議露出水面，可避免身體過熱。

泡湯前後都要補充水分，避免水分流失。

孕媽咪容易有姿勢性低血壓，起身或轉換姿勢時要放慢速度。

來源：懷孕初期常見小問題

懷孕初期常見小問題

一 孕吐

也就是害喜，是懷孕初期的常見症狀。

常見狀況

最常出現晨吐，然而一天中任何時間都可能發生。

多數在孕期三個月後逐漸消失，少數也可能持續到懷孕後期。

預防／處理方法

避免油膩、不易消化或調味重的食物。

乾濕食物分開吃，並避免在吃飽後大量喝湯或水。

孕吐後用開水漱口去除味道及口腔保健，並喝點水，減少食道灼傷的可能。

補充維生素六，食物來源如糙米、小麥、肝臟、瘦肉、蛋、豆類等。

少量多餐、避免空腹，可在兩餐間補充食物。

【媽咪擔心的事】

孕吐吃不下，會不會影響寶寶健康？

單純輕微的害喜或孕吐通常不會影響到胎兒健康。但是如果孕吐嚴重，症狀無法改善時，請就醫診療。

延伸閱讀：

【國民健康署】年紀越輕的孕婦，孕吐會越嚴重？

二 頭暈頭痛

吃不好、睡不好、緊張和壓力都是可能原因！

常見狀況

起床後或突然站起來時，會感覺頭暈。

頭部、後頸部有肌肉緊繃的疼痛感。

預防／處理方法

變換姿勢時放慢動作，避免突然站立。

避免維持同一個姿勢過久，適度活動，促進血液循環。

孕期放鬆心情，不要讓自己太勞累，輕柔的按摩或伸展有助於身心舒緩。

如有劇烈頭痛，應儘速就醫。

三 陰道出血

孕期中的常見狀況，到醫院檢查最安心！

常見狀況

著床期、子宮外孕、流產或其他病兆都可能出血。

預防／處理方法

白天出血可立即至門診求診。

若發生在半夜，初期少量出血、沒有疼痛可隔天就醫。

出血量增多或出現鮮血，或出血合併腹部疼痛，請儘速就醫。

孕媽咪如有出血或凝血障礙，請告知您的醫師。

【媽咪擔心的事】

孕期出血，會是流產嗎？

引起出血的原因有很多，不一定是流產，到醫院檢查最安心。事先觀察血的型態、出血量及顏色，更有利於醫師診斷。

四 頻尿

懷孕初期、後期都會出現的困擾。

常見狀況

才剛尿完不久又有想上廁所的感覺！

白天解尿超過八次，夜晚超過二次。

預防／處理方法

有尿意就去排尿，不憋尿。

分散喝水的次數，避免一次大量喝水。

白天多喝水，晚餐後減少水量的攝取。

如果次數太頻繁，影響日常生活，還是需要就醫診療。

【媽咪擔心的事】

常覺得想上廁所，但卻只尿一點點？

這是正常的生理現象，通常生完就會改善！記得有尿意就去上廁所，不要憋尿！

來源：懷孕初期：超音波看寶寶

懷孕初期：超音波看寶寶

超音波看寶寶

產檢超音波除了可以讓爸比媽咪看到肚子裡的寶寶之外，主要功能在於透過測量胎兒頭雙頂骨徑（）、腹圍（）與股骨長度（）來瞭解胎兒週數及生長評估。

政府提供三次超音波檢查

三次的超音波檢查分別在孕期初期、中期及後期，每次檢查的重點也有不同。

超音波檢查次數、建議週數、檢查重點：

第一次、第八到十六週、評估胎兒數、胎兒心跳、胎兒大小測量、著床位置及預產期

第二次、第二十週前後、胎兒大小測量、胎盤位置及羊水量

第三次、第三十二週後、兒成長測量、胎位、胎盤位置及羊水量

並非所有異常都可以篩檢出來

腹部的脂肪、胎兒的姿勢以及羊水量的多寡都會影響超音波檢查的準確性。產檢超音波是一種篩檢方法，而不是最終診斷，並非所有的胎兒異常狀況都可以由此篩檢而

出。

三、四、高層次超音波都要做嗎？

超音波的檢查是二的黑白影像，用來瞭解胎兒週數及生長評估。三、四則是能看見胎兒的立體影像。高層次超音波主要是指醫師花費較長的時間，從胎兒的頭部到腳部做系統性的檢查。基本上還是依每個人的需求來做選擇。

來源：懷孕初期：口腔檢查篇

懷孕初期：口腔檢查篇

孕期更要做好口腔保健

孕期牙痛，是不少孕媽咪都可能遇到的困擾。畏懼就醫並非最好的辦法，為了好孕氣和順利生產。懷孕後及時對口腔做全面性檢查和適時進行所需治療，對孕婦的口腔健康必有助益。

齦齒、牙齦炎和牙周炎發生機率增加

婦女懷孕期間會因為飲食習慣與賀爾蒙的改變，導致口腔環境變化。進而增加齦齒、牙齦炎和牙周炎發生的機率，因此牙齦也容易出血。一般建議合併牙線清潔方式，也可使用軟性刷毛。合併漱口，可減少出血現象。

健保提供婦女懷孕期間每九十天可接受一次洗牙服務

為了照護孕婦的特殊口腔狀況，全民健康保險自一百零四年一月一日起新增「懷孕婦女牙結石清除（也就是洗牙）」項目。讓女性在懷孕期間，每三個月就可以接受一次洗牙服務。只要攜帶孕媽咪健康手冊及健保卡，就可以每三個月到各健保特約牙醫醫療機構進行洗牙。

來源：懷孕初期：建立規律的運動習慣

懷孕初期：建立規律的運動習慣

今天運動了嗎？對身體健康且沒有孕期合併症的孕媽咪來說，開始或繼續運動是安全的。您可以從容易達成的身體活動開始做起，每天增加一些，幫助自己在孕期養成運動的習慣。

還沒有運動習慣的媽咪，現在開始動起來！

理想目標

每天累計三十分鐘。

每週累計一百五十分鐘。

懷孕剛開始運動者

從五分鐘開始，漸進式的增加。

每週增加五分鐘，直到每天達成三十分鐘

已有運動習慣者

可維持原有的運動習慣，但不再進行新的或更高強度的運動訓練。

從提升身體活動量開始

例如少搭電梯、手扶梯，多爬樓梯，短距離以步行取代搭車，或是飯後與家人、朋友散散步。

選擇適合的有氧運動

快走、游泳、固定式腳踏車（健身車）、孕婦瑜珈／皮拉提斯（避免熱瑜珈／熱皮拉提斯）等，家人也請加入一起運動的行列！

每週二天肌力訓練

懷孕期間建議每週至少二天，以非連續或隔天方式執行肌力訓練（上肢、下肢並重），可採輕度阻力訓練如彈力帶或自己身體重量負重運動。

練習骨盆底肌運動

從懷孕初期開始練習，可預防孕期常見漏尿及產後的尿失禁問題。

孕期運動注意事項

運動環境：

選擇通風涼爽或有空調的場所。

避免在溫度過高（大於三十二）、悶熱的場地進行運動。

熱量及水分：

請勿空腹太久後運動，避免發生低血糖症狀。

可採少量多餐的方式補充熱量。

應適時補充水分，避免脫水及體溫遽升。

不適狀況：

運動中若出現陰道出血、腹痛、規律疼痛的子宮收縮、破水、呼吸困難、頭暈頭痛、肌肉無力影響平衡、小腿疼痛或腫脹，要立即停止運動。

如有高危險妊娠情形，如早產現象、產前出血、前置胎盤或其他合併症如高血壓等，可能不適合運動，請進一步諮詢您的婦產科醫師。

來源：懷孕初期：生活保健篇 戒菸、戒酒、不吸毒

懷孕初期：生活保健篇 戒菸、戒酒、不吸毒

戒菸、戒酒、不吸毒！

若於懷孕期間吸菸、酗酒、施用毒品，會使胎兒曝露在有害物質當中。或由胎盤進到胎兒體內，影響胎兒的智力發展及健康問題。並增加流產、早產、胎死腹中、低出生體重的風險。

吸菸對胎兒的影響

若孕媽咪吸菸，肚子裡的胎兒會接觸到許多有害的化學物質。其中尼古丁會損害胎兒的大腦和肺部，並導致血管變窄。造成提供胎兒的氧氣減少，您每次吸菸。寶寶就心跳得更厲害！其他具體影響如：增加胎兒的神經、消化系統和視力的危害、增加自然流產、先天畸形、早產、低出生體重風險。成長後罹患血癌的危險性較高。

要留意的是，電子菸、二手菸、三手菸也同樣具有風險！在家裡和工作場所都要儘量避免它們的存在。

懷孕就是戒菸時機！

懷孕後就馬上戒菸，如果很難戒除，至少要從減少接觸機會開始。您可以尋求戒菸醫療機構，或洽詢免費戒菸專線八百到六百三十六-三百六十三獲得幫助。

酒精對胎兒的影響

不論什麼酒：葡萄酒、啤酒、調酒，只要含酒精，對寶寶就有風險！孕媽咪飲酒會增加胎兒罹患酒精胎兒症候群的風險，可能導致生長遲緩、智能障礙等問題。因此，懷孕期間應避免飲酒，以確保胎兒的健康和發展。

孕期須完全避免喝酒

有很多女性在懷孕初期就變得不喜歡酒精的味道，為了寶寶好，也為了自己，請維持不喝酒的正確行為。

毒品對胎兒的影響

孕媽咪若施用毒品，毒品會經由母體胎盤進入胎兒體內。相當於胎兒間接性吸毒，可能使得新生兒出現「新生兒戒斷症候群」。提高癲癇發作、出生體重過輕、呼吸問題、甚至死亡等風險。

拒絕施用毒品

如果您未停止藥物濫用，請儘速至衛福部指定藥癮戒治機構或撥打毒品危害防制中心諮詢專線八百到七十七萬零八百八十五尋求專業協助，並停止施用毒品。

來源：懷孕初期：生活保健篇 更安心的美麗保養守則

懷孕初期：生活保健篇 更安心的美麗保養守則

更安心的美麗保養守則

孕期不需要為了關照肚子裡的寶寶，而給自己太大的壓力。愛美是每個人的權利，孕媽咪也不例外。媽咪快樂，寶寶也會跟著快樂。

孕媽咪使用化粧品須知

頭皮或皮膚過敏、發炎狀態或其他身體狀況（如懷孕期間），建議避免染髮或燙髮。

長痘痘時，保養程序應儘量簡化，可在醫師指導下輔以適當的外用抗痘產品。

儘量不要使用顏色過重、香味強及成分複雜的化粧品。這些化粧品可能含有塑化劑，有干擾內分泌的風險，增加寶寶過敏體質機率。

懷孕期間臉上容易長斑，應注意防曬，輔以適合的純物理性防曬品（如戴帽子、長袖衣物等）。

皮膚若乾癢或長疹子，可穿著透氣寬鬆的衣物、使用溫和的沐浴產品，情形嚴重時，可求診皮膚科治療。

如使用化粧品有疑義，建議可以諮詢醫師。

孕期按摩放輕鬆

按摩有助放鬆和改善血液循環，平時便可請伴侶協助按摩腿部及背部肌肉。

按摩的最佳姿勢是側臥，以舒適為原則，避免出現疼痛感。

來源：懷孕可以吃膳食纖維預防便秘嗎？

懷孕可以吃膳食纖維預防便秘嗎？

懷孕期間隨著子宮慢慢變大，子宮會壓迫到腸胃道。容易引起便秘情形，而膳食纖維是腸胃道的清道夫。故孕婦應攝取適量的纖維質及水分，並適度運動。以防止便秘問題發生。膳食纖維來源有全穀類、未加工之豆類、蔬菜及水果，建議您不妨先從天然食物攝取，不但可取得到膳

食纖維，更可由天然食物中獲得孕期所需要的維生素和礦物質。必要時，依醫師處方服用軟便劑，切勿自行服用成藥。

來源：懷孕可以喝蜂蜜嗎

懷孕可以喝蜂蜜嗎

一 蜂蜜富含維生素及多種人體必須氨基酸與微量元素，具有促進消化。增進食慾，鎮靜安眠。提高人體抵抗力，也有潤腸通便的特性。

二 蜂蜜可能含有肉毒桿菌孢子，讓孕媽咪擔心會對胎兒產生影響。一般而言，孕媽咪即使吃到含有微量肉毒桿菌的蜂蜜。在消化酵素的破壞下，是不會引起中毒的。加上肉毒桿菌毒素的分子不大，不會通過胎盤影響胎兒。但應避免食用過量，增加罹患妊娠糖尿病風險。為避免孕婦因食用、接觸花粉而過敏導致孕期不適，建議在挑選、購買蜂蜜時。最好不要購買未經純化、提煉，可能含有花粉的蜂蜜產品。較有保障。

來源：懷孕後期常見小問題

懷孕後期常見小問題

一 呼吸急促：

活動一下就氣喘吁吁！

常見狀況：

體內血流量增加，心臟負荷量變大，心跳頻率也跟著增加。

子宮往上頂，壓迫橫膈膜，呼吸淺而急促。

預防／處理方法：

放慢動作，減少心臟的負擔。

適量的運動增加心肺功能。

保持愉快心情避免壓力上身。

媽咪擔心的事：

幾步路就感覺呼吸困難、心跳加快，這樣正常嗎？

心跳每分鐘會增加約十下，是孕媽咪常見的情況，因此會影響呼吸、甚至輕微心悸的情況，但休息後會緩解都算正常。

二 恥骨痛：

就是胯下痛，可能延伸到骨盆、腰背。

常見狀況：

走路、上下樓梯、睡覺翻身就感覺疼痛。

越到後期，稍微動一下就痛！

預防處理方法：

放慢動作，和緩地移動。

使用托腹帶減低骨盆的拉扯。

嚴重恥骨痛，請就醫診療。

媽咪擔心的事：

恥骨痛可以順利生產嗎？

一般情況下，恥骨痛不會影響自然產。若是嚴重恥骨痛，中醫或復健科的診療，可能會有幫助。

三便秘：

腸胃蠕動減慢或缺乏纖維質引起；子宮增大使得小腸移位，或子宮壓迫直腸所致。

常見狀況：

排便費力、不舒服。

大便乾硬、呈顆粒狀。

預防處理方法：

每天要喝足二千的水。

適當的運動可以促進腸胃蠕動，幫助排便。

多吃纖維豐富的全穀、未精製雜糧、蔬菜、水果。

養成定時排便的習慣。

四痔瘡：

便秘、腹瀉、用力會使靜脈內壓力增加，增大的子宮壓迫靜脈阻礙循環所致。

常見狀況：

上完廁所後卻仍覺得排不乾淨。

肛門口越來越腫痛，大便會出血。

排便後肛門口腫脹、突出。

預防處理方法：

每天要喝足二千的水。

多吃纖維豐富的全穀、未精製雜糧、蔬菜、水果。

養成定時排便的習慣。

溫水坐浴：坐在溫水盆中五到十分鐘，一天可進行三至四次。

有腫痛厲害、排便困難時，可就醫依醫師處方使用軟便劑或止痛軟膏。

媽咪擔心的事：痔瘡好難受，可以做手術治療嗎？

懷孕期間出現痔瘡，治療的目標以緩解疼痛症狀為主，其實許多的痔瘡問題會在產後自動改善，建議手術治療可以等到產後再視情況考慮。實際情形建議與醫師討論評估。

延伸閱讀：

【孕產婦關懷網站】為什麼懷孕會造成痔瘡

五 失眠：

懷孕後期受到賀爾蒙的影響，孕媽咪變得淺眠易醒。

常見狀況：

孕期不適如抽筋、頻尿、胎動等，影響睡眠。

睡前思考或擔心生產狀況等問題，無法入睡。

預防處理方法：

睡前減少使用三產品，養成良好的睡眠習慣。

聽音樂或做伸展運動，找到能讓自己放鬆的方式。

日常規律的運動，有助於睡眠。

媽咪擔心的事：白天要上班，晚上又睡不好，該怎麼辦？

先解除身上的壓力，並培養良好的睡眠習慣。在白天感覺累時，二、三次約二十分鐘的小休息，也可以補充體力。有需要的話可以諮詢專業醫師使用合適的藥物。

延伸閱讀：

【食品藥物管理署】孕媽咪失眠怎麼辦

來源：懷孕後期旅行建議

懷孕後期旅行建議

旅行建議

身體狀況良好的孕媽咪，到了懷孕後期適度地外出走走。例如近郊的半日遊或一日遊，欣賞藍天綠樹、親近大自然。有助於放鬆孕期緊張的情緒。

安排半日或一日的小旅行，可以當日來回的近郊，或是就近的公園、博物館散步、參觀。

孕媽咪請與另一半或家人、好友作伴出遊，不僅能使旅程更為愉快，如果有疲累、不舒服時，也有人照應。

出遊交通工具及路線以平穩、短程為優先考量，避免長時間維持相同姿勢，不要久站或久坐。

外出穿著舒適好走的平底鞋，必要時使用托腹帶、彈性襪減輕身體負擔。

行程以輕鬆、休閒為主，隨時補充水分並安排多次的休息時間，避免過度疲勞。

旅途中若是感覺疲累，就要適時的休息；若身體有任何不適，必要時應該停止旅行。

出門隨身攜帶孕媽咪健康手冊、健保卡，以備不時之需。

來源：懷孕後期等待產兆

懷孕後期等待產兆

等待產兆

懷孕約三十七到四十週左右，當寶寶準備降臨到這個世界。孕媽咪將會面臨三個生產前的徵兆：落紅、破水、子宮規律收縮，這三個產兆沒有一定的發生順序。也不是每個人都會經歷這三個產兆。

落紅：

當子宮開始收縮、子宮頸漸漸打開，子宮頸口的小血管破裂，就會造成落紅現象。落紅可以說是「帶血的黏稠分泌物」，顏色可能是咖啡色或淡紅色，分泌的量不會像是月經那麼多。

破水：

破水指的是有水狀液體從陰道流出，大多會持續滲出，媽咪會有褲底溼答答的感覺。一旦發現破水，請立即到醫院。而破水後不一定會馬上生，需視個人狀況，子宮開始有規律收縮後，才會進入生產階段。

子宮規律收縮：

子宮收縮不一定都是以痛來表現，可能感覺肚子緊繃，或是腰很痠，都可能是子宮收縮的表徵。當子宮規律收縮，約三到五分鐘一次。每次持續超過一分鐘，而且間隔越來越短。表示將進入生產階段。

何時準備到醫院生產？

一旦發生以下三種情況，媽咪請準備到醫院生產：

一發生子宮規律收縮：第一胎媽咪低於五分鐘收縮一次，間隔縮短、持續時間增加。且有便意感，收縮時無法言語；第二胎（含）以上媽咪六到八分鐘收縮一次。即可準備到醫院檢查。若住處離生產醫療院所較遠，請提早出門。

二破水。

三異常狀況，如出血量大、胎動減少等。

來源：懷孕後期飲食營養重點

懷孕後期飲食營養重點

飲食營養重點

吃什麼對寶寶最好？答案就是六大類食物均衡營養的攝取，儘量吃天然食物，減少加工食品，就是對寶寶、媽咪都好的方式。

熱量三百大卡，蛋白質十公克

懷孕後期似乎特別容易餓？但熱量的需求和懷孕中期一樣，沒有再增加喔！因此飲食以「質量並重」為準則，吃多也要吃到重點及均衡，記得多運動消耗一下！容易胃部脹氣的孕媽咪，建議少量多餐，以免造成身體的負擔。

鐵攝取增加，鈣持續補足

懷孕後期鐵的攝取量增加到四十五毫克，其中十五毫克可從食物中獲得，三十毫克需額外補充，請諮詢婦產科醫師的建議。台灣婦女缺鐵情形普遍，孕媽咪要留意。建議飯後適量攝取富含維生素的水果，如奇異果、橘子、芭樂等，幫助鐵質吸收。

高纖食物要充足，預防便秘

孕媽咪每日要喝足二千的水分，每日攝取三蔬二果共五個拳頭大小：水果、菜葉、菜梗都要吃。並以糙米、南瓜等全穀及未精製雜糧，取代白麵包、蛋糕等精製澱粉。搭配適量水分攝取，促進腸道蠕動。有助於預防便秘。

富含膳食纖維的食物來源

蔬菜：地瓜葉、菠菜、香菇、花椰菜、牛蒡、秋葵……等

水果：芭樂、草莓、百香果、奇異果、柳丁、釋迦……等

降低每日鈉攝取，消除水腫

孕期體內水分比較容易滯留，飲食鹽分的攝取不要過量，不沾醬，少喝湯。另外，建議孕媽咪平時多出門散步，適度的運動對改善水腫也有幫助。如果水腫持續惡化，有可能有其他懷孕併發症，請就醫診療。

建議吃：含鉀高的蔬菜水果如香蕉、菠菜，並攝取足夠蛋白質。

減少吃：火腿、貢丸、香腸、牛肉乾等加工品。

來源：懷孕後期：持續運動3重點

懷孕後期：持續運動三重點

持續運動三重點

懷孕後期持續運動是關鍵，無論您是運動老手還是新手，都別因孕期的不適而放棄！保持運動，讓您懷孕的日子充滿活力與愉悅。

運動過程中伴侶來作伴，不僅一起變健康，也能讓兩人的感情升溫！

一 不放棄

已經建立運動習慣的孕媽咪，不需要因為肚子變大而停止運動喔！若沒有不適情形，請維持運動的強度與時間。繼續運動有助於保持體能，促進血液循環，甚至減輕生產的不適感。

二 不嫌晚

還沒有運動習慣的話，懷孕後期也不是放棄的時候，相反地，現在就是開始的絕佳時機！（開始的建議請參考第十六頁）讓運動成為懷孕生活的一部分，讓孕期更健康、愉快。

三 繼續維持

無論是已經建立運動習慣或是全新的開始，懷孕後期仍

應繼續維持運動。定期諮詢醫生建議，確保運動計畫符合個人身體狀況，讓懷孕的每個階段都充滿活力。

確認狀況，再進行運動

運動時須注意自身當下的體力狀況，若還沒開始就覺得疲累，就不適合再勉強運動。

運動過程中若發現有陰道出血、嚴重腹痛、規律宮縮、破水現象，也應立即停止運動，並回醫院檢查。

若沒有任何不適，仍可以從事熟悉的運動內容及項目。

【運動建議】

穩定核心肌群，增加骨盆支撐力

建議以斜躺姿或站姿取代平躺，以避免仰臥位低血壓症候群可能產生的頭暈目眩、噁心或不舒服等問題。

肌耐力訓練，提升體能

如靠牆半蹲三十到六十秒，或是將負重減輕，但重複的次數增加，以提升肌耐力。待產、生產都是需要體力的事，肌耐力訓練幫助孕媽咪體能升級！

【動作示範】

靠牆半蹲耐力運動

一身體靠牆，雙腳與肩同寬，腳跟與牆面的距離為一個腳掌長。

二雙手拿水瓶，並往前平舉。

三吸氣預備，吐氣時往下半蹲，接著雙手輪流伸直彎曲。

四動作過程中都保持深蹲姿勢。結束後再站起稍作休息。

孕媽咪今天運動了沒？

提升身體活動量

持續有氧運動

每週二天肌力訓練

維持骨盆底肌運動

來源：懷孕後為什麼會一直吐口水

懷孕後為什麼會一直吐口水

產前患者通常會因唾液分泌增加而感到痛苦和不舒服，這被稱為流涎或妊娠流涎。這些情況通常與懷孕前三個月的噁心和嘔吐有關。

唾液口水過多也是妊娠反應的現象之一，大多數發生於早上起床會有噁心感的孕媽咪，唾液增多是孕期所出現的正常反應，所以不必擔心。

緩解方式如果孕媽咪不喜歡過多唾液的感覺，可以試著吃薄荷口味的口香糖，或用含有薄荷的牙膏刷牙。薄荷不會影響胎兒健康，刷牙後用清水把口腔漱洗乾淨。依個人狀況，不要勉強將口水再吞回。

來源：懷孕持續餵奶是否影響胎兒發育？

懷孕持續餵奶是否影響胎兒發育？

全母乳哺育的媽媽通常大約會在產後四到六個月左右開始排卵，也有可能會更早。無論是否哺乳，只要有排卵，就有可能懷孕，亦即「餵母乳不等於避孕」。孕期哺乳是可以的，但須觀察懷孕期間孕婦在哺乳時有無子宮收縮疼痛及出血的問題，孕期體重增加理想，哺乳媽媽仍可在懷孕期間持續哺餵母乳。孕期哺乳與否是個人的決定，沒有人可以代替媽媽做選擇，除非寶寶不願意喝或媽媽有離乳考量。

懷孕時乳頭可能較敏感，奶水量可能改變。味道也可能改變，只要媽媽和寶寶都願意。仍可持續哺乳。如果寶寶吸吮時媽媽覺得有宮縮疼痛情形，建議媽媽稍休息一下，再讓寶寶親餵。如果情況未改善，則建議可諮詢專業的醫師意見。

來源：懷孕時各階段熱量需求及體重控制怎麼做？

懷孕時各階段熱量需求及體重控制怎麼做？

當驗孕棒出現兩條線的那一刻起，媽媽的孕育旅程也正式展開。面對快速變化的身體，體重管理常讓人感到焦慮：「該吃多少才夠？」「體重增加太多會不會對寶寶不好？」其實，吃得對比吃得多更重要，掌握營養重點，就能自在地照顧自己和寶寶。

孕期體重控制的重要性：太輕或太重都會有風險

孕期體重上升是自然現象，但過多或過少都可能影響母子健康。妥善管理體重，不只是為了身材，更是給自己和寶寶最實際的照顧。

體重太輕：寶寶發育恐受限

有些媽媽因為怕胖，懷孕初期飲食控制過頭，結果體重遲遲不上升。若體重增加太少，可能代表攝取營養不足。胎兒發育恐受影響，容易出生體重過低。甚至早產，影響未

來成長與免疫力。

體重太重：風險升高、產後恢復更難

反過來，若體重短時間內快速上升。也可能讓媽媽面臨妊娠糖尿病、高血壓、水腫等風險，還可能導致寶寶體型過大。增加難產與剖腹產機率。過度增加的體重也會讓產後減重更辛苦。

懷孕各階段的熱量需求：通常建議，第二孕期每日多二百五十大卡，第三孕期每日多四百五十大卡

一提到懷孕，很多人會直覺「要補！」但其實懷孕期間的熱量需求會隨著週數變化，不需要一開始就吃很多，而是依階段調整，營養剛剛好最理想。

懷孕初期（一到十二週）：不需額外熱量

胚胎著床與初步發育中，因胚胎還很小，三個月時僅約二十公克，熱量需求與孕前差異不大。若出現孕吐、不舒服的情況，只要以少量多餐、選擇易消化的食物為原則，不必強求進食量。

懷孕中期（十三到二十七週）：每日多二百五十大卡

寶寶開始快速成長，媽媽也會感覺胃口變好。這時每日建議增加約二百五十大卡，相當於一個蒸地瓜（約一百一十克，相當於便利商店二十五元點心瓜），加上一杯無糖豆漿、一顆水煮蛋。

懷孕後期（二十八週～生產）：維持多四百五十大卡

進入後期，寶寶體重快速增加，媽媽體內的荷爾蒙也讓血糖與體重變化變得更明顯。此時維持熱量攝取在符合需求的穩定範圍內，重點在「吃對營養」而不是「吃得多」。

孕期各階段體重增加建議：看孕前與孕期週數掌握節奏

根據國民健康署的建議，準媽媽可以依自己孕前的來參考整個孕期該增加多少體重，以及中後期每週適合增加的速度。

分階段體重變化小提醒

懷孕初期（一到十二週）：建議增加一到二公斤，重點是穩定情緒與營養，不需刻意追求增重。

懷孕中期（十三到二十七週）：寶寶開始快速成長，應穩定增加體重，依建議每週約二十五到五公斤，總共約二到五公斤。

懷孕後期（二十八週後）：持續穩定成長，但也要避免過快增加，總共約三到七公斤最好，以降低妊娠糖尿病、血壓異常與分娩風險。

以上為標準體位的增重原則，原本過瘦的可再加一些，過重的就要少一些，有疑問的可與您的產檢醫師討論。

孕期飲食原則：除了控制熱量，這些營養素不能少！

懷孕期間除了控制體重與攝取適當熱量外，下列三大營養更是寶寶健康成長的基礎，也是媽媽維持體力與免疫力的重要來源：

蛋白質：

胎兒成長的基礎，每日建議多攝取約十公克，支持寶寶器官發育與媽媽身體變化。來源如奶製品、黃豆製品、魚、蛋、肉等。

礦物質：

鐵：懷孕早中期建議每日十五毫克，懷孕晚期需增至三十毫克，預防貧血與早產。可多吃深綠色蔬菜、肝臟、蛋黃等，搭配維生素助吸收。

鈣：每日約一千毫克，有助胎兒生長與母體需要，來源如牛奶、乳製品、豆腐、深綠色蔬菜等。

碘：促進腦部發育，適量攝取碘鹽、海帶、魚貝類等。

維生素：

葉酸：每日六百微克，預防神經管缺陷，來源如深綠蔬菜、豆類、水果。

維生素D：幫助鈣吸收並幫助生長發育，來源如富含油脂的魚肉、蛋黃，也可經由曬太陽產生。

維生素B12：促進胎兒神經系統的健康，可從肉類、海鮮、紫菜等中獲取。

來源：懷孕時為什麼另一半也會出現懷孕症狀？

懷孕時為什麼另一半也會出現懷孕症狀？

科學家稱為「產翁現象」，在現代醫學研究中，稱此一個奇特現象為「擬娩症候群」(Pseudopregnancy)，這種症狀通常發生在二十一到二十七歲的男性身上。通常較容易出現在太太懷孕後期三個月，自己也會顯露出某種懷孕症狀。例如：噁心想吐、腰痠背痛、體重增加。科學家認為，十一的年輕準爸爸，或多或少經歷過這種奇怪的症狀，科學家將其歸之於一種心理失調的現象。即準爸爸們看到懷孕的妻子正在經歷懷孕的生理痛苦，他們心裡會產生出一種焦慮的情緒，不由自主地開始親身體驗「懷孕的痛苦」。

來源：懷孕期婦女的心理變化

懷孕期婦女的心理變化

懷孕對準媽媽而言是人生一大事，也是生命中重要階段。是否為預期中的懷孕、配偶及家人的支持度、家庭的經濟情況…等，皆會為準媽媽帶來不同程度的壓力和焦慮。而女性成熟度和對生產的身體、心理準備度，也影響準媽媽在懷孕期間是正向還是負向的情緒反應。

懷孕過程中，配偶及家人的支持與陪伴。能有效減緩懷孕過程中的不適與不安，透過與家人間良好互動。不僅可以增進感情，也可以一同體會對新生寶寶的期待與關愛。

懷孕的心理變化

第一孕期（懷孕十三週前）

一 為了確定是否懷孕密切觀察身體變化，同時對胎兒感到很不真實。

二 出現身體不適，注意力放在自己身上。

三 可能認為自己還沒做好準備，即使懷孕是計劃中的，仍會感到矛盾，喜憂參半。

第二孕期（懷孕十三到二十九週）

一起初發現胎動時，開始感受到胎兒存在是一個真實的個體，感到興奮並接受懷孕的事實。

二 在身體、心理上，逐漸與胎兒形成「母子一體」的感覺，使孕婦覺得自己有責任愛護、保障胎兒的健康及安全。

三 孕婦也會開始注重胎教，生活重心及話題集中在胎兒。

第三孕期（懷孕二十九週以上）

一 孕婦對懷孕的身體感受更清楚，且對這種改變會出現愛恨交加的「矛盾反應」。

二 因體重增加造成行動不便，身體容易疲憊不適。需要更多休息，感覺懷孕愈後期愈辛苦。會期望預產期趕快到來，但又會擔心生產的疼痛與危險性。

三 注意力的焦點放在分娩事件上，會有不好的幻想造成壓力，情緒較脆弱，容易感到被拒絕、有失落感和焦慮。

母性任務發展

一 確保自己及胎兒在懷孕、生產過程中平安順利：尋求良好的醫療院所與醫師、閱讀吸收相關知識、接受家人朋友，甚至宗教信仰所給予的精神支持。

二 家人迎接新生兒的準備：對於家人是否認同並接受胎兒而感到不安，孕程中，先生伴侶以及其他孩子對於胎兒的認同與關心，將有助於孕婦的情緒穩定度。

三 學習對孩子貢獻自己：身為母親對孩子的貢獻是需要學習，母愛並非天生內建，需要不斷的從親子關係中觀察、從錯誤中學習。

四 認同胎兒成為自己的一部份，情緒上與胎兒連成一體：藉由胎動的感動，母親在懷孕期間與胎兒發展依附（）關係，將成為母職中重要的精神支持。

孕婦在認同母親角色的行為表現

模仿：主動模仿學習他人具母親形象的行為，如作母親的一些動作、言辭、及照顧孩童的技巧等。

角色扮演：藉著照顧他人嬰兒的角色扮演（）方式，來執行母親的角色，練習做一個母親。

幻想：將母親的角色內化，會幻想各種有孩子的情況而如何去扮演好母親的角色，並推敲自己在角色中的情形。

接受：孕婦藉由尋找角色模範與自我相比對的過程，從中選擇合適自己的母親角色模式，合適則加強，不合適則拒絕。

哀傷：在接受一個新角色時，須捨棄自己以前的角色或加以修正。心理與角色上的變化無法完全回復到懷孕、生產前的狀況。

做一個快樂的孕婦～

一 規律產檢，尋求專業指導與諮詢。

二 必要時請醫師進行篩檢，以評估並提供高危險妊娠的照護。

三 適當的體重管理。

四 良好的飲食習慣。

五 非藥物性的舒緩壓力的方法：補充三（深海魚油）、針灸、瑜珈、溫水泡澡、按摩、芳香療法、規律的運動、充足的睡眠。

六 對懷孕有正確的認知。

七 不放棄充實的生活。

八 嘗試找人傾訴、分享心情。

九 堅定信心、面對問題。

來源：懷孕期間不適症狀與處理

懷孕期間不適症狀與處理

懷孕期間生理心理都會有些改變，準媽媽遇到一些不舒服的症狀時可以如何處理？

頻尿

原因：子宮擴大壓迫膀胱，或心理因素。

處理方法：有尿意感立即前往排尿。白天增加液體攝取量，夜間為減少小便次數，可在晚餐以後減少液體攝取量。

噁心、嘔吐

原因：荷爾蒙改變、代謝改變、情緒因素、空腹。

處理方法：起床前先吃些蘇打餅乾、乾吐司或穀類食品後，再下床。避免在用餐時喝湯或開水。少量多餐、避免空腹饑餓，可在兩餐間補充食物。避免油膩、不易消化或調味濃烈之食物。孕吐後用開水漱口，以去除噁心味。並可喝少許開水，將胃酸沖離食道，以減少食道灼傷的機會。

便秘

原因：

一飲食不足，運動量減少，腸胃蠕動減慢及缺乏纖維質食物引起。

二子宮增大使得小腸移位，或子宮壓迫直腸所致。

三補充鐵劑而引起。

處理方法：水份充足，一天要攝取二千之水份。適度的運動，早晚做散步活動。多吃有渣的蔬菜、水果、全穀類。養成每天定時排便的習慣。必要時依醫師處方服用軟便劑，切勿自行服用成藥。

陰道分泌物增加

原因：受體內荷爾蒙影響，子宮頸分泌增加。

處理方法：注意清潔，每日淋浴，勿用消毒水清潔外陰部。如廁後衛生紙由陰部往肛門處擦拭，勿來回擦以防感染。勿穿褲襪或緊身衣褲。宜穿透氣棉質內褲，濕即更換，勿用不透氣護墊，易悶及潮濕。若分泌物多且有搔癢、灼熱感、臭味情形，應看醫師。

抽筋、下肢水腫及靜脈曲張

原因：骨盆腔壓力增加造成下肢血液回流減少。

處理方法：

一 保持下肢溫暖。

二 攝取含鈣較多的食物，如牛奶、排骨、小魚乾。

三 抽筋時將腿伸直，以手由足底向小腿方向推、按摩。

四 勿吃太鹹的食物。

五 休息時最好採左側臥，可將下肢抬高，使血液循環較流暢。

六 洗澡時可用冷水沖洗腿部三至五分鐘，舒緩腿部疲勞。

七 盡量避免長時間泡熱水或泡溫泉，否則會容易造成靜脈更加腫脹而破裂。

八 睡前可將腿舉起五至十分鐘，促進腿部的靜脈血液回流。

預防之道：

一 避免久站，保持下肢溫暖，必須站立時經常左右變換重心。

二 坐著不要翹二郎腿或讓腳懸空。

三 休息時把小腿抬高。

四 起床前就穿上彈性襪。

五 避免穿太緊的上衣或腰帶。

六 維持理想體重。

痔瘡

原因：便秘、腹瀉、用力使靜脈內壓力增加，增大的子宮壓迫靜脈阻礙循環所致。

處理方法：養成定時排便習慣，避免便秘，蹲坐用力，久坐或久站。溫水坐浴。疼痛厲害可看醫師，使用軟便劑或止痛軟膏。

腰酸背痛

原因：姿勢不良，子宮擴大使腰薦椎的曲度增加，懷孕期間荷爾蒙改變使關節軟化、鬆弛而導致。

處理方式：保持正確姿勢，背部保持平直，勿彎腰駝背。避免拿重物、久站、久坐或太勞累。坐時腰背應有支托。使

用腹托支持腹部，以減輕背部過度用力。按摩腰或背部以促進血液循環。

胃灼熱、心口灼熱

原因：懷孕時黃體素分泌增加，使腸胃蠕動減緩。食物在胃內停留的時間增長，加上賁門括約肌鬆弛導致胃液逆流回食道。因而引發灼熱感；懷孕後期，因子宮向上壓迫胃部。也容易出現胸口灼熱的症狀。

處理方式：少量多餐，避免一次進食太快或過多。避免甜食與油膩、不易消化或油炸的食物，減少碳酸飲料等會刺激胃酸分泌的食物。避免衣物太緊或束緊皮帶，減少胃食道逆流的机会。進食後宜半坐臥，不要馬上躺下。睡覺時將枕頭墊高。嚴重時可在醫師的建議下服用制酸劑、止吐藥物。

蛀牙、牙齦炎、懷孕期牙齦增生、牙周病惡化

原因：荷爾蒙改變、進食次數明顯的增加、懷孕的初期對酸性食物特別偏好、常會反胃及吐酸水。

處理方式：維持良好的口腔衛生習慣餐後及睡前潔牙、搭配牙線棒及牙間刷。定期口腔檢查懷孕婦女牙結石清除。有異常情況應及早接受治療。

出血性問題

原因：可能與流產、早產及胎盤位置有關。

處理方法：懷孕期間之出血及凝血障礙會導致嚴重的問題，包括流產。如果準媽媽有出血或凝血障礙，請告知您的醫師。

來源：懷孕期間可以游泳嗎

懷孕期間可以游泳嗎

孕婦適當的運動，可以幫助腸胃蠕動以利排便；並促進血液循環、強健肌肉、舒緩背痛、減少陣痛時的疼痛，減少生產時情緒及全身肌肉的緊張、增加產道肌肉的強韌性，以便順利生產。

對孕婦來說游泳是很好的運動，在懷孕前就有游泳習慣的準媽咪們，只要您沒有腹痛、出血等流產或早產的現象，可一直游到生產為止。

游泳運動的注意事項游泳前請做些暖身運動，以免下水後發生腿部抽筋現象。運動的時間及速度以自己體能可以負荷為主。注意地面濕滑避免跌倒。適時補充水分。游泳完畢後，會陰部請以清水沖洗乾淨以避免感染。

來源：懷孕期間外食午餐、晚餐如何吃？吃對孕期不貧血

懷孕期間外食午餐、晚餐如何吃？吃對孕期不貧血

現代工作步調快速，許多媽咪在懷孕時仍一邊忙於工作，一日三餐總有個一、兩餐外食。在孕期所需的營養素中，李婉萍營養師會建議各位孕媽咪留意葉酸、鐵質、維生素十二及蛋白質是否都有攝取足夠？若是缺乏上述營養素，就有極大的可能會遇到「孕期貧血」。懷孕時貧血不僅是媽咪感覺頭暈、食慾不佳而已，程度嚴重者還會提高流產、早產的機率，即使寶寶出生也可能成長遲緩、體重過低。那常常外食的孕媽咪該如何吃才能充足孕期四大營養素呢？

孕期外食也不怕貧血重點營養素：葉酸、鐵質、維生素十二、蛋白質

建議選項：豬肝麵一碗、滷豆干一盤、燙綠色蔬菜一道、柳丁一顆

備餐謹記原則：「一日高纖不能少，綠色蔬菜一定要」。纖維之所以重要是因為可以提供腸道好菌所需的食物，在懷孕期間子宮容易壓迫到腸道導致排便不順。多攝取深綠色蔬菜能促進消化代謝、讓排便順暢，同時深綠色蔬菜也富含葉酸。是預防貧血時必須攝取到的重要營養素。

一 豬肝麵：含鐵量高，預防貧血好幫手！

豬肝除鐵質含量高，更富有動物性蛋白質，助於鐵質吸收。另外，紅肉（如：牛肉、豬肉）及動物內臟（如：肝、腰子、心）基本上都是含鐵量較高的食材，像豬肝相對熱量低但含鐵高一碗約一百二十五公克的豬肝湯就有一百二十八的鐵質，媽咪們可依需求及喜好替換食材種類。豬肝牛排鐵質比一比豬肝湯十二萬五千一百五十八卡，鐵質一百二十八；八盎司紐約克牛排四百二十九大卡，鐵質五十二

二 滷豆干：蛋白質、鐵質

充足的蛋白質利於協助鐵質吸收，可以搭配一盤滷豆干，更能幫助寶寶好好地長肌肉！

三 深綠色青菜：葉酸、膳食纖維

外食很常看到的高麗菜或豆芽菜，其實葉酸含量較不足。營養師會更推薦選擇紅鳳菜或紅莧菜，不只含有葉酸。含鐵量也很高。在同樣都是一百之下，沙朗牛排含鐵量有二十五，紅莧菜的含鐵量卻有八十五！

四 柳丁：維生素、膳食纖維

飯後搭配柳丁或橘子，除了補充維生素之外。也幫助增加鐵質的吸收率，柳丁也有著豐富的膳食纖維。不僅能預防貧血也能顧腸胃。

來源：懷孕期間常會頭暈要如何預防？

懷孕期間常會頭暈要如何預防？

懷孕期間孕婦偶爾會有昏厥、眩暈的現象，是因血容量改變及血液鬱積滯留在身體下半部或末梢血管引起姿勢性低血壓而引起。當突然的姿勢改變或久站，會覺得眩暈、眼冒金星、物體旋轉。有時可能昏厥暈倒。發生眩暈時，應就近坐下或躺著，如果持續有不適情形，應儘速請教醫師尋求改善方法。

預防方法：

一 變換姿勢時，應緩慢移動身體。

二 避免長時間站立太久或突然改變姿勢。

三 不要到擁擠而空氣不好的空間、公共場所。

四 充足的睡眠與休息，減輕工作量勿太勞累。

看更多：

懷孕後期腰臀不適解決方案

懷孕可以吃膳食纖維預防便秘嗎？

孕期二十五週可以進行胎教囉！

來源：懷孕期間情緒改變

懷孕期間情緒改變

懷孕期間，由於荷爾蒙分泌改變加上懷孕的不安全感，使得孕婦身心承受了巨大的負擔，會有不穩定的情緒表現：

一 煩躁、暴躁：孕婦因妊娠反應而會感到心情惡劣，煩悶不安，愛發脾氣。

二 擔心：孕婦會擔心胎兒的健康。

三 憂鬱：憂鬱情緒會造成孕婦失眠、厭食。

四 淡漠：妊娠期間，孕婦可能只關心體內的胎兒而對其他事情漠不關心，這樣會影響夫妻感情。

五 依賴：會希望丈夫能常常陪在身邊，過分依賴丈夫或母親。

六 猜疑：想著寶寶是男孩還是女孩，擔心寶寶的性別給自己的壓力，無形中造成孕婦心理負擔。

七 羞怯：怕別人看出自己懷孕了，不好意思出現在公共場所。

八焦急、緊張：期待寶寶的出生，擔心寶寶不健康，而焦躁不安；或對分娩產生恐懼。

如何舒緩情緒

一轉移情緒：去做一件高興或喜歡的事，如聽音樂、欣賞畫冊、閱讀或郊遊。自然美感所引起的情感，會使孕婦對生活的興趣提高。

二釋放煩惱：將煩惱向密友傾訴，或寫信、寫日記。這種做法，能非常有效地調整孕婦的情緒。必要時，可找心理醫生進行諮詢及疏導。

三和好友聊聊：應結交情緒積極樂觀的朋友，充分享受與他們在一起的快樂，讓他們的良好情緒感染自己。

四改變造型轉換心情：換髮型或買件新衣服，變換房間的佈置，都會給孕婦帶來一種新鮮感，進而改變沮喪的心情。

五減輕孕吐：孕吐會使孕婦煩惱、沮喪，因此要積極減輕症狀。早晨可先吃一些餅乾或點心，半小時後再起床。多吃清淡可口的蔬菜水果，少吃油膩甜食，少量多餐為宜。

來源：懷孕期間感染猴痘有哪些風險？

懷孕期間感染猴痘有哪些風險？

一千九百五十八年猴痘病毒首次從研究用猴子身上被發現，因此該病被命名為「猴痘」。猴痘病毒屬痘病毒科，正痘病毒屬。主要由齧齒動物和靈長類動物傳播給人，屬人畜共通傳染病。隨著一千九百八十年天花消滅和之後停止接種天花疫苗，猴痘成為現存最嚴重的正痘病毒感染症。

其人傳人是透過密切接觸確定個案的皮疹、瘡痂、體液造成人與人之間的傳染，例如經由親密接觸之性行為。包括：口交、肛交或陰道性交，或接觸猴痘患者生殖器陰莖、睪丸、陰唇及陰道或肛門、與猴痘患者進行擁抱、按摩和親吻。以及長時間的面對面接觸等。接觸到感染者呼吸道分泌物、損傷的皮膚或黏膜或被污染物品而感染。而性接觸為此波疫情主要傳播途徑，飛沫傳播需在長時間面對面接觸情境下較容易發生，因此執行會產生飛沫微粒之醫療措施且未著適當個人防護之醫護人員，及親密接觸之同住家人才有較大的感染風險。產婦若感染猴痘病毒，可經胎盤垂直傳染給胎兒，或於產程中因接觸而傳染。

至於人畜共通傳染，乃直接接觸感染動物的血液、體液、損傷的皮膚或黏膜而被感染。食用受感染的動物肉類也是一種危險因子。

猴痘感染後症狀包括發燒、畏寒寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛

、淋巴腺腫大如耳週、腋窩、頸部或腹股溝等處、極度倦怠。發燒一至三天後出現皮膚病灶，通常自臉部蔓延至身體其他部位，四肢比軀幹更常見。大多數個案可於幾週內康復。兒童、孕婦及免疫功能低下者尤其容易重症，併發症包括繼發性細菌感染、肺炎、敗血症等。然而大多數猴痘病患的病程為自限性，因此以輸液治療與維持營養等支持性療法為主，以減輕症狀和併發症。但由於孕產婦感染猴痘病例有限，所以是否較容易感染孕產婦則未知，但仍有零星案例指出感染猴痘會造成流產或胎死腹中等現象。

我國目前有儲備藥物，供國內猴痘重症患者、嚴重免疫不全者、兒童族群特別是一歲以下的嬰兒、孕婦及哺乳婦女使用。

美國食品藥物管理局於二千零一十九年核准由含有活的但非複製減弱天花病毒株製成之新疫苗，可用預防天花和猴痘感染，適用於十八歲以上感染猴痘之高風險族群。我國亦已專案進口猴痘疫苗，公費提供符合接種對象條件之民眾使用。一般民眾非屬猴痘高風險族群，故無須常規性接種猴痘疫苗。如已出現猴痘症狀，則不建議接種疫苗。就目前人類研究報告，該疫苗沒有足夠的證據表示會對孕婦有所危害。

而動物實驗研究表示不會造成腹內胎兒有所危害。懷孕與哺乳並非接種禁忌症。若孕婦與哺乳婦女因職業或高風險暴露需接種猴痘疫苗時，建議與醫師討論評估後再決定是否接種。

目前提供公費疫苗接種對象如下：

一 暴露前預防：

一 正痘病毒屬之實驗室操作人員。

二 與確診猴痘個案曾有任何形式性接觸之高風險接觸者，但未曾接種過暴露後預防疫苗。

三 近一年有風險性行為者例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者。

四 照顧猴痘確診個案之醫療照護與清消人員，以及協助疑似猴痘個案檢體採檢或執行猴痘疫苗接種作業人員。

二 暴露後預防：「猴痘疫情調查及接觸者追蹤指引之接觸者匡列處置原則」所列高暴露風險接觸者。

三 其他特殊狀況報經疾管署同意者。

目前並沒有研究有指出猴痘的感染與游泳池、溫泉水等相關，場所本身不是問題。畢竟猴痘為透過密切接觸確定個案的皮疹、瘡痂、體液造成人與人之間的傳染，因此避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險

場域才是重點。尤其是可能發生性行為的營業場所，在缺乏免疫力的情況下。減少出入為宜。建議如有風險性行為，請接種猴痘疫苗，提升自身保護力。另如出現水泡、皮疹等皮膚病灶或淋巴腺腫大等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。美國指出，因接觸猴痘確診個案使用過但未消毒的物品、織物等如衣服、床上用品、毛巾等而感染猴痘病毒的風險很低。

雖然在有症狀的猴痘患者的家庭和醫院病房中，頻繁接觸的物件表面可偵測到猴痘病毒，但病毒濃度普遍較低，在環境表面和空氣樣本值三十。目前並沒有證實，因為住宿旅館接觸床單、毛巾等，而產生群聚事件的報告

根據目前研究資料，猴痘確診個案病毒量在發病初期最高，隨後逐漸下降。發病三週後除精液外，其他檢體包括皮膚、咽喉拭子等有九十五機率已無法以檢出病毒。目前尚不清楚發病後期所偵測到的病毒是否具有傳染力。

女性個案若於痊癒後再懷孕，胎兒並無感染風險。男性個案痊癒後精液中之病毒是否具有傳染力目前仍未知，因此美國與建議，痊癒後一段時間內避免性行為或全程使用保險套是確保性伴侶安全之高規格做法。我國根據上述指引，建議男性個案於出現症狀後三個月內避免各種性行為，或全程使用保險套。

來源：懷孕期間的睡眠姿勢

懷孕期間的睡眠姿勢

不論什麼樣的睡姿，只要孕媽咪感覺舒適、能睡得好，基本上沒有特別限制。不過，側睡對下肢循環比較有幫助。

側睡對下肢循環有幫助

以生理角度來說，側睡對於下肢的循環是比較有幫助的，左側睡或右側睡不用刻意限制，孕媽咪能睡得安穩才是重點。若睡到一半發現自己變成仰睡，也不必擔心。

運用枕頭幫助支撐身體

使用枕頭、靠墊撐住肚子、腰部，或夾在兩腿之間。是側睡更舒適的小技巧，能幫助支撐身體。讓孕媽咪睡得更舒適。

來源：懷孕期間皮膚搔癢

懷孕期間皮膚搔癢

約有二十的婦女在懷孕期間，身體不同部位的皮膚會出現搔癢的情形。而在懷孕期間產生的皮膚症狀有九十都會令人感覺癢到不行，因此學理上將這些症狀統稱為妊娠搔癢症。主要是因為體內荷爾蒙的改變，雌激素分泌量變多。導致膽鹽代謝不良，淤積在體內。同時前列腺素濃

度的增加，使皮膚搔癢耐受度減退。此種情形稱為妊娠搔癢症。有皮膚問題可找皮膚科醫師討論是否須使用藥物來治療。

食：避免咖啡、酒等飲料，油炸食物要少碰，多蔬果、適當水份攝取。

衣：穿著寬鬆衣服減少磨擦、刺激。

住：洗澡水勿過熱，避免過度清潔。皮膚搔癢時用毛巾稍做冰敷，充足睡眠、適當紓解壓力。保持好心情。

行：適當塗抹皮膚保濕產品，避免高溫、容易流汗的環境。若有任何問題都可與醫師討論，仔細挑選安全的藥物，準媽媽們也可以安心的接受治療。

來源：懷孕期間素食怎麼吃？孕媽咪吃素也不怕會貧血

懷孕期間素食怎麼吃？孕媽咪吃素也不怕會貧血

根據國民健康署的調查結果，育齡女性平均約每五位就有一位有貧血情形。如果於懷孕期間發生貧血症狀，不但媽咪本身容易感到頭暈、疲倦、食慾不佳。嚴重的話更可能導致胎兒流產、早產，甚至造成寶寶出生後成長遲緩或體重過低。所以可不能輕忽！想要預防貧血，有四大營養素建議需要加強攝取：葉酸、鐵質、維生素十二、蛋白質。但由於鐵質及維生素十二大多來自於動物性食材，素食者較不易攝取，那懷孕的婦女是否就不能吃素了嗎？答案是當然還是可以的！

維生素十二除了存在於動物性食材之外，其實也存在植物性食材中。例如：海帶類食材，李婉萍營養師建議在懷孕期間素食者以蛋奶素為主。因為維生素十二也可以於蛋黃中攝取。另外，因植物性鐵質吸收率不高，建議在飯後兩小時內搭配攝取維生素含量高的水果（例如：芭樂、奇異果、柚子等），可以幫助鐵質吸收。

吃素如何避免孕期貧血？葉酸、鐵質、維生素十二、蛋白質不可少

建議餐單：五穀米飯一碗、豆腐／豆皮一道、炒蛋料理一道、綠色青菜一道、玉米海帶湯一碗、芭樂／奇異果一顆

一五穀米飯：多種穀、多種豆，互補成為優質蛋白質。

主食以澱粉為主，為主要熱量來源。素食者的蛋白質主要來自豆類，但如果只吃白飯配豆腐。營養不夠均衡，建議讓穀類搭配豆類一起吃。互補成為優質蛋白質，實際上可做成黃豆飯、紅豆飯或五穀米飯。

二豆腐／豆皮／炒蛋料理：蛋白質、鐵質、維生素十二

想要寶寶頭好壯壯，肌肉生成就不能缺少蛋白質，同時有足夠的蛋白質也能幫助鐵質的吸收！但在素食不能吃動

物性蛋白質（肉類）的情況下，「蛋」及「豆類」的攝取就變得更加重要。蛋除了提供蛋白質外，蛋黃也是鐵質及維生素十二的重要來源。建議孕媽咪盡量不要挑食不吃蛋黃！

三 綠色青菜／玉米海帶湯：葉酸、維生素十二、膳食纖維

玉米屬於全穀雜糧類，但也提供葉酸。和綠色青菜一樣都是纖維豐富的食材，海帶則有素食者容易缺乏的維生素十二。兩者都是預防貧血不可或缺的重要食材。另外，綠色蔬菜會推薦紅鳳菜、紅莧菜。同樣是一百，沙朗牛排含有的鐵量是二十五。紅莧菜卻足足有八十五之多！

來源：懷孕期間要避免上下樓梯嗎？

懷孕期間要避免上下樓梯嗎？

懷孕期間平時不需刻意避免上下樓梯或將爬樓梯當作產前運動。上下樓梯基本上也算是孕婦可以從事的一種運動，但懷孕後期的孕婦由於重心不穩。膝蓋負荷亦加重，且腹部變大可能在下樓梯時看不見腳下的情況。為了避免沒有踏穩而跌落，上下樓梯時最好手能扶握樓梯扶手。有人在旁陪同注意比較安全。

來源：懷孕期間運動時須注意什麼

懷孕期間運動時須注意什麼

孕婦運動要以輕鬆為原則，若是會喘或上氣不接下氣，就已失去運動的意義。在走路時宜放慢腳步以減輕脊椎的負荷，若走累了。想休息時，也儘量坐在有垂直椅背的椅子為宜。儘量少坐在沙發上。另外孕婦儘量不要爬特別陡的坡道，要穿著舒適合腳的鞋子並注意活動安全。走路運動時要防止體溫過熱或是脫水，因此在走路前、中、後都應補充水份。避免在太熱的天氣中行走，更不要在上十時至下午三時這段太陽直射最強的時段走路，以免母體溫度增高太多，不利胎兒成長。

除日常活動及散步外，在醫護人員指導下，依個人身體狀況，做產前運動（如腰部運動、腿部運動、呼吸運動……等）。應養成每天運動的習慣，並持之有恆。次數由少而多，時間由短而長。避免過勞。

孕期的前三個月一定要小心，避免劇烈運動。在運動時如果有出現陰道出血、有液體流出，或出現突發疼痛、胸痛、呼吸困難、嚴重或持續的頭痛或頭暈等問題，一定要立即停止運動，最好馬上去醫院檢查。另外，如果在停止運動半小時後仍然持續有宮縮、腹痛，亦不能再運動，並建議立即就醫。

來源：懷孕生產好心情

懷孕生產好心情

懷孕是許多準媽媽生命中全新的經驗

面對身體、心理、職場、社交關係、家庭環境與經濟的調整，準爸爸與親友們應該提供適時的鼓勵與支持，以正面喜悅的態度迎接新生命的到來。孕產過程中有任何的問題可藉由全國性免付費孕產兒關懷諮詢專線八百到八百七十-八百七十華語諧音：抱緊您抱緊您與孕產兒關懷網站（），獲得您所需的衛教知識與協助。

懷孕初期的不確定感

懷孕初期除了迫不及待與家人親友分享的喜悅外，也可能伴隨著懷疑是否準備好迎接寶寶的不確定感。隨著懷孕過程漸漸出現體重增加與不適症狀，準媽媽需要藉由適當的生理與心理調適，以迎接這段美麗的旅程。請準媽媽忍耐一下，多數孕吐等不適症狀到懷孕中期將明顯改善。

懷孕中期做好準備

懷孕中期準媽媽逐漸習慣了身體與生活的改變，也開始感受到寶寶明顯的胎動。除了定期接受產前檢查之外，很適合為生產、坐月子、寶寶照護等過程進行孕產知識與相關物品的準備。

懷孕後期安心待產

隨著預產期越來越近，緊張的情緒與身體的不適會造成相當的壓力。建議準媽媽務必準時產檢，並與醫師討論適當的生產方式，在親友的支持與陪伴下以穩定安心的情緒迎接新生命的到來。

給準媽媽的產檢資源建議

一 孕產婦關懷諮詢專線與孕產婦關懷網站：

國民健康署提供準媽媽及其家人可以撥打免付費孕產婦關懷諮詢專線或至孕產婦關懷網站查詢，瞭解您所需要的孕產知識。

二 產前檢查補助產後健康照護服務：

為周全孕期照護，自一百一十年七月一日起。國民健康署提供十四次產前檢查、三次超音波檢查、妊娠糖尿病篩檢、貧血檢查、懷孕第三十五到三十七週孕婦乙型鏈球菌篩檢補助，以及二次孕婦產前健康照護衛教指導服務。準媽媽記得要與醫師配合準時接受產檢，確保寶寶與媽媽的健康。另外，於一百一十四年五月除了現有的十四次產前檢查，再加碼增加二次的產後健康照護服務，相關資訊請參閱文章：產後媽咪看過來！妳知道如何運用政府補助的「產後健康照護服務」方案嗎？

三 支持團體：

台灣各縣市均有母乳哺育與孕產支持團體，每季定期提供您在地化的孕產支持與協助。上述資源可至孕產兒關懷諮詢專線八百到八百七十-八百七十抱緊您抱緊您、孕產兒關懷網站（）。

給準媽媽的健康建議

一 與醫師合作：

藉由產檢過程讓您的醫師充分了解準媽媽與寶寶的健康狀況，及不適的症狀處理方式，並與醫師充分討論後選擇適當的生產方式，準備好迎接新生命的到來。

二 注意營養多多休息：

建議準媽媽優先攝取天然食物，並避免菸、酒、加工食品。尤其要注意多食用如海帶、海藻、綠色蔬菜、黃豆製品、紅肉、肝臟及酵母…等食物，以增加葉酸、鐵、碘的攝取。對於胎兒生長發育，頭好壯壯非常重要。是奠定寶寶一生健康的基石。部分準媽媽可能會有疲倦想睡的感覺，建議媽媽可以把握時間多休息，讓身體與心理準備好迎接懷孕所帶來的改變。

三 轉換心情：

更換髮型與衣服都會為生活帶來新鮮感，從事舒緩心情與培養美感的休閒活動，如澆花、聽音樂等，都能轉移準媽媽不舒適的感覺。

給準媽媽的社交建議

一 釋放煩惱：

向親友以文字或聊天的方式傾訴心中的想法，能有效地調整孕婦的情緒，也可以參加好友聚會，讓自己保持良好的情緒。

二 準爸爸與親友參與：

建議準爸爸或親友協同採買孕產所需用品或陪同產檢，藉由準備的過程給予心理及生活上的鼓勵與支持，家人的支持是穩定情緒最大的力量。

三 親職教育：

與準爸爸或撫養者一同學習親職教育，為良好的親子關係奠定基礎。

給媽媽的生活環境建議

一 生活與環境準備：

準備好寶寶照護與母乳哺育相關用品，提供寶寶良好舒適的居家環境。

二 職場準備與調適：

因應懷孕期間身體改變所造成的不便，避免從事危險勞力的事務，配合舒適的鞋子與坐墊降低腿部與腰部的不適。

三 哺集乳室與母乳保存：

瞭解日常活動範圍中的哺集乳室地點，並準備好返回職場後哺集乳與母乳保存設備。

來源：懷孕第10週 懷孕初期-飲食技巧大公開

懷孕第十週 懷孕初期-飲食技巧大公開

媽咪身體變化

媽咪的子宮大約成長到一顆柳丁的大小了。如果媽咪胃口很好，有可能體重會快速增加。腰部會變得更粗，孕期增重太快、太多。產後減重會很辛苦喔！有些媽咪皮膚黑色素會加重，像是痣、斑點、乳頭顏色可能會加深。因為孕期荷爾蒙變化的影響，此時可能覺得比較容易疲倦。這是正常現象，另外。有些人則會有頭疼的困擾。

胎兒發育狀況

寶寶以驚人的速度成長著，目前身長大約有三十一公分，重量約為四公克。進入第十週，寶寶重要器官都已經形成。目前比例上仍然是頭部和身體各約占一半的長度，而寶寶的手、腳可以更靈巧的活動了。小手指、小腳趾上的蹼已經消失。

骨骼持續發育著，在超音波中可以看見寶寶白色的脊椎，也將發展出膝蓋和腳踝。如果是男寶寶，他的睪丸會開始產生睪丸激素。

飲食營養

孕期第十週，媽咪可以檢視一下日常的營養攝取是否均衡，以下是六大類食物建議，可根據個人的活動量及體重做調整。例如活動量很小的媽咪，每天約攝取一千五百大卡的熱量即可。

一 全穀雜糧類：一天二十五到四十五碗。

食物來源：糙米飯、全麥饅頭、麵條、地瓜、玉米等。

二 豆魚蛋肉類：一天四到七十五份。

食物來源：雞蛋、豆腐、豆漿、雞肉、魚肉、牛肉、肝臟等。

三 蔬菜類：一天三到五份。一般蔬菜煮熟後，裝大半碗算一份。

食物來源：各種蔬菜。

四 水果類：一天二到四份。拳頭大小算一份。

食物來源：各種水果。

五 奶類：一天十五杯。一杯以二百四十計算。

食物來源：牛奶、起司、優酪乳等。

六 油脂及堅果種子類：一天三到六湯匙的油脂及一份堅果。五顆腰果或杏仁果就是一份。

食物來源：烹調用橄欖油、沙拉油等。堅果類，如花生、腰果、開心果等。

詳細內容請參考衛福部單張：孕產期營養、素食孕產期營養

生活小叮嚀

一本週請媽咪可注意懷孕早期的自費產檢項目，包括染色體脆折症基因檢查、脊髓性肌肉萎縮症基因檢查，可以和醫師討論是否有檢查的必要性。

二胃口好的媽咪還是要控制一下飲食喔！要等第二孕期才需要增加熱量的攝取，通常第一孕期體重不太需要增加，或是少量增加二到三公斤左右為宜。

三台北捷運有提供「好孕貼紙」、「好孕徽章」或「好孕吊飾」，媽咪只要憑「孕婦健康手冊」都可以兌換，搭乘捷運時更能確保有座位可坐。

來源：懷孕第11週 懷孕「鈣」重要！

懷孕第十一週 懷孕「鈣」重要

媽咪身體變化

本週媽咪的體重和上週不會有太大的不同，但有些人會開始覺得皮膚狀況有點不太一樣囉。可能會長青春痘、粉刺，或是比較敏感。另外，從胸線下方到肚臍會慢慢出現一條顏色偏深的線。乳頭及乳暈的顏色也會再加深。

因為荷爾蒙的影響，媽咪可能會覺得分泌物有增加的狀況。正常的分泌物是呈現透明、微黏稠的液體，但如果妳感覺有異味或黃綠色分泌物。則是感染了，需要就醫治療。

胎兒發育狀況

孕期第十一週，寶寶的身長大約有四十一公分，重量約為七公克。目前妳的寶寶已經有完整外形，皮膚呈現透明感，可以看得到血管。寶寶的手指及腳趾完全分開了，有時候會吸吮大拇指或腳趾呢，隨時也會進行伸展和踢腿的動作，是不是很可愛呢！

寶寶的內臟器官，例如肝臟、腎、腸、大腦等正全力發育中。心跳越來越有力，目前心跳速度大約每分鐘一百二十至一百六十下，本週也可以看到寶寶脊柱的輪廓，脊神經開始生長。

飲食營養

媽咪應該都知道懷孕期間鈣質補充很重要，建議每日攝取一千毫克的鈣質，來滿足胎兒的生長，還有母體的需求。如果鈣缺乏，在中後孕期容易出現腳抽筋現象，以及將來會有骨質疏鬆的困擾喔。

高鈣食物包括：牛乳、乳製品、豆腐、小魚干、黑芝麻、深綠色蔬菜等。如果妳有乳糖不耐的困擾，可以改攝取像是起司、優酪乳、無糖的優格。

生活小叮嚀

一建議媽咪可以調整日常的保養品，選擇溫和不刺激或是專為孕婦設計的產品。長痘痘時，化粧保養程序要儘量簡化，必要時可在醫師指導下使用抗痘產品。

二除了補充鈣質之外，適當曬太陽可以增加體內維生素D，進而促進鈣質的吸收。建議孕媽咪於陽光充足但不是最強烈階段，到戶外曬太陽約十到二十分鐘。但如果是在室內隔著玻璃，那麼只會吸收陽光的熱度。並沒有曬太陽的功效喔！

產前檢查

第一孕期唐氏症篩檢

自費費用：約二千二百元

懷孕第十一到十四週時，建議妳經醫師綜合評估後再進行，但三十四歲以上者可評估選擇羊膜穿刺檢查。此篩檢是透過超音波檢查加抽血計算機率，可評估寶寶罹患唐氏症的可能性，準確率約八十到八十五。

唐氏症是最常見的染色體異常疾病，也是導致智能障礙的最主要疾病。平均每八百位孕婦，就可能有一位會懷有唐氏症胎兒。若篩檢結果為高風險者，建議於十六到十八週時接受羊膜穿刺檢查，以確定胎兒是否為唐氏症患者。

來源：懷孕第12週 做好產檢規劃，孕育健康寶貝

懷孕第十二週 做好產檢規劃，孕育健康寶貝

媽咪身體變化

恭喜媽咪進入孕期第十二週了！現在開始懷孕狀況越來越穩定，發生流產的機會已經大大減少，可以安心來迎接妳的孕期新生活。多數人孕吐症狀也慢慢減輕，再撐幾週，惱人的孕吐就可能結束了。

有的媽咪會發現原本只有腹部上方出現一條線，慢慢地從肚臍往下又出現一條明顯的妊娠中線。不過，也有媽媽要到中後期妊娠中線才會變明顯。其實每個人的身上都隱約可看見一條白線，懷孕期因為荷爾蒙變化才讓妊娠中線變明顯。別擔心，這是懷孕期間特殊現象，等生產後顏色就會逐漸變淡。

胎兒發育狀況

本週寶寶身長五十四公分，重量約為十四公克。胎盤已完全形成，以臍帶連接著胎兒。胎盤主要的作用是運輸營養及氧氣供給寶寶，並排泄胎兒的代謝物。如尿素氮、二氧化碳等。此外，羊水也圍繞著寶寶，妳的寶寶會在羊水中轉換不同方向，多數時間寶寶總是忙碌地活動著。腎臟功能也開始運作，會製造出尿液。

五官更加清晰，而且會做出像打呵欠的動作，手和腳的指甲也出現了，小寶寶每天都在努力成長中。

生活小叮嚀

一 習俗會說「懷孕未滿三個月」不能說，本週懷孕狀況已經穩定了，請可以放心囉！不過，在懷孕初期如果有任何不舒服。還是要去找醫師喔，尤其是不小心感冒時。可不能忍著不就醫，感冒症狀太嚴重。會影響胎兒發育。如果到了流感疫苗施打期，也要記得去接種疫苗。

二 公費產檢是屬於必做的產檢項目，請媽咪一定要按時接受產檢喔！產前檢查超過十四次及超音波超過三次者，也可自費增加檢查的次數。如經醫師診斷確為醫療需要者，則由健保給付。

三 因為孕期眼睛會變得比較敏感，如果戴隱形眼鏡容易不舒服，那麼就暫時改為一般框型眼鏡吧！雖然可能比較不美麗，不過，還是舒服比較重要。

產前檢查

產檢是孕期的大事，本週可以進行第二次產檢，包括問診、身體檢查（測量體重和血壓等）、實驗室檢驗以及例行檢查項目。並補助一次超音波檢查、一次乙型鏈球菌篩檢，以及二次產前健康照護衛教指導。媽咪只要翻開孕婦健康手冊裡面都有完整的項目喔！

理想產檢時間：

八週內檢查一次

二十八週內每隔四週檢查一次

二十九到三十六週每隔兩週檢查一次

三十七到四十週每隔一週檢查一次

除了公費產檢的項目外，現在也有很多的自費產檢項目。例如：子癲前症風險評估、脊隨性肌肉萎縮症基因檢測、染色體脆折症檢測、高層次超音波等等，媽咪都可以主動詢問醫師。和醫師討論是否有檢查的必要性。

來源：懷孕第13週 調整適合孕期的工作

懷孕第十三週 調整適合孕期的工作

媽咪身體變化

恭喜媽咪，賀喜媽咪，惱人的孕吐終於開始消退了！到了懷孕第十三週，有一半左右的媽咪會發現原來動不動就吐的狀況好像改善許多，傳說中美好的懷孕旅程即將來臨。不過，有少數的媽咪會持續孕吐到懷孕中後期喔，但只要產檢時寶寶發展都有符合標準，就不用擔心。

多數媽咪腹部會稍稍隆起，第二胎以上的媽咪可能會更加明顯。之前合身的衣服穿起來會太緊，請媽咪可以準備較寬鬆、吸汗的材質。保持身體的舒適及衛生。

胎兒發育狀況

目前寶寶的器官、神經、肌肉都已發育形成，而且互動串連合作了。寶寶身長七十四公分，重量約為二十三公克，像顆小蘋果的大小了。寶寶的頭部大約還是身體的一半大小，已經可以看出脖子部位了。眼睛和耳朵外形已經清晰可辨，眼睛仍然緊閉著。

牙齦跟牙床也開始發育。骨骼和肌肉持續發展著，平時寶寶會伸手臂、踢踢腿，不過，媽咪還不會感覺到胎動。

生活小叮嚀

一如果媽咪不喜歡穿寬鬆型的孕婦裝，那可以找找比較沒有強調腰線的服裝，或是單件式洋裝，只要不壓迫腹部或胸部都可以。現在有很多孕婦裝設計也很時尚喔，產後身材尚未恢復前也可以繼續穿，所以，還是可以考慮買一些孕婦裝。

二有些工作環境不是很適合孕婦，例如高溫的廚房、需要搬貨補貨、化學工廠等，如果妳不確定自己的工作性質會不會影響胎兒健康，可諮詢醫師意見。如果工作內容有

可能會危害胎兒成長，可以和老闆及同事商量及調整。

三請準爸爸要以實際行動來關懷太太，例如陪太太去做產檢；一同參加產前教育課程及產前運動；用心傾聽，分享太太快樂與憂慮；平時多分擔家事。這些舉動可提供太太懷孕期間最直接的支持，準爸爸也能藉此瞭解胎兒的生長發育情況喔。

產前檢查

子癲前症（妊娠毒血症）篩檢

費用

：二千到三千元

本週向媽媽介紹一項自費產檢項目-子癲前症（妊娠毒血症）篩檢，如果媽咪有高血壓、糖尿病或腎臟疾病、紅斑性狼瘡以及曾發生過妊娠高血壓的人，在十一到十三週時可以考慮進行子癲前症篩檢，透過胎兒超音波加子宮血流量測、抽血以及量血壓加以評估。

子癲前症是台灣產婦死亡的三大原因之一，子癲前症篩檢能計算出孕婦後期發生症狀的機率，可及早進行藥物控制及治療。

來源：懷孕第14週 初中期常見的孕期不適

懷孕第十四週 初中期常見的孕期不適

媽咪身體變化

進入懷孕第十四週，媽咪有沒有覺得輕鬆很多啊，看起來微微隆起的小腹會讓妳產生幸福感，越來越能享受成為孕婦的奇妙感受。

不過，進入第十四週。妳可能會發現陰道分泌物增加了，這是因為荷爾蒙的改變。正常的分泌物是白色或偏透明狀，但如果感覺分泌物量很多、瘙癢、有異味。就需要就醫檢查。

有些媽咪最近也會覺得視力好像有點不穩定，沒辦法看得像之前一樣清楚。別擔心，這是懷孕造成的眼部充血積水。多半等產後就會恢復正常，如果有不舒服請找眼科醫師檢查一下。

胎兒發育狀況

本週寶寶的五官已經很明顯了，甚至牙床裡也開始生長牙齒。皮膚非常薄，手指的指紋開始形成。全身會有一層細細的絨毛，聽起來有點像水蜜桃對吧。目前身長約為八十七公分，重量約四十三公克。如果妳懷的是女寶寶，她的卵巢中的卵泡數約有二百萬。不過，從出生後開始退化。到了青春期的剩三十萬個。

寶寶現在媽咪的肚子裡會皺眉、做鬼臉，沒事也會吸吸手指，光想像畫面就覺得很卡哇伊！

產前檢查

新生兒先天異常的發生原因有很多種，包括染色體異常、單基因突變、多因子遺傳或環境因素等，有很多先天異常都是原因不明的。這也是為什麼每位媽咪都要重視定期產檢。

目前產前遺傳診斷常用的方法有三個：一羊膜腔穿刺術。二絨毛膜取樣術。三臍帶血採樣術。

如有以下狀況的媽咪，需安排產前遺傳診斷時，政府會補助五千元。

一百三十四歲以上孕婦。

二曾生育過先天異常兒者。

三本人或配偶有遺傳性疾病者。

四家族有遺傳性疾病者。

五其他可能生育先天異常兒之高危險群者。（如：經超音波或孕婦血清篩檢胎兒有異常可能者。）

迎接寶寶計劃

比較熱門的產後護理之家／坐月子中心，可能半年內預定都已經額滿。需要排候補，所以。懷孕初期身體比較輕鬆時，有打算去產後護理之家的媽咪就可以開始預約參觀了。

目前提供產婦產後照顧機構分為產後護理之家、以及坊間所稱之「坐月子中心」兩類，最大的差別在於立案時有沒有「護理人員」提供「護理服務」。產後護理之家是依護理人員法向主管機關申請並立案，提供護理服務；坐月子中心則以提供膳食及住宿為主。沒有護理人員，不能執行護理服務。

衛生福利部呼籲準媽媽們及產婦，選擇產後護理機構時不要只看機構豪華光鮮的裝潢，最重要的是要選擇安全、專業、有品質，且是評鑑合格的機構接受產後照護及服務。

來源：懷孕第15週 孕期火燒心!! 胃灼熱怎麼辦

懷孕第十五週 孕期火燒心 胃灼熱 怎麼辦

媽咪身體變化

本週媽咪可能會出現胃灼熱的困擾，就是咽喉下方感覺灼熱或酸酸的。請盡量少量多餐，避免一次進食太快或過多。也建議不要吃甜食與油膩、不易消化或油炸的食物，吃完東西後不要馬上躺下、睡覺時可墊高頭部。這樣會比較舒服喔！

因為要孕育寶寶，妳的心肺功能負荷會增加，有時媽咪如果走路快一點就會覺得呼吸有點喘。另外，因為血流增加。媽咪很容易出汗且怕熱，建議媽媽穿著吸汗透氣的衣物。並注意肌膚清潔，以免汗水刺激引起肌膚敏感。

胎兒發育狀況

進入第十五周，妳的可愛寶寶的身長約一百零一公分，重量是七十公克，看起來像大蘋果的大小了。寶寶的頭皮和眼眉上開始出現細細的毛髮。骨骼系統和肌肉進一步發育中。腸子已經移至胎兒的體內；肝開始分泌膽汁，幫助消化脂肪。

寶寶的手腳伸展幅度增大，會在羊水中開心的游動，重複做相同的動作。在十四、十五週時已經可以透過超音波知道寶寶的性別，不過。有時候寶寶會雙腿夾緊緊，就無法明確看出性別了。因此在十六週時產檢時妳可以碰碰運氣，看寶寶願不願意揭曉他／她的性別。

飲食營養

親愛的媽媽，懷孕期間體重要適當控制。因為太重太瘦，對媽咪及寶寶都會有不良影響。建議整個孕期總增重以十到十四公斤為宜，同時要留意每週體重增加的速度。請妳可以參考以下數字。

體重公斤 身高二公尺二

例如：身高一百六十公分，體重五十五公斤。二百一十四（適中）

懷孕前小於一百八十五屬於體重過輕者

第二、三孕期每週增加五公斤

整個孕期建議增加約一百二十五到十八公斤

懷孕前在一百八十五到二百四十九屬於體重適中者

第二、三孕期每週增加五公斤

整個孕期建議增加約一百一十五到十六公斤

懷孕前二十五到二百九十九體重稍過重

第二、三孕期每週增加三公斤

整個孕期建議增加約七到一百一十五公斤

懷孕前三十屬於肥胖者

第二、三孕期每週增加二十五公斤

整個孕期建議增加約五到九公斤

休閒運動

在懷孕中期後，因為身體狀況穩定。媽咪可能會計劃國內或國外旅遊，會建議妳利用產檢時和醫師討論一下。有沒有需要注意的地方。如有特殊情況的人，像是有妊娠高血壓、妊娠糖尿病，建議安排輕鬆的國內旅遊行程就好。

旅行時請妳要有親友同行，如果身體不適就調整行程，同時要避免太開心買太多東西提過重的物品。如果是搭機行程，請妳避免長時間維持同一姿勢，中途可以起來活動一下，以防血液循環不良。

懷孕期間的旅遊地點，要選擇衛生環境比較好、醫療照護品質比較好的國家。如非必要請勿去茲卡病毒流行地區以及德國麻疹疫區，或其他影響母胎安全疾病流行地區。

來源：懷孕第16週 孕育不留痕！妊娠紋不要來

懷孕第十六週孕育不留痕妊娠紋不要來

媽咪身體變化

懷孕第十六週，因為子宮增大壓迫到靜脈。加上如果缺鈣，媽咪可能會出現腿抽筋的現象。建議妳有時間可以按摩雙腿或抬腿，預防腿抽筋。或是呼叫先生來服務一下囉。平時也能多補充高鈣食物，如乳品、深綠色蔬菜、乾豆類、小魚乾。

本週最特殊的一件事，就是有些媽咪可以感覺到胎動了！有人覺得像是氣泡在肚子裡往上冒的滑動感或是蝴蝶在肚子裡頭飛舞，不知道妳的感覺是什麼啊？如果還沒有胎動感覺的媽咪也別急，再過幾週就會明顯感受到胎動了。

另外，有些媽咪會發現自己越來越健忘。有人說，一「孕」傻三年。畢竟媽咪要適應及處理的事情太多了，偶爾健忘也是正常的啦。

胎兒發育狀況

本週寶寶的身長約十三公分，重量是一百四十公克，又長大了不少，媽咪很有成就感對吧！由於背部肌肉更有力，妳的寶寶可以略微挺直身體。另外，他也會感覺到光。對

光線會有動作反應，雖然此時他的眼睛仍是閉著的。

到了十六週，寶寶會在肚子裡打嗝囉。打嗝是因為在媽咪的子宮裡不斷的吞咽羊水，幫助肺泡長大。透過「打嗝」可以發展寶寶的肺部呼吸功能。

生活小叮嚀

本週來聊聊很多人在意的「妊娠紋」，有人說，妊娠紋是懷孕獨特的印記。不過，所有的媽咪都不希望在肚子上留下一道道像西瓜般的紋路吧！妊娠紋主要會出現在下腹部、臀部、胸部、背部，呈紫色或是紫紅色的條紋。

有些人會長妊娠紋，有些人不會。誰是幸運兒還真說不準，而通常有幾個方式可以預防或是不讓妊娠紋加深。那就是要做好體重控制，每個月不宜胖超過二公斤。另外，可多增加攝取優質蛋白質食物。增加皮膚彈性；最後，保養也有一定的幫助。細心保養可以增加肌膚的保濕及彈力，妊娠紋保養品請妳選擇成份單純、不含香料、酒精的成份。

產前檢查

本週又到了媽咪期待的公費產檢週，一樣會進行問診、身體檢查、實驗室檢查。如果媽咪有任何疑問，也可以把握產檢時請教醫師。

此次產檢也會進行早產防治衛教指導。早產是指懷孕二十至未滿三十七週的生產，發生率約佔所有懷孕的五到十%，但卻佔所有新生兒死亡的八十%。

媽咪如在懷孕過程中，如有出現以下早產徵兆，要儘快就醫。

一 一小時內有六次以上或十到十五分鐘有一次的子宮收縮，休息三十分鐘仍無改善。這些收縮不一定有疼痛感，但肚子會變硬或有下墜感。

二 類似月經來時的悶痛感或來之前的脹痛感。

三 子宮與陰道的壓力，有下墜感或陰道有壓迫感。

四 其他方法無法改善的下背痛。

五 持續不斷的腹瀉或腹部絞痛。

六 陰道水樣、黏液和血液樣分泌物增加。

七 感覺胎動較平常減少一半以上。

第二孕期唐氏症篩檢

自費費用：約二千二百到二千五百元

如果年齡在三十四歲以下，而且之前沒有做第一孕期唐氏症篩檢的媽咪，可以考慮懷孕十五到二十週時，自費做第二孕期四指標母血唐氏症篩檢。以抽血方式來評估懷到唐氏症胎兒的風險值，準確率約為八十三。若篩檢結果為高風險者，建議進一步於十六到二十週接受羊膜穿刺檢查。

來源：懷孕第17週 羊膜穿刺檢查時機

懷孕第十七週羊膜穿刺檢查時機

媽咪身體變化

進入懷孕中期，因為媽咪要從心臟流出更多血液通過胎盤輸送給胎兒，因此妳可能會有頭暈、頭疼等狀況出現。媽咪全身的骨骼、肌肉和關節也要適應孕育寶寶生長的過程，會產生腰痛、抽筋、水腫以及靜脈曲張的反應。

本週媽咪的小腹突出更為明顯了，請妳改穿比較有彈性、不緊繃的衣服會比較舒服喔。從懷孕到現在體重建議可增加二到四公斤上下，如果已經增加太快的媽咪要稍微留意一下。

胎兒發育狀況

本週寶寶身長有十三公分，重量約一百四十公克。寶寶的肺部即將開始運作，氣管完成了分支，準備吸入氧氣。如果妳懷的是女孩，十七週左右會開始發育子宮和陰道；如果妳懷的是男孩，陰莖與陰囊會逐漸變大。

有趣的是寶寶偶爾會把臍帶當做玩具，抓一抓、拉一拉。不過，媽咪不用擔心他會傷害到自己。胎兒本身有自我保護的本能，如果有不舒服寶寶自然會放開。

飲食營養

懷孕時鐵質的需要量增加，孕期第一期及第二期都建議媽咪每日要攝取量十五毫克的鐵。孕期缺鐵可能對胎兒的腦部造成不良影響。建議妳多攝取富含鐵質食物，例如：海藻類（文蛤、章魚、蚵仔等）、肝臟、紅色肉類，及深色蔬菜（萵菜、甜豌豆、紅鳳菜等）。

生活小叮嚀

一媽咪如果起身太快容易頭暈、低血糖也會引發頭暈，所以，早上起床時動作要放慢、平時也不要突然從椅子上站起來、避免長時間維持同一個姿勢、睡覺可以嘗試側臥。

二腰酸背痛是很常發生的狀況，媽咪可改穿比較有彈性、舒適的鞋子。站姿及坐姿盡量正確，不要太過後仰。坐著時可以使用靠枕，避免長時間站立。如果腰酸也可以局部熱敷或輕柔按摩。

三請準爸爸陪妳去買一些合適內衣褲、托腹帶、孕婦裝，還有好穿的鞋子以及孕婦枕。請準爸爸平時也要多多幫太太按摩腰、腿。

產前檢查

媽咪妳幾歲呢？三十四歲以上的高齡產婦，或是其他經醫師診斷認為是染色體異常的高危險孕婦，就要進行羊膜穿刺的檢查。羊膜穿刺可及早診斷出胎兒是否有遺傳性疾病，尤其是最常見的是唐氏症。

懷孕十六週至十八週是抽取羊水最好的時間，建議安排在第十七週進行。只要在專業醫師操作下，羊膜穿刺是很安全的，請媽咪不用擔心。

完成羊膜穿刺術後，約有一到三萬一千的早產或自發性流產機率。術後如有陰道出血、腹部悶痛或劇痛、陰道有羊水滲出或不明原因發燒現象，請媽咪要盡快回醫院檢查。一週內勿有性生活，不要提重物，多休息即可。

來源：懷孕第18週 孕期性生活行不行

懷孕第十八週 孕期性生活行不行

來源：懷孕第19週 孕期便秘大作戰！

懷孕第十九週 孕期便秘大作戰

媽咪身體變化

進入懷孕中期，媽咪的體重可能會快速增加。不過，最好還是每週只增加五公斤左右為宜。整個月的總增重以二公斤最為理想如您的介於適中一百八十五到二百四十九。

如果媽咪有背部疼痛的困擾，主要是身體重心的改變。加上體重增加，讓妳沒辦法保持良好的姿勢及充分伸展。所以，媽咪要時時提醒自己維持正確的站姿及坐姿。

另外，因為血流增加，妳也可能會有鼻塞、流鼻血和頭痛的症狀，可找婦產科醫師討論。此時還可能出現牙齦痛的情況，必要時請找牙醫師檢查。

胎兒發育狀況

這週寶寶的腦部會以驚人的速度發展，觸覺、味覺、嗅覺、視覺和聽覺等神經細胞正在分化。本週頭臀身長約一百五十三公分，重量約二百四十克，接下來幾週寶寶的體重會迅速增加。

因為目前肚子裡的空間夠大，妳的寶寶會頻繁地變換姿勢、做各種動作，所以，媽咪時不時會感受到寶寶的胎動

。寶寶的聽覺也發育得更好了，不久後就能聽到外面的聲音了，有空就來嘗試一下胎教吧！

飲食營養

嗯嗯不順真讓人痛苦啊～尤其到了懷孕中後期，便秘的問題會更明顯，建議媽咪可以嘗試以下方法。

一水份要充足，一天要攝取二千的水份。

二適度的運動，早晚做散步運動。

三多吃高纖維的蔬菜、水果、全穀類及未精製雜糧。

四少吃辛辣、刺激的食物。

五養成每天定時排便的習慣。

六如果便秘一直無法改善，請找醫師協助，醫師會提供媽咪安全的處方軟便劑。

生活小叮嚀

一從懷孕中期開始，媽咪可以嘗試進行胎教，以下介紹幾種胎教法給媽咪參考：

音樂胎教：輕柔、歡樂、古典音樂、或是爸爸媽咪自己唱歌給胎兒聽也可以，主要是媽咪聽了會心情好的音樂。

情緒胎教：媽咪如果長期有負面思想，胎兒心跳會變快、情緒緊繃。所以，媽咪一定讓自己情緒穩定。做一些會讓自己快樂的事，例如看書、按摩、看好笑的電影。

撫摸胎教：可以輕撫肚子和寶寶說話，也可以利用每天塗按摩油保養肚皮時和寶寶對話聊天。準爸爸當然也可以輕柔按摩媽咪肚子，這樣不只寶寶開心，連媽咪也會有被呵護的感覺。

藝術胎教：媽咪可以欣賞藝術展覽等活動，看花展、服裝展，看美麗的事物，自然會有好心情。

二頭痛發生時可以睡覺休息，或是喝杯溫開水。輕揉捏按摩太陽穴，平時最好也能有運動的習慣。可舒緩頭痛的困擾。

來源：懷孕第1週 備孕準備!! 關鍵營養素吃了嗎

懷孕第一週備孕準備關鍵營養素吃了嗎

健康的媽咪才能孕育健康的寶寶，當妳準備懷孕的前三個月。就要開始補充葉酸囉另外，也請避免進行節食減重。並應均衡攝取六大類的營養、培養運動習慣與愉悅的心情～

飲食營養

健康的媽咪才能孕育健康的健康寶寶，當妳準備懷孕時。請避免進行節食減重，應均衡攝取六大類的營養。可選擇天然的食品，減少高油脂、高熱量的飲食、避免煙燻加工的食物等。這些技巧有助妳調整出健康好體質，來迎接寶寶的降臨喔。

建議媽咪三餐要定時，多攝取蔬菜、水果以及含有蛋白質的食物，例如魚肉蛋豆。另外，葉酸是很重要的營養素，從備孕前三個月到懷孕早期都需要多補充含有葉酸的食物，可以預防胎兒神經管缺陷。妳可以從肝臟、深綠色蔬菜、豆類獲得，或直接補充含有葉酸的營養品。

生活小叮嚀

一 媽咪你知道嗎？懷孕二百八十天是以最後一次月經的第一天開始算起，孕期第一週是卵子即將受精的準備期，目前卵子及精子尚未相遇喔！提醒媽咪可固定記錄月經來的時間，這樣才能準確計算出預產期。

二 當妳進入備孕狀態時，就要調整生活作息，檢視是否有不利於受孕的因子，例如：改掉熬夜的習慣、多攝取均衡營養、戒除菸酒等。

三 在日常生活中，請妳不要接觸危險物質，如藥物、光等放射性物質。如因疾病需接受治療，也記得告知醫師妳正在備孕中。

四 如果媽咪習慣喝咖啡，會建議妳控制攝取量，一天不超過一杯喔~咖啡因一天最多攝取量不超過三百毫克。

五 一開始媽咪就可以留意及規劃，將來準備進行產檢的婦產科院所及醫師人選。

休閒運動

此時是準備受孕的前期，很多人都說。越在意反而難受孕，若能放鬆心情好孕更快來報到。所以，備孕的爸爸媽咪們。請放鬆心情，可以計算一下排卵期。然後安排來個休閒運動計劃，讓夫妻都能用愉悅的心情。迎接美好的受孕時機。

計算排卵期：

若月經週期規律，從下次月經來潮的第一天往前推十四天。就是排卵日，而排卵日的前五天及後四天。加起來共十天的時間，稱為排卵期。也就是有機會受孕的時間。

請媽咪也盡早培養運動的習慣，不管是瑜伽、健走、游泳、肌肉耐力訓練等都很好。如果原來就有運動的習慣，當然可以繼續維持下去。因為運動會提升妳的心肺功能、可鍛鍊肌肉張力及身體的協調性，對於將來孕育寶寶幫助

很大。

來源：懷孕第20週 進行一次免費超音波檢查

懷孕第二十週進行一次免費超音波檢查

媽咪身體變化

恭喜媽咪來到懷孕一半的旅程了！因為動情素與黃體激素上升，妳的便秘、痔瘡情況會更加劇。另外，隨著子宮變大。有些人會覺得腹部下側、鼠蹊部有刺痛感，如果多休息能改善。通常就無須特別處理。

因為子宮隨孕期的增加而變大，會壓迫到骨盆腔靜脈和下腔靜脈，除了雙腿水腫，靜脈曲張也會越來越明顯。

如果媽咪乳腺比較發達，會發現胸部分泌少量像乳汁的白色分泌物，只要保持清潔即可，不要過度擠壓喔！另外，此時胸部又會增大一個罩杯左右，媽咪可考慮更換內衣尺寸；但到了後期通常還會再增大一個尺寸。

胎兒發育狀況

可愛的寶寶不停的成長發育中，外觀特徵已經很完整，包括耳、鼻、口、眼皮、眉毛、睫毛、頭髮等。目前頭臀身長約一百六十四公分，重量約三百公克。而寶寶的聽力也越來越好了，如果突然出現太大聲音，他可能會嚇一跳！除此之外，嗅覺及味覺也開始發展了。同時全身長滿了胎毛，皮膚也出現白色厚厚的胎脂。保護著寶寶的肌膚。

此刻寶寶會喝羊水的頻率越來越高，並會在羊水中尿尿！別擔心這是正常的現象，喝羊水可以訓練寶寶的吞嚥力。

產前檢查

孕期二十週又到了定期產檢的時刻。除了之前固定的例行檢查，本週媽咪可進行一次免費的產前超音波檢查。

目的是利用超音波儀器來監測胎兒心跳，測量胎兒的頭雙頂骨徑、腹圍與股骨長度等。以了解胎兒週數，及進行生長評估、多胞胎的確認。並偵測胎盤位置和羊水量多寡，如果記不清最後一次月經時間的人。超音波也可以幫助推估預產期。

迎接寶寶的計劃

進入懷孕中期時，媽咪可以多去參加媽媽教室。除了可以學習各種孕產知識外，妳和老公也可以培養共同育兒革命情感。很多媽媽教室也會贈送實用的小禮物，或是試吃彌月禮、月子餐。可學習又可拿小禮物挺不錯的。只要在網路輸入媽媽教室，很容易就能找到相關訊息，很多前輩媽咪也會分享她們推薦參加的場次。

來源：懷孕第21週 懷孕21週的飲食重點

懷孕第二十一週 懷孕二十一週的飲食重點

媽咪身體變化

恭喜媽咪，這個階段的妳揮別了初期的不舒服感，胃口變得更好，心情與體力也會有顯著的轉變。進入懷孕中期後，妳的體重平均每週會增加四百到五百克，因此營養需求會變高。而隨著子宮逐漸變大，媽咪的肚子將更有「孕味」囉！不過也因為支撐子宮的韌帶被拉長，讓妳的下腹部偶爾會有抽痛感，甚至因為壓迫到直腸，而出現輕微的脹氣及便秘。

胎兒發育狀況

妳那懷孕二十一週的胎兒，現在已經有二百六十七公分高。體重約三百六十克囉～肚子裡的他，皮膚紅紅、皺皺的。嘴唇、眉毛及眼睫毛也更清楚，模樣就像個小老頭。而且他還會吸吮手指、打嗝了呢！不僅如此，寶寶的聽力也慢慢發展出來，能聽到媽咪模糊的聲音了，建議邀請爸爸一起來多跟他多說說話吧～

還有還有，寶寶的味蕾及消化系統也同步發育中。開始會吞嚥羊水，甚至已經是個小小美食家。懂得品嚐媽咪吃的食物的味道了！

飲食營養

這階段媽咪每天攝取的熱量要增加三百大卡，可以多補充維生素群幫助轉換能量。但最好少油少鹽並少吃點含糖或澱粉類的食物，免得體重增加太快。還可能有妊娠糖尿病的風險喔！

增加維生素B群

媽咪一定要記得多吃含維生素群的食物，尤其是下列這三種營養成分，讓妳每天能量滿滿！

一 維生素一：小麥胚芽、葵瓜子、黑芝麻、黃豆粉、燕麥、蕎麥、乾香菇、絲瓜花、豬里肌等。

二 維生素二：酵母粉、豬肝、麥片、乾竹筴、乾香菇、羊奶粉、紫菜、西洋芹菜、鴨鹹蛋黃等。

三 菸鹼酸：乾香菇、柴魚片、花生、酵母粉、豬肝、豬肉、葵瓜子、竹筴魚、小魚乾帶皮雞胸肉、米胚芽、金喜菇、乾木耳等。

少吃含糖或澱粉類食物

媽咪知道嗎？妳的血糖升太快會讓寶寶長得太胖，也會影響之後的妊娠糖尿病篩檢喔～應盡量忍住巧克力、蛋糕、餅乾等零食的誘惑，如果真的嘴饞，可以吃少量豆花、愛玉凍、水果、燕麥粥、涼拌毛豆等來取代唷～

生活小叮嚀

一 平常喜歡穿合身衣褲的你，現在已經不太適合了，建議穿著較寬鬆的衣服，對自己與寶寶都會比較舒服喔～

二 如果這時媽咪有輕微的脹氣或便秘，建議可以少量多餐，還要記得多喝水、多吃蔬菜水果，進行適當的運動。

三 這時媽咪可以有性生活囉～只要沒有出血、子宮收縮、前置胎盤或有早產風險等須安胎的狀況，就與先生好好享受一下吧～

四 我知道這時候媽咪的食慾特別好，但仍要注意熱量，以免體重增加太快。

五 提醒媽咪，這階段容易有牙齦出血問題，記得要把牙齒刷乾淨，定期檢查及洗牙喔～

休閒運動

這時候媽咪的精神跟體力應該比較好了吧？有空時可以讓老公陪你去運動，或許可以找找夫妻一起上的孕婦瑜珈。多多出門約會，有助放鬆心情、夫妻感情更好。還能預防產前憂鬱找上門喔！

來源：懷孕第22週 安心出遊去

懷孕第二十二週 安心出遊去

媽咪身體變化

媽咪有記得量體重嗎？這週體重將會比上週增加四百到五百克，而且懷孕中期腹圍也會每週增加十五到十六公分～妳會發現肚臍已經突出來，子宮高度也大概跟肚臍一樣高了！因為小腹越來越大，媽咪可能會有一點點的背部僵直、腰痠背痛等不舒服。而且還會覺得皮膚有點癢，尤其是肚子。但這是因為肌膚快速膨脹造成的，產後就會好很多。請稍微忍耐一下下囉～

胎兒發育狀況

嘿！寶寶又長大了一些囉！身高已有約二百七十八公分，體重約四百三十克了。他皮膚上的血管也變得清晰，且手脚指甲還會長長喔～不僅如此。他的大腦發展也會越來越成熟，妳會發現。他原本平滑的腦組織，開始出現皺褶。

再加上，寶寶的末梢神經日漸成熟。所以他會不時觸摸自己的臍帶、媽咪的肚子喔～此外，他的聽力越來越好了。會漸漸對外界的聲音有反應，爸比媽咪有空時就跟他聊聊天。讓他盡快熟悉你們的聲音吧！

飲食營養

因為這時候寶寶的大腦開始快速發育，媽咪記得多補充健全腦功能的營養喔～

葉酸

媽咪熟悉的葉酸，並不是只有懷孕初期才要補充喔！葉酸在中期時可以幫助寶寶腦中樞功能發育、造血及細胞複製，真的非常重要呢！可從牛肉、黑芝麻、葵瓜子、薏仁、黑麥片、深色蔬菜、黑豆、榴槤、龍眼乾…當中攝取。

-三不飽和脂肪酸

另一項常見的-三不飽和脂肪酸，相信媽咪也常耳聞吧！-三有助於寶寶腦神經、視網膜細胞發育，食物當中魚類的含量最豐富。但旗魚、鯊魚、鮪魚等深海大型魚類等含汞量皆偏高，對媽咪不一定安全。因此建議可以選擇小型且新鮮的鯖魚、沙丁魚、鮭魚、秋刀魚、鱈魚等。

生活小叮嚀

一提醒媽咪，腹圍會反映羊水量及胎兒體重的變化，建議懷孕期間最好每週量一次喔～

二媽咪如果有皮膚搔癢的困擾，可以擦點有助保濕的乳液或護膚油；衣物材質最好以寬鬆、透氣為主；洗澡時注意水溫勿過熱等，這些方法都能降低皮膚的刺激性。

三這時候媽咪有體力就盡情的玩吧！只要不是太偏遠的郊區、山區，且交通方便、離醫療院所較近的旅行地都可以去～因為媽咪真的很需要放鬆，犒賞一下自己辛苦的懷孕旅程，對吧？不過，要記得隨身攜帶孕婦手冊、健保卡、身分證，以備不時之需。

產前檢查

如果媽咪的子宮頸曾開過刀、孕期下腹反覆悶痛、有出血症狀，可以在二十二週以後，利用超音波檢查子宮頸長度來判斷早產風險，可以請醫師判斷是否要進行早產風險的評估喔～

來源：懷孕第23週 多與寶寶互動吧~

懷孕第二十三週多與寶寶互動吧~

媽咪身體變化

媽咪這週感覺如何呢？妳的體重將再增加四百到五百克，肚子持續變大中，腰痠背痛的情形可能還是沒改善，而且還會不自覺得挺出肚子、往後仰著走路吧？別擔心，這是在支撐寶寶重量的現象。此外，這時子宮大得壓迫到腸胃道，妳可能會出現便秘、脹氣、胃食道逆流等症狀，所

以飲食習慣要稍微注意一下喔～

胎兒發育狀況

妳的寶貝這時候已經有約二百八十九公分高，體重約五百零一公克囉～他的皮膚看起來又薄又皺。整個五官看起來更清楚，不僅如此。還能看到寶寶更多動作，例如：揮手、打哈欠、動嘴巴等。十分有趣！二十三週後，寶寶除了大腦發展以外。肺部也開始發育囉～可以看到寶寶呼吸時，將羊水吸入肺部撐大肺泡的樣子。這是他在為出生後作準備。

飲食營養

媽咪除了在意寶寶的發育，也要多多關心自己是不是有便秘情形喔～

膳食纖維

平時要多吃膳食纖維，包括一些高纖的蔬菜、水果、未精緻化的穀類，如：牛蒡、地瓜葉、黃豆芽、土芭樂、西洋梨、燕麥、栗子、酪梨、香蕉、黑豆等。此外，可以適量補充優格、優酪乳增加腸胃道的好菌，都是預防便秘的好方法！

常吃外食的媽咪比較容易有纖維量攝取不夠的問題，建議正餐時可以額外點一份燙青菜、海帶湯或菇類料理；自助餐則是除了魚或肉，能再多挑三到四樣以蔬菜為主的配菜；想吃點心則可以選擇綠豆湯、烤地瓜等。

維生素

妳知道維生素可以幫助寶寶的腦部發育嗎？但是維生素沒辦法靠身體自己生成，也不易儲存，所以每天都只能用「吃」來攝取。記住，越新鮮的蔬果，維生素含量越高，像是柑橘、檸檬、木瓜、草莓、奇異果、番茄、芭樂、柚子、綠花椰菜、芥藍菜、苦瓜、油菜等都是不錯的選擇唷～

生活小叮嚀

一媽咪記得要「少坐多動」，如果沒時間運動，那就從日常生活中增加一點活動機會，例如：通勤時以走樓梯取代手扶梯。

二忙碌的媽咪，記得要多喝水，最好能攝取二千的白開水，可以預防便秘。

三寶寶有了聽力後，除了讓他聽聽音樂、說說故事以外。準爸媽可以用自己的聲音多跟寶寶說說話，進行胎教。讓他熟悉你們的聲音喔～

來源：懷孕第24週 孕中的護膚之道

懷孕第二十四週孕中的護膚之道

媽媽身體變化

媽咪本週體重持續增加四百到五百克，妳可能開始感到腿麻、水腫，嚴重點還會出現靜脈曲張。而且，媽咪的皮膚在短時間內撐開。所以會發現肚皮出現了一些粉色條狀的妊娠紋，愛美的妳心情可能受到影響。不過別擔心，這種情況是可以改善的！

胎兒發育狀況

懷孕進入到二十四週，妳的小寶貝身高來到三十公分左右，體重約六百公克囉～此時除了大腦，寶寶的心臟、脾臟、腎臟、肺臟等內臟器官將持續發育中。還有他的骨頭與肌肉也開始生長，媽咪會感覺到寶寶的活動力越來越強。而且羊水量變多，讓他的活動空間變大了～經常會自己轉換方向。媽咪甚至可以感覺到寶寶上下顛倒。

飲食營養

媽咪記得要多補充蛋白質，來幫助寶寶長肉、變壯，更有利於未來親餵時有足夠的奶水喔～

【攝取優質蛋白質】

到了懷孕中期，媽咪每天應額外補充十公克的優質蛋白質，分量相當於一個掌心的大小，可以從雞胸肉、魚肉、牛腱、去皮鴨肉等補充；吃素的媽咪則能從杏仁片、豆腐皮、傳統豆腐、豆干等黃豆製品、小麥胚芽、牛羊奶、乳酪等攝取。

另外，常吃外食的媽咪要注意。像是香腸、臘肉、鹹蛋、肉鬆、熱狗等加工肉品，或是用高溫油炸、燒烤的雞排、烤肉等。都會破壞蛋白質成分，最好少吃喔～

生活小叮嚀

一媽咪會發現，妊娠紋幾乎都在乳房下方、肚子及大腿的位置。很介意的話，不妨可以在洗澡後塗抹一些妊娠紋乳液或油狀保養品。用輕推按摩的方式來增加肌膚彈性吧！

二懷孕的過程很辛苦，這時候妳可能會想用食物犒賞自己的辛勞，但要注意體重勿上升太快，嘴饞時還是要注意營養喔～

三外型上的改變，讓媽咪很低落吧？這種時候非常需要準爸爸的陪伴，多多給媽咪心靈上的支持、說些中聽的話，能有效降低媽咪憂鬱的機率唷！

產前檢查

懷孕後因為荷爾蒙的改變，讓媽咪的血糖不易控制，一百一十年七月一日起衛生福利部國民健康署提供一次免

費妊娠糖尿病篩檢及貧血檢驗給懷孕二十四到二十八週的孕婦。因為罹患妊娠糖尿病的媽咪，可能會有妊娠高血壓、寶寶體重過重或過輕等風險，小心增加胎死腹中的機率！

迎接寶寶計畫

一媽咪這時候可以開始與準爸爸討論陪產的問題，提前詢問丈夫的陪產意願，了解陪產時該做的事。

二媽咪不妨趁現在行動較方便，邀請丈夫一起上些新手爸媽的課程，提前練習照護寶寶喔～

三相信媽咪身邊一定有很多熱情的親友們爭相送你二手的嬰兒用品，像是手推車、汽座、衣服等。雖然能幫助省荷包，但還是要仔細檢查一下功能正不正常。使用前也要徹底清潔、消毒喔！

來源：懷孕第25週 孕期25週可以進行胎教囉！

懷孕第二十五週 孕期二十五週可以進行胎教囉！

媽咪身體變化

恭喜媽咪邁入懷孕七個月囉！這時候媽咪的乳暈會變得更暗沉，而且乳頭還會分泌一點乳汁。表示妳已經在為寶寶出生後哺乳做準備囉～此時子宮的位置已大到接近乳房下方的位置，使得妳仰睡時會感到有些痛苦。改側睡才比較不會壓迫到呼吸道。

不過這時妳可能會有個驚喜發現，就是頭髮居然變得更濃密、有光澤了！不過這是因為荷爾蒙改變，讓妳的頭髮維持在生長期不易脫落，所以平常有掉髮困擾的媽咪在孕期反而會減少掉髮情形。

胎兒發育狀況

妳的小寶貝此時身高已有三百四十六公分，體重六百六十公克囉～妳會發現，寶寶已經可以張開眼睛了！而且逐漸能看到微弱的光，且手腳變得更有力。可以握緊拳頭，胎動也會越來越厲害～不僅如此。他的聽覺越來越成熟，對外面的聲音也會出現反應囉！這階段很適合替寶寶留下三或四超音波作為成長紀錄呢～不過要提醒，此項服務為自費喔！

飲食營養

媽咪這時候要記得多吃一些可以幫助寶寶骨骼、牙齒生長的營養素喔～

增加維生素攝取

維生素對寶寶的皮膚及視覺發展也很重要，其中有個重要的成分是-胡蘿蔔素。可在體內轉化成維生素，每日建議

攝取六百微克。媽咪可以從動物內臟、魚油、深綠色蔬菜（如：菠菜、茼蒿、紅鳳菜、韭菜、油菜等）、豌豆莢、深橘黃蔬果（如：紅蘿蔔、木瓜、芒果、哈密瓜、地瓜、柑橘等）中攝取。

生活小叮嚀

一 越接近預產期，媽咪的乳房會越敏感，記得要好好呵護！若發現乳頭有像薄膜般的小白點，表示有分泌乳汁。此時可用對肌膚沒有傷害性的天然油品，如：橄欖油。將小白點擦拭乾淨，但千萬別用手擠。以免感染喔～

二 平常喜歡穿有跟、拖鞋的媽咪要注意囉～這時候妳的重心很容易不穩，最好改穿軟質、平底為主的鞋子，會讓妳整個人更舒服！

三 別懷疑，寶寶真的能聽到妳跟老公的聲音！尤其低頻的聲音會讓寶寶更有安全感，所以爸比的角色很重要呢～你們可以每天念故事給寶寶聽，也是在幫助他做語言訓練唷～但要記得保持好情緒，跟寶寶才能有更快樂的互動。

休閒運動

肚子越來越大，讓妳經常腰痠背痛吧？不妨透過游泳或水中有氧來舒緩，因為水流及浮力有按摩、放鬆肌肉的功用喔～但提醒媽咪，水中有氧會有一些熱身運動、躺姿、側姿等動作，建議要由專業人士指導後再進行比較好喔！

孕期游泳注意事項：

一 游泳前要先做五到十分鐘的暖身操，完畢後再慢慢下水；游十分鐘左右要稍微放緩動作，讓心跳速度降低。

二 注意水質是否乾淨。

三 盡量挑選人少的水道及時段，注意環境安全（如：泳池邊濕滑），才不會受傷喔！

來源：懷孕第26週 腳水腫讓妳很困擾嗎

懷孕第二十六週 腳水腫讓妳很困擾嗎

媽咪身體變化

媽咪這時的總體重正常應該增加約五到六公斤囉～不過也因為肚子變大後，壓迫到妳的血管。所以手、臉、腳可能有些微水腫的狀況，連平時的鞋子都覺得有點不合腳了。甚至小腿肌肉還容易感到疲勞，所以偶爾會有抽筋的情況發生。

胎兒發育狀況

懷孕來到二十六週，妳的寶寶身高已達三百五十六公分

，體重則是七百六十公克左右～妳可以看到他長齊的眉毛與眼睫毛，還有少量的頭髮了呢！此時寶寶不僅可以快速眨眼，聽力也變得更敏銳，對於觸摸也會有反應～寶寶的心跳變得更強，靠近媽咪的肚子還能聽到寶寶的心跳聲喔！

飲食營養

媽咪應該少吃重口味、太鹹的食物，才不會讓水腫的狀況更嚴重喔！

避免重口味、過鹹的食物

媽咪如果吃太多鹽分過高的食物，像是醬瓜、醃蘿蔔、培根、香腸、披薩、麵線、小魚乾、鹽味海苔、泡麵、罐頭等加工食物或醃漬品。可能會因為體內鹽分太高，加上水喝太少。就會讓水腫的情形更加嚴重。建議採用少鹽的烹調法，多吃一些利水的蔬菜（如：冬瓜、芹菜、海帶、菠菜、大黃瓜等）、水果（西瓜、哈密瓜、香瓜、水梨、奇異果、蓮霧），還可多補充好吸收的蛋白質食物（如：牛肉、豬肉、魚肉、黃豆、黑豆等），都能幫助消水腫喔～

生活小叮嚀

一 媽咪可以趁這個時間去修剪頭髮。

二 盡量不要長時間坐或站，多找些時間休息或散步；爸比可以幫媽咪按摩腿部。舒緩水腫不適；睡前媽咪可以利用二個枕頭將腿墊高，每次約十五分鐘。讓血液回流。

三 大腹便便的妳，建議外出時不要再以機車或腳踏車代步，以免跌倒喔！

四 懷孕中期時，有個很討厭又棘手的狀況，就是「子宮頸閉鎖不全」！因為沒什麼症狀，常常事發突然。幸運的話能在例行產檢中發現，即時進行子宮頸環紮手術。成功的話可以增加寶寶存活機會；但有時太晚發現可能會流產或早產。所以提醒媽咪一定要定期產檢，尤其是懷多胞胎的媽咪更要追蹤子宮頸長度。

休閒運動

腹部、跨腿運動要避免

媽咪平時喜歡做仰臥起坐、捲腹等腹部運動，以及跨大步及分腿蹲等劇烈拉扯腿部的運動，這時候要避免囉！因為這可能會引發恥骨疼痛。

練習凱格爾運動

媽咪可以開始練習凱格爾運動，是個可以強化肌肉的提肛運動，能幫助之後生產時較順利。建議每天早、中、晚各做一次，一次三個循環，一個循環收縮十次。但記住，不要給自己太多壓力，適量就好～

凱格爾運動教學

不管是坐、站、躺或走路，媽咪只要想到就可以做凱格爾運動，但最好不要用憋尿的方式訓練，因為長期下來可能會讓排尿變得不順喔～試試看以下二種方法。

數秒：先將骨盆底肌肉放鬆後，再讓肛門用力收縮「數五秒」後再放鬆。

不數秒：肛門用力夾緊後直接放鬆，休息一下後再重複做一次。但如果媽咪在做運動的過程中，感覺肚子不舒服或累累的。表示施力點不太正確，記住。出力的只有骨盆底，其他部位別跟著用力喔～

來源：懷孕第27週 抽筋擾人清夢！

懷孕第二十七週抽筋擾人清夢

媽咪身體變化

本週媽咪體重會再比上週多五公斤喔～胎動會越來越厲害，有時媽咪可以感覺到肚子輕微震動，妳知道嗎？那其實是寶寶在打嗝呢！偶爾還會感覺到寶寶拳打腳踢，讓妳很不舒服吧～

不僅如此，媽咪大小腿抽筋的狀況會越來越頻繁。而且常常發生在晚上，大大影響媽咪的睡眠。建議媽咪可以請爸比幫妳熱敷或按摩來緩解唷～

胎兒發育狀況

妳的小寶貝已經長到三百六十六公分高，體重八百七十五公克囉～他的皮膚呈現紅色皺褶，皮下脂肪也開始沉積，所以看起來有點肉肉的。寶寶二十七週後，視覺發育讓他可以感覺光線明暗，甚至會對光線有自主反應了！是不是很神奇呢？此外，寶寶會經常吸吮手指，清醒與活動的時間也變多了呢～

飲食營養

媽咪抽筋的情況越來越嚴重，讓妳很不舒服嗎？不妨從飲食方面來改善吧！

改善抽筋這樣吃

抽筋嚴重的媽咪要少吃冰冷食物，才不會讓血液循環變得更差喔～建議可以補充鉀離子含量高的食物，如：香蕉、釋迦、芹菜、金針菇、地瓜、綠豆等。還有補充鐵、鎂的攝取，像是深綠色蔬菜、堅果類、紅色的瘦肉（牛肉、羊肉）等。多多攝取牛奶、黑芝麻、小魚乾、豆製品等高鈣食物唷！

生活小叮嚀

一媽咪抽筋時，趕快把腿伸直，讓腳趾往身體的方向壓；最好在越來越痛之前，趕緊起身讓腳板踩在地上。此外準爸比也可以協助熱敷媽咪的抽筋處，若抽筋部位在小腿肚，也可以用畫圓的方式按摩來舒緩。

二媽咪懷孕後，一定要多多注重私密處保養，可以觀察自己的分泌物，正常是無味、透明或白色、量較多。但如果出現血的顏色，就要小心可能是低位胎盤或早產的警訊；分泌物變黃或綠、濃稠、氣味重則可能是細菌感染，若有搔癢、灼熱感等情形都要盡快就醫唷～

三預計產後要回職場的媽咪，可以開始思考托育方式及尋求托育機構。

迎接寶寶計畫

預計要餵母乳的媽咪，可開始準備寶寶哺育用品囉！像是吸乳器、奶瓶、母乳儲存袋、溫奶器等。

一 奶瓶：

全親餵的媽咪會用到的奶瓶次數較少，只要準備一到二個一百五十以下奶瓶作為寶寶喝水用即可；若是配方親餵混合的媽咪，至少要準備二到三個二百五十左右的大奶瓶及一到二個一百五十的小奶瓶。

二 吸乳器：

放完產假準備要回職場的媽咪，還是可以餵母乳喔～有空時事先用吸乳器擠奶冰著，媽咪再看個人需求選擇手動電動、雙邊單邊的款式。

三 母乳儲存袋：

乳汁太多或職場媽咪可能就需要母乳儲存袋來幫忙保存珍貴的母乳，最好放在冷凍庫保存，寶寶要喝時再解凍就可以囉～

四 溫奶器：

方便媽媽解凍母乳時可以使用，好處在於可調控溫度。

來源：懷孕第28週 孕期28週的飲食重點

懷孕第二十八週 孕期二十八週的飲食重點

媽咪身體變化

媽咪到了二十八週後，總體重大約會增加七到八公斤。此時子宮底的位置已在肚臍上約八公分左右囉～所以走路、爬樓梯時會壓迫到骨盆，使得媽咪的身體面臨一些新

症狀，像是背痛、恥骨疼痛等，行動也越來越吃力了。不僅如此，可能還會出現假性陣痛（宮縮）的狀況。提醒媽咪，如果有不規則宮縮時。一定要馬上停下來休息喔！

胎兒發育狀況

寶寶的身高已經有三百七十六公分，體重突破一公斤（約一千零五克）了呢！從這時候開始，寶寶的營養需求會進入巔峰。因為他的小腦袋瓜準備開始活躍發展，所以腦容量越來越大。皮下脂肪持續增長～此外，寶寶也會出現睡眠與清醒的交替現象。每隔一段時間就會睡個二十到三十分鐘。

飲食營養

鈣攝取量要再增加

二十八週後，寶寶對鈣的需求會倍增。所以媽咪需要每天再多攝取二百毫克的鈣，寶寶的骨骼及牙齒發育才會茁壯喔～對媽咪來說。孕期補充足夠的鈣質，還能降低併發症的風險。媽咪也能預先存存骨本，預防中年後的骨質疏鬆症呢！

建議媽咪可以從牛奶、乳製品（如：乳酪）、紫菜、海帶、豆干、凍豆腐、黃豆、黑芝麻、山粉圓、紅莧菜、地瓜葉、小魚乾、淡菜、白蝦等食物獲取。但要注意，鈣要吸收得好。需要靠維生素及蛋白質喔～相反地，咖啡、高脂肪食物等含有草酸。會抑制鈣吸收，所以不能同時吃。

生活小叮嚀

一妳家小寶貝很喜歡聽妳跟準爸爸的聲音，也會有所回應，建議這時候可以多多跟他對話、說故事給他聽。

二現在寶寶對光線比較敏感，可以進行光照胎教。但並不是要爸比媽咪直接拿手電筒照射，而是媽咪多多到戶外走走。提前讓寶寶感受白天與晚上的差別，或許對日後訓練睡眠有幫助喔～

三媽咪的穿著方面，盡量要穿有支撐力的鞋子及內衣，能有效幫助減壓及減輕重量。

四懷雙胞胎或多胞胎的媽咪要注意有早產風險，因為當雙胞胎二十八週時，子宮容量就等同單胎足月的大小，所以很難超過三十七週生產。所以要提醒媽咪，如果出現規律宮縮、輕微破水（一次量約三十）、陰道出血並帶一點黏液、胎動比平常少一半以上、腹部有下墜感等狀況，都要趕快就醫，進行安胎。

五新生兒很容易感染百日咳，非常建議媽咪每次懷孕時，在二十八到三十六週施打自費百日咳疫苗，如此才可以透過胎盤給寶寶抗體喔～

產前檢查

第

六

次公費產檢

到了二十八週後，媽咪會需要密集產檢，變成兩週一次。這週會進行例行性檢查，包括一般問診、身體檢查及實驗室項目檢查。

胎兒生理監測

這項為自費產檢，會在媽咪的肚子上綁兩個監測器，主要觀察宮縮狀況、寶寶心跳是否穩定、宮縮時寶寶心跳是否穩定等。一般在三十六週以後醫師才會做胎兒生理監測評估，但如果媽咪出現急性宮縮、出血或腹痛等症狀，就必須在二十八週以後做胎兒生理監測，有健保給付。

來源：懷孕第29週 孕期29週的生活小叮嚀

懷孕第二十九週 孕期二十九週的生活小叮嚀

媽咪身體變化

恭喜媽咪懷孕已經進入第八個月囉～大多數媽咪每月約會增加一到十五公斤。此時子宮底的位置已經到達橫膈膜的位置，媽咪會感到呼吸有點困難，稍微走一小段路就會喘。妳還會發現自己的腿、腳踝與陰部有條狀、彎曲的藍色紋路，那就是靜脈曲張的表現。這也是因為寶寶的供血量增加，還有受到重量壓迫導致的。媽咪真的辛苦了！

胎兒發育狀況

寶寶身高已有三百八十六公分，體重一千一百五十三公克了，未來他的體重還會迅速增加喔～此時寶寶的視覺已經發育完成，但出生時最剛開始只能看到黑白兩色。此外，媽咪也會感覺到寶寶的活動越來越頻繁、強烈，這都顯示他的骨骼及肌肉發展得很好喔～

飲食營養

補充含鐵食物

由於懷孕到了後期，為了提供更多的營養給寶寶。媽咪的血流量會增加，再加上寶寶也需要造血功能。因此媽咪要補充大量鐵質，尤其是懷孕前就會貧血的媽咪更要注意！嚴重缺鐵，小心可能會造成流產、早產及寶寶出生體重過低的情形喔～

一般媽咪懷孕二十九週後每天需要攝取四十五毫克的鐵，而且來自動物性食物的鐵質，比起植物性食物的鐵質

吸收較好。像是鴨血、牡蠣、文蛤、黑豆、紅莧菜、紅鳳菜等都有豐富的含鐵量；亦建議媽咪在吃的時候，可以搭配現榨果汁或橘子、芭樂等富含維生素的水果來幫助鐵質吸收，特別是吃素的媽咪。

此外，穀類雜糧、咖啡、茶、乳製品等，會抑制鐵質的吸收，因此要避免同時食用喔！

生活小叮嚀

一媽咪記得要持續記錄胎動，每天可感覺到數十次的胎動，至於胎動的部位主要看胎位而定。若寶寶的頭朝下往上踢時，媽咪比較可以感覺到胎動；若臀部朝下，媽咪就比較難察覺。

二提醒媽咪不論是工作、休息時間，都不要長時間維持同一個姿勢，如：久站、久蹲，休息時也要把腳抬高或晃動腿部。

三有靜脈曲張困擾的媽咪，平時可以穿著透氣、排汗效果佳的彈性襪。透過外在加壓的方式促進血液回流，能有效減輕症狀。壓力單位為一百二十（丹尼數）以上，但不要太緊喔～

迎接寶寶計畫

媽咪可以開始準備寶寶「穿」的部分了！包含尿布、嬰兒內衣、外衣、包巾等。

一尿布：尿布有分新生兒、、、二、三等六種尺寸，新生兒用黏貼式尿布比較適合，除了要有防漏側邊和尿濕顯示的基本功能，更要選擇吸收力好、透氣佳的尿布。

二嬰兒內衣（紗布內衣）：新生兒出門機會不多，在家大多只會穿紗布內衣，而剛出生的寶寶容易溢奶、流汗，建議可以準備六到八套替換喔～

三外衣：寶寶外衣的選擇就更多了！有包屁衣、連身衣、蝴蝶衣等，除了外型可愛。媽咪一定要挑選有透氣排汗功能的材質，如：紗布、棉質。可準備四到五套替換。

四包巾：包巾通常分純棉、紗布、竹纖維等三種材質。包包巾可以讓新生兒有被「環抱」的感覺，此時他會很有安全感，可依需求準備二到三件替換。

來源：懷孕第2週 缺鐵也會影響受孕的機率

懷孕第二週缺鐵也會影響受孕的機率

媽咪身體變化

媽咪的生理期如果規律的話，一般在下次月經來前的十四天左右就是排卵日。而排卵日前後四到五天都有機會受孕，也就是說，孕期第二週後期及孕期第三週前期都是

妳的排卵期，妳和先生在排卵期內行房就有機會受孕。

孕期第二週，月經已經結束一段時間了，身體正在為排卵做準備，妳多半不會有什麼不適感。不過因為太胖或太瘦都會影響受孕，建議要留意自己的是否符合標準，利用飲食及運動來調整，幫自己打造好孕體質。

飲食營養

懷孕的媽咪比一般人更容易有貧血的問題，另外，如果缺鐵也會影響受孕的機率，缺鐵的人常有臉色蒼白、疲倦、缺乏體力、抵抗力減弱的情形。從備孕階段妳就可以開始補鐵了，建議每日攝取量十五毫克。鐵含量高的食物，例如牛肉、豬血、鴨血、豬肝、紫菜、髮菜、菠菜等。因為維生素可以促進鐵的吸收，所以，同時也可補充水果。

請媽咪也別忘多喝水，可促進身體的新陳代謝。並可以利用假日自己下廚，多吃蔬菜、水果。以攝取豐富的維生素、礦物質及膳食纖維，可以讓妳更健康、增加抵抗力。

生活小叮嚀

一請把握卵子和精子有機會相遇的排卵期，同時妳和先生都要維持健康的身體，讓卵子和精子更加有活力，有機會結合成受精卵。

二新生命加入後，將會帶來很大的改變，妳和先生不妨事先討論規劃，例如：產檢的醫療院所、孩子將來要給誰帶、坐月子的方式等等。

三媽咪要注意喔，懷孕前三個月是細胞分裂期。胎兒會發展出器官，因此。要特別留意藥物的使用，因為無法確定之後是否會懷孕。在服用任何藥物之前，都請諮詢醫師或藥劑師。另外，如果懷孕期想要自行補充維他命及營養補給品，也建議妳先諮詢醫師及藥師，以避免過量服用。

四除了準爸媽要戒菸酒外，如果有同住的其他家人也要戒菸，媽咪也要盡量避免接觸二手菸，甚至三手菸。三手菸指的是熄滅後在居家環境中，例如桌椅、地板、牆壁、衣櫥待。所殘留的有害污染物質，可說是一人吸菸。全家受害。

休閒運動

請放鬆心情，有機會就多多散步。和先生多聊天、安排小約會，期待在美好的氣氛下。讓卵子有機會遇上精子。

請媽咪一樣繼續維持運動的好習慣！如果妳對運動總是難以堅持，可以考慮利用每天上班或下班提前一、二站下車，小走二十分鐘來增加自己的體力。或是和先生一起去報名運動課程吧，兩個人一起變健康，迎接寶寶的加入。

來源：懷孕第30週 懷孕後期，不舒服的症狀變多了！

懷孕第三十週 懷孕後期，不舒服的症狀變多了

媽咪身體變化

本週媽咪體重會再比上週多出二到三公斤，肚子是不是感覺越來越緊繃了呢？懷孕後期媽咪出現更多不舒服的症狀，真的辛苦了！此時子宮已經頂到胸腔底部，讓你呼吸更加費力。此外，可能有些媽咪會有手腳痠麻的現象。那是因為子宮大得壓迫到你的神經導致，但別擔心。這種情況生產後會消失。

胎兒發育狀況

寶寶幾乎要塞滿媽咪的肚子了，此時身長已有三百九十四公分，體重約一千三百一十九克。妳會發現，寶寶的四肢變得更長了。而且皺紋也變少、脂肪增加，越來越接近出生後的模樣囉～不僅如此。媽咪有時隔著肚皮也會有感覺微微震動，那是因為寶寶正在用力呼吸。訓練自己的橫膈膜。

飲食營養

維生素要充足

維生素不僅能幫助鈣質吸收，還能預防寶寶太小的問題。一般最有效直接的方法就是在太陽底下曬十到二十分鐘，但如果手腳有塗防曬油就沒效了！至於怕曬黑的媽咪該怎麼補充呢？其實妳還是可以從高油脂含量的食物中獲得，如：魚類、魚肝油、蛋黃、強化乳製品等；吃素的媽咪則可以從蕈菇類食物（黑木耳、蘑菇、香菇等）中攝取。若仍然不足，可以在營養師、醫師的建議下補充營養品。

生活小叮嚀

一主動或被動吸菸、孕婦本身體重不足、酗酒、藥物濫用等因素，都可能讓寶寶生長遲滯或體重過輕，媽咪都要避免。

二媽咪最近一定感到很疲勞吧～要記得多多休息，不要勉強，當妳覺得很累的時候，務必要停下來調節一下節奏喔！

三最近是不是常常覺得呼吸不順、容易喘呢？不妨把身體坐直、睡覺時枕頭墊高一些，能幫助呼吸更順暢！

休閒運動

此時媽咪除了走路外，還能做「健身球運動」。這項運動可以幫助妳減輕大小腿的負重，還能鍛鍊骨盆底肌肉。未來生產時會更好生喔！不過要注意的是，健身球是圓形、有彈力的。做時最好要有人陪同，不要單獨一人使用。最好的方式就是帶老公去找教練學囉～

看更多：

懷孕後期持續運動三重點

淺談減痛分娩

順利度過「陣痛」這一關

來源：懷孕第31週 不憋尿、多吃舒壓食物、測胎動

懷孕第三十一週 不憋尿、多吃舒壓食物、測胎動

媽咪身體變化

媽咪這週除了體重持續上升以外，妳也會感覺到乳房又大又重，有些媽咪可能會流出初乳，妳可以墊溢乳墊防止漏出來。這時候寶寶的頭會逐漸往下，壓迫到膀胱。所以媽咪會越來越頻尿，甚至打個噴嚏都會害妳漏尿。但別擔心，這種狀況在產後會改善。

胎兒發育狀況

妳的小寶貝身高來到四百一十四公分，體重也有十五公斤囉～接下來他的體重會開始快速增加。使得子宮的空間變得更擠，寶寶難以伸展。所以媽咪會覺得胎動變少。寶寶這時候的生殖器官已經差不多成形了，可以看到睪丸（男寶）或大陰唇（女寶）囉！

飲食營養

越接近預產期，媽咪的壓力可能會越大，妳除了可以找一些幫助放鬆心情的事情做以外，還能多吃一些可以紓壓的食物喔～

多吃抗壓食物

孕婦真的很需要紓壓，不妨可以適量攝取含有維生素群（如：小麥、胚芽米、燕麥）、脂肪（如：牛奶）、色胺酸（如：香蕉、黑豆漿、豆腐）、（鮭魚、鯖魚）、礦物質（如：菠菜、木瓜）等營養素的食物。

生活小叮嚀

一從孕期二十八週以後，媽咪記得要持續記錄胎動喔～最好每天都要測量三回胎動。可以早上、下午、晚上各一回，每次觀察一到二小時。分別要有至少十次的胎動。如果發現胎動少於平常的一半，表示寶寶可能有缺氧或胎兒窘迫等狀態，應盡快尋求醫師協助評估寶寶健康安全喔！

二如果有頻尿的情形，建議孕媽咪有尿意感即前往排尿；白天增加液體攝取量，夜間為了減少小便次數，可在晚餐以後減少液體的攝取量。

三 如果媽咪有漏尿的情況，可以開始練凱格爾運動，可以改善漏尿狀況，生產完也要持續練凱格爾運動哦～

四 再次提醒媽咪，不管妳之前是否曾經接種過破傷風、減白喉混合疫苗（）或減破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗（），每一次懷孕都還是要再接再種一劑疫苗喔！雖然疫苗在孕期任何週數都可以接種，但為了讓媽咪抗體傳遞給寶寶的接種發揮最大效益，建議能在懷孕第二十八到三十六週接種最好；若懷孕時未接種，生產後也要馬上接種～

迎接寶寶計畫

爸比媽咪可以開始佈置寶寶睡覺的地方囉～像是嬰兒床、床墊等，而嬰兒枕頭、棉被通常不建議一歲以下寶寶使用，因為容易發生窒息風險，真的要小心！

一 嬰兒床：寶寶還太小時，建議把嬰兒床放在主臥室，方便爸比媽咪照顧。挑選嬰兒床時，首先要看尺寸大小是否適合，接著要檢查整體結構是否安全，包括欄杆寬度不可超過六公分、床板卡榫是否穩固、輪子是否能固定、油漆太亮可能含有重金屬等。

二 床墊：因為寶寶容易流汗，所以一定要選擇透氣性佳的材質，軟硬適中的床墊喔～建議可以多多比較，選出最適合的款式。

來源：懷孕第32週 懷孕初期症狀又找上門 4招改善飲食法

懷孕第三十二週 懷孕初期症狀又找上門 四招改善飲食法

媽咪身體變化

親愛的媽咪，這週妳將持續增重二百五十克左右，大約比孕前增重八到九公斤。而且會感覺肚子越來越緊繃，連要剪個腳趾甲都沒辦法。這時候就需要老公代勞囉～不僅如此，子宮過度擠壓腸胃。讓妳有時連一餐都吃不完，還容易脹氣、胃食道逆流。建議可以採取少量多餐的方式，但還是要顧到營養是否均衡喔！

胎兒發展狀況

小寶貝越來越大了！他身高已經來到四百二十四公分，體重有十七公斤囉！他的皮膚已經接近肉色，且透過超音波，寶寶的五官也會更清晰！

這時候大部分的寶寶頭部會慢慢轉向媽咪骨盆的位置，為了出生的姿勢！但他還是很調皮，喜歡轉來轉去活動筋骨～不過有些寶寶可能是呈現臀部在下或其他姿勢。媽咪暫時先不用擔心，醫師可能會進行一些措施來幫助胎位轉正。或是寶寶也可能自行轉到正常的位置。

飲食營養

因為子宮壓迫到腸胃，懷孕初期的脹氣、胃灼熱的不舒服又找上門，讓媽咪感到很辛苦。此時預防脹氣妳可以這樣吃～

細嚼慢嚥

媽咪吃東西時一次不要太大口，仔細把食物嚼碎再吞下去，會比較好消化喔～

減少空氣跑進去

因為咀嚼、吸食會不自覺吞下過多氣體，所以媽咪在吃東西時。記得把嘴巴緊閉，也要少吃口香糖、蜜餞、含酸梅等。減少空氣跑進去。

記錄產氣食物

有些人會說要少吃產氣食物，像是青椒、地瓜、高麗菜、豆漿等。但這還是要看媽咪的體質喔～妳要養成飲食筆記的習慣，才會知道哪些食物對妳有影響。別一味地把產氣食物當拒絕往來戶～

少吃高油脂的食物

大魚大肉、油炸物、甜膩的食物都比較不好消化，所以媽咪也要少吃。

生活小叮嚀

一媽咪要先做好住院或回娘家待產時，不在家的準備，像是家事筆記等。

二這時候媽咪可以使用托腹帶來減輕肚子的重量。

三雖然懷孕後期媽咪會水腫是正常現象，但如果手、臉有出現異常的腫脹，就可能是子癰前症的先兆，一定要馬上到醫院做進一步的檢查喔！

四可以開始確認居住地的津貼、補助等申請方式。

產前檢查

媽咪從三十二週後，要記得進行第八次的公費產檢以及第三次的超音波檢查喔～現在每兩週會進行一次產檢，追蹤寶寶的成長狀況，與醫師討論生產方式。尤其是懷雙胞胎的媽咪更要準時產檢，預防早產的情形發生喔～另外這週除了問診、尿液檢查以外，還要再抽血檢查一次梅毒血清反應，以確保媽媽沒有受到感染喔～

來源：懷孕第33週 媽咪，妳累了嗎 快請隊友來幫忙！

懷孕第三十三週媽咪，妳累了嗎快請隊友來幫忙

媽咪身體變化

懷孕正式進入第九個月，大腹便便的妳，最近行動一定很不便吧！媽咪加油，再撐一下就能迎接寶寶囉～本週將持續增重二百五十克。這時候子宮已經幾乎達到媽咪可以承擔的極限，全身肌肉都會感到痠痛。不僅如此，偶爾還會因為疲勞而有頭暈的狀況。提醒媽咪一定要適時地請身邊的人協助，別硬唷～

胎兒發育狀況

妳的小寶貝持續增大中，此時身高來到四百三十七公分。體重則近二公斤（約一千九百一十八克）囉～所以媽咪的子宮對寶貝來說，已經小得快讓他動彈不得了～妳會發現。寶寶的膚色從紅逐漸轉為粉紅，他的瞳孔也可以根據光線強弱進行調節。就像個「人」一樣～

飲食營養

睡不好的媽咪，妳知道除了補充鈣質以外，還有一個營養素也很重要喔！

有利鈣吸收的鎂

鎂是人體必需吸收的礦物質中的前四名呢！鎂不僅能幫助鈣吸收，還能降低媽咪罹患子癲前症、憂鬱症及骨質疏鬆的風險喔～不僅如此，孕晚期媽咪難睡的困擾，也能靠鎂來改善唷～富含鎂的食物包含：菠菜、苜蓿芽、白菜、金錢魚、鮮蝦、小卷、海蜇皮、蕎麥、白芝麻、芝麻醬、紅豆、米豆等。

生活小叮嚀

一越接近預產期，想必媽咪一定既興奮又焦慮吧～建議準爸爸可以多陪媽咪上一些媽媽教室，提前為分娩做準備。媽咪也可以跟有生產經驗的朋友聊聊，請他們傳授一些有用的生產技巧給妳，也能紓解一點壓力唷～

二妳跟先生討論好孩子出生的規畫了嗎？像是托育方式、孩子取名等，也可以趁現在先準備準備喔！

三媽咪，妳昨晚睡得好嗎？經常因為骨盆痛、腰痠背痛得輾轉難眠吧！這時候改成左側躺，隆起的肚子及腰背後方都墊側睡枕。或購買可多變化的月亮枕，可能會讓妳比較好睡喔～當然睡姿還是以媽咪覺得最舒適、好睡的為主。別勉強自己～

四提醒媽咪，孕婦感染流感的高危險群，若孕期剛好遇到流感流行季節，最好要接種公費「流感疫苗」喔！

迎接寶寶計畫

妳的待產包準備好了嗎？記得要儘早準備，才不會手忙腳亂喔～有些附設產後護理之家的婦產科院所會協助準備，可以先問清楚。基本上，待產包就是按照孕婦手冊列出的用品來準備，分以下幾類：

一 文件：媽咪的健保卡、夫妻身分證、孕婦健康手冊（包含產檢檢驗報告）、分娩同意書。

二 盥洗用品：毛巾、臉盆、牙刷、牙膏、肥皂、衛生紙、濕紙巾、乾紙巾、基礎保養品等。

三 產後護理用品：看護墊、產褥墊、產後衛生棉、一般衛生棉、夜用生理安全褲、生理沖洗劑等。

四 換洗衣物：拖鞋、哺乳內衣、免洗內褲、哺乳外衣、哺乳睡衣、毛帽、襪子、束腹帶（剖腹產必備）等。

五 哺乳用品：集乳袋、溢乳墊、吸乳器、疏乳棒、授乳枕等。

六 寶寶用品：紗布衣、紗布帽、包巾、衣服、奶嘴、小奶瓶等。

來源：懷孕第34週 懷孕後期 腰臀不適解決方案

懷孕第三十四週 懷孕後期腰臀不適解決方案

媽咪身體變化

媽咪離生產又更近囉～這週體重又再增加二百五十克，而且妳會覺得肚子看起來往下墜、且有點往前傾。整個重量往下壓之後，妳的骨盆、膀胱、臀部又更不舒服了。甚至還有坐骨神經痛讓妳的腿發麻、無力，連腰部跟臀部都有刺痛感。

胎兒發育狀況

快速成長的寶寶身高已經來到四十五公分，體重則是二千一百四十六公克了！這時候子宮內的空間已經沒辦法讓他活動自如了，比較重的頭部也會順勢往下。但為了讓媽咪好生一點，寶寶此時的頭骨還是軟軟的喔～此外。他還要透過胎盤來吸收媽咪給他的免疫抗體，以提供出生後避免感染的防禦力喔！

飲食營養

坐骨神經痛不只可以靠一些伸展運動緩解，還能透過飲食來舒緩喔～

排便順暢很重要

媽咪保持排便順暢，就不會增加腹部負擔，可以多攝取富含纖維質的蔬菜，如：菇類、牛蒡、地瓜葉、秋葵、空心菜

、花椰菜、敏豆、竹筍、青江菜、絲瓜、冬瓜、苦瓜、番茄、洋蔥、高麗菜等。

維生素群舒緩神經

維生素能滋養神經，其中胚芽米、燕麥、黃豆、堅果類、深綠色蔬菜、香蕉等，都能幫助媽咪舒緩喔～

生活小叮嚀

一預計回娘家附近生產的媽咪，應盡可能在三十四週左右就回去待產喔～

二還在工作的媽咪，可以看看自身狀況，決定要不要從這週就開始請假待產。

三這時候媽咪的肚子已經很沉重，上下樓梯、洗澡時一定要特別注意安全，避免滑倒喔！就算要做家事，也一定要輕緩，更不要做危險動作！

四假性陣痛可能會越來越頻繁出現，只要發生不規則的肚子悶痛或痠痛、強度沒有越來越強，媽咪可以試著改變姿勢、起身走動、按摩腳或背部來舒緩肌肉。但如果假性陣痛讓你非常不舒服，那就趕快就醫吧！

五懷雙胞胎的媽咪，很常會在三十四週就有產兆，請務必注意喔～

產前檢查

這週媽咪會進行公費產檢，準爸媽記得要留意寶寶胎頭的位置，因為胎位是否正常會直接影響到媽咪的分娩狀況。

不僅如此，媽咪也可以擬定一個生產計畫書。與醫生討論生產方式，了解生產時的醫療處置。例如：是否要剃毛、灌腸、剪會陰、注射點滴、施打減痛分娩、產房是否能让先生進去…等。不過這份計畫書仍要是「可調整」的，畢竟生產過程中會遇到很多突發狀況，還是要相信醫師當下的判斷喔～

產前運動

這時候媽咪可以做一些幫助強化背部肌肉，讓骨盆腔的關節更柔軟、靈活，有助生產時更順利！以下列舉二個產前運動，媽咪可以每天挑一個做喔～

深蹲合掌式：掌握骨盆底肌用力的訣竅

一先準備瑜珈磚或堆疊的書本放於雙腳張開的中間處。

二接著坐上去後，將手於胸前合掌。手肘打開，挺直背部。並讓肩膀往下沉。

三 一邊吐氣、一邊手肘將膝蓋往兩側推開，雙腳逐漸變成字型，伸展髖關節。

四 動作停留一分鐘，並進行反覆幾次深呼吸。

背臀運動：背部可以伸展、放鬆

一 準備一條彈力最鬆、最薄的拉力帶。

二 身體站直、抬頭挺胸，雙腳微微打開與骨盆同寬，左腳固定拉力帶下端，右手抓緊拉力帶上端。

三 右腳慢慢往後延伸，腳尖踩地，身體微微向前傾，把重心放在左邊的臀部。

四 慢慢地將右手拉力帶往上高舉過頭頂。

五 可以一天一次，左右兩邊各做十到十五次。

看更多：

懷孕初期：規律運動篇建立規律的運動習慣

懷孕中期漸進式增加運動

懷孕後期持續運動三重點

來源：懷孕第35週 孕肚變大後症狀更多了！

懷孕第三十五週 孕肚變大後症狀更多了！

媽咪身體變化

恭喜媽咪進入懷孕的最後階段，這週體重一樣會繼續增加二百五十克。總增加重量約八到九公斤，子宮的位置已經來到肋骨下方。整個體積被撐大了約十五倍，所以媽咪會感覺全身越來越疼痛。也會出現類似懷孕初期的反胃症狀，真的很辛苦！不僅如此，這時候妳還會覺得下墜感越來越明顯，陰道分泌物也會增多。

胎兒發育狀況

此時妳的小寶貝越來越壯囉～他的身高來到四百六十二公分，體重二千三百八十三公克了。幾乎塞滿了整個子宮，因此更加難以活動筋骨。不過他還是偶爾會吸吮自己的手指，先預習出生後喝的功課喔～這時候寶寶的肺部功能已經發育完成。就算提前出生，存活率也有九十九%呢！

飲食營養

平常習慣吃外食的媽咪，要注意不要吃到生食。以免把細菌吃下肚，造成母子垂直感染。也許媽咪感染了沒症狀

，卻可能影響到寶寶。

不論是生菜沙拉、生雞蛋、生魚片、生乳、即期加工品等，都可能受到李斯特菌、沙門氏菌污染，如果真的不確定品質、衛生條件是否沒問題，媽咪還是別吃為妙！若要生吃蔬菜、水果，請務必要徹底洗淨；生鮮肉品最好選擇全熟的～

日式料理、甜點「生食」最常見

相信許多人吃日式料理一定會點生魚片、握壽司、親子丼等，但是這些都含有生食的部分，懷孕時盡量不要點。不妨選擇包熟食的壽司捲、炸天婦羅的牛蒡及野菜、烤魚等，只要計算好熱量，還是可以享受一下日式風味～

甜點的部分，有些蛋糕的作法是用生蛋、生乳做成。如：提拉米蘇，建議媽咪嘴饞想買來吃時。先問清楚做法跟成分比較好喔～

生活小叮嚀

一因為寶寶隨時有可能會報到，爸比媽咪做功課要溫柔些，否則太激烈的行為可能會引發子宮收縮，提高早產的風險喔～

二準爸媽也要開始確認寶寶報戶口的程序。

三因為這時候陰道分泌物會變多，所以媽咪要好好注意私密處的保養。

四記得事先規劃從家中出發到醫院的交通方式、花費時間、誰陪媽咪去待產、辦理產假申請等。

迎接寶寶計畫

接著，我們要開始準備新生兒的外出用品囉～像是手推車、汽車座椅等，挑選建議如下：

一

手推車

嬰兒手推車有分坐椅式及平躺式兩種，基本上新生兒～六個月的寶寶的脊椎發育還未成熟，所以最好選擇平躺式的推車比較好。另外，記得選擇有雙向功能的，爸比媽咪在推推車時才能時時刻刻注意寶寶的狀態。

二

汽車安全座椅

寶寶出院時，不管是前往月子中心或回家。大多都會用汽車載，為了安全。零到二歲的寶寶搭小型車時，安全座椅須採後向式或攜帶式嬰兒床；二歲以上至四歲以下且體

重在十八公斤以下者。應坐於車輛後座的幼童用座椅，並優先選用後向幼童用座椅。

最重要的一點就是，安裝一定要正確，爸比媽咪請謹記四個原則：

「後」：只可安裝於後座，並選用「後」向式安全椅

「安」：按照說明書步驟安裝

「固」：座椅穩固不搖晃

「指」：緊縛孩子一指寬

備註：背巾、背帶的部分，媽咪先不要急著買。建議等到寶寶出生後，隔一段時間再直接帶寶寶去試用。才能挑出最適合的用品。

延伸閱讀 嬰幼兒意外事故防制 -汽車安全座椅的重要

來源：懷孕第36週 拍拍手~媽咪更接近預產期了

懷孕第三十六週 拍拍手~媽咪更接近預產期了

媽咪身體變化

距離見到寶寶本尊的日子已經越來越接近囉～本週的體重仍然會再上升二百五十克，雖然妳的體重可能控制得還不錯，但腰痠背痛、恥骨痛的狀況仍然持續。不僅如此，比上週更頻繁的宮縮也經常讓妳很緊張，提醒媽咪要提前了解真假性陣痛的表現，隨時做好入院的準備喔！

胎兒發育狀況

現在妳的寶貝已經有四百七十四公分高、二千六百二十二公克重囉～此時寶寶的皮膚更加光滑、臉頰肉肉的，而頭髮的髮色及髮量也能看得出是遺傳媽咪或爸比了！而原本包覆在他身上細細的絨毛與白白的胎脂逐漸脫落，這些分泌物也會被寶寶吞入存在腸道中。形成胎便，在出生後二十四小時左右會排出。這也是寶寶的第一次便便唷～

飲食營養

有些媽咪到了懷孕後期，醫生說妳過瘦，寶寶能吸收到的營養、熱量也很低，該怎麼辦呢？

多補充澱粉類

過瘦的媽咪可以多吃一些澱粉類的食物來增加熱量，建議從三餐以外增加點心試試看～例如：下午茶可以吃地瓜配米漿、全麥堅果麵包，或是晚餐後喝一杯紅豆牛奶、綠豆湯等。

不要只吃高蛋白食物

如果媽咪的點心只吃茶葉蛋或無糖豆漿，反而會因為整體熱量不夠。使得蛋白質被用來充當能量使用，發揮不了修補、長肉的作用。寶寶還是容易增胖喔！

避免吃太多「空熱量」

提醒媽咪別想著要增加熱量，就攝取太多單醣類的甜點、飲料、汽水；或是卡路里很高、卻沒有營養價值的食物，如：薯條、可樂餅、鹽酥雞、洋芋片等，這些食物只會讓你變虛胖而已喔～

生活小叮嚀

一 這時候的你，可能會有點心慌慌。甚至不由自主地一直整理寶寶的衣物、用品等，這是一種築巢的概念～沒關係。只要別太勞累，媽咪的心裡會感到很滿足唷～

二 雖然懷孕後期要多休息，但還是要持續做一些和緩的運動。例如：散步，可以早晨或晚餐後跟老公一起出門走走。會讓你生產時的體力比較好。

三 有時間就複習你跟老公在媽媽教室上課學到的順產技巧，包括呼吸、伸展等。

產前檢查

媽咪要記得這禮拜回去產檢喔～本週是第十次公費產檢，且從這週開始媽咪每週就要產檢一次。除了問診、身體檢查、抽血檢驗的一般程序以外，還會多一項有健保給付「乙型鏈球菌篩檢」唷！

乙型鏈球菌是人類的腸胃道及生殖泌尿道常見的細菌，約有十八到二十的孕婦產道帶有此細菌，當寶寶經產道出生時很可能受到感染，嚴重會有敗血症！所以在懷孕第三十五到三十七週左右必須採檢以確保媽咪沒有感染，篩檢的方法很簡單。只需要用棉棒擦拭陰道外口、會陰處及肛門口，採檢過程不會使用內診檢查。也不會用「鴨嘴」（即擴陰器）撐開陰道，所以。媽咪不會感到疼痛不適，也不用擔心影響胎兒健康。若採檢為陽性，媽咪待產時就需先施打抗生素，來杜絕寶寶出生過程中遭受感染喔～

來源：懷孕第37週 為順產準備-媽咪可以做的幾件事

懷孕第三十七週為順產準備-媽咪可以做的幾件事

媽咪身體變化

孕期正式進入第十個月囉～媽咪懷孕到三十七週已經可以算是足月了，小寶貝隨時可能會降臨唷！此時子宮大小約三十八公分，羊水量約有一千。隨著胎頭下降到骨盆

腔，妳前幾週的一些反胃、呼吸困難的症狀會消失。但膀胱受到的壓力更大了，讓妳有頻尿、尿不乾淨等狀況。媽咪記得不要因此而憋尿或不喝水喔！

胎兒發育狀況

寶寶的身高來到約四百八十六公分、體重約二千八百五十九公克囉～從這週開始，他的體重增加會稍微減緩，但仍有成長空間喔！寶寶的脂肪會繼續形成，看起來會更加圓潤，讓他出生後能夠保暖身體。

飲食營養

如果媽咪這時候發現體重超過十到十四公斤的理想範圍，切記不要刻意減肥，可以從飲食中調整喔～

減少澱粉食物比例

如果那餐已經有米飯和麵條等主食，就別再吃地瓜或馬鈴薯；或是將精緻米飯改為五穀飯、糙米飯等。

進食順序要改變

超過二十四的媽咪，三餐一樣都要吃，但進食順序可變成蔬菜蛋白質食物澱粉類食物。

少吃糖分太高的水果

水果的糖分也不容小覷，吃太多也會增加過多熱量！像是鳳梨、釋迦、芒果、龍眼、香蕉等就不適合；可以選擇升糖指數較低、水分高的水果，例如：蘋果、水梨、芭樂、橘子等。

生活小叮嚀

一媽咪如果感覺自己的陰道有溫溫的水流出，但又不確定是分泌物、漏尿或羊水破，可以參考以下狀況來分辨：

分泌物：聞起來沒有異味，摸起來較為黏稠，顏色呈現乳白色。

漏尿：聞起來有尿騷味，摸起來水水的，顏色為清澈黃色，可以感覺有尿意。

羊水流出的：聞起來沒有味道或略帶腥味，摸起來不黏、水水的，顏色呈現淡黃色，且通常會無法控制地一直流出來。若媽咪嚴重懷疑是破水，請一定要趕快就醫喔～

二雖然接近預產期讓妳的心情很緊繃，但還是要試著放鬆、釋放壓力。不妨透過冥想、深呼吸、聽音樂、練習放鬆瑜珈，或是請老公幫妳按摩腿部、臉部等。讓肌肉放鬆。

三產前一個月最好少出遠門，不管媽咪是打算自然產或剖腹產都是喔～若要出門，請一定要帶充飽電的手機。

產前運動

生產球

媽咪可以試試看生產球輔助的運動，幫助訓練骨盆肌肉、增加下半身的肌耐力、減輕腿部壓力，同時還能幫助分娩時順利。不過生產球是圓型、有彈性的，媽咪使用時最好有教練或老公在旁邊協助，比較安全喔～

爬樓梯

爬樓梯也可以訓練骨盆肌肉，幫助順產，但覺得喘時一定要停下來休息。不過到了產前一個月，肚子可能因為太大而影響視線，看不太到樓梯階，最好要有人陪同。而下樓梯對媽咪來說比較危險，不妨用搭電梯的方式下樓比較安全喔！

如果擔心跌倒，也可以改走平面的路，像是逛街、到公園散步等，總之要順產就要適度運動。

來源：懷孕第38週 揮別生產焦慮 準爸爸的支持很重要！

懷孕第三十八週揮別生產焦慮準爸爸的支持很重要！

媽咪身體變化

懷孕進入最後倒數階段，媽咪這時的體重應該增加約十到十四公斤左右了（以懷孕前一百八十五到二百四十九的媽咪為例）。因為懷孕三十七週後就算足月，若媽咪在這週生產也是很正常的喔～

媽咪，妳是不是常常怕寶寶在上廁所時不小心掉出來，而不敢用力便便呢？其實不用擔心，只要沒有出現其他產兆，都可以正常如廁喔～

胎兒發育狀況

寶寶到了三十八週後，身高已接近五十公分。體重也達三千克囉～這時候寶寶的器官已經發展得相當完善，身體的皺褶越來越少。肌膚呈現光滑粉嫩，幾乎已經是新生兒的模樣了～

飲食營養

媽咪除了均衡飲食以外，可以多吃一些能幫助情緒穩定的食物。

維生素

維生素可以穩定情緒，讓媽咪解除卸貨前的不安，最好的來源是小麥胚芽、橄欖油、各種堅果（杏仁含量最豐富）、酪梨、深綠色蔬菜等。

生活小叮嚀

一因為生產日逼近，讓怕痛的妳很不安吧？再加上又想到日後育兒的問題，心情又更加焦慮了…為了不讓自己陷入憂鬱症，建議媽咪可以多曬曬太陽、在住家附近走走散心、多與親友聊聊天、跟老公傾訴妳的不安，別太鑽牛角尖喔～

二有空就多多練習拉梅茲呼吸法，因為正確的呼吸方法可以幫助生產時用對力。

三媽咪洗澡時最好用淋浴的方式，而且水溫別太高。如果真的想泡澡紓解壓力，一次以五分鐘為限。且浴室門不要反鎖，當出現狀況時。方便家人進入。

產前檢查

三十八週為第十二次的公費產檢，且從這週開始媽咪每週就要產檢一次。若媽咪想要剖腹產，建議最晚這週就要告知醫生。讓醫生評估妳的狀況是否符合剖腹產適應症，未符合則要自費。基本上子宮肌瘤開過刀、嚴重子癰前症、寶寶過大、胎位不正等會建議剖腹產。

迎接寶寶計畫

三十八週後，媽咪隨時都可能生產，所以事先了解產兆非常重要！

一

落紅：

發現內褲有混和著少許血液的分泌物，這很可能是子宮頸已經慢慢打開了！

二

規律陣痛（宮縮）：

開始有陣痛或腰痠的感覺，而且從不規則逐漸變成規則（第一胎約三到五分鐘就會陣痛一次。第二胎以後只要有規則陣痛就要開始待產），而且每次疼痛時間也逐漸變長（約三十到七十秒）。且不會隨著走動減緩，疼痛感會延伸到整個腹部、背部、腰後方。甚至會有便意或肛門不由自主想用力的感覺；此外，媽咪也可以觀察到。痛的時候肚子會變硬，不痛時則會變軟。

三

破水：

羊膜破裂，羊水不斷地從陰道流出來。

基本上，這三種產兆沒有先後順序。所以不論是出現哪一種，最好盡快就醫。或是先打電話至生產醫院告知狀況，詢問是否可以前往待產喔～

來源：懷孕第39週 陪產時，準爸爸能做些什麼

懷孕第三十九週陪產時，準爸爸能做些什麼

媽咪身體變化

生產繼續倒數中～媽咪這週的體重應該不太會有變化，甚至還可能會減少五公斤，這顯示妳真的離見到寶寶的日子不遠了！這週媽咪的乳頭會分泌濃稠的黃色乳汁，已經在為寶寶出生後的第一餐做準備了～不妨趁這時候先預習一下哺乳的技巧吧～

胎兒發展狀況

妳的小寶貝身高來到五百零七公分，體重約三千二百八十八公克囉～為了乾乾淨淨地與爸比媽咪見面。寶寶的胎毛及胎脂大部分已經脫落，只剩下肩膀及四肢還有一些。與上週相比，幾乎只有身軀大小的變化～

飲食營養

媽咪知道嗎？產前多吃鋅可以讓妳比較好生喔～為什麼呢？原因如下：

高鋅飲食助順產

鋅除了跟寶寶大腦發育有關，還會影響分娩狀況喔～因為產前缺鋅除了增加早產風險。還會使產程延長、子宮收縮無力等狀況，讓生產過程變得較不順利。孕媽咪每天需要攝取十五毫克的鋅。動物性食物的鋅含量最高，如：蚵仔、牛肉、羊肉、雞肉、淡菜等，但吃素的媽咪也能從洋菜、小麥胚芽、蘑菇、葵瓜子中攝取。

生活小叮嚀

一想必這時候媽咪與老公因為各種未知而陷入焦慮吧！先別想了，不如利用這段時間好好享受兩人生活。看場電影、聽聽音樂會等，不然等到寶寶出生後。想要有獨處的機會就更難囉～

二 做好臨盆的心理準備，生產程序及臨盆時的聯絡方式做最後確認。

三 老公也要做好陪產請假的準備唷～生產時媽咪非常需要你在身邊呢！

四 媽咪的待產包準備好了沒呀？請至少要把緊急帶去醫院生產的待產包備妥，才能快速應變喔～

產前檢查

三十九週會進行第十三次產檢，這次除了進行常規性的檢查以外。衛教師也會做產前衛教，讓媽咪了解生產該注意的事項。包括：自然產的分娩過程、住院生產準備、產兆等，也會事先說明產房的設置。幫助你們了解一下生產環境，讓準爸媽臨時報到時也不會手忙腳亂。

迎接寶寶計畫

在媽咪待產時，準爸爸這個陪產角色非常重要喔～要想辦法幫媽咪放鬆，正確做法如下：

一 幫忙按摩、坐生產球運動緩解疼痛

可以讓媽咪跪趴在生產球上，老公接著用手或寶特瓶裝溫水當按摩用具。輕輕按摩媽咪的腰部及背部，也可以依照媽咪的需求熱敷或冷敷；或是讓媽咪坐生產球上。準爸爸從前面抱住媽咪的身體支撐，等到坐穩後。先左右擺動後，重心穩固後再以畫圓圈的方式規律擺動。

二 協助媽咪調整呼吸節奏

宮縮的強度越強，媽咪的呼吸可能會越來越亂，所以需要爸比在旁邊幫他調整呼吸節奏。

三 提醒媽咪如廁、補充水分

除了要適時補充水分以外，每隔兩小時要提醒媽咪上廁所，以免膀胱過度膨脹而影響寶寶下降。

四 餵媽咪吃有熱量、容易消化的食物

產程初期時，爸比可以趁空檔餵媽咪吃一些好消化的固體食物，如：燕麥棒、布丁、米穀棒等。到了第二產程後，則要選擇一些更好消化的流質食物，如：稀飯、果汁、運動飲料、蜂蜜水等，讓媽咪儲存體力。要注意食物不能太過油膩，以免消化不良。

來源：懷孕第3週 掌握排卵期，增加受孕機會~

懷孕第三週掌握排卵期，增加受孕機會~

媽咪身體變化

孕期第三週是排卵期，因為精子能在女性體內存活三到五天。如果這幾天妳和先生有性行為，將有機會讓精子與卵子相遇。結合成為受精卵，孕育出你們愛的寶貝。健康的男性每次射精時會有數千萬，甚至上億隻的精子射出。但最後只有一隻精子能完成任務，讓卵子受精。真是不簡單啊！而受精卵經過三到五天的時間會從輸卵管到達子宮腔準備著床。

但對媽咪來說，孕期第三週身體不會有什麼變化。妳也無法得知自己是否受孕了，此時。透過超音波也看不到受精卵，不過。妳的體內正悄悄進行著孕育寶貝的大事！

胎兒發育狀況

孕期第三週，恭喜妳和先生共同創造出愛的結晶。本週微小的受精卵會不斷的分裂，胎兒已擁有來自妳和先生的二十三對染色體，胎兒的性別在受孕當下也已經決定囉！

飲食營養

持續維持良好的飲食習慣對媽咪很重要，如果妳是外食媽媽。建議嘗試以下做法，也能幫助妳在孕期營養攝取更均衡。包括：一選擇自助餐，妳可以增加蔬菜的攝取量。肉類多以魚肉及雞肉為主；二便利商店：可選擇熱量較低，主食為糙米的健康便當；三加熱滷味：多夾一、二份青菜。並請老闆簡單調味就好。

在懷孕期間鐵質、鈣質及蛋白質對妳都是重要的營養素，鐵質是構成血紅素的主要成份，可以從肝臟、肉類、牡蠣、貝類、蛋黃、綠葉蔬菜等食物中攝取。而鈣質可提供骨骼及牙齒的發育，建議多吃牛奶、小魚乾、豆類、深色蔬菜、堅果類等食物。蛋白質有助胎兒發育，攝取來源為奶類製品、豆漿、豆腐、豆干等黃豆製品、魚、蛋、肉等。

生活小叮嚀

一正常女性每個月會排一次卵，有計劃懷孕的媽咪當然要把握每個月的排卵期！小小提醒妳，不要只有在排卵日那一天才同房，建議排卵日的前三天、前一天、當天、後一天、後三天都可以有性福計劃（可依夫妻時間及實際狀況調整），更可以提高成功受孕的機會。

二如果妳和先生在未避孕的狀況下，超過一年努力都沒有懷孕，請積極就醫了解是否有影響懷孕的健康因素。

三孕期第三週有可能在妳不知道的時候，受精卵已經前往子宮著床囉！所以，請媽咪維持良好的生活作息。盡量減少出入人多的公共場所、勤洗手，讓自己保持健康。用最好的狀態迎接小小受精卵的報到。

來源：懷孕第40週 40週闖關成功 迎接小寶貝囉！

懷孕第四十週 四十週闖關成功迎接小寶貝囉

媽咪身體變化

相信這時候有些媽咪已經把寶寶緊緊抱在懷裡了吧？還在努力中的媽咪也先別急，加把勁。寶寶很快出來囉～這週媽咪的關節、肌肉會變得更加柔軟，隨時在為生產做準備。

備。如果媽咪採取自然產的方式，這時候的規律陣痛就是寶寶在敲門的指標。表示你們真的快見面囉！

胎兒發育狀況

小寶貝準備破繭而出，這時候的身高來到五百一十二公分。體重約三千四百六十二公克囉～他已經具備各種能力，完全能在子宮外生活了。成熟的肺部發育，更會在出生的第一刻發揮作用。並會用響亮的哭聲，來向爸比媽咪宣示「我來囉！」

飲食營養

基本上，本週仍要注意飲食以清淡、均衡為主，但如果媽咪容易緊張，不妨多吃一些可以穩定情緒的食物。

色胺酸

像是香蕉、牛奶、雞肉等含有豐富的色胺酸，可以讓媽咪安定神經，還有助眠的效果喔～

-氨基丁酸

-氨基丁酸可以抑制媽咪緊張焦慮的心情，不妨從發芽糙米、玄米、燕麥、番茄、黃豆等食物中攝取。

膽鹼

膽鹼同樣可以減輕壓力，幫助媽咪精神振作，如：蛋黃、牛肉、豬肉、香菇、肝臟、黃豆等都有豐富含量。

生活小叮嚀

一提醒媽咪這週一定要時時刻刻注意自己身體的變化，只要出現破水、規律陣痛、落紅等狀況，都是寶寶準備出來的暗號，記得趕緊就醫。

二如果已經有規律陣痛，但又還沒達到一般住院標準（子宮頸口開了三至四公分或二到三指）。請媽咪忍耐一下，讓爸比牽著你多走路。可以幫助子宮頸軟化喔！

三還有還有，媽咪要去醫院待產前，記得別化妝與擦指甲油，因為醫生會看這兩個地方來觀察媽咪身體的血氧飽和度變化喔～

四非常非常怕痛的媽咪，可以事前與醫師溝通要自費施打減痛分娩，可以幫助媽咪減輕七到八成的疼痛。

產前檢查

本週如果媽咪還未生產則會進行第十四次的公費產檢，除了例行性檢查以外。醫生也會進行「過期妊娠」檢查，因為到了四十週以後。胎盤會急速退化，對寶寶的危險性會變高。因此超過四十二週就會催生引產。也就是寶寶在

媽咪肚子裡面住太久了，需要推一把，讓他趕緊出來唷～

產前運動

蹲站可幫助順產

接近預產期時，媽咪可以扶著桌子做蹲站的動作。每天做兩次，一次維持約二分鐘。但記得做的時候，旁邊一定要有人協助。且腳步不穩的時候別貿然蹲下或站起喔！

按摩會陰

按摩會陰不僅可以增加會陰部的肌肉彈性，還能降低生產時陰道撕裂傷的程度。媽咪可以先將手洗乾淨，食指伸進陰道約一個指節深後。大拇指在外，用兩指輕輕的按壓一下陰道口。每天進行十分鐘以內就可以囉～

來源：懷孕第4週 記錄月經時間有助計算預產期

懷孕第四週記錄月經時間有助計算預產期

媽咪身體變化

孕期第四週，妳的寶寶已經住進子宮了。不過，大多數的媽咪不會有什麼感覺。身體也沒有明顯變化，此時妳的子宮開始增厚。成為適合孕育寶寶的環境。有少數的人在受精卵著床時會出現出血現象，通常顏色很淺、點狀少量出血，出血會自動停止，請不用太擔心。

但如果受精卵不健康就不會順利著床，會出現較大的出血量。如果妳沒有留意是否會懷孕，妳也可能只是當成經血量變多或是生理期紊亂。這是胚胎自然淘汰的過程，請放寬心。

本週還不建議妳驗孕，以免患得患失，通常建議等月經延遲一週沒來時，驗孕更為準確。

胎兒發育狀況

親愛的媽咪，受精卵會發育成胚胎。本週胚胎已經在子宮著床了，著床後的胚胎會慢慢長大。這時大腦的發育已經開始，受精卵不斷地分裂。一部分形成大腦，另一部分則形成神經組織。胎盤也開始初步形成，胎盤是演化自胚胎組織，胎盤功能及位置都要正常，才能讓寶寶健康的成長。

要提醒妳特別留意，胎兒神經管閉合的時間是在懷孕第一個月底，而此時，很多人甚至還不知道自己已經懷孕。所以，備孕階段妳就要多攝取高葉酸的食物，以預防發生像脊柱裂的罕見疾病。

生活小叮嚀

一本週是胚胎著床的時間，媽咪請妳盡量不要讓自己太勞累。維持正常的作息，因為還無法明確知道是否已經懷孕了。也不要太緊張，保持平常心即可。

二本週不建議妳染燙頭髮，如果想要改變造型，可考慮剪髮即可。如果妳平時有下廚習慣，要使用抽油煙機或排風扇，並打開門窗，減少吸入做菜油煙。

三因為最後一次月經來的時間，可以幫助計算預產期。如果妳還沒記錄之前月經時間的人，趕快回想一下。把日期登錄起來。也要準備留意下週月經如果遲遲沒來就可能是懷孕了，如果如期報到，就表示沒有受孕，請再接再厲。

四經過藥局時妳可以購買驗孕棒，準備隔一、兩週後進行驗孕。根據經驗，即使是驗出二條線。多數媽媽還是會再驗一次才敢相信自己懷孕了。

休閒運動

因為懷孕不是生病，放鬆心情。只要不要太勞累，妳一樣可以維持日常工作及生活作息。而且要養成規律的運動，會讓妳保持好體力。孕育寶寶的過程會更加輕鬆。

如果搭乘大眾交通工具上下班，請媽咪別忘了勤洗手、戴口罩。外出旅行時，不建議安排泡溫泉的行程，怕長期處在高溫環境對孕育寶寶有影響，如果只是泡泡腳則沒什麼問題。

來源：懷孕第5週 月經還沒來報到，我懷孕了嗎

懷孕第五週月經還沒來報到，我懷孕了嗎

媽咪身體變化

備孕中的媽咪，本週是關鍵時刻了。如果妳的月經遲遲沒來，加上身體開始出現一些變化。妳很可能是懷孕了！受孕後體內會產生大量荷爾蒙，幫助身體更適合孕育寶寶，同時也會逐漸出現噁心、想吐、乳房脹痛、疲累、情緒起伏大的症狀。

如果是比較敏感的媽咪，本週就會覺得自己好像不太一樣了！不過，有些大而化之或是妊娠反應比較少的媽媽，孕期第五週可能還是沒什麼感覺。

胎兒發育狀況

經過幾週快速的細胞分化，到了第五週妳的寶寶開始在子宮內形成胚囊，這是初步確認子宮內懷孕的依據。生命是非常奇妙的，小小的胚胎，每天都會快速的生長，再來的每一週都會有不同的改變。

飲食營養

第五週妳可能會感覺噁心想吐，比較不喜歡的食物味道就先避免吧，盡量多吃天然健康的食物，少吃太油膩或不好消化的食物。目前營養重點還是放在媽媽身上，均衡的營養攝取就是最好的方式，請妳不需要為了寶寶而增加過量飲食。

另外，媽咪也要多補充水份。尤其是孕吐後，除了喝開水之外。也可以喝一些果汁。如果妳是沒有孕吐困擾的幸運兒，可以補充媽媽奶粉或豆製品等，增加蛋白質的攝取量。還有碘也是不少人會忽略的營養素，碘嚴重不足時有可能會影響胎兒腦部發育。造成新生兒生長遲緩和神經發育不全，建議妳可使用含碘鹽並適量攝取含碘量較豐富的食物。例如：海帶及海藻等。

生活小叮嚀

一 妳可能會覺得特別容易疲憊、想睡，這是正常的現象，可以利用中午午休一下，晚上也可提早上床睡覺。

二 少數人可能會有初期出血的狀況，如果妳也有這個症狀。不管量多量少，都請諮詢醫師的意見。只要醫師評估沒太大問題，就不用太擔心。

三 妳可以開始準備吸收各種懷孕的知識囉，例如善用衛福部資源、婦幼知識網站、孕產雜誌書籍等。

產前檢查

如果妳自行用驗孕棒驗孕發現有二條線了，就可以準備找醫師檢查再次做確認。此時主要是確認胚胎的位置，因為大約一百位會有一到二位媽媽發生子宮外孕。也就是胚胎著床在子宮以外的地方，例如輸卵管、卵巢、腹腔等。如果目前子宮內看不到胚胎，可遵照醫師指示，等一、二週後再次進行檢查，請妳不要太擔心。

通常在六到八週前後會先確認是否有聽到寶寶的心跳，以及確認胚胎在子宮內穩定著床。沒有子宮外孕的狀況，產檢時就會發給妳孕婦健康手冊（媽媽手冊）。媽咪目前還不用太心急喔！

來源：懷孕第6週 媽咪必學！減輕孕吐的困擾

懷孕第六週媽咪必學減輕孕吐的困擾

來源：懷孕第7週 保持好心情，當個快樂孕媽咪~

懷孕第七週保持好心情，當個快樂孕媽咪~

媽咪身體變化

孕育新生命不簡單，媽咪妳辛苦了！目前孕吐、乳房壓痛、疲累、暈眩感仍然會持續著，這是必經的過程，請媽咪繼

續加油喔！有些媽咪在孕吐過後會有強烈的飢餓感，不過。妳可能稍稍進食又會想吐，這是正常現象。請盡量放鬆心情！

由於子宮壓迫膀胱，妳可能會有頻尿、尿急的困擾，只要有尿意就去如廁，多半不會有什麼影響。

如果體重還沒有增加或是第一胎的新手媽咪，外形上不會有明顯的改變。如果是第二胎以上的媽咪，有些人腰線會變粗或腹部略為突出。可能會被看出已經懷孕了。

胎兒發育狀況

進入第七週，胚胎又長大了。目前寶寶看起來像一顆豆子，約有十三公分長。此時，已經稍有人外形概念囉！有一個大大的頭部，腦細胞正快速的成長。內臟器官也迅速發育中，五官開始形成。會有兩個黑點的眼睛，出現鼻孔及嘴巴的位置。

手臂和腿也會長出嫩芽，像小短槳一樣。身上的小尾巴快要消失了，不過。此時寶寶還不能算是一個胎兒，目前還在胚胎的階段。

飲食營養

第七週寶寶還非常小，媽咪並不需要刻意攝取過多的熱量。因為在懷孕零到三個月階段「寶寶自己會帶便當來」，卵黃囊會提供胎兒養份。媽咪只要維持原來的體重就好。如果胃口大開的媽咪，要適當控制熱量的攝取啊，妳可別認為一人吃兩人補，目前只會胖在自己身上。

這個階段以鐵質及葉酸為營養補充重點，平時可多吃深綠色蔬菜、牛肉、貝類等富含鐵質的食物。而孕媽咪一天的葉酸需求量為六百微克，如果妳的日常飲食攝取不足。可在醫師指導下補充含有葉酸的營養品，以幫助寶寶腦部及脊髓神經的健全發展。

生活小叮嚀

一受到荷爾蒙的影響，在懷孕初期妳的情緒起伏會比較大。媽咪盡量不要讓自己生氣或有負面的思想，因為孕婦的情緒可是會影響胎兒的發育。心平氣和的媽咪才能孕育健康寶寶。

二如果妳的受孕狀況都很穩定，可以維持性生活。但要避免太特殊或激烈的姿勢，並請老公使用保險套。但如果妳曾有早產病史或流產症狀，懷孕最初三個月及最後二個月宜暫停性生活。

休閒運動

媽咪可以多散步，在懷孕前三個月暫時避免太過劇烈的運動。妳喜愛的高跟鞋都要準備收起來了，外出走路時。可更換低跟鞋或球鞋，以免重心不穩造成跌倒的危險。很

多低跟鞋也很好看喔。

可以多聽聽音樂、多看正向樂觀的影片，找出各種方法來讓妳自己保持好心情，快樂迎接新生活的到來。

來源：懷孕第8週 孕期 牙齒保健 不馬虎

懷孕第八週 孕期 牙齒保健 不馬虎

媽咪身體變化

恭喜妳，進入懷孕第八週。也就是快滿二個月了，媽咪的子宮會在骨盆內持續增大。可能會有腹部、骨盆不適或拉扯的感覺，只要沒有過度的疼痛都是自然的現象。此外，子宮頸也會繼續變軟，為將來寶寶出生做準備。妳也會覺得胸部慢慢增大了，這是乳腺生長的表現。看著自己的胸部和腹部慢慢長大，媽咪應該會覺得孕育寶寶的過程真是太神奇了！

胎兒發育狀況

孕期第八週，寶寶身高大約是十六公分。重量約為一公克，接近一粒小葡萄的大小。真是可愛！寶寶手臂和雙腿變得更長了，小手指和腳趾也開始發育，不過，會有蹼狀物的感覺。而眼瞼也已經形成，耳朵、嘴唇、鼻尖更為完整了。

小小寶寶開始有伸展的動作，會踢腿、伸腿、晃動小手臂。不過，寶寶實在太小了。媽咪並不會有感覺喔！

飲食營養

本週不用刻意多吃或是少吃，如仍有孕吐困擾。那就盡量少量多餐，吃一些自己喜歡的食物。可選擇易於消化、蛋白質豐富的食物為主。目前媽咪只需提供少量的營養給寶寶，所以，不用太擔心。

平時可以幫自己準備水果餐盒做為下午點心或是直接在超商買水果盒，建議每日攝取二到四份水果，一份約為媽咪的一個拳頭大小。可選擇當季的水果，例如蘋果、香蕉、芭樂、柳橙、葡萄等都不錯，可增加維生素C及纖維質的攝取，幫助預防便秘。

生活小叮嚀

一懷孕期間牙齒健康也很重要，可別因為刷牙會想嘔吐，就減少刷牙的頻率，這樣會影響口腔健康喔！如果有牙周病不處理，也可能影響胎兒的發育。所以，妳如果有任何不舒服。請盡快就醫，別拖到症狀嚴重。反而讓治療更麻煩。只要告訴牙醫師妳已經懷孕了，醫師就會安排合適的處理方式。

二除了十四次的公費產檢，媽咪也可以開始收集了解自費產檢的項目，依照自身的需求進行檢查。

產前檢查

如果本週仍然無法聽見寶寶心跳，有可能是「空包彈」。醫學上稱為「萎縮卵」，也就是胚胎停止發育。請媽咪不要太傷心，因為二十五到三十四歲的女性。自然流產機率約為十%，三十五歲以上機率約為二十%。到了四十歲以上，自然流產機率升高為三十%。主要是染色體異常或基因突變。如果萎縮卵在一到二週內沒有自然流產，醫師會再安排小手術或使用藥物進行流產。

來源：懷孕第9週「孕動」！讓媽咪健康、寶寶有活力

懷孕第九週「孕動」讓媽咪健康、寶寶有活力

媽咪身體變化

為了孕育寶寶，媽咪的身體持續改變著，目前體重尚不會增加太多，但細心的妳是否已經能感受到身形曲線有些不同了？因為子宮逐漸增大，妳也可能會有脹氣困擾，有些人還會出現失眠、睡不好的症狀。

媽咪可能會覺得懷孕後身體各方面都不太對勁，因此有點煩躁，請換個角度思考，這正是一輩子中最特殊的歷程。告訴準爸爸妳的感受，讓準爸爸陪妳度過這個焦躁的時期，請他每天說幾句甜言蜜語，讓妳有好心情。

胎兒發育狀況

恭喜媽咪，寶寶已經進入第九週的胎兒階段了，現在已經不再只是胚胎囉！寶寶身高大約是二十三公分，重量約為二公克，接近一粒櫻桃的大小。寶寶的小尾巴在本週已經消失了，各個器官、肌肉、神經開始發育，例如腸道系統及生殖器官都在發育中，不過還無法透過超音波得知性別。寶寶手臂又更長了，稍微可以彎曲，雙腿外形也更加明顯，會交叉在身體的前方。

生活小叮嚀

一因為脹氣或孕吐問題，妳可能會想找中醫師調理，請一定要找合格的診所及中醫師，不可服用來路不明的草藥或是隨意服用成藥。

二媽咪的胸部會變得更加敏感，可以考慮更換大一個尺寸，或是改穿無鋼圈型的舒適內衣。還有妳也可以更換大一號的內褲，避免腹部太緊而覺得不舒服。

三睡不好的媽咪，建議睡覺前不要再滑手機了。白天要減少咖啡因攝取，睡前可以用溫水泡腳。讓身體比較放鬆。

四百一十週之前流產機率比較高，可以做家事，但請妳不要過度勞累、搬重物。

休閒運動

進入孕期第九週，妳有建立運動的習慣了嗎？只要沒有流產徵兆或是醫師沒有禁止運動的媽咪，都可持續運動的好習慣。因為孕媽咪體溫較高，運動時可穿舒適、透氣的服裝，鞋子包覆性、防滑性要好，運動的空間不要太過悶熱。散步、游泳、孕婦瑜伽、有氧體操、慢跑都是適合的運動。如果媽咪在孕前就有重訓的習慣，建議懷孕初期先暫緩，等滿三個月之後，再依身體狀況請教練安排合適的重訓內容。

另外，最近如有遇上婦幼用品展也可以去參加。認識一下各種孕婦及寶寶用品或是孕期營養品蠻不錯的，只是不用急著買太多。建議上網做功課或詢問有經驗的親友，以免堆積太多用不上的物品。

來源：懷孕肚子變大不太好睡，怎麼辦

懷孕肚子變大不太好睡，怎麼辦

孕婦長時間睡眠不足，身心無法得到放鬆，可能影響胎兒的發展。如果總是睡得不好，建議改變睡姿。側睡是最適合準媽媽的睡姿，可以避免重量集中背部，也不會妨礙血液循環。您可以利用枕頭或抱枕抬高在上方的那隻腳，會覺得更舒服。

有些醫師會建議孕媽咪左側睡，但如果左側睡讓您非常不習慣的話。反而會有反效果，因此。孕媽咪只要掌握側睡的原則，並不一定要強迫自己非得左側睡不可。另外可以在晚間減少水分的攝取，避免夜間一直起來上廁所而影響睡眠。

來源：懷孕與甲狀腺疾病

懷孕與甲狀腺疾病

懷孕期間的甲狀腺功能變化

正常懷孕期間孕婦的基礎代謝率會增加，而甲狀腺的生理變化為暫時性甲狀腺機能亢進症。原因是懷孕婦女的絨毛膜性腺激素- β 濃度增加所造成。此激素有類似促甲狀腺素- β 的功能。故懷孕初期八到十三週左右時會有類似甲狀腺機能亢進症的症狀，如體重未增加、心跳加快和異常疲累。或出現妊娠劇烈嘔吐，因絨毛膜促性腺激素（ hCG ）刺激母體甲狀腺使然，這是為了確保在懷孕初期能有足夠的甲狀腺素。來讓寶寶有完整的神經發育，若嘔吐的情況嚴重。必要時需配合藥物或住院治療。

一般而言進入懷孕五個月左右就會自然改善，因此不需要特別治療。

甲狀腺亢進與懷孕

甲狀腺功能亢進的婦女在懷孕後可能會使心悸、雙手顫抖、怕熱、多汗、焦慮、失眠、易餓…等症狀會更為明顯，造成孕婦體重減輕。有甲狀腺功能亢進的婦女應等甲狀腺機能控制妥當再計畫懷孕，以減少對母體造成的併發症。如流產、早產、子癰前症等，孕婦甲狀腺亢進在沒有適當治療控制時，可能產生「甲狀腺風暴」，使全身代謝功能失序造成心肺功能衰竭的危險。對胎兒而言，也會有體重較輕或子宮內生長遲滯、新生兒甲狀腺機能亢進及胎死腹中的併發症。懷孕期間孕婦需定期監測體內甲狀腺功能並依醫師指示服用藥物，整體臨床效益仍大於其風險，切勿自行停藥。

甲狀腺低下與懷孕

甲狀腺功能低下的婦女較易發生排卵異常，因此不孕的機率較高。如果孕期甲狀腺功能控制不佳，會使流產機率增加、妊娠高血壓、胎盤早期剝離、產後出血等併發症。胎兒先天中樞神經系統異常的比例也會增高；孕婦發現有甲狀腺功能偏低時，應立即接受足量的甲狀腺素治療。並定期追蹤甲狀腺功能。

懷孕期間使用甲狀腺相關藥品是否對腹中胎兒造成不良影響？

甲狀腺亢進於懷孕期間治療方式以藥品為首選。最常使用為。副作用較少，雖會穿透胎盤。造成畸形兒比例極低，但還是可能造成胎兒引發甲狀腺低下的情況。建議懷孕期間應定期施行甲狀腺機能檢查，並依據醫師的處置進行藥品的服用與適切的治療。

甲狀腺低下懷孕期間服用甲狀腺素，此藥物僅少許通過胎盤，一般治療劑量下，並不會對胎兒甲狀腺造成影響。在懷孕期間，母體的荷爾蒙變化對孕婦及胎兒都會有影響。建議配合醫師診斷，孕期及生產後定期追蹤和治療。才能確保母嬰健康。

來源：懷雙胞胎孕程的注意事項

懷雙胞胎孕程的注意事項

一般來說，每個媽媽在懷孕的過程中都會有些不舒服。懷孕初期主要不適為噁心、嘔吐、疲倦等，而懷雙多胞胎的孕婦通常在懷孕早期人類絨毛膜激素值比懷單胞胎的孕婦高。噁心嘔吐、食慾下降等妊娠初期症狀可能比懷單胞胎媽媽反應更大，可能讓準媽咪更加不適；這時期最好少量多餐。避免高油脂及不易消化的食物，若嘔吐情形嚴重。可與醫師討論補充維生素六，必要時在醫師建議下服用止吐藥物改善。

懷孕後期隨著腹中兩個胎兒逐漸長大，胎兒的體積與重量壓迫媽媽體內器官。使準媽咪感到的不適可能有呼吸不順、容易疲累、吃不下東西行動困難等，然而這時期需

特別注意。身體活動要放慢輕柔，平時在身體狀況許可下做些放鬆和柔軟的運動。可讓自己舒服些，例如游泳是個相當適合孕婦的運動。因在水中孕婦可減輕身體重量的負荷，減緩孕期負重所造成的不適症狀。

孕期照護對懷雙胞胎的媽媽來說是特別重要的，由於雙胞胎對於子宮的空間壓力較大。使得懷雙胞胎的媽媽有較高的機率需要安胎，或者早產風險較高。生產週數最常在懷孕三十六到三十八週。所以，隨時觀察孕婦及胎兒情況。注意是否有生產的徵兆，如陣痛、落紅、破水等。可以避免過小週數的早產。此外，若能固定同一位產檢醫師。持續的追蹤與檢查，可使醫師對孕婦及胎兒們的狀況更加熟悉及了解。孕期照護也將更為周全。如發現高危險妊娠，亦可透過完整的產前檢查，早期預防懷孕過程可能發生的併發症，並且依妊娠情況選擇就近的「高危險妊娠孕產婦及新生兒照護品質中度級、重度級急救責任醫院」接受檢查及生產。

伴侶在懷孕過程中也扮演十分重要的角色，雙胞胎的媽媽有時因身體不適。包括骨盆帶疼痛，胸腔、腹腔受壓迫造成呼吸不順、腹脹、腰酸背痛等。而使行動不便，或可能煩惱未來兩個寶寶的照顧問題。而出現心情沮喪低落等情緒；此時，配偶就扮演很重要的角色。夫妻可互相分享及討論擔憂與快樂，一起計畫未來照顧寶寶們的事宜。陪伴參與定期產檢，了解太太和寶寶們的健康狀況。在這些過程中可以讓夫妻更了解彼此想法，使關係更加密切。一同迎接新成員們的到來。

來源：懷雙胞胎的孕婦體重該增加多少~

懷雙胞胎的孕婦體重該增加多少~

懷孕婦女在孕期的體重應增加多少這個問題一直是孕婦在懷孕初期想問的問題，要攝取多少營養才能養大腹中的胎兒，讓寶寶能有強壯的身體，足以適應出生後的環境也一直是孕婦關心的問題。孕婦的體重增加太多並不是一個好現象，因為可能導致孕期的後半段的妊娠併發症，例如糖尿病、高血壓或胎兒過重不利生產。

在正常狀況下胎兒在子宮內體重增加的速度或是胎兒的出生體重會受到下列因素影響

一 隔代的影響如孕婦若是出生時為低出生體重者可能有三十會出生低體重的胎兒；另外，胎兒的祖母的身材也會影響胎兒的出生體重，這樣的結果可能是基因造成，也有可能是環境因素所導致的。

二 種族與體質的因素：孕婦的生活型態、本身的體態身材，或是對碳水化合物的代謝等都有可能對胎兒的體重造成影響。

三 孕前的體重與妊娠中所增加的體重：過去的研究發現孕婦懷孕前或妊娠早期的體重、孕婦的體脂肪分佈、孕期的體重增加的速率等等，都會影響到胎兒出生時的身高

和體重。

所以正常的懷孕下若依照產科醫師的建議，有均衡的飲食。適度的運動和好品質的睡眠，一般而言只要孕婦的體重增加不要超過醫師的建議值。足月的胎兒體重都會在二千五百到三千五百公克。有研究報告發現若以妊娠二十四週為分界點計算，二十四週前若孕婦體重增加少於四十二公斤。則約有二倍的機會生出體重過輕的胎兒，也就是嬰兒和體重在一般足月嬰兒的十個百分位之下。即使在二十四週以後拼命的吃，想要做補償也是無濟於事。仍有一百八十八倍的機會會生出體重過輕的嬰兒。

此研究代表孕婦早期充足且均衡的營養對胎兒在子宮內的成長發育是很重要的。但要切記孕婦若吃太多，讓體重在孕期增加太多反而會有無法預期的併發症。所以孕婦在知道自己懷孕後與醫護團隊做攝食營養的諮詢是非常重要的。

懷雙胞胎的孕婦呢

上面所談的是單胞胎妊娠時孕婦該注意的理想體重增加速率，但懷雙胞胎時，該如何控制體重的增加速率，如何才能達到理想的體重

雙胞胎妊娠在美國約佔出出生嬰兒的二到三，台灣的發生率也是三左右。但在施行人工受孕的孕婦中，雙胞胎發生的比率則較高。可能與施行人工生殖時植入較多的胚胎有關，懷雙胞胎的早產比率比懷單胞胎高。根據美國的統計約有四十七到五十的雙胞胎是在三十七周以前出生的。雙胞胎的嬰兒出生體重平均比單胞胎嬰兒少約八百公克以單一胎兒計，所以雙胞胎的出生體重若能達到二千五百公克已經算很成熟了。

有不少的雙胞胎，兩個胎兒的出生體重是不相稱的。產科醫師在產檢時若發現一個的體重大於二千五百公克，大部分就會認為胎兒已成熟。除非是遇到例外的情況，如同卵雙胞胎有輸血症候群者--。兩個胎兒的體重可能會差五百公克以上，而且大的比小的存活率差。總之，胎兒太大不一定代表出生後愈強壯。腹中的胎兒太大，對於孕婦是一個很大的負擔。不只肚子會大到壓迫心臟，孕婦本身心肺功能的負擔也會加重。

體重該增加多少呢

在台灣平常會強調以吃來補身體，婦女懷孕後，最常想到的是吃什麼才可以讓胎兒長得強壯。所以懷孕以後，周遭的親朋好友會鼓勵孕婦多吃營養的食物，因為一人吃兩人補的觀念，結果都補到孕婦的身上。懷雙胞胎以後要怎麼吃的問題更大，在台灣尚缺少有系統的研究。根據美國醫學研究院，十在一千九百九十年的建議，懷雙胞胎到足月一般在三十六到三十七週左右，體重約增加十六到二十公斤三十五到四十五磅。但是這一建議並未考慮到孕前婦女的體質比，。有專家建議，孕前體重過輕的婦女可增加二十三到二十八公斤五十到六十二磅，若孕前

體重過重者，可考慮體重增加十三到十七公斤二十九到三十八磅即可。

以上的建議體重增加是以整個孕期而言，但以整個孕期長達九個月，應如何控制和調整體重的增加速率，我們大概可分為二十週以前、二十至二十八週之間和二十八週以後三個階段。更重要的是要考慮到孕婦本身孕前的身高與體重的關係，也就是體質比。以下將孕婦的孕前狀況區分為體重過輕、體重正常、體重過重與肥胖四個等級，也就是我們常用的以體質比分為四等級來區分，上面所講二十週以前、二十到二十八週和二十八週後至出生為止的孕婦體重增加情形列表，給各位懷雙胞胎的孕婦們當參考。

從上述表格中，可以發現孕前體重較輕者可以在妊娠中比孕前屬於過重或是肥胖者增加較多的體重。各位孕婦可以自行控制飲食，均衡的營養攝取。比一般民間所倡導的一人吃兩人補或三人補更好。在妊娠期間適度的運動也是必需的，婦女若懷雙胞胎時，可以多收集資料並整理好，在產前檢查或到醫院、診所做諮詢時和醫師做討論。聽取醫師或衛教師的建議，將孕期的體重增加速率控制在建議的範圍內。如此下去，懷雙胞胎將不再是那麼可怕的事，孕婦可能可以讓整個孕期過得順利。

結 論

最後，要特別提醒的是，產後記得在坐月子的一個月至一個半月的時間裡把體重減下來。在英國近幾年來的研究建議，坐完月子時最佳的體重是孕前體質比一百一十以內最為適當。產後要注意的是適度的運動、均衡的營養和讓產道或骨盆充分的復原。在這個時期蔬菜水果與維生素的攝取，比在台灣強調的進補與調理身體更為重要，尤其是減少便秘的發生，更能幫助骨盆器官的復原。產後鬆垮的肚皮只能靠適度的運動讓它復原；其他的方法如過度的強調進補、食療或是藥膳的調理等，對於產後健康而言不見得有助益；更可能造成產後肥胖的問題。

來源：成為長輩和伴侶間的溝通橋樑

成為長輩和伴侶間的溝通橋樑

時代在變，育兒觀念也不斷進化更新。新時代爸媽有自己的教養主張，育兒路上很怕遇到和長輩觀念不同。溝通不良，使彼此心生芥蒂。以下四項技巧，有助爸爸成為伴侶與長輩間的溝通橋樑。

技巧一

孩子的教養責任應由爸媽負責

小寶寶的加入為家庭帶來喜悅與活力，家人也會想要出手幫忙照顧，但這些密集的關愛也可能帶來混亂。新手爸媽要有了解，知道自己才是孩子的主要照顧者，可溫和且堅定地向家人傳達自己的主見。遇到坐汽座、趴睡等危

險性高的狀況時，夫妻必須堅持原則，但其他無傷大雅的決定，也可以接受他人的建議。

技巧二

理性聆聽、審慎考量長輩意見

當長輩提出五花八門的育兒建議時，爸媽可以用開放且審慎的態度面對。不需要立刻否定長輩建議，可以先聆聽並感謝他們的關心。向家人表示自己會審慎考量建議，避免直接拒絕。令對方感到挫敗。

技巧三

善用有力人士來溝通長輩堅持的觀點

長輩有時會有固有的觀點，例如小孩要穿多一點才不會感冒、小寶寶可以看卡通節目等，此時親戚朋友、醫師或專家，都是可以運用的「有力人士」。爸爸可以說有問過醫師，或是比較有經驗的朋友。例如：「醫師上次說，寶寶沒有那麼怕冷。穿太多長痱子更不好」、「某某老師說，小孩太早接觸三產品。會影響視力或導致近視度數暴增」。

技巧四

要當關係潤滑劑而非傳聲筒

來自不同的家庭環境，生活習慣與溝通方式難免有所差異。當伴侶與長輩出現意見不一致的時候，爸爸應該適時站出來當起潤滑劑。有些情緒化的內容建議由你吸收、消化，避免像是傳聲筒。把負面話語原封不動地轉述給伴侶或家人。另外，也建議先生和太太各自與自己的家人溝通，避免產生誤會。

來源：我想要離乳該如何做？

我想要離乳該如何做？

準備離乳的媽媽，通常對離乳此事有複雜的情感。您需要藉由與別人討論來幫助您釐清自己的想法，為什麼想離乳？週遭的人對您要離乳這件事有什麼想法？是否有人勉強您呢？

您對離乳的感覺關係著離乳如何進行，若您的感覺是焦慮及罪惡感的，這可能使孩子不安而更想要頻繁的吸奶。如果您對離乳的決定是有自信的，能藉由其他方法滿足孩子的需求，孩子的離乳過程會較少困難。有些媽媽相信離乳將使寶寶較少對媽媽的依賴或減少夜間吃奶次數，這樣的期待是不實際的。您必須知道，在離乳這事件的改變下。寶寶的需求通常會暫時性增加。

思考寶寶對母乳的需求及母乳以外的替代方法。必須注意的是，較大的嬰幼兒哺乳過程對其情緒與身體親近的安撫可能比提供乳汁來得重要。有強烈吸吮需求而常餵

奶的寶寶，在離乳後提供他另一個安撫的管道可能會使孩子的離乳過程抗拒較少。

您可以先觀察並了解孩子可能準備好要離乳的表徵：

一至少一歲以上；

二逐漸顯得對吃奶較無興趣；

三進食多種食物；

四和媽媽的關係穩定；

五接受哺乳之外的他種安撫方式；

六可以接受在某些時間或地方不吃奶；

七有時可以不吃奶就睡著；

八當稍鼓勵他不要吃奶時，沒有明顯不安；

九提供選擇時，寧可和你玩、看書或做別的事，而非吃奶。

您可以採漸進性地鼓勵離乳

一不主動給、也不拒絕；

二以替代、分散注意力；

三健康的食物和飲料；

四說故事和唸故事書；

五讓孩子參與日常家務事；

六準備好玩的活動；

七媽媽提供完整的注意力和關心；

八邀請其他小朋友來玩；

九多外出、或多留在家裡；

十以別種方式撫觸小孩；

十一延遲哺乳的時間；

十二和孩子一起計劃；

十三讓父親與其他家人參與；

十四站著、不要坐下來；

十五 改變常規；

十六 縮短每次哺乳時間；

十七 限制哺乳的時間和地點；

十八 不要勉強。

若您仍決定離乳，您可以嘗試這麼做

***一歲以下的寶寶：**

若寶寶不接受媽媽親自以奶瓶餵食，可以請父親或其他家人協助較能成功。可能的話，讓寶寶有數天甚至數星期的時間來適應，採漸進式的方式以奶瓶餵食來替代哺餵母乳。媽媽本身仍應擠出母乳以減輕乳房腫脹，需衛教媽媽擠奶時只需擠到自身覺得舒服即可，勿將乳房排空。慢慢的乳汁分泌即會減少。

***一歲以上或更大的孩子：**

這年紀的孩子已添加副食品甚至已開始吃固體食物，此時可以讓孩子學習以杯子、吸管、湯匙來餵食。您需注意不要主動的提供乳房餵奶，孩子要求時才給，先吃副食品，孩子有要求再餵母乳。副食品進食部分，父親與其他家人的角色非常重要，鼓勵爸爸與其他家人和孩子一起進食，也許這時他們能享受不一樣的親子時光。若孩子沒有吃母乳就不肯入睡，您可以全家開著車出去，亦能幫助孩子更容易入睡。白天時，可以改變每天的常規分散孩子想吃母乳的注意力，如：帶孩子去拜訪朋友、百貨公司等。睡前除了開車之外，也可以建立睡前一些儀式，如：講故事、按摩背部、唱歌等不同的方式協助孩子容易入睡。記得孩子離乳是他成長過程另一新的階段，媽媽在這過程中仍是非常重要的，此時孩子需要媽媽更多額外的愛來協助他渡過。

以下的徵狀可能表示離乳的過程太快或太早：

一 持續哭鬧不安，不願妥協接受任何替代品與交換條件

二 講話突然結巴

三 晚上醒來次數增加

四 變得十分黏人

五 產生分離焦慮

六 吃手或咬東西以前從未發生

七 身體不舒服的徵狀，可能會肚子痛或便秘

若寶寶有這些行為表現出現，您需要評估是否要減緩離

乳過程，或嘗試更多方式來安撫寶寶。

來源：我懷孕了嗎？--懷孕的生理徵象

我懷孕了嗎？--懷孕的生理徵象

懷孕常見的生理徵象，然而這些徵象是懷孕的「可能徵象」，並不能完全確認已經懷孕。

月經停止

生育年齡的婦女，月經週期正常的女性。在性行為後超過正常經期兩週，發現月經停止。可能是懷孕了。這是婦女最常注意到的症狀，但並不是月經沒有來就是懷孕；月經沒有來的原因。可能因為疾病、疲勞、壓力過大、工作忙碌、環境變化…等，造成月經停止的現象。倘若發現月經沒來情形，還是要經由醫師診斷。才能確定懷孕。

噁心或伴隨嘔吐

幾乎很多懷孕初期的孕婦會有頭暈、噁心及嘔吐的感覺，常發生在早晨起來時，又稱「晨吐」，也可能發生在一天中的其他時間。因荷爾蒙影響所致，症狀會因人而異；若是噁心、嘔吐的情形很嚴重就需要就醫治療，否則這些都是懷孕初期的正常現象；但也有些胃腸疾病、感染等情形造成婦女感到噁心、嘔吐。

乳房飽脹感、皮膚變化

因荷爾蒙刺激乳腺組織和腺泡、血管增生，導致懷孕婦女會有乳房飽脹或刺痛感。且敏感性增加，乳暈直徑變大、顏色變深。乳頭明顯突出，乳房皮下的靜脈明顯…等變化。倘有泌乳素過高或是患有腦下垂體腫瘤時，也會引起乳房的變化，因此乳房的飽脹感也不能作為確立懷孕的依據。懷孕後因黑色素刺激素增加，使孕婦皮膚顏色變深常見於乳頭、乳暈、腋下、脖子、腹部、外陰部、肛門等處，或是腹部中央出現黑線、臉頰出現褐斑孕斑，尤其懷孕後期更為明顯。

疲倦感

由於胚胎迅速生長快速消耗母體內葡萄糖，造成低血糖症狀，導致懷孕婦女常常會想睡覺，通常發生在懷孕的前三個月。然而，疲倦也可能是因為壓力、工作疲倦及疾病等因素所造成。

頻尿

因為懷孕使子宮變大，從骨盆腔上升至腹腔而造成膀胱角度的改變，因而造成頻尿。但泌尿道感染或是子宮肌瘤過大也會有頻尿的症狀。

要如何確認懷孕了呢確認懷孕有下列方式：

一、尿液檢測

一 可自行購買驗孕棒、驗孕試紙或就醫檢驗，適用在過生理期一到二週時，可馬上得知結果。只要驗孕棒試紙的品質沒有問題，準確度高達九成以上。

二 原理：因為懷孕後，尿液中的人類絨毛膜性腺激素（ HCG ）會升高，而驗孕試紙、驗孕棒、驗孕卡就是用來測出尿液中是否有超過一定量的人類絨毛膜性腺激素。

二、抽血驗孕

一 須經由醫生診視後開立檢驗單，抽血檢測。適用在受孕後十二天至十六天左右，數小時內得知結果。也可檢查是否有子宮外孕的可能。

二 原理：因為懷孕後血液中人類絨毛膜性腺激素（ HCG ）會升高，所以抽血可以了解是否懷孕。不過，通常在驗尿發現陽性。但超音波找不到胚胎，為了確認不是子宮外孕。才會以抽血方式再次確認懷孕的可能性；或是懷孕四週內，希望提早確認是否已經懷孕。也可透過抽血檢測來了解。

三、腹部超音波

一 須由醫生診斷，適用在受孕後二十一天左右妊娠第五到六週，可立即得知結果。

二 原理：利用聲波，藉由水及軟組織做為傳導介質。產生反射的影像來了解子宮內的情況，進而診斷是否已經懷孕。確認胚胎著床的位置。

四、陰道超音波

一 須經醫生診斷，適用受孕後十八至二十四天左右，可馬上得知結果。

二 原理：陰道超音波則是將探頭伸入陰道中，隔著子宮頸對子宮進行掃描。由於能夠更清楚看清子宮內的影像，所以。通常如果腹部超音波沒有看到胚胎，醫師可能會改以陰道超音波來做檢查。

來源：我有肝炎可以餵奶嗎？

我有肝炎可以餵奶嗎？

型肝炎仍可以哺乳，而且母乳中的抗體可以保護嬰兒。有時在急性期媽媽可能會因為生病及症狀明顯而無法哺乳，建議可以先將奶水擠出餵食嬰兒，直到症狀緩解再親餵。

型肝炎多半藉由針頭、血液及性傳染，少由乳汁傳染特別是媽媽在疾病的非活動期及無症狀，對嬰兒的影響性相

當地小；有研究建議媽媽在疾病的活動期可能需要先暫停哺乳，但仍要持續擠乳。

肝帶原母親的嬰兒，於出生後接受型肝炎免疫球蛋白之注射及常規的型肝炎疫苗注射，可以降低嬰兒感染型肝炎的機率。但臨床結果顯示，某些嬰兒即使有以上預防措施仍感染型肝炎，尤其是血中病毒量偏高的肝帶原母親，主要原因是子宮內與生產時的垂直感染。因此近日健保署通過，針對病毒量超過一定標準的肝帶原孕婦。在懷孕第二十八週時給付抗病毒藥物治療，多數研究建議的首選藥物是（商品名為。惠立妥），以降低子宮內與生產過程時的感染。如此可將肝傳給胎兒的風險降到最低。

孕期使用抗型肝炎抗病毒藥物，根據目前研究顯示，並不影響胎兒健康及其出生後的發展，至於產後持續服用抗病毒藥物（有些建議要持續一到三個月）是否可以哺乳？多數研究顯示由於這些抗病毒藥物分泌到乳汁中的濃度非常少量，似乎不至於對嬰兒產生不良影響，但目前仍缺乏長期的研究證據。根據美國國家醫學圖書館資料顯示，目前建議的型肝炎抗病毒藥物並非哺乳禁忌。而寶寶在出生後即接受型肝炎免疫球蛋白之注射及常規的型肝炎疫苗注射，哺乳並不會增加寶寶感染型肝炎的機率。所以產後還是可以餵母乳。

母乳餵養的好處遠遠大於極低的潛在感染風險。此外，由於世界衛生組織建議所有嬰兒在出生時都接種型肝炎疫苗，可降低經由哺餵母乳或母乳餵食傳染的危險性。

來源：我的14次產檢週記

我的十四次產檢週記

我的第一次產檢週記

懷孕初期：未滿十三週

建議週數：第八週

六到八週懷孕歷程

胎兒發育：一閃一閃的心跳越來越清晰！目前寶寶看起來像一顆豆子。

母體變化：八成孕媽咪有程度不同的孕吐困擾！建議改為少量多餐的飲食方式。

生活注意事項：恭喜媽咪加入孕育行列，孕期資訊請鎖定孕媽咪衛教手冊。

延伸閱讀：【健康九九】戒菸服務

延伸閱讀：第一次產檢衛教資訊

我的第二次產檢週記

懷孕初期：未滿十三週

建議週數：第十二週

九到十二週懷孕歷程

胎兒發育：五官、四肢、骨骼，重要器官逐步發展。

母體變化：體型外觀上開始產生變化，肚子漸漸隆起、乳暈色素變深、有頻尿現象。

生活注意事項：頻繁上廁所，有時會造成生活上的不便，但是不要因此而憋尿喔！

延伸閱讀：【心理健康司】愛丁堡產後憂鬱量表

延伸閱讀：第二次產檢衛教資訊

我的第三次產檢週記

懷孕初期：十三週～未滿二十九週

建議週數：第十六週

十三到十六週懷孕歷程

胎兒發育：胎兒外型明顯可辨，一舉一動越來越多變化！

母體變化：肚子隆起明顯，可能會有陰道分泌物增加、腰痠背痛、小腿抽筋等困擾。

生活注意事項：陰道分泌物會增加，可穿比較清爽的衣服。如有量偏多、搔癢、異味等情形，請就醫檢查。

延伸閱讀：【保護服務司】一百一十三保護專線介紹

延伸閱讀：第三次產檢衛教資訊

我的第四次產檢週記

懷孕初期：十三週～未滿二十九週

建議週數：第二十週

十七到二十週懷孕歷程

胎兒發育：肺部開始發育，腦部快速發展。

母體變化：胎兒在肚子裡滾動，像有氣泡啵啵啵，是胎動！

生活注意事項：寶寶需要比較多的營養，家人陪著孕媽咪

一起吃得均衡與健康。心情愉快也很重要喔！

延伸閱讀：【健康九九

】戒菸服務

延伸閱讀：第四次產檢衛教資訊

我的第五次產檢週記

懷孕初期：十三週～未滿二十九週

建議週數：第二十四週

二十一到二十四週懷孕歷程

胎兒發育：胎兒開始練習呼吸動作，也聽得到聲音了！

母體變化：乳房脹痛、可能開始分泌乳汁。下肢浮腫與痠麻感變得明顯。

生活注意事項：寶寶聽得到聲音喔！家人請多跟寶寶說說話。

延伸閱讀：【心理健康司】愛丁堡產後憂鬱量表

延伸閱讀：第五次產檢衛教資訊

我的第六次產檢週記

懷孕初期：十三週～未滿二十九週

建議週數：第二十八週

二十五到二十八週懷孕歷程

胎兒發育：寶寶眼睛完全發育，會睜眼和閉眼。皮下脂肪逐漸加厚。

母體變化：肚子越來越大，子宮脹大向上推擠，這是腹脹，跟硬硬的子宮收縮不一樣喔。

生活注意事項：運動達標了嗎？家人陪伴一起進行適量運動，飯後散步也不錯。

延伸閱讀：【孕媽咪衛教手冊】難以預料的狀況題

延伸閱讀：第六次產檢衛教資訊

我的第七次產檢週記

懷孕初期：二十九週以上

建議週數：第三十週

二十九到三十週懷孕歷程

胎兒發育：胎兒手腳很有力，會在媽咪的肚子裡拳打腳踢，胎動變得頻繁！

母體變化：肚子變得沉重，走起路來有點像企鵝，因為雙腳打開走，身體會比較好平衡。

生活注意事項：如有靜脈曲張，要避免久站久坐。並適度運動，休息時抬腿。以減輕症狀。

延伸閱讀：【健康九九

】戒菸服務

延伸閱讀：第七次產檢衛教資訊

我的第八次產檢週記

懷孕初期：二十九週以上

建議週數：第三十二週

三十一到三十二週懷孕歷程

胎兒發育：胎兒快速成長，幾乎佔滿整個子宮！五官也更清晰。

母體變化：骨盆底的肌肉群負擔沉重，大笑、咳嗽時可能會漏尿！

生活注意事項：如果媽咪有漏尿的情況，可以多練骨盆底肌運動。

延伸閱讀：【心理健康司】愛丁堡產後憂鬱量表

延伸閱讀：第八次產檢衛教資訊

我的第九次產檢週記

懷孕初期：二十九週以上

建議週數：第三十四週

三十三到三十四週懷孕歷程

胎兒發育：大部分的寶寶胎頭已經朝下，不過，也有少數寶寶會到三十七週才固定。

母體變化：腹部沉重，骨盆、膀胱、臀部可能更不舒服，可透過托腹帶緩解痠痛。

生活注意事項：還在工作的媽咪，要準備和同事做好工作上的交接，快要準備休產假了。

延伸閱讀：【孕媽咪衛教手冊】生產準備中！產兆 & 生產總預習

延伸閱讀：第九次產檢衛教資訊

我的第十次產檢週記

懷孕初期：二十九週以上

建議週數：第三十六週

三十五到三十六週懷孕歷程

胎兒發育：胎毛逐漸消失，循環、呼吸、消化等器官發育成熟。

母體變化：更頻繁的宮縮會讓媽咪有點緊張，這是身體正在為生產做準備。

生活注意事項：家人協助事先規劃好從家中出發到醫院的交通方式、誰陪媽咪去待產等。

延伸閱讀：【健康九九

】戒菸服務

延伸閱讀：第十次產檢衛教資訊

我的第十一次產檢週記

懷孕初期：二十九週以上

建議週數：第三十七週

三十七週懷孕歷程

胎兒發育：三十七週之後就算是足月了！胎兒頭髮已相當濃密，指甲也長至指尖。

母體變化：胎頭下降到骨盆腔，之前反胃、呼吸困難的症狀可能會消失，不過依舊會覺得頻尿。

生活注意事項：寶寶隨時有可能出生，家人協助再次確認待產包已放在方便拿取的地方。

延伸閱讀：【心理健康司】愛丁堡產後憂鬱量表

延伸閱讀：第十一次產檢衛教資訊

我的第十二次產檢週記

懷孕初期：二十九週以上

建議週數：第三十八週

三十八週懷孕歷程

胎兒發育：皮膚光滑圓潤，顱骨堅硬，手指腳趾有指甲發育完成。

母體變化：懷孕進入最後倒數階段，媽咪在這週生產也是正常的喔。

生活注意事項：三十八週後隨時都可能會生產，所以與家人事先瞭解產兆非常重要！

延伸閱讀：【孕媽咪衛教手冊】產後挑戰：身心恢復 & 育兒生活

延伸閱讀：第十二次產檢衛教資訊

我的第十三次產檢週記

懷孕初期：二十九週以上

建議週數：第三十九週

三十九週懷孕歷程

胎兒發育：胎兒變大，子宮內的空間越來越小，胎動稍微減少。

母體變化：子宮佔滿整個骨盆腔，子宮頸及陰道變軟，陣痛、浮腫、靜脈曲張更明顯。

生活注意事項：家人也要做好陪產請假的準備囉。請隨時將手機帶在身邊。

延伸閱讀：【健康九九

】戒菸服務

延伸閱讀：第十三次產檢衛教資訊

我的第十四次產檢週記

懷孕初期：二十九週以上

建議週數：第四十週

四十週懷孕歷程

胎兒發育：胎兒的頭朝下，膝蓋緊挨著鼻子，大腿貼著身

體，準備要出來了。

母體變化：有些媽咪的乳頭會分泌濃稠的黃色乳汁，已經在為寶寶出生後的第一餐做準備了。

生活注意事項：把心情放輕鬆，多多留意生理變化，若超過四十週沒有產兆，醫師也會評估是否要催生。

來源：我該如何擠奶？

我該如何擠奶？

以手擠奶是最有效的擠乳方式，在擠奶前可以嘗試刺激噴乳反射，讓擠奶更容易。

一先徹底的洗手，準備好乾淨的容器。

二舒服的站或坐著，拿著容器靠近乳房。

三將大拇指放在乳頭上方二到三公分處的乳房上，食指在乳頭及乳暈下的乳房上對著大拇指，以其他的手指托住乳房。將大拇指及食指輕輕地往胸壁內壓，要避免壓太深，以免阻塞輸乳管。

四再以大拇指及食指相對，壓住乳頭及乳暈後方。反覆壓放，應該不痛，如果會痛的話，表示技巧不對。在一開始可能沒有奶水流出，但是在擠壓幾次後，奶水開始滴出。如果噴乳反射活躍的話，奶水會似泉水湧出。

五以相同方式擠壓乳暈兩側，確定奶水由乳房各部位被擠出。

六避免以手指摩擦皮膚，手指的動作應比較像滾動。避免擠壓乳頭本身，壓或拉乳頭不會擠出奶水，這就好像寶寶吸乳頭一樣。

七由一邊乳房開始擠到奶流變慢，然後擠另一邊。如此反覆數次，一次可能要花二十到三十分鐘。尤其是剛開始的時候。每個人擠乳所需時間不一定，隨著擠奶的技巧越熟練，奶水量就會越多。

來源：掌握黃金72小時，守護孩子「聽」與「說」

掌握黃金七十二小時，守護孩子「聽」與「說」

你知道嗎？若錯過新生兒聽力篩檢的黃金時機，可能會延誤寶寶的語言與認知發展。讓我們一起瞭解，新手爸媽該如何在寶寶出生後的七十二小時內，把握先機，給孩子一個會聽、會說的未來！

新生兒先天性聽力損失發生率

一般家庭的父母可能不會認為家中寶寶會出現聽力問題，其實先天性聽力損失並不罕見。根據衛生福利部統計

，每一千位新生兒中，約有一到二位患有先天性雙側中、重度聽力損失，其中部分嬰兒外觀與一般寶寶完全無異。

而且約有一半以上的聽力損失兒並沒有任何家族史或明顯高風險因子（例如：家族有聽力問題、早產、重度黃疸、住過加護病房、或有胎內感染等），這也是為什麼全面性的新生兒聽力篩檢如此重要。

聽力發展與語言學習密不可分，如果能在出生後及早發現異常。介入治療、配戴助聽裝置、安排語言復健訓練，對未來的語言發展、社交能力與學習力。都有極大的影響。

出生三個月內政府有補助新生兒聽力篩檢

為了早期發現、早期介入，衛生福利部國民健康署從一百零一年三月十五日起，提供未滿三個月「新生兒聽力篩檢服務」，能讓每位寶寶在出生後七十二小時內完成第一次聽力篩檢。這個篩檢通常都是在醫院內進行，大部分寶寶出生的醫療院所都會主動幫新生兒安排檢查，不需要再到別的醫院做檢查。

家長也可以主動詢問即將生產的醫療院所是否有進行此項篩檢。

主要篩檢方式是以自動聽性腦幹反應檢查（）：透過電極貼片監測寶寶對聲音的神經反應。

檢查過程不會疼痛，而且快速，即使寶寶在睡眠的狀態中也能進行。如果篩檢結果未通過，也不代表寶寶一定有聽力損失，需要再進一步追蹤與複檢。

若聽力篩檢未通過，該怎麼辦？

有些寶寶在第一次篩檢未通過，請爸媽別太緊張，可能只是當下耳朵內還有胎脂、羊水殘留，或是環境過於吵雜、寶寶不夠安靜等因素影響。

所以，首次篩檢未過，醫院會安排在出院前（三十六到六十小時）進行第二次篩檢。

若第二次篩檢仍未通過：

建議於三個月內完成聽力診斷評估，由專門的耳鼻喉科醫師做進一步檢查。

若確診聽力損失，應於六個月內開始介入治療，例如配戴助聽器、安排語言治療等。

先天性聽力障礙的寶寶，如透過新生兒聽力篩檢及早發現。並在六個月前接受治療，未來在語言、認知及溝通技巧等方面的發展。幾乎可以達到正常小孩的表現。

善用「兒童健康手冊」的嬰幼兒聽力簡易居家行為量表

新生兒聽力篩檢通過，並不代表孩子未來不會有聽力問題，除了醫療院所的篩檢很重要外，家長的日常觀察也不可忽略。因為寶寶的發展節奏不同，有些聽力問題可能在出生時沒被發現，所以在日常生活中也應該持續留意觀察。

在《兒童健康手冊》中，提供一張非常實用的工具：「嬰幼兒聽力簡易居家行為量表」。這張表格是根據寶寶的月齡所設計，可做為家長觀察寶寶聽力的依據。

例如：出生後二個月內，聽到巨大的聲響會使孩子有驚嚇的反應；三個月至六個月大哭鬧時。聽見媽媽的聲音會安靜下來；七至十二個月大時，當你從背後叫他。他會轉向你或者發出咿咿唔唔的聲音。

爸媽可以定期依據這張表來做觀察，如果發現寶寶對聲音反應遲鈍。或是每個階段答案為「否」多於三項以上，應尋求耳鼻喉科醫師檢查是否有聽力問題。避免錯失學習語言的先機。

聽見，是寶寶學會說話的第一步。別讓寶寶錯過黃金期，請於出生七十二小時內完成聽力篩檢，讓寶寶開啟「聽」的旅程，聽見這個世界的美好聲音。

來源：排卵日期要怎麼計算？

排卵日期要怎麼計算？

推算排卵日期的五種方法

一 月經推算排卵期：

女性的月經週期月經的第一天開始直到下一次月經來臨間的天數因人而異，約在二十五天到三十五天之間。排卵日通常是月經來潮前十四天。

二 量測基礎體溫：

正常情況下，女性在排卵前一天會發現低溫期約下降一到二。排卵後由於黃體素的分泌，使體溫在排卵後會快速攀升到高溫期約升高三到五。並持續到月經到來前一到二天，如能堅持每天清晨測量基礎體溫。就能根據體溫變化，尋找出自己的排卵日期。

三 子宮頸粘液測試：

在排卵期期間，會感覺到分泌物量增多。分泌物呈蛋清水樣透明清亮，拉絲性高。一般持續二到三天，是女性易受孕的時間。

四 排卵試紙：

月經週期沒有規律可以使用排卵測試器。測量尿液中促黃體生成激素的濃度來預測排卵期，如果檢測到激素的濃度升高，就預示著接下來的二十四到四十八小時將要開始排卵了。

五 陰道超音波：

在每月月經週期後第十二天開始用超音波連續觀測排卵，隔天一次每兩天一次直至卵子排出，這樣便可以準確的確定是何時排卵及卵泡的發育情況。

來源：採用適合的生產方式

採用適合的生產方式

生產方式除了在醫療院所進行自然產、剖腹產，還有其他生產方式，可依孕婦健康狀況，在產檢時與醫師或助產師討論安全且是伴侶雙方想要的生產計畫。

母體正常的情況下，通常會選擇自然產。如有剖腹產適應症，例如：胎位不正、前胎剖腹、媽媽有重大疾病、產程遲滯等。與醫師討論後決定是否選擇剖腹產。建議規劃合宜的生產方式，不選擇無醫療適應症之剖腹生產。

同時生產前可參考醫療機構生產計畫書，討論出你們覺得安全、舒適、愉快的生產方式。

來源：接種疫苗後可能發生的反應與處理

接種疫苗後可能發生的反應與處理

疫苗接種部位及途徑

幼兒預防接種為盡量避開有神經及血管的部位，一般選擇於大腿前外側或上臂三角肌接種，針對二歲以下嬰幼兒，建議接種部位為大腿前外側。而活性減毒的水痘、日本腦炎及麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗採皮下注射，其餘不活化疫苗則採肌肉注射。另卡介苗應接種在左上臂三角肌中點，採皮內注射。

接種疫苗後可能發生的反應與處理

接種疫苗後可能發生的局部紅腫、疼痛，通常二到三天內會消失。至於發燒如係在該項疫苗所列可能時間發生，可使用醫師給的退燒藥。但如高燒不退或有其他特殊症狀，則可能染患其他疾病。應儘速就醫診察，找出真正的病因。如本身有熱性痙攣的病史，在接種疫苗後。可能會增加出現熱性痙攣之機會，除需注意體溫變化外。亦請於接種前告訴醫師，俾利其評估退燒藥之服用時機。

各項疫苗接種後的反應及處理方法可參考兒童健康手冊內說明，若仍有預防接種相關問題，可撥打各地衛生局

預防接種專線洽詢。

疫苗種類、反應及處理方法：

卡介苗：

注射後接種部位大多有紅色小結節，約三週後會開始腫脹。約六週開始形成膿瘍或潰爛，此時可以乾紗布覆蓋接種部位並以膠帶固定。若紗布潮濕或有分泌物沾黏時應更換，約經四個月開始結痂。

如果接種部位出現下列情形，請提前回診由醫師為嬰幼兒作適當的評估與處置：一接種五個月後，接種部位膿瘍未自動癒合結痂、二同側腋窩淋巴腺腫大。

型肝炎疫苗：一般少有特別反應。

白喉破傷風非細胞性百日咳、b型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗：

接種後一到三天可能發生注射部位紅腫、酸痛，偶爾有哭鬧不安、疲倦、食慾不振或嘔吐等症狀，通常二到三天後會恢復。

不停啼哭或發高燒之症狀較為少見；而嚴重不良反應如嚴重過敏、昏睡或痙攣則極為罕見。

如接種部位紅腫持續擴大、接種後持續高燒超過四十八小時或發生嚴重過敏反應及嚴重不適症狀，應儘速請醫師處理。

水痘疫苗：局部腫痛，少數注射後五到二十六天於注射部位或身上出現類似水痘的水泡。

麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗：在接種後五到十二天，偶有疹子、咳嗽、鼻炎或發燒等症狀。

活性減毒日本腦炎疫苗：一般可能有注射部位疼痛、紅、腫；少數於接種後三到七天出現輕微或中度全身無力、肌痛、易怒、食慾不振、發燒、頭痛等症狀，會在數天內恢復。至於嚴重過敏、昏睡或痙攣等症狀則極為罕見。如上述症狀持續未獲改善，應儘速就醫處理。

不活化日本腦炎疫苗：一般少有特別反應。偶會出現注射部位疼痛，輕微發燒、腹瀉、類流感症狀等症狀。

白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗：

接種部位常有紅腫、疼痛現象，通常都是短暫的，會在數天內恢復，請勿揉、抓注射部位。

如接種部位紅腫、硬塊不退、發生膿瘍或持續發燒，請儘速就醫。

偶爾有食慾不振、嘔吐、輕微下痢、腸胃不適等症狀。

流感疫苗：局部腫痛，偶有發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹及紅疹等全身性輕微反應，一般會在發生後一到二天內自然恢復。

十三價結合型肺炎鏈球菌疫苗：

接種後少數人可能發生注射部位疼痛、紅腫的反應，一般於接種二天內恢復。

發燒、倦怠等嚴重副作用極少發生，接種後如有持續發燒、嚴重過敏反應。如呼吸困難、氣喘、眩昏、心跳加速等不適症狀，應儘速就醫。請醫師做進一步的判斷與處理。

型肝炎疫苗：一般少有特別反應，少數為接種部位紅腫痛。全身性反應不常見。

來源：控糖、控血壓不容易！輕鬆掌握5招飲食原則，遠離妊娠合併症風險

控糖、控血壓不容易！輕鬆掌握五招飲食原則，遠離妊娠合併症風險

因懷孕而產生的合併症，常見的有妊娠高血壓、妊娠糖尿病等。這類孕婦除了遵循醫囑，更要注意的是日常飲食。避開高鹽、高糖食物，有助於穩定孕媽咪自身的健康狀態。也能確保胎兒的成長不受影響。

常見妊娠合併症影響母嬰健康

所謂的妊娠合併症，指的是孕前沒有這項疾病，是因為懷孕才被診斷出。常見的合併症有妊娠高血壓及妊娠糖尿病，近年來根據統計，這類族群有越來越多的趨勢。

每次產檢都會進行血壓測量，在孕期如果發現血壓的收縮壓高於一百四十。或舒張壓高於九十，抑或是妊娠後期之血壓比早期收縮壓升高三十或舒張壓升高十五。即可被診斷為「妊娠高血壓」，由於血管收縮的關係。會影響到母體提供胎兒的營養多寡，營養不夠。胎兒的出生體重就會降低，也會造成早產。倘若媽媽的血壓控制不佳，可能演變成子癰前症或是子癰症，不可不慎。

多數的孕媽咪都是在孕期二十四至二十八週，進行「葡萄糖耐量試驗」後，才發現自己患有「妊娠糖尿病」。孕媽咪過高的血糖會透過胎盤影響胎兒，造成像是胎兒過大、肩難產、新生兒低血糖等風險，孕媽咪則是會提高剖腹產的機率，產後也可能演變成典型糖尿病。

掌握五招飲食原則，少糖少鹽是關鍵！

患有妊娠糖尿病、妊娠高血壓的孕媽咪，務必有效的控制血糖及血壓數值。才不會讓症狀變得更加嚴重，甚至影

響到產後。而最好的方法，就是從「飲食」下手！以下提供簡單五招，只要吃得對、吃得巧，就能維持母嬰的健康。

一 避免攝取加工食品的：

均衡攝取全穀雜糧類、水果類、乳品類、油脂與堅果種子類，和豆魚蛋肉類。並多選擇高纖維食物，像是蔬菜、燕麥、糙米等。避免加工或醃製食物，如罐頭醬菜、香腸等。以防吃進過多的鈉，也要減少使用重口味醬料的。

二 優質澱粉不可少：

媽咪不能因為擔心體重增加快，而不吃任何澱粉類食物。孕期還是需要碳水化合物的幫助，以供應胎兒發育所需。可以選擇富含纖維的全穀雜糧類，像是地瓜、南瓜等，來取代麵包、麵條等精緻澱粉，有助於血糖的穩定。

三 烹煮方式要改變：

為了避免無形中攝取到太多的糖分及鹽分，在烹調食物時。最好以清蒸、水煮、涼拌為主，並選擇堅果、橄欖油作為主要的油脂來源。降低豬油等飽和脂肪酸的攝取。

四 高纖飲食控糖、控血壓：

足夠的纖維質能維持孕婦腸道的健康，又能提供飽足感，建議每餐至少攝取一個拳頭大的蔬菜量，且含有兩種以上蔬菜。高血壓的孕媽咪可搭配高鈣、高鉀、高鎂的食物，如：芹菜、菠菜、香菇、空心菜、哈密瓜、香瓜、香蕉等。同時也要補充足夠的蛋白質，如優格、雞肉、魚肉等。以供應因蛋白尿流失的蛋白質。

五 每日水分要喝夠：

建議孕婦每日要喝足二千毫升的水分，確保攝取的水分，促進血液循環，避免水腫及血壓的升高。

即便是一般孕媽咪，孕期飲食都應避免酒精、高濃度咖啡因、人工添加物（罐頭、醃漬物等）、空熱量食物。如甜點、巧克力、碳酸飲料等，建議多攝取富含蛋白質（雞肉、魚肉、豆製品）、葉酸（深綠色蔬菜、柑橘類水果）及鐵質（紅肉、深綠葉蔬菜）的食物種類。為自己儲存有效的營養價值，提供寶寶最優質的成長養分！

來源：提醒家長預防接種注意事項

提醒家長預防接種注意事項

一、請依所列疫苗種類、時程按時接種，以達接種效益。接種時請務必攜帶兒童健康手冊及健保卡，以利查核登錄，接種紀錄應妥善永久保存，以備國小新生入學、出國留學、工作、移民及各項健康紀錄檢查之需。

二、媽媽為型肝炎表面抗原抗原陽性者的嬰兒，應於出生

後儘速注射一劑型肝炎免疫球蛋白及型肝炎疫苗，越早越好，不要晚於二十四小時。應在完成第三劑型肝炎疫苗後，年滿十二個月大時進行型肝炎表面抗原（ HBSAg ）及型肝炎表面抗體（ HBsAb ）等檢測。針對檢測後之相關建議，請參閱兒童健康手冊內幼兒型肝炎追蹤檢查項目及紀錄表。

三、卡介苗接種相關注意事項：

一 疑似結核病人及疑似被結核菌感染者，勿直接接種卡介苗。

二 發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。

三 麻疹及水痘感染，宜待復原期六週後再接種。

四 請父母確認父母雙方家人沒有疑似先天性免疫不全疾病之家族史，例如幼年因嚴重感染死亡。

五 母親為人類免疫缺乏病毒愛滋病毒感染，其嬰幼兒應待追蹤至排除感染再接種卡介苗。

六 提早接種的嬰兒，體重應達二千五百公克以上。

七 接種後可能的不良反應：常見但不嚴重的不良反應：局部膿瘍、淋巴結炎等。

不常見但嚴重的不良反應：骨炎骨髓炎、瀰漫性卡介苗感染等發生於嚴重先天性免疫缺損的嬰幼兒。

八 骨炎骨髓炎通常在施打卡介苗後數月至一年多後發生症狀，四肢骨受侵犯為主，可能導致局部腫脹、疼痛、跛行。懷疑時請尋求兒童感染科醫師診治。

九 嬰幼兒若有結核病接觸史，請先前往地方衛生主管機關或兒科進行潛伏結核感染評估與治療。

十 請盡量不要讓寶寶接觸可能的結核病患者如避免咳嗽中的親友來訪或照顧寶寶等。

四、下列不適用活性減毒日本腦炎疫苗的幼兒，可由醫療院所協助向轄區衛生所申請不活化疫苗完成接種：一 對本疫苗之任何成分曾有嚴重過敏反應者。二 先天或後天免疫不全者，包括接受化學治療、使用十四天高劑量全身性皮質類固醇。三 感染人類免疫缺乏病毒，不論有無症狀，其免疫功能有缺損者。

五、流感疫苗接種對象為年滿六個月以上兒童，除八歲（含）以下兒童首次接種需接種二劑外，曾接種者或九歲以上每年接種一劑即可。國小學童於校園集中接種，全面提供一劑公費流感疫苗；若為出生後首次接種之國小一、二年級學童。家長如有自覺需要，可於學校第一劑接種至少四週後。至醫療院所自費接種第二劑。

六、型肝炎公費疫苗接種對象為一百零六年一月以後出生年滿十二個月以上幼兒，一百零八年四月起，擴及十三歲以下之低收、中低收入戶學幼童，其他年齡層兒童未接種者可自費接種。

七、為預防可能感染風險，欲前往麻疹或德國麻疹流行地區之六個月以上未滿一歲嬰兒。可自費接種一劑麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗，但滿一歲後仍須按時程完成二劑公費疫苗接種。並與前一劑至少間隔四週（二十八天）。

八、若攜子女居住或往來於兩國之間，由於各國之預防接種項目與時程。可能因該國的疾病流行趨勢等相關因素而有些微不同，至當地應先瞭解該國之預防接種項目與時程。再依其規定接續完成各項預防接種；回國後其預防接種之接續，可攜帶原使用保存之預防接種紀錄至各地衛生所（室）及各縣市預防接種合約醫院診所完成補接種。

來源：新生兒-出生至十個月 你會關心的事

新生兒 -出生至十個月你會關心的事

出生至二個月您會關心的事

給爸媽的叮嚀

當心情不好或連續幾天覺得好累時，記得找家人或朋友幫忙。

在寶寶睡覺時，嘗試也跟著一起休息或睡覺，但須在不同床鋪。

如果寶寶有哥哥姊姊，可以讓他們用安全的方式幫點小忙，並且也請爸媽分一點時間與大孩子單獨相處。

如果有人提供給您不喜歡的建议，微笑稱謝就好。

記得照顧好自己，才有精力照顧寶寶。

別忘了做產後檢查。

如果要返回職場或校園，可以提前做規劃。

幫助寶寶換尿布後應洗手。

日光或白色燈光下仔細觀察寶寶皮膚及糞便的顏色比對嬰兒黃金九色卡。

從戶外或工作地返家，在摟抱、親吻或餵食小孩之前，務必更衣洗手。

如何和寶寶互動

可以開始每天玩與洗澡。

可以溫柔地摸寶寶的頭或輕輕地搖他讓他覺得舒服。

喝奶睡著時，可以拍他、換尿布，或脫掉一些衣服讓他醒來繼續喝。

讓寶寶和您在同一個房間，在自己的小床裡仰睡，嬰兒床的床欄間隔要小於六公分，且床欄應保持拉起。

寶寶是透過哭聲來表達情緒或是生理需求，而且寶寶在六到八週大時可能更會哭，寶寶哭時可以跟他說話、拍他、摸他、抱他，或輕輕搖他來安撫他。

給爸媽的叮嚀

有私人的時間。

與每個孩子有單獨相處的時間。

鼓勵另一半幫忙照顧寶寶。

如果有需要，選擇一個受過訓練且成熟負責的保母。

每天擁抱寶寶，對著寶寶唱歌與說話。

按摩寶寶使他容易入睡。

如何和寶寶互動

保持日常生活習慣，例如餵食、午睡和晚上睡覺的時間需固定。

午睡和晚上睡覺的時間，不管寶寶是醒著或是昏昏欲睡，都放在寶寶床上。

降低寶寶的床墊，使他坐起來也無法越過床欄，並應隨時保持床欄拉起。

瞭解寶寶的喜惡。

鼓勵寶寶主動玩耍，例如給寶寶鏡子或鮮豔的玩具，讓他們握著。

經常與寶寶說話。

四至十個月您會關心的事

給爸媽的叮嚀

需要有耐心地幫助寶寶學習獨自把食物吃完。

要堅持原則，禁止驚嚇或吆喝寶寶。

保持家裡安全，不要經常對寶寶說「不行」。只有當寶寶可能會受傷或傷害到別人的時候，才說「不行」。

一次給予一種新食物，不要強迫寶寶進食，可以選擇不同稠度或能引起寶寶興趣的食物給寶寶吃，建議每天準備三餐和二到三次的點心給寶寶食用。

汽車安全座椅應使用後向式並置於後座，嚴禁置於前座。

如有疑慮或有困難無法解決時，請尋找外界的協助。

常用清水或紗布幫寶寶清洗口腔。

無卡介苗接種禁忌者，請於出生滿五個月建議於出生滿五到八個月完成卡介苗接種。

如何和寶寶互動

為寶寶維持日常的生活習慣。

在睡前一個小時，可有溫馨的親子時間，也讓寶寶鎮定下來。

如果寶寶晚間醒來，在旁查看但不要把抱起。

注意寶寶的行為，這階段他會探索家裡和外面的世界。

當把玩具拿開，寶寶會哭是很正常的，請保持冷靜。

給予寶寶玩球、玩具磚塊等適合該年齡層之安全玩具。

不要讓寶寶看電視和電腦等螢幕。

利用簡單的詞句，告訴寶寶您想要他做什麼。

每天與寶寶說話和唱歌。

來源：新生兒-十個月至三歲 你會關心的事

新生兒 -十個月至三歲 你會關心的事

十個月至一歲半 您會關心的事

給爸媽的叮嚀

設置簡單且短的規則，不要體罰或對寶寶大吼大叫。

要有耐心面對寶寶凌亂飲食和玩耍，要記得您的寶寶正在學習。

確保寶寶所在的地方安全。

確保每個人都關心寶寶，給予健康的食物。避免吃甜食，使用同樣的規則。維持紀律。

幫助寶寶上廁所，在換尿布後和飯前應洗手。

當寶寶表現良好時，請適時的讚美他；當表現不好時，請利用簡短且清楚的句子告知他。

母親為型肝炎表面抗原陽性的寶寶，應於出生滿十二個月大時進行型肝炎表面抗原及型肝炎表面抗體等檢測。

如何和寶寶互動

讓寶寶學習選擇：給予兩個不錯的選擇，例如香蕉或蘋果，或兩本最喜歡的書，只能其中擇一。

在新環境、新朋友面前，寶寶可能會感到焦慮不安，這是正常的，請安慰他們。

讓寶寶有機會嘗試新食品，並允許他們用嘴巴或手觸摸食物，從而學習。

不要期望寶寶會分享，他可能嘗試獨立並維護自身的利益，這時期是正常的表現，不用擔心。

教導寶寶不傷害其他人或動物，例如不打人、不咬人。

教導寶寶如何用字彙，例如用手勢搭配言語。

一歲半至二歲您會關心的事

給爸媽的叮嚀

不要讓寶寶獨自在家裡或院子裡，尤其是馬路上更要注意。

當寶寶抗拒您或去結交新朋友，這很正常，不用擔心。

每天陪伴寶寶，傾聽寶寶說話，瞭解他們的想法，尊重寶寶的意願。

幫助寶寶表達自己的感情與想法，教導他們記得自己的名字。

讓您的寶寶遠離火爐、滾燙的液體、火柴、打火機等危險用品，防止燙傷。

開始教導寶寶上廁所。

如何和寶寶互動

建議未滿二歲幼兒不看螢幕，二歲以上兒童每天看螢幕不要超過一小時，有視覺異常症狀應看眼科醫師。看電視時需要在旁陪同並一起討論您所看到的，以引導寶寶思考。

寶寶可能會喜歡重複聽同樣的故事，可以停止一個故事讓他們學習動物的叫聲或是讓他們完成故事的其中一部分。

注意寶寶如何回應新見面的朋友或新環境的情況。

不要取笑寶寶的恐懼，或使別人驚嚇您的寶寶。

幫助寶寶與其他孩子玩耍，但不要期望他會共享，這是正常的行為。

二至三歲您會關心的事

給爸媽的叮嚀

所有的家庭成員需達成共識，有相同的家庭規則，並鼓勵孩子良好的行為。

要注意，您的父母可能有不同的教育方式。

每當孩子靠近水的地方，包括水桶、水池、上廁所，應當提高警覺，在旁注意。

教導孩子如何管理憤怒的情緒，如獨處冷靜後才說話。

安排時間參觀動物園、博物館和其他地方，幫助孩子學習。

確保家裡的窗戶不易被孩子推開或爬出，可在窗戶外安裝鐵架或讓孩子遠離窗邊。

讓孩子遠離火爐、滾燙的液體和浴室洗澡水、火柴、打火機等危險用品，防止燙傷。

如何和寶寶互動

進行戶外活動時，限制孩子在陽光下的時間，幫他戴上一頂帽子和擦防蚊液，做好保護措施。

孩子可能會要求讀同一本書一遍又一遍，養成孩子閱讀的習慣。

教導孩子在觸摸動物之前需要事先詢問。

到處都是讓孩子學習的機會，例如看到超級市場的水果招牌等都是教材。

讓孩子與其他幼兒一起玩耍，從而學習與他人相處。

來源：新生兒-早產兒居家照護錦囊(1)

新生兒-早產兒居家照護錦囊一

早產兒居家照護錦囊

新生兒無論出生時的體重為多少，只要未滿三十七週出生，即是早產兒。早產寶寶各時期的生長（身高、頭圍、體重）、認知與動作發展、副食品添加等等，在三歲之前都是依其矯正年齡進行評估。此外，政府與民間都有提供相關的資源與照顧支持，希望能有效分擔家長養育的負擔與辛勞，有需要的家屬請善加利用。早產兒的生長、腦神經發展、副食品添加須使用矯正年齡，但預防注射則依實際出生年齡。

早產兒常見合併症

早產兒較容易因器官未成熟產生相關問題，常見的合併症包括：腦室內出血、腦室周圍白質軟化症、視網膜病變、聽力受損、慢性肺部疾病、開放性動脈導管、壞死性腸炎等。

懷孕週數越短，早產兒發生上述問題的機會越大，因而極低出生體重早產兒的父母宜與主治醫師長期配合觀察追蹤。

早產兒的矯正年齡

不論寶寶何時出生，以「現在日期」減去「預產日期」，即可計算出

寶寶的「矯正年齡」。例如：寶寶出生日期為

五月一日，媽媽的預產日期是七月一日，則至八月一日時，寶寶的矯正年齡為一個月。

如何餵食早產兒

早產兒進食特性：由於生理發展仍未成熟，吸吮能力較足月兒弱，餵食過程中比較容易噎到，或有發紺現象（皮膚或是嘴唇顏色變青、變紫）。

早產兒最佳的餵食方式是「需求性餵食」，也就是依照寶寶的生理時鐘予以哺餵，並且按照寶寶能接受的餵食量適當給予。

餵食時應注意事項

早產兒回家後仍可能有胃食道逆流的問題，餵奶時可採取少量多餐分段餵食。並注意早產兒的膚色及唇色，若有發紺現象。必須先停止餵奶並輕拍背部，待膚色及唇色恢復正常後再繼續餵奶。

切勿平躺餵奶。

特殊狀況無法親餵母乳而需採瓶餵時，早產兒因為吸吮能力較弱，奶嘴的選擇應以質軟、圓洞為佳。合適的奶洞大小，以奶瓶倒立時，奶水可以一秒一滴流出者較為適合。

一般嗆奶處理，先清除口鼻的奶水，並以適度力量輕拍背部至呼吸平順、膚色紅潤即可繼續餵奶，或休息一下再繼續。

餵奶中，萬一寶寶咳嗽後呼吸暫停，可以輕搓寶寶背部或輕彈寶寶腳底，以刺激呼吸。

早產兒的睡眠照護

早產兒的住院期間較長，已習慣醫院的吵雜環境，且無晝夜分別，剛回家時會有一段適應期。

可藉由環境營造、夜間點小夜燈，及讓寶寶聽輕柔音樂等方式調整，待寶寶習慣後，再慢慢減少光線亮度及聲音。

居家照護很重要

「低（含極低）出生體重兒居家照護計畫」係國民健康署協同合約醫院針對出生體重超過一千五百公克~未達二千五百公克或大於等於二千五百公克之早產兒懷孕週數小於三十七週，並合併生理或社會特殊情況。經專業醫護人員評估有照護需求者，為其出院後提供延續性照護。協助返家後的照護及諮詢服務。

出院前醫院將為您及寶寶進行居家照護需求評估，依評估結果安排出院後的照護服務，包含居家、視訊及電話訪視面訪等追蹤訪視與衛教，不須額外收費。

對於出生體重小於等於一千五百公克的寶寶，建議至少於矯正年齡六個月、十二個月、十八個月、二十四個月時定期回診，醫院會安排「極低出生體重早產兒心智發展檢查」，以追蹤了解寶寶的心智發展之情形。

「低（含極低）出生體重兒居家照護」提供的服務如下：

一如您的寶寶「出生體重小於等於一千五百公克」，醫院會另外提醒您於矯正年齡六個月、十二個月、十八個月、二十四個月時定期回診進行「極低出生體重早產兒心智發展檢查」。

二照護需求評估：醫院於寶寶出院前會針對您及寶寶的基本資料、照護需求與衛教指導及社會經濟情形進行評估及收案分級。

三追蹤訪視服務：醫院在了解您及寶寶的狀況與照護需求後，提供您居家、視訊及電話訪視面訪等追蹤訪視服務。直到寶寶已無照護需求或達矯正年齡二歲。

四 全國有提供「低（含極低）出生體重兒居家照護」服務之醫院名單：四億五千九百三十一萬五千零五十八

低含極低出生體重兒居家照護計畫服務同意書

低含極低出生體重兒居家照護計畫服務同意書

一、服務說明

「低極低出生體重兒居家照護計畫」係國民健康署協同合約醫院

針對出生體重小於等於一千五百公克、大於一千五百公克未達二千五百公克或出生體重大於等於二千五百公克之早產兒（懷孕週數小於三十七週），有合併症或攜帶管路及儀器之新生兒出院後提供延續性照護服務，協助返家後的照護指導及諮詢服務。

出院前醫院將為您及寶寶進行居家照護需求評估，依評估結果安排出院後的照護服務，包含居家、視訊及電話訪視面訪等追蹤訪視與衛教，

及相關轉介服務，此服務不須額外付費。

二、接受服務意願

本人法定代理人同意接受醫院提供服務包含居家訪視、視訊、電話、面訪等衛教服務，服務內容經雙方充分討論後執行備註：

本人法定代理人拒絕接受居家照護服務。

理由：

三、服務轉介意願有跨院轉介需求時填寫

同意上述照護服務自年月日起由醫院持續提供。

資料蒐集知情同意：本人法定代理人同意在提供追蹤關懷服務

過程所蒐集之資料包括新生兒的身高、體重、頭圍、生長評估、發展評估及衛教內容等，將提供國民健康署分析及政策評估時使用，資料並進行妥善保密。

立書人：

法定代理人：關係：日期：年月日

解說人員簽名：日期：年月日

註：一若您的孩子出生於提供「低（含極低）出生體重而居

家照護」服務之醫院，會有醫護人員運用此份同意書徵詢您接受服務之意願。

二最新全國低（含極低）出生體重兒居家照計畫服務醫院資訊，可至國民健康署官網查詢（四億五千九百三十一萬五千零五十八）

預防感染

早產兒的免疫力較足月兒弱，較容易感染疾病。有少數早產兒因肺部尚未發育成熟，易發生慢性肺疾病。而有慢性肺疾病的寶寶，肺部感染的機率較一般嬰兒來得高。症狀也較嚴重，預防感染的方法包括：

限制訪客。

注意居家環境的通風。

照顧寶寶前後流水濕洗手。

家人感冒應戴上口罩。

家中禁菸，尤其是嬰兒返家仍需使用氧氣時，家中絕對禁止吸菸，並須隔絕助燃物。

寶寶週歲前避免帶孩子出入公共場所。

若照護上有疑慮，可善用早產兒基金會居家照護諮詢專線服務（二萬二千五百二十三到九百零八，週一至週五八百到一千七百），以減少不必要的醫院就診。

早產兒的行為照護

早產兒比足月兒容易躁動、不易安撫，可藉由做袋鼠式護理和嬰幼兒按摩來改善。（相關資訊請參考早產兒基金會網站）

更多早產兒照護技巧，可掃描下方「早產兒居家照護手冊」及「早產寶寶手札」，瀏覽相關衛教資訊。

來源：新生兒-早產兒居家照護錦囊(2)

新生兒-早產兒居家照護錦囊二

早產兒居家照護錦囊

巴掌仙子加油站

健保身分

寶寶出生後六十天內，尚未加保前，可用母親或父親的健保卡就診；在寶寶辦理出生登記後，則可跟隨父親或母親其中一方加入健保並申請健保卡。

三歲以下兒童醫療補助於二千零二年開辦，凡三歲以下參加全民健康保險之兒童，就醫時即自動減免健保部分負擔。

申辦重大傷病證明

依「全民健康保險保險對象免自行負擔費用辦法」第二條規定，保險對象經特約醫院、診所醫師診斷為重大傷病者。得檢具醫師開具之診斷證明書及重大傷病證明申請書、身分證明文件影本及相關佐證之病歷資料，向中央健康保險署各分區業務組提出申請。經審查符合資格者，發給重大傷病證明。

若早產兒出生後三個月內因神經、肌肉、骨骼、心臟、肺臟含支氣管等相關併發症住院者，由醫師逕行認定免申請證明；若早產兒出生滿三個月後，因前述併發症領有身心障礙等級中度以上之身心障礙手冊並經醫師認定符合重大傷病項目者，可依規定申請重大傷病證明。

早產兒基金會醫療費用補助

由基金會的合約醫院社工師評估，評估資料包括家庭經濟收入、家中工作人口數、早產兒之住院時間長短及醫療狀況等。若符合申請標準，由合約醫院的社工師協助申請。

早產兒基金會居家醫療器材費用補助

若早產兒出院返家後須租用醫療器材，如：血氧濃度監視器、製氧機、氧氣鋼瓶、抽痰機、呼吸器、靜脈輸注幫浦（含灌食幫浦）等，可透過合約醫院的社工師評估後協助申請。早產兒基金會將補助一半的醫療器材租借費用，期程以累計一年為限。

如特殊個案須半年以上長期使用者，由醫師註明原因，則可申請購置。儀器不需使用後，請家屬將儀器捐贈給個案住院醫院之社會服務室，提供給經濟困難的早產兒家庭使用。

來源：新生兒-給單親爸爸媽媽

新生兒 -給單親爸爸媽媽

給單親爸爸媽媽

現今社會越來越多孩子來自單親家庭，孩子面臨家庭結構的改變，常常無法適應；家長則因為必須身兼數職而分身乏術。為了照顧孩子的需求與感受，並協助您滿足自己的需要，以下建議提供您參考。

心理上的調適

保持樂觀的態度，看待每一天的驚喜和挑戰。

為了您的家庭著想，應好好照顧自己。均衡飲食，並得到足夠的休息、運動和睡眠。

留一個時間去做自己喜歡的事情，像是和朋友看電影、唱歌等社交活動。

不要對您的孩子感到內疚，很多家庭也有同樣遭遇，您不需要懲罰自己，或是用溺愛來彌補孩子。覺得自己有罪並不會讓生活美滿。

別鑽牛角尖，執著於不存在的問題。很多單親家庭的孩子都可以幸福快樂的長大，單親家庭不代表會遇到更多問題，或是需要解決更多的問題。

家庭生活的安排

尋求外界的協助，例如保母或是幼兒園，在您上班的時候，幫忙照顧孩子。

對孩子訂定一個合理的規則，並且堅決實行。當規則清楚且貫徹一致時，孩子會有安全感，並且萌生責任感。等到孩子能接受更大的責任時，您再擴充規則的內容，藉以培養孩子的責任感。

每天安排一些時間與孩子相處，例如聊天、玩耍、親子共讀、看功課或陪同看電視。

經常讚美您的孩子，表現出真正的愛，無條件的付出，積極支持您的孩子。

對外尋求支援

與親戚朋友保持良好關係，有時他們可以幫忙照顧孩子。

與其他家庭建立友誼，這些朋友會分享訊息。提供協助照顧孩子的管道或方法，也會介紹可靠的保母。或本身就願意幫忙帶孩子。

與可信賴的親人、朋友和兒科或家醫科醫師等專業人士討論孩子的行為、生長發展與家庭的關係等問題。

來源：新生兒-給多胞胎爸爸媽媽、男孩女孩都疼愛

新生兒 -給多胞胎爸爸媽媽、男孩女孩都疼愛

給多胞胎爸爸媽媽

對您和家人來說，幾個小寶貝一口氣同時加入家庭生活，這是何等熱鬧開心的事。但是在實際生活中，您勢必要面臨更多的育兒工作和挑戰。

您可能需要更大的住家空間或較大的車子，以便容納多位家庭成員。

每個孩子都是獨特的，提醒您的家人或朋友。別把孩子們當作「雙胞胎」或「三胞胎」，必須視他們為獨特的個體。您可以參照下列技巧：

叫孩子的時候，請呼喚孩子自己的名字，不要以類似「雙胞胎」之類的稱號叫孩子。

和每個孩子單獨交談並且用眼神接觸。

安排時間與每個孩子單獨相處，例如輪流與每個孩子一起去購物。

鼓勵每個孩子的獨特性，例如讓孩子有不同的穿著樣式。

女孩男孩都疼愛

隨著文化的變遷，性別平等的觀念漸趨普及。新時代的父母應以更開明的性平觀念，珍惜孩子的性別特質。讓孩子獲得適性的發展。

女性也可以傳宗接代

女性結婚後可繼續保有原來姓氏，無需再冠夫姓。

子女姓氏可由父母書面約定從父姓或母姓。

女性與男性具有平等的家產繼承權利，女兒和兒子繼承家產的權利也完全相同。

祭祀公業條例施行後，不分男女、不分姓氏，都可繼承派下權。

女性也是家族成員，傳承相同的血緣，在喪葬禮儀中，女性也可以擔任主奠者或負責捧斗（神主牌）、執幡、撐傘等儀式。

孩子未來的成就無關性別

「性別平等教育法」：讓女性與男性皆有平等受教育之權利。

「性別平等工作法」：保障女性工作權之平等，消除性別歧視。

女性勞動參與率、專業技術人員比率、管理及經理人員比率不斷提升；立法院立法委員及地方議員等民意代表中的女性席次比例，及女性公務人員進入決策階層比率都有提高。

女孩男孩都是寶

研究發現，生女兒的父母較長壽，可能與女兒較貼心，會照顧年邁、生病父母有關。

父母和孩子之間的親情連結與子女性別並無關聯，長期情感的親密互動才是真正讓父母感到「有女、有子萬事足」的關鍵。

為了幫助更多寶寶平安出生，不因為性別而被放棄，請您一起來守護！若您有發現違法檢測及選擇寶寶性別的事情，請向衛生福利部國民健康署胎兒性別篩選查

報窗口反映，電話：八百到八百七十-八百七十。

小提示

偏見停一停，女男一樣行。兩性都珍貴，平等才是對。讓我們珍惜生命，珍惜上天賜予我們的心肝寶貝。

來源：新生兒先天性代謝異常疾病篩檢

新生兒先天性代謝異常疾病篩檢

健康的孩子，是家庭的歡樂泉源，讓孩子儘早接受新生兒篩檢及相關健康檢查非常重要。透過新生兒篩檢，可以早期發現症狀不明顯的先天性代謝異常疾病。如果篩檢結果為疑陽性時，並不代表寶寶已確定罹患該項疾病，請及早接受進一步檢查。若篩檢結果為無異常時，也不代表不會發病或身體健康。若寶寶已確診時，在黃金治療期間提供妥善之診治，可以將疾病對身體或智能的損害降到最低。

如何接受新生兒先天性代謝異常疾病篩檢

由醫療院所對出生後四十八小時之新生兒採取少許腳後跟血液，寄交國民健康署指定之新生兒篩檢中心合約實驗室進行相關檢驗。

尚未知道篩檢結果前，請不要讓寶寶接觸茶丸（俗稱臭丸），也不可任意服用藥物。

篩檢結果為（疑似）陽性時，原採血院所或確認檢查醫院會在最短時間內協助您的寶寶接受進一步之確認檢查。篩檢的敏感度並非一百，主要是因為檢查結果會因疾病的型別（如某些疾病有晚發作型、非典型）與飲食攝取方式（如蛋白質攝取不足、特殊飲食）而有偽陰性的可能。

寶寶如果出現任何健康上的問題，請務必詢問您的兒科或家庭醫學科醫師。

篩檢結果可在採血後約二到四個星期得知若檢測結果無異常，不另行通知，請洽原採血院所瞭解。

新生兒先天性代謝異常疾病篩檢衛教單張二十一項疾病
外語五華語言版看這裡

葡萄糖 -六 -磷酸鹽 去氫酶 缺乏症 (-六 -缺乏症，俗稱蠶豆症)

約每一百個寶寶就會有三個，是台灣地區常見的遺傳性
疾病。

主因是寶寶體內紅血球之葡萄糖新陳代謝發生異常。

患有此病症的寶寶在接觸某些物質（氧化性藥物、蠶豆、樟腦丸、紫藥水、磺胺劑等），常容易發生急性溶血性貧血，而造成貧血、出現臉色蒼白、疲累、食慾差、嚴重的新生兒黃疸（眼白及皮膚均變黃）、茶色尿等症狀。當孩子出現以上症狀時，請務必儘快帶孩子至醫院就醫。

平日注意避免各類引起溶血的物質，萬一發生嚴重溶血時，施予合適治療，以減少後遺症的發生及影響身高、體重及智能等各方面發展。如未及時處理會導致核黃疸、智能障礙，甚至有生命危險。

如果您確知寶寶患有蠶豆症時，記得提醒醫護人員。並隨身攜帶「-六 -缺乏症注意事項卡」，早期確認寶寶健康狀況。避免接觸上述之致病因素，可減少對寶寶的傷害。

先天性甲狀腺低能症

約每三千個寶寶就有一個。

主因是寶寶體內缺乏甲狀腺荷爾蒙，影響腦神經及身體生長發育。剛出生的寶寶幾乎無異常症狀，通常在出生後二到三個月才會慢慢出現症狀。

如果及早發現，在出生後一到二個月內給予甲狀腺素治療，可使寶寶有正常的身體成長及智能發展。但若到了六個月以後才治療，大部分會變成智能障礙、生長發育遲緩、身材矮小。

政府提供補助的新生兒篩檢檢查還包括以下幾項：

先天性腎上腺增生症

中鏈醯輔酶去氫酶缺乏症

戊二酸血症第一型

苯酮尿症

異戊酸血症

甲基丙二酸血症

高胱胺酸尿症

楓漿尿症

半乳糖血症

瓜胺酸血症第型

瓜胺酸血症第型

三羥基三甲基戊二酸尿症

全羧化酶合成酶缺乏

丙酸血症

原發性肉鹼缺乏症

肉鹼棕櫚醯基轉移酶缺乏症第型

肉鹼棕櫚醯基轉移酶缺乏症第型

極長鏈醯輔酶去氫酶缺乏症

早發型戊二酸血症第型

如想更進一步的了解，可至國民健康署網站健康主題全人健康孕產婦健康生育健康與預防遺傳疾病防治項下查詢。

至於目前已提供而尚未納入衛生福利部認定的新生兒篩檢項目，因考量須釐清其臨床效力、或有無確診後續發展及有效的治療方法等。均需採先趨性研究進一步探究；亦應經過家長知情同意，並獲得父母簽署之書面同意書。方可進行篩檢。

新生兒篩檢血片剩餘檢體之德國麻疹抗體檢測

懷孕期間感染德國麻疹，病毒可透過胎盤垂直傳染給胎兒。造成先天性缺陷，如先天性耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足及先天性心臟病等缺陷的情形。稱為先天性德國麻疹症候群（，）。

為確實掌握病例的發生情形，避免病例將病毒傳播給他人而造成後續的感染。疾病管制署運用先天性代謝異常疾病篩檢血片剩餘的檢體，進行德國麻疹抗體檢測。如為陽性，將進行疫調、健康監視等防治措施。早期發現，早期治療，請按時接受健康檢查。

來源：新生兒常見皮膚症狀

新生兒常見皮膚症狀

生理性脫皮

正常新生兒會皮膚皺皺的，在一、二個月內會有脫屑脫皮現象。尤其手掌、腳掌脫皮狀況會更明顯。

原因：胎兒懷胎十月長時間在子宮的羊水內浸泡著，出生後空氣濕度大約為六十，對於新生兒皮膚濕度狀況轉換成十分乾燥的環境。便逐漸開始脫皮，大約在出生後一至兩週最明顯。待寶寶一~二個月大之後皮膚逐漸適應空氣濕度，脫皮狀況即改善。過期妊娠懷孕超過四十二週胎兒皮下脂肪會減少，所以皮膚會更乾而皺。出生後脫皮會更嚴重。

處理方式：

屬於正常的生理現象，一段時間後會自然恢復。也可適度添加無刺激性嬰兒保濕產品或凡士林減少乾裂更嚴重。避免過度清潔，選擇天然成分無刺激沐浴精或不使用清潔產品，單純溫水沐浴。

毒性紅斑

「毒性紅斑」一詞聽起來很嚇人，但實際上並不需任何治療。新生兒毒性紅斑在新生兒時期相當常見，而且會自然消退的紅斑，為不知原因的良性發炎反應。有可能在剛洗完澡或新生兒哭泣溫度較高時紅斑增加，溫度下降後紅斑就便消退。

特徵：好發於剛出生新生兒的臉部、近端肢體、軀幹以及臀部，但也可能分佈在身體各處，除了手掌與腳底外。一開始是紅斑，有的會長出白色或黃色的膿胞，可持續三到五天後自然消褪，對寶寶無不良影響。

處理方法：

一 保持舒適的環境溫度：剛出生的寶寶由於體溫調節系統尚未發育成熟，易受外在環境溫度影響而改變皮膚溫度。因此，維持周圍環境在室溫二十四到二十六很重要，夏天衣物以輕薄、吸汗為主，如遇天冷時可加穿衣服以免著涼。但應避免包得密不透風，不然一下小哭鬧就又滿身紅斑。

二 保持新生兒患部皮膚的乾爽，不要自行塗抹來路不明的藥品，以免造成次發性的皮膚感染。

嬰兒粟粒疹（）

因為新生兒汗腺不發達，在兩頰、額頭、腋下、頸部、胸前、或其他身體皺褶處會出現。出現如針尖大小的白色、紅色平滑小突起的小疹子，有些是像透明的小疹子。有時會有黃膿泡樣，稱為「粟粒疹」。

原因：主要是真皮上的角質產生囊狀滯留而形成的，千萬不可以擠，寶寶的脂腺和孔隙開始日益成熟，粟粒疹也隨著慢慢消失。

處理方式：

在出生後至兩三個月內常反覆出現，只要維持通風隔幾天會自動消退。天氣熱或穿太多時會更明顯，粟粒疹不會癢，對孩子也不會帶來不舒服，不需治療。無須擠壓和塗抹任何藥膏。

脂漏性皮膚炎

常見嬰兒期寶寶的頭皮、眉毛及耳後出現黃黃油油如鱗屑狀的皮疹，因為不會癢所以不會引起嬰兒不適。偶爾會出現在眼皮、外耳道，引起的原因是此階段的嬰兒皮脂分泌較旺盛，厚厚的黃油痂皮黏在頭皮上、頭髮上，學理上稱為「乳痂」()。好發在出生後兩週到五週，大約在出生後三個月到十二個月後，皮疹會自行緩解。

但是如皮脂分泌的累積，一層層的堆疊在寶寶的頭皮上。皮脂提供了黴菌喜歡的生長環境，黴菌滋長又加重了發炎反應。惡性循環的結果，造成大量的痂皮累積。必要時可與醫師討論用藥照護。

處理方式：

一一般無須特別處理，會隨著皮脂旺盛情形下降而慢慢改善，會自然消退。

二不用力摳洗，避免造成傷口，洗澡前先塗敷天然低刺激嬰兒油、凡士林後輕輕抓洗，但不建議使用麻油。

三嚴重者依醫師處方給予局部塗抹劑。

四鱗屑多，加強床單、衣物、帽子的更換清洗。

血管瘤

東方人說血管瘤是床母作記號，西方人說是天使的吻痕。

型式：

一鮭魚斑一部位常見後頭枕部或兩側的上眼瞼處，色鮮紅如鮭魚。哭時更明顯，有時還會隨著環境溫度而改變。顏色會漸漸褪去，一、兩歲後消失。即使未完全消退，後頭枕部區域長上頭髮後也會蓋住此斑。

二草莓血管瘤一草莓狀及其顏色的血管瘤，是為血管內皮細胞增生而成。此為新生兒血管增生的良性腫瘤，大部分出現在頭臉部女孩較常見。凸出鮮紅的痣，可能在出生幾週後才比較明顯。在一歲之前仍可能逐漸變大，約在

兩、三歲達到最高峰。在五六歲之前自動消退。若病灶過大、長在眼皮上、嘴唇邊、或其他部位會影響日常生活者，應請兒科醫師診治。

蒙古斑

蒙古斑好發於東方人的肩膀、臀部、手腕、腳踝及背部，通常是一出生時就會被發現，國內約有八十以上新生兒身上都能見到蒙古斑。斑塊呈現像瘀青的暗藍色，皮膚表面沒有其他變化。蒙古斑色素的顏色會隨著年紀增長而越來越淡，許多寶寶成長至一到二歲的時候，蒙古斑會自然消失，不需特別作治療。

來源：新生兒臍帶護理

新生兒臍帶護理

新生兒在生產剪斷臍帶後，還需要幾天至兩週的時間才會脫落。這段時間爸爸和媽媽需要細心地幫寶寶進行清潔，同時也要注意避免尿布與衣物對臍帶部位的壓迫與磨擦。防止發炎與感染，若清潔過程中發現有紅腫、滲液、惡臭的狀況或寶寶有發熱發燒的現象時。應與護理人員或醫師聯繫，確保寶寶的健康。

臍帶護理準備工具

大部分醫療院所於產後出院時會提供媽媽臍帶護理包，部分藥局也有販售，爸爸和媽媽也可以自行準備以下物品：

一百七十五濃度酒精消毒效果

二百九十五濃度酒精乾燥效果

三無菌小棉籤

四無菌紗布

五透氣膠帶

臍帶清潔時機

寶寶的臍帶需要保持清潔與乾燥，因此在沐浴後或是不慎沾到尿布的尿液與糞便時一定要進行清潔。更換尿布時也可以順便進行清潔，一般而言一天進行二到三次的清潔工作。爸爸和媽媽也可以視需求增加清潔的頻率，持續進行至臍帶脫落後一週。

臍帶護理步驟

一 為了防止感染，爸爸和媽媽請先將手仔細洗乾淨

二 以手指撐開寶寶的肚臍部位，也可以藉由手指輕拉寶寶的臍帶，露出臍帶與身體的交接處

三以棉花棒沾濕濃度七十五的酒精仔細由內而外進行擦拭，依序為臍帶根部、臍帶、周圍皮膚的清潔與消毒，爸爸和媽媽可以視情況重複此步驟直到清潔乾淨

四以棉花棒沾濕濃度九十五的酒精仔細由內而外進行擦拭，利用酒精達到乾燥的效果

五以紗布覆蓋住寶寶的肚臍部位，並以透氣膠帶固定，完成臍帶護理的工作。

來源：早產兒-睡眠篇

早產兒-睡眠篇

早產兒的住院期間較長，已習慣醫院的吵雜環境。且無晝夜生理期，因此。剛回家時會有一段適應期。

然而，早產兒需要長時間的睡眠，以追趕上正常嬰兒的成長。剛回家時，寶寶也許不習慣安靜、黑暗的睡眠環境。因此，夜間有一點光線及收音機的聲音。可能會使他睡得好些，等寶寶習慣之後。再慢慢減少嬰兒夜間睡眠時周圍的光線亮度及聲音。

另外，許多父母擔心早產兒睡覺時忘了呼吸。不放心讓他單獨在房間裡睡覺，不妨把寶寶放在小床上。當父母在廚房或客廳時，把嬰兒床推在旁邊。以便就近觀察，晚上睡覺時才把嬰兒推回房間。

其實，如果您的寶寶還有危險性，醫生是不會讓他出院的。為了能夠長期照顧好寶寶，當他睡時，您也應利用時間休息，這樣您才有足夠的體力照顧他。而且，早產兒在一段時間後，他的呼吸規則性會增強，就不會有呼吸暫停的情形發生了。

一、睡眠型態

睡眠狀態的觀察包括：一身體活動；二呼吸型態；三臉部表情及眼球活動；四對外界反應能力。

二、睡眠週期

嬰兒的睡眠週期約六十到九十分鐘，每個週期包括以下幾個階段：

（一）睡眠期

- 深睡期：臉部無表情，四肢不動，呼吸規律，較不易醒。
- 淺睡期：呼吸較不規則，臉部偶爾有表情，手腳偶爾會移動，可能有眼球運動。

這個階段較易被外界驚醒，而進入轉換期，否則就會進入

深睡期。

（二）轉換期

- 昏昏欲睡期：呼吸不規則，眼睛半閉。想睡的樣子，活動較大。打哈欠，眼神較遲滯。

稍有刺激就易醒刺激包括內在的，如：饑餓、尿布溼，以及外在的，如：吵鬧的環境。

（三）睡醒期

- 安靜警覺期：已醒來，但少有四肢活動。呼吸規則，對外界注意力較集中。是親子互動最佳時間。

- 活動警覺期：肢體活動多，呼吸不規則。易哭泣，睜眼。內在需求增加如饑餓時，須開始餵食滿足後。才適合親子互動。

來源：早產兒呼吸狀況觀察

早產兒呼吸狀況觀察

一、呼吸暫停

（一）大部分早產兒出院時，不會有呼吸暫停的情形，只有少部分早產兒仍偶會呼吸暫停、心跳減慢、臉色發白、發紺的情形。有需要時，在出院前醫護人員會建議早產兒的父母租用血氧濃度監視器。

（二）餵奶當中若發現寶寶臉色發白、變青時，應立即停止餵奶。將寶寶的臉側向一邊，避免吐奶或嗆奶。再輕拍寶寶背部，等呼吸恢復、臉色紅潤後。再繼續餵。若情況嚴重或短時間內無法回復，則需立即就醫，或家中原備有氧氣者，此時需給孩子吸些氧氣。

（三）若睡眠中呼吸暫停，讓寶寶右側臥，再輕拍背部或手腳，刺激寶寶呼吸。

（四）發現寶寶呼吸暫停時，不要慌張；大部分的呼吸暫停經過刺激後。都能恢復呼吸，等寶寶中樞神經系統漸漸成熟後。症狀就會改善。（五）如果呼吸暫停的次數越來越多，可能合併其他疾病，應帶給醫師診治。

二、慢性肺疾病

近幾年，由於呼吸治療的進步，使得較多的極低體重兒存活下來，因而慢性肺疾病的發生率也逐漸的增加。

造成早產兒慢性肺疾病最常見的原因是支氣管與肺的發育障礙，此外，反覆吸入性肺炎、肺部感染和先天肺部發育不良等，也是造成慢性肺疾病的原因。

呼吸融合細胞病毒是引起嬰幼兒細支氣管炎及肺炎的主

要原因，尤其是以下的高危險群，包括出生體重小於一千公克或是出生周數小於二十八周的早產兒、支氣管肺發育不全早產兒慢性肺疾病、罹患先天性心臟病或是有先天性免疫不全者。

如果是高危險早產兒或有慢性肺疾病時，在年齡第一年内因感染而再住院率高達四十。而且母體保護抗體約在出生二個月後即很少了，所以約在嬰兒的二到七個月大最易感染的細小支氣管炎或肺炎。

哈佛大學的小兒感染科主任麥克因托許醫師甚至提出造成一歲以下的細小支氣管炎，可能是日後一到五歲幼兒氣喘致因的來源之一。

對於呼吸融合細胞病毒感染的預防，最重要的是應避免被感染，在預防策略上，有以下注意事項：

（一）家中成員及訪客有任何感冒的症狀都應該不要接觸早產兒，照顧者除了帶口罩外應多洗手，因為咳嗽擤鼻涕時最容易經由手傳染給早產兒。

（二）早產兒應避免不必要的就診，若有問題應透過各醫院早產兒加護病房的專職護理師詢問就診之必要性，因為醫院是感染呼吸融合細胞病毒的場所。

（三）至少在一歲以前早產兒不要去公共場所。

（四）鼓勵餵食母乳至少六個月，以降低一歲以前呼吸融合細胞病毒的感染，以及一歲以後發生氣喘的機會。

（五）肌肉注射呼吸融合細胞病毒單株抗體，可降低呼吸融合細胞病毒五十五的住院率。

來源：早產兒哺乳要點

早產兒哺乳要點

寶寶提早來報到，您一定相當的擔心。在出生的頭一兩週，通常寶寶的狀況仍不穩定。此時您需要做的就是儘早開始擠奶。一開始，媽媽有時不易擠出足夠的母乳。然而，如果儘快練習建立良好的擠奶技巧，並獲得足夠的支持時，這通常是可克服的課題。

儘早開始並持續擠出母乳

母乳的產生是一個供需原理，當寶寶因某些情況必須與媽媽分開。例如入住新生兒加護病房或中重度病床，或還無法直接吸奶時。在產後頭一天，可能的話在產後六個小時內就開始擠奶。這可幫助母乳開始流出並持續分泌，就如同產後儘快開始讓寶寶吸吮可以讓母乳早一點來一樣。如果您可以擠出幾毫升的初乳，對寶寶也是很寶貴的。每天每二到三小時擠一次母乳，每次二十到三十分鐘，一整天至少擠乳八到十二次。出院後仍需持續這樣的擠奶以確保奶水量，將擠出的奶水冷藏或冰凍，當您或

家人至醫院探視寶寶時，將您所擠的母乳送至醫院供醫護人員哺餵您的寶寶。

肌膚接觸

只要寶寶狀況穩定，和醫院的工作人員討論袋鼠式護理的可能性。所謂的袋鼠式護理包含了早期的肌膚接觸以及母乳哺育。儘可能多到醫院中探視寶寶，提供適當的肌膚接觸及照護。如此親密的接觸，不但有助於成功的開始母乳哺育。更增加早產兒血液中的氧氣濃度、降低壓力性荷爾蒙、調節體溫以及穩定生命徵象。

學習吸吮乳房

一旦寶寶可以嘗試直接吃奶時，您可以讓寶寶直接吸吮乳房。可以直接把乳汁擠到寶寶口中，在這種狀況之下，橄欖球式或修正橄欖球式抱法最為實際。許多寶寶在這個階段可能只會尋找並舔舔乳頭，含住乳房但不吸吮。或是吸了四、五次之後，停頓二到四分鐘然後再繼續吸吮。在這暫停時期，不需要急著把寶寶抱開。讓他留在那裡是非常重要的，因為如果他就緒之後。有可能再度開始吸吮。如果有必要的話，他會持續上述行為長達一個小時之久。但是要注意寶寶如有壓力的表現則不宜勉強。

除此之外，持續以管灌或是杯餵的方式餵食，直到他能夠完全有效的吸吮為止。確定寶寶以正確的姿勢吸乳及含乳，如此可幫助日後成功的哺餵母乳。

來源：早產兒哺餵母乳的好處

早產兒哺餵母乳的好處

“袋鼠式照顧”作為一個幫助母親和早產兒認識彼此的方法。那些已在穩定狀況的早產兒，可以被帶離保溫箱，抱在媽媽的懷裡，與媽媽的肌膚緊密地接觸。媽媽穿著寬鬆的前開式棉質衣物，將寶寶垂直放在兩乳之間，或靠在胸部上，寶寶會注視著母親、對她的聲音有反應或輕鬆安祥的睡著。有一些嬰兒會睡到一半醒過來找尋媽媽的乳頭。這樣的經驗會讓媽媽們感到，自己更像一個母親了。同時，也有助於乳汁供給量的增加，增進噴乳反射，使母親的重要性再被肯定。母嬰同在一起，雙方均感覺安心。

雖然此時寶寶可能還在使用人工呼吸器，妳還是可能抱抱他的，僅管剛開始或許只能給妳抱一下而已也是值得。這種與母親肌膚相接觸的方法不但有助於維生系統包括呼吸、吸吮、吞嚥、心跳速率及喉嚨發聲的調整與協調也為哺乳作預備。若妳從乳頭擠出幾滴乳汁，寶寶聞到並舔到乳汁的氣味，也開始知道他所得到的營養是從何而來的。在這段寶寶初離開保溫箱的時間，護士們可能會在旁監控他的情況，這是很重要的，也可以使妳更安心。

早產兒因為消化系統尚未成熟，母乳可以提供重要而且好吸收的營養。母乳中的蛋白質較易消化且適合嬰兒，脂

肪是提供早產兒成長所需的能量。母乳中有一種酵素（脂肪分解酶），可以幫助嬰兒更有效率地消化母乳中的脂肪。產後的前幾週，早產兒的母親分泌的乳汁比一般足月嬰兒母親的乳汁含有更多的蛋白質、鈉、磷、氯化物和其他養份。儘管這種差別僅於出生後一個月左右，但這些額外的營養還是很重要的。

此外，母乳可以保護早產兒免於感染的危險。早產兒因免疫系統未成熟，就需更費力地與入侵的病菌對抗。所以母乳中之活細胞及與免疫有關的成份，對早產兒就顯得格外的重要。以母乳哺育的足月嬰兒，較少感冒、腹瀉、過敏和耳朵發炎，縱然發生，也較輕微。早產兒最迫切需要母乳的原因，是能得到免疫性的保護。正在進行的研究發現，母乳中有許多荷爾蒙和酵素，包含多種生長激素。直至目前為止，科學家對於這些荷爾蒙酵素之作用的了解很有限，但是研究者都認為，它們可能與嬰兒之消化系統及神經系統的成熟有很重要的關聯。哺育母乳對早產兒身體健康和發展是很重要的，哺育母乳對於母親也是很重要的，能增進母子之間感情的聯結。只有嬰兒的母親能夠提供給他母乳。用母乳哺育寶寶，也使你們肌膚親蜜接觸。縱然他還不能直接在妳懷中吸奶，為他擠奶也使你們之間有如懷孕期間的連結感。醫師和護士可能暫時是照顧妳早產兒的主要人員，但唯有妳提供的母乳能幫助他成長和茁壯。

來源：早產兒回家的準備及照護

早產兒回家的準備及照護

早產兒出院前的準備

環境的準備：

室溫維持在攝氏二十六到二十八度，濕度五十到六十。

需備有除濕機、溫濕度計。

房間保持通風，勿使用絨毛性布簾或地毯。

衣服、床單常保持清潔、乾燥。

家裡不飼養小寵物。

醫療輔助器材之準備：

氧氣：攜帶型及固定型皆需。

血氧濃度監視器。

呼吸系統照顧輔助器材：家庭式呼吸器製氧機、攜帶型氧氣鋼質瓶、小量噴霧器、拍痰器、抽吸器、吸球等。

氣管造口照護用物。

鼻胃管餵食：灌食器、胃管、空針等。

人員的準備：

在醫院時實際參與照護，充實知識技巧，增加自信心。

家庭其他成員亦須準備，如幫忙照顧者或早產嬰兒的兄姊等。

早產兒回家後的照護

感染的預防：

減少親友的探訪。

二歲以內避免到公共場所，如百貨公司、餐廳、人多擁擠處。

室內禁止吸菸。

照顧者需保持雙手清潔。

患有傳染病者勿與嬰兒接觸，避免小寶寶感染。

照顧時的注意事項：

寶寶哭時，可由膚色、粘膜或指甲床顏色的改變來密切觀察，儘可能不要讓寶寶哭很厲害，以減少能量的耗損。

給寶寶使用奶嘴，不僅可滿足嬰兒吸吮的需求，也可促進氧氣的吸入，和減少哭的次數。

寶寶哭時可將寶寶抱入懷中，或將其雙腳屈向腹部，使哭的動作得以緩和。

禁止在家中抽菸，以免寶寶吸入二手菸。

減少去公共場所的次數，以減少呼吸道感染的機會。

當寶寶有下列情況，應帶給醫師診治：

呼吸暫停次數愈來愈多。

呼吸不規則、胸凹更加明顯、異常出汗、氧氣需要量增加。

活動力變差、哭聲弱或尖銳、嗜睡、無力。

來源：早產兒居家照護錦囊

早產兒居家照護錦囊

新生兒無論出生時的體重為多少，只要未滿三十七週出

生，即是早產兒。早產寶寶各時期的生長（身高、頭圍、體重）、認知與動作發展、副食品添加等等，在三歲之前都是依其矯正年齡進行評量。此外，政府與民間都有提供相關的資源與照顧支持，希望能有效分擔家長養育的負擔與辛勞，有需要的家屬請善加利用。早產兒的生長、腦神經發展、副食品添加須使用矯正年齡，但預防注射則依實際出生年齡。

早產兒常見合併症

早產兒較容易因器官未成熟產生相關問題，常見的合併症包括：腦室內出血、腦室周圍白質軟化症、視網膜病變、聽力受損、慢性肺部疾病、開放性動脈導管、壞死性腸炎等。

懷孕週數越短，早產兒發生上述問題的機會越大，因而極低出生體重早產兒的父母宜與主治醫師長期配合觀察追蹤。

早產兒的矯正年齡

不論寶寶何時出生，以「現在日期」減去「預產日期」，即可計算出寶寶的「矯正年齡」。例如：寶寶出生日期為五月一日，媽媽的預產日期是七月一日，則至八月一日時，寶寶的矯正年齡為一個月。

如何餵食早產兒

早產兒進食特性：由於生理發展仍未成熟，吸吮能力較足月兒弱，餵食過程中比較容易噎到，或有發紺現象（皮膚或是嘴唇顏色變青、變紫）。

噎奶的原因喝奶姿勢不佳（例如讓寶寶躺著喝奶）。食道賁門括約肌不成熟，導致胃食道逆流。奶嘴孔洞太大，吞嚥不及。先天吸吮能力不佳，如唇顎裂、心臟病、神經系統異常、唐氏症、早產兒或合併有慢性肺疾病的嬰兒。呼吸道感染，吞嚥不順。

如何預防噎奶？若以奶瓶哺餵，可將奶瓶倒放。看是否奶水滴下來的速度為每秒一滴，若呈一直線。則代表奶洞太大，容易噎奶。

早產兒最佳的餵食方式是「需求性餵食」，也就是依照寶寶的生理時鐘予以哺餵，並且按照寶寶能接受的餵食量適當給予。

餵食時應注意事項

早產兒回家後仍可能有胃食道逆流的問題，餵奶時可採取少量多餐分段餵食。並注意早產兒的膚色及唇色，若有發紺現象。必須先停止餵奶並輕拍背部，待膚色及唇色恢復正常後再繼續餵奶。

切勿平躺餵奶。

特殊狀況無法親餵母乳而需採瓶餵時，早產兒因為吸吮能力較弱，奶嘴的選擇應以質軟、中號、圓洞為佳。合適的奶洞大小，以奶瓶倒立時，奶水可以一秒一滴流出者較為適合。

一般嗆奶處理，只需移除口中奶水，並以適度力量輕拍背部至呼吸平順、膚色紅潤即可繼續餵奶，或休息一下再繼續。

餵奶中，萬一寶寶咳嗽後呼吸暫停，可以輕搓寶寶背部或輕彈寶寶腳底，以刺激呼吸。

預防感染

早產兒的免疫力較足月兒弱，較容易感染疾病。有少數早產兒因肺部尚未發育成熟，易發生慢性肺疾病。而有慢性肺疾病的孩子，肺部感染的機率較一般嬰兒來得高。症狀也較嚴重。預防感染的方法包括：

限制訪客。

注意居家環境的通風。

接觸寶寶前後皆須洗手。

家中禁菸。嬰兒返家仍需使用氧氣時，家中絕對禁止吸菸，並須隔絕助燃物。

寶寶週歲前避免帶他出入公共場所。

若照護上有疑慮，可善用早產兒基金會居家護理諮詢專線服務（二到二千五百二十三-九百零八，週一至週五八百三十到一千七百），以減少不必要的醫院就診。

早產兒的睡眠照護

早產兒的住院期間較長，已習慣醫院的吵雜環境，且無晝夜分別，剛回家時會有一段適應期。

可藉由環境營造、夜間點小夜燈，及讓寶寶聽輕柔音樂等方式調整，待寶寶習慣後，再慢慢減少光線亮度及聲音。

早產兒的行為照護

早產兒比足月兒容易躁動、不易安撫，可藉由做袋鼠式護理和嬰幼兒按摩來改善。

更多早產兒照護技巧，可至國民健康署手冊專區下載「早產兒居家照護手冊」及「早產寶寶健康手札」使用。

來源：早產兒的排便觀察及處理

早產兒的排便觀察及處理

一般而言，寶寶一天大概解一到三次大便，平時大人應仔細觀察寶寶排泄物的形狀、顏色、氣味以及排便量，以初步預防腸胃道疾病。早產兒與足月嬰兒的排泄並無不同，請依一般狀況照顧。

一、腹瀉

(一)腹瀉的觀察：以其氣味及性質為主，而不以次數定論。若寶寶的大便比以前酸臭，或由軟便轉為稀水便。或帶黏液且次數比平常多，則為腹瀉。

嚴重腹瀉可能出現的症狀：發燒。不想吃或食量減少，甚至體重減輕。腹脹或嘔吐。嚴重時會有脫水的情形，嘴唇乾、不安、哭鬧、軟弱、小便減少或嗜睡。

(二)腹瀉的原因：引起腹瀉的原因很多，約可分為以下幾點：

與飲食有關的原因，如牛奶過敏、配方奶沖泡太濃、乳糖耐受不良、喝過量的果汁、吃到不新鮮的食物、副食品添加不當等。

感染，如由病毒或細菌等引起之腸炎。

其他，如巨結腸、內分泌問題等。

(三)腹瀉的居家照護：哺乳的寶寶請加強洗手，仍持續哺餵母乳。泡配方奶前及接觸嬰兒前後都要洗手。要用煮沸過的開水沖泡奶粉，奶瓶須正確消毒及存放，且避免接觸不潔物品。勤換尿布保持乾燥，避免紅臀。寶寶出院後，如有多次嘔吐、腹脹、水瀉、解血便的情況，應儘速就醫。非經醫師指示，不可服用任何藥物。

二、便秘

(一)便秘的觀察：

大便質地變硬、堅實，大便次數減少，甚至數天未解大便。不過，若寶寶雖數天才解一次大便。但所解出之便不硬，且寶寶平時沒有不舒適的表現。則不是便秘。

便秘的原因

胃腸蠕動遲緩。

牛奶沖泡不當，如牛奶沖泡濃度太稀。

其他，如腸阻塞、巨結腸症。

(二)便秘的居家照護：

嬰兒若三天未解大便，可用肛溫計塗上潤滑油（如凡士林

、甘油）抬高雙腿。放入肛門一到二公分，輕輕旋轉。以刺激腸胃蠕動及幫助排便。若仍未改善，最好送醫治療。

來源：早產兒的腸胃道狀況

早產兒的腸胃道狀況

早產兒腸胃道問題發生的可能性，比足月嬰兒高。常見的腸胃道問題包括：嘔吐、便秘、腸胃道感染及胃食道回流。

胃食道回流

一胃食道回流是指：胃中的食物回流到食道，通常伴隨著噎到氣管阻塞、嘔吐或別的呼吸道症狀。

二胃食道回流通常是暫時性的，當食道下括約肌的張力開始增加，約六個月後逐漸好轉。但有些嚴重的情況則需給予處置，醫療上的措施包括：

- 姿勢擺位，例如右側臥。
- 少量多餐。
- 藥物使用以促進胃中內容物的排空，或手術治療。

三可經由下列措施減低胃食道回流：

- 餵奶時經常幫嬰兒排氣。
- 以坐臥的方式緩慢餵食（減少吞嚥空氣，避免使空氣進入胃中）。
- 少量多餐餵食。
- 餵食後趴臥或右側臥，以促進胃的排空。

來源：早產兒追蹤檢查很重要

早產兒追蹤檢查很重要

由早產兒基金會近十年追蹤檢查門診資料的分析顯示，出生體重一千五百公克之早產兒或有特殊合併症的早產兒，比一般足月兒在認知與動作發展上較易發生遲緩情形。

建議至少於矯正年齡六個月、一歲、二歲及五歲時做定期回診，及早發現、及時轉介，以期達到早期療育功效。

完整的極低出生體重早產兒追蹤檢查計畫應該包括五大項目：

一身高、頭圍、體重與營養狀態評估：量測生長指標，並對照矯正年齡的生長曲線表以評估生長狀況。詢問哺餵攝

取情形、副食品添加比重等，並提供適當的營養諮詢。

二神經發育與粗動作評估：藉由肌肉張力、神經反射的消失或出現，及坐姿與站姿的穩定性等評估來評量早產兒的神經發育狀況。

三心智發展評估：評量嬰幼兒目前認知、語言、社會人際、精細動作及粗動作之各項發展，並配合評測過程的行為觀察，整體瞭解嬰幼兒的心智發展情形。

四眼科評估：建議除了住院中進行的視網膜檢查外，於矯正年齡一歲左右開始定期視力檢查。

五聽力評估：於住院中接受首次聽力篩檢，並於矯正年齡一歲左右再次評估（需同時考量孩子發展的語言、認知、表達與理解等能力）。

巴掌仙子加油站

健保身分

寶寶出生後六十天內，尚未加保前，可用母親或父親的健保卡就診；在寶寶辦理出生登記後，則可跟隨父親或母親其中一方加入健保並申請健保卡。

三歲以下兒童醫療補助於二零二零年開辦，凡三歲以下參加全民健康保險之兒童，就醫時即自動減免健保部分負擔。

申辦重大傷病證明

依「全民健康保險保險對象免自行負擔費用辦法」第二條規定，保險對象經特約醫療院所醫師診斷為重大傷病者。得檢具醫師開具之診斷證明書及重大傷病申請書、身分證明正反面影本及相關佐證之病歷資料，向健保署各分區業務組提出申請。經審查符合資格者，發給重大傷病證明。

若早產兒出生後三個月內因相關併發症住院者，由醫師逕行認定免申請證明；若早產兒出生滿三個月後，領有身心障礙等級中度以上之身心障礙手冊經醫師認定符合重大傷病範圍者，可依規定申請重大傷病證明。

早產兒基金會醫療費用補助

由基金會的合約醫院社工師評估，評估資料包括家庭經濟收入、家中工作人口數、早產兒之住院時間長短及醫療狀況等。若符合申請標準，由合約醫院的社工師協助申請。

早產兒基金會居家醫療器材費用補助

若早產兒出院返家後須租用醫療器材，如：血氧濃度監視器、製氧機、氧氣鋼瓶、抽痰機、呼吸器、靜脈輸注幫浦（

含灌食幫浦)等，可透過合約醫院的社工師評估後協助申請。早產兒基金會將補助一半的醫療器材租借費用至不需使用為止。

如特殊個案需半年以上長期使用者，由醫師註明原因，則可申請購置。儀器不需使用後，請家屬將儀器捐贈給個案住院醫院之社會服務室，提供給經濟困難的早產兒家庭使用。

相關資源：

早產兒追蹤檢查服務同意書、兒童發展聯合評估中心聯絡資訊。

兒童發展通報轉介中心名冊，請參閱兒童衛教手冊。

地方政府社會局另有提供兒少生活補助、托育費用補助、育兒津貼等兒童及少年相關的社會福利，詳情可參閱各縣市政府社會局處網站。

目前全民健康保險針對早產兒施打呼吸道融合細胞病毒單株抗體免疫調節劑，詳細給付標準可參閱衛生福利部中央健康保險署網站。

來源：早產兒預防接種篇

早產兒預防接種篇

由於早產兒的抵抗力較足月兒差，更需要按時接種疫苗，以避免感染嚴重的疾病。

預防接種的一般禁忌

接種疫苗之目的在於預防疾病的發生與流行，所有疫苗都有一些不可避免的副作用，但在利多於弊的考量下，還是需要廣泛地實施疫苗接種。

(一)發燒及其他需要特殊治療的疾病：發燒時不要接種疫苗，主要是因為疫苗造成的不適反應，可能會影響對病情的判斷。至於一般沒有發燒的感冒，仍然可以接種疫苗。而其他需要特殊治療的疾病，一般是指需要住院治療的特殊病症則不宜接種，原因也同樣是預防混淆病情的判斷。

(二)對於同種疫苗曾有過嚴重反應：所謂的嚴重反應，是指可能危及生命，或是會引起永久性後遺症的反應，例如過敏性休克。

(三)未接受過治療的結核病患者：結核病特別會影響到細胞性免疫功能，如果未經治療，不適於接種任何疫苗。

接種疫苗前的評估

(一)身體狀況：

一 現在身體是否有無任何下列病徵如發燒三百八十五以上、嘔吐、呼吸困難、正服用八寶散或驚風散等藥物。

二 最近一年內是否有發生抽痙狀況。

(二) 接種反應：之前預防接種後是否有嚴重反應，如發高燒四百零五以上、抽痙、昏迷、休克、哭鬧不安三小時以上等。

(三) 特殊疾病：是否有嚴重心、肝、腎、白血病、癌症等疾病。

(四) 其他：

一 最近三個月內有無就醫、服藥等情形

二 最近三個月是否注射過免疫球蛋白或使用免疫製劑或輸血

來源：早產寶寶一般性照護

早產寶寶一般性照護

嬰兒哭泣的可能原因：

(一) 饑餓

(二) 身體不舒服，如：太熱、太冷、尿布溼了、腹脹，都可能使嬰兒不舒服而哭鬧。

(三) 外界的刺激，如：燈光太亮、聲音太吵，或環境突然改變時嬰兒比較會哭鬧不安。

(四) 嬰兒腹絞痛，造成此現象的真正原因仍不明。有人認為與腸胃道過敏有關，另有人認為此種腹絞痛與嬰兒的神經中樞不成熟有關。但大部份在三、四個月大時，這種哭鬧會逐漸減少。

一般來說，早產兒的行為和足月兒的行為稍有不同。早產兒比較容易躁動、不易安撫；而在寶寶的中樞神經系統發展成熟以前，寶寶的哭聲可能不宏亮。但他會經由其他的生理反應來表達他的不舒服，如：皮膚顏色改變、重覆打哈欠或打嗝、捲縮四肢。以下提供一些安慰寶寶的技巧：

(一) 如果不到餵奶的時間寶寶就哭了，先檢查看是否因尿布溼而不舒服。

(二) 給寶寶奶嘴，安撫他。

(三) 把寶寶抱緊，或用毛巾把他包裹起來。使他有安全感，抱寶寶時。將他的手臂和腳彎曲，靠近身軀。能使他感

到舒服，同時發展彎曲性。

(四)抱寶寶靠在大人的肩上，或把他輕鬆地抱在懷裡，或抱著他走一走，輕柔、規律的聲音和動作會使嬰兒容易安靜下來。

來源：春季寶寶照顧指南：食衣住行生活提醒

春季寶寶照顧指南：食衣住行生活提醒

春天氣候多變，時而溫暖、時而濕冷，而且日夜溫差大，這對寶寶的免疫系統是一大考驗。因此，爸媽要特別注意寶寶的飲食、穿衣、居家環境和外出照護，以幫助寶寶健康快樂地度過春天！

春季寶寶飲食指南

春天氣溫忽冷忽熱，寶寶的腸胃較敏感，建議以清淡、均衡、易消化的飲食為主，以減少腸胃不適和過敏的風險。

一 補充維生素，提升免疫力

橘子、草莓、番茄、奇異果等水果富含維生素，有助於增強免疫力，降低感冒機率。但攝取時需適量，以免刺激寶寶腸胃。

二 多吃當季蔬菜，促進腸胃健康

菠菜、紅蘿蔔、高麗菜等春季蔬菜含有豐富的維生素和膳食纖維，能幫助腸胃蠕動，減少便秘的問題。

三 攝取優質蛋白質，幫助生長發育

選擇容易消化的食物，如雞肉、魚肉、豆腐和雞蛋，這些都適合寶寶的腸胃。吃魚時要確保魚刺已完全去除，以免發生噎住的危險。

四 避免生冷、油膩食物

雖然天氣逐漸回暖，但寶寶腸胃仍較脆弱。冰飲、炸物、甜食可能刺激腸胃、影響消化，建議以溫熱食物為主。降低腹瀉或便秘的風險。

春季寶寶的穿衣技巧

春天早晚涼爽、白天炎熱，最適合「洋蔥式穿搭」，方便隨時增減衣物，避免寶寶著涼或過熱。

一 內層：吸汗透氣，保持乾爽

貼身衣物建議選擇純棉材質，能吸汗又透氣，避免流汗後悶住，導致皮膚不適。

二 中層：靈活搭配，適度保暖

氣溫較低時，可穿輕薄的長袖或毛衣。提供適度保暖，又不會過於悶熱。也方便根據天氣變化調整。

三 外層：防風防水，應對突發天氣

春天偶爾有陣雨或強風，外出時準備輕薄的防風外套，既能擋風也能防小雨，幫助寶寶適應多變的氣候。

春季寶寶的居家照護重點

春天濕氣較重，容易滋生塵蟎、黴菌。此外，空氣品質不穩定。也可能影響寶寶的呼吸道健康。因此，保持居家環境乾爽清潔，是守護寶寶健康的關鍵。

一 勤曬被子，保持乾爽

潮濕的環境容易讓塵蟎滋生，建議在天氣好的時候，定期將床單、枕頭套拿到陽光下曬一曬，或使用除蟎機、烘被機來清潔。

二 控制濕度，避免黴菌問題

若家裡濕氣較重，可開啟除濕機。或在衣櫃、床底放竹炭、除濕包，吸收多餘水分。讓環境更乾爽舒適。

三 保持空氣流通，降低病菌風險

每天開窗通風至少二十到三十分鐘，讓室內空氣流通，降低細菌、病毒的傳播風險，同時減少室內悶熱的問題。

四 減少空氣污染影響

可擺放空氣清淨機，或在空氣品質不良時減少開窗時間，降低懸浮微粒對寶寶呼吸道的影響。

春季寶寶外出注意事項

春天陽光逐漸變強，但天氣變化也快。外出時要注意防曬、防風，並適時調整行程。以免寶寶因氣溫驟變而感冒。

一 避開中午烈日，適時防曬

春天的紫外線強度逐漸增加，外出時可幫寶寶戴帽子、撐陽傘，或選擇長袖薄衣防曬。三歲以上的孩子可以適量使用兒童專用防曬乳，避免曬傷。

二 風大時戴帽子、圍上薄圍巾

春天風較大，特別是早晨與傍晚時段，寶寶的耳朵與脖子容易受冷風影響，導致不適。可以戴帽子或圍上薄圍巾，防止冷風直吹。

三 注意氣溫變化，避免長時間外出

春天氣溫不穩定，建議外出前查看天氣預報，攜帶薄外套或防風衣，避免突如其來的降溫或小雨影響寶寶健康。

四 回家後立刻清潔，減少細菌附著

外出回家後，記得幫寶寶洗手、洗臉，並更換外出衣物，以減少公共環境的細菌和污染源。

春天是充滿生機與活力的季節，但也是寶寶容易生病的時期。透過均衡的飲食、適當的穿搭、乾淨舒適的居家環境，以及外出時的細心防護，爸媽就能為寶寶建立良好的抵抗力，健康快樂地享受這個美好的季節！

來源：月子期間不能吃性寒生冷的蔬果、冷飲嗎？

月子期間不能吃性寒生冷的蔬果、冷飲嗎？

其實蔬菜、水果並不一定都是生冷的，也有平性、涼性與寒性之分。如：橘子、瓜、梨、菜頭、大白菜、西瓜、苦瓜，性質就比較生冷。若坐月子期間就建議媽咪少吃。但蘋果、櫻桃、葡萄、芭樂、柳丁，均屬於平性溫和的水果，故坐月子期間仍可食用。

至於寒冷冰品，對西醫來說。月子吃冰品、喝冷飲是沒關係的，但就中醫看法。冰品屬於「寒邪」、「濕邪」，若吃多則會使體質變太寒、濕氣太重。也影響循環代謝的能力並抑制子宮收縮，所以產後水腫、惡露、血塊、悶痛等狀況更不易排除。

來源：月子餐一定要用米酒料理嗎？

月子餐一定要用米酒料理嗎？

傳統產後使用「米酒」入藥膳燉煮，目的是為了藉助酒的「熱性」燉出藥材的療效，來幫助產後體質虛寒、氣淤的媽咪以驅除體內寒氣。但剖腹產媽咪，不建議使用「米酒」入菜。尤其傷口若還有發炎時，會使傷口癒合情況不佳。更擔心容易引起傷口組織發炎等其他嚴重情況。因個人體質不同，有些人體質本就偏燥，若再用酒燉煮食物，也容易上火。產後麻油雞全酒進補，米酒經過煮沸雖然部分酒精會揮發，但過量的酒精會透過乳汁使新生兒過長睡眠、腦部發育受到酒精影響。

美國疾病管制與預防中心不建議哺乳母親飲用酒精飲料，但也發現若一天飲用一份酒精標準單位的飲料對哺乳影響不大，前提是母親喝到含酒精飲料至少要等二小時後才能哺乳。依據美國的指引一份酒精標準單位的飲料可能是一罐三百五十的五酒精濃度啤酒、一杯一百五十的十二酒精濃度紅酒或一小杯四十四的四十烈酒。即便如此，仍不建議哺乳母親飲用酒精飲料，因為會影響母親判斷與能否安全照顧寶寶的風險。

來源：月子餐不能加鹽坐月子期間不能喝水

月子餐不能加鹽坐月子期間不能喝水

坐月子期間的飲食，鹽分建議應與一般正常飲食相同。每天約六克，在產後一個月內身體自動排除體內多餘水分。也是媽咪快速減重的時機，此時若再增加鹽分的攝取。水分則容易滯留體內，形成腎臟等臟器代謝的負擔。但並無限制產婦不能喝水；懷孕期間因子宮撐大壓迫下肢靜脈回流，會出現下肢水腫情形。但產後通常水腫會消退，若產婦擔心會有小腹或水腫而不喝水。那是多慮的，反而要適量的補充水分。以維持良好的新陳代謝。哺乳婦女建議每天攝取液體至少二千五百及富含膳食纖維的均衡飲食，包括湯品、豆漿或牛奶等高蛋白的飲品。有助於產後媽咪體力的恢復及乳汁的分泌，且能促進新陳代謝及腸胃蠕動。預防便秘。

來源：未滿2歲兒童育兒津貼及托育補助新制（內附「0-6歲國家一起養」育兒新制說明摺頁）

未滿二歲兒童育兒津貼及托育補助新制內附「零到六歲國家一起養」育兒新制說明摺頁

為落實「零到六歲國家一起養」政策，行政院今年年初核定修正我國少子女化對策計畫（一百零七年-一百一十三年），今一百一十年八月補助新制正式上路。未滿二歲兒童之父母（或監護人），經稅捐稽徵機關核定之最近一年綜合所得總額合計未達申報標準。或綜合所得稅稅率未達二十%者，可申請育兒津貼及托育補助。二者不得重覆請領，新制分二階段逐步提高發放金額如下：

一、育兒津貼：今年八月起將由現行新台幣下同二千五百元調高為三千五百元（第二胎四千元，第三胎四千五百元），明年八月再調高至五千元（第二胎六千元，第三胎七千元）。

二、托育補助：今年八月起將由現行六千元調高為七千元（第二胎八千元，第三胎九千元），明年八月再調高至八千五百元（第二胎九千五百元，第三胎一萬五百元）。

衛福部進一步說明，一百一十年七月領有未滿二歲兒童育兒津貼及托育補助。且八月仍符請領資格的民眾，政府將主動提高發放金額並直接入帳至原請領帳戶。民眾不用重新申請；但特別提醒目前正在請領育嬰留停津貼、弱勢家庭生活類補助的民眾，八月起可同時請領育兒津貼。記得要到兒童戶籍所在地鄉鎮、市、區公所提出申請。

新制申請方式與現制相同，育兒津貼請民眾檢具申請書及相關證明文件，「郵寄」或「親送」到兒童戶籍地的鄉（鎮、市、區）公所提出申請；托育補助則向收托單位（準公共托嬰中心、公共托育機構、居家托育服務中心）提出申請。

衛福部已印製一百餘萬份新制宣導摺頁，在七月二十三日寄送全國約三十四萬名未滿二歲兒童的家庭。並陸續送達戶政事務所、鄉鎮市區公所、衛生所、親子館、醫療院所及地方政府等相關機關構，讓更多家長知道補助內容。儘快提出申請。

民眾如有任何問題，可撥打「一千九百五十七福利諮詢專線」詢問上午八時到晚上十時，或至衛福部社家署-育兒津貼及托育準公共專區另開新視窗查詢。

來源：梅毒篩檢為陽性，該怎麼辦？

梅毒篩檢為陽性，該怎麼辦？

梅毒是由梅毒螺旋體引起的全身性慢性傳染病，梅毒分為早期及晚期梅毒。早期梅毒包括一期梅毒、二期梅毒和早期潛伏性梅毒，晚期梅毒包括三期梅毒、晚期潛伏性梅毒。通常早期梅毒的傳染性較強。

在感染梅毒初期，梅毒螺旋體進入人體的部位會出現無痛潰瘍。稱之為硬性下疳無壓痛感，但按壓有清澈之滲出液溢出。內含大量之梅毒螺旋體，故傳染性極高。感染梅毒若沒有接受適當治療，接著出現全身性症狀。包括頭痛、倦怠、噁心、發燒、體重下降、肌肉、骨骼及關節疼痛、全身性淋巴腺腫、全身皮膚隆起紅豆般大小的疹子、外陰部或身體其他部位會出現疣狀斑塊，稱為扁平濕疣在身體綑摺處之表淺性潰瘍。內含無數梅毒螺旋菌，故具高傳染性。

早期梅毒若未接受適當治療，後續便會發展成無症狀的潛伏性梅毒。雖然並無臨床症狀，但體內仍然有梅毒螺旋菌存在。對身體組織器官仍有破壞性。通常梅毒於感染後三至七年，可能發展為心血管疾病或神經性疾病等晚期梅毒的嚴重症狀。

懷孕婦女若感染梅毒且未接受適當治療，可能透過胎盤感染胎兒，導致胎兒於子宮內死亡、早產、新生兒死亡、體重過輕或先天性梅毒。梅毒血清通常在妊娠初期第十二週產檢及妊娠第三期第三十二週產檢時抽血檢驗，如梅毒檢驗呈陽性者。請孕婦依醫囑配合儘速接受治療及追蹤檢驗，以預防胎兒感染影響其健康。包括體重不足、梅毒性鼻漏或胎兒外觀如馬鞍鼻等。

感染梅毒的孕婦通常建議使用盤尼西林類藥物治療；如經皮膚過敏試驗證實為盤尼西林過敏，最好接受盤尼西林減敏治療，然後再給予適當之劑量作正式治療。

感染梅毒的孕婦，如未於生產前接受完整治療或檢驗陽性的時間接近產期，則產下之嬰幼兒須配合衛生單位接受先天性梅毒之治療及定期追蹤先天性梅毒檢驗結果，以維護寶寶的健康。

來源：正值高溫，夏天生產的媽媽 飲食、生活要怎麼顧？

正值高溫，夏天生產的媽媽飲食、生活要怎麼顧？

台灣夏天，氣溫高、濕度重，對剛經歷生產的媽媽來說，是身心雙重挑戰。產後調養期，不論在飲食、作息、居家環境都要多一份用心。以下整理了夏季產後飲食及生活照護重點，讓媽媽產後休養更安心。

夏季口乾舌燥，產後飲食怎麼吃？

夏天動輒超過三十度的高溫，加上產後身體正處於修復期，許多媽媽會感到口乾舌燥、胃口差。但為了幫助身體復原及哺乳所需，營養補給不可忽略。以下幾個飲食原則，可讓媽媽吃得健康又不燥熱：

產後階段性飲食技巧：

產後第一～二週，建議以清淡、易消化為主。例如粥品、雞湯、魚湯、排骨湯等；到了第三～四週，可逐漸增加蛋白質攝取。也能開始食用麻油類料理，如麻油雞、麻油豬肝湯等。有助補氣養血。

避免過補、燥熱食材：

提醒媽媽像是麻油雞、當歸、老薑等偏溫熱的補品，產後第一週不建議馬上食用，特別是夏天體質偏熱、流汗多的媽媽，反而會上火、便秘或產生痔瘡不適。

建議溫和烹調食物：

另外料理方式以蒸、煮、燉為主，避免油炸、辛辣，才不會讓身體更加燥熱。

補充足夠水分與湯品：

由於哺乳的需求，媽媽產後每天最好可以攝取二千五百到三千毫升的水分，除了開水外，也可以喝四神湯、鱸魚湯、雞湯、黑豆水等。避免喝太冰或含糖飲料，以免刺激腸胃。

增加高纖蔬果攝取：

建議每天都要多攝取蔬菜水果，可以預防便秘的發生，像是木瓜、奇異果、蓮霧、蘋果、香蕉等都是不錯的選擇。

總結來說，夏季產後飲食不要補到冒汗、上火，重視營養均衡與水分補給，讓身體循序漸進修復、逐步恢復元氣。

天氣悶熱，產後傷口照護與清潔小撇步

潮濕悶熱的氣候，對產後媽媽的傷口與私密處清潔是一大考驗。無論是自然產的會陰傷口，或是剖腹產的腹部傷口，都需要細心照顧。以下幾點建議幫助媽媽度過恢復期：

會陰或剖腹產傷口清潔：

可使用專用沖洗瓶或坐浴方式清潔外陰部，清潔後輕輕擦乾；剖腹產則注意避免用手觸摸傷口，前二週建議不要碰水，保持敷料乾爽。如果擔心剖腹疤痕問題，可持續貼約三到六個月的美容膠，以預防疤痕增生。

勤換產褥墊或衛生棉：

炎熱天氣下，產後排出物與汗水混合容易滋生細菌，建議每二到三小時更換一次，維持私密處清爽衛生。

便秘與排尿不順處理：

產後容易便秘，建議多攝取蔬果與水分，必要時可依醫師指示使用軟便劑；若排尿困難，試著使用溫水坐浴或局部熱敷放鬆肌肉。

身體清潔建議：

剛生產完可以使用溫水擦澡，出院後大多可以開始淋浴，但要避免長時間泡澡，以防感染。洗頭也是沒問題的，只要避免冷風吹襲，洗後立即吹乾即可。

良好的清潔習慣不但提升舒適感，也能有效預防感染，讓媽媽安心度過產後恢復期。

產後長時間待冷氣房注意事項

為了避免中暑或是汗流浹背不舒服，產婦在夏天也可以吹冷氣，只要留意以下幾點就能舒適、健康度過產後調養期。

冷氣溫度不宜過低：

建議室溫維持在二十六到二十八度之間，避免劇烈溫差導致頭痛。也可以搭配電扇使空氣流通。

避免直吹傷口或頭部：

使用空調或電扇，風口要避免直接吹向身體，可將出風口朝牆壁或天花板。

可採洋蔥式穿法：

待在冷氣房可穿棉質薄長袖長褲，衣物選擇吸汗透氣的材質，視情況可加穿披肩、小背心或襪子，避免著涼。

定時通風：

夏季濕氣重，即使天天吹冷氣，也建議每天打開窗戶換氣一次，如果濕氣較重時也可以使用除濕機保持乾燥。另外，也能使用空氣清淨機，維持室內的空氣品質。

夏季生產的媽媽不必擔心天氣炎熱影響休養。善用冷氣、飲食均衡、注意傷口與清潔，有需要時請家人幫忙照顧寶寶。讓自己多一點休息與放鬆的時間，身體自然能慢慢恢復、充滿活力。迎接育兒新生活的每一天。

來源：正確抱寶寶的方式

正確抱寶寶的方式

新生小寶寶的到來，對爸媽來說。人生的意義與過去大不相同，寶寶抱在懷裡。責任加重，卻也是最甜蜜的負擔。以下說明幾種照顧寶寶的入門技巧。

正確抱寶寶的方式

第一步：把手放在寶寶頭下

剛出生不久的新生兒，頭大身子小。頸部肌肉發育不成熟，沒有足夠力量支撐頭部重量。故家長須把一隻手輕輕地放到寶寶頭下，用手掌包住整個頭部並托住頸部。以支撐寶寶的頭。

第二步：另一隻手抱寶寶臀部

穩住頭部後，再把另一隻手放到寶寶的臀部下面，手掌包住整個臀部，力量集中在兩手腕上。

第三步：慢慢把寶寶的頭托起來

慢慢地把寶寶的頭托起來，但一定要注意頸部，否則寶寶的頭會往後仰而感到不舒服。家長要用腰部和手部力量配合，讓寶寶躺在臂彎中，貼近胸口處，這時也可以較為放鬆。

一般而言，一到二個月的寶寶盡可能橫抱在臂彎中，三個月後就可以豎著抱起。任何時候動作要輕柔，注意保護寶寶的頸部，讓寶寶感覺舒服。

由於胎兒在母體內已習慣母親的心跳節律，抱著寶寶緊貼左胸。傾聽爸媽的心跳聲，當他聽到熟悉的聲音時。會有安全感，更容易適應其情境。從而使寶寶情緒平復下來。

抱著寶寶時，多和他說話，並有目光的交流。這種感情交流，對孩子腦部及神經發育，以及身體生長都有著極大的好處。

來源：母乳哺育 你我一同守護- 四寶媽白家綺分享母乳哺育的經驗(影片)

母乳哺育你我一同守護 -四寶媽白家綺分享母乳哺育的經驗影片

不論名人或素人全民一同響應哺乳親密時光

影星白家綺自己小時候就是母乳寶寶，身為人母則全力支持母乳哺育。四個小孩都餵母乳，當工作忙碌。無法親餵母乳時，會擠奶保存再給寶寶喝。努力堅持哺餵母乳的她，感謝有神隊友老公讓她可以順利成功哺餵母乳。另育有五個月寶寶的哺乳家庭成員游先生說「太太哺乳過程很辛苦，自己工作忙。但是為了讓寶寶能夠成功哺餵母乳，產前會主動協助太太查詢正確資訊。產後也會幫忙溫母乳，或是打掃家裡。有的時候也會幫太太按摩，減輕壓力及調適心情。讓老婆哺乳可以輕鬆達陣。」，國民健康署呼籲全家人一起守護寶寶，支持媽媽哺餵母乳

來源：母乳哺育「奶爸與孩子的成長秘密」懶人包

母乳哺育「奶爸與孩子的成長秘密」懶人包

奶爸與孩子的成長秘密一次看懂哺餵母乳大小事

一 為什麼要哺餵母乳？

母乳的好處和營養

一 營養完整，量身定做

二 抗菌因子多，寶寶生病少

三 促進產後恢復

二 早期肌膚接觸為何很重要？

一 有利啟動寶寶依本能順利吸乳

二 促進親子關係

三 促進母親子宮收縮

四 讓寶寶更穩定

三 我如何知道寶寶獲得足夠的奶水呢

一 哪些是寶寶想吃的表現呢

寶寶飢餓暗示：伸舌頭、舔嘴唇、眼睛找、嬰兒有明顯的尋乳反射，可能出現吸吮自己的手。

二 如何確定寶寶有喝到足夠生長的奶水呢

依據尿布濕的片數、每天大便次數及嬰兒體重變化等，以判斷是否吃到足夠奶水供嬰兒成長

四 產後親子同室有那些好處呢

一 依 寶 寶 的 飢 餓 需 求 餵 奶

二 增 進 親 子 關 係 及 增 加 寶 寶 安 全 感 和 信 任 感

三 及 早 透 過 專 業 人 員 協 助 ， 增 進 照 顧 寶 寶 的 能 力

四 減 少 餵 奶 時 來 回 奔 波 ， 增 加 媽 咪 的 休 息 時 間

五 減 少 寶 寶 院 內 感 染 的 風 險

懶 人 包 - 奶 爸 與 孩 子 的 成 長 秘 密 奶 爸 與 孩 子 的 成 長 秘 密 懶
人 包 檔 下 載

來 源 ： 母 乳 哺 育 的 好 處

母 乳 哺 育 的 好 處

嬰 兒 期 營 養 的 黃 金 標 準 就 是 母 乳 ！ 母 乳 營 養 完 整 均 衡 ， 成
份 更 會 隨 著 寶 寶 成 長 而 調 整 ； 量 身 定 做 滿 足 寶 寶 各 階 段
的 生 長 需 求 。 質 量 並 重 、 容 易 消 化 吸 收 。 舉 例 來 說 ， 母 乳
中 的 鐵 五 十 能 被 寶 寶 吸 收 ， 牛 奶 中 的 鐵 則 只 有 十 被 吸 收
。

對 寶 寶 的 好 處

一 抗 菌 因 子 多 ， 寶 寶 生 病 少 ； 母 乳 含 有 A 型 免 疫 球 蛋 白 、 生
長 因 子 、 補 體 及 運 鐵 蛋 白 等 成 份 ， 可 以 增 強 嬰 兒 免 疫 力
， 嬰 兒 不 易 生 病 。

二 過 敏 風 險 低 ； 不 易 致 敏 ， 降 低 過 敏 性 疾 病 的 發 生 。

三 寶 寶 不 易 胖 ； 哺 餵 母 乳 可 以 降 低 兒 童 肥 胖 的 發 生 率 。

四 促 進 下 顎 發 育 ； 寶 寶 吸 吮 是 相 當 費 力 的 動 作 ， 需 要 上 下
顎 一 起 配 合 ， 才 能 夠 有 韻 律 地 吸 出 母 乳 。 因 此 ， 持 續 哺 餵
母 乳 。 讓 寶 寶 多 做 口 腔 運 動 ， 可 以 促 進 下 顎 發 育 。 有 助 於
寶 寶 語 言 發 聲 的 發 展 ； 而 上 下 顎 的 運 動 會 刺 激 到 腦 部 ，
具 有 活 化 腦 部 的 作 用 。

五 保 護 腸 胃 道 ； 母 乳 可 促 進 寶 寶 腸 胃 道 比 菲 德 氏 菌 的 增
生 ， 保 護 腸 道 ； 並 且 讓 腸 道 維 持 在 偏 酸 性 ， 進 而 抑 制 病 菌
的 繁 殖 。 此 外 ， 母 乳 中 的 蛋 白 質 和 脂 肪 容 易 消 化 ， 所 以 寶
寶 較 不 會 消 化 不 良 。

六 心 理 ； 人 格 正 向 發 展

一 奠 定 人 際 基 礎 ； 寶 寶 出 生 後 立 即 喝 母 奶 ， 是 再 自 然 不 過
的 事 情 。 所 以 透 過 哺 乳 ， 可 以 建 立 良 好 的 親 子 關 係 。 對 寶
寶 日 後 在 人 際 關 係 相 處 上 都 有 加 分 作 用 。

二 培 養 信 賴 感 ； 人 際 關 係 的 基 礎 有 賴 互 信 和 互 愛 。 英 國 的
動 物 學 者 德 斯 蒙 德 莫 里 斯 指 出 ， 出 生 後 的 嬰 兒 期 。 「 好 好
抱 住 寶 寶 」 ， 是 父 母 把 握 親 子 互 動 、 和 孩 子 維 繫 良 好 依 附

關係的機會之一；而「哺乳」。就是建立信賴感最直接的方式。

對媽媽的好處

一產後出血少：正確含吸乳房、刺激催產素作用，有利於子宮收縮與恢復，減少產後大出血。

二維持身材好妙方：孕期儲備的脂肪是乳汁製造的原料，可以幫助母親產後身材的恢復。

三媽媽罹癌風險低：可減少媽媽罹患卵巢癌及停經前乳癌的風險。

四自然避孕好：完全哺餵母乳六個月，自然避孕效果好。純母乳哺育，寶寶未滿六個月。而且媽媽月經還沒有來，三個因素都符合者。其避孕效果和其他避孕方式一樣好。

來源：母乳哺育的嬰幼兒吸吮表現

母乳哺育的嬰幼兒吸吮表現

嬰幼兒良好的吸吮是成功哺餵母乳最重要的關鍵因素，當寶寶無法有效吸吮。可能因為母親、嬰兒或雙方的因素，除了在母親身上可能因為奶水量分泌、乳房構造、母體疾病而影響哺餵狀況之外。嬰兒的部分也需要關切。

一、如何分辨「有效吸吮」

寶寶在媽媽的乳房上直接喝乳時需要『吸吮-吞嚥-呼吸』三要素，互相配合才能達成有效親餵。所以爸爸媽媽們可以觀察寶寶有無協調三要素的表現。寶寶吸吮時嘴巴應張得很大，含住大部分的乳暈，下巴貼著乳房、下唇外翻正確含乳。一開始可能吸吮的速度很快（一秒鐘兩三次），但是當奶水開始流出寶寶真的吸到奶水時，吸吮的動作會變慢（大約為一秒一次），接著是規律吞嚥動作、呼吸平穩協調。

當寶寶吃飽後會主動鬆口放開乳房，如媽媽餵乳前原有脹奶的感覺，在餵完奶後會覺得乳房較軟。寶寶喝到足夠的奶水量時，尿量及體重的表徵為三天大以上的寶寶每天的尿量一天有六次以上，量多而且顏色清澈（尿量約三塊乾尿布的重量）。頭四個月體重每月增加超過五公斤。

二、何謂「無效吸吮」

寶寶在吸吮時嘴巴像小鳥嘴一樣無法張大口正確含乳，媽媽感受哺乳全程乳頭都會疼痛、乳頭出現水泡、破皮。寶寶吸吮的速度較淺快、易滑脫，嘴巴無法一直固定在乳房上，因而讓寶寶吸入的奶水量少，吸吮很久卻沒有吞嚥或很久才吞一次。媽媽的奶水未被有效移出，乳房容易塞奶或造成泌乳量越來越少。

有些寶寶因為神經肌肉問題，肌肉張力過強或過低。也都會造成含奶及吸吮有問題，這時需要特別的醫療專業人員協助。甚至需額外的奶水補充。

三、採取措施哺乳協助

產後即刻肌膚接觸時，寶寶會逐漸自己尋找媽媽乳房，大約會在產後一小時到一個半小時憑著本能含上乳房開始吸吮喝奶，因此產後肌膚接觸的時間愈長愈好。這樣的過程會烙印在寶寶腦海，一出生無任何的干擾奶嘴、奶瓶就在媽媽乳房吸吮得到奶水，因此能讓親餵哺乳更快成功。但是有時寶寶因為媽媽使用麻醉性止痛藥物或其他原因減弱了主動性尋乳能力，此時會需要媽媽以及醫療專業人員的協助，讓寶寶儘可能在頭一個小時左右開始含乳吸奶。

哺乳姿勢採生物哺育法

媽媽半仰躺，讓寶寶採趴臥的姿勢在媽媽胸腹上面。媽媽手臂支托寶寶頭部、手掌支托臀部，肚子貼肚子、寶寶鼻頭對乳頭。這樣方式刺激哺乳相關反射，如尋乳、張嘴反射等。寶寶較不用花力氣去對抗重力及本身平衡的姿勢，能把力氣和注意力放在吸吮上。寶寶含乳姿勢不易滑動且較深。媽媽需利用枕頭做好背腰部或手的支撐，整個哺餵過程媽媽是輕鬆的。

有些寶寶喝奶又快又急，可能幾分鐘就喝夠了。

要特別注意含乳姿勢，是否會讓媽媽不舒服。寶寶有時會因為吸到大口奶水導致來不及吞嚥而嗆奶，此時可以改變餵奶姿勢例生物哺育法，減慢奶水流速。

醫療介入

如寶寶「無效吸吮」狀況仍持續出現，或有奶水進食量不足的表徵時，建議諮詢醫療專業團隊評估媽媽及寶寶是否有需個別處理的狀況。

結語：

母親在哺餵時，嬰幼兒吸吮不佳可能造成媽媽乳頭不適。或者是餵奶時寶寶會煩躁讓媽媽感覺被拒絕，或是沒有適當及早處理造成寶寶體重下降等。這些因素都可能讓產婦不想直接餵奶。所以先了解哺乳的相關知識及餵奶技巧，充分的產前準備讓後續的哺乳更加順利。產後哺乳除了保持心情愉快，更要以平常心面對哺乳時會遇到的問題，當碰到哺乳上的問題，一定要尋求專業人員協助。

來源：母乳哺育的支持及協助！

母乳哺育的支持及協助！

母乳哺育是很自然的事，但並不代表餵奶是一件容易的事，在產前先了解哺乳的相關知識及餵奶技巧，充分的產前準備能讓後續的哺乳更加順利。產後哺乳除了保持心情愉快，更要以平常心面對哺乳時會遇到的問題，當碰到哺乳上的問題，一定要尋求專業人員協助。

如何成功親餵寶寶

一準媽媽在懷孕後便可開始依照醫療專業人員或國健署孕產婦關懷網站提供哺乳相關資料做準備與規劃，告知家人未來計畫的哺乳方式，並請家人協助產後媽媽及寶寶的照護。

二產後即刻肌膚接觸早期吸吮建立安全感和彼此熟悉，開始肌膚接觸時，靠寶寶自己尋找乳房並含上乳頭開始吸吮，可刺激媽媽的泌乳激素增加。

三不限次數依寶寶需求哺乳有助於刺激奶水分泌，持續移出奶水也可減少乳房腫脹的情形。泌乳激素的濃度在夜間比較高，所以夜間哺乳對促進奶水分泌非常重要！

四左右乳房輪流持續哺乳擠乳寶寶吸完一邊乳房後再給他吸另一邊的乳房，可讓寶寶吃到足夠的母乳。比較有飽足感，如此兩邊乳房都受到刺激。都可製造奶水。

五確保寶寶含乳姿勢正確寶寶在吸吮乳房時必須含住乳頭和大部分的乳暈，下巴貼緊乳房，如此可以有效吸吮。餵奶時注意手指不要壓到乳暈阻塞奶水流出。如果寶寶無法一直由媽媽親餵時，媽媽一定要兩三個小時就將奶水擠出來，乳房才會持續分泌奶水。

六舒適環境與寬鬆衣物選擇舒適安靜的環境，也可藉由輕柔的音樂讓媽媽和寶寶身心愉快。日常衣著上應穿戴適當胸罩支持並保護乳房，以免因摩擦發生破皮現象，同時也要避免不合身窄小的胸罩壓迫乳房造成的壓力影響泌乳。

上班後哺乳

許多媽媽面臨產假結束，必須回到公司上班，便無法讓寶寶想喝奶就隨時親餵，這時媽媽就要考慮符合自己上班形態的餵母乳方式。通常可分為完全的瓶餵（可能是全母乳或混合配方乳）、或上班瓶餵母乳或配方奶下班親餵。

當親餵轉瓶餵或瓶餵轉親餵發生困難時，如何處理：

一寶寶拒絕親餵，請媽媽勿強迫寶寶。增加肌膚接觸、並輔以生物哺育法姿勢親餵；若母親的奶水不足時，需增加泌奶量。也就是增加哺乳或擠奶頻率，並可以考慮使用哺乳輔助器需專業哺育人員協助讓寶寶願意持續嘗試乳房吸吮。

二 寶寶拒絕奶瓶，仍要請媽媽勿強迫寶寶。避免在寶寶過餓時餵奶，請其他人餵食；可用母親的衣服包覆奶瓶；選擇適合的奶嘴並在餵奶前加溫奶嘴；嘗試不同的奶水溫度；餵奶時。輕微晃動嬰兒；嘗試在寶寶半夢半醒之間餵奶；或採用其他方法餵食如：滴管，湯匙。或杯子餵食。

母乳哺育的任何一個方式，對於母親及新生兒都是一項新事物的學習。在嘗試某項哺餵方式時，如果剛開始就出現挫敗或壓力，往往會讓母親放棄哺乳或新生兒抗拒哺乳。例如剛開始親餵時發生乳頭疼痛，就讓母親抗拒親餵；亦或者剛開始採用全親餵。後來嘗試替代哺餵方式時嬰兒產生抗拒，卻又強迫餵食；讓原來應該是美好的母乳哺育。卻變成兩敗俱傷。

什麼樣的哺育方法最適合母親？

其實沒有絕對答案，哺乳只是一個過程，對孩子的愛才是未來幸福的關鍵！只要母親能享受哺餵、陪伴嬰兒成長、母性得以發揮，那就是最適合的方式。

來源：母乳哺育與寶寶蛀牙的關連性

母乳哺育與寶寶蛀牙的關連性

很多人擔心母乳中的乳糖會造成蛀牙，但是根據醫學文獻研究結果發現，長期的哺餵母乳並不會造成蛀牙。哺餵母乳還可以減少咬合不正，顏面肌肉發展不全，及避免阻塞性睡眠呼吸暫停。

蛀牙主要的成因包括：

一 糖分的攝取。影響因素主要是牙齒暴露在糖分下的頻率，而不是所接受的糖分總量。也就是說，如果寶寶一天吃三顆糖，最好一次吃完，而不是分三次吃。

二 蛀牙菌進入口中的時間。蛀牙菌可以經由照顧寶寶的人傳染給寶寶，例如親吻、共用湯匙等。

三 胎兒發育期間媽媽的疾病或壓力。

四 家庭的飲食習慣不佳。

五 家庭的口腔及衛生習慣不好。

六 家族的遺傳性。

因此，母乳哺育和寶寶的蛀牙無關。然而，完全哺餵母乳並不能保證寶寶不會蛀牙，因為還有很多其他危險因子存在。根據美國兒童牙科醫學會（）發表的幼兒早期齲齒預防策略，以下是有效減少齲齒的方式

一 父母及同住家人養成潔牙習慣，減少牙齒上的的變形

鏈球菌數量，並避免唾液交換傳染的可能。

二 養成良好的口腔清潔習慣，長出第一顆乳牙前就要落實口腔清潔。

三 政府提供六歲以下兒童每半年塗氟保健服務，在嬰兒六個月大長出第一顆乳齒起。應定期由兒童牙醫評估追蹤，為孩童評估齲齒風險並提供家長諮詢與預防措施相關衛教。目前衛福部口腔健康司為兒童口腔健康每半年提供兒童牙齒塗氟治療補助，請家長善加利用。

四 避免奶瓶餵食、不飲用含糖飲料。

五 餐後潔牙，正確使用牙刷、牙膏與牙線：學齡前幼童由家長協助並督導潔牙工作，在孩童尚未能獨立將牙齒刷乾淨時，父母應幫孩子再刷一次牙。

人類乳汁中含有免疫球蛋白（A）和免疫球蛋白（G）可以減緩鏈球菌生長速度，乳鐵蛋白可抑制牙菌斑生長…等成分，可以保護牙齒免於蛀牙的侵害、修補受損的琺瑯質、抑制幼兒早期齲齒的發展。根據目前最新實證醫學文獻中，母乳哺育與蛀牙的風險評估分析結果發現

一一歲以下的兒童，哺乳時間越長，有較低的齲齒風險。

二 哺乳超過一歲以上的兒童，比哺乳小於一歲者，有較高的齲齒風險。一歲以上的兒童，如果夜間有哺乳且哺乳較頻繁的兒童，有較高的齲齒風險即奶瓶性齲齒。但因超過一歲的兒童，缺乏有關直接哺乳、奶瓶餵食、不哺乳也未用奶瓶餵食、頻繁哺乳、甜食或含糖飲料攝取以及口腔清潔有無與頻率的研究，導致無法找出這些危險因子間的關聯性。

綜上，該實證醫學文獻結論顯示：一歲以下嬰兒哺乳可以減少齲齒風險，哺乳超過一歲以上的兒童，齲齒風險增加的原因尚待進一步的研究。理想的嬰幼兒餵食為純哺乳哺餵六個月，之後開始添加副食品並持續哺乳到兩歲或兩歲以上，當哺乳嬰幼兒長出牙齒後就應該落實潔牙政策、定期牙醫檢查並持續哺乳，讓嬰幼兒獲得哺乳的好處也減低齲齒風險。

來源：母乳寶寶排便狀況

母乳寶寶排便狀況

喝母乳的寶寶在頭一兩個月的大便通常是稀稀水水，帶一點黏液。有一點顆粒，有一點酸味。甚至一吃就解。這是因為母乳中含有豐富的乳糖，會被腸道中的乳糖酶分解吸收。部分沒被分解的乳糖在腸道中發酵產氣，刺激腸蠕動。產生像腹瀉般的軟便。這是正常的大便，不是腹瀉。前提是媽媽的奶水豐沛，又頻繁換邊哺餵。導致嬰兒吃到的都是富含乳糖的前奶有的寶寶這樣的大便情況會一直維持到添加固體食物時才比較成形，但是。有些寶寶的大便情況在一兩個月後反而變成三四天才解一次，通

常仍然還是軟便。最久甚只可以一兩個禮拜才解一次軟大便，這並非便秘。只要嬰兒沒有腹脹、嘔吐或哭鬧不安，體重增加與小便量很正常的話，就可以不用太擔心。

母乳寶寶大便可能次數一天多次或多天一次，依寶寶體質而定。因此母乳便較稀且次數較多次是正常的現象，不過要注意寶寶生長的情形。若體重一直沒有增加，且一直拉稀便。建議還是要就醫由小兒科醫師診斷，必要時開立藥物使用。若大便次數多次，很容易引起尿布疹。所以要更加勤換尿片，可用清水將屁股洗乾淨並拭乾。暫時不要用粗糙的濕紙巾，以免過度摩擦肌膚。造成寶寶皮膚損傷不適。

來源：母乳是嬰兒6個月以前最好的食物

母乳是嬰兒六個月以前最好的食物

母乳是嬰兒六個月以前最好的食物，母乳中所含的蛋白質、脂肪及醣類較易吸收消化；母乳的免疫球蛋白、促腦細胞發育物質具物種專一性，而且不會有牛奶或羊奶異種奶蛋白的致過敏性，這都是母乳勝過配方奶的優點。即使在寶寶出生六個月之後，母乳中仍然含有適合嬰幼兒的營養成分。

一歲之後配合副食品餵食並持續依著寶寶的需求哺乳時，母乳還可以提供約三分之一的寶寶所需要的熱量，滿足超過一半的蛋白質，以及約九成的維他命所需。所以聯合國兒童基金會及世界衛生組織皆鼓勵純母乳哺育到出生六個月，之後給嬰兒添加副食品同時，可以持續哺育母乳至二歲或二歲以上。

喝母乳嬰兒會不會有缺鐵性貧血？

不同哺乳動物的奶所含的鐵都不多（五到七毫升），但是它們之間有很重要的差異存在。牛奶中的鐵只有百分之十被吸收，而母乳中的鐵有百分之五十可以被吸收。早期喝牛奶為基礎之配方奶的嬰兒可能因為得不到足夠的鐵而有貧血，因此現在的嬰兒配方奶粉絕大部分都有額外添加鐵。健康的足月嬰兒在前四到六個月純母乳哺育不會有缺鐵性貧血，但是六個月左右嬰兒本身的鐵存量不夠。開始需要經由添加副食品額外補充鐵，如果副食品餵食不足。就並須再額外補充鐵劑每日一毫克公斤體重。

鐵主要存在於紅色的肉類，芝麻、紫菜、紅豆、蠶豆、豬肝、牡蠣、魚類、乾果也是鐵的來源，市面的嬰兒米麥粉也有添加鐵。副食品補充不足者，宜額外補充鐵。如果嬰兒本身有一些特殊狀況，如早產兒或者出生後有失血者，本身的鐵存量可能不足者，就更需要提早補充鐵。

添加副食品的十項原則

一 在六個月大開始給予其他食物。

二 持續哺育母乳到二歲或更久。

三 依寶寶饑餓的表徵及進食能力做回應，幫助並鼓勵不強迫進食。耐心慢慢地餵，讓寶寶嘗試不同的食物、口味和口感。減少進食時的干擾。

四 安全地準備和保存食物。

五 逐漸增加副食品餵食的量。

六 依孩子的興趣及能力，變換食物的黏稠度及增加食物的多樣性。

七 逐漸增加餵食副食品的次數。

八 給予富含營養的食物。

九 以維生素和礦物質維護健康。

十 寶寶生病時更頻繁的哺餵母乳。

如有相關疑問，仍建議諮詢專業醫生喔。

來源：淺談減痛分娩

淺談減痛分娩

在人類歷史中，許多女性在生命過程中經歷懷孕與生產，生育既可能帶來喜悅與成就感，也常伴隨身體上的不適與疼痛。長久以來，由於醫療條件有限，分娩的痛苦往往被視為難以避免的自然過程。

直到十九世紀中葉，醫學技術逐漸發展。一千八百五十三年，麻醉劑首次公開應用於英國的維多利亞女皇分娩過程中。麻醉師以面罩讓她吸入麻醉藥，使她在較少疼痛的情況下順利產下第八個孩子。

這一事件在當時引起廣泛關注，也促使無痛分娩逐漸被社會接受並在歐洲推廣。隨著醫療科技的進步，人們開始重新思考分娩與疼痛的關係——分娩不再必然意味著必須承受劇烈痛苦，而是可以透過醫療與照護，讓女性在更安全與更受尊重的條件下迎接新生命。

產痛慘痛

產痛到底有多痛

真正的產痛是十分恐怖的（臨床疼痛指數上產痛是排名第二，僅次於燒灼傷痛），更何況產痛有時候是遙遙無期不可預測。

其實產痛不只是疼痛的感覺而已，另一方面還會影響到待產女性的生理及心理方面。因為疼痛，可能使母親的血

壓上升、心臟工作負荷增加，因而子宮血管收縮，影響胎盤功能。也會造成骨盆肌肉無法放鬆，影響產程進展。而產痛的不良經驗甚至會造成產後憂鬱症的發生，因此適當的止痛對母親及小寶寶皆有助益的。

甚麼是分娩的疼痛

分娩通常分為下面三個階段：

第一產程子宮發生有規律間歇性的收縮到子宮頸全開。

第二產程子宮頸全開到胎兒娩出。

第三產程胎兒娩出到胎盤娩出。

其中第一產程的疼痛，主要因為子宮的收縮及子宮頸的擴張而引起，而其痛覺神經是經由第十、十一、十二胸椎十萬一千一百一十二及第一腰椎一神經節所傳遞至中樞。

第二產程的疼痛，主要因為陰道擴張及會陰壓迫而引起，而其痛覺神經是經第二至第四薦椎神經二百三十四所傳遞（陰道和會陰的疼痛）。

產痛以第一產程的中後期因為子宮的收縮加劇及子宮頸的快速擴張最為疼痛，稍後第二產程的痛覺傳到會陰及肛門處，且伴有便意感，但疼痛的程度稍減。因此無痛分娩的目標就是減少第一產程中後期的疼痛。

什麼是無痛分娩？

廣義的無痛分娩，是利用衛教、心理治療、藥物或儀器等等方式來達到減輕產痛的目的。例如靜脈或肌肉注射止痛劑、吸入性麻醉劑、衛教如拉梅茲呼吸減痛法、區域性神經阻斷術等等；而目前公認最有效、安全及普遍的方式就是硬脊膜外腔麻醉，也就是現在我們稱的無痛分娩或減痛分娩，可以將產痛減輕八、九成。

生產過程使用硬脊膜外腔麻醉，適當的麻醉藥劑量下，藥物沒有直接進入血管與胎兒直接接觸，因此極少對胎兒有影響。用這個方法來減少生產時的痛苦，理論和實際上都很安全。

無痛分娩施打方式及過程

經婦產科醫師評估，無痛分娩（硬脊膜外腔麻醉）於子宮規則收縮、開始陣痛時實施。經由專業麻醉醫師執行，在腰椎局部麻醉並放置一條很細的留滯導管至硬脊膜外腔。提供持續性給藥，主要就是要阻斷第一產程的痛覺神經傳遞。及持續低劑量用藥至第二產程，再配合醫護人員指導下用力。則能達到更好的止痛效果及順利生產。麻醉止痛藥物注入後，產婦立即可感受到疼痛減少，甚至完全沒有痛覺，而且子宮收縮及產婦下肢活動力則不受影響。

無痛分娩可能發生的副作用

無痛分娩在各大醫院施行，對產婦及胎兒是相當安全的，絕大多數的待產婦皆能緩解產痛。但它還是可能發生一些副作用，例如：暫時性的發抖、低血壓、嘔吐，以及較少見的頭痛、腰酸背痛、感染、抽筋、藥物過敏或麻醉止痛不全的情況。

無痛分娩對有麻醉專科資格醫師而言，是一種相當成熟的技術，所以在美國約七、八成的產婦接受無痛分娩。由於時代的進步，生活型態改變，孕婦高齡化，產痛已有愈來愈難以承受的趨勢。所以適當的減痛分娩，不會讓產婦畏懼生產。可提高自然生產比率，進而樂意生產。高興地一起迎接寶貝的到來！

來源：準備好再次當爸爸了嗎？

準備好再次當爸爸了嗎？

再次當爸爸通常會比第一次當新手爸爸來得更從容些，不過，從備孕起下方各層面小叮嚀提醒您，幫助您做好再次當爸爸的準備。

生理層面

備孕下一胎時，如果間隔比較久，就要注意伴侶是否體力上有落差、生理狀況改變、有準備好再次懷孕嗎？

一般建議與前胎產後間隔一年以上再受孕，除了讓媽咪身體有足夠的修復期，夫妻也能先專心照顧小嬰兒。如果間隔沒有超過六個月，再懷孕時較容易有早產或低出生體重的風險。

心理層面

在小寶加入之前，先考慮自己準備好了嗎？因為爸爸就要肩負起部分照顧較大孩子的任務及角色，讓伴侶可以有時間多休息，減少媽媽在身體及精神上的壓力。其次也請考量大寶準備好了嗎？建議先和大寶溝通，讓他理解家中即將多了弟弟或妹妹。也可以帶他去公園玩，多陪伴他。以舒緩他的不安。

經濟層面

前一胎經歷過的產檢、生產、坐月子等花費，下一胎同樣要面對。接下來寶寶出生後還有生活、醫療、教育等等支出，花費變雙倍。提醒爸媽要做好財務規劃。

生活層面

懷孕是爸媽共同要面對的事，您會需要再次和伴侶經歷產檢、生產、育兒過程，而社交活動也將會改變。回家陪伴

孩子是爸爸需要肩負的責任，取而代之的是孩子加倍的歡笑聲。

來源：準備當媽咪！懷孕初期飲食營養重點

準備當媽咪！懷孕初期飲食營養重點

飲食營養重點

為了照顧好媽媽和胎兒的健康，孕期的營養著實重要。俗話說「一人吃兩人補」，然而孕期的飲食並非多吃就好，而是同時兼顧營養均衡。可以諮詢專業醫師及營養師，協助您在孕期建立良好的飲食習慣。

熱量零大卡，蛋白質十公克

懷孕初期所需的熱量就和平時相近，飲食營養蛋白質建議增加十公克。一般人每日的蛋白質攝取量為體重（公斤）乘以十一公克，若體重是五十公斤。孕期每日建議蛋白質攝取量即為六十五公克（五千零一十一萬一千零六十五）。素食孕媽咪也要攝取足夠的優質蛋白質黃豆及其製品、蛋類、奶類及其製品，讓胎兒健康成長。

蛋白質怎麼吃？

女生一個手掌大小、厚度的蛋白質類食物約有二十一公克蛋白質，以體重五十公斤的孕媽咪來說，三餐都吃約一個手掌大小的豆魚蛋肉類，蛋白質就接近建議攝取量囉！

*每日蛋白質實際建議攝取量，需視孕媽咪體重、年齡、活動量等情形調整。

整個孕期都要補足的營養素

葉酸、鐵、碘、維生素十二是懷孕開始每天都要攝取足量的關鍵營養素，如果在日常飲食中攝取不足，建議在醫師處方下，額外食用營養補充劑。

延伸閱讀：

【健康九九】食在好孕-吃對營養寶媽都健康手冊

初期胃口不佳，怎麼辦？

孕吐、噁心、脹氣…，懷孕初期腸胃的各種不適，讓孕媽咪胃口不佳，吃不下卻又擔心影響寶寶健康。您可以試試看這樣做：

口味清淡：口味重的料理特別是油膩的食物容易引起噁心感。清淡飲食可以減少腸胃的刺激。

少量多餐：將每次飲食份量減少，增加用餐次數，水也小口小口的喝，避免反胃。吃完東西後不要馬上坐下，走動

一下幫助消化。

液體固體分開吃：例如吃完飯後不要馬上喝湯，避免引起噁心嘔吐。

補充維生素六：食物來源如糙米、小麥、肝臟、瘦肉、蛋、豆類等。

若真的吃不下，孕媽咪也別心急。懷孕初期胎兒的營養來源是卵黃囊，不需要因為擔心寶寶沒有養分而強迫自己進食。依自己的狀況調整飲食即可。

孕期咖啡因，少量攝取

目前沒有相關研究報告顯示咖啡因是否會增加孕期的風險，但專家仍建議孕媽咪每天攝取咖啡因不超過二百到三百毫克，一天一杯不擔心。要留意！除了咖啡，茶、可樂、巧克力等也都含有咖啡因。

延伸閱讀：

【國民健康署】孕期營養迷思破解

來源：準媽媽健康操

準媽媽健康操

每日宜適當運動，並注意運動相關安全事項。產前運動可以減少陣痛時的疼痛，減少生產時情緒及全身肌肉的緊張、增加產道肌肉的強韌性，以便順利生產。但有些準媽媽的情況可能不適合產前運動，最好請醫護人員評估及指導。

運動時，需注意：

運動前先排空膀胱。

應穿寬鬆之衣服，並解開帶扣。

最好在硬板上做。

常見的產前運動種類

腿部運動：懷孕早期開始做

目的：增加骨盆附近肌肉及會陰部彈性。

作法：手扶椅背需注意椅子穩固，左腿固定。右腿成三百六十度的轉動，做畢後還原。再換腿繼續做。

腳部運動：懷孕早期開始做

目的：雙腿抬高運動

一 促進下肢靜脈血之回流。

二 伸展脊椎及臀部肌肉張力。

作法：平躺仰臥，雙腿垂直抬高。足部抵住牆，可維持三到五分鐘。每天反覆數次。

盤腳坐式：懷孕三個月後

目的：

一 鍛鍊腹股溝之肌肉及關節處韌帶之張力。

二 防止懷孕末期，由於膨大的子宮壓力所產生的痙攣或抽筋。

作法：平坐於床墊上，兩小腿平行交接，一前一後，兩膝遠遠分開。每天一次，每次由五分鐘增至三十分鐘。

腰部運動：懷孕六個月後

目的：減少腰部之酸痛，幫助生產時腹壓增強及會陰部之彈性，以利生產。

作法：手扶椅背需注意椅子穩固，慢慢吸氣。同時手臂用力，使身體的重力集中於椅背。腳尖立起，使身體抬高、腰部挺直、然後慢慢吐氣。手臂放鬆、腳還原。

腹部深呼吸：懷孕末期做

目的：幫助放鬆肌肉，減少宮縮產生腹部的壓力。

作法：有宮縮產生時，集中注意力，慢慢將氣深吸入至腹腔，使腹部凸出。盡量緩慢吐氣至全部呼出後感覺肌肉的放鬆。速度依宮縮劇烈程度調整，每分鐘六到九次，每次練習一分鐘。做時緩慢吐氣及完全吐氣，可預防頭暈現象。

胸式呼吸：懷孕末期做於第一產程腹部深呼吸仍無法放鬆時

目的：幫助放鬆肌肉，減少宮縮產生腹部的壓力。

作法：

一 集中注意力輕吸氣直到胸部完全充盈。

二 吐氣至全部呼出吐盡，並感肌肉放鬆。

三 呼吸速度依宮縮劇烈程度調整為六到九次分鐘以上，每次練習一分鐘。

四 呼吸時注意盡量放慢，並至最後盡量吐盡，可預防頭暈

來源：準媽媽檢查篇 讓寶寶安全的成長

準媽媽檢查篇 讓寶寶安全的成長

早產是指寶寶在懷孕滿二十週至未滿三十七週時出生。
早產寶寶的照顧不容易，是新生兒死亡的主要原因。

若出現下列類似早產徵兆的情形，應盡快就醫才能降低早產風險。

早產徵兆

一小時內有六次以上或十到十五分鐘有一次的子宮收縮，休息三十分鐘仍無改善，這些收縮不一定有疼痛感，但肚子會變硬或有下墜感。

類似月經來時的悶痛感或來之前的脹痛感。

子宮與陰道的壓力，有下墜感或陰道有壓迫感。

其他方法無法改善的下背痛。

持續不斷的腹瀉或腹部絞痛。

陰道水樣、黏液和血液樣分泌物增加。

感覺胎動較平常減少一半以上。

如果您有上述任何症狀，可能為高危險妊娠孕產婦，請記得向醫師說明協助診斷，以確保自己和胎兒的安全。當您在懷孕過程中出現任何緊急狀況時，請至高危險妊娠孕產婦及新生兒照護品質中度、重度級急救責任醫院就醫

有關早產兒相關福利，請洽財團法人台灣早產兒基金會)

來源：準媽媽檢查篇 認識孕期貧血

準媽媽檢查篇 認識孕期貧血

台灣有將近一到兩成孕婦在初期產檢時為貧血，而在生產時更高達三到四成。而孕期貧血可能造成胎兒過小、發生早產，增加周產期死亡率，或產生發展遲緩、注意力不足、智力障礙等問題

。也可能增加孕產婦心肺負擔，造成頭暈、暈倒。傷口癒合不良，子宮收縮不良、難產、產後憂鬱等。以及使產後大出血的孕婦更加危險，因此孕產婦及醫療照護提供者須特別注意。

懷孕時鐵質的需要量增加，孕期第一期及第二期建議攝

取量十五毫克天，第三期與哺乳婦則建議配合補充劑之使用增加攝取至四十五毫克天，以及每天攝入六葉酸

，以預防孕產婦貧血。鐵的補充除了供應孕婦本身及胎兒所需外，並大量貯存在胎兒體內，以供嬰兒出生後六個月內使用。孕期鐵營養不足可能對胎兒的腦部與精神症狀造成不良影響，建議多攝取富含鐵質食物。請參考營養素的重要食物來源

若抽血結果血紅素

<一百零五，

那就表示有貧血

。輕微貧血者，大多先補充鐵劑並評估其療效。倘若治療後無良好反應者，則需進一步的處置或檢查。同時改善其不良反應的原因或找出病症，如腸道吸收問題（對口服藥劑吸收不良或是搭配制酸劑一起服用而導致吸收不佳）。無法規則性用藥或有其他部位合併慢性出血等。如孕婦無法使用口服鐵劑者，也可以考慮給予靜脈注射鐵劑。若為嚴重貧血者（血紅素<六）會導致胎兒氧氣運送不足，進而造成胎兒窘迫

、羊水量減少，甚至胎兒死亡，就會建議緊急輸血

。孕期及產後需持續追蹤貧血情形及療效，並持續有效的治療至產後六到十二週。

預防孕期貧血小撇步

一 孕前補充葉酸

建議每日攝取葉酸應達四百微克

，有懷孕計畫的婦女，可在懷孕前三個月即開始

留意葉酸的補充。

二 攝取含鐵食物

建議每日鐵攝取量達十五毫克

，並在飯後二小時內搭配富含維生素的水果幫助鐵質吸收。

三 維生素十二很重要

建議每日攝取維生素十二應達二十四微克

，全素食者建議可在醫生指導下，補充維生素十二補充劑。

四 蛋白質不可少

每餐飲食注意要有蛋白質食物做搭配，才可以提供足夠的造血元素。

來源：準媽媽檢查篇 贏在起跑點

準媽媽檢查篇 贏在起跑點

懷孕期間媽媽的心境變化，會影響到胎兒。因此懷孕期間請隨時保持平靜愉快的心情。

問透過產前檢查，可以知道寶寶的狀況嗎？

答懷孕六到八週可以由超音波看到心跳。懷孕十二週以上，就可以用都卜勒儀器由準媽媽腹部聽到胎兒的心跳聲。第一胎在十八到二十週就可以感受到胎動；第二胎更早，可能十六週就可以感受到嘍！

問胎位於何時方有意義

答在懷孕七個月以前，羊水較多，胎兒較小，胎位時有變更。七到八個月後，胎位才會固定。

來源：準媽媽檢查篇 趕走對胎兒的不良影響

準媽媽檢查篇 趕走對胎兒的不良影響

趕走對胎兒的不良影響

懷孕期間藥物安全性分級表

級別定義

在懷孕婦女的對照臨床試驗中，無法證實對懷孕第一期或較後期胎兒有風險、或對胎兒傷害的可能性。

動物試驗未顯示對胎兒有危險，但缺乏懷孕婦女的對照臨床試驗資料；或者，動物試驗顯示對胎兒有不良反應，但懷孕婦女對照臨床試驗無法證實對胎兒有危險。

動物試驗顯示有致畸性或殘害胚胎，但沒有懷孕婦女的對照臨床試驗；或者，懷孕婦女的對照臨床試驗或動物試驗均缺乏資料。

已證實對人類胎兒有危險，但在一些狀況如有致命危險的狀況或在嚴重疾病其他較安全的藥品無法使用或無效，必須利益大於潛在的風險才可以使用。

在動物及人體試驗、及或臨床經驗證實會造成胎兒異常，這種風險遠超過可能的利益。

孕婦在懷孕期自行補充維他命及營養補給品，應先諮詢醫師及藥師，以避免過量服用對胎兒造成危害。

相關藥品安全資訊請至衛生福利部食品藥物管理署查詢

來源：準媽媽檢查篇 遠離先天性疾病

準媽媽檢查篇 遠離先天性疾病

海洋性貧血

台灣常見的單基因遺傳性疾病之一，大約有六的人為帶因者，身體狀況通常與一般人類似。分為甲型與乙型，夫妻若為同型帶因者。則每次懷孕，其胎兒有十四機會罹患重型海洋性貧血。會危及準媽媽或胎兒的生命及健康。甲型重型患者於胎兒時期便會出現胎兒水腫，而乙型重型患者將須終生輸血、施打排鐵劑來維持生命。因此，孕婦在第一次產檢時，應接受「孕婦海洋性貧血篩檢」。發現準媽媽及準爸爸的「平均紅血球體積」(MCH)八十，需接受後續的帶因者確診；若夫婦為同型海洋性貧血帶因者，應進一步接受胎兒產前遺傳診斷及遺傳諮詢。

因此，孕婦在第一次產檢時，應接受「孕婦海洋性貧血篩檢」。發現「平均紅血球體積」較小的準媽媽及準爸爸，需接受後續的帶因者確診；若夫婦為同型海洋性貧血帶因者，應進一步接受胎兒產前遺傳診斷及遺傳諮詢。

唐氏症

唐氏症是一種最常見的染色體異常疾病，也是導致智能障礙的最主要病因；平均每八百位孕婦，就可能有一位會懷有唐氏症胎兒。唐氏症篩檢則是一種用來估計胎兒罹患唐氏症風險的檢測，若篩檢結果為高風險者，建議應接受絨毛取樣或羊膜穿刺檢查，以確定胎兒是否為唐氏症患者。

現行的唐氏症篩檢有兩種方式，分別為：第一孕期十一到十四週母血唐氏症篩檢。以超音波檢查胎兒頸部透明帶和鼻樑骨，並抽取孕婦血液進行血清標誌分析。此項檢查可檢出八十二到八十七的唐氏兒；第二孕期十五到二十週母血唐氏症篩檢，則是抽取孕婦血液進行血清標誌分析。此項檢查可檢出八十的唐氏兒。

建議年齡滿三十四歲以上孕婦、曾生育過染色體異常胎兒、或家族成員有染色體異常者，可直接接受羊膜穿刺術檢查。以診斷胎兒是否為唐氏症患者；而未滿三十四歲的孕婦則可先接受唐氏症篩檢，篩檢結果若為高風險者。則應進一步接受絨毛取樣或羊膜穿刺檢查，以確定胎兒染色體是否異常。

來源：準媽媽生活保健DIY

準媽媽生活保健

衣著

選擇寬鬆、吸汗材質，保持身體舒適及衛生。

穿著低跟、防滑的舒適鞋子，避免跌倒。

平常應戴上胸罩，支持並保護乳房。

休息與睡眠

每天睡足八小時，中午最好有三十分鐘的午睡。

白天注意身心狀態，可做短暫休息。

懷孕末期宜採側臥，休息時抬高雙腳，以促進下肢血液循環減少水腫。

活動

避免攀高、舉重或提重物。

可作家務，但不可勞累。

散步是最好的活動，也可依醫護人員的評估及指導，進行適當的產前運動。

性生活

原則上不需禁止，但曾有早產或流產症狀者，懷孕最初三個月及最後兩個月宜暫停。

此次懷孕有子宮頸閉鎖不全或前置胎盤，或目前尚未足月但有陰道出血及陣痛等情形者，應禁止。

在性行為的過程中，若孕婦產生子宮強烈收縮、不正常出血、嚴重下腹痛等，應停止性行為，儘快就醫。

性伴侶若有茲卡病毒感染症流行地區旅遊史，懷孕期間之性行為均應使用保險套。

排泄

宜每天排便。

不憋尿，有尿意時即排尿，不減少水份攝取。

宜多吃蔬菜、水果、多喝開水，以促進大小便暢通。

口腔衛生

建議婦女在準備懷孕前就作好牙科治療。養成良好的口腔衛生習慣，包括：睡前要刷牙。一天至少刷二次，平常使用含氟牙膏刷牙；少甜食、多漱口。減少牙齒傷害。可持健保卡至牙科醫療院所定期接受口腔檢查；以及每天至

少一次使用牙線棒或牙間刷清潔牙縫，不要共用牙刷。若口腔出現不舒服症狀，一定要就醫處置。

懷孕時可能使原有齲齒、牙周病惡化，建議產前每三個月可至牙科醫療院所接受牙結石清除服務。

沐浴

孕期避免身體泡高溫熱水澡及溫泉。

應採淋浴，避免盆浴，尤其最後兩個月。

陰道分泌物會增多，宜保持會陰部清潔、乾燥。

環境及工作的暴露

某些工作場所上的危害，可能會影響胎兒的健康。因此，懷孕婦女應瞭解如何預防某些職場的危害；當懷孕婦女可能會接觸到危害物質或作業時，

請洽詢事業單位依法配置之勞工健康服務醫護人員，若該事業單位依法毋須配置勞工健康服務醫護人員，可洽請勞動部職業安全衛生署委託辦理之各區勞工健康服務中心提供協助電話：八億零六萬八千五百八十。

旅遊

懷孕期間如果計劃在國內或到國外旅遊時，請告知您的醫師。懷孕期間旅遊，可能會產生問題；儘可能先瞭解旅遊目的地及過境地區的醫療照護服務。如無必要應暫緩前往茲卡病毒感染症流行或其他影響母胎安全疾病流行地區，若必須前往。請做好防蚊措施。

來源：準媽媽生活篇 準媽媽生活保健DIY

準媽媽生活篇 準媽媽生活保健

衣著

選擇寬鬆的、吸汗材質，保持身體的舒適及衛生。

穿著低跟、防滑的舒適鞋子，避免跌倒。

平常應戴上胸罩，支托保護乳房。

休息 & 睡眠

每天睡足八小時，中午最好有三十分鐘的午睡。

白天注意身心狀態，可做短暫休息。

懷孕末期宜採側臥，休息時抬高雙腳，以促進下肢血液循環減少水腫。

活動

避免攀高、舉或提重物。

可做家務，但不可勞累。

適當運動是重要的，可依醫護人員的評估及指導，進行產前運動。

性生活

原則上不需禁止，但曾有早產病史或流產症狀者，懷孕最初三個月及最後兩個月宜暫停。

此次懷孕有子宮頸閉鎖不全或前置胎盤，或目前尚未足月但有陰道出血及鎮痛等情形者，應禁止。

在性行為的過程中，若孕婦產生子宮強烈收縮、不正常出血、嚴重下腹痛等，應停止性行為，儘快就醫。

性伴侶若有茲卡病毒感染症流行地區旅遊史，懷孕期間之性行為均應使用保險套。

排泄

宜每天排便。

不憋尿，有尿意時即排尿，不減少水份攝取。

宜多吃蔬菜、水果、多喝開水，以促進大小便暢通。

口腔衛生

建議婦女在準備懷孕前就作好牙科治療。養成良好的口腔衛生習慣，包括：睡前要刷牙，一天至少刷二次；平常使用含氟牙膏刷牙；少甜食、多漱口，減少牙齒傷害。可持健保卡至牙科醫療院所定期接受口腔檢查；以及每天至少一次使用牙線棒或牙間刷清潔牙縫，不要共用牙刷。若口腔出現不舒服症狀，一定要就醫處置。

懷孕時可能使原有齲齒、牙周病惡化。建議產前每三個月可至牙科醫療院所接受牙結石清除服務。

沐浴

孕期避免身體泡高溫熱水澡及溫泉。

應採淋浴，避免盆浴，尤其最後兩個月。

陰道分泌物會增多，宜保持會陰部清潔、乾燥。

環境及工作的暴露

某些工作場所上的危害，可能會影響胎兒的健康。因此，懷孕婦女應瞭解如何預防某些職場的危害；當懷孕婦女可能會接觸到危害物質或作業時。請洽詢事業單位依法配置之勞工健康服務醫護人員，若該事業單位依法毋須配置勞工健康服務醫護人員。可洽請勞動部職業安全衛生署委託辦理之各區勞工健康服務中心提供協助電話：八億零六萬八千五百八十。

旅遊

懷孕期間如果計劃在國內或到國外旅遊時，請告知您的醫師。懷孕期間旅遊，可能會產生問題；儘可能先瞭解旅遊目的地及過境地區的醫療照護服務。

如無必要應暫緩前往茲卡病毒感染症流行或其他影響母胎安全疾病流行地區，若必須前往，請做好防蚊措施。

懷孕期間能不能搭機出遊？

飛機上的濕度較低，容易使人體血液濃縮。妊娠期間由於生理性靜脈擴張，加上黃體素作用。發生血栓症的機會較高；搭機久坐也會對原本有下肢水腫、腹腔靜脈受到胎兒壓迫的孕婦，產生靜脈栓塞、早產的風險。

另外，隨著飛行中的低艙壓狀態。增加心肺功能調適負荷，對於有心臟病、嚴重貧血、或是有其他高危險妊娠的孕婦。可能帶來風險！

飛行旅程過度勞累也可能導致流產與早產的可能，由於飛機上無法提供良好的生產醫療環境，一旦發生破水、急產等，相當危險。臨床建議第三孕期不要搭飛機。

建議

有異常出血或下腹悶痛等症狀應避免長途飛機旅遊。

如果計畫到國外旅遊時，請告知您的醫師並聽從醫師建議。

最好有親友相伴，假使身體不適或需要提些重物，應有人幫忙協助。

搭機時避免長時間維持同一姿勢，造成血液循環不良，可多活動，維持適當周邊循環。

懷孕期間規劃旅遊前，儘可能先瞭解旅遊目的地過境地區的醫療照護服務，避免前往衛生條件不佳的地方。

孕期旅遊注意相關事項，可電洽國民健康署免付費孕產關懷諮詢專線八百到八十七萬零八百七十，或至孕產兒關懷網站查詢相關資訊。

準媽媽生活篇吃出健康

準媽媽生活篇

吃出健康

孕產婦體重增加及一般飲食原則

孕期的營養不僅影響媽媽也影響胎兒健康。如果對熱量與營養素攝取有疑問，建議找合格營養師做進一步的營養評估與諮詢以獲取最適合自己的飲食改善建議。

一 標準體重：懷孕期間，孕婦體重應依懷孕前體重做適當調整。以增加十到十四公斤為宜，且須注意體重增加的速度。懷孕期間不適於減重，孕期體重增加指引請參考下表。

孕期體重增加指引

身體質量指數 體重公斤 身高平方公尺

二 熱量

懷孕自第二期起，每日需增加三百大卡的熱量。但每個人每天的總熱量，需視孕婦的年齡、活動量、懷孕前的健康狀況及體重增加情形，而加以調整。

哺乳婦熱量的需要每日以增加五百大卡為宜。

三 蛋白質

自懷孕第一期起，因胎兒發育所需，每日需額外增加十公克的蛋白質。蛋白質來源中一半以上來自優質蛋白質，如：奶類製品、豆漿、豆腐、豆干等黃豆製品、魚、蛋、肉等。

哺乳期間建議哺乳婦每日應增加十五公克蛋白質的攝取，蛋白質來源中一半以上應來自優質蛋白質。

孕婦及哺乳婦可能對部分重金屬如甲基汞等的危害較為敏感，所以對於重金屬濃度偏高之大型肉食性魚類如：鯊魚、旗魚、長鰭鮪、油魚等。建議應減量攝取，但可透過適量攝取其他小型魚類。獲取所需營養，並分散風險。

四 懷孕婦女較容易發生便秘。建議主食應多選擇全穀及未精製雜糧，並攝取充足的蔬菜水果，獲得足夠的膳食纖維，以預防便秘。

五 懷孕哺乳期許多維生素及礦物質的需求量增加，攝取量應達到國人膳食營養素參考攝取量。孕產婦應均衡攝取六大類食物，多攝取深色蔬菜、全穀及未精製雜糧，且應以天然食物來源為主，而非選擇單一營養素或礦物質補充劑。若有飲食與營養疑問，建議洽詢營養師進行飲食評估以瞭解個人化改善飲食的建議，或可在醫師處方指

導下，補充孕婦專用的營養補充品。

六 礦物質

鐵懷孕時鐵質的需要量增加，孕期第一期及第二期建議攝取量十五毫克天。第三期與哺乳婦則建議配合補充劑之服用增加攝取至四十五毫克天，鐵的補充除了供應孕婦本身及胎兒所需外。並大量貯存在胎兒體內，以供嬰兒出生後六個月內使用。孕期鐵營養不足可能對胎兒的腦部與精神症狀造成不良影響。建議多攝取富含鐵質食物，如海產類（文蛤、章魚、蚵仔等）、肝臟、紅色肉類，及深色蔬菜莧菜、甜豌豆、紅鳳菜等。

碘婦女懷孕時碘嚴重不足時有可能會影響胎兒腦部發育，造成新生兒生長遲緩和神經發育不全，甚至增加嬰兒死亡率。孕婦碘建議二百二十五微克天，哺乳婦建議二百五十微克天；建議使用含碘鹽並適量攝取含碘量較豐富的食物，如：海帶及海藻等。

鈣孕婦及哺乳婦鈣建議攝取一千毫克天，以滿足胎兒嬰兒的生長和母體的需要。鈣質豐富的食物，如：牛乳、乳製品、高鈣豆製品（如：傳統豆腐、豆干）、深綠色蔬菜等。

鈉懷孕期間若有高血壓或水腫等症狀，則應控制鈉的攝取量。

備註：礦物質攝取量應達到國人膳食營養素參考攝取量，並且不超過其上限攝取量。

七 維生素

懷孕及哺乳期間大部分維生素的需要量均增加。

一 葉酸

國內十年來嬰幼兒神經管缺陷平均發生率約為萬分之七。依據美國實證研究顯示，孕期攝取足夠的葉酸可減少五十到七十胎兒的腦及脊髓的先天性神經管缺陷的發生。建議育齡婦女每日建議攝取四毫克葉酸，準備懷孕婦女則在受孕前一個月至懷孕期間，每日攝取六百微克的葉酸，哺乳婦建議每日攝取五百微克的葉酸。

葉酸廣泛存在於許多食物中，如：綠色蔬菜、肝臟、豆類及水果如柑橘類，葉酸攝取建議應優先由天然植物中多樣攝取。如果在日常飲食中攝取不足，建議在醫師處方指導下，補充葉酸錠劑。若曾生育過神經管缺損而或者罹患有糖尿病的孕婦，建議補充每日四毫克的葉酸。

二 維生素十二：

母親維生素十二於缺乏或是不適當的狀態下，可能會導致胎兒的神經管缺陷。維生素十二豐富的食物主要為動物性來源食物，其中肝臟、肉類、奶、蛋等含量最豐富。對於全素者，應特別注意維生素十二的補充，建議採用全素

的孕乳婦可多食用紫菜、紅毛苔、強化維生素十二的營養酵母等食物以攝取維生素十二，並與醫師討論補充劑的使用時機。

三 維生素：

每日建議攝取量為十微克，主要經由陽光暴曬於皮膚上產生。故建議露出臉部、手臂等身體部位接受適度日曬，且多食用富含維生素的食物。如魚類、雞蛋、強化維生素的乳品或奶粉等。

八 食物的選擇要均衡，孕婦、哺乳婦應減少或避免攝取下列食物

菸、酒、咖啡與濃茶。

脂肪含量多的食物，如：肥肉、油炸食物等。

煙燻加工食物，如：醃肉、鹹蛋、鹹魚、火腿、豆腐乳等。

空熱量食物，如：糖果、可樂、汽水等。

九 懷孕初期若有噁心、嘔吐等現象，應少量多餐及選擇低脂肪且無刺激性的食物。早晨醒來時，可吃少量全穀雜糧類食物，如餅乾、饅頭等改善孕吐。在懷孕末期，避免碳水化合物及脂肪攝食過多，造成體脂肪增加。

十 不明來源的中藥非經合格中醫師確認用藥用量及用法者，應避免食用之。

營養素的重要食物來源

營養素名稱食物來源

蛋白質

乳品類、豆類與豆製品、魚類、蛋類、肉類

鎂

全穀類、堅果、綠色蔬菜

碘

含碘食鹽、海帶

鋅

蛋、核桃、海鮮類、全穀類

鈣

乳品類、豆類與豆製品、小魚乾

鐵

肝臟、海藻、魚、蛋黃、紅肉、全穀類、深綠色蔬菜

維生素

全脂牛奶、乳酪、魚油、深黃色蔬菜和水果

維生素

添加維生素的牛奶、魚肉、蛋黃

維生素

蛋黃、花生、植物油、蔬菜、乾果、全穀類

維生素一

糙米、全穀類、堅果、豆類、豬肉

維生素二

酵母、全穀類、綠色蔬菜、牛奶、蛋

維生素六

全穀類、魚、肉類、水果、堅果、蔬菜

維生素十二

肉、魚類、牛奶、蛋、味噌、健素、酵母粉

維生素

各種水果，如芭樂、柑橘類、蕃茄，以及蔬菜，如：甜椒、花椰菜

葉酸

深綠色蔬菜、肝臟、黃豆製品、柑橘類水果

菸鹼素

肉類、魚類、全穀類、核果、豆類

膳食纖維

全穀類、蔬菜、水果、乾豆類、核果類、種子類

來源：準媽媽生活篇 當個舒適自在的準媽媽

媽媽生活篇 當個舒適自在的準媽媽

懷孕期間生理心理都會有些改變，準媽媽遇到一些不舒服的症狀時可以如何處理？

一 頻尿

原因子宮擴大壓迫膀胱，或心理因素。

處理方法

有尿意感立即前往排尿。

白天增加液體攝取量，夜間為減少小便次數，可在晚餐以後減少液體攝取量。

噁心、嘔吐

原因荷爾蒙改變、代謝改變、情緒因素、空腹。

處理方法

起床前先吃些蘇打餅乾、乾吐司或穀類食品後，再下床。

避免在用餐腹部飽脹時大量喝湯或喝水。

少量多餐、避免空腹飢餓，可在兩餐間補充食物。

避免油膩、不易消化或調味濃烈之食物。

孕吐後用開水漱口，以去除噁心味。並可喝少許開水，將胃酸沖離食道，以減少食道灼傷的機會。

二 便秘

原因

食不足，運動量減少，腸胃蠕動減慢及缺乏纖維質食物引起。

子宮增大使得小腸位移，或子宮壓迫直腸所致。

補充鐵劑而引起。

處理方法

水分充足，一天要攝取二千之水份。

適度的運動，早晚做散步活動。

多吃有渣的蔬菜、水果、全穀及未精製雜糧。

養成每天定時排便的習慣。

必要時依醫師處方服用軟便劑，切勿自行服用成藥。

三 陰道分泌物增加

原因受體內荷爾蒙影響，子宮頸分泌增加。

處理方法

注意清潔，每日淋浴，勿用消毒水清潔外陰部。

如廁後衛生紙由陰部往肛門處擦拭，勿來回擦拭以防感染。

勿穿褲襪或緊身衣褲。

宜穿透氣棉質內褲，濕即更換，勿用不透氣護墊，易悶及潮濕。

若分泌物多且有搔癢、灼熱感、臭味情形，應就醫。

四 抽筋、下肢水腫及靜脈曲張

原因骨盆腔壓力增加造成下肢血液回流減少。

處理方法

保持下肢溫度。

攝取含鈣較多的食物，如乳品、深綠色蔬菜、黃豆及其製品、乾豆類、小魚乾。

抽筋時將腿伸直，以手由足底向小腿方向推、按摩。

休息時可將下肢抬高，使血液循環較流暢。

五 出血性問題

原因可能與流產、早產及胎盤位置有關。

處理方法

懷孕期間之出血及凝血障礙會導致嚴重的問題，包括流產。如果準媽媽有出血或凝血障礙，請告知您的醫師。

六 痔瘡

原因便秘、腹瀉、用力使靜脈內壓力增加，增大的子宮壓迫靜脈阻礙循環所致。

處理方法

養成定時排便習慣，避免便秘，蹲坐用力，久坐或久站。

溫水坐浴。

疼痛厲害可看醫師，使用軟便劑或止痛軟膏。

三餐多攝取全穀及未精製雜糧，新鮮水果，多喝水，以預防便秘。

七 腰酸背痛

原因姿勢不良，子宮擴大使腰薦椎的曲度增加，懷孕期荷爾蒙改變使關節軟化、鬆弛而導致。

處理方法

保持正確姿勢，背部保持平直，勿彎腰駝背。

避免拿重物久站、久坐或太勞累。

坐時腰背應有支托。

使用托腹帶支持腹部，減輕背部過度用力。

按摩腰或背部以促進血液循環。

八 胃灼熱、心口灼熱

原因食道括約肌鬆弛導致胃酸逆流。

處理方法

少量多餐，避免一次進食太快或過多。

避免甜食或油膩、不易消化或油炸的食物。

進食後宜半坐臥，不要馬上躺下。

嚴重時可在醫師的建議下服用制酸劑止、吐藥物。

九 蛀牙、牙齦炎、懷孕期牙齦增生、牙周病惡化

原因荷爾蒙改變、進食次數明顯的增加、懷孕的初期對酸性食物特別偏好、常會反胃及吐酸水。

處理方法

維持良好的口腔衛生習慣。

定期口腔檢查懷孕婦女牙結石清除。

飲食應攝取充足的新鮮蔬果，以獲得充足的維生素，保護牙齦健康。

健保署提供女性於懷孕期間每九十天可接受一次洗牙服務包含牙結石清除、牙菌斑偵測、去除維護教學及新生

來源：準媽媽生活篇 認識產後憂鬱症及防治

準媽媽生活篇 認識產後憂鬱症及防治

寶寶出生了，有的媽媽會有一點情緒低落或心情不穩定。這些現象大部分會在幾天後消失；然而，少數個案卻是狀況嚴重。需要專業介入治療。因為這些情緒症狀可能是不自覺，或是被忽視，可能造成個人及家庭的困擾，甚至傷害等情況。

產後憂鬱症是產後情緒障礙的一種，發生的原因目前仍然不清楚。可能跟生理、心理及社會因子有關，例如：周產期發生重大生活壓力事件、生產時體力耗費、生產過程經歷重大身心創傷等；此外。產後媽媽須負責照顧新生兒角色，育兒的辛勞壓力、人際互動的改變與調適。或因懷孕造成身體外觀的改變等，也會造成憂鬱。

如何知道自己有沒有可能有產後憂鬱？

我們建議產後媽媽可以利用下面兩個問題，進行簡易評估。

過去一個月，是否常被情緒

低落、憂鬱或感覺未來沒有希望所困擾？

過去一個月，是否常對事物失去興趣或做事沒有愉悅感？

如果上述兩個問題的確發生在您的身上時，建議您尋求協助，或透過心理衛生機構協談及轉介。同時也可以告知您的婦產科醫師，家庭醫學科醫師或兒科醫師。或精神科身心科醫師，以適時提供診斷、會談及必要的藥物協助。以避免傷害的發生。

產後情緒障礙分類產後憂鬱症是產後情緒障礙的一種：

產後情緒低落

盛行率：約有三到八成左右

常見的發生時：：通常出現於產後三到四天內

病程長短：情緒低落現象，通常幾天便會消失

症狀：焦慮、心情低落、脾氣暴躁、疲憊、容易流淚、失眠、頭痛、做惡夢等

處理方式：

一屬暫時性症狀；通常不需治療即會自行緩解，但家人需多給予心理支持。

二若症狀持續超過兩星期，便需要尋求進一步之醫療協助及診斷。

產後憂鬱症

盛行率：約有一成

常見的發生時間：通常出現於產後六週內

病程長短：症狀會持續數週至數個月

症狀：憂鬱、情緒低落、脾氣暴躁、疲憊、失眠；常有罪惡感或無價值感；飲食障礙、容易流淚、無法專心、對週遭生活及喜歡的事物失去興趣或常覺得無法應付生活；覺得自己無法照顧好嬰兒等情形；嚴重者甚至有自殺的想法。

處理方式：需要接受醫療協助及照護

產後精神病

盛行率：每千例的生產個案，約有一到兩位

常見的發生時間：通常出現於產後二週內

病程長短：症狀會持續數週至數個月

症狀：情緒激動不穩定、哭泣、失眠、個性行為改變；出現妄想或幻覺現象，如：媽媽可能誤認嬰兒已死亡或被掉包；症狀嚴重者，可能會有傷害自己或家人的妄想等

處理方式：需要接受醫療照護，及住院觀察治療

如何因應情緒低落或產後憂鬱症？

自我生活調適・尋求支持與協助

產後情緒低落，通常在產後的三到四天發生，而第五天達最明顯：通常產後兩週內就會消失。大部分的個案只需要家屬、朋友多予照顧與支持即可恢復。建議新手媽媽照顧新生兒時，可利用嬰兒睡眠時，多讓自己休息，不要陷入過度疲憊或睡眠不足的狀態。儘可能由其他家人分擔及減輕產後媽媽的家事清潔等勞力工作，給自己一些喘息休息的機會。同時應適度的向家人或親朋好友說出您的感受，也可以跟其他產後媽媽分享彼此的經驗與心情。將能得到相當的幫忙。

尋求醫療與心理衛生資源

如果產後情緒低落的症狀一直無法改善，甚至持續時間長達二週以上時，建議應立即尋求協助。可至各醫療院所婦產科、家庭醫學科、小兒科或精神科身心科尋求協助

，或可洽各地方政府衛生局社區心理衛生中心尋求相關心理衛生服務資源。對於產後憂鬱症的治療，通常及早診斷及早治療，越容易成功治癒。如果有產後憂鬱症時，切勿慌張，通常醫師會給予抗憂鬱藥物，並輔以會談諮商或進一步給予心理治療。此時，如果需要持續哺餵母乳者，可與您的醫師討論用藥成分及劑量。

積極接受診療，避免病症加重

如果發生嚴重產後精神病時，產後媽媽除了會出現情緒激動不穩定、哭泣、個性行為改變之外，甚至會出現妄想或幻覺現象。可能會造成傷害嬰兒，自殘或是自殺，必須接受積極治療，以免造成不幸。

結語

大部分的產後媽媽都會有輕微產後情緒低落現象，可在家人及朋友的關懷與支持下可以很快的獲得緩解，若一旦出現症狀加重或久久不能改善時，應立即協同家人尋求醫療的幫助。

給家屬的一段話

產後憂鬱或產後憂鬱症可能常被忽視或不自覺，因此常無法得到家人或親友即時的支持及抒發。家屬們經由一些簡單的對談聊天，給予傾聽、陪伴及支持，是能讓產後媽媽們自在的談敘個人想法及感受，並讓其情緒獲得抒發。同時，產後媽媽在照顧新生兒時。需耗費相當的體力，也常致睡眠不足。因此，家人應該去分擔照顧新生兒及家庭勞務。減輕產後媽媽的身體負擔；平時多關心產後媽媽，如果發現有產後憂鬱的現象且長時間無法緩解。甚至加重時，應立即尋求醫療協助。

社區心理衛生中心

一、衛生福利部「心快活」心理健康學習平台：於「心專欄」及「心課程」提供孕產婦相關心理健康文章及課程影片供瀏覽。

二、衛生福利部一千九百二十五安心專線（依舊愛我）：提供二十四小時免費心理支持服務。

三、各地方政府社區心理衛生中心：提供心理衛生宣導、教育訓練、諮詢、轉介、轉銜服務、資源網絡聯結、自殺防治、物質濫用防治及其他心理衛生等服務。

「心快活」心理健康學習平台一千九百二十五安心專線依舊愛我社區心理衛生中心名單

來源：準媽媽的健康注意事項-預防新生兒病毒感染

準媽媽的健康注意事項-預防新生兒病毒感染

一些病菌的感染，在懷孕期間可能經由母體傳染給寶寶

。或於生產過程中，經由接觸母親的血液與分泌物而感染。因此須特別注意，例如：陰道感染、型肝炎、梅毒、德國麻疹、乙型鏈球菌、水痘、愛滋病、腸病毒等。如果發生這些感染，應儘早就醫，接受適當的治療，才可保障媽媽及胎兒的健康。

預防新生兒病毒感染：

孕婦在生產前後，如出現發燒、上呼吸道感染症狀、腹瀉、肋肌痛、心肌炎等疑似病毒感染情形。可透過分娩時或產後之接觸而傳染給新生兒，產婦應加強在接觸嬰兒前後做好戴口罩、勤洗手等感染防護措施。以降低傳染給嬰兒之機會。

新生兒感染後，可能出現發燒、厭食、嘔吐、焦躁不安、臉色蒼白、心跳快速、活動力下降、嗜睡、呼吸淺快、發紺、全身有出血點、瘀青、黃疸等症狀，甚至可能導致死亡。

照顧者應注意觀察，如有上述症狀，請儘速就醫。

為避免懷孕期間受到病菌感染，準媽媽應多注意：

一 均衡飲食、適度運動，以加強個人的免疫力。

二 注意個人衛生，勤洗手。

三 少到公共場所，避免接觸感染源。

四 提高警覺，如有不明原因的發燒症狀，應告訴醫師。

來源：準爸爸待產準備功課

準爸爸待產準備功課

準爸爸除了陪同媽媽產檢外，當接近預產期時。一起準備入院待產時所需要的用品，置入適當的小包中待產包。方便生產時可以快速攜帶，才不會手忙腳亂喔

一 孕婦健康手冊與健保卡身份證

健保卡與孕婦健康手冊記載了準媽媽就醫與產檢等相關記錄，及雙方的身份證正本。

二 能顯示秒數的鐘錶

準爸爸可以幫助媽媽記錄陣痛的頻率，提供醫護產人員瞭解生產的進度。

三 盥洗用品與內衣物

準備一定數量的換洗衣物。產後衛生護墊、會陰沖洗用品與衛生紙、濕紙巾等。

四 保暖衣物

生產後媽媽可能比較容易感覺寒冷，出院時也需要適當的保暖衣物。包括棉襪、外套、睡覺時的毛毯等。

五 毛巾

不論是盥洗後的擦拭或是新生兒餵奶與清潔的需求，建議多準備幾條毛巾進行交替使用。

六 哺乳相關衣物與用品

前開扣式的胸衣與睡衣，方便哺乳的進行。吸乳器、溢乳墊等用品也是哺乳時所需要的。

七 飲食相關用品

吸管、筷子、湯匙、杯子等飲食所需的餐具。

八 嬰兒用品

寶寶出院當日所穿的衣服、鞋襪、包巾等用品。

九 返家的交通工具

準爸爸除了安排照護準媽媽與新生兒住院期間的生活之外，也記得安排好返家時的交通工具。開車載送二歲以下幼童時，應選用安置於車輛後座之攜帶式嬰兒床或後向幼童用座椅。並檢查安全座椅有正確安裝及穩固，以守護母嬰的乘車安全。

孕婦住院用品待產包，亦可參考各醫療院所清單備妥

來源：準爸爸於懷孕中後期的必做功課

準爸爸於懷孕中後期的必做功課

一 陪同進行產前檢查

藉由產檢的過程，醫師可以即時掌握媽媽與寶寶的健康現況。並給予適當的協助與處置，如果時間允許。建議準爸爸也應參與產檢的過程，與準媽媽共同為迎接新生命做準備。藉由超音波檢查的過程，準爸爸可以與即將誕生的新生命提早見面。

二 一起進行寶寶胎教與命名

隨著胎動越來越明顯，常常與準媽媽與肚子裡的寶寶講話、唱歌，放鬆媽媽的心情刺激寶寶的感官發育。一起討論寶寶的命名，準媽媽與準爸爸更可以體會到寶寶存在的真實感。

三 舒緩準媽媽乳房不適

懷孕過程中媽媽的乳房乳腺會開始腫脹，協助媽媽進行乳房的按摩，可以促進乳腺發育並舒緩乳房的不適。

四瞭解生產過程

陪同準媽媽一起瞭解生產的過程，適時安撫媽媽的不安的情緒。與媽媽討論適當的生產方式選擇，合適的情況下也可以與媽媽一起陪產，讓媽媽體會到準爸爸的參與及支持。

五一起準備生產用品與嬰兒用品

陪同媽媽列出用品清單，一同採購生產用品與小寶寶的衣服和汽車安全座椅，為迎接新生命做好準備。

孕婦住院用品待產包，亦可參考各醫療院所清單備妥

嬰兒用品準備

來源：準爸爸於懷孕初期的必做功課

準爸爸於懷孕初期的必做功課

一關心媽媽的身體變化

隨著懷孕的過程，媽媽的身體會逐漸產生變化，從害喜、味覺、嗅覺改變至心理的情緒化反應，媽媽必須面臨相當大的轉變。此時準爸爸可以適時給予關心，瞭解準媽媽的身體狀況，並給予適時地協助。

二分享媽媽的心理情緒

準爸爸可以儘量找出時間陪伴準媽媽，不論是生活瑣事的討論與分享。或是身體與心理變化的關懷，讓準媽媽安心地知道她不是獨自一個人面對這些改變。並且感激準媽媽為迎接新生命所做的努力。

三分擔準媽媽的家務事

準爸爸可以主動分擔準媽媽的家務事。隨著懷孕過程中，準媽媽身體的改變。可能不再適合進行某些日常家務事，準爸爸可以表現出貼心負責的一面。主動分擔準媽媽的家務事，讓準媽媽在安心安全情況下順利待產。

四幫準媽媽按摩舒緩

隨著胎兒的成長，準媽媽身體上的負擔與不適症狀也隨之增加。準爸爸可以幫準媽媽進行舒緩腿部的按摩，或是對不適症狀的安撫。都是讓準媽媽感受到關懷以及增進夫妻間情感的好表現。

五適應懷孕帶來的生活改變

為了迎接健康新生命的到來，必須避免對胎兒健康可能有影響的行為，有抽菸習慣的準爸爸可以開始考慮戒菸了。孕婦的飲食習慣可能隨著懷孕而改變，準爸爸可以貼心地適應並給予鼓勵。

來源：準爸爸母乳哺育支持

準爸爸母乳哺育支持

哺餵母乳和其他照顧寶寶的議題都需要父母一起做決定，必須兩個人都覺得哺乳是很好的一件事，一起討論彼此的問題和擔憂才容易順利哺乳。爸爸及家人可以提供媽媽重要的情緒上支持，你們的愛可以讓哺乳更順利。爸爸及其他家人可以和小寶寶一起做的事很多，例如：

換尿褲尿布

洗澡

抱寶寶給媽媽餵奶

媽媽餵奶後協助拍嗝

抱著寶寶，享受肌膚接觸的時光

安撫寶寶

和寶寶說話，唱歌給他聽

當媽媽洗澡、吃飯時，主動照顧寶寶

陪寶寶玩

來源：準爸爸迎接新生命的第一堂課

準爸爸迎接新生命的第一堂課

一 以喜悅的態度迎接新生命

懷孕對準爸爸與準媽媽都是相當特別的生命體驗，可能交雜著驚訝、歡喜、困惑、壓力的情緒。如果是在非預期的情況下發現懷孕，更可能會感到煩惱或憂慮，準媽媽更會很敏感很介意另一半的態度與決定。建議準爸爸以喜悅正面的態度面對新生命來臨的消息，給予準媽媽感激與肯定。

二 撫慰準媽媽的不安

迎接新生命的到來，會影響夫妻之間甚至整個家族的生活型態，家中的經濟來源是否可以負擔？未來小孩要誰帶？種種問題可能伴隨著迎接新生命的喜悅後慢慢浮現。準爸爸必須適時地擔任撫慰準媽媽心理與支持家庭的支柱，讓媽媽可以安心地度過懷孕的過程。

三 調整心情迎接甜蜜的負擔

準爸爸必須調整心情迎接準媽媽懷孕的過程，面對未來經濟、家務、工作、心理上的改變，準爸爸面對的衝擊並不小於準媽媽。建議可以向有育兒經驗的親友同事請教，以喜悅的心情迎接這個甜蜜的負擔。

來源：漏尿、下墜感找上身！產後骨盆鬆垮垮如何解？

漏尿、下墜感找上身！產後骨盆鬆垮垮如何解？

順利把寶寶生下來後，媽媽們原本以為可以鬆口氣。沒想到產後幾個月，卻發現一些難以說出口的害羞困擾。像是一打噴嚏就會漏尿，下腹部時常感覺到下墜感等等。不知道如何解決？其實這些症狀都與「骨盆鬆弛」有關，媽咪們必須重視這類的問題，並積極找尋改善方法，才能不影響日常生活。

懷孕、生產，都會影響骨盆的健康

骨盆屬於一個骨骼構造，位於脊椎末端，連接脊柱和股骨。為了準備懷孕及生產，女性的骨盆構造天生與男性不太相同。女性的骨盆內擁有多種重要器官，包含卵巢、子宮、輸卵管、膀胱、直腸、輸尿管等。同時也具備承載重量的功能。

而骨盆的底部是由肌肉群所支撐，負責撐起在骨盆內的器官。以維持骨盆腔的穩定，當女性懷孕後。子宮會隨著胎兒的重量逐漸變大，骨盆底肌需要協助撐起因懷孕而變大的子宮。而孕期體內又會分泌鬆弛素，使得孕媽咪的關節、肌肉等部位變得鬆弛。增加彈性，以便往後的生產。因此，骨盆底肌自然也會受到影響。長期下來，骨盆底部的肌肉功能不足。就會導致「骨盆鬆弛」。

在分娩的過程中，骨盆底肌會隨著產程的進展。漸漸變得鬆軟，胎兒也會隨著子宮收縮而開始下降。整個產程都會壓迫到產道周邊的肌肉，對骨盆腔造成莫大的壓力。倘若產婦用力的方式又不正確，就可能加重對於骨盆腔及肌肉的傷害。

骨盆鬆弛，下墜感、漏尿為常見困擾

生產次數多、多胞胎、胎兒過大等條件的媽咪，產後容易導致骨盆鬆弛，一旦沒有重視骨盆鬆弛的問題，就可能出現像是下墜感、尿失禁等困擾。

孕期受到孕肚及腹壓的影響，骨盆底部的肌肉逐漸失去彈性。沒有足夠的力氣去支撐骨盆腔內的器官，導致膀胱、子宮等出現脫垂。這就是為什麼媽咪在產後會有明顯的下墜感，也會因為不小心打了個噴嚏、大笑一聲。就造成漏尿。更嚴重的情況，可能需要靠手術才能改善。

另外，子宮及膀胱的脫垂。會連帶影響到尿道，引發解尿困難、泌尿道感染等。也會影響腸胃道功能，增加便秘的機率。

通常骨盆鬆弛約會在產後兩個月內恢復，倘若不是太嚴重的情況。一般媽咪不會有太明顯的感覺，不過還是建議。當產後身體復原差不多時，就要進行適當的運動。來增加骨盆底肌的力量。

「骨盆運動」不偷懶，有效加強骨盆底肌力量

想要強化骨盆底肌群的強度，最簡單的方式可從骨盆運動，也就是俗稱的「凱格爾（Kegel）運動」做起！最好是從孕期就開始做，並持續到產後。才能有效鍛鍊肌肉的強度及延展性，有助生產時更加順利。更能降低產後骨盆鬆弛的嚴重程度。

凱格爾運動就好像是小便到一半時，先停止排尿的動作。然後停留五至十秒，感覺到陰道口及肛門口的收縮。再放鬆十秒，每天約練習二十次左右。平躺在床上時，也可將臀部夾緊、雙膝併攏，運用臀部的力量撐起下半身，呈現有如「橋式」的動作。

最後提醒媽咪，產後務必視自身的恢復狀況。再來決定何時開始進行骨盆運動，月子期間盡可能減少往下蹲的動作。讓骨盆腔獲得足夠的休息。

媽咪們一旦發覺，骨盆鬆弛造成的漏尿等困擾。已影響到日常生活，請找尋專業醫師的協助。與醫師共同討論適合的治療方法，別讓骨盆鬆弛問題。打擾甜蜜的產後育兒時光！

來源：為什麼懷孕後常忘東忘西的

為什麼懷孕後常忘東忘西的

許多孕婦抱怨在第二孕期、第三孕期有記憶力減退的現象，但經過客觀的神經心理測驗並沒有呈現有異常結果；以二千零一十八年加拿大婦女健康研究單位分析從一千九百九十年以後有關婦女記憶力的研究，懷孕婦女記憶功能的減退可能跟妊娠期間合併有憂鬱症狀有關。研究顯示有些婦女在懷孕期間會降低外顯語言的記憶能力，但並不會影響內顯記憶的能力，而在工作上面的記憶並不會受到太多的影響。印度的另一份針對孕婦的研究，利用客觀的測試。發現孕婦有很高的比例無法回憶起剛剛看到的字，因而發現在懷孕期間。神經的傳導介質，如腎上腺素、血清素、多巴胺都有明顯的下降。這些狀況會影響到神經系統的活動，可能與記憶力減退有關。不過，通常在產後就會回復。

來源：為什麼懷孕會造成痔瘡？

為什麼懷孕會造成痔瘡？

痔瘡是因為肛門內壓力上升，使得肛門直腸黏膜下層的靜脈發生擴張及曲張而形成。痔瘡的主要症包括出血、疼痛、脫垂、肛癢、排困難等，造成的原因有長期便秘、久坐久站或因病長期臥床、缺乏運動、蔬果攝取不足、懷孕的婦女、肥胖以及一些會引起腹內壓升高的疾病等。

懷孕婦女比一般人更容易患痔瘡，因為懷孕引起腹部壓力增高。隨著胎兒成長，子宮逐漸擴大。腹部下腔靜脈的壓迫也日益加重，妨礙下肢血液回流。使得痔核經常在充血狀態。增大的子宮也會壓迫到直腸末端，阻礙糞便排泄。由於用力排便及痔核充血，造成痔瘡發作；而孕婦在分娩時用力過度。痔瘡會更嚴重，造成脫肛、出血及腫痛。另一方面，孕婦的活動量降低。使得胃腸蠕動減慢，糞便在腸內停留時間較長。糞便內水份被再吸收導致大便乾燥，更加重排便困難。乾燥的糞便在排泄時擦破痔瘡黏膜而出血，甚至使原有的痔核脫垂於肛門外。罹患痔瘡的孕婦往往因肛門劇烈疼痛，行動不方便而更怕排便，形成惡性循環。

除了懷孕易造成痔瘡外，便秘、低纖維飲食及水份攝取不足也都容易引發痔瘡。因此孕婦在懷孕期間，要注意補充膳食纖維及水份，養成良好的排便習慣，有便秘問題時配合婦產科醫師診治使用軟便劑改善。在懷孕期間出現痔瘡，治療的目標以緩解疼痛症狀為主，因為許多的痔瘡問題會在生產之後自動改善，手術治療最好等到生產完一段時間後再考慮進行。

貼心提醒：

一 養成定時排便習慣，保持大便通暢，避免便秘。

二 高纖維飲食，應多吃綠色蔬菜及水果，並攝取充足的水份二千天。

三 避免排便時閱讀報章、雜誌，因為長時間蹲坐馬桶會導致局部過度充血。

四 避免長時間久坐或久站，適度的運動，早晚做散步活動。

五 溫水坐浴，方法：浴盆中注入三十八到四十度的溫水。坐在溫水盆中十到十五分鐘，一天可進行三至四次。幫助肛門周遭的血液循環，能舒緩痔瘡的不適。

六 有腫痛厲害、排便困難時，可就醫依醫師處方服用軟便劑或止痛軟膏。

來源：為什麼會流產照顧伴侶的訣竅

為什麼會流產照顧伴侶的訣竅

懷孕過程中，偶爾會有無法預期的狀況來敲門。根據研究

統計顯示，懷孕過程約有十到十五%的自然流產發生率。而且超過半數的流產是因為胚胎本身異常，屬於自然淘汰的機轉！所以，流產比想像中還常見。通常年紀越大流產機率較高，不是不做什麼。或是不吃什麼就不會流產，流產毋須自責。攜手度過就是最好的陪伴。

何時準備再次懷孕比較好

身體與心理都需要一些時間調適與恢復，建議與醫師討論，待身體恢復良好，再重新準備下一次的懷孕計畫。

若有習慣性流產，曾發生超過三次（含）小於十二週的流產。或是特殊疾病造成流產，請伴侶雙方一起配合醫師做檢查。找出真正原因並接受治療。

照顧流產伴侶的方式

一接納對方的情緒，不一定要說很多安慰的話，有時溫暖的擁抱勝過言語。

二容許彼此可以有傷心的時間，聊聊內心感受，給彼此加油鼓勵。

三補充優質的蛋白質修復體力，例如：雞蛋、雞肉、魚肉、牛肉，或是黃豆類製品等。

四可以請教中醫師，準備適宜的中藥燉補湯品。

五外出旅行，藉由大自然風景，與伴侶一起轉換心情。

來源：為什麼要做妊娠糖尿病篩檢？

為什麼要做妊娠糖尿病篩檢？

一妊娠糖尿病的孕產婦，由於懷孕期間過高的血糖會通過胎盤而影響胎兒，因而造成胎兒過大、新生兒低血糖、新生兒黃疸、肩難產的風險；對母體而言則會增加剖腹產率，二十年後半數的婦女也可能演變成慢性糖尿病。有家族史、高齡、肥胖、曾經發生死胎、胎兒畸型、產檢發現胎兒過大、羊水過多等症狀的孕婦為妊娠糖尿病的高危險群。

二政府於一百一十年七月起將七十五克口服葡萄糖耐受性試驗納入一般產檢補助項目，係參採（）在二千零一十年提出之建議，使用七十五克口服葡萄糖耐受性試驗來診斷妊娠糖尿病。於妊娠二十四至二十八週安排空腹八小時的七十五克口服葡萄糖耐受性試驗，以空腹血糖九十二；口服葡萄糖後第一小時血糖一百八十；第二小時血糖一百五十三為標準，符合以上三項當中一項（含）以上，即診斷為妊娠糖尿病。

三診斷為妊娠糖尿病的孕婦，經由飲食控制及運動的方式通常能維持正常的血糖，飲食控制之建議為：

一應根據懷孕前進行整體熱量攝取規劃，並以懷孕期間體重增加及每日血糖值進行熱量攝取的調整，建議您與營養師共同協商的飲食計劃，養成定時定量的飲食習慣。

二均衡飲食，依據飲食計畫適量攝取主食類、水果類、油脂類、奶類和肉魚蛋豆類。

三少吃油炸的食物。

四多食用富含纖維質的食物，多吃蔬菜、全穀類。

五飲食儘量清淡，避免加工或醃製的食物；烹調食物宜採清蒸、水煮、涼拌等方式。

運動方面則建議每週至少五天，每天三十分鐘或每週至少一百五十分鐘的中等強度有氧運動（如：走路、游泳等），其中可穿插間歇休息。而運動過程中維持微喘、不渴、不熱為原則。

四懷孕期間血糖的定時監測是重要的。懷孕期間每日血糖應控制在空腹六十到九十五，餐後一小時六十到一百四十，餐後兩小時六十到一百二十。如果無法經由飲食和運動控制血糖，建議接受醫療處置，以減少妊娠糖尿病的併發症。妊娠糖尿病的產婦建議於生產後四至十二週再次安排空腹八小時後的七十五克口服葡萄糖試驗，以排除轉變為慢性糖尿病的可能性。

來源：無法親餵時，一次搞懂擠奶、母乳保存與回溫技巧

無法親餵時，一次搞懂擠奶、母乳保存與回溫技巧

對許多新手媽媽來說，因為工作、外出或其他原因無法親餵寶寶，常讓人感到焦慮與不安。其實，只要掌握正確的擠奶方式與保存技巧，即使無法直接親餵，也能讓寶寶持續享有母乳的營養與保護力。這篇文章教你一次搞懂擠奶方式、母乳保存與回溫三大重點，安心陪伴寶寶成長。

擠奶方式與技巧

無論是上班族媽媽、還是親餵與瓶餵交替的媽媽，擠奶的最大目的是「維持供需平衡」。建議每三到四小時擠一次奶，相當於一天六到八次，以模擬寶寶吸吮的頻率，穩定乳汁供應。若母乳量還不穩，也可縮短至每二到三小時一次。

夜間若有餵奶空檔，也建議起來擠奶或直接親餵，有助避免乳腺阻塞與泌乳量下降。

每次擠多久才適合？

一次擠奶時間大約為十五到二十分鐘，每邊乳房各十到

十五分鐘最為合適，建議不要超過三十分鐘，避免乳頭受傷。不過媽媽剛開始擠乳時可能較不順，需要比較長的時間，等熟練後速度就會更快些，奶水也會越來越多。

手擠奶技巧

一將大拇指放在乳頭位置往上約二到三公分的乳房上，食指放在乳頭及乳暈下方的乳房上（對著大拇指），然後以其他的手指托住乳房。

二將大拇指及食指輕輕地往胸壁下壓，然後再往乳頭及乳暈方向推進。

三當一邊乳房擠到奶流變慢，則可換擠另一邊，如此反覆數次，直到兩邊乳房各部位奶水擠出。

對於產後媽媽來說，剛開始擠乳可能沒有乳汁流出，但多擠幾次後，奶水就會慢慢滴出。另外，於擠奶前熱敷乳房。再以螺旋狀輕柔按摩，也有助促進乳汁流出；或媽媽若有需求。也可輔以手動或電動擠乳器來協助。

如何促進乳汁分泌？

保持心情放鬆、多攝取水分、充分睡眠，以及補充蛋白質都是基本功。有些媽媽會額外飲用發奶茶或吃發奶營養品，也可以嘗試看看，找到適合自己的方式最重要。

母乳怎麼保存？工具與保存時間一次看懂

必備的保存工具有哪些？

儲乳袋或母乳儲存瓶：請選擇食品級材質、可密封且耐冷凍，並在每袋清楚標記擠奶日期與時間。重複使用的儲存瓶需確實清潔與消毒。

冷藏與冷凍空間：母乳應獨立放置，避免與生鮮食材混放。

保冷袋冰寶：方便外出時可短暫保存母乳，延長保存時間。

參考資料：國民健康署網站 --母奶要怎樣儲存及回溫？

小叮嚀：「三百三十三原則」也是常見好記的口訣：室溫三小時、冷藏三天、冷凍三個月，實際可依個人的習慣做些微調。

保存注意事項

裝袋或裝瓶時請填七到八分滿，預留膨脹空間。

遵循「先擠先用」原則，優先使用較早擠出的母乳，養成標示與依序習慣。

解凍過的母乳不可重複冷凍。

冰箱門邊溫度不穩，建議將母乳放在冷藏或冷凍室深處。

若空間足夠，建議劃分一區來存放母乳，避免交叉污染。

冷凍母乳怎麼解凍、回溫？這樣做才安心

解凍方法有哪些？

冷藏退冰：將母乳前一晚放入冷藏室，約需十二小時慢慢解凍，是最安全的方式。

流動冷水解凍：若急需使用，可將母乳密封袋放入冷水中沖泡，加速退冰。

注意：不可用微波爐或熱水直接加熱，避免破壞母乳中的免疫因子與蛋白質。

回溫步驟

一將解凍後的母乳放入攝氏六十以下的溫水中隔水加溫，或使用溫奶器加熱。

二冷凍母乳會自然分層，加熱時可輕輕搖晃瓶身，讓脂肪均勻混合。

三奶水回溫至約三十六到四十時，即可餵食寶寶。

回溫後的保存時限

已回溫但寶寶尚未飲用完的母乳，請在一小時內使用完畢。

最後沒喝完的母乳需丟棄，不可以反覆加熱食用。

每次退冰不宜太多，避免浪費。

即使無法每次都親餵，透過擠奶與妥善保存，媽媽仍然可以把這份珍貴的營養留給寶寶。

來源：照顧剛生產的伴侶

照顧剛生產的伴侶

恭喜您！和期待十個月的寶寶見面了！您和伴侶想必內心充滿感動，請您再次肯定太太的努力。而此時剛生產完的太太也需要適當的休息及睡眠，請細心留意她的需求。貼心給予照顧及陪伴。

保暖

不管是自然產或剖腹產的產婦，產後都要留意保暖，請幫太太準備襪子或是薄外套。另外，有些產婦生產後幾天。可能會大量出汗，請協助太太更換乾爽的衣服。並適時幫她擦拭汗水。

進食

可依產婦的胃口來準備食物，除了適時補充水分外，通常生完睡飽後的產婦會想要喝一碗熱湯或是溫暖的流質類食物，爸爸可以留意醫院附近是否可以購買或請家人協助準備。

下床

自然產的媽媽可依個人體力決定下床時間，初次下床時。要留意因為姿勢的改變會有頭暈以及引起疼痛的現象，請爸爸協助太太先在床邊坐一會。漸進式下床活動或陪同如廁。剖腹產因為傷口疼痛會延遲下床，一般鼓勵媽媽傷口疼痛減緩後。通常隔天就可下床，下床前同樣要確保伴侶沒有覺得頭暈。再漸進下床活動。

按摩子宮

自然產的產婦，護理人員會教導產婦或伴侶如何按摩子宮，以加速助子宮良好收縮，以利產後排出物順利排出體外。伴侶也可以協助太太按摩子宮。

來源：照顧新生兒必備5技巧

照顧新生兒必備五技巧

照顧新生兒並不難，熟練下列這五件必備的技巧，你就可以成為自信心爆棚的超級奶爸！

寶寶張著小嘴、吐著舌頭，頭動來動去看似在找尋東西，是想喝奶的徵兆。但爸媽如用手指輕點嘴角誘發「尋乳反射」，不盡然是寶寶想喝奶。因為尋乳反射是嬰兒自然的反應，基本上還是建議觀察寶寶想喝奶的徵兆。來判斷是否餓了會比較準確。

第一大技巧親餵與瓶餵協助

親餵協助

親餵雖然爸爸無法代勞，卻可以從旁協助，讓媽咪的哺乳過程更順暢。

一舒適姿勢準備哺乳枕或靠枕，協助太太找到舒適的姿勢開始哺餵。

二防溢吐奶準備紗布巾或小毛巾，以防溢吐奶措手不及。

三 口腔清潔如寶寶清醒狀況許可，喝奶後建議可以用拋棄式紗布沾濕溫開水，幫寶寶清潔口腔。

四 按摩舒緩可替媽媽按摩頭皮與肩頸，舒緩媽媽情緒。

瓶餵協助

媽媽事先擠出來保存的母乳，就可以交給爸爸來進行瓶餵，讓媽媽多出時間做別的事。

一 輕點嘴唇將奶瓶輕點寶寶嘴唇，此時寶寶會張嘴，將奶嘴完整放入寶寶口中。

二 奶瓶傾斜奶瓶傾斜使奶水充滿奶嘴，讓寶寶持續吸吮不會吞下空氣。

三 暫停拍嗝新生兒的飲奶量有限，寶寶不想喝時，可輕輕拍嗝後，再確認是否還想再喝。不要強迫已不想喝奶的嬰兒把剩下的奶喝完。

四 口腔清潔如寶寶清醒狀況許可，喝奶後建議可以用拋棄式紗布沾濕溫開水，幫寶寶清潔口腔。

小提醒瓶餵時請注意奶水流速，試著將奶瓶倒置，奶水「一秒一滴」的孔洞大小，最適合新生兒吸吮與吞嚥。

第二大技巧拍嗝

一 抱好寶寶讓寶寶側身坐在大人腿上，爸爸一手從前方托住寶寶的下巴、頸部與肩膀。

二 空掌輕拍另一手微彎呈空掌，在寶寶背上輕拍。

第三大技巧洗澡

注意事項

無論四季，洗澡時浴室室溫維持在二十五到二十八，最為舒適。

建議先放冷水再放熱水，確保寶寶安全。

最適合的洗澡水大約是介於在三十七到三十八左右，可以用溫度計測量。如寶寶洗完澡後全身紅通通，或是出現起疹發紅現象，表示水太熱，請逐漸調降水溫找到適合的溫度。

避免寶寶太餓或太飽時洗澡。

第四大技巧換尿布

一 洗屁屁先用溫清水幫寶寶把屁股洗乾淨不便時可用濕紙巾。

二 雙腳舉高讓寶寶躺好，一手抓住雙腳舉高。

三 放尿布另一手將乾淨尿布放到適合位置，再將雙腳放下。

四 黏好尿布撕開尿布兩側的魔鬼氈確實黏好。

五 最後檢查確認腰部鬆緊度是否合宜，並整理大腿側邊的尿布。

小提醒

一 爸爸帶寶寶外出在外，可留意公共場所是否有專設的育嬰室、親子廁所，可方便爸爸幫寶寶泡奶、餵奶或換尿布。

二 如寶寶有輕微紅屁屁可先詢問醫師或藥師是否需使用氧化鋅藥膏。

三 寶寶穿幾件衣服才夠：新生兒的體溫較不穩定，建議採「洋蔥式穿搭法」。衡量冷熱以摸後頸為準，衣著件數與大人差不多即可。另外也可注意寶寶是否流汗，來決定是否要少穿一點喔。睡覺時如需保暖，可使用睡袋型睡衣或以包巾包裹，並將手臂露出，避免蓋住臉部。

第五大技巧臍帶護理

一 先消毒滅菌棉棒滴上適量七十五%酒精，繞著臍帶根部由內往外環狀擦拭一圈。

二 後乾燥再取另一支滅菌棉棒，滴上適量九十五%酒精，繞著臍帶根部由內往外環狀擦拭一圈。

小提醒

寶寶臍帶照顧的原則是保持乾淨與乾燥，請爸媽們依接生醫院之教導，進行臍帶護理。臍帶未脫落前應讓寶寶穿著寬鬆衣物，並將尿布反摺。使臍部保持乾燥，若有長息肉或是分泌物惡臭、周圍皮膚紅腫等臍帶炎的現象。則請返回醫院診治。

溫馨提醒

留意受虐性腦傷：正常照顧下或與寶寶玩耍而晃動到嬰兒的頭部，並不會造成寶寶腦傷。家長不要給自己太大壓力，目前醫學上已經摒棄「嬰兒搖晃症」這個易令人誤解的名詞。改稱為「受虐性腦傷」，通常是來自照顧者情緒失控。大力搖晃嬰兒所導致。

來源：燒燙傷及瓦斯事故傷害初步處理

燒燙傷及瓦斯事故傷害初步處理

燙傷急救五步驟『沖、脫、泡、蓋、送』

沖：迅速以流動的自來水沖洗傷口十五到三十分鐘，或將受傷部位浸泡於冷水內，以快速降低皮膚表面熱度。

脫：充分泡濕後，再小心除去衣物；必要時用剪刀剪開衣服，並暫時保留黏住的部分。盡量避免將傷口水泡弄破。

泡：繼續浸泡於冷水十五到三十分鐘，可減輕疼痛及穩定情緒。但若燙傷面積廣大，或幼童年齡較小。則不必浸泡過久，以免體溫下降過度。或延誤治療時機。

蓋：用清潔乾淨的床單或布單、紗布覆蓋。勿任意塗上外用藥或民間偏方，這些東西可能無助於傷口的復原，並且容易引起傷口感染，及影響醫護人員的判斷和緊急處理。

送：除極小之燙傷可以自理之外，應送往鄰近的醫療院所做進一步的處理。若傷勢較大，則最好轉送到設置有燙傷中心的醫院治療。

瓦斯外洩處理四步驟『禁、關、推、離』

禁：禁止開或關任何電器用品，如抽油煙機、電燈等，也不可以插拔電插頭。

關：先關閉瓦斯總開關，但不可碰觸瓦斯爐開關，以免產生火花。

推：輕輕緩緩推開（打開）門窗，讓空氣流通。

離：離開現場，疏散至屋外安全場所。再打電話通知當地瓦斯公司，請求檢測外洩情形。或通報一百一十九消防局求助。

若有疑似瓦外洩事件發生，且家中成員有頭痛、頭暈、虛弱無力、噁心嘔吐、胸口疼痛或不適、呼吸困難、意識改變等症狀，有可能已產生一氧化碳中毒，需儘速至急診就醫。

來源：營造安全睡眠環境-預防嬰兒猝死症

營造安全睡眠環境-預防嬰兒猝死症

所謂嬰兒猝死症候群，是指：「一歲以下嬰兒突然死亡，且經過完整病理解剖、解析死亡過程並檢視臨床病史等詳細調查後仍未能找到死因者」。

「趴睡」是嬰兒猝死症的關鍵危險因子！因為有些寶寶在睡夢中驚醒的神經反應不佳，所以發生窒息情況時，寶寶可能死於夢中，而趴睡相對容易導致窒息。

許多爸媽會讓寶寶趴睡，主要有兩個原因，一是考量頭型，二是寶寶趴睡看起來睡得較安穩。然而，由於出生三、四個月的嬰兒。頸部肌肉力不足，而且頭部相對於身體又比較重。萬一口鼻被掩蓋住時，寶寶不容易自行移開。因而容易窒息。此外，若枕頭上有口水或溢奶，也會容易造成呼吸道阻塞而窒息。

側睡因為容易翻身成趴睡，亦不建議。如果擔心寶寶頭型扁掉，不要讓寶寶的頭固定偏向某一側睡，因為寶寶比較喜歡朝門的方向看，爸比與媽咪可以每隔一段時間將床頭、床尾的方向調換。此外，寶寶醒著的時候建議一天數次讓他趴著玩一段時間。一方面避免後腦殼受壓的時間太長，一方面也可以訓練頸部和肩膀肌肉的力量。可保持頭型又確保安全。

因有些嬰兒於睡夢中驚醒的神經反應不佳，發生窒息。為了預防嬰兒猝死，及維持安全的睡眠環境，必須排除任何可能引起嬰兒呼吸道阻塞的因素。

美國兒科醫學會及臺灣兒科醫學會，建議下列的預防措施：

一 一歲以下嬰兒每次睡眠都應該仰睡，側睡並不安全。

二 床鋪表面必須堅實，外表可包以被單。

三 研究證實哺餵母乳有保護作用，建議哺餵母乳至少至嬰兒六個月齡。

四 嬰兒不建議與其他人同睡，但建議與父母同室不同床睡眠。父母可將嬰兒抱在床上餵奶或安撫，在父母要入睡前即應將嬰兒放置在嬰兒床上，雙胞胎與多胞胎也應該分床睡眠。

五 嬰兒床不可有任何鬆軟物件，包括枕頭、玩具枕具、被褥、蓋被、羊毛製品、毛毯、床單等軟的物件，嬰兒床應堅硬並蓋以被單。

六 嬰兒不宜配戴平安符、項鍊等可能阻塞呼吸的物件，不可無成人在旁照顧，而將奶瓶直接塞在嬰兒口中。

七 預防成人抱嬰兒時睡著：

一 產後母嬰初期皮膚接觸，宜有清醒的成人在場陪伴。

二 母親親餵母乳或成人抱小孩時，應盡量保持清醒，而且最好有其他意識清醒的成人在場，尤其在產後初期母親容易疲累時。

三 成人若自覺疲累，盡量避免獨自抱小孩。

八 孕婦應接受例行產前檢查，研究顯示可降低嬰兒猝死發生率。

九 母親於懷孕期間與生產後必須避免抽煙、喝酒與使用非法藥物。

十 避免讓嬰兒過度保溫或用布單蓋著嬰兒頭部。

由於嬰兒氣道的解剖結構，當寶寶仰睡時。食道在氣管的下方，因此。吐奶逆流之液體因重力作用會往下方透過吞咽進入食道，不會進入氣管產生嗆到或窒息；反之。若寶寶趴睡或側睡時，氣管在食道的下方或者同一水平方向。那麼逆流的液體進入氣管機會增加，造成嗆傷或窒息風險大增。寶寶側睡容易翻成趴睡仍有風險。

一歲以下請不要使用枕頭。目前國內外文獻對於嬰兒枕防側翻、顧頭型等功能皆無實證依據，反而可能讓嬰兒在臉朝下時翻不回來，大大增加窒息猝死的機率。且新生寶寶的頭跟肩部幾乎同寬，平躺時，背部和後腦勺在同一平面上，寶寶不會睡得不舒服。寶寶的頭型會隨著年齡增長及習慣，仍有改變的空間，家長不用太擔心頭型問題。

來源：營養小常識-兒童過重和肥胖防治原則

營養小常識-兒童過重和肥胖防治原則

兒童過重和肥胖防治原則

健康飲食、身體活動和睡眠建議兒童肥胖問題普遍存在全球多數國家，兒童期肥胖會增加心臟血管疾病、糖尿病、脂肪肝及骨骼肌肉疾病，對心理與社交學習也多有影響。兒童肥胖會導致成年肥胖，增加成年後肥胖相關慢性病的罹病率和死亡率，因此肥胖防治應從兒童時期做起，並延伸至整個生命週期。衛生福利部國民健康署「兒童肥胖防治實證指引」建議嬰幼兒至青少年，應定期身體健康檢查。早期發現肥胖及其相關疾病，並鼓勵日常生活中培養健康飲食習慣、規律身體活動和充足睡眠時間。相關建議如下：

飲食習慣建議

- 母乳哺餵對嬰兒未來一生的健康具有保護作用，可降低日後肥胖及其他急慢性疾病的風險。
- 不以食物來獎勵或控制嬰幼兒的行為。
- 每天吃早餐。
- 鼓勵在家中用餐，減少至速食店用餐。
- 鼓勵過重或肥胖兒童食用低熱量高營養密度食物，包括蔬菜、水果、全穀食物、低脂乳製品、瘦肉、低脂魚、豆類等。

- 鼓勵食用強化維生素的奶類與乳酪製品，以增加鈣、維生素、維生素二與其他微量營養素等與骨骼生長有關的營養素。

- 一歲以後的乳品類食物來源，應選擇無添加糖的品項；二歲以上過重或肥胖兒童建議飲用低脂乳品；二歲以下兒童不宜飲用低脂或脫脂乳品。

- 鼓勵高纖維的食物，有助於血脂正常、腸胃功能及葡萄糖代謝。

- 避免高熱量飲食，包括高脂肉類、油炸與燒烤食品、甜食、油類調味料等。

- 避免喝含糖飲料，最佳飲料是白開水。

- 鼓勵直接食用水果，避免果汁。

- 不需過度限制點心，但也不鼓勵，應注意點心的品質而非數量。

- 不建議節食、少吃一餐，或使用藥物減重。

- 飲食原則：由六大食物種類選擇天然新鮮食物：全穀雜糧類、蔬菜類、豆魚蛋肉類、乳品類、水果類，以及油脂與堅果種子類如糙米飯、蔬菜、魚肉—脂肪含量較低的豆魚蛋肉類食物、牛奶、香蕉、橄欖油—不飽和脂肪含量高且反式脂肪為「零」的油品。避免高度加工的食物，並儘量減少糖的添加。

運動建議

- 降低每日觀看螢幕時間，每日不超過二小時，每三十分鐘休息。

- 搭配多樣化的基本動作：如走、跑、跳、攀爬等移動性技能，鼓勵每天至少達到六十分鐘中等費力以上的身體活動活動時仍可交談，但無法唱歌。

- 在適宜溫濕度下運動，運動前補充水分、運動中定時喝水每二十分鐘補充水分。

睡眠建議

- 睡眠不足與肥胖有關。

- 建議兒童睡眠時間

四到十二個月：每天睡眠十二到十六小時，包括非常規睡眠時間的小睡。

一到二歲：每天睡眠十一到十四小時，包括非常規睡眠時間的小睡。

三到五歲：每天睡眠十到十三小時，包括非常規睡眠時間的小睡。

六到十二歲：每天睡眠九到十二小時。

環境和社會互動關係建議

- 家中用餐時應避免可能導致分心的事物，如避免利用電視、平板及手機等三用品吸引小孩達到餵食目的。
- 營造和諧家庭氣氛、強化親子關係，以利兒童健康生活型態的養成。
- 家長自己應有健康飲食與身體活動習慣。
- 促進兒童建立正向的同儕關係，從小建立健康飲食習慣和結交喜愛身體活動的好朋友。

養成孩子動態生活習慣

- 世界衛生組織建議兒童及青少年每天都應至少達到六十分鐘以上中等費力身體活動活動時仍可交談，但無法唱歌，每週至少累積四百二十分鐘。
- 鼓勵家長抽空陪伴幼兒，一起將運動融入遊戲，培養幼兒的動態生活習慣。可以配合兒童發展階段大肌肉動作的發展，搭配多樣化的基本動作形式如走、跑、跳、攀爬等移動性技能。以及具有遊戲成分的活動，帶領小朋友做伸展、躍馬步、跨步跳及傳接球等運動。促進親子活動。
- 六個月以下的嬰兒每天應有身體俯臥活動的親子遊戲時間，但一歲以下嬰兒睡眠時不可俯臥，以避免增加嬰兒猝死機率。
- 不要限制孩子身體活動的機會，例如非用餐時間。不要將孩子固定在餐椅上，在安全範圍內。儘量讓孩子增加身體活動量。
- 孩子二歲以前不要觀看電視或電子用品螢幕，二歲以後要限制每日注視螢幕時間不可超過二小時。切勿在幼兒房放置電視，避免長期久坐增加肥胖的風險。且易受電視食品廣告影響。
- 依孩子不同年齡，每天早睡早起的習慣，維持充分的睡眠時間。

避免兒童肥胖

- 根據研究指出，肥胖兒童有二分之一的機率變成肥胖成人，肥胖青少年變成肥胖成年人的機率更高達三分之二，未來都是心血管疾病、糖尿病等慢性疾病的潛在病人。

- 瞭解嬰幼兒體重及身高生長情形，於每次健康檢查時。應計算身體質量指數，簡稱。並與醫師討論。

- 當孩子身體質量指數被定義為「體重過重或肥胖」時，應尋求醫師或營養師建議，儘速調整生活作息，避免增加相關慢性疾病的罹病風險。

來源：營養小常識-副食品添加原則

營養小常識-副食品添加原則

當寶寶逐漸長大，就必需添加副食品。一方面提供奶類不足的營養，另一方面也能夠訓練咀嚼和吞嚥。為日後的營養攝取作準備。

何時開始添加副食品？

可至衛生福利部國民健康署「健康九九」網站搜尋「嬰兒期營養」、「素食嬰兒期營養」取得更多資訊！

寶寶出生四個月矯正年齡內不建議添加副食品，以免消化不良或過敏；純母乳哺育滿六個月後必需添加副食品。滿四到六個月寶寶如有以下狀況，可以考慮提早在滿

四個月後開始添加副食品：

純母乳哺餵到六個月實在有困難時。

媽媽奶水量明顯降低。

寶寶顯得吃不飽。

寶寶出現厭奶但沒生病或其他原因。

寶寶已經可以自己抬頭並保持頭部平穩。

可以將食物從湯匙移動到自己的喉嚨。

寶寶有主動要求其他食物的表現（看大人吃其他食物時很有興趣，伸手來抓、抓了放嘴巴）。

添加副食品的重點時程

六個月大以後，開始訓練寶寶使用杯子，以作為日後戒斷奶瓶的準備。如果適應良好，可以嘗試以果泥取代過濾果汁，以增加纖維攝取。

六到八個月左右，可以讓寶寶練習自己拿著餅乾或烤過的土司吃。

九到十個月大時，提供一些約一口大小、較軟的食物，也可讓寶寶用手抓著吃。

副食品吃得較多時，奶量自然隨著減少。依照世界衛生組織的建議，在六到八個月時，一天至少應吃二到三次副食品；九個月以後，一天至少吃三到四次副食品。

添加副食品的訣竅

每次只添加一種新食物，由少量（一到二湯匙）開始。逐漸增加，觀察三到五天。如無長紅疹、腹瀉、嘔吐等症狀，則可繼續餵食。若出現以上的反應，則應暫停該食物一到二個月後再嘗試，或向醫師諮詢。

添加副食品應優先給予較不易引起過敏的嬰兒米精或嬰兒米粉開始，再依序添加嬰兒麥精或嬰兒麥粉、蔬菜類、水果類、肉類，建議由口味淡的食物開始。

使用過的食物可重複使用，若寶寶可以接受穀類，添加蔬菜時，可將穀類和蔬菜混合食用。

六個月嬰兒容易缺乏鐵質，選擇添加鐵質的嬰兒專用米精比一般米麩佳，米精應以水或奶調成糊狀餵食。

開始餵食糊狀食物（如米糊、果泥等）時，應以湯匙餵食，避免將副食品加入奶瓶內與奶混和，以奶瓶餵食。

選在寶寶較餓的時候餵食（例如吃奶前一小時）較易成功，下一餐何時吃奶可視副食品吃了多少而作彈性調整。

餵食時應抱起寶寶，面對面餵食；寶寶會坐了以後，則應讓他坐穩以確保安全，勿追逐餵食。

若寶寶拒絕張口、將頭轉開或哭鬧起來時，勿強迫餵食；可暫停一到二星期後再試。

若寶寶僅露出皺眉和嫌惡的表情，並未明顯推拒時。可能只是不習慣新食物，應多嘗試幾次。讓他習慣，勿輕易放棄。

餵食時的氣氛應保持輕鬆快樂，如果吃飽了就應該停止，不要強迫寶寶將準備的食物全部吃完。

嘗試高致敏性食物的注意事項

應先確認寶寶已經餵食過其他副食品並有良好的耐受性後，再準備開始餵食高致敏性食物，例如：蛋類、大豆、小麥、花生醬及堅果醬、魚類及貝類等。

最初幾次選擇在家餵食，並謹慎小心。

有以下情形者，應先與兒童過敏免疫專科醫師諮詢餵食高致敏性食物的適當性

寶寶曾經對食物有過敏反應或有已知的食物過敏現象，

或是家長認為寶寶可能有食物過敏現象。

寶寶有持續性中度到重度的異位性皮膚炎，儘管已有治療。

寶寶的兄姊有花生過敏。

寶寶對於食物的血液過敏原測試呈現陽性反應者。

寶寶副食品添加應避免提供以下食物：

一歲以下的寶寶不可餵食蜂蜜，因為蜂蜜中可能有肉毒桿菌孢子。一歲以下寶寶因免疫系統及腸道菌叢尚未健全，應避免食用蜂蜜。如果食用蜂蜜，可能造成肉毒桿菌毒素中毒。症狀從便秘開始，昏睡、倦怠、食慾不振、眼瞼下垂、嚥物困難、失去頭部控制、肌肉張力低下及全身性虛脫。有時會發展至呼吸無力衰竭而死亡；另食材應澈底清洗、去皮及加熱，再提供嬰兒食用。減少食品中毒的風險。

避免給予硬且圓的食物，易導致寶寶噎住，如堅果、葡萄、果凍、湯圓、粉圓或糖果。

不應該提供八寶粉散、珍珠粉、退胎水、紅嬰水與偏方給寶寶食用。

添加副食品應注意什麼？

稀飯是很好的半固體食物，但僅用大骨湯煮的稀飯，營養和熱量均不足，必需添加其他食物（如蔬菜、全穀及未精製雜糧、蛋黃、肉類等）在內。

製作副食品時應注意衛生，不需添加人工調味品鹽、糖、味精、雞粉，口味儘量清淡。

市售罐裝嬰兒食品應避免選用添加有澱粉等賦形劑的產品，以免攝取不必要的熱量。購買時應注意有效期限及適用年齡，且打開後就必需冷藏，且儘速食用完畢。

寶寶的大便若出現未消化的食物，例如紅蘿蔔或玉米的皮、蔬菜的纖維等，這都是正常的，不必因此停止餵食。

奶類可提供豐富的鈣質及蛋白質，但因為鮮奶或優酪乳的蛋白質與礦物質（如鈣、鈉、鉀等）含量較高，對嬰幼兒的腎臟造成負擔，因此一歲以下嬰幼兒不建

議喝鮮奶或優酪乳。

副食品應均衡攝取，避免偏食導致某些營養素缺乏。

未添加副食品前，除非天氣很熱、流很多汗，一般不需要額外再給予水分，以免影響奶量攝取。

來源：營養小常識-培養良好的飲食習慣

營養小常識-培養良好的飲食習慣

培養良好的飲食習慣

高熱量低營養素密度的飲食內容及缺乏運動的靜態生活，是造成肥胖的主要原因。良好的飲食習慣，能使孩子攝取充足、均衡的營養。父母以身作則，陪伴孩子養成健康生活型態。透過聰明吃、快樂動，教導孩子學習選擇健康飲食。養成動態生活習慣，可以為國家未來主人翁預約一個健康的未來。

養成嬰幼兒良好飲食習慣

用餐有一定的地點，餵副食品時讓寶寶坐穩。一歲以後，將高腳椅放在餐桌邊。安排與其他家人一同進食。

尊重寶寶的胃口，不強迫餵食。若孩子吃不完，下次可將食物減少。

一歲到一歲半之間為黃金訓練期，讓寶寶學習自己用湯匙吃飯。

孩子會自己吃飯以後，一次給予他少量的食物；吃完了還要的話，才再給他。

維持進餐時的和樂氣氛，讓孩子參與餐桌上的談話。

三歲後可以開始規定一些簡單的餐桌禮節，孩子遵循時應常給予誇獎。

規定合理的用餐時間（一般而言約為三十分鐘），時間到了或全家人都已經吃完了，就請孩子離開。

三餐之間可提供點心！但宜在正餐前二小時吃完，量不要多，選擇有營養的食物，避免高油、高糖、高鹽及重口味的食物或零食。牛奶、蛋、豆花、蔬果等都是可以選擇的好點心。

引發孩子對食物的興趣！藉著與孩子一起進食、購物、看電視、看書等機會，介紹及討論各類食物；採購與製作準備食物時，也可邀請孩子參與。

幼兒期營養攝取小叮嚀

幼兒的飲食習慣是奠定成人飲食的基礎！您與孩子最親密，不但是孩子飲食的把關者，更是行為模仿的對象。請多關心孩子吃些什麼、怎麼吃，作孩子的好榜樣。

健康均衡飲食從小做起！幼兒期是飲食行為養成的關鍵期，在飲食上。除了攝取充足熱量以外，更要重視均衡性。使孩子攝取到多種營養素，幫助孩子建立健康飲食習慣。

六個月大以後的寶寶光喝奶是不夠的，寶寶需要攝取各

種食物、練習咀嚼與進食，主食應增加肉末、果泥、粥等食物。

盡量讓孩子嘗試各種食物！孩子此時期的飲食選擇，可能會影響一生的飲食喜好及健康。

不要強迫孩子一定要清空盤子，避免日後是為了吃而吃，而不是因為餓了。

培養一生適用的飲食習慣

建議養成孩子每天攝取乳品類的習慣，以補充鈣質、維生素二。但不要將乳品類當主要食物來源，而忽略其他食物的攝取。

養成孩子喜歡吃蔬菜將對孩子日後的健康產生重大影響，建議於副食品著重蔬菜泥；家長特別耐心示範「蔬菜很好吃」的感覺，漸漸提高孩子對蔬菜的接受度。

多吃富含鐵的食物！一到二歲的孩子容易缺乏鐵質，應養成均衡飲食習慣，可適量攝取紅色肉類、蛋黃及深色蔬菜來改善。

蔬菜及水果不可少！蔬果中含有豐富維生素、礦物質及膳食纖維，都是孩子生長所需營養。

避免含糖或咖啡因飲料！補充水分以白開水為宜。

不在孩子面前批評或不吃某種食物，讓孩子有樣學樣。

多變換烹煮方式，讓孩子少量多嘗試。

提供孩子多元多樣的食物選擇，不要侷限在父母的好惡。

創意美食「新煮張」

加點巧思，創造千變萬化的美味健康餐食！重視食物的顏色搭配，嘗試變化外型，例如利用食物本身的顏色、餐盤擺飾及壓模等。

選擇新鮮、當季的天然食物！少吃罐頭、醃漬物等加工食品。

製備食物的過程中，不宜添加過多的鹽、味精等調味料，以及辣椒、咖哩等味道較刺激的香辛料。

以蒸、燉、煮的方式取代煎、炸，因為油炸食物油膩不易消化，也有更高的致病風險。

處理生食、熟食的砧板要分開製備食品的環境應維持整潔，避免交叉污染；食材應澈底清洗，避免生食並澈底加熱至中心溫度攝氏七十度以上，降低病原性微生物感染風險。

烹煮蛋類應完全煮熟再提供給寶寶食用，烹調及用餐前應以肥皂澈底洗手，勿食用蛋殼破損的蛋。

烹調後之食品應儘速食用，或置於攝氏七度以下，避免在室溫下放太久。

孩子飲食偏差怎麼辦？

偏食：照顧者以身作則，不要在孩子面前批評或不吃某種食物。烹煮時需要耐心多變換方式，並且讓孩子少量多嘗試幾次。採購與製備食物時，也可以邀請孩子一起參與。

愛吃零食、甜點：家中不要存放太多零食讓孩子隨手可拿，當然也不要利用零食、甜點當作獎勵或要求孩子的條件。

吃飯不專心：吃飯時不要開電視，並遠離玩具，堅持固定在餐桌上用餐。

用餐時注意以下情形：

不要限定孩子一定要吃多少份量的食物。

不要利用進餐時批評、教訓或責罵孩子。

不要在家中存放許多零食，讓孩子隨手可拿。

不要以食物作為孩子行為表現良好的獎勵品。

不要讓孩子一面吃東西一面遊戲、看電視或聽故事。

來源：營養小常識-嬰幼、兒童期每日膳食營養素

營養小常識-嬰幼、兒童期每日膳食營養素

嬰幼、兒童期每日膳食營養素

如對嬰幼、兒童期營養有疑問者，請洽詢醫師或營養師提供諮詢協助。營養素足夠攝取量及建議量可至衛生福利部國民健康署網站，首頁健康主題健康生活均衡飲食食物營養與熱量主題文章國人膳食營養素參考攝取量專區查詢「國人膳食營養素參考攝取量」第八版。飲食建議可至國民健康署「健康九九」網站搜尋「嬰兒期營養」、「幼兒期營養」及「學童期營養」；素食者亦有適合嬰幼兒及兒童期之飲食建議。

礦物質

碘：人體所需的碘大部分來自飲食，建議選擇加碘鹽取代一般鹽（但嬰兒副食品不建議添加鹽等調味料），並適量攝取含碘高的食物，例如海魚、無調味海苔、海帶、紫菜

等海藻類食物。

鐵：幼兒容易缺乏鐵質，應養成均衡飲食習慣，並多吃深色蔬菜、豆類、每天一個蛋、適當攝取含鐵質高的紅肉；富含鐵質的副食品可在四到六個月時開始添加。

鈣：含鈣質豐富的食物，除了鮮乳和乳製品之外，可考慮高鈣豆製品，如傳統豆腐、豆干、凍豆腐及豆干絲等；二歲以下兒童不宜飲用低脂或脫脂乳。

鎂：因為鎂為葉綠素組成之一，因此鎂多存在於富含葉綠素的蔬菜中，如：菠菜、莧菜及芥藍菜。而胚芽、全穀類之麩皮、核果類、種子類及香蕉亦為鎂之豐富飲食來源。

鋅：全穀類、乳品、蛋、魚貝類、瘦肉、堅果均含豐富的鋅。

如何沖調嬰兒配方食品

若無法哺餵母乳，一歲前寶寶應該使用嬰兒配方食品。嬰兒配方奶粉非無菌，它可能含有細菌。務必以攝氏七十度以上水溫沖調，正確的沖調和保存嬰兒配方奶粉。可以有效降低患病風險，請參嬰幼、兒童期每日膳食營養素考孕產婦關懷網站首頁文章列表母乳哺育寶寶注意事項。嬰兒奶瓶另相關嬰兒配方食品餵食的資訊，可至國民健康署「健康九九」餵食指導及網站搜尋「嬰兒期營養」參考相關建議內容。

蛋白質

嬰兒自滿六個月起，可嘗試給予富含鐵質的蛋白質類食物，如半個蛋黃；自十個月起，可給予嬰兒富含白質的食物。一到三歲的幼兒除每天攝取富含蛋白質的食物外，可增加乳品攝取，以獲得充足的蛋白質。

維生素

：

動物肝臟、蛋黃為富含維生素之食物；深綠色與深黃紅色蔬果富含胡蘿蔔素，可轉化成維生素。

維生素：

嬰兒缺乏維生素易導致佝僂症。人體需要的維生素，可來自食物或皮膚經日照自行合成。台灣雖地處亞熱帶，但國人因氣溫、空氣污染等因素日曬時間有限，且母乳中的維生素含量較低，使食物成為重要的維生素來源。魚類、添加維生素的乳品為國內重要的維生素食物來源，考量部分大型魚類（如：鯊、旗、鮪、油魚等）有蓄積較高濃度甲基汞之情形。對嬰幼兒神經發育可能造成危害，建議均衡攝食各式魚類。減量攝取大型魚類。除在飲食中納入維生素含量豐富的食物，亦可避開紫外線強烈之時段帶孩子到戶外活動曬太陽。若有需要宜諮詢小兒科醫師評估補充的需要性。

維生素：

深綠色蔬菜、蛋黃、堅果、種子、穀類胚芽、植物油等為含量較高的食物。

維生素：

新鮮水果（如芭樂、柳丁、橘子、奇異果等）含量豐富。

維生素一、六與菸鹼素：

全穀類、大豆、乳品、堅果、瘦肉、肝臟等含量豐富。

維生素二：

牛奶及乳製品含量最豐富，其他如全穀類與深色蔬菜也很豐富。

維生素十二：

主要來源為動物性食品，例如：蛋、乳品、肉類含量豐富；素食者若選擇蛋奶素則較不須擔憂缺乏問題。

葉酸：

綠色蔬菜、肝臟、豆類及水果（柑橘類）都是葉酸含量較豐富的食物來源。

來源：爸媽最想知道的10大孕產議題懶人包

爸媽最想知道的十大孕產議題懶人包

在準備懷孕到生產的階段，準爸媽們常有各種五花八門的疑問。因此衛生福利部針對準爸媽們最關心的孕產議題做網路調查，提供最實用及正確的孕產資訊。守護母嬰健康。

網路調查四大主題報你知

根據衛生福利部與嬰兒與母親雜誌合作，一百零九年八月八日至一百零九年八月十五日針對全台各地的準爸媽們以網路方式蒐集在孕前準備、懷孕照護、產後照護及孕產婦心理健康四大主題之問卷調查，全台共有二十縣市超過三千位爸媽一同參與此次活動，結果顯示最熱門議題為

九成擔心孕前檢查是否都做對了嗎？

六成七想知道孕期如何養胎不養胖？

七成想知道讓母乳源源不絕的實用技巧。

甬擔心！孕產問題懶人包讓你一目瞭然

依據調查結果國民健康署製作十大熱門孕產議題懶人包，提供準爸媽最實用的資訊，並針對於各階段一議題，提供專業建議如下：

一「孕前期檢查完全蒐羅，需要自費做檢查嗎？」：國民健康署補助每位準媽媽十四次產前檢查，請務必定期產檢，確保母嬰健康。但因目前院所提供的自費產檢項目非常多，並非每項檢查都要做。可根據個人的需求，與醫師做討論。再選擇最適合自己的檢查項目。

二「只要營養，其餘免談！孕期如何養胎不養胖？」：懷孕期間應該均衡攝取六大類食物，避免熱量偏高的外食。多攝取深色蔬菜、全穀雜糧，並以天然食物來源為主。若有任何營養的疑問，建議找專業營養師做進一步的營養諮詢。另外要定期量體重，依懷孕前的體重做適當調整。以增加十到十四公斤最適合，除此之外也須注意體重增加的速度。國民健康署提醒也不適合在懷孕期間進行減重。

三「如何讓母乳源源不絕的實用技巧」：準媽媽們可能擔心奶水不足或寶寶吃不飽等問題而放棄母乳哺育，因此國民健康署提供八個小口訣。讓準媽媽們輕鬆解決母乳哺育的煩惱：一生產醫院能協助，二早期哺乳要落實。三正確含吸莫遲疑，四寶寶想吃就要餵。五餵奶時間不限定，六夜間哺餵泌乳旺。七心情放鬆輕鬆餵，八手到擒來是母乳。

「如何更快適應新手父母的角色？」：相信在成為新手爸媽的開心之餘，內心也會感到緊張與壓力。為讓「新手爸媽」快速成為「上手爸媽」，衛生福利部國民健康署提供孕產婦關懷網站查詢孕期照護資訊。及社家署也有育兒親職網協助新手爸媽提升親職教育知能，民眾如有任何孕前、孕期及產後的問題。也可撥打孕產婦關懷諮詢專線八百到八百七十-八百七十（華語諧音：抱緊您，抱緊您）。將由專業人員解答及主動致電回復，歡迎準爸媽們多加利用！

爸媽最想知道的十個孕產問題懶人包下載

來源：爸媽的心理調適

爸媽的心理調適

一旦為人父母，自然而然想為您的孩子和家人做到最好。請記得您是獨特的個體，也是獨特的父母，要照顧好自己。而保持規律運動，有助於消除緊張壓力，並常保健康活力。最重要的是，在工作、家庭和自己的努力上找到平衡點。

保持規律運動：

運動是生活中很重要的一部分，它能幫助您放鬆，並且讓您更有活力。

您可以透過親子活動來放鬆身心，並且達到運動的需求，例如：用嬰兒車載著孩子，全家一起出門散步。和家人一起去游泳。和孩子一起去公園玩耍。

重回工作崗位以後：

產假或陪產假即將結束，必須重返工作崗位。您可能會面臨以下問題，讓您備感壓力甚至精疲力竭。比方說：

得將孩子送到托嬰中心，或請保母照顧孩子。

必須送其他學齡期的孩子上學。

您需要全神貫注地工作，因此面臨工作上的父母、家人、孩子。

配合工作而調整孩子的作息，親子適應過程可能較辛苦。

孩子逐漸長大，形成新的生活模式。每一次調適都不輕鬆，這是為人父母必經的學習過程，您會習慣生活上的變動和新安排。

最重要的是，在工作、家庭和自己的需求上找到最佳的平衡點。

照顧自己和您的至親：

為人父母需要學習務實。不要對您自己或其他人期望太高，也不要對自己和家人的付出視為理所當然。

相信自己的能力。您做得非常好，而且每一天都在學習新的事物。

定期獎賞自己。放鬆或做一些開心的事情，像是找時間去散步，和父母、另一半還是朋友享受一頓美好的晚餐。

沒有人是完美的，所有父母都有不足之處，不必太在意，從中記取經驗比相互指責更為重要。

有時候您可能不同意另一半的作法或想法，私底下表白您的感受，並且與另一半共同商量解決方法。

請別在孩子面前吵架。

如果問題很難解決，請尋求外界支援。

來源：爸爸如何在生活中取得平衡？

爸爸如何在生活中取得平衡？

有句話這麼說：當了爸爸，才懂得如何當個爸爸。爸爸這個身分很難用簡單的語言，來道盡其中的甘苦酸甜，在真正成為父親之後，才能更深層體認到對家庭及孩子的愛、責任與義務。

夫妻就像一個團隊，共同照顧、教養子女。在過程中難免有爭執，但夫妻雙方應互相支持、積極溝通、包容互補。讓孩子在父母的陪伴中幸福長大。

爸爸如何在工作、家庭和朋友中取得平衡，是許多人心中的難題。以下方法，可幫助更快適應父職角色。

一

與伴侶溝通協調彼此之任務

一起和伴侶討論出理想的「分工」模式。例如先生習慣早起，則負責送小孩到保母家，而太太能準時下班，就負責接回小孩。家庭是共同的責任，就像經營合作社一樣。可根據自身擅長的能力來分配家務，任何一方忙不過來時。就進行補位，不要有誰幫誰的想法。一起為幸福的家而努力。

二

規劃親子活動分享育兒經

有了家庭之後，很難如往常一樣，隨興和同事、朋友聚會。那麼就揪成親子團吧！讓孩子一起加入這個社交圈，而大人們也能交流育兒經，彼此互相加油打氣。

三

善用親友、同事形成互助網絡

家人親友是育兒的幫手，如果有困難就開口求援，由家人親友暫時來支援。同時若能與有相似年齡小孩的同事、朋友形成照顧互助網絡，也是育兒助力。

來源：爸爸如何調適心理壓力

爸爸如何調適心理壓力

大家常會討論女性的孕期與產後憂鬱問題，其實爸爸也會因身分的轉變而適應不良、倍感壓力，甚至出現憂鬱傾向！

維護家庭是雙方面的責任，太太的心情需要照顧，爸爸的情緒也同樣重要喔！伴侶之間的傾聽與支持是重要的紓壓方式，同時也不要害怕尋求協助。當爸爸出現嚴重情緒困擾時，也可安排心理或婚姻諮商。為壓力找到出口。

紓解壓力小技巧

安排輕鬆的全家親子旅遊。

抽出時間運動，藉由揮灑汗水來紓壓。

什麼都不做，讓自己每天放空十分鐘。

可將壓力告知伴侶或親友，聊聊心情、透過溝通共同面對。

如果育兒壓力太大時，請將寶寶交給家人，暫時離開現場。

心情溫度計簡式健康表可用於了解情緒困擾的程度，當你感到緊張不安、心情低落。甚至憂鬱時，請進行做自我檢測。有重度情緒困擾時，建議尋求專業心理治療或醫療協助。

若面臨婚姻、家庭或親子關係的問題，不知如何自我調適時，可以利用衛生福利部男性關懷專線：八百到十三-九百九十九

，提供免費線上諮詢服務。

來源：爸爸育兒經-首重愛妻兒建立親子關係

爸爸育兒經-首重愛妻兒建立親子關係

當寶寶哇哇墜地的那一刻起，新手爸媽們在欣喜迎接之餘。就要開始面對種種育兒的挑戰，從寶寶餵食母乳、洗澡、換尿布、打預防針到安撫、玩耍和教育等。每一項挑戰都需要新手爸媽同心協力，經過不斷的學習與體驗的。在這許多的育兒活動中，媽媽具有舉足輕重的地位，尤其媽媽親餵剛出生寶寶是需要許多時間的學習與適應。對新手爸爸而言，有時在媽媽與寶寶的身邊。似乎發揮不了功能，認為自己幫不上忙。因而看著媽媽和寶寶的親密關係，疏離感倍增。心情上顯得低落與無助。到底新手爸爸可以為寶寶做甚麼

爸爸在孩子的成長過程中，也是塑造孩子人格特質的重要典範。許多專家學者研究發現爸爸對於孩子的領導力、獨立能力、自律性和道德觀都有深刻的影響，而爸爸對於不同性別孩子的教養方式也會影響到孩子長大後對於自己性別的認同，也是建立早期性別平等觀念重要時期。

一般而言，對男孩比較嚴厲，對女孩比較寵溺的爸爸容易造成孩子長大後對於自己或他人性別有主觀的期待。例如：當小男孩不小心跌倒的時候，爸爸會希望孩子自己站起來。疼痛不准哭，要忍痛、要受挫、要經得起打擊；當小男孩長大後。這樣性別差異的認知就會逐漸影響到自己做人處事的方法。因此，爸爸對於孩子的行為反應或稱

為管教方法逐漸會成為塑造孩子未來人格特質的影響因素之一。

對於新手爸爸而言，「教養」新生兒未免言之過早。因為新生兒在發展認知能力之前，大部分的育兒照顧都落在媽媽的身上。而有些媽媽會因為擔心爸爸不會照顧，幾乎一手包辦所有的育兒照顧。從餵奶、洗澡、安撫到看醫生，每一樣都要親力親為。有的媽媽還要處理家務事，包辦家裡的清潔打掃、洗衣、煮飯。當爸爸下班回家時，已經累到無法和顏悅色的關注到爸爸。更別說要享受夫妻情趣、天倫之樂了。因此，爸爸能主動學習並接手照顧寶寶的部分工作或分擔家務是每一個新手媽媽的願望。要爸爸接手，第一步就是媽媽要放手。媽媽如果不懂得放手，爸爸就無法接手照顧寶寶的工作。媽媽要謹記自己不是寶寶的唯一照顧者，媽媽可以做的工作，爸爸也可以做得一樣好。和所有工作一樣，只要常加練習就會熟悉。

剛出生的寶寶通常都是由媽媽親自餵奶，如果媽媽是餵母乳。寶寶更會黏著媽媽不放，因為寶寶害怕也許一離開媽媽。熟悉的味道不見了，食物也會跟著不見。因此，餵奶是建立親子關係的關鍵時刻。最好的方式是由媽媽親餵，爸爸多陪伴媽媽與寶寶。給予支持與鼓勵，餵奶前給媽媽準備開水或牛奶給媽媽飲用。補充水份，餵奶後。給媽媽按摩腰背，舒展筋骨或臥床休息。當爸爸陪伴寶寶時，可以經由爸爸與寶寶對話的聲音。讓寶寶尋找音源，漸漸的形成眼睛的接觸。讓寶寶慢慢成長過程中可以清楚看到爸爸的臉，抱的時候貼近胸口。爸爸這時候可以和寶寶多說說話，自然就會拉近彼此的關係。除了餵奶之外，當然像是換尿布、洗澡、穿衣和看病等。都可以和爸爸輪流做，這樣可以讓寶寶熟悉爸爸的聲音、氣味和臉部表情。也可以增加親子之間的關係。

新手爸爸們可以為寶寶做甚麼下面有幾件事，提供爸爸們可以嘗試去做的：

一、當寶寶哭泣的時候，爸爸可以嘗試抱著孩子安撫、唱歌、散步等不同方式的安撫

，即使到了最後還是要媽媽來抱，爸爸都必須要讓孩子學習媽媽不是唯一照顧她他的人。

二、爸爸可以在寶寶喝完奶、換完尿布以後，逗寶寶說話或扮鬼臉逗寶寶笑

，這些都可以幫忙寶寶認識爸爸，進而可以建立良好的親子關係。

三、大部分的寶寶都喜歡到戶外看看外面的世界，爸爸可以用袋鼠背前背的方式，帶寶寶到外面散步，和寶寶說話。

用背帶比用推車更容易拉近親子之間的距離。記得到外面去散步的時候，要防曬和注意安全。

四、爸爸可以學習幫寶寶洗澡，寶寶洗完澡後，就可以嘗試幫寶寶用乳液按摩。

按摩可以舒緩寶寶的情緒，也可以增加寶寶的安全感。如果每天爸爸可以花個十分鐘的時間，用乳液輕輕的幫寶寶按摩。同時和寶寶說話、微笑，寶寶可以把這樣舒服的感覺和爸爸聯想在一起。很快就可以加強彼此之間的親密感。

五、爸爸每天下班回家，可以安排固定的時間和寶寶玩耍，讓這個玩耍時間只專屬於爸爸和寶寶

，時間不用太久。五到十分鐘就好了，久而久之。爸爸下班回來，寶寶自然就會想找爸爸玩耍。但是要記得，如果寶寶要求和爸爸玩耍時。爸爸一直不斷的拒絕或者沒有善意的回應，兩三次之後。寶寶自然就不會找爸爸玩，或者認為找爸爸玩等於挨罵。因此，時間的設定很重要，這個時間希望是不會被任何事打擾的時間。

六、晚上寶寶要睡覺的時間，爸爸可以養成睡前說故事的習慣

，讓寶寶知道。當爸爸在睡前說故事的時候，就是要睡覺的時候。一旦養成良好的習慣，寶寶睡眠的時間就可以固定。

在建立親子關係的關鍵時刻，新手爸爸們透過以上的育兒活動。讓爸爸和寶寶獲得愉悅相處的機會，除了分擔媽媽的育兒工作外。重要的是能夠滿足寶寶成長的需求，同時擁有爸爸媽媽共同的關愛與照顧。奠定了寶寶正常身心發展重要的基礎。

來源：特殊的育兒資源

特殊的育兒資源

若家中有早產兒、多胞胎，在育兒路上需要更多協助，以下資源提供參考，也建議您可至社會及家庭署網站查詢更多內容。

家有早產兒

早產的寶寶若是出生週數太早、體重過低，可能因身體器官功能尚未發育成熟，出生後必須更細心照顧呵護。

家有小腳丫早產寶寶，您可向各縣市政府社會局（處）。了解相關生育補助、育兒津貼、托育補助、兒少生活津貼、弱勢兒童及少年醫療補助等相關訊息，並經醫療單位評估。如有需求可透過早期療育通報轉介，為孩子尋求相關資源協助。

家有雙多胞胎

照顧雙寶（多寶）的幸福和辛苦都是加倍的，夫妻雙方更是需要分工合作，才能有足夠的體力及時間來照顧寶貝。以下補助資源提供爸媽參考。

生育給付按比例增加給付金額

勞保提供之生育給付，是按女性被保險人分娩或早產當月（退保後生產者為退保當月）起。前六個月之平均月投保薪資，一次給與生育給付六十日。生雙胞胎以上的媽媽，則按比例增加給付金額。需要注意的是，生育給付必須由女方辦理，爸爸請記得貼心提醒另一半，不要錯失自己的權益唷！

雙胞胎夫妻各可領一年育嬰留職停薪津貼及薪資補助

如果夫妻雙方都是就業保險的被保險人，兩人都依性別工作平等法規定。同時辦理育嬰留職停薪並申請育嬰留職停薪津貼，合計一名子女可請領十二個月的津貼及薪資補助。二名子女加起來則是二十四個月津貼及薪資補助。

來源：特殊群體生育調節補助作業說明

特殊群體生育調節補助作業說明

特殊群體生育調節補助作業說明

生育調節補助款申領流程：

（一）民眾費用減免申請

一 流程

民眾應備齊一戶口名簿正本二身心障礙手冊正本或患有礙優生疾病等證明文件至所在地鄉鎮市區衛生所提出申請。

衛生所人員查驗個案檢附之身分證明文件，確認無誤後影印乙份。填具「子宮內避孕器裝置個案紀錄聯」或「結紮個案紀錄聯」乙式二聯（如附件四），蓋職章後核發第一聯給民眾。作為就醫憑證，存根聯與個案身分證明文件影本（註明「核與正本無誤」並核蓋職章）。留存衛生所備查。民眾持「子宮內避孕器裝置個案紀錄聯」或「結紮個案紀錄聯」至醫療院所接受手術，遺失不得補發民眾自付不足費用。

二 減免對象：本人或其配偶、子女有下列情形之一者：

（一）患有精神疾病。

（二）患有有礙優生疾病。

（三）領有身心障礙手冊。

(四) 列案低收入戶。

須為設籍中華民國國籍；如為外國籍或大陸地區人民尚未設籍者，以其中華民國國籍配偶之戶籍地為準。

(二) 醫療機構費用申請流程

醫療院所填具醫療補助款申領清單及領據，連同「子宮內避孕器裝置個案紀錄聯」或「結紮個案紀錄聯」，於次月二日前送衛生局審核。

(三) 衛生局費用申請流程

衛生局審核無誤後，每月十日前填寫申領送件清單，連同附件一及附件四函送衛生福利部國民健康署（台閩地區個案）；台北市政府衛生局（台北市個案）；高雄市政府衛生局（高雄市個案）新北市政府衛生局（新北市個案）；桃園市政府衛生局（桃園市個案）；台中市政府衛生局（台中市個案）；台南市政府衛生局（台南市個案）核辦。審核後，依醫療院所實際申請金額，逕行核撥補助款至各醫療院所。（為配合會計年度結算，當年度補助款限於當年十二月二十五日前申報完畢。）

來源：獨一無二好事成雙_以兒科醫師觀點談雙胞胎照顧

獨一無二好事成雙以兒科醫師觀點談雙胞胎照顧

擁有一對雙胞胎可以說是父母生命中最興奮的事，但是緊接而來的照顧卻可能是許多新手父母的夢魘。當知道肚裡懷的是雙胞胎時，父母就應開始思考未來孩子出生後可能面臨到的問題。提早做準備，才不會到時手忙腳亂。更何況雙胞胎懷孕通常會面臨早產與更多的懷孕併發症，父母早一點做準備。才能讓寶寶得到更完善的照顧。做為雙胞胎父母，你準備好了嗎

一、尋求支援

媽媽在懷孕時期就應該與另一半討論如何分工照顧小寶寶。寶寶出生後如果能得到雙方父母的幫忙照顧，除了可減少自己的負擔。對小寶寶而言，也可以得到更多來自其他家庭成員的關愛。這對寶寶的成長有正向的幫助。

二、哺育母乳

對寶寶而言，母乳是最適合的食物。母乳蛋白質不但最適合寶寶，較不易引起過敏。也較好消化吸收，長期追蹤發現。食用母乳的嬰幼兒其視力及智力發展較食用配方奶之嬰幼兒好，而且母乳中還含有對抗環境中病菌的抗體、白血球及活細胞等。若能哺育母乳，對寶寶而言當然是最好的選擇。但是同時哺育雙胞胎寶寶，對媽媽可能是負擔。這個時候，妳可以尋求母乳協會以及其他雙胞胎媽媽的經驗。讓自己能夠更快上手哺育母乳。在哺育母乳

期間媽媽應增加蛋白質的攝取，最好有一半以上為動物性蛋白質的食物。如魚、肉、蛋、奶類，並增加水果、蔬菜及水分的攝取。以促進乳汁的分泌。親自哺育母乳可以增進媽媽與寶寶的感情，也可以讓寶寶更有安全感。

三、注意早產兒的相關併發症

雙胞胎或多胞胎懷孕常會合併早產，早產兒因為提早報到。許多器官尚未發展成熟，因此早產兒會面臨許多併發症。而大多數併發症和器官及身體系統功能不成熟有關。這些併發症及後遺症包括了慢性肺疾病、腦室內出血後之腦室周圍白質軟化症、視網膜病變等，這些併發症都需長期追蹤治療。所以對早產兒而言，出院後追蹤是相當重要的事，一般來說，至少需追蹤至二足歲。早產兒的體重越輕或懷孕週數越小發生併發症的機率也越大，而這些併發症之中，腦部的傷害最令父母擔憂。早產兒腦室內出血或腦室周圍白質軟化症可能會造成寶寶水腦與腦性麻痺，而其他的腦部後遺症，還包括了視覺障礙、聽力障礙、語言障礙、智力障礙、吞嚥餵食困難以及癲癇等。

四、睡眠問題

剛剛出生的嬰兒沒有白天和晚上的概念。一天二十四小時中除了睡覺就是吃奶，這樣才能正常發育和成長。新生兒每天大約會睡十六到十八小時；寶寶通常會睡上二到四小時，然後醒來吃奶。隨著年齡漸長，會逐漸在晚上睡得稍微比白天的時候時間長一些。雙胞胎媽媽因為要同時照顧兩個寶寶，剛開始時。可能在晚上需要另一半的協助，如果妳是母乳餵養的話。能夠親餵是最好的，因為妳可以一邊餵奶一邊躺著休息。白天當孩子睡覺的時候妳也應該小睡片刻。用配方奶哺餵的孩子睡眠時間會稍微長一點，因為配方奶會在寶寶的胃裏停留的時間稍微久一點。當奶量不夠時，可以考慮入睡前一餐給予配方奶，讓寶寶睡得比較久一些。不過，切記對於新生早產兒最好還是三至四小時餵一次奶，以免血糖過低。嬰兒睡醒吃奶時都會精神飽滿，倘若寶寶顯得特別勞累睏倦。甚至到了吃奶時間也不願醒來，家長便要小心孩子是否有問題。要及早詢問醫生的意見。

五、嬰兒啼哭

嬰兒不會說話，當他有需求或不舒服時只能用哭來表示。嬰兒都會啼哭，特別是出生後的頭幾週。當他們有需要時就會啼哭，但啼哭並非表示出現問題。對於新手父母而言，如何辨別各式各樣的啼哭以及如何去安撫寶寶都是新手父母要學習的課題。

有時嬰兒啼哭的原因很明顯，例如他們尿布濕了或肚子餓了。但是有時候，要找出啼哭的原因比較困難。要知道嬰兒啼哭的原因，通常需要考慮所有可能的情況。當排除一些生理狀況引起的啼哭後，腹痛是引起啼哭的另一個重要原因。尤其是在嬰幼兒，由於嬰幼兒消化系統發育尚未成熟或是因為腹脹。嬰兒常會高聲、尖叫地啼哭，並

且不容易安撫。當嬰兒啼哭難以停止時，首先應排除所有正常的啼哭原因。當一般的安撫沒有效果時，可以把寶寶抱在胸前。讓寶寶能與妳保持身體接觸，也可以讓寶寶吸吮奶嘴。因為這會讓他們安心與平靜。還可以為他們放音樂，也可以輕輕搖晃他們或放他們到嬰兒車內出去走走。當試盡一切方法仍無法安撫，可能需要帶寶寶給醫生做一下檢查，看是否有其他原因，像是腹股溝疝氣或是腸套疊等需要處理的外科急症。

六、嬰幼兒發展與發展遲緩

父母在照顧寶寶時，除了關心寶寶是否吃得飽、穿得暖、長的高壯之外，更應該關心寶寶的發展。嬰幼兒的發展，因環境所接受到的刺激。及天生之差異而有所不同，兒童發展的各個階段彼此有著緊密的關係。每個階段都承繼了前一階段打造的基礎，同時也是為了下個階段做準備。嬰幼兒期是各方面發展的關鍵時期，如果兒童有發展方面的問題，且錯失關鍵期的療育，可能會影響孩子的一生。父母必須掌握及知道兒童發展各個階段的時程及特點，才能及早發現寶寶的發展問題進而尋求專業人士的協助。

所謂發展遲緩指的是與同年齡孩子的能力相較，最差的二十為發展遲緩兒童。另一個定義則是指與同年齡孩子的平均數相較，落後兩個以上的標準差的兒童。造成兒童發展遲緩的原因可能有很多，出生體重一千五百公克以下或妊娠期少於三十二週的早產兒是其中一個重要因素。另外有研究顯示，相較於單胞胎。經多胚胎減胎之雙胞胎常有明顯運動障礙，若妳的雙胞胎寶寶有早產或是低體重出生一定要多多注意寶寶的發展的狀況。如果父母能早一點早發現寶寶有發展上的問題，轉介給專業人員診療，讓寶寶得到更好的療育和照顧，這樣就能幫助他發揮他應有的潛能。

台灣生育率逐年下降，二千零一十六年全年只有約二十萬新生兒誕生，二千零一十八年更跌到只有十八萬一千六百零一人，生育率也滑落至千分之七百七十。隨著嬰兒出生人數減少，以及現代父母教育程度提高，讓父母對於孩子的發展及教育投與更多的關心。每一位父母都想給孩子最好的環境、最多的關愛，希望孩子有最好的發展。但是另外一方面，現代許多父母忙於賺錢、顧及事業。常無法陪伴寶寶成長，兒童在三、四歲之前的重要任務之一。就是發展一個足以令他她信任的依附關係。能信任與依附照顧寶寶的父母親，寶寶才能由這個基礎出發去認識自己，這對小孩未來的個性與人格形成有著重要的影響。

龍鳳胎雖是雙胞胎卻是不同的個體，即使是同卵雙胞胎，仍然有「個別差異」。每個孩子發展快慢各有不同，即使是同樣年齡的孩子。也不見得會表現出同樣的能力，就連孩子本身在各方面的發展速度也可能不同。人的一生有許多事情都可以等待，惟有孩子的成長不能等。多花一點時間陪伴他們，除了享受天倫之樂外。我們也可以從他們身上學習到很多。

來源：獨特中的獨特_龍鳳胎知多少

獨特中的獨特龍鳳胎知多少

你有沒有雙胞胎的朋友呢你的孩子是雙胞胎嗎還是，你自己就是雙胞胎呢有沒有人想過。為什麼有的雙胞胎長得沒有那麼像，甚至有的雙胞胎。是一個男生一個女生

事實上，雙胞胎又分同卵與異卵。同卵雙胞胎必定是同性別，而且他們會有很多生理特質比較相像。例如長相、身高等；異卵雙胞胎就不同了，和一般兄弟姐妹的差別類似。唯一不同在他們是同時出生，所以他們長相或個性等會有很大的差別。甚至有不同的性別，而這不同性別的雙胞胎。就是俗稱的龍鳳胎。或許大家已經很熟悉，這樣一次生出男生女生『恰恰好』的情形。就叫做龍鳳胎，它是多胞胎的一個類型。而龍鳳胎是中國人起的特有名稱，專指一男一女的雙胞胎。意指成龍成鳳，在國外則僅稱不同性別雙胞胎或男女雙胞胎。另外，多胞胎有時也是由不同性別組成，也是龍鳳胎。以下簡單說明內政部的雙多胞胎統計資料，使讀者能夠略為掌握雙多胞胎含龍鳳胎的概況。

雙多胞胎對人口出生的貢獻，可從內政部人口統計網站上查到按胎性區分的統計結果表一。由表中可知，台灣少子女化現象明顯。歷年出生嬰兒數急遽下降，然而相對的。雙胞胎的出生比率卻是年年上升，從二千年的二百三十七逐年增加到二千零一十八年的三百六十七。每年都有約三千多對的雙胞胎出生。

其中，依據國健署二千零一十七年人工生殖施行結果分析報告。當年度進行人工生殖的治療者其成功產下的嬰兒數有九千五百九十人，而這些透過人工生殖的嬰兒。有七百四十九為單胎生產、二百五十為雙胎生產、一為三胞胎以上生產。另外，在台大張珏教授進行雙胞胎需求研究時也發現到。其實，在統計數字之外。還有許多待改進的狀況，如在醫療品質及產後協助。

我們必須要注意到，國外早已有不少研究指出。因不孕而人工生殖的雙胞胎家庭，其生活品質容易因多個嬰兒出生而改變。例如社會烙印、胎兒之一往生、婚姻亮紅燈、孩子健康、家庭經濟或其他負荷、父母壓力、母親憂鬱、不孕經驗等。這是雙胞胎家庭極容易遇到的困擾，龍鳳胎因其性別不同的特殊性。自然又在某些部份有更大的壓力，父母親在心理及社會上需要特別的支持。除了家庭系統的協助，雙多胞胎、龍鳳胎的特別與難處。都還需要社會與政府的重視。

來源：生活小常識-寶貝!寶貝!113保護專線，親親.寶貝一協助孩子遠離家庭暴力

生活小常識-寶貝寶貝一百一十三保護專線，親親寶貝一協助孩子遠離家庭暴力

寶貝寶貝一百一十三保護專線

每個孩子都是家庭的寶貝、社會的希望，孩子就像脆弱的

幼苗。大人的一時情緒失控、不當體罰管教，或是心存僥倖而疏忽。都有可能在一瞬間造成無法補救的傷害。讓我們一起來寶貝孩子，讓他們都能在「免於恐懼、沒有傷害」的安全環境下，健康快樂地長大。

別讓憤怒情緒主宰您的行動

責打並不能教導孩子做好事情，它只會使孩子變得暴力並且失去控制。

父母一時情緒失控，可能造成孩子重大傷害，如腦部受傷或終身殘障甚至死亡。當孩子因而傷亡，父母會被依刑法和兒童及少年福利與權益保障法加重其十二，嚴重者判處無期徒刑！

孩子大部分是被憤怒的父母所傷害，不要讓憤怒主宰了您的行動，如果您害怕自己會傷害孩子，請立即尋求以下幫助：

- 當您覺得很生氣的時候，離開現場，不要接近孩子。
- 打電話給您的朋友或親戚，說出自己的憤怒。
- 向家庭教育中心，請教並學習正確管教孩子的要領。

父母心存僥倖將使自己觸法

兒童傷害大部分發生在家中，父母一時的疏忽可能導致兒童意外受傷甚至不幸喪生。包括誤觸火源燙傷、誤食藥物、玩窗簾拉繩致繞頸窒息、未鎖窗戶安全鎖而墜樓、悶死車內、火災或意外災害；兒童安全是父母的責任，不要心存僥倖。就算只是一分鐘也別讓寶貝單獨在家或留置車上。

「兒童及少年福利與權益保障法」中明文規定，不可以將六歲以下或需要特別看護之兒童及少年單獨放在危險的環境中。例如讓孩子一個人在家或是在車內，或是由不適當的人照顧（比如孩子。或酗酒、吸毒、身心狀況不佳足以影響兒少身心健康或安全者）。

違反以上規定，將會遭到罰款（三千元以上。一萬五千元以下），或是強制接受親職教育輔導（四小時以上。五十小時以下）。若拒絕參加輔導，將遭到累積罰款，一直罰到參加為止。

協助通報人人有責

如果發現鄰居孩子被責打、不當對待或單獨留在家裡，您可以幫忙打電話到一百一十三或報警一百一十請求協助，這樣可以避免孩子發生危險。

通報時請儘量蒐集相關資訊，如兒少的基本資料姓名、年齡、電話、地址等、受傷情形、受虐史、家庭狀況、生活照顧情形等。

通報資訊越完整，越有助於社工員及時、有效判斷案件之危急程度，給予適當處遇。

通報小提示

兒少的基本資料姓名、年齡、電話、地址等

受傷情形

受虐史

家庭狀況

生活照顧情形

親親・寶貝－協助孩子遠離家庭暴力

孩子出生後，夫妻間易因角色轉換、子女照顧及教養議題出現許多衝突，甚至出現家庭暴力行為。根據國內外相關研究及實務經驗顯示，長期目睹父母激烈爭吵或暴力行為，將對孩子產生許多負面影響。

目睹家庭暴力可能對孩子的影響

許多父母常認為孩子年紀小，不清楚父母之間發生什麼事。或即便孩子看到或聽到父母激烈爭吵或暴力行為，也不會有不良影響。但事實上，不論孩子年紀多小。當孩子看到或聽到父母間的激烈爭吵或暴力行為，都會使孩子的生理與心理發展產生負面影響。

長期目睹父母激烈衝突或暴力行為，孩子會出現以下反應：

- 嬰幼兒及學齡前階段
- 生理層面出現發展遲緩現象
- 出現嚴重的分離焦慮
- 因恐懼、不安而影響孩子探索及遊戲能力
- 在遊戲中可能模仿父母的暴力行為
- 不敢表達情緒，或用激烈的方式表達憤怒與攻擊
- 認為暴力是自己所導致的
- 出現退化（例如：已會自己上廁所後，突然變成經常尿在褲子上）

學齡期階段

- 恐懼、害怕、無力、憤怒、覺得都是自己的錯、缺乏安全感
- 攻擊行為、焦慮（如：咬指甲、拔頭髮）、沮喪、退縮
- 頭痛、胃痛、厭食、嗜睡、注意力不集中等
- 對父母說相愛卻彼此傷害的行為，感到困惑、混淆
- 認為暴力可以解決問題

如何幫助孩子遠離家庭暴力

家庭應是提供孩子穩定及安全成長的場所，保護孩子免於遭受家庭暴力的傷害更是父母的責任。因此，如果您和伴侶有意見上的爭執時。應冷靜地想辦法解決，切勿以暴力行為來逼迫對方屈服。或是藉由傷害孩子來報復對方，應尊重每個孩子的生命權。

如果您和伴侶的衝突已無法自行解決，甚至已經出現暴力行為。便應向專業人員尋求協助，或撥打一百一十三保護專線諮詢。才能真正改善彼此的關係，並讓孩子在安全、穩定及健康的關係中成長。

來源：生活小常識-口腔保健知多少

生活小常識 -口腔保健知多少

口腔保健知多少～小測驗提醒您！

兒童口腔衛生清潔

在寶寶零到六個月大未長牙前，進食後應該用紗布擦拭口腔包括牙床、黏膜及舌頭；六個月到一歲左右乳門齒長出後，可開始用含氟濃度一千以上牙膏清潔牙齒。根據國際指引，刷完含氟濃度一千以上牙膏後。其實要減量漱口，防齲（蛀）效果會更好。所以即使不會漱口的或一歲以下的小朋友，只要控制牙膏量就好。三歲以前米粒大小的量，三歲以上豌豆大小的量。

幫孩子刷牙時，要讓寶寶的頭部有所倚靠。並選在安全明亮的地方，例如坐在沙發、地毯或床上等。可讓寶寶枕在家長的大腿上，為保護寶寶的牙齦。所以刷牙的力量要輕柔。

兒童在起床後、三餐飯後或吃完東西後如：喝完母乳或牛奶、飲料及果汁、麥片及果泥、其他副食品等，以及晚上睡覺前都應該要用含氟濃度一千以上牙膏清潔牙齒。或至少一天刷兩次含氟濃度一千以上的牙膏。

固定刷牙的方法、時間、順序，讓孩子習慣固定的潔牙方式。此外，可搭配遊戲、音樂等來增加潔牙樂趣。

牙刷的使用方法

牙刷應選擇軟毛小頭的牙刷，且每三個月至半年更換一次。

牙刷及牙膏不可與他人共用，避免交叉感染。

刷牙時，牙刷刷毛朝向牙齦約四十五度。且要同時涵蓋牙齒與一些牙齦，刷上排牙齒時刷毛朝上。刷下排牙齒時刷毛朝下。每次以二顆牙齒為單位來回輕刷至少十次，並清潔到牙齒的每一面。

兒童刷牙順序：先刷右邊的頰側面咬合面舌側面，接著刷左邊的頰側面咬合面舌側面，最後刷上下門牙的唇側面舌側面

牙線棒的使用時機方法

當發現乳牙相鄰緊密時，就可以開始使用牙線（棒）清潔。

牙線棒主要是輔助牙刷的功能，可以去除牙縫中的食物殘渣與牙菌斑，最好能夠每天使用，至少睡前使用一次牙線棒清潔齒列。

牙線使用時，先拉出約四十五公分的牙線（長如手臂）。纏繞在雙手中指第二指節，比出手槍姿勢。以雙手姆指及食指打直撐住牙線，約留下一公分牙線或視兒童口內大小作調整。並將牙線拉成字型，使牙線緊貼牙面上下刮。

幼兒早發性齲齒（蛀牙）

蛀牙是因口腔內的細菌將食物發酵後，產生酸性物質侵蝕牙齒所形成。

嬰幼兒齲齒，經常發生在上顎前牙及後牙咬合面。初期牙齒會出現白斑，隨後轉變成褐色。黑色或產生窩洞。

含著奶瓶（母乳）入睡、經常吃含糖飲料或食物、或不良飲食習慣，都會提高早發性幼兒齲齒的風險。建議幼童減少攝取含有添加糖類的飲料及食物。

正確潔牙、使用含氟濃度一千以上牙膏、健康飲食、一歲前開始定期每三至六個月檢查塗氟及後牙窩溝封填，都能降低蛀牙發生。

來源：生活小常識-和尿布說掰掰～如廁訓練

生活小常識 -和尿布說掰掰～如廁訓練

和尿布說掰掰～如廁訓練

嬰兒的大小便是靠反射動作，完全無法自己控制；二至三

歲間。生理上已成熟到可以隨意控制大小便的肌肉，幼兒就能學會在內急時。不需要提醒，自己走向馬桶。脫下褲子大小便，之後再穿好褲子。這就是所謂完成「如廁訓練」了。能夠揮別尿布，真是孩子人生中的一大步！

順利完成如廁訓練的正確心態

孩子揮別尿布是遲早的事，家長不必太急躁，應保持輕鬆自在的態度，像是跟孩子玩遊戲似的完成訓練。

如果遇到阻力，勿跟孩子硬拗，可包回尿布等一、兩個星期後再試，如廁訓練終會成功的。

孩子失誤時，以有點惋惜的態度。告訴他下次想尿或解便的時候，趕快告訴大人。大人會幫助他。然後幫他清理乾淨，並請他幫點小忙。例如把髒尿布丟進垃圾桶等，勿責罵或體罰孩子。家長強烈的情緒反應常常是訓練失敗的主要原因。

即使已經成功的達成訓練，孩子仍會有幾個月的時間偶有「意外」發生。這是正常現象，勿苛責孩子。冷靜、淡然處理即可。

開始訓練的良好時機

一歲半至二歲之間，通常男孩會較女孩慢一些。

以下現象表示孩子已準備好了

感覺得到膀胱脹和便意（例如突然安靜下來、臉部表情改變、跳腳、蹲下、拉扯褲子或用語言、手勢告訴大人）。

尿濕了或解便了，會有所表示或讓大人知道。

喜歡換上乾淨的尿布。

瞭解「尿尿」、「嗯嗯」、「臭臭」、「便便」、「馬桶」、「乾的」、「乾淨」、「濕的」、「髒」的意思。

看過同性別的大人或孩子（例如手足）使用馬桶，知道馬桶是做什麼用的。

會自己拉下及拉上褲子。

訓練成功的訣竅

買了小馬桶後，先將它放在孩子常遊戲的地方。鼓勵他常常坐在上面，時間長短不拘。讓孩子逐漸熟悉它，視它為所有物。

注意孩子想小便或大便的跡象，或利用午睡剛睡醒或是飯後二十到三十分鐘的好時機。帶他到小馬桶處，鼓勵他脫下尿布坐上去。尿（或便）在裡面。

當孩子已經有一半的機率成功時，可以開始不穿尿布。改穿寬鬆的褲子，讓他練習自己拉下、拉上褲子。尿布只在午睡或夜裡才使用。

小技巧幫大忙

唸一、二本有關如廁訓練的故事書給孩子聽。

讓孩子跟一、二位已經達成訓練的孩子一起玩，並看著別的孩子使用小馬桶。

不要選擇孩子正處於反抗期或生病時開始訓練。

不要一直嘮嘮叨叨的提醒、催促孩子，只有在他顯示出有尿意或便意時才帶他去坐小馬桶。

不要強制孩子坐上小馬桶；孩子不想坐了，就應該讓他起來；即使孩子未抗拒，坐了五分鐘還解不出來，也應該讓他起來。

孩子肯合作就應該誇獎他，如果解出。更應同時給予精神鼓勵和實質上的獎勵（例如外出散步、貼紙等），可以有效地提高成功機率。不要怕物質獎勵寵壞孩子。

來源：生活小常識-培養良好的睡眠習慣、嬰兒猝死症預防有訣竅

生活小常識-培養良好的睡眠習慣、嬰兒猝死症預防有訣竅

培養良好的睡眠習慣

充足的睡眠，能使孩子維持充沛的體力和學習的企圖心。睡眠習慣不好，會導致睡眠不足或睡眠品質不良，使得孩子情緒不穩定、合作性差、學習興趣降低及不能專心。孩子睡不好，家長也可能睡不好。長久下來不但影響健康，亦傷害親子關係。因此有必要培養孩子良好的睡眠習慣。

大人孩子都好睡的訣竅

嬰幼兒夜間的睡眠分成七到八個週期，淺睡與深睡交替進行。淺睡時會有響動，可能吵醒同床的家長。此時除非孩子大哭，應避免一些不必要的安撫動作。如餵奶、拍背等，給孩子機會學習自行入睡比較適當。另外建議分床睡，減少互相干擾的機會（與父母同室不同床）。

二到三個月大後，夜裡儘量少換尿布。寶寶如有響動可先不理睬，除非他大哭。不然不要餵奶。餵奶時不要開大燈，不跟他說話或玩。亦可逐漸減少餵奶量，讓他體會白天和晚上的不同。而逐漸放棄夜間吃奶的習慣，一覺睡到天亮（吃母乳的寶寶可能要更大一些才會拉長夜間吃奶的間隔）。

六個月大後，儘量讓寶寶學會自行入睡。家長的幫助愈少愈好；總是習慣依賴大人拍、抱、搖，或餵奶哄他入睡的寶寶。在夜間由深睡回到淺睡狀態時，一旦感覺到沒有人安撫他就會醒來。吵著要大人再哄他入睡，一夜間發生數次都有可能。日復一日，家長的身心都會受到很大的干擾。

入睡的地方，應該就是寶寶夜裡睡覺的地方。若由家長抱著入睡，或在小搖床、沙發、大床等處先睡著後，再放回小床，也會讓寶寶在淺睡時感受到睡眠環境的不同而醒來。

如何養成孩子的好睡眠習慣

大多數孩子都是貪玩、不想上床睡覺的，因此睡前的掙扎與煩躁不安極為常見。為了孩子的健康，就寢時間不應由他自己決定。而是由家長在考量自己和孩子的需要後，訂定一個合理的就寢時間。並且確實執行。

替孩子建立一套「就寢儀式」，有助於順利入睡。也就是在睡前進行一系列、有一定順序、安靜的準備活動，幫助孩子放鬆心情，例如：尿尿洗澡換睡衣刷牙喝水上床講故事道晚安關燈。

嬰兒猝死症預防有訣竅

許多研究顯示，趴睡是導致嬰兒猝死症的重要危險因素；除了睡姿，還有一些關於睡眠環境的危險因子陸續被發現。避免這些可能的危險，並注意嬰兒睡姿及睡眠環境的安全，才能協助孩子擁有香甜的睡眠品質。

排除呼吸道阻塞因素，預防嬰兒睡眠中發生意外

寶寶應該仰睡，仰睡並不會增加嗆奶的機會，家長無須擔心。

趴睡易導致嬰兒猝死症，可能是因為有些嬰兒於睡夢中驚醒的神經反應不佳，所以容易發生窒息等事故，故不建議。

側睡因為容易翻身成趴睡，亦不建議。

寶寶的床墊應平滑，不可太軟。除了床單，不宜有任何的枕頭、棉被、毯子。也勿將填充玩偶放在嬰兒床上，或使用防撞護墊。

如使用毛巾被或毛毯，應將嬰兒裹至胸部，以減少蓋住臉部的機會。使用的被子不宜厚重或鬆軟。

寶寶不可和大人同床而睡，也不建議和其他孩子一起睡。包括多胞胎兄弟姊妹；若大人喝酒、服用影響清醒能力的藥物，或抽菸後。則更增加嬰兒猝死的危險性。

來源：生活小常識-無菸家庭

生活小常識-無菸家庭

菸品的煙霧中有超過七千種化學物質，其中數百種的成分具有毒性。有九十三種為有毒及致癌成分，「菸害」會增加孩子罹患呼吸道感染、氣喘、中耳炎、眼睛發炎、腸絞痛和嬰兒猝死症的機率。甚至會增加未來罹患癌症的風險。二手菸又稱被動吸菸，是指不吸菸的人吸取吸菸者噴吐的菸霧；三手菸是泛指吸菸後殘留在衣服、牆壁、傢俱。甚至是頭髮和皮膚等菸草殘餘化學物質，這些代謝物附著身上。毒性物質便四處傳播。近年出現的電子煙多含尼古丁，煙霧含重金屬及致癌物甲醛、乙醛與丙烯醛…等多種危害物質，所產生的二手菸亦含尼古丁及有害物質，危害孕婦與兒童健康。

寶貝孩子的健康，請不要吸菸及使用電子煙

孕婦吸菸會增加生出低體重兒，與嬰兒猝死症的風險，孩子發生學習障礙或腦性麻痺的風險也較高。

二手菸、三手菸會傷害所有的人，但對於孩童而言特別危險，包括：

會增加發生嬰兒猝死症的風險。

會影響嬰兒腦部功能，干擾正常的呼吸。

讓孩子容易咳嗽或打噴嚏、罹患氣喘或加重症狀、刺激耳咽管導致感染中耳炎。

讓孩子肺功能較差，容易罹患如支氣管炎、喉頭炎或肺炎等呼吸道疾病。

大人吸菸，使孩子更容易成為終生吸菸者，未來罹患癌症、喝酒、濫用藥物與發生問題行為等風險升高。

電子煙會增加使用者罹患心臟及肺部疾病風險，孕婦使用電子煙會危害胎兒成長，二手菸也會危害兒童健康及影響腦部發育。

保護孕婦與孩子的健康，建議您立即戒菸！

「菸害防制法」新規定自一百一十二年三月二十二日實施：

全面禁止電子煙在內之類菸品，且任何人不得使用（第十五條）。

孕婦不得吸菸（第十六條）。

任何人不得強迫、引誘或以其他方式使孕婦吸菸（第十七條）。

各級學校、幼兒園、托嬰中心、居家式托育服務場所及其

他供兒童及少年教育或活動為主要目的之場所全面禁菸（第十八條）。

室內公共場所與三人以上共用之室內工作場所全面禁菸（第十八條）。

於孕婦或未滿三歲兒童在場之室內場所不得吸菸（第二十條）。

來源：生活小常識-親子共讀

生活小常識-親子共讀

親子共讀

閱讀的重要性

「從孩子出生後，即可開始唸故事書給寶寶聽」已成為許多國家兒科醫療與教育界給家長的建議。因為儘早唸故事書給寶寶聽的互動方式，可以提供孩子穩定的成長環境。促進親子關係，不僅可以刺激認知及語言發展。還可以幫助孩子未來的情緒控制及社會適應等重要的能力，對嬰幼兒腦部的發育非常重要。嬰幼兒期的親子共讀，並不著重在認知學習。而是透過唸故事書，培養親子互動的感情。希望家長能夠從嬰兒期即開始建立親子共讀的習慣。

配合兒童年齡發展，您可以～

零到三個月大時

，父母可以將寶寶抱在懷裡。或躺在嬰兒床上，用溫柔輕鬆的聲音唸故事。並經常撫摸寶寶，讓寶寶熟悉父母溫柔的聲音。建立良好的親子關係。

三到六個月大的幼兒

，對鮮艷顏色的圖案特別感興趣。父母可以將孩子抱在懷裡，使用柔軟的布書或可以發出聲音的童書。用溫柔的聲音唸出書本上的圖畫內容。

六個月到一歲大的幼兒

，會開始想要模仿他人的說話及聲音。此時，父母可以抱著孩子。指著圖案說出物品或動物的名稱。這時期的幼兒可能會出現丟書、吃咬

書或用手拍打有趣圖片的動作，這些都是他們用來認識書本的正常行為。

十二個月大以後的孩童

，父母可以就孩子發展的情形。鼓勵孩子自己動手翻閱書本，從旁向孩子說出書本內容或圖片呈現的意涵。及試

著用簡單的語彙與孩子溝通互動，漸進加深親子共讀的方式與時間。

一到二歲的孩童

，建議父母多利用指圖命名的方式。即手指著圖片，並且同時說出圖片中的物品名稱或動作。然後鼓勵孩子跟著模仿大人說話仿說。

二歲以上的孩子

，父母可以多利用「開放性問句」來跟孩子互動說故事，並鼓勵孩子開口回答問題。

三歲以上的孩子

，父母可以再加入用手指文字帶著孩子閱讀。並且和孩子討論故事內容或大意，鼓勵孩子用自己的言語表達討論。父母也可以將故事內容與生活經驗結合，延伸討論話題。

「儘早唸故事書給幼兒聽」的簡單原則

一從「對話式共讀」開始：大人可以用看圖講故事和自問自答方式，邊講邊觀察孩子的反應，孩子的笑容、咬書、拍打、撕書都是喜歡書的表現。

二找個舒服的地方一起看書：大人的懷裡是孩子聽故事最舒服的位置，床邊的晚安故事，則是安撫孩子入眠的好方法。

三不需硬性規定時間：嬰幼兒專注力原本就不長，家長不需規定哪個時間一定要共讀，或是要共讀多久。只要大人和孩子都喜歡，即使每次共讀只有五分鐘也可以。

四由少而多建立閱讀習慣：建議剛開始每天撥出幾分鐘時間，找個輕鬆的角落抱著孩子輕柔的閱讀，然後再慢慢延長閱讀的時間，自然可養成閱讀習慣。

五不要過度約束孩子：孩子專注力較短，聽故事時可能一下子就分心，只要大人持之以恆，孩子自然就會過來參與。

六用溫暖的聲音朗讀，孩子自然會被吸引回到書裡。

七家長要以身作則：孩子的成長環境中，家裡經常有書，常有人閱讀，孩子自然而然就會親近書、親近閱讀。

來源：生活小常識-預防事故傷害、燒燙傷及瓦斯事故傷害緊急處理

生活小常識-預防事故傷害、燒燙傷及瓦斯事故傷害緊急處理

燒燙傷及瓦斯事故傷害緊急處理

常見燒燙傷及瓦斯外洩意外，在第一時間有其正確處理步驟。平日熟悉這些步驟，能在緊急時刻將傷害降到最低，所以請家長務必要牢記。

燙傷急救五步驟「沖、脫、泡、蓋、送」

沖迅速以流動的自來水沖洗傷口十五到三十分鐘，或將受傷部位浸泡於冷水內，以快速降低皮膚表面熱度。

脫充分泡濕後，再小心除去衣物；必要時用剪刀剪開衣服，並暫時保留黏住的部分，儘量避免將傷口水泡弄破。

泡繼續浸泡於冷水十五到三十分鐘，可減輕疼痛及穩定情緒。但若燙傷面積廣大，或幼童年齡較小。則不必浸泡過久，以免體溫下降過度。或延誤治療時機。

蓋用清潔乾淨的床單或布單、紗布覆蓋，勿任意塗上外用藥或民間偏方。這些東西可能無助於傷口的復原，並且容易引起傷口感染。及影響醫護人員的判斷和緊急處理。

送除極小之燙傷可以自理之外，應送往鄰近的醫療院所做進一步的處理，若傷勢較大，則最好轉送到設置有燙傷中心的醫院治療。

瓦斯外洩處理四步驟「禁、關、推、離」

禁禁止開或關任何電器用品，如抽油煙機、電燈等，也不可以插拔電插頭及觸碰瓦斯爐開關，以免產生火花。

關先關閉瓦斯總開關，避免瓦斯持續外洩。

推輕輕緩緩推開（打開）門窗，讓空氣流通。

離離開現場，疏散至屋外安全場所。再打電話通知當地瓦斯公司，請求檢測外洩情形。或通報一百一十九消防局求助。

來源：生產方式的選擇-剖腹產

生產方式的選擇-剖腹產

剖腹產屬於開腹手術，對胎兒及母體仍有潛在的風險，常見的剖腹產適應症包括：胎兒窘迫、胎位不正、多胞胎、前次剖腹產或子宮曾經接受手術者……等。

剖腹產小學堂

一手術過程中會有感覺嗎？

術前準備就緒，醫師會確認下刀位置，大部分在下腹部橫向劃開。剖腹產通常採取半身麻醉，以減緩手術過程中

引起的疼痛。

二術後可能帶來哪些風險？

部分產婦可能會對麻醉過敏，或有腸沾黏、泌尿道感染等。而再次懷孕發生子宮破裂的機率較高，或因為前置胎盤合併植入性胎盤的機率也會提升。新生兒也會有較高比例出現呼吸窘迫等狀況。

三還有機會進行肌膚接觸嗎？

剖腹產原則採半身麻醉，產婦仍屬於清醒狀態。待護理師確認寶寶的生命跡象正常，完成簡單的基本護理後。就能進行親子肌膚接觸。

來源：生產方式的選擇-自然產

生產方式的選擇-自然產

母胎正常的情況下，多數孕媽咪可以自然生產，其優點有產後恢復快、能儘早下床活動等。產前難免緊張，先做好預習，可以讓孕媽咪更有信心迎向生產。

產程三階段

談到自然產，就要先認識生產過程，產程可分成以下三個階段：

第一產程：

分為潛伏期及活動期

從子宮收縮開始，隨著收縮強度及頻率增加，子宮頸漸漸張開至完全擴張。

潛伏期

從規則子宮收縮開始進入潛伏期，住院後會進行以下評估：基本的身體檢查、子宮收縮的頻率、時間和強度、胎頭下降和胎兒先露部位，並確認孕媽咪的生產計畫。

活動期

主要特徵是子宮收縮強度變強，頻率變密。持續時間也較久，每位孕媽咪所要經歷的時間不太相同。第一胎跟第二胎的產程也不同，通常胎次越高。產程越快。

第二產程：

子宮頸完全擴張，至胎兒娩出

可能持續幾分鐘到幾小時，藉由子宮規律收縮，幫助胎兒娩出。如果產程延長，胎兒無法順利娩出，或是發生胎心音變化，須立即娩出。

第三產程：

胎兒娩出至胎盤娩出

從寶寶分娩出來後到胎盤完整娩出的時期，一般約幾分鐘到幾十分鐘，醫師或助產師隨後可能會進行會陰部傷口的縫合，以及觀察子宮收縮情況及產後出血。

自然產小學堂

一 生產時我該如何用對力？

在母嬰正常情況下，當子宮頸全開後會迫切想用力。請順著「自己的感覺」用力，可以發出聲音。自然用力與閉聲門用力皆可，選擇自己想要及有效的方式用力。

二 一定要灌腸、剃毛、剪會陰嗎？

目前各醫療院所都有提供生產計畫書的範本（參考孕媽咪健康手冊第二十七頁），裡頭清楚寫上待產時可能遇上的前置作業。包含是否灌腸、會陰部剃毛、禁食、人工破水等，建議產檢時與生產醫師或助產師充分討論。如過程中遇上非預期情況，建議仍以醫師或助產師的專業判斷處置。協助您擁有安全的生產經驗。

三 哪些情況需要器械的介入？（如：真空吸引、產鉗）

當產程進展不如預期，導致第二產程過久。胎頭無法順利下降，產婦過於疲憊。或是出現胎兒窘迫等情況，便會考慮使用真空吸引、產鉗等輔助陰道生產。

四 我會不會吃全餐？

本來預計自然產，在產程中可能因為產程延長、胎兒窘迫等因素。考量母體與胎兒的健康，最後不得不改以剖腹產方式生產。就是大家常說的「吃全餐」。要避免「吃全餐」的情況發生，規律產檢、適度運動、對生產有充分的認知與信心，都是關鍵要素。

來源：生產準備中！孕媽咪待產包及新生兒用品參考清單

生產準備中！孕媽咪待產包及新生兒用品參考清單

孕媽咪待產包參考清單

在孕期三十二週以後，準媽咪就能開始準備待產包囉！在整理的過程中，不妨讓伴侶及家人共同參與，等到入院待產時，才能在必要時幫助到您。而目前各醫療院所皆有提供部分用品，媽媽可依自身需求或習慣，調整待產包內容。

媽咪用品：盥洗用具牙刷、牙膏等、產墊、衛生護墊、束腹

帶剖腹產使用、貼身衣物哺乳內衣等、出院所需的衣物

寶寶用品：包巾、衣服、襪子、帽子、

證件資料：配偶雙方身分證、產婦健保卡、各項產前檢查資料、孕媽咪健康手冊

新生兒用品參考清單

為了降低新生兒回到家中的慌亂感，爸媽們不妨利用產前時間。準備好新生兒用品，為寶寶營造一個舒適溫暖的家。開心迎接他的到來！

奶瓶六到八支、消毒鍋一個、擠乳器一到二個、溫奶器一個、包巾二到三條、紗布衣三到四件、尿布一包、外出服二到三套、帽子、襪子一到二套、洗浴用品一個、浴盆一個、紗布巾、方巾六到八條、適齡的汽車安全座椅一個、背巾一條、手推車一台、媽媽包一個、共讀書籍二到三本、嬰兒床一張

來源：生產的多元選擇

生產的多元選擇

生產選擇除了熟知的自然產和剖腹產，還可以依照自己的意願及感受，事先與接生醫師或助產師進行充分討論，來選擇自己期待的生產方式。

當懷孕進入中期時，就可以開始依個人經驗及身體狀況與醫師或助產師討論生產計畫（參考孕媽咪健康手冊第二十七頁），包括生產方式、生產地點，例如：在醫院、診所、助產所或居家生產。選擇自然產時，採取蹲姿、跪趴姿、水中生產或家庭成員陪產，讓準媽咪能規劃符合個人需求生產環境與照護服務，擁有安全又安心的生產經驗。

建議選擇前，能透過產前溝通。擁有充分準備及認知，以最安心、安全的方法。迎接新生兒的到來！

來源：產前遺傳診斷(羊膜穿刺)補助問答集

產前遺傳診斷羊膜穿刺補助問答集

一

、產前遺傳診斷羊膜穿刺補助，是全部孕婦都適用嗎還是要符合怎樣條件才有補助

一：凡三十四歲以上孕婦、本人或配偶或家族有罹患遺傳性疾病、曾生育過異常兒、孕婦血清篩檢疑似染色體異常之危險機率大於一千二百七十、超音波篩檢胎兒可能有異常、或疑似基因疾病等孕婦，在婦產科醫療院所接受羊膜穿刺採檢，並送至國民健康署審查通過的臨床細胞遺傳學檢驗類指定檢驗機構七檢驗者，即可獲得補助。

二

、如果是外國籍或大陸地區人民，符合產前遺傳診斷羊膜穿刺補助條件之孕婦，也能補助產前遺傳診斷羊膜穿刺嗎？

二：外國籍或大陸地區人民尚未設籍者，配偶具有中華民國國籍。且符合產前遺傳診斷羊膜穿刺補助條件之孕婦，請向產檢院所提供配偶相關證明文件。即可於當次檢驗直接減免費用，不需額外申請。

三

、符合補助條件之孕婦，如何取得產前遺傳診斷羊膜穿刺補助？

三：符合補助條件的孕婦，將由產檢醫院協助填寫產前遺傳診斷申請表；補助費用會由產檢醫院協助，直接從自行負擔之費用中扣除。

四

、產前遺傳診斷羊膜穿刺補助減免多少費用？

四：衛生福利部國民健康署每年編列預算提供本項費用之部分補助，目前每案單胞胎補助上限為新臺幣五千元。但低收入戶、居住於優生保健措施醫療資源不足地區者，另減免新臺幣三千五百元。最高補助上限為新臺幣八千五百元。

五

、如果在家裡找到已經過期的產前遺傳診斷羊膜穿刺補助支票，還可以領嗎？要去哪裡領？

五：國民健康署於一百零三年十一月三日發布提高產前遺傳診斷補助，並回溯自一百零三年一月一日施行；減免檢驗費用從最高二。零元提高為五，零元。因此一百零三年一月一日至一百零三年十一月三日期間，依照舊的補助方案接受產前遺傳診斷檢驗費用之孕婦。在一百零三年會收到國民健康署以雙掛號寄送之差額補助支票。若在家中找到已經過期的差額補助支票，請依國民健康署官網上的「衛生福利部國民健康署一百零三年產前遺傳診斷補助差額支票未兌領或遺失支票費用匯款作業流程」八十七。將應備文件以掛號寄至國民健康署一萬零三百四十一臺北市大同區塔城街三十六號，婦幼健康組吳小姐收。國民健康署將會將款項直接匯至您提供的帳戶中。

來源：產前遺傳診斷補助(羊膜穿刺)

產前遺傳診斷補助羊膜穿刺

為減少新生兒先天異常的發生，推動產前遺傳診斷工作，以減少嚴重畸形兒的出生，減輕家庭及社會的負擔。符合補助條件之孕婦，將由產檢醫院協助填寫產前遺傳診斷申請表；政府提供補助費用五千元，會直接由產檢醫院協助您從自行負擔之費用中扣除補助費用，屆時您只要自付一些費用。如果您有任何疑問，請洽當地衛生局詢問。

什麼人需要產前遺傳診斷？

一百三十四歲以上孕婦。

二曾生育過先天異常兒者。

三本人或配偶有遺傳性疾病者。

四家族有遺傳性疾病者。

五其他可能生育先天異常兒之高危險群者。（如：經超音波或孕婦血清篩檢胎兒有異常可能者。

新生兒為什麼會先天性異常？

新生兒先天異常的發生原因有很多種，包括染色體異常、單基因突變、多因子遺傳或環境因素等，然而仍有很多先天異常其發生原因尚不清楚。

產前遺傳診斷常用的方法？

一羊膜腔穿刺術。

二絨毛膜取樣術。

三臍帶血採樣術。

什麼人需要產前遺傳診斷？

一百三十四歲以上孕婦。

二曾生育過先天異常兒者。

三本人或配偶有遺傳性疾病者。

四家族有遺傳性疾病者。

五其他可能生育先天異常兒之高危險群者。（如：經超音波或孕婦血清篩檢胎兒有異常可能者。

政府單位有補助產前遺傳診斷嗎？

一目前是由衛生福利部每年編列預算提供該項費用之部分補助，孕婦接受產前遺傳診斷者，仍然需要自付一些費用。有關政府補助或減免之金額，可洽詢採檢醫院或當

地衛生局。

二符合補助條件之孕婦，將由產檢醫院協助填寫產前遺傳診斷申請表；政府所提供之補助費用，會直接由產檢醫院協助您從自行負擔之費用中扣除補助費用，屆時您只要自付一些費用。

來源：產婦與痔瘡

孕產婦與痔瘡

孕期痔瘡急性發作怎麼辦？要該如何跟它說分手……

影片連結：

來源：產後住院生活

產後住院生活

恭喜寶寶平安誕生！孕媽咪在經歷長時間的陣痛、生產後，會在醫療院所待上約三到五天不等的時間。這段住院時間，重點將放在傷口的護理、觀察產後排出物狀況。以及學習哺乳。

自然產會陰傷口護理

使用於陰道傷口的縫合線會被人體吸收，大部分不需要拆線。產後的前兩天，產婦可能會覺得傷口有腫脹感、疼痛感。適當使用甜甜圈坐墊、採取側臥，都能讓產婦獲得良好的休息品質。

剖腹產腹部傷口護理

通常表皮傷口在手術後五到七天會逐漸癒合，但傷口較穩定需要四到六週的時間。鼓勵儘早下床，避免靜脈血栓的發生，下床前建議使用束腹帶支撐傷口，減緩因腹部用力而造成的傷口疼痛。

擔心留疤怎麼辦？

如果擔心疤痕明顯，剖腹產後的媽咪可以考慮使用預防疤痕貼片或凝膠。但因每個人的肌膚敏感度不同，建議事先諮詢醫師，以便選擇適合的產品。

產後排出物及狀態

產後排出物指的是陰道所排出的分泌物，混合子宮內的血液、胎膜、子宮頸的分泌物等。約在產後二至三天量最多，產後約至二個月會結束。顏色會從鮮紅色，慢慢轉為暗紅色、褐色。最後變成淡白色。

這些狀況要就醫！

產婦不妨透過每次更換護墊時，觀察產後排出物的狀態

。如量明顯變多、有異味，或是顏色持續是鮮紅色的。可能是有狀況，需告知醫護人員。以便妥善處理。

子宮按摩

正確的子宮按摩，能刺激子宮收縮，預防產後大出血。產婦可將手放至肚臍周圍，找尋子宮的位置，運用環狀按摩，使得子宮變硬。如果原本子宮收縮良好，就不需要刻意做子宮按摩。

親子同室

親子同室能讓媽咪及家人提前熟悉寶寶各種生理特性，同時也是學習照顧寶寶的最佳時機。要留意，除了母乳哺餵時，親子同室不同床，以免發生窒息危險。產後若身體恢復良好，不只是鼓勵媽咪與寶寶同室，家人也請共同分擔育兒之事，留給產後的媽咪多一點休息的時間。

來源：產後出院準備與照護知識

產後出院準備與照護知識

新生命的加入，同時也是新生活的開端，迎接新生兒的必備用品，相信新手爸媽在生產前皆已做足準備。提醒爸爸，如果有開車的話，「汽車安全座椅」是務必備妥的物品。依法規規定，二歲以下幼童應安置於車輛後座之攜帶式嬰兒床或後向幼童用座椅，裝好後必須穩固不搖晃，並確實繫緊安全帶。

幫伴侶注意回診時間

生產過後，會安排產後回診。以確認媽媽身體復原狀況，請爸爸記得日期。帶太太回診。坐月子期間若太太出現身體不適，例如傷口感染、發燒或不正常出血現象，則須提前回醫院就診。

我會緊抱寶寶，可以不用坐汽座？

「距離那麼近，我抱一下就好」。這樣的想法並不妥，要知道車輛撞擊發生的當下。瞬間力道甚至可達數百公斤！為了避免憾事，請務必堅守坐汽車安全座椅的原則。

兒童安全座椅四個簡單好記的小口訣

「後」：只安裝於「後」座，並選用「後」向式安全座椅

「安」：請依循各廠牌說明書「安」裝安全座椅

「固」：安裝完成後必須確認安全座椅穩「固」不搖晃

「指」：確認寶寶繫緊安全帶並保留一「指」寬的空隙

來源：產後媽咪最關心的事！解答月子期飲食6大迷思

產後媽咪最關心的事！解答月子期飲食六大迷思

很多人常說，女性把月子期做好，有助於恢復生產時所消耗的元氣，也能有機會調整體質。不過，隨著觀念的更新，該如何把月子做好？特別是在飲食這方面，仍然存在許多迷思及禁忌。

一：坐月子期間不能喝水？

老一輩的人都會說，坐月子不能喝水，主要是擔心水質不乾淨、過於生冷，也可能加重腿部水腫。其實這是多慮的，通常產後下肢水腫都會慢慢消退，而攝取足夠的水分，則有助於維持體內良好的新陳代謝。建議產後媽咪每日補充至少二千五百的水分，從食物、湯品、飲品中攝取都可以，能提高母乳量，也能減少便秘。

二：哪些水果適合產後媽咪？

適量攝取水果，媽咪們能獲得維生素、礦物質及膳食纖維，加速腸道蠕動，預防便秘。飲食中應避免太多生冷的水果及蔬菜，包含西瓜、梨子、橘子等。可以多選擇溫熱性水果，像是櫻桃、荔枝、龍眼、芒果等。或是柿子、梅子、葡萄、蘋果、鳳梨、香蕉、木瓜、甘蔗等中醫藥分類為平性的水果。

三：麻油類料理何時可以吃？

麻油性屬溫熱，可以驅寒。也因此傳統的月子餐中，都會使用麻油來製作各種進補料理。不過像是麻油、人蔘這類食材，在產後食用。都有可能增加傷口發炎、出血的風險，且麻油的成分一百%為脂肪。屬於高熱量食物，吃多了恐會對身體帶來負擔。

一般會建議產後一週內，因傷口還在發炎期。要避免麻油類料理；產後第二週，可酌量食用一些。到產後第三週之後，傷口、身體各項狀況都復原良好。就可正常食用，同時也要搭配全穀雜糧類、蔬菜水果類。以達營養均衡。

四：月子期的飲食禁忌？

在月子餐中，最需要留意的食材就是酒了。在傳統的觀念裡，認為產婦不宜喝酒。而使用純米酒來烹煮湯品，雖然米酒在煮沸後會揮發掉部分酒精。但殘留的酒精可能會對寶寶的睡眠及腦部發育造成影響，建議產後一週後再適量加入料理。

烹煮時也要記得開蓋並拉長烹煮時間，盡可能讓酒精揮發完全，產婦也應該酌量食用，並搭配大量的飲水。另外，像是咖啡、茶等這些含有咖啡因的食品。也要適量飲用，避免透過乳汁影響寶寶的情緒。而高熱量、加工類等食品也要避免過量。

五：冰飲及生食可以吃嗎？

剛生產完的媽咪，身體各項機能都還在恢復。在中醫的觀念裡，冷的食物吃多了。會讓體質變寒、濕氣太重，可能會抑制子宮收縮。讓惡露更難排出。生食方面，因為擔心有細菌疑慮，加上又是哺乳媽咪，就更不建議食用。

至於哪些算是生冷食物呢？像是橘子、瓜類、大白菜、菜頭等，屬性較為生冷，在月子期間，這類食物還是建議產婦儘量少吃。

六：哺乳媽咪可以喝咖啡嗎？

有在哺餵母乳的媽咪，只要是吃進肚中的食物、飲品。都可能讓寶寶吸收到，但也不是什麼東西都不能吃。只是要適量。以常見的咖啡因來說，孕婦一般建議一天攝取不要超過二百毫克，哺乳媽咪則以三百毫克為上限，等於是市售的兩杯卡布奇諾咖啡。除了咖啡之外，其實有些手搖飲也含有咖啡因成分。建議媽咪在購買時要多留意成分表，假如有發現寶寶容易焦躁不安或哭鬧。可能就要減少或是暫停攝取。

來源：產後媽咪看過來！妳知道如何運用政府補助的「產後健康照護服務」方案嗎？

產後媽咪看過來！妳知道如何運用政府補助的「產後健康照護服務」方案嗎？

新生兒的出生，讓家庭生活變得手忙腳亂。媽咪們的重心都放在孩子身上，卻忽略了經歷生產的身體。也是需要好好呵護及休息！國健署擴大對媽咪們的照顧，提供二次公費補助的產後健康照顧服務。盼藉由專業的醫療力量，守護媽咪的健康。一同陪伴寶寶成長茁壯。

產後回診為何重要？

不少媽咪會思考，都已經順利完成生產，為什麼還要再看婦產科？產後回診是許多人會忽略的重要環節，即便生產過程一切順利，產後的身體健康，以及心理狀態仍必須關注。透過回診，醫師能掌握媽咪產後子宮、傷口、乳房的恢復狀況。觀察產後排出物（惡露量）是否正常，並提供需要的哺乳衛教知識。特別是孕期患有妊娠糖尿病、妊娠高血壓、前置胎盤等高風險媽咪，產後更要積極回診。追蹤自身狀況，有助恢復至孕前的健康狀態。

二次公費產後照顧服務：產後一個月內、產後一個月至三個月內

生產對媽咪們的身體造成諸多改變，有些變化並不會隨著生產結束而消失，需靠產後繼續追蹤，評估身體機能是否恢復至孕前狀態。衛生福利部體貼到產後媽咪的身心健康，除了現有的十四次產前檢查，再加碼增加二次的產後健康照護服務，以下為服務對象、時程及內容：

服務對象：

一自一百一十四年五月起，具健保身分且有生產事實的產婦

二自一百一十四年八月起，配偶為我國國民且未納健保並有生產事實之新住民產婦

服務時程：

第一次在產後一個月內（建議於產後一到二週），第二次產後一個月至三個月內（建議於產後六到八週）。

服務內容：

主要包含生理量測、疾病與身體機能評估、心理健康自評、產後生活型態及生育相關諮詢等四類，說明如下：

•生理量測：

體重與血壓測量，了解媽咪產後身體恢復狀況。

•疾病與身體機能評估：

由專業醫師或助產人員進行孕產期疾病的後續評估，和慢性病、骨盆泌尿機能評估。

•心理健康自評：

提供愛丁堡憂鬱量表進行自我評估，再依照量表結果進行諮詢或是轉介給適合科別醫師。

•產後生活型態及生育相關諮詢：

在第一次健康照護服務中，會提供睡眠、戒菸、高血壓與其他慢性疾病的相關諮詢。在第二次健康照護服務時，會再提供運動、營養、性生活、避孕和預備下一胎的諮詢等。

產後回診關心六重點

無論是自然產，還是剖腹產。都有產後回診的必要性，傷口的復原好不好、產後排出物是否排乾淨且正常、哺乳是否順利等等的細節。都是醫師關心的重點。以下整理醫師於產後回診時，會關心的六個重點。假如媽咪在產後出現任何不適，不需要等到預定的回診日才就醫。而應儘早找尋醫師幫忙，以免錯過治療黃金期！

子宮大小及位置

:

觀察其收縮狀況。產後約四週，子宮便會下降至骨盆腔內；產後約六週左右，則會恢復至孕前的拳頭大小。

陰道狀況：

自然產後數日，需用煮沸過的飲用水進行簡單的會陰外部清潔，避免陰道或子宮感染發炎。

產後排出物的量及顏色：

產後排出物約會在產後一到二個月內結束，量應該是要越來越少。顏色也會從一開始的鮮紅色，慢慢轉變至粉紅色、淡黃色。然後消失。醫師會藉由超音波確認子宮內是否還有殘留物。

傷口復原：

剖腹產傷口恢復是否良好，需觀察是否存在異常分泌物或是疤痕組織，表層傷口約七到十日恢復，深層傷口則須三到四個月。自然產的會陰傷口恢復需七到十日。

哺乳知識：

哺乳媽咪可能會碰上各種疑難雜症，包含餵奶姿勢、不懂寶寶吃飽了沒、石頭奶等。目前各醫療院所都有專業的泌乳顧問，媽咪們不妨藉由回診時間。諮詢相關問題，或利用國民健康署設置的免付費孕產兒關懷諮詢專線：八百到八百七十-八百七十（諧音：抱緊您。抱緊您），由專人替您解答。幫助您哺乳更加順利。

心理層面：

家中突然有了新生命，身為新手爸媽。很多育兒事都還在學習當中，加上身體荷爾蒙的影響。媽咪們可能會出現心情低落的情況。這時除了身旁家人的支持，必要時尋求專業人員協助，讓情緒得到適合的抒發出口。

最後提醒媽咪，所有健保特約醫療院所，有提供產檢服務者，皆有提供產後健康照護服務。產後媽咪依然需要被呵護，愛孩子的同時，也別忘了好好照顧自己！

來源：產後子宮收縮不良問題大！促進子宮復原怎麼做？

產後子宮收縮不良問題大！促進子宮復原怎麼做？

子宮收縮，不只是分娩時的現象。產後的子宮收縮，有助於子宮傷口的止血癒合。及將子宮內的殘留物排出體外，是防止產後大出血的大功臣。

產後子宮收縮疼痛，俗稱的「產後痛」

生產前，子宮收縮的目的，是幫忙把胎兒娩出，宮縮並不會因分娩結束而消失。懷孕讓子宮的體積變大，分娩結束後。必須藉由收縮子宮來壓迫子宮內傷口的血管止血及癒合，大幅降低產後大出血的風險。同時幫忙把子宮內的殘留物排出體外，讓子宮恢復原狀。

產後子宮收縮的痛，也就是常聽到的「產後痛」。通常會在產後三天內，痛感最為明顯。約莫在產後數週逐漸緩解。然而，有在親餵母乳的媽咪。寶寶含乳頭時會刺激腦部分泌催產素，進而促進子宮收縮。媽咪們也會感覺到較明顯的宮縮痛。二胎以上的媽咪會比頭胎的媽咪感受到較強的宮縮痛。

正確按摩，有效幫助子宮恢復

生產後，除了會給予藥物促進宮縮外。護理師也會衛教媽咪正確的子宮按摩手法，刺激宮縮。防止產後大出血，也能幫助子宮內殘留物排出體外。

至於子宮按摩如何進行？

一首先媽咪要先找到子宮的位置。剛生產完的子宮，位於肚臍與恥骨之間。

二將手掌張開掌心向下壓約三至五公分左右，確認有感受到類似圓球狀的子宮。

三開始進行環狀按摩，直到子宮明顯由軟變硬為止。

由於產後前幾日子宮較大，能感受到子宮的收縮變化，產婦應把握這段時間，可加速子宮的復原。一般來說，約產後兩週，子宮會回到骨盆腔內；產後約四至六週的時間，大小及位置會恢復至懷孕之前。

促進子宮恢復必做的五件事

子宮經歷近十個月的孕期，以及生產時的壓力，產後正是修復的好時機！子宮若恢復良好，可減少媽咪們很多的產後問題，也能為下一胎做好準備。要讓子宮順利復原，產後日常應注意以下這五件事：

一觀察產後排出物：

產後排出物的顏色及量，是確認子宮健康的重要指標。產後頭幾日，出血量較多。顏色會是鮮紅色的；隨著時間，顏色會轉為淡紅色、粉紅色；最後變得淡黃色。或是透明分泌物，量也會慢慢減少。一旦發現產後排出物的量不減反增，還飄散著異味，就要儘快就醫。

二多休息，適度下床走動：

產後適度地下床走動是必要的，可使產後排出物加速排除，也能促進腸道蠕動，排便更順暢。而照顧寶寶之餘，也要記得多加休息，保有充足的睡眠，以助身體恢復。

三注意營養補充：

產後媽咪可以多補充富含鐵質及蛋白質的食物，一方面

補足生產時的失血，也能幫助傷口的復原。另外，像是酒精、人參、高油脂及冰冷食物儘量避免。

四 哺 餵 母 乳：

母乳含有豐富且獨特的營養價值，媽咪只要身體狀況許可。產後應積極哺乳，在親餵寶寶時。大腦會分泌催產素，促使子宮收縮。幫助子宮修復及產後排出物的排出。

五 產 後 回 診：

醫師會透過超音波，觀察子宮大小及位置。以及產後排出物是否排得乾淨，也會確認傷口的恢復狀況。產婦也能藉此反映身體的不適，以便醫師診斷。

來源：產後挑戰：心情不憂鬱

產 後 挑 戰：心 情 不 憂 鬱

心 情 不 憂 鬱

孕產婦會面臨不同程度的壓力，也可能出現情緒症狀，這些情緒問題常因不自覺或被忽視而未得到適當即時的處理，產後情緒問題主要分三大類：

產 後 情 緒 低 落

約三到八成產婦可能出現情緒變化大、心情低落、易怒、焦慮等情況，此為產後的環境變化或身心壓力造成。多數症狀輕，通常不超過二週。會自然緩解。出現產後情緒低落時，家人的體諒、協助與心理支持很重要。

周 產 期 憂 鬱 症

約一百一十的孕產婦從懷孕開始到產後一年的期間出現比較嚴重的憂鬱症狀，如：心情鬱悶，失眠、負面思考、無助無望感、缺乏興趣與動力、食慾減低，甚至出現想不開、自殺或傷害嬰兒的意念或行為。周產期憂鬱症不只是一般的情緒反應，是「生病」了，一定要尋求專業協助。

產 後 精 神 病

約有一萬一千的產婦可能會有幻聽、妄想等症狀。亦需專業介入。建議孕產媽咪多注意自身情緒，亦可用自評量表評估自身情況。若有情緒困擾，宜尋求家人及朋友的陪伴支持。並向婦產科醫師及專業醫師諮詢。

好像有點鬱悶？

生活中，情緒起伏是很正常的，但若持續感到情緒低落，可以運用心理量表瞭解自己的狀態。需要時，請勇敢尋求幫助，以確保心理健康。

當媽咪自覺情緒出現問題時，可以透過以下三個方式：

一先使用「愛丁堡產後憂鬱量表」或「心情溫度計」自評轉介專業治療。

二建議找家人及親友傾訴，把心裡的感覺說出口。

三向婦產科醫師及專業醫師諮詢。

給家人的一段話

周產期憂鬱可能被忽視或不自覺，因此常無法得到家人或親友及時的支持及抒發。同時產後媽咪在照顧新生兒時，需耗費相當的體力，也常致睡眠不足。因此，家人應該去分擔照顧新生兒及家庭勞務。減輕媽咪的身體負擔；平時多關心媽咪，如果發現有憂鬱的現象且長時間無法緩解。甚至加重時，應立即尋求醫療協助。

來源：產後掉髮

產後掉髮

頭皮的毛囊依據生長的狀態可分為生長期、過渡期、休止期。正常情況下約有九十的毛囊處於生長期，小於一%處於退化期，九處於休止期。生長期的時間約為二至六年，之後經過二至三星期的過渡期後進入休止期，再經過二至三個月後掉落，而被新生的頭髮取代。一般來說，每天的掉髮量在一百根內是不需要擔心的。

由於懷孕時動情激素升高，使得生長期的毛囊壽命延長。孕婦頭髮會有九十五%處於生長期，只有五%在休止期。因而掉髮狀況被內分泌抑制而減緩，所以頭髮比懷孕前較少掉落。相對來講髮量反而有比較濃密的傾向；當生產後動情激素驟減，原本因動情激素作用而維持在生長期的頭髮瞬間進入休止期。此時休止期的頭髮會增加，甚至可達六十五%。這個時期許多頭髮會同時進入休息的狀態，在兩、三個月之後大量掉落。形成所謂的”產後掉髮”，一般約持續二至六個月。多半會自行恢復，完全恢復約需半年至一年的時間。

除此之外，生產時的生理疼痛和心理壓力、生產失血造成貧血。也是造成休止期落髮的原因之一，所以產後的脫髮其實是回歸頭髮的生長常態。但因為掉髮速度有個別差異，以至於掉得比較快而集中的產婦。才會感覺特別嚴重，之後頭髮會回復正常的生長循環。但是如果產後焦躁或其他因素，如坐月子時沒注意頭皮清潔問題。造成頭皮阻塞等問題，也會導致頭髮不健康。

產婦只需要做好平日的頭髮護理，如使用溫和的洗髮精。適當的頭皮按摩促進血液循環，避免大力搔抓、過度拉扯、高溫吹整。這段時間也須避免做特殊的髮型如玉米鬚、綁馬尾，建議至少六個月內不要染燙頭髮。且注意平時梳理、清潔頭髮時，避免用力搓揉或拉扯；此外。飲食缺乏蛋白質、鐵、鋅、維生素、維生素等，都能造成頭皮營養

不良。使頭髮質、量受到間接的不良影響，應多多攝取含抗氧化成份的當季蔬果。並補充細胞代謝所需的養分，例如優質的蛋白質（大豆類、奶、蛋）。時時保持心情愉悅，攝取均衡的營養。充足的休息與睡眠，這些方法都能減少掉髮。早日恢復正常髮量。

來源：產後會漏尿怎麼辦？

產後會漏尿怎麼辦？

女性因用力的動作，例如咳嗽、打噴嚏、大笑、下樓梯、跳躍或提重物時。使腹腔的壓力突然上升，尿道閉合的壓力無法阻擋膀胱的壓力。導致漏尿或滲尿的問題，稱為壓力性尿失禁。常發生於多產、肥胖、骨盆腔曾經手術或更年期之婦女。

平常可作肛門緊縮的運動，每次五至十秒。再放鬆十秒，每天練習二十次左右。加強骨盆底肌肉力量，稱為凱格爾運動：

第一步：平躺，臀部夾緊，雙膝併攏，由腳之間提起下半身。

第二步：平躺，腳墊高並交叉，骨盆抬起臀部夾緊作內縮動作。

第三步：側躺，腿彎曲，用力交叉伸直，臀部夾緊。

第四步：手扶背後坐正，腿交叉，壓膝，臀部夾緊收縮骨盆。

治療方式需依個人的症狀，視病情狀況而採取最適宜的治療方式，建議您與婦產科或泌尿科醫師作進一步的諮詢。

來源：產後月經常見問題Q&A；：來的時間、疼痛感、月經量與規律性

產後月經常見問題：來的時間、疼痛感、月經量與規律性

月經幾乎陪伴女性大半人生，但在懷孕這段特殊時期。體內的荷爾蒙變化而使排卵暫停，子宮內膜保持穩定。為胚胎及寶寶持續生長提供營養。而懷孕過程的月經暫停，在產後經過一段時間的恢復後，月經即可再度回歸。

：產後第一次月經何時來？

無論自然產還是剖腹產，生產後子宮都需要一段恢復期，此時排出的不是月經，而是「產後排出物」。產後排出物由剝落的子宮內膜細胞、胎盤殘留、出血及分泌物所組成，顏色會由鮮紅逐漸轉為褐色再到黃色，通常持續約四到八週才結束。

等產後排出物結束，卵巢排卵功能恢復後，月經才會來，但時間會因個人體質及是否哺乳而異。多數人在產後六

到十週左右會來第一次月經；若哺餵母乳，期間泌乳激素持續分泌，月經可能會延遲到產後二十週左右才出現。

：產後月經沒來是不是就不會排卵？

雖然月經的出現，通常代表身體已經恢復排卵功能。但事實上何時恢復排卵，並無固定時間。月經來之前通常會先行排卵，無論是「月經恢復前不會排卵」或「產後第一次月經沒有排卵」的觀念都是不正確的；因此若尚未有再次懷孕的打算。產後只要有性行為就應做好避孕措施。

：產後幾次月經都不規律，什麼時候才能恢復？

產後媽媽常會遇到週期紊亂的情況，像是出血量少、天數縮短，甚至週期忽長忽短。這是因為產後體內激素波動，再加上照顧新生兒的疲累、育兒壓力與追奶壓力，都可能影響到月經的穩定與否。

不過媽咪不用太擔心，這些狀況通常會在產後第三個月經週期後逐漸改善，給自己多一點休息、保持放鬆，身體復原會更加順利。

：產後經期拉好長，怎麼回事？

除了月經規律的問題，有些媽咪也會有經期過長的情形，甚至經血滴滴答答遲遲無法結束。造成這種狀況的原因有很多，像是哺乳使泌乳激素升高、子宮收縮不良、有殘留組織在子宮裡、婦科疾病或荷爾蒙失調，甚至是月子期間調養方式不適合等引起，都可能造成經期延長。

除此之外，產後月經若經血中帶有明顯血塊、味道不對。或者同時伴隨發燒、下腹疼痛，就必須就醫檢查。透過超音波或必要的檢測，來確認媽咪的子宮恢復狀況或問題。

：產後月經量突然變多／變少了

一般正常月經持續時間約三到七天，出血量為三十至八十毫升，若經血超過八十毫升，就是出血量偏多。

產後媽咪出血量增加，可能和過度疲勞、情緒起伏有關，也可能與子宮肌腺瘤、子宮息肉等婦科疾病有關；而月經量減少的可能原因包括，飲食熱量不足、壓力過大或內分泌紊亂等。若是長期月經量過少，甚至伴隨異常不適，就需要回診檢查，排除感染、手術後沾黏或荷爾蒙失調等情況。

：聽說產後經痛會減輕？

有些媽咪可能聽過：生完孩子後，月經來時好像比較不痛了。其實是因為當月經來潮時，子宮收縮會讓經血往下排出。但有時候也可能逆流到骨盆腔，引起骨盆的脹痛。而女性在生產過後，子宮的功能變得更加成熟。子宮頸口也比以前寬大，經血排出較為順暢。因此而減少疼痛的

發生。

不過，如果經痛原因是「續發性經痛」引起。也就是有特定病因導致的經痛（像子宮內膜異位症等），就算經過生產。若問題沒有根治，疼痛依舊可能存在。

因此，產後若仍出現明顯或過度的經痛，或是經期過長或過短，都應給專業醫師檢查。提醒媽咪的是，每個人身體狀況不同。產後身體恢復所需時間也有差異，應多點耐心與溫柔對待。若有問題也可透過政府二次的產後健康照護服務，獲得相關醫療協助。

「產後健康照護服務」方案

服務對象：

一自一百一十四年五月起，具健保身分且有生產事實的產婦

二自一百一十四年八月起，配偶為我國國民且未納健保並有生產事實之新住民產婦

服務時程：

第一次在產後一個月內（建議於產後一到二週），第二次產後一個月至三個月內（建議於產後六到八週）。

服務內容：

- 生理量測
- 疾病與身體機能評估
- 心理健康自評
- 產後生活型態及生育相關諮詢

來源：產後要喝生化湯才能把惡露排乾淨？

產後要喝生化湯才能把惡露排乾淨？

產後坐月子中的固有傳統，就是要服用「生化湯」。古書上記載，生化湯具有「生新血、化瘀血」的功用，所謂的化瘀血就是促進子宮內惡露排出的意思，一天一帖服用五到七天。

產後西醫婦產科醫師多半會開「子宮收縮的藥」以促進產婦子宮復原。若產婦持續服用子宮收縮劑或子宮收縮不正常者同時服用生化湯，則反而可能導致出血過多。建議若想藉助生化湯來排除惡露，最好經由合格中醫師親視把脈診察。評估個人體質及產後狀態，開立個別化的調理處方。否則盲目服用，易引起子宮過度收縮及出血。這樣反而對產後復原不利。

來源：產後身體恢復：第一次月經、避孕方法

產後身體恢復：第一次月經、避孕方法

女性的身體從懷孕到生產經歷巨大的轉變，產後掌握坐月子期間。攝取均衡營養，讓身體機能修復。並培養親子關係，讓身心皆恢復到健康狀態。

坐月子選擇

隨著時代的進步，產後坐月子的方式越來越多元。包括請親友幫忙在家坐月子，也可以到產後護理之家。媽咪可依自身需求來選擇。

延伸閱讀：

【護理及健康照護司】產後護理之家評鑑專區

【孕產婦關懷網站】坐月子的方式及事先安排

產後的第一次月經

產後第一次月經來潮的時間，與是否哺餵母乳及個人身體狀況有關。如果是全母乳的媽咪，由於泌乳激素持續分泌。月經會較晚出現，若是非全母乳的媽咪。平均產後約六至八週會來第一次月經，有些人甚至會更早。

延伸閱讀：

【健康九九】如何預防子宮頸癌？

避孕方法

在產後第一次月經來之前，體內不代表不會排卵，只要有性行為的發生，都有可能懷孕。常見的避孕方法有以下四種，媽咪可依自身需求來選擇：

來源：產後運動健康做

產後運動健康做

產後進行適當的運動是安全和健康的，它可以幫助您感覺充滿能量、減少壓力。降低產後憂鬱的發生，維持體能與體態。避免肥胖而併發高血壓或糖尿病。

產後運動有原則

頻率：每天或至少每週五天以上

時間：每天至少三十分鐘以上或每週一百五十分鐘以上

強度：逐漸地增加強度至中等費力程度

型態：有氧、肌力（至少每週二天）

方法及策略

可先從五到十分鐘開始、逐漸增加。

以分段多次方式來累積，一天至少三十分鐘以上的運動量，逐漸地增加至可一次三十分鐘以上的運動能力及體力。

不同生產方式的運動建議

自然產

生產後若沒有任何不舒服或醫療上的限制，宜早期下床活動，並在體力及體能的許可下，漸進式的增加活動及運動。

剖腹產

宜早期下床活動，可以促進體力恢復。當產後不適的症狀較緩解、生命徵象及動作穩定時，可採溫和方式逐漸增加運動。

產後零到三週運動建議

骨盆底肌運動

時間：產後若沒有嚴重的會陰撕裂傷，可儘早執行。

優點：增加骨盆底肌恢復，及避免產後尿失禁的發生。

方式：收縮會陰及肛門口肌肉五秒，放鬆五秒，重複十次，一天可以執行數次。

走路

低強度的走路，減少對骨盆底肌的壓力，分段逐漸累積至可達到三十分鐘以上。

登階或爬樓梯

視自己的體力，溫和緩慢的增加頻率。

產後三到六週運動建議

負重運動

當限制活動十五到三十天時，易導致肌肉及肌力的流失。

剖腹產孕婦，建議重量以不超過自己寶寶的重量為限制。

避免負重運動過程中，採過度閉氣或閉氣過久而增加腹

內壓力。

訓練目標：抱小孩所需的肌力強化

一坐姿，雙手將物品（如三公斤左右的背包）抱至胸前。

坐在椅子前面十三的位置，然後背要挺直。

雙腳張開，與屁股同寬。

二吸氣收緊核心，吐氣慢慢站起來，接著慢慢坐下。

強化腹部核心肌群運動

採溫和漸進方式執行或增加。

懷孕期間腹直肌分離，易導致產後腹部肌肉鬆垮或鬆弛，且懷孕期間身體重心及姿勢改變導致的下背痛等問題，皆與腹部核心肌群有關聯。

訓練目標：啟動核心肌群

運用核心肌群的力量，將膝蓋往肩膀方向帶。慢慢地抬起臀部和下背，停頓一下。再慢慢地回到起始動作。

產後六週後的運動建議

與一般成人的運動建議相同。

產後運動注意事項

一避免於飯前或飯後一小時內進行，運動前先排空膀胱，運動後適當補充水分。

二躺姿運動建議在有支撐性的平面上進行，不宜過軟過硬。

三運動次數由少漸多，量力而為，勿勉強或過累。

四運動中如產後排出物增多或是任何不適，則須暫時停止運動。

五有特殊情況或是手術生產者，建議先諮詢醫護人員後再進行。

六產後若有肌肉骨骼疼痛或是產後尿失禁問題，請先尋求相關醫療專業評估與治療。

七運動並不會影響乳汁品質，哺乳媽咪可以放心運動。記得穿著支撐性較好的內衣，避免乳頭摩擦。並於運動前哺餵完畢。

來源：產後運動應注意事項

產後運動應注意事項

懷孕過程孕婦的腹直肌會被拉長，腹斜肌或腹橫肌也容易產生鬆弛無力的現象。造成產後腹部鬆弛，加上懷孕期間若姿勢不良可能產生脊柱歪斜與肌力不平衡。因而導致背痛。另外，懷孕或生產的過程若骨盆底肌群受到影響，易造成產後婦女，偶有尿液不由自主流出的情況。因此，執行產後運動具有下列的目的與益處

一 促進子宮收縮，預防產後大出血

二 促進腸蠕動，預防便秘

三 促進血液循環，預防血栓靜脈炎發生

四 增強腹肌張力，減少腰酸背痛，且有助於早日恢復身材，

五 促進骨盆底肌肉收縮，使骨盆的器官恢復原來的位置，預防子宮脫垂、直腸膨出、尿失禁等問題

六 促進體力及活力的恢復，減輕焦慮及壓力，以適應新角色的改變

產後運動何時開始呢？

如果生產過程順利，無任何併發症。在產後住院期間就可嘗試一些較簡單的臥床運動，如生產過程有難產的現象。傷口裂傷太大或剖腹生產者，依傷口及個人情形在傷口復原後。可選擇適宜的運動，以不會引起傷口疼痛為原則。

執行產後運動應注意事項如下：

一 避免於飯前或飯後一小時內進行，運動前先排空膀胱。

二 選擇在硬板床或榻榻米或地板上進行。

三 穿著寬鬆、輕便、透氣、彈性佳的衣褲，且注意室內空氣是否流通。

四 運動過程中，配合深呼吸，並以漸進方式進行，以增加耐力。

五 運動次數由少漸多，量力而為，勿勉強或過累。

六 運動中如有惡露增多或不適，則需暫時停止，待恢復正常後再開始進行。

七 運動後適當休息，補充水份。

八 持之以恆，至少連續運動二到三個月。

九有特殊情況或手術生產者宜先請教醫護人員後再進行。

來源：產痛一定會痛？要出發到醫院了？

產痛一定會痛？要出發到醫院了？

產痛一定會痛？要出發到醫院了？

「現在是陣痛開始了嗎？」、「我是不是快生了」、「該到醫院待產了嗎？」、「會不會被醫院退貨？」落紅、破水、子宮規律收縮是三大產兆，學會初步判斷的方法，順利到醫院待產。

三大產兆介紹請看「懷孕後期小驚喜：等待產兆」

是「陣痛來臨」還是「假性陣痛」？

宮縮狀況是判斷真假陣痛的重要指標，如有規則宮縮，且有明顯疼痛不舒服感，應至醫療院所檢查。

「陣痛來臨」時的子宮收縮會有休息期，而且有規則性。像是子宮整個緊繃，然後變軟。再變回緊繃。

「假性陣痛」則是時間與頻率都沒有規律性，大多只是下腹悶痛的感覺，通常休息一下就可以緩解。

陣痛來臨

宮縮時間：間隔時間較短

是否能緩解：很難緩解

宮縮強度：強

假性陣痛

宮縮時間：不規則也不密集

是否能緩解：大多會緩解或自行停止

宮縮強度：較弱

是破水、陰道分泌物還是漏尿？

陰道有水流出，就是破水了嗎？可以從流出液體的流量、味道，試著分辨它是破水、分泌物還是漏尿，如無法確認狀況應至醫療院所就醫檢查。

來源：用『親子共讀』促進孩子的腦部發育

用『親子共讀』促進孩子的腦部發育

在兒童發展評估門診中，發現有愈來愈多的孩子在語言能力上是落後的。原因多半是家長陪伴太少，或只知道陪孩子玩玩具；專注力也是常見於孩子的問題。看太多的電視或三產品，或是整天帶孩子往外跑。孩子專注力的持續度沒有被訓練。「親子共讀」不但能促進孩子的語言發展、智能發展，也對未來情緒行為發展有幫助。對於孩子專注力的穩定度，也能有提升的作用。親子共讀的重點在於家長必須利用自己溫暖又熟悉的聲音講故事給孩子聽，家長的聲音能夠活化孩童腦部更多區域，是有聲書無法比擬的。孩童三歲以前腦部發育最快，所以出生至三歲前是親子共讀建立的最佳時間點。然而，親子共讀的精神究竟為何？該怎麼讀才能吸引孩子的目光或興趣？對許多家長而言是很大的挑戰。

親子共讀的重點在於「對話式共讀」，最初是由美國心理學家教授在一千九百九十八年開發的一種親子閱讀方式。旨在改變傳統家長與孩子的角色，使孩子成為主要的說故事者。家長在旁聆聽、引導，增加親子間的語言互動。以促進孩子的心智發展。例如：一到二歲，可以詢問指認及命名圖畫書上的圖案；二歲以上可以多以開放性問句詢問孩子問題，訓練孩子完整句子的表達能力。透過對話共讀的方式，也可以幫助家長了解孩子的反應是否適當，是否符合其年齡發展。

對話式共讀」遵循三種原則：一鼓勵孩子參與；二鼓勵孩子回饋；三依據孩子語言能力，調整閱讀方式。許多家長在共讀時，只是單純的唸，卻忽略孩子反應的重要性，孩子也缺乏口語回應的機會。所謂的「對話」是指要能一問一答，家長問開放性問題讓孩子學習回答，才能訓練孩子語言表達的能力。以下分述不同年齡層，建議家長可使用的閱讀技巧

零到二歲的幼兒

一親子共讀年齡越早越好。

二多利用韻文、兒謠或遊戲來吸引寶寶的興趣。

三做任何日常生活動作都可以說給寶寶聽。

四試著讓寶寶模仿父母的聲音。

五當寶寶發出聲音時，給他一個擁抱鼓勵。六嘗試讓一歲半以上孩子自己翻書。

二歲以上的兒童

一時間不侷限，唸故事書時間不一定要很久，不一定要把整本書唸完。

二可以看圖說故事或唱歌，不須照字唸。

三看故事書封面，也可以讓較大孩子預測故事書內容。

四家長手指著字唸，從上到下，從左到右。

五肢體語言或聲音讓故事內容更生動。

六從故事延伸到家庭的日常生活經驗。

七從故事中問孩子問題，也鼓勵孩子問問題。八讓三歲以上的孩子自己說故事給父母聽。

最後，掌握「大聲讀」並且「開心讀」的技巧是非常重要的。在閱讀時保持愉快的心情與孩子互動，這樣一來不僅讓孩子覺得共讀非常好玩有趣。更能增進親子間的情誼。記住這兩個技巧「大聲讀」及「開心讀」，共讀效果會事半功倍喔！

來源：用包巾包住寶寶，他才不會「驚到」？

用包巾包住寶寶，他才不會「驚到」？

新生兒因為神經發育尚未成熟的關係，會有許多原始反射，如「驚嚇反射」就是其中之一。典型的驚嚇反射為：在不碰觸嬰兒的情況下，周遭發出聲響而引發手臂外展、手指張開，然後手肘彎曲且拳頭緊握、雙臂互抱的驚嚇反應。

寶寶會因為身體移動或噪音引起「驚嚇反射」驚醒而哭，對這樣的情況。可以在寶寶睡覺時用包巾稍微將寶寶包住，抑制此種反射頻率。不可用絲襪或繩子綁住固定。由於「驚嚇反射」對新生兒來說是很正常的，如果沒有常常因此反射而驚醒，平時就不需用包巾把寶寶全身包起來。在寶寶一個月大時最明顯，大約在五～六個月大時就會消失。

來源：用心呵護寶寶的嬌嫩屁屁！如何預防尿布疹的發生？

用心呵護寶寶的嬌嫩屁屁！如何預防尿布疹的發生？

尿布疹好發原因多為悶熱、過敏，不僅僅是在夏季，冬天幫孩子穿過多的衣物、擔心天氣冷而減少換尿布的次數，這些行為都有可能引發尿布疹。

四種常見尿布疹類型

一刺激型尿布疹：屁屁肌膚長時間與尿液、糞便接觸，受到這些排泄物的刺激。加上與尿布、衣物的摩擦，就會產生「刺激型尿布疹」。疹子多出現在肛門周邊，以及屁股隆起的位置。

二悶熱型尿布疹：就像是汗疹一樣，悶熱型尿布疹主要是因為尿布的透氣度不夠。屁屁肌膚過於悶熱所引起的，疹子多出現在尿布包住較不透氣的部位。包含腰部、大腿根部（尿布鬆緊帶位置）等，保持這些皮膚區域的乾爽透

氣。即能緩解症狀。

三過敏型尿布疹：市售的尿布，有些會標榜添加香味、抑菌成分等。但孩子的肌膚十分脆弱，這些成分可能增加孩子肌膚過敏的風險。進而造成過敏型尿布疹，整個屁股都可能會有症狀。爸媽們在為孩子挑選尿布種類時，需要特別留意。

四感染型尿布疹：尿布與寶寶的肌膚長時間包覆在一起，尿布中的環境開始變得潮濕。就會開始滋生細菌、黴菌，像是常見的鏈球菌、葡萄球菌、念珠菌等。因此造成「感染型尿布疹」，會在皮膚皺摺處。比如說股溝、外生殖器等部位出現零星狀的小紅疹或是白點。

預防尿布疹兩重點

造成尿布疹的多數原因，來自於悶熱及刺激物，爸媽們只要謹記兩個重點：勤換尿布、保持屁屁的乾爽，就不用擔心尿布疹傷害寶寶的屁屁肌膚。

至於勤換尿布，是要多久換一次才好呢？只要寶寶有大便，爸媽們就該馬上更換。並以水洗屁屁，取代用濕紙巾擦拭。減少屁屁肌膚受到摩擦。小便量就算少，也建議不要穿戴超過兩小時。如果想要讓寶寶在夜晚擁有較好的睡眠品質，可以將尿布換成夜晚型尿布。增加尿布的吸水量及透氣度，盡可能降低對寶寶肌膚的傷害。

保持屁屁的乾爽，可說是預防紅屁股最有效的方法。在天氣、室內溫度許可的情況下，爸媽們為寶寶清潔完屁屁後。可以讓寶寶光著屁股一小段時間，讓肌膚上所殘留的水分完全乾燥再包上尿布。如此一來，寶寶也會覺得舒服不少。

尿布挑選四提醒

尿布是寶寶最親密的朋友，同時也 and 尿布疹密切相關，以下提供爸媽們挑選尿布的四個方向：

一尺寸：選尿布的第一步，就是選擇適合寶寶的尺寸。爸媽們不能只參考寶寶的年齡，而應依照寶寶的體型。以及實際生活的習慣，挑選包覆性夠又能方便活動款式。當發現寶寶的大腿有明顯勒痕、魔鬼氈有點黏不起來時，則表示需要更換更大的尺寸囉！

二透氣度：尿布與寶寶二十四小時不離身，尿布是否透氣真的好重要，才能有效將尿布中的濕氣、熱氣排出，維持屁屁肌膚的舒適度。

三材質：寶寶屁股的肌膚相當稚嫩、脆弱，尿布所使用的材質必須親膚，才能減少肌膚與尿布的摩擦，造成不適。市面上有些款式的尿布會展示出來，爸媽們不妨可以實際摸摸看，感受一下。

四吸水量：擁有足夠的吸水量，能確保寶寶屁屁保持乾爽

。假如寶寶已經能睡過夜，爸媽們可挑選夜晚型尿布。吸水量及透氣度都比一般尿布來的高，可讓寶寶一夜好眠。

發生尿布疹，尋求專業醫師求助

多數育兒家庭都備有屁屁膏，於更換尿布時擦拭在肛門周邊，來預防尿布疹的生成。市售的屁屁膏多數含有氧化鋅，能達到隔絕排泄物及肌膚的效果。只要寶寶使用起來不會不舒服，也沒有對成分過敏。爸媽們可以繼續使用。

不過，當寶寶出現尿布疹時。建議要帶給專業醫師治療，不要自行到坊間購買成藥。恐會讓問題越變越嚴重。針對感染型尿布疹，醫師會開立抗生素，並依個別情況來決定用藥的天數。其餘類型的尿布疹，則是會開立像是類固醇藥膏。能快速解決紅腫癢的困擾，不過這類藥物不能長期使用。症狀有改善時，則建議停止使用。

來源：疑似家庭暴力情事之處理

疑似家庭暴力情事之處理

一請於知悉家暴案件等情事後，於二十四小時內電話通報一百一十三保護專線

，或連結「社會安全網-關懷起來」網頁進行線上通報。或請醫院之相關工作人員填妥通報表（可由醫院之社會服務室相關部門提供），逕傳真至各縣市政府家庭暴力及性侵害防治中心。辦理通報事宜，俾提供被害人妥適服務。

二依家庭暴力防治法第五十條規定，醫事人員、社會工作人員、教育人員、保育人員、警察人員、移民業務人員及其他執行家庭暴力防治人員。在執行職務時知有疑似家庭暴力，應立即通報當地主管機關。至遲不得逾二十四小時。未依規定通報者，依同法第六十二條第一項規定，由直轄市、縣（市）主管機關處新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰。但醫事人員為避免被害人身體緊急危難而違反者，不罰。

三醫事人員執行醫療業務時，如發現有依法所應強制通報之家暴案件。若當事人表達不願意被通報，可於通報表上註明當事人無意願通報。以提醒各直轄市、縣市政府家庭暴力及性侵害防治中心後續處理之技巧。如發現親密關係暴力案件，為儘早辨識高危機個案，應施予台灣親密關係暴力危險評估表（），並於次月十日前至衛生福利部家庭暴力資料庫系統完成填報。

來源：發燒的正確處置

發燒的正確處置

發燒是兒童生病最常見的症狀表現之一，但發燒未必就是疾病引起。發燒可以促進免疫功能，貿然退燒未必有助

孩子的健康。應把握正確處理原則，避免不當的退燒方法。才能夠協助孩子康復。

關於發燒現象

發燒的定義為身體內部中心體溫三十八。

人體生病引起的發炎反應會讓體溫的定位點提高，所以造成發燒現象。

開始發燒時，身體會感到發寒、四肢冰冷，這是體溫定位點上升的結果。

一旦體溫提高到定位點之後，四肢會變溫熱，也不會有明顯怕冷的感覺。

發燒一段時間或使用退燒藥以後，體溫定位點下降，身體可能會覺得熱，並開始流汗退燒。

測量體溫：

肛溫最接近身體內部的中心體溫，耳溫與肛溫的相關性很高，但三個月以下嬰兒的耳溫與中心體溫的相關性較差。

口溫平均比肛溫低，腋溫平均比肛溫低。

一個月以下或體重很低的新生兒，不適合量肛溫與耳溫，可考慮量腋溫或背溫。

重新認識發燒的影響：

適度發燒可以提升免疫系統的效能，有研究顯示退燒藥會壓抑身體免疫反應，反而可能延緩疾病的康復。

人體對發炎反應引起的發燒有調控機制，所以一般不會超過四十一。

有些家長擔心如果不積極退燒，孩子的體溫可能一直往上飆高，其實人體的體溫調控機制不會讓體溫無限上升。坊間孩子腦子燒壞的傳說，其實是孩子罹患腦炎、腦膜炎等疾病而留下神經後遺症，與發燒無直接因果關係。

必須注意的危險病徵

有無發燒和體溫高低都不一定能代表疾病嚴重程度。兒童生病時，重要的是觀察有無重症危險病徵，如果有下列情形就必須儘速至醫師處診治。

三個月以下嬰兒出現發燒症狀

咳痰有血絲

尿量大幅減少

呼吸暫停哭泣時沒有眼淚

頸部僵硬

皮膚出現紫斑

持續頭痛與嘔吐

嘴唇、手指、腳趾發黑

心跳速度太慢、心跳不規則

痙攣、肌抽躍（肌肉不自主快速抽動，像觸電一樣）、肢體麻痺、感覺異常

未發燒時呼吸急促、呼吸困難、吸氣時胸壁凹陷

意識不清、持續昏睡、未發燒時躁動不安、眼神呆滯

無法正常活動，例如不能爬樓梯、走小段路便會很喘

退燒的時機：

發燒大多是因為一般感冒病毒所引起，這一類的發燒通常幾天內就會自動退燒，退燒藥物只是緩解發燒所產生的身體不適，並非殺死病毒。因此若非發炎性疾病導致，例如衣服穿太多、中暑之類的體溫過高，由於這種高體溫對人體並沒有幫助，隨時都可予以退燒。至於發炎反應引起的發燒，如果體溫並未太高（超過三十九）也沒有引起特殊不舒服時，並不需要積極退燒。要注意的是，發燒對下列病人會產生較大的不良影響，所以當體溫超過三十八，就可考慮積極退燒：

慢性肺病

併發心臟衰竭之心臟病或發紺性心臟病

曾有熱性痙攣或癲癇發作

嚴重的神經肌肉疾病

慢性貧血

糖尿病與其他代謝異常（例如先天酵素缺乏）

其他因為發燒而有特殊不適症狀。

認識正確的退燒方法：

各種退燒藥物中，除了阿斯匹靈不可用於十八歲以下兒童，其他口服與塞劑之退燒藥均可於必要時適量使用。

單純注射點滴並沒有退燒效果。

冰枕、溫水拭浴等物理退燒法，並不會改變發炎反應引起體溫定位點的異常上升現象，所以不會有退燒效果，反而可能造成發燒兒童額外的代謝負擔。

衣服穿太多、中暑等產熱與散熱失調的情形也會造成發燒現象，但此時身體的體溫定位點其實是正常的，在這種情況下使用物理退燒法才會有些幫助。

剛出現發燒症狀時，可先做一些簡易的居家護理：

一、多喝水來補充水份，避免因發燒期間流汗過多而脫水。只要沒有嚴重的嘔吐腹瀉等消化道症狀，病人還能飲用開水或電解質水。就不必以吊點滴來補充水分。

二、穿著舒適吸汗的衣物來幫助散熱。不需穿太多衣服或包包巾來逼汗，流汗太多反而容易造成身體的脫水。

三、洗溫水澡有助緩解發燒症狀；但是使用冰枕無法使感染症退燒。持續高燒應就醫診治若持續高燒不退，則需立即就醫。找出正確病因，依醫師指示按時服用退燒藥（如：或）等藥物來治療。以免延誤病情產生其他的併發症。

有時候治療期間仍會反覆發燒數天，此時應留意是否有新的症狀或是病況有新的變化，以助醫師即時診治病情。發燒的後續照顧：部分家長認為吃退燒藥以後如果又燒起來，就表示醫生開的藥沒有效，所以會去找其他醫師。事實上，各種退燒藥的效果都只能維持幾個小時，目的在暫時緩解病人的不適。如果疾病的過程還沒有結束，退燒以後又燒起來是很常見的現象。常見的呼吸道或腸胃道病毒感染，有些可能持續發燒達七天或甚至更久。家長必須注意孩子有無出現上述所列的危險病徵，並持續遵從醫囑追蹤治療。

來源：看懂寶寶的「語言」！嬰兒的哭及肢體透露了哪些訊息呢？

看懂寶寶的「語言」！嬰兒的哭及肢體透露了哪些訊息呢？

認識寶寶的五種哭聲

約在寶寶三個月大之後，寶寶會開始因為不同狀況而哭，像是肚子餓、想要被安撫、想睡覺、尿布濕等。以下列舉寶寶常見五種需求，及其藉由哭聲的表達方式，提供爸媽一些頭緒，照顧寶寶能更加得心應手：

一 肚子餓

哭泣方式：當寶寶想喝奶時，一開始的哭聲會升高。再來逐漸減弱，頻率高高低低的。同時也會伴隨吸吮的動作，碰觸嘴巴時會有尋乳反應。

因應做法：建議爸媽可大約算一下寶寶喝奶時間，提前準備好，不要等到寶寶大哭時再餵，可能會影響寶寶喝奶的情緒。

二 尿布濕

哭泣方式：尿布濕了，寶寶的屁屁會感覺到不舒服。此時寶寶的哭聲會較大聲，且不停地啼哭。爸媽可能會觀察到寶寶的表情看似煩躁，會有蹬腳的動作出現。隨著尿布濕的時間變長，爸媽若未能及時更換，有些寶寶會因為習慣濕濕的感覺，哭聲逐漸變小。

因應做法：避免寶寶尿布疹，及尿布濕感到不適。建議爸媽可二到三小時幫寶寶換一次尿布，但新生兒喝奶後可能會有排便的情況。建議於喝奶後一陣子，加強觀察是否需更換尿布。

三 想睡覺

哭泣方式：陪寶寶玩了一陣子的玩具、遊戲，或是給予足夠的刺激時，爸媽會發現寶寶開始揉眼睛、打哈欠、摸耳朵，這表示他們想睡覺囉！想睡的寶寶哭聲是一陣一陣的，行為舉止變成煩躁不安，拿什麼東西吸引他都沒用，會開始哭鬧不止。

因應做法：當寶寶出現上述揉眼睛、打哈欠、摸耳朵等動作時，爸媽可將寶寶移至安靜的環境，營造習慣入睡環境，儘快哄寶寶入睡。

四 想被安撫

哭泣方式：寶寶約三個月大左右，就會產生依戀情緒。有時不是肚子餓，也不是尿布濕。就是想要爸媽抱抱自己。看到主要照顧者離開，特別是媽媽。寶寶會開始內心焦急，眼睛緊緊注視著照顧者。發出讓人憐惜的哭聲。

因應做法：這時記得請多抱抱他不需擔心寵壞孩子而不安撫，還能讓彼此的親子關係更加分。

五 身體不舒服

哭泣方式：排除掉以上的需求後，寶寶依然哭鬧，就要懷疑是不是身體不舒服。像是常見的腸絞痛，寶寶哭時可能兩腿會捲縮。發生陣陣哭聲；如果是呼吸道感染症狀，像是發燒、咳嗽等。因為身體虛弱沒力氣，寶寶的哭聲會比較微弱且無力。也會伴隨呻吟聲，或是呼吸、心跳加快情況。

因應做法：應依照寶寶症狀盡快帶孩子就醫治療，或先行給予居家舒緩照護。

不要讓寶寶獨自哭泣！爸媽運用「三心」妙招

雖然哭是寶寶專屬的表達方式，還是建議不要讓寶寶哭超過十分鐘以上，避免造成生理上，甚至是對腦部的負面影響。而當寶寶哭鬧時，爸媽們應該採用正確的安撫方式。像是聽音樂、說故事等，避免劇烈搖晃。才不會造成憾事。國健署提出「三心」妙招，幫助爸媽針對寶寶哭鬧不穩的情緒給予照護：

一「細心」觀察：

爸媽們可參考上述所提供的哭聲判斷法，留意寶寶可能出現的問題及需求，適時排除問題，或是回應需求。

二「耐心」安撫：

透過與寶寶輕聲細語，並撫摸其背部的方式來進行安撫。如果仍無法了解寶寶哭鬧的原因，也不要因此挫折或失去耐心。這是正常的過程，可以多詢問有經驗的家人朋友。或是尋求專業人員的幫忙。

三「安心」陪伴：

有時寶寶會哭泣，只是單純想要大人的陪伴。爸媽可以透過擁抱，將孩子緊貼於你的左胸口上。讓他聽聽爸媽的心跳聲，透過熟悉的聲音及體溫。來增加寶寶的安全感。

寶寶最信任的對象就是家長和主要照顧者，只要願意花時間。用心與寶寶培養相處默契，「哭泣」將不會再是件令人頭痛的事。而是有助於親子溝通的橋樑！

來源：看牙醫之前孕媽咪應該知道的事

看牙醫之前孕媽咪應該知道的事

牙周病與早產、低出生體重嬰兒、子癲前症的發生有關，孕媽咪別忽視了口腔的健康。洗牙、塗氟、補牙、局部麻醉或照射牙科光等牙科檢查及治療，經醫師評估後，一般於懷孕期間皆屬安全。

孕媽咪常見的口腔疾病

孕媽咪的牙周問題與懷孕後賀爾蒙的改變造成體內血液循環變豐富有關，身體組織對牙菌斑刺激產生的炎性反應更為敏感。同時，孕吐時的酸性物質、孕程中進食次數增加，和孕程時日常身體照護的焦點轉移反而導致口腔清潔不佳，這些因素都更容易引發牙齦發炎腫痛甚至是局部牙周組織破壞。一旦忽視口腔清潔時，口腔細菌容易滋生，會比懷孕前更容易產生齲齒的問題。

孕期的牙科治療

一治療牙齒過程使用的局部麻醉藥一般不太會影響到胎兒，但如果有高血壓、低血壓、妊娠糖尿病或子癲症等高

風險妊娠等情形，則建議先與醫師溝通。

二 如果孕媽咪有急性感染的現象，建議依醫師治療需求服藥，以避免感染衍生更嚴重的全身性問題。

三 拍攝口腔光，在使用適當的防護裝置（鉛衣及甲狀腺防護）下。被認為是安全的，建議由醫師依專業評估治療需求。進行牙科光檢查。

來源：破解！常見的懷孕迷思

破解！常見的懷孕迷思

請不要再道聽塗說！關於懷孕的各種迷思，我們應該要知道的正確知識。

懷孕未滿三個月不能說？

想說不說都可以！懷孕初期胎兒的確比較不穩定，但說與不說，並不會影響流產的機率。

懷孕不能參加婚喪喜慶？

無特別限制。常見的習俗予以尊重，只要當事人或其家人不介意，喜宴時要留意不吃未煮熟的食物；參加喪禮前審慎評估自己的健康與體力狀況。

不能拿刀或剪刀？

沒有科學根據。使用時注意安全，避免受傷即可。

不能搬家或移動家具？

不要自己動手搬重物。孕媽咪避免太過勞累，若有搬家或移動重物的需求，可請他人協助。

孕媽咪吃的食物顏色決定胎兒膚色？

寶寶膚色由父母的基因決定。色素不會通過胎盤給寶寶，因此不會影響寶寶的膚色。

吃冰、喝涼傷胎，不能吃？

可以，但不要過量。沒有研究發現孕媽咪吃冰會直接影響胎兒健康，但應留意冰品、冰飲的熱量及衛生喔！

不能喝咖啡、茶？

可以，但不要過量。孕期每日咖啡因攝取不超過二百到三百毫克，一天一杯是可以的。

可不可以吃麻油雞？

全酒的料理不建議。如果不小心吃到有加酒的料理不需

過度慌張，因為通常含酒量不多，但懷孕不建議喝酒及吃全酒的料理。

孕媽咪不能泡溫泉？

懷孕十二週前建議避免泡溫泉。十二週後泡湯時，請確保水溫低於三十九度。每次泡湯不超過十分鐘，且有伴同行。以策安全。

可不可以按摩？

可以。身體健康的孕媽咪於懷孕中後期，適度的按摩可以紓解腰痠背痛、腿部腫脹等不適，另一半請主動來幫忙！

孕期可以正常性行為嗎？

可以。除非有早產、流產、出血等特殊狀況，孕期無需禁慾。

酸兒辣女？尖肚男、圓肚女？

沒有科學根據。孕媽咪的味覺改變無關寶寶性別。肚子形狀跟孕媽咪身材和胎兒大小有關，也跟性別無關。男寶女寶一樣好。

來源：秋冬病毒來襲！呼吸道融合病毒與輪狀病毒預防全攻略

秋冬病毒來襲！呼吸道融合病毒與輪狀病毒預防全攻略

寶寶一旦感染，爸媽不只心疼不已。在照顧過程也會身心俱疲，提醒爸媽可以特別留意這兩種病毒的症狀與預防方式。守護全家人的健康。

秋冬常見病毒感染一呼吸道融合病毒（）

對大人而言就像感冒，但對免疫力尚未成熟的嬰幼兒卻可能引發重症，因此也有「嬰幼兒呼吸道大魔王」之稱。臺灣地處亞熱帶，流行的季節傾向並不明顯。全年均有病例發生，且病程往往快速又猛烈。嚴重時需住院，甚至康復後仍可能留下氣喘或肺功能變差等後遺症。

主要是透過飛沫或接觸傳染，且傳染力極強，「只要一人感染，最多可傳染五位嬰幼兒」。更棘手的是，無法終身免疫，即使曾經感染過，新生兒體內的免疫力也不足以防止再次感染。

寶寶氣管狹小，感染後容易因為發炎腫脹導致呼吸道堵塞，且伴隨喘鳴與多痰的現象。典型症狀包括：

嚴重咳嗽、痰多

呼吸時有咻咻（喘鳴）聲

發燒

鼻涕黏稠

嚴重時會呼吸困難、發紺

同時，感染也可能引起併發症，包括細支氣管炎、支氣管痙攣、肺炎，甚至急性呼吸衰竭、重度呼吸暫停與嬰兒猝死。

沒有特效藥！預防勝於治療

目前尚無特效藥，治療主要以緩解症狀為主，如化痰藥、鼻涕藥、使用氧氣帳等。但支持性療法無法縮短病程，病毒最終仍須靠寶寶自身免疫力來清除。因此，平時應做好個人防護。減少感染的機會，最好的預防方式還是減少出沒人多的公共場所、勤洗手、戴口罩、保持社交距離。尤其像托嬰中心、月子中心、幼兒園這些小朋友常會聚集的地方還是最危險需要多注意的，另外家裡有兄弟姊妹、長期暴露在二手菸環境或有家族過敏史也都是相對高感染風險的族群。

面對絕對是預防勝於治療，目前新生兒有單株抗體可選擇接種。健保針對三類高風險族群幼兒（出生週數小於三十三週早產兒、出生週數三十五週以下早產兒合併慢性肺病、具有重大血流動力異常的先天性心臟病童），提供短效型單株抗體給付，每月施打一劑、可連續施打六劑。

另外，今年也推出了長效型單株抗體，能為新生兒及嬰幼兒提供約五個月的防護力，足以撐過的流行季。

除此之外，孕婦也可接種疫苗。媽咪在孕期施打疫苗，不僅保護自己。抗體還能透過胎盤傳給寶寶，提供出生後三至六個月的保護。順利度過免疫力最脆弱的階段。

秋冬常見病毒感染二輪狀病毒

輪狀病毒是五歲以下嬰幼兒腹瀉的元兇，尤其在秋冬季節最常見。在台灣，因嚴重腸胃炎住院的幼兒，約十三是感染輪狀病毒。它的潛伏期約二至三天，初期常見發燒、嘔吐、腹痛等症狀，接著出現腹瀉，病程約持續三到七天後會逐漸緩解。

輪狀病毒主要經由「糞口傳染」，也就是接觸患者的糞便、嘔吐物。或吃到受污染的食物或水，患者從腹瀉前二天起。至發病後十天內都具有傳染力。其次病毒也常附著在玩具、器皿、門把、馬桶等表面，並存活十天以上。

輪狀病毒治療與預防

目前輪狀病毒並無特定藥物，治療上以補充水分與電解質為主。當孩子嘔吐、腹瀉嚴重，無法進食。務必儘快就醫

，以免電解質失衡、脫水。若未及時治療，嚴重恐危及生命。

有些爸媽會給孩子喝運動飲料補充電解質，但這類飲品糖分高、電解質少。建議使用口服電解質水溶液為佳，並適時就醫。避免病情惡化。

針對輪狀病毒的預防，八個月以下嬰兒有口服疫苗可以選擇，父母可評估寶寶的需求，至醫院診所自費接種。年紀較大的孩子雖無疫苗可打，仍可透過勤洗手、注意衛生習慣來降低感染風險。

若家中已有輪狀病毒感染者，照顧者在清理嘔吐物或糞便時，務必戴手套、外科口罩，並徹底洗手。受患者污染的器物表面如家具、玩具、門把等共同接觸物品以二十漂白水加一公升清水一千擦拭；患者嘔吐物及排泄物應以一百漂白水加一公升清水五千消毒清理，防止病毒在家中傳播。

來源：純母乳哺育寶寶是否要補充鐵劑或維生素D？

純母乳哺育寶寶是否要補充鐵劑或維生素？

關於鐵劑的補充，美國兒科醫學會的母乳小組曾公開表達其疑慮。不建議全面對四個月大的純母乳哺育寶寶補充鐵劑，認為要對廣大的嬰兒投藥。應該有更充份的支持證據，且須注意對不缺鐵的寶寶是否會造成潛在傷害。他們指出，有其他方法，例如分娩時延遲夾臍帶，即可提高寶寶的鐵儲存量。

懷孕期多補鐵，能增加寶寶體內鐵的存積量

在已開發國家，媽媽營養狀況通常不錯，這個疑慮相當低。若媽媽擔心的話，可多注意懷孕期的鐵攝取量。母乳期的鐵攝取量對於奶水中的鐵影響不大，但是懷孕期母親血中的鐵含量會影響胎兒體內的鐵存積量。台灣兒科醫學會的建議是四到六個月大的寶寶尚未使用副食品之前，應開始每天補充口服鐵劑一體重。對於早產兒或母親在懷孕過程中有貧血或失血者，須考慮對純母乳哺育的嬰兒早期開始補充鐵，如果使用鐵劑補充，一天補充二體重。

補充維生素的考量

國民健康署查詢各國，發現在歐美有些國家建議全面補充維生素，台灣兒科醫學會則建議哺餵母乳的寶寶每日可以補充四百口服維生素。但世界衛生組織、澳洲、法國、日本則並無此建議；各國之建議，與其日照、膚色、衣著習慣、母親營養狀況等有關，日照不足或習慣衣著緊密的國家，較傾向於建議補充維他命。如果您想要幫寶寶補充維生素，可以先和兒科醫師做討論。

來源：給伴侶、家人的8個小叮嚀 懷孕不是媽咪一個人的事

給伴侶、家人的八個小叮嚀懷孕不是媽咪一個人的事

給伴侶、家人的八個小叮嚀

一懷孕是全家人都要共同關心的事！

二陪伴孕媽咪產檢，一起認識懷孕、生產的大小事。

三協助孕媽咪減少孕期不適，給予最大的體諒與支持。

四減少孕媽咪的家事負擔，讓媽咪有足夠的休息。

五跟孕媽咪一起參加爸媽教室，參與孕媽咪各階段的生活。

六待產時耐心陪伴在孕媽咪身旁，貼心回應孕媽咪的各種需求。

七請給孕媽咪剛剛好的關心，別讓過度的關心變成壓力。

八提前學習照顧寶寶的事，如：洗澡、包尿布，成為好幫手。

來源：給單親爸爸媽媽

給單親爸爸媽媽

現今社會越來越多孩子來自單親家庭。孩子面臨家庭結構的改變，常常無法適應；家長則因為必須身兼數職而分身乏術。為了照顧孩子的需求與感受，並協助您滿足自己的需要，以下建議提供您參考。

心理上的調適

保持樂觀的態度，看待每一天的驚喜和挑戰。

為了您的家庭著想，應好好照顧自己。均衡飲食，並得到足夠的休息、運動和睡眠。

留一個時間去做自己喜歡的事情，像是和朋友看電影、唱歌等社交活動。

不要對您的孩子感到內疚，很多家庭也有同樣遭遇，您不需要懲罰自己，或是用溺愛來彌補孩子。覺得自己有罪並不會讓生活美滿。

別鑽牛角尖，執著於不存在的問題。很多單親家庭的孩子都可以幸福快樂的長大，單親家庭不代表會遇到更多問題，或是需要解決更多的問題。

家庭生活的安排

尋求外界的協助，例如保母或是幼兒園，在您上班的時候

，幫忙照顧孩子。

對孩子訂定一個合理的規則，並且堅決實行。當規則清楚且貫徹一致時，孩子會有安全感，並且萌生責任感。等到孩子能接受更大的責任時，您再擴充規則的內容，藉以培養孩子的責任感。

每天安排一些時間與孩子相處，例如聊天、玩耍、閱讀、看功課或陪同看電視。

經常讚美您的孩子，表現出真正的愛，無條件的付出，積極支持您的孩子。

對外尋求支援

與親戚朋友保持良好關係，有時他們可以幫忙照顧孩子。

與其他家庭建立友誼，這些朋友會分享訊息。提供協助照顧孩子的管道或方法，也會介紹可靠的保母。或本身就願意幫忙帶孩子。

與可信賴的親人、朋友和兒科或家醫科醫師等專業人士討論孩子的行為、生長發展與家庭的關係等問題。

來源：給多胞胎爸爸媽媽

給多胞胎爸爸媽媽

對您和家人來說，幾個小寶貝一口氣同時加入家庭生活，這是何等熱鬧開心的事。但是在實際生活中，您勢必要面臨更多的育兒工作和挑戰。

您可能需要更大的住家空間或較大的車子，以便容納多位家庭成員。

每個孩子都是獨特的，提醒您的家人或朋友，別把孩子們當作「雙胞胎」或「三胞胎」，必須視他們為獨特的個體。

您可以參照下列技巧：

叫孩子的時候，請呼喚他們自己的名字，不要以類似「雙胞胎」之類的稱號叫他們。

和每個孩子單獨交談並且用眼神接觸。

安排時間與每個孩子單獨相處，例如，輪流與每個孩子一起去購物。

鼓勵每個孩子的獨特性，例如讓他們有不同的穿著樣式。

來源：給新手爸媽的話&爸媽的心理調適

給新手爸媽的話 爸媽的心理調適

給新手爸媽的話

初為人父母是前所未有的經驗，照顧寶寶既開心，卻也會讓人焦慮、勞累不已。您與另一半需要相互打氣、彼此感謝，共同分擔照顧的工作。也請別忘了善待自己，讓自己可以適時放鬆一下。

新手媽媽小叮嚀

寶寶出生後，您的個人時間會變少。為了專心照顧寶寶和您自己，應該勇於向家人提出請求幫忙分擔家務，或尋求外界的協助，直到生活模式穩定下來。

照顧並瞭解自己與家人的需要。有時不妨請家人協助照顧寶寶，出去散步或游泳、與朋友聊天喝咖啡，甚至換個新髮型或買本雜誌閱讀，讓自己放鬆一下。

產後均衡飲食是維持您和寶寶健康的第一步，在哺乳期不要刻意減重；小於一千八百大卡的低熱量飲食可能會影響乳汁分泌。放鬆心情多休息，依寶寶需求多多哺乳。是促進乳汁分泌的重要原則。產後均衡飲食建議可參考衛生福利部國民健康署孕產期營養單張。

新手爸爸小叮嚀

協調工作分配很重要，可依據夫妻雙方每天之時間規劃或擅長的工作來分攤，如洗澡、換尿布等。

孩子逐漸長大，會睡不安穩！若覺得不堪負荷或影響到工作，務必與另一半討論解決方法。

孩子長大後，會越來越有自己的想法，不再只是黏在您身旁。您必須讓孩子感受到您的關愛，主動參與他們生活上的每件事。即便忙碌了一整天，下班後仍需要花時間陪孩子玩耍或閱讀。

請記得善待自己，讓自己也能喘息一下，像是參加朋友聚會或去運動。

爸媽的心理調適

一旦為人父母，自然而然想為您的孩子和家人做到最好。請記得您是獨特的個體，也是獨特的父母，要照顧好自己。而保持規律運動，有助於消除緊張壓力，並常保健康活力。最重要的是，在工作、家庭和自己的需求上找到平衡點。

保持規律運動

運動是生活中很重要的一部分，它能幫助您放鬆，並且讓您更有活力。

您可以透過親子活動來放鬆身心，並且達到運動的需求，例如：用嬰兒車載著孩子，全家一起出門散步。

和家人一起去游泳。

和孩子一起去公園玩耍。

重回工作崗位以後

產假或陪產假即將結束，必須重返工作崗位。您可能會面臨以下問題，讓您備感壓力甚至精疲力竭。比方說：

得將孩子送到托嬰中心，或請保母照顧孩子。

必須送其他學齡期的孩子上學。

您需要全神貫注地工作，因此面臨工作上的壓力。

需配合工作而調整孩子的作息，親子適應過程可能較為辛苦。

孩子逐漸長大，形成新的生活模式。每一次調適都不輕鬆，這是為人父母必經的學習過程，您會習慣生活上的變動和新安排。

最重要的是，在工作、家庭和自己的努力上找到最佳的平衡點。

照顧自己和您的至親

來源：給新手爸媽的話

給新手爸媽的話

初為人父母是前所未有的經驗，照顧寶寶既愉悅，卻也會讓人焦慮、勞累不已。您與另一半需要相互打氣、彼此感謝，共同分擔照顧的工作。也請別忘了善待自己，讓自己可以適時放鬆一下。

新手媽媽小叮嚀

寶寶出生後，您的個人時間會變少。為了專心照顧寶寶和您自己，應該勇於向家人提出請求幫忙分擔家務，或尋求外界的協助，直到生活模式穩定下來。

照顧並了解自己與家人的需要。有時不妨請家人協助照顧寶寶，出去散步或游泳、與朋友聊天喝咖啡，甚至換個新髮型或買本雜誌閱讀，讓自己放鬆一下。

經歷懷孕和分娩之後，您需要至少九個月來調整身體，因此不建議您進行減肥。請均衡飲食，並配合運動，才有助於復原。

新手爸爸小叮嚀

協調工作分配很重要，可依據夫妻雙方每天之時間規劃或擅長的工作來分攤，如洗澡、換尿布等。孩子逐漸長大，會睡不安穩！若覺得不堪負荷或影響到工作，務必與另一半討論解決方法。

孩子長大後，會越來越有自己的想法，不再只是黏在您身旁。您必須讓孩子感受到您的關愛，主動參與他們生活上的每件事。即便忙碌了一整天，下班後仍需要用點時間陪孩子玩耍或閱讀。

請記得善待自己，讓自己也能喘息一下，像是參加朋友聚會或去運動。

來源：羊水過多的原因

羊水過多的原因

羊水在妊娠時可以提供胚胎早期發育時的營養供給。在妊娠中後期，不只可以做為保護胎兒不受到外力傷害的保護墊，還能作為胎兒運動、生長、呼吸道、消化道循環以及胎兒尿液排泄的場所。特別是胎兒的生長過程中，羊水提供給四肢及軀幹有一充分的空間來活動及伸展，羊水對於呼吸道中的肺泡細胞的發育及成熟，也是相當有幫助。

羊水之來源，初期為胎盤及胎膜分泌出來，後來加上呼吸、消化道之排泄及分泌液，以及由胎兒腎臟製造胎兒尿液組成。於懷孕的某一段時間內，是呈現平衡狀況。也就是由上述地方分泌出來，然後由胎兒吞嚥呼吸。胎盤血流代謝處理掉，若是生成或排泄之速度改變。就會造成羊水過多或羊水過少。

當羊水量超過二千就稱為羊水過多，占妊娠的一。羊水過多有兩種類型慢性跟急性，大多數孕婦是屬慢性羊水過多。就是羊水量是逐漸地增加，為第三妊娠期的問題。急性羊水過多約在二十到二十四週診斷出來，因羊水量在數天之內迅速地增加。

造成過多原因有：胎兒畸形、食道瘻管、消化道阻塞、神經管缺陷、妊娠糖尿病以及不明原因。

最重要是先找出是否有孕婦所造成之問題（如糖尿病、妊娠高血壓…等）或胎兒問題（如先天畸形、腎臟發育不全、消化道阻塞…等）先施以診斷，再考慮如何處置。有些羊水過多症，需施以羊水過多抽取術。以避免早期宮縮早產之問題。

來源：職業婦女如何繼續以母乳哺餵寶寶

職業婦女如何繼續以母乳哺餵寶寶

經過坐月子期間，媽媽好不容易建立起和寶寶的哺餵默契。但面臨產假結束，必須回到公司上班。便無法讓寶寶想喝就隨時親餵，這時媽媽就要考慮符合自己上班型態的餵母乳方式。

通常可分為完全的瓶餵（可能是全母乳或混合配方乳）、上班母乳和配方奶混合，下班親餵。至於有些寶寶不願意接受奶瓶的情形較嚴重，無法親餵時就必須嘗試更多不同的哺餵方法。例如不同孔徑的奶嘴、不同的溫奶溫度、不同的情境轉換等等。

由於每個寶寶的習性，以及媽媽的工作性質和時間都不同。媽媽可以多聽取其他上班族母乳媽媽的意見，大約知道可能會遇到什麼問題。多嘗試幾種方法，不要輕易放棄餵母乳。當然，每個媽媽都有選擇自己哺餵小孩的方式。不管最後媽媽是選擇餵母乳或配方乳，聽取家人和親朋好友的建議後。都應該尊重媽媽的選擇。

上班的擠奶時機

性別工作平等法及勞動基準法保障女性受僱者，除規定之休息時間外，每日另給哺（集）乳時間六十分鐘。對一個供需穩定的媽媽來說，大約三到四小時擠一次奶。而後下班回家親餵；對於需要增加奶量的媽媽就需要增加擠奶次數，請注意與其一次擠很久。不如縮短每次擠乳時間但增加擠奶密集度。

如果上班前已經是全母乳餵食或是幾乎全母乳的媽媽，出奶量算很大。如果每次擠乳間隔太久，很容易引起脹奶甚至乳腺炎。處理不當就可能產生乳房膿瘍。

對於這類媽媽則建議上午一上班，隔兩小時（約十點鐘）就可以擠一次奶。每邊各擠約三分鐘，完成一次噴乳反射即可（可以排出約五十的奶）；然後再過兩小時（約十二點鐘）就再擠一次奶。每邊各擠約八分鐘，完成二到三次噴乳反射即可（可以排出約八十到九十的奶）。下午在三點鐘及五點鐘時，可以重複上午擠奶各三分鐘八分鐘的模式。由於三分鐘等於是一般上盥洗室的時間，比較不影響工作，如果兩個吸盤同時使用，可以更節省時間。

如果經常拖到四小時以上，乳房很脹才去擠奶。一來很難擠，而且一擠就要將近四十分鐘甚至一小時。處理不當的話，可能會發炎化膿。影響母乳哺育。所以職場媽媽一定要注意擠奶間隔，出奶量大的媽媽。無論如何，二到三小時以內一定要去排乳。否則會增加發炎的風險。

至於在上班期間，公司若有哺集乳室和冰箱，就可以在休息的時候擠奶，冰凍保存後帶回家給寶寶喝。開始上班之後，如果想要繼續哺餵母乳。最好要有合宜的休息、減少壓力，並確認備齊擠乳器、儲乳袋。若公司沒有冰箱就要加帶冰袋或冰桶。有的媽媽會帶寶寶的相片上班，在擠奶時可以促進奶水流出現。

把握親餵的時機

除了某些時間彈性的工作、或是工作地點離家裡很近，其他絕大部分的媽媽在上班時間。都無法親餵寶貝，因此要把握每一次可以親餵的時間。因為寶寶的吸吮最能刺激奶水，最好在上班前先餵乳。且一回家後也立刻親餵，儘可能請照顧者在接近媽媽下班前不要用奶瓶餵食。在辦公室間也可以尋求有哺乳經驗的同事協助。預計是媽媽快來接寶寶的時間，寶寶已經有點焦躁不安時，照顧者可以試著和寶寶說話，安撫寶寶的情緒。必要時可以先給寶寶一點點奶水，建議不要用奶瓶。可以用杯子或湯匙餵寶寶，當媽媽來接寶寶時。可以很快的就餵他吃奶。

來源：聽力篩檢很重要

聽力篩檢很重要

新生兒先天性聽力損失發生率，比起其他出生時篩檢的先天性代謝疾病高出十至一百倍。只用肉眼觀察來看嬰兒對聲音的行為反應，無法正確診斷出聽力損失問題，必須使用聽力檢查儀器才能正確診斷出嬰兒的聽力損失。

早期發現聽力損失的重要

新生兒雙側重度感音性聽力損失發生率約為千分之一，如果再加上輕度、中度或單側性聽力損失，則發生率高達千分之三。

先天性聽力損失應在三個月大前診斷，且於六個月大前開始配戴聽覺輔具與接受聽能復健創健，如此才能有正常的語言發展歷程。

正確診斷必須仰賴聽力檢查儀器

只觀察嬰幼兒對聲音的反應，而不使用聽力儀器來做檢查，只能診斷出大於六十分貝之雙側中度聽力損失。

對六到七個月大寶寶，只利用觀察方式來看其對聲音的行為反應，也無法正確診斷出聽力損失問題，所以務必要使用儀器檢查聽力加以確診。一百零一年三月十五日起，政府全面補助新生兒聽力篩檢，請把握時程（本國籍出生三個月內之新生兒，可接受一次篩檢補助）至醫療院所（公告於國民健康署網站）接受篩檢。

來源：聽語障父母之孕期衛教指導服務與支持

聽語障父母之孕期衛教指導服務與支持

懷孕對於準父母是一件充滿喜悅的事，為使準父母在懷孕、生產歷程中能擁有良好的適應與準備。國民健康署提供連續性的全人照護服務，以提升孕期照顧品質。並針對孕期重要健康議題，增加兩次的產前衛教評估與指導

。協助婦女維持健康，導正並改善不良情況。支持和引導為人父母的孕育過程，請準父母善加運用。

對於單耳或雙耳發生部分或完全喪失聽覺的聽覺障礙準父母而言，有可能造成生活及溝通上的困難，更需要獲得協助。因此，在孕期給予完整的衛教指導服務與支持。使聽障準父母更加了解整個孕期及哺育嬰幼兒可能會有的問題，做好準備。至為重要。

為幫助聽語障父母在就醫及孕期衛教時，能與醫護人員間獲得有效的溝通與協助。且能正確接收了解孕期衛教及哺育嬰幼兒相關的內容，建議儘量運用文字筆談、口語、手勢、圖片、臉部表情等方法來加強訊息傳遞；還有配偶、親友的同行陪伴。將有助於就醫及衛教時與醫護人員的溝通，以及返家後的支持與照顧；或者就醫前可向全台各縣市社會局申請手語翻譯或同步聽打的服務。例如台北市政府社會局免付費電話：八百到三百六十五-二百二十四，免付費傳真：八百到三百六十五-六百二十四。線上申辦系統二，每人每月申請服務最高補助使用三十小時。鼓勵聽語障的準父母可多加使用社會資源及親友來協助順利度過孕期及育兒之路。

來源：育兒津貼及托育補助

育兒津貼及托育補助

運用津貼與補助來減輕家長育兒負擔，讓爸媽在育兒的路上更安心。

年齡

未滿二歲。

申領條件

托育補助及育兒津貼擇一領取。

以上資訊為一百一十二年一月一日發放標準，發放內容將來可能變動，最新資訊請參考延伸閱讀育兒津貼及托育準公共專區七。

溫馨提醒：育兒彈性工時

一受僱於僱用三十人以上的公司，受僱者爸爸媽媽為撫育未滿三歲小孩，每天可減少工時一小時無薪資或調整工作時間。

二受僱於僱用三十人以上的公司，受僱者爸爸媽媽經與雇主協商合意，亦得適用減少工時一小時無薪資或調整工作時間。

來源：胎兒超音波檢查說明

胎兒超音波檢查說明

產檢超音波篩檢是一種非侵入性的檢查，可用於測量胎兒的頭雙頂骨徑、腹圍與大腿長度等評估胎兒生長狀況、觀察胎盤位置和羊水量。超音波是一種人類耳朵聽不到的聲波，需要水及軟組織做為傳導介質，超音波無法穿透骨頭也可能受到空氣阻隔，因此檢查的準確性會有許多限制。若母親腹部脂肪組織太厚、胎兒趴臥、或骨頭阻擋，皆會造成許多器官無法判讀，而無法發現某些異常。另外，若羊水過多。會導致胎兒距離探頭過遠而影像不清；若羊水過少，則胎兒四肢重疊、阻礙聲波進入。均會減低檢查的準確性。

超音波的發展從二到目前最新的四都有，而所謂的二、三、四是什麼呢？二是診斷最常用到的超音波，是一個平面影像。從平面影像來看我們可以從胎兒的頭、手、腳到胎盤以及媽媽的子宮頸來做一個完整的檢查，而三則是由多張的二影像來重組出一個立體的畫面。比較少用，主要的功能是讓爸爸媽媽可以提前了解胎兒的外觀。及子宮內胎兒的情況；而四超音波則是連續的三影像組合成一個動態的畫面，在產檢過程中。是最少用到的，一般我們會視情況使用。產前胎兒的健康評估和檢查，大部分都使用二超音波，即可得知我們產檢所需的量測值，確認寶寶的成長情形。

透過胎兒超音波，我們可以獲得什麼資訊？

大致上我們將週產期分為幾個階段：

（一）懷孕初期這個時期的胎兒超音波占了很重要的角色，大約懷孕六到八週時。我們可以透過超音波來聽到胎兒的心跳聲，量胎兒大小來估算預產期以及安排之後的產檢。而還有重要的一點是確認子宮內懷孕，如果非子宮內懷孕（子宮外孕）的話。對媽媽來說是一個不小的風險，須及早診斷。

（二）懷孕早期在二十週前，為唐氏症篩檢的重要時期。目前唐氏症篩檢有分兩種：第一孕期唐氏症篩檢十一到十三週，我們透過超音波測量胎兒的頸後透明帶、鼻骨、血流等等。加上媽媽的抽血數據計算出唐氏症的風險值，準確率約八十二到八十七；第二孕期唐氏症篩檢十五到二十週。為抽取媽媽的血液來做分析，準確率約六十到八十三。

（三）懷孕中期二十週以後，寶寶的身體構造及內臟器官幾乎都具備了。這時候的胎兒超音波，就可以幫助我們看看寶寶的軀幹、脊椎、內臟器官等等比較精細的構造。如果與醫師諮詢後覺得還有需要在做更仔細的檢查的話，可以視情況選擇加做高層次超音波。何謂高層次超音波？懷孕二十到二十四週時，若經產檢超音波懷疑有異常或是依據個人情況。想再更仔細的檢查胎兒的細部構造時，可與醫師討論是否再加做高層次超音波。目前坊間自費約兩千至四千不等，檢查時間約半小時至一小時。會根據專業技術員或專業醫師的臨床經驗來檢查胎兒頭部

、胸腔、骨骼、內臟器官、臍帶、羊水等等的資訊，來評估寶寶的生長發育情形。

(四)懷孕晚期的胎兒超音波主要用來預估胎兒體重，觀察生長曲線是否正常發育。也會關係到生產方式，根據寶寶的情況及家庭因素來決定自然產或剖腹產；而針對需要安胎的孕婦。也可以用超音波檢測胎兒與媽媽的血流情形，評估是否提前或延後生產。胎兒超音波是目前可以提供最多寶寶資訊的一個診斷工具，雖然我們可以透過超音波了解大致上寶寶的成長情形。但仍有超音波能力有限的檢查是無法當下判斷的，而有些檢查是出生後才能安排小兒科會診的。所以仍建議產婦定期規律的產檢，為寶寶及媽媽的健康把關。

檢查結果

一超音波是一種篩檢方法，並非最終診斷。檢查的準確性有其限制，主要目的在於評估胎兒生長發育的狀況。以及胎盤位置和羊水量等，並非所有的胎兒問題均可以透過超音波檢查出來。

二超音波的檢查報告，只能判讀為：在這個週數的檢查下，篩檢胎兒生長發育及胎盤位置有否異常的狀況。若沒有篩檢出異常狀況，並不代表胎兒就是完全正常、沒有疾病。因為有的胎兒疾病會在較大的週數、甚或出生後才出現，也有的雖然已出現。但超音波並無法診斷這類問題，而胎兒器官是否有異常則需執行胎兒超音波才能進一步評估。檢查上的限制如胎兒的智商、視力、聽力、有無胎記、或有否生化代謝異常等，無法以超音波檢查出來。

三超音波無法取代羊膜穿刺，意即無法由超音波確切診斷有無唐氏症或其他染色體異常疾病。

四微小的胎兒缺陷無法完全辨識，例如：較小的心室中膈缺損。動脈弓狹窄或神經管缺損通常位於尾脊皮膚的小破洞早期正常的胎兒檢查，並無法保證妊娠後期或出生時仍為正常。因為有許多特殊疾病出現於妊娠末期，甚至在出生後才開始發生或出現。故無法在早期十六到二十四週即由超音波檢查發現所有胎兒疾病，同時也無法由單次檢查即斷言以後均不會發有任何問題發生。

五由於胎兒常處於握拳或活動狀態，幾乎無法由超音波確切診斷指趾節異常。

六妊娠週數越大二十八週時，因為胎兒在子宮無法完全伸展，骨骼肢體重疊，導致檢查效果較差。

七胎兒在子宮內的血液循環與出生之後的血液循環並不相同，導致一些先天性心臟疾病很難在出生前作診斷。

個別考量

一自一百一十年七月一日起政府提供孕婦在懷孕八到十六週、第二十週前後及三十二週後各一次超音波檢查，

準媽媽們也可選擇進行自費的胎兒超音波檢查。但民眾有權利決定是否要接受這項檢查，即使做檢查。也有權力拒絕知悉某些檢查結果，例如有些民眾因為信仰或其他因素。不會因胎兒異常而選擇終止妊娠，或不希望知悉一些無法在母體內處理的問題。例如心臟瓣膜輕微的異常或兔唇。如果您有上述考量，請在檢查前主動告知醫生。

二 超音波檢查發現的胎兒畸形，部分是目前醫療可以矯正，且不影響未來生長與發育的，例如唇顎裂、部分先天性心臟病等。故如果於產前檢查發現有胎兒畸形，建議諮詢相關專科醫師，以取得充分醫療資訊，作出適當的處置。

三 若懷孕期間有身體不適或胎兒有特殊狀況，可與醫師討論檢查頻率及次數。

四 胎兒超音波對於性別的判定有很高的不準確性，而且依規定不可用來判定胎兒性別，亦不可以因胎兒的性別而終止妊娠。

來源：胎教的影響

胎教的影響

藉由尖端醫療儀器和科技胚胎學的研究，醫學界已認知：未出生胎兒在孕期十六週即有完好的觸覺和味覺；十八週的胎兒對光已經會產生反應；二十週則已發展出聽覺，此時的胎兒並有作夢、記憶和思考的能力。因此，胎兒除了生理的發育成長外，胎兒的心靈和靈性亦在孕期就開始醞釀和培養了，透過胎教將有其具體的影響。

當孕媽咪們孕育新生命時，除了期盼孕產過程順利、腹中胎兒能健康的生長發育外。也有越來越多的準父母們從懷孕開始就十分注意對胎兒的教育，希望從懷孕開始。就能依據胎兒在各階段成長發育的情況，主動地給予各種訊息刺激。藉由互動及創造優良的內外環境，避免不良的刺激對胚胎和胎兒造成影響。促使胎兒健康成長。

然而，胎教的本質是愛的傳遞。而不是知識的灌輸，孕媽咪的生活方式、情緒、語言及外在環境都會影響胎兒。孕媽咪在懷孕期間調整並維持正常生活作息，保持愉悅的心情。讓自己處於適當良好的環境，可以刺激胎兒感官神經發育、建立孕媽咪與胎兒的溝通、撫慰胎兒的情緒與穩定的發育。孕媽咪可以參考下列幾種胎教方式，讓胎兒感受到家人的關愛

一 情緒胎教：

孕媽咪心情好、情緒穩定、想法正向，大腦會分泌好的荷爾蒙（腦內啡）。會對胎兒帶來正面影響；相反地，孕媽咪情緒煩躁不安、壓力大、易怒、想法負面。腎上腺素上升，又由於胎兒藉由胎盤與母體連結在一起。這些負面的情緒會導致胎兒的心跳變快、情緒緊繃，甚至連胎兒都會跟

著感到緊張。因此，孕婦要盡量避免焦躁、生氣等負面情緒，若長期都處於這種情緒之中，對胎兒更會帶來負面影響。同時，生氣也會使孕媽咪血管收縮，可能會引起頭痛不適。

二 環境胎教：

孕媽咪本身的生活環境、子宮內的環境都是環境胎教。在孕期的保健上，睡眠充足、飲食均衡營養、適度運動、心情愉悅、保持良好的生活習慣，胎兒所身處的環境也較好。如果準爸爸或準媽媽有抽菸的習慣，應盡量為了自己及家人的健康而戒菸，因二手菸對於孕婦與胎兒的健康危害相當大。

三 音樂胎教：

胎兒約五、六個月大時，內耳基本已發育完成。逐漸能聽到外界的聲音與音頻，這時就可以開始進行語言和音樂胎教。聽著和諧的旋律可以讓人打從心底感到舒適與恬靜，音樂胎教主要是讓孕媽咪感覺心情舒坦、讓身心得以好好的放鬆。對胎兒的感官有正向的影響。選擇音樂時，建議以「節奏反覆」與「柔和」為主要標準，且每天定時播放給胎兒聆聽，藉由反覆的聲音提供胎兒正向刺激。

四 撫摸胎教與語言胎教：

撫摸胎教即為輕撫肚子，有助於刺激觸覺發展。可以與語言胎教一起執行，透過輕摸肚子時。適時和胎兒說話。孕媽咪在懷孕五個月左右可感覺胎動，六個月左右能較清楚地觸碰到胎兒的肢體。準爸媽或手足可以透過撫摸肚皮、對胎兒說話、穩定胎兒情緒，亦可增加準爸爸及手足迎接新成員的準備度。讓孕媽咪感受到被關心與支持。

五 閱讀胎教：

閱讀胎教屬於聽覺刺激的範圍，適合準爸爸一起加入。因胎兒不在準爸爸的肚子裡，藉由閱讀胎教讓準爸爸提前參與。即早做好當爸爸的適應與準備。媽咪與爸比多和胎兒說話，有助於增加胎內記憶與感受。建議睡前可以輕聲唸一小段文章給胎兒聽，選擇內容簡單、有押韻的歌謠或小品文章。

六 藝術胎教：

孕媽咪觀賞畫展或參加藝術休閒活動時，將所見所聞與胎兒分享，有助於胎兒腦部發育。

「胎教」是以科學所能瞭解之胎兒的能力為基礎，希望藉此能幫助未來孩子成就豐富的創造力和感性的人格。只要能讓孕媽咪與家庭成員感受到快樂的胎教，讓胎兒感受到關愛的胎教。就是最好的胎教。

腸病毒 感染 嬰幼兒 照護

腸病毒 感染 途徑

腸病毒的傳染性極強，可經由腸胃道（糞-口、水或食物污染）、呼吸道飛沫、咳嗽或打噴嚏，也可經由接觸病人的皮膚水泡潰瘍液體而感染。

新生兒在生產過程中接觸到母親產道分泌物，或是接觸母親的血液及呼吸道分泌物，也可能感染。出生後的感染源可能來自母親及其他人。

感染腸病毒 常見症狀

大多數腸病毒感染沒有症狀，或類似一般感冒。有時會引起較特殊的臨床表現，常見的有手足口病、疱疹性咽峽炎等。

大部分新生兒感染後症狀都不嚴重，但少數會出現腦膜腦炎、敗血症、嚴重肝功能異常及心肌炎，甚至死亡。

預防腸病毒的方法

勤於正確洗手，保持良好個人衛生習慣。

注意環境衛生及居家環境良好通風。

盡量避免出入擁擠之公共場所，或與疑似病患接觸。

注意營養、均衡飲食、運動及充足的睡眠，都可以增強免疫力。餵食母乳，也可提高嬰兒抵抗力。

在摟抱、親吻或餵食幼兒前，務必更衣洗手。

若幼童經診斷感染腸病毒時，最好讓病童請假在家休息至少一星期，以避免傳給他人。

孕婦在生產前後有疑似腸病毒感染症狀時，產後要加強在接觸嬰兒前後的洗手、戴口罩及個人衛生，也要注意觀察新生兒的體溫及活力表現。

當嬰兒有不明原因的發燒、精神活力變差時，應立即就醫，如曾有接觸到發燒或腸病毒感染的患者，也應主動告知醫師。

腸病毒重症前表現病徵

：在發病後七天內，出現下列病徵，應及早就醫，包括：持續發燒、嗜睡、意識不清、活動力降低、手腳無力、肌躍型抽搐有如受到驚嚇的肢體抽動、持續嘔吐、不發燒時心跳加快等症狀。

針對健康的孕產婦及新生兒，更應加強下列的幾個步驟：

一 出生後即刻的肌膚接觸

：出生後即刻的肌膚接觸除了保溫，維持新生兒的血糖濃度。穩定呼吸速率之外，同時讓嬰兒一生下來就接觸媽媽身上正常的菌種。減少環境中不正常菌種的滋生，降低感染及日後過敏的機會。

二 母乳哺育，並且儘可能二十四小時親子同室

：當母親接觸到周圍環境的菌種時，體內會產生抗體對抗感染以保護自己。母乳中也會有這些抗體保護她的嬰兒。這也是為什麼當母親有一些感染時，我們並不建議嬰兒和她隔離，因為母親的母乳可以保護嬰兒免於感染。但是母親需要注意自己的個人衛生習慣。當嬰兒和母親在一起時，嬰兒接觸的菌種和母親接觸的會一樣，而母親會有對抗這些菌種的抗體在胎兒期就傳至嬰兒體內保護嬰兒；如果又持續哺乳的話，更是雙重保護。但是如果嬰兒留在嬰兒室的話，接觸到的是醫院中的病菌，可能和母親周圍環境的菌種比較不一樣，嬰兒得到的保護力可能就比較不夠。因此讓嬰兒待在母親身邊反而比較安全。

三 注意個人衛生，勤洗手，學習觀察新生兒的表現

：不論嬰兒是親子同室或是在嬰兒室中，都應該盡量避免不必要的訪客。所有會接觸到嬰兒的人包括父母、其他家人及醫院的工作人員都需要注意衛生，加強洗手。有呼吸道、腸胃道感染或發燒者不宜接觸嬰兒。母親如有呼吸道感染者，除了洗手外，需戴口罩。醫護人員應當持續定期觀察所有新生兒，並利用親子同室的機會教導母親及其他家人如何注意嬰兒的體溫、呼吸及活力等表現。

四 回家後的照顧如同在醫院一樣持續哺乳，注意衛生，加強洗手

，不必要的訪客仍應避免。當嬰兒有不明原因的發燒、精神活力變差時，應立即請兒科醫師診治。家中如有其他較大兒童有發燒時，也應主動告知醫師。相信經由這樣的步驟，父母及寶寶都可度過一個健康快樂的夏日。

來源：腸絞痛

腸絞痛

有些寶寶在十天到三個月大時會在傍晚或半夜的時候哭鬧，令父母手足無措且神經緊張，腸絞痛是可能的原因之一。目前腸絞痛發生的原因尚不清楚，每個寶寶發生的情況也有所不同，以下幾個處理原則供父母參考。

腸絞痛最常發生在何時

一 腸絞痛通常發生在十天至三個月大的寶寶。約二十的

寶寶在第二週至第四週大時開始出現腸絞痛狀況，高峰期大約在六週大時。

二 腸絞痛的寶寶會在傍晚或半夜的時候哭鬧，雖然感覺有餓卻拒絕吸奶，因為哭鬧而臉部漲紅，並高舉他的大腿或脹氣放屁。

三 腸絞痛寶寶的哭鬧很難安撫，一天可能出現三個小時。之後慢慢降低至一天約一—二個小時，直到三—四個月大時狀況開始消失。最晚持續到六個月大。

寶寶腸絞痛發生原因

一 寶寶腸絞痛發生原因不明，有可能是寶寶受到某種刺激、情緒無法得到安撫，也可能是寶寶神經系統尚未發育成熟。

二 少數的腸絞痛是牛奶蛋白過敏所造成。

三 重要的是，腸絞痛需要和疝氣等急症鑑別。當寶寶發生腸絞痛時，兒科醫師會先判斷寶寶哭鬧的原因是不是因為其他需治療的疾病所引起。

如何改善腸絞痛

腸絞痛發生原因未明，每個寶寶發生的情況亦有不同。沒有一種方法可以適用所有寶寶，下列方法父母可多管齊下。以便改善寶寶的症狀：

一 關於哺餵，母乳媽媽自己可嘗試減少食用乳製品、咖啡因、洋蔥、甘藍菜（包心菜），和其他可能引起腸絞痛的食物；配方奶寶寶則可和醫師討論是否需要改變餵食種類。

二 不要過量哺餵寶寶，嘗試將餵奶的間隔拉長至少兩個至兩個半小時。

三 帶寶寶散步來安撫他。

四 輕搖寶寶，帶他到另一個沒人的房間或可以聽到烘衣機／洗衣機、電風扇等會發出規律低沉聲音的家電旁邊。穩定節奏的輕搖及聲音可以幫助寶寶入睡，但不可以直接把寶寶放在洗衣機或烘衣機上面。

五 奶嘴有安撫作用，如果寶寶願意吃奶嘴，可以嘗試給予寶寶吸吮奶嘴。

六 讓寶寶趴著，橫跨在成人雙腿上，並輕輕拍撫他的背。這樣可以讓寶寶腹部受壓力，幫助他舒服點。

七 將寶寶裹在大的薄毯裡，讓他感覺到安全感及溫暖；但一定要注意避免呼吸道阻塞，或是造成體溫過高。

來源：舒緩子宮收縮不適的方法

舒緩子宮收縮不適的方法

舒緩子宮收縮不適的方法

孕媽咪可藉由非藥物技巧舒緩疼痛，包含：改變姿勢、按摩、淋浴與熱敷、聽音樂、慢速且深層的呼吸或是選擇施打減痛分娩，來緩解生產的陣痛感。

改變姿勢

在未破水的情況下，孕媽咪可請伴侶或陪產者協助，在床上改變較舒服的姿勢或是下床活動。也可以利用生產球來改變姿勢，例如坐在球上、站姿靠在球上或跪姿趴在球上，以左右搖擺的方式來放鬆身體，伴侶請隨時在側扶著孕媽咪。

輕柔按摩

請伴侶幫忙按摩！可以使用乳液或按摩油，以整個手掌或大拇指或拳頭。在背部、腰部、腿部、肩頸部等部位，以孕媽咪覺得舒服的力道。揉捏、輕推等方式進行按壓；也可用按摩用具在痠痛的部位滾動，以幫助舒緩。

淋浴、熱敷

在醫護人員許可下，陪產者可協助孕媽咪沖個熱水澡或是幫孕媽咪進行背部熱敷（請使用可以控制溫度的熱水袋，勿使用暖暖包以防燙傷）。可促進血液循環，減少肌肉的緊繃感，有助降低產痛的感受。

聽音樂

音樂可以讓人放鬆，幫助舒緩產痛壓力。產前就可以準備好喜歡的音樂，為了不影響旁人，搭配耳機應該是不錯的選擇！

慢速且深層的呼吸

孕媽咪覺得舒適的呼吸方式，就是適合的減痛呼吸法。可儘量使用慢速且深層的呼吸，關鍵是利用專注呼吸來轉移疼痛感。另外，呼吸法建議搭配其他減痛方式，例如按摩、改變姿勢等，效果會比較明顯。

減痛分娩

當以上的運動無法有效緩解，孕媽咪也能選擇硬脊膜外麻醉，也就是俗稱的「減痛分娩」。由麻醉科醫師執行，於硬脊膜外腔注射麻醉藥以進行止痛，讓下半身的神經傳導變慢及阻斷，達到減痛作用。此項措施為自費項目，如有考慮進行減痛分娩，建議事先詢問生產的醫療院所。

延伸閱讀：【孕產婦關懷網站】

順利度過「陣痛」這一關

延伸閱讀：【孕產婦關懷網站】

六招幫助減輕產痛

來源：親餵後需要幫寶寶拍打嗝嗎

親餵後需要幫寶寶拍打嗝嗎

一般來說，親餵母乳後是不需要拍嗝的。但仍需要多觀察寶寶的反應，若寶寶常常在喝完奶後出現溢奶或吐奶的情形。可在更換乳房哺乳或者餵完奶後拍嗝。

拍嗝的方式：

一直立式：將寶寶的頭靠在媽咪肩膀上，隨時注意不要壓住寶寶口鼻。手掌微彎如空杯狀置於寶寶背部，由下往上方向輕拍幫助氣體排出。

二坐在膝上式：讓寶寶稍微往前傾坐在媽咪大腿上，一手以手的虎口托住寶寶下巴及前胸，另一手將手掌微彎如空杯狀幫寶寶由下往上輕拍背。

來源：觀察寶寶的大便顏色

觀察寶寶的大便顏色

新生兒的大便顏色可能是黃色、綠色，甚至墨綠色，大便的顏色大部分是來自膽汁，有部分是來自食物或水分等。膽汁在與小腸中的食物殘渣混合分解後會變成黃褐色、墨綠色等。當母乳或配方奶含鐵質較高時，多餘的鐵質沒被身體吸收就會排出來。因而解出綠色便，就是俗稱的「挫青屎」。通常不會對健康造成影響。

寶寶出生後，家長應仔細觀察寶寶的皮膚及糞便顏色。若寶寶的皮膚呈現黃疸現象，眼白變黃。就要更仔細觀察比對大便的顏色如兒童健康手冊內嬰兒黃金九色卡圖示。一般而言，黃疸在寶寶身上相當常見。出生後第二到三天出現，第四到五天達到高峰。約二週消失。哺餵母乳的嬰兒黃疸期可能比較長，但黃疸指數不致升高。因此膽道閉鎖寶寶常被誤認為母乳性黃疸而延誤就醫。

膽道閉鎖是指因膽道病變，造成外膽管管腔封閉。無法讓膽汁順利排出體外，如果不及早在六十天內診治（接受葛西氏手術）。膽汁鬱積在肝臟，嚴重者可能在一、兩個月內造成肝硬化。使得寶寶必須要換肝。主要症狀有黃疸持續兩週以上、便便顏色呈灰白色，如「嬰兒大便卡」上屬於不正常狀況之一到六號顏色或從黃色變得愈來愈白、右上腹腫大（因肝臟腫大）等，若寶寶有這些症狀需盡快送醫進行抽血等檢查。膽道閉鎖是可透過及早發現、及早治療而避免造成嚴重甚至致命的疾病，如能在六十天之內越早越好進行葛西氏手術。讓膽汁順利排出的機率將近九成，若拖到三個月以後才手術。則約只有三成六，

因此。把握嬰兒出生六十天內的發現黃金期非常重要！

請父母平日在寶寶排便時，不忘拿出大便卡在日光或白色燈光下比對以清楚辨識；滿月時。如期帶寶寶接受健康檢查，如果不確定寶寶便便是否正常。不要忘記將包有便便的尿布一併帶至醫院或用數位相機拍下，交由兒科醫師再做確認。並把結果登錄在「新生兒大便卡篩檢結果通報系統」，才算完成整個篩檢。

來源：解讀寶寶吸手、咬指甲的原因，別急著糾正！

解讀寶寶吸手、咬指甲的原因，別急著糾正！

一歲以下寶寶因為『口慾期』的緣故，會有吸吮的需要。寶寶需要時可先哺餵母乳滿足其口慾，若仍無法滿足或哭鬧。可以提供安撫奶嘴使用。吸吮是原始的反射動作，一般來說。吸吮慾望最強的時候約在二至四個月，若是不給寶寶吸奶嘴。寶寶可能會吸手指來滿足口慾！但一歲過後，寶寶口慾漸漸消失，減少對奶嘴的依賴時可慢慢戒掉奶嘴。為避免咬合受影響，建議二歲前戒斷奶嘴為妥。

孩童咬手指甲是因為舒緩緊張焦慮，有自我安撫的效果。但近年來亦有研究詮釋，孩子無論是吸手指或咬指甲等行為。都是兒童時期常見的兩種口腔習慣，大多數父母都不能接受。但其實孩子吸吮手指是天生的，研究顯示這樣的行為最早可能在胎兒於妊娠時期約二十九周就出現。如果出生幾個月後開始發展這樣的習慣，會越來越明顯。行為頻率的高峰期通常持續至十八個月至兩歲大，大部分在四歲時這習慣會趨緩或停止；而咬手指常見於三到六歲的兒童。隨著年齡增長，在青少年時期會達到高峰。慢慢地再逐漸減少。

過去研究指出孩童咬手指甲是因為舒緩緊張焦慮，有自我安撫的效果，但近年來亦有研究詮釋這樣的習慣出現在孩子無聊或是正在處理困難的事情的過程中，而非全然是解焦慮的應對。當孩童無聊時選擇咬指甲來排解，這可能與活動量不足或感覺統合異常有關；而處理困難事情時咬指甲，主要與提升當下的專注力有關。另外，也有其他成因造成咬指甲的習慣，例如：遺傳或透過觀察或模仿父母或兄弟姐妹等環境因素。

雖有研究指出吃手、咬指甲和孩子心理層面的情緒緊張無關，但過度吸手指、咬指甲。可能會影響上顎牙齒的發育與排列，影響發音、咀嚼功能與齒像美觀；再者。過度咬指甲會影響指甲的生成或造成輕微的指頭變形，不可不慎。另有學者推測兒童時期的吃手、咬指甲的習慣與成人時期的吸菸或咀嚼口香糖的習慣有關的，所以美國兒科醫學會建議這樣的習慣孩子四歲前都不需要過度緊張，除非嚴重的影響健康或對生活造成負面影響。

針對不同年齡層，有不同的策略方式。如果是兩歲以下，比較是口腔期使然。建議可給予食物類小點心、讓孩子有適當的感官滿足經驗是很重要的。而兩歲以上的孩子，可嘗試以下策略來協助改善吃手、咬指甲習慣：

方法一、滿足刺激需求：

孩子可能因感覺統合中觸覺和本體覺的刺激較少，所以給予充分刺激來滿足需求相形的重要。家長可以讓寶寶接觸不同質感的物品，增加觸覺刺激。或安排精細的操作活動，例如撕貼畫、摺貼圓點點貼紙、玩積木或黏土。

方法二、溫柔的提醒：

如果孩子多在放空、

無聊時吃手，這時只要溫柔提醒就好。不須強烈禁止或斥責，這樣反而會造成孩子的壓力。引起反效果。

方法三、使用忽略或轉移注意力的方式：

鼓勵孩子參與其他活動，尤其是雙手操作的遊戲，例如黏土、玩沙、揉紙球、攀爬或雙手操作的組裝積木。

方法四、增加孩子的活動量：

六歲以下的兒童，每天應有三十分鐘的大肌肉活動時間，活動中也可加入與「衝動控制」相關的遊戲，例如：撲克牌遊戲中的「心臟病」遊戲、一二三木頭人、老鷹抓小雞、紅綠燈等等。

方法五、每日親子時間：

與孩子共同討論目前認為困難或難以解決的事情是什麼，一同想辦法解決，也可透過親子共讀時引導。引導孩子去思考解決辦法，而非直接告訴孩子辦法，才能提升孩子解決問題能力。

方法六、充分的衛生教育：

讓孩子知道吸手指、咬指甲會有的健康疑慮，並利用圖片做輔助會讓孩子更能理解。平時更要注意為孩子修剪和清潔指甲，並養成正確洗手的好習慣。

方法七、使用替代方法：

在看電視或坐在車裡，可給一些操作小物，替代無聊空檔時的一出現的吸手指或咬指甲行為。

來源：認識兒童發展遲緩及早期療育

認識兒童發展遲緩及早期療育

一、何謂發展遲緩：

兒童在出生以後，隨著神經系統成熟及成長環境照顧。不但身體不斷成長，在其認知、動作、語言、社會適應行為

或情緒發展等各領域。均有一定的發展里程碑。

發展遲緩係指兒童成長及發展過程中，可能因先天生理條件、心理疾病。或家庭成長環境的影響下，在認知發展、生理發展、語言及溝通發展、心理社會發展或生活自理技能等方面。與一般同年齡的兒童相比，有發展落後或異常的現象。並經衛生主管機關認可之醫院評估確認並發給證明之兒童。

二、發展遲緩的原因：

大多數發展遲緩的原因是未知的，目前能被發現的原因約僅占二十至二十五。在已知的原因中，包括：營養、家庭環境刺激、基因突變、先天疾病、後天疾病等。其中遺傳和環境因素的影響是最大的。

如果寶寶是早產兒、出生低體重（出生體重＜二千五百）、有先天性異常、腦部疾病或受傷、母親懷孕期間曾接觸過菸酒藥品，或家族近親有視聽覺障礙、智能不足、精神異常等，寶寶較容易發展遲緩，家長應特別留意觀察。

三、發展遲緩兒童與身心障礙兒童之關係：

身心障礙兒童係指因生理疾病傷害，導致機能異常致使生活適應及社會適應有困難之兒童。

發展遲緩兒童發生的原因中，有部份已知的原因是來自生理傷害導致障礙的形成而造成發展遲緩的現象。例如：視覺、聽覺缺陷的孩子，因學習管道受到限制而表現出有發展遲緩的現象。但不是所有的發展遲緩兒童都會是身心障礙兒童，只有部份發展遲緩兒童乃因為有身心障礙的事實而顯現出有發展遲緩的情形。也有部份因發展遲緩現象未獲改善而成為身心障礙兒童。

四、早期療育的重要性及其效益：

嬰幼兒三歲以前腦細胞連結網已發育七十到八十，六歲之後腦細胞連結網增長逐漸緩慢。故零至六歲嬰幼兒若有功能受損或遲緩現象，愈早給予補救。成效愈大。孩子的生長與發展一生只有一次，不要錯過療育的最佳時機。

發展遲緩是現象的總稱，如能及早診斷並接受適當之療育。並透過醫療、教育、福利的介入，可以讓部份發展遲緩兒童減少未來形成障礙的可能性或是減輕未來障礙的程度。也就是說，經過早期的療育。可以讓孩子未來障礙的程度由重度進展為中度，或由中度進展到輕度。甚至一部份的發展遲緩兒童可以在經過早期療育之後趕上發展的里程碑。

為此，政府結合社政、衛生、教育等相關單位資源。以兒童及其家庭之最佳利益為優先考量，推動兒童發展早期發現與篩檢、通報轉介、聯合評估、療育及家庭支持服務、追蹤輔導等相關工作。以及早提供發展遲緩兒童及其家

庭整合介入之服務。

五、早期療育服務：

早期療育透過專業團隊的合作過程，對發展遲緩兒童提供適當的醫療照顧、教導方法、教育計畫與社會福利服務等，通常專業團隊成員包括家長、特殊教育老師、醫師、護理人員、臨床心理師、社會工作師、物理治療師、職能治療師、語言治療師、幼教老師等，提供全方面完整的療育服務。

如何早期發現孩子的發展問題？

家長平日應多加觀察寶寶的發展步驟，同時定期帶孩子接受健康檢查。

家長應定期觀察並填寫兒童健康手冊中各年齡層之「家長記錄事項」，及寶寶成長的發展步驟，並在每次健檢時，提供寶寶的狀況給醫師作參考。

家長可依寶寶的實足月（年）齡，自行對照各年齡層的發展重點。如果發現孩子有疑似發展異常狀況，可至國民健康署補助之兒童發展聯合評估中心聯絡資訊可至國民健康署署網請下載檔案參閱或地方政府補助或指定之兒童發展聯合評估醫院聯絡資訊可洽各地方政府衛生局，由醫師及專業團隊人員提供資訊協助及評估服務。

來源：認識前置胎盤

認識前置胎盤

一般正常懷孕時，胎盤是附著在子宮腔前壁、後壁或頂部位置；通常是會隨著懷孕週數的增加而往子宮頂部方向移動。並不是胎盤真的會自己動，而是子宮隨週數變大。胎盤主要部位也跟著向上提昇。而前置胎盤是指懷孕二十週以後胎盤不當的著床於子宮下段的一部分或覆蓋於內口上。在懷孕末期時，下段子宮收縮及子宮頸擴張時。胎盤絨毛會由子宮壁上撕裂，使得胎盤部位的子宮竇暴露出來。開始出血，但出血量是暴露的子宮竇數量而定。

常見原因：

前置胎盤的原因不明，統計上，每二百次妊娠中有一次會發生前置胎盤，可能的原因有：曾有前置胎盤、多產、高齡、粘連性胎盤、蛻膜血管發育不全、吸菸、前胎剖腹產、最近自然或人工流產、胎盤過大。

前置胎盤可分為四級：

一、完全性前置胎盤：子宮內口完全被胎盤覆蓋。

二、部分性前置胎盤：子宮內口部分被胎盤覆蓋。

三、邊緣性前置胎盤：胎盤緣位於子宮內口的邊緣。

四、低位胎盤-：胎盤著床於子宮下段，雖很接近但未到達內口。

懷孕二十週後的產前出血是前置胎盤的常見症狀。只要有出血症狀出現都應該到醫院就醫接受進一步評估。典型的情形是在妊娠三十二週之後出現的無痛性陰道出血約佔七十到八十，此時是因為子宮下段變薄而牽扯到胎盤附著的位置。出血是胎盤的開放血管所流出的母體血，胎兒循環則是保持完整。出血通常是突然的、無痛的而且大量的，但有時剛開始時只是少量。出血量其實不容易估計，但很少會達到休克的程度，而出血的頻率增加是會增加貧血及低血容性休克的危險；有二十到三十的產婦出血時會合併產痛，其中有十是因為胎盤的剝離所造成。此外雖然沒有出血，但有突發性腹痛、破水或是胎動降低的情形都應該緊急就醫。

除了低位性及部份邊緣性胎盤的孕婦可以進行陰道自然生產之外，幾乎所有前置胎盤的孕婦都需要剖腹生產。什麼時機進行剖腹生產，醫師會評估孕婦與胎兒的危險性與胎兒的成熟度，做出最好的判斷。

來源：認識多元生產模式-營造正向的生產經驗

認識多元生產模式-營造正向的生產經驗

雖然生產是件喜事，但有多少孕產婦是擁有正向的生產經驗？生產過程除了疼痛，驚恐，又能帶給生產婦女什麼樣的感受？在二零一十八年提出的生產照護建議準則，特別強調要讓產婦能有正向的生產經驗。本篇文章將介紹多元生產模式，期待未來能尊重及支持婦女對生產模式的選擇。進而營造正向的生產經驗。

建議讀者在閱讀本文章之前，先參考國民健康署所提供的孕婦衛教手冊一百一十二年版第六十二到六十三頁內容。有多元生產模式及各種生產方式的說明，包括經陰道自然生產。器械輔助經陰道自然生產及剖腹生產三種不同生產方式的介紹，每種方式都有其優點和限制。但每位孕產婦健康狀況、醫療風險，家庭文化背景及個人需求喜好價值觀等因素都是獨特的。因此生產方式應在母嬰安全確保的先決條件下，透過適當產前教育課程。充分溝通解釋各種生產模式或措施的過程、優點、風險和適用情況，根據個別情況並尊重孕產家庭偏好而定。這就是多元生產模式的精神。

不可否認，生產還是可能有風險。但排除一些高危險妊娠無法嘗試陰道自然生產的孕產婦，根據醫療文獻及專家經驗統計。大約有八十懷孕是屬於低風險的，也就是這些孕婦的生產過程多是屬於生理性生產或是正常生產。根據美國護士助產士協會二零一十二的定義，由婦女和胎兒與生俱來能力所驅動的生產過程稱為生理性生產。而根據多個機構與學會的意見，生理性生產應包括下

列幾個條件：足月懷孕產程的自發性起動和進展。透過婦女生理及心理本能條件讓產程進行，極小化藥物或醫療技術的介入。陰道自然生產，產後即刻母嬰肌膚接觸及儘早開始母乳哺餵。許多文獻顯示，生理性生產提供婦女與新生兒相當多的好處（包括身體與情緒）。尤其是增加婦女對生產的滿意度，並能透過生產增能婦女（母職角色的發揮）。促進親子依附關係的連結，建立正向的生產經驗。

在現今產科醫療照護模式，有很多因素會干擾生理性生產。如：引產或催生、不友善的待產環境（過冷、過亮、過吵）、限制飲食、限制活動及姿勢、醫療機構政策（人力、效率、時間的壓力）、醫療介入（藥物止痛、常規會陰切開，器械輔助陰道生產、剖腹生產）、即刻斷臍及母嬰分離等等。有些是具醫療必要性而無可避免，但也有些是可以根據產前或待產時臨床狀況去做彈性選擇。而非常規性執行。美國婦產科醫學會專家會議（七百六十六萬二千零一十七）建議醫療照護者應致力於改變或減少生產中的介入措施如：產程潛伏期過早入院、週數過早或非必要的催生、非必要持續性胎心音監測、常規會陰切開、缺乏非藥物性疼痛支持措施、待產中禁食、固定平躺姿勢生產、無彈性的生產用力時機與方法等等，以上可以透過產前教育。跟照護機構及人員充分溝通，以共同決策模式。制定生產計畫書，在醫療安全的前提下。達到生理性生產的目的。

要促成生理性生產，除了醫療機構及照護人員的協助配合，孕產婦本身也須考慮下列幾個因素：健康狀況與身體素質（低風險）、生產模式的主觀意識及自我選擇（個人生命價值觀）、對生產的認識程度和自信心（參與產前教育）、跟醫護人員充分溝通達成共同決策（生產計畫書）及選擇願意提供或支持生理性生產的醫療機構（友善生產機構）。

不管是介入較多的醫療化生產，或是介入較少的生理性生產。都是多元生產模式的一部分，就像一句廣告詞：“科技始終來自於人性”。科技的進步，大幅改善人類醫療照護的品質與效率。但同樣的進步，卻讓醫療照護似乎少了點溫暖與耐心。期望未來我們不只仰賴科技，而是可以運用科技。提供人性化的服務，讓孕產婦都能有更彈性的選擇。建議所有孕產婦在產前，都可以跟您的產科醫療照護者充分溝通。參考其專業意見，配合自己的意願。選擇自己喜好的生產模式或環境，營造一個安全又正向的生產經驗。

來源：認識生產過程-剖腹生產

認識生產過程-剖腹生產

懷孕到中後期時，準父母可開始依自我的生產計劃及身體狀況跟醫師或助產師討論，選擇一種合適的分娩方式做準備。因此，除了醫師必須審慎評估之外，產婦自己也要慎重考慮。

生產方式可分成陰道產與剖腹產兩種。當有特殊狀況無法陰道生產時，則採剖腹生產。是利用手術模式，切開腹壁和子宮壁。將胎兒從子宮中取出的生產方式，產後需要多一點時間恢復。住院時間較長。

若於產前即已診斷出孕媽咪屬高危險妊娠，如前置胎盤、子癲症、胎兒橫位、骨盆狹小、多胞胎、心臟病合併心臟衰竭等或生殖道活動性疱疹等因素時，在實證醫學的考量下，便會直接建議孕媽咪採剖腹生產較為安全。臨床上，除了健保適應症與媽媽本身的意願外。若採用陰道生產的產婦，在分娩過程中出現產程遲滯或胎兒窘迫等緊急狀況。為顧及胎兒的安全，也會建議改採剖腹生產來因應。生產住院時間四至五天，而子宮及傷口的真正復原，則需要三個月至半年。

剖腹生產的適應症

一胎兒窘迫須附胎兒監視器報告

二產程進展不良。

三產前出血。

四胎位正。

五臍帶脫垂。

六催生失敗者。

七生殖道疱疹者

八前次剖腹產（須註明前次剖腹產的理由）。

九先前有子宮手術者。

十陰部或陰道長尖形濕疣。

十一胎兒先天不正常可治療者。

十二子癲前症

（一）無法控制的嚴重型子癲前症。

（二）有症候群，引產六小時失敗者。症候群是溶血，、肝臟酵素升高。和低血小板數，等三種症候。是子癲前症的併發症，亦即妊娠高血壓併發蛋白尿之疾病。再影響到肝臟的特別病症。

（三）引產六小時但產程進展不良。

十三胎兒體重小於一千五百公克（限有新生兒加護病房設備的醫院）。

十四 骨盆畸形（包括小兒麻痺或車禍受傷）。

十五 胎兒體重超過四千公克。

十六 胎頭骨盆不對稱（）。

十七 阻生性生產（例如有子宮肌瘤或卵巢腫塊）。

十八 主要內科併發症。

十九 經診斷為（愛滋病毒）陽性者。

二十 其他特殊適應症，但須詳細說明。

剖腹產的手術前準備

一 預定剖腹產前一天住院準備，確認手術方式，並提醒注意事項及預先防範各種可能的突變狀況。例如：若有嚴重貧血，可先備血或輸血；若有心電圖異常，可事先會診心臟內科或麻醉科再次評估等等。

二 測量生命徵象（包括呼吸、心跳、血壓）、身高、體重，以及驗尿及驗血。

三 到病房完成病歷問診、填寫同意書（包括手術及麻醉同意書）、核對身分、安排胎兒監視器裝置（了解胎兒心跳和母親子宮收縮的情況）。

四 告知手術前須知，例如：取下活動假牙、隱形眼鏡、眼鏡、髮夾、飾物、手錶等，不要塗指甲油及化妝（為觀察是否有發紺情形）。

五 禁食（包括開水）八小時（以免麻醉後引起嘔吐不適，造成吸入性肺炎）術前需有足夠的空腹時間緊急剖腹產除外。

六 護理人員會協助剃除腹部和陰部的毛髮，以減少手術後傷口感染。

七 手術當天：打上點滴，可用來補充體液電解質及方便給藥。

剖腹生產手術流程

一 手術當天的前置作業：

（一）醫護人員會陪同待產婦在等候室再次核對身分及病歷。

（二）進入手術室，進行麻醉，一般是採半身麻醉（包括硬脊膜外及脊髓麻醉法）。

（三）進行皮膚剃毛消毒，範圍是乳房下沿著腋中線至大

腿上段及會陰部，目的是為了避免毛髮上的細菌掉落到已切開的傷口，造成感染。

(四)放置尿管，是為了避免麻醉後尿道括約肌鬆弛，造成小便失禁或術後無法解尿之不便，同時也是做為術後排出尿量監測之用。

二 開始進行剖腹產手術：

(一)術前準備就緒，醫師會確認下刀位置。約於下腹部、陰毛邊緣位置橫向劃開約十五公分左右切口，依序切開皮下脂肪、肌膜、腹肌、腹膜層。進入腹腔。

(二)在子宮下段橫向切開肌肉層、羊膜腔，將胎兒及胎盤取出，有時醫生為了幫助胎兒娩出，會用手掌壓迫子宮底。

(三)斷臍及清除惡露後再逐層縫合子宮及腹部傷口，貼上透氣紙膠帶及覆蓋紗布。

三 剖腹產後照護：

(一)產婦至恢復室觀察生命徵象(包括呼吸、心跳、血壓)，約一、二小時後且生命徵象穩定，產婦就可以回病房休息。

(二)到病房後仍要持續進行生命徵象的監測、觀察傷口、子宮收縮、惡露量、排尿量。

(三)產後尿管通常需留置一到三天，移除導尿管即可下床活動，一般在四到八小時內自解小便。術後下床要採漸進式下床，下床前應先坐於床緣。動作須緩慢不要過於心急，必須有家人或護理人員陪伴。慢慢的扶著站起，以免太快改變姿勢產生姿位性低血壓。導致頭暈目眩而發生暈倒的危險。下床時可使用束腹帶，以緩解活動時傷口的不適。

(四)於排氣(放屁)後先喝少量溫水，若無嘔吐情形。可食用流質食物如：魚湯、果汁等，然後再吃軟質飲食。最後則可開始多攝取雞精、肉類等高蛋白質的食物，來幫助組織修復。

(五)手術傷口醫護人員會定時換藥，須保持乾淨。勿碰到水，但若不慎沾水。立即換藥以無菌棉棒沾優碘消毒傷口後，再用紗布覆蓋紙膠黏貼。觀察有無滲液，可先採用擦澡方式維持身體清潔。手術後如果傷口復原良好，乾燥沒有滲出液。出院前即可拆線，出院前醫師再次診視無異常。返家後一周約手術後二周左右，傷口癒合完全即可碰水洗澡。出院後可洗澡時，傷口可貼美容膠布約三到六個月預防疤痕增生不需天天更換，約三到五天換一次美容膠布。紙膠若有脫落或不密合時，輕輕撕下。術後下床活動若感覺傷口疼痛不適，可使用束腹帶減輕不適，但臥床休息或睡眠時應將束腹帶鬆開以避免皮膚癢或不適；且要留意束腹帶的清潔，沾有血跡時應清洗乾淨。

若有下列情況，請返院求診產後發燒超過三十八度時、產後大出血紅色惡露不止。腹部傷口發紅、腫、異常疼痛、腹部劇烈疼痛。惡露變色、有惡臭味、不正常的出血。提供產後照護內容，包括飲食衛教、母乳哺餵、腹部傷口照護、產後運動等。

雙胞胎妊娠，雖然不是剖腹生產之絕對適應症。不過大部份孕婦會沒有勇氣嘗試陰道生產，而婦產科醫師為求孕婦之生產安全性。在與病患充分溝通之後，通常多會選擇剖腹生產；所以雙胞胎妊娠之剖腹生產率也會相對增高。產婦在經歷剖腹產之後，身體會因傷口疼痛而行動不便，非常疲憊。但隨著時間過去，會慢慢恢復到懷孕前的健康狀態，可以進行各種活動。

當醫師告知本次懷孕可能是高危險妊娠，需經由完整的產前檢查。來早期預防懷孕過程可能發生之併發症，建議至就近的「高危險妊娠孕產婦及新生兒照護品質中度級、重度級急救責任醫院」生產。在人力及設備較完善的醫療院所，母親及嬰兒的安全較可獲得保障。

經過一次剖腹產後，當再次懷孕時，一般認定適合施行「剖腹後改由陰道分娩方式」之條件為：

一 前胎剖腹產的子宮切口為下段切開剖腹

二 適當骨盆結構

三 有意願準備嘗試「剖腹後之陰道分娩方式」

四 無其他必須採剖腹生產的適應症

五 同時必須在具備可立即實施緊急剖腹生產且有能力急救新生兒的一定規模醫療機構生產擁有一個順利安全的分娩，需要婦產科醫師及護產人員的專業評估，和孕婦及家屬充分討論了解最合適的生產方式，並尊重孕婦的選擇。

來源：認識生產過程-陰道生產

認識生產過程-陰道生產

懷孕到中後期時，準父母可開始依自我的生產計劃及身體狀況跟醫師或助產師討論。選擇一種合適的分娩方式做準備，因此。除了醫師必須審慎評估之外，產婦自己也要慎重考慮。

生產方式可分成自然產與剖腹產兩種。臨床經驗顯示，大部分的分娩是以自然生產方式為主的。自然生產就是陰道生產，即胎兒經由子宮收縮與產道擠壓從陰道生下。產後復原較快，住院時間較短。

接近生產期之前，會出現下列幾種徵象：

一 輕鬆感：預產期前幾週，胎兒頭部會下降到骨盆腔。孕婦會有輕鬆感，通常食慾較好。呼吸較順暢。

二 落紅或現血：表示子宮頸漸開，填塞在子宮頸內的粘液混合少許血液，從陰道口排出。由於胎頭的擠壓造成子宮頸黏膜微血管破裂，也會有現血的出現。一般而言，黏液塞排出後或現血出現後二十四至四十八小時內，就會開始分娩。現血的量通常會隨子宮頸漸進的變薄擴張而增加。

三 陣痛或腰酸：因子宮收縮而造成的，會有下列特性：

一 開始時為不規則疼痛，漸漸的轉變為規則，疼痛隨著時間漸漸加長。

二 疼痛的部位在整個腹部及背部，或是尾骶骨處有痠痛感。

三 陣痛時子宮變得很硬，不痛時就變軟。

四 不會因按摩或走動而減輕疼痛。

四 破水（由陰道流出清澈的液體）：因保護胎兒的羊膜破裂，通常破水發生在第一產程的活動期。若在分娩過程開始前即破水則稱為早期破水，早期破水的個案中會有八至二十四小時內進入產程，因為破水會誘發分娩。此時不管是否陣痛，皆應減少走動，儘快到醫院。

整個陰道生產過程從規則的陣痛或腰痠開始進入產程，直到胎兒及胎盤娩出。每個人生產所需的時間，有個別差異。平均而言初產婦約十二到十八小時，第二胎含以上的產婦約八到十小時。

陰道生產的產程及相關處置：

第一產程：又分為潛伏期和活動期。活動期特徵為胎兒胸腹部位下降速度加快，子宮頸變薄速度加快。

-潛伏期：住院後會進行下列的評估：基本的身體檢查、收集孕婦產檢及目前的分娩資料，包括子宮收縮開始的時間、收縮的頻率、持續時間和強度，落紅、胎膜破裂、胎動；陰道內診瞭解子宮頸變薄、擴張及確定胎位、胎頭下降和胎兒先露部位；確認孕婦的生產計畫和選擇。同時，護產人員會依各醫療院所規定評估胎兒心搏速率。如果產婦是因破水入院，也要觀察羊水性狀並預防破水過久增加感染的風險。

-活動期：主要特徵是子宮收縮變強、變密及持續時間變長。

在此階段也會經由陰道內診瞭解子宮頸變薄、擴張及確定胎位、胎頭下降和胎兒先露部位，腹部檢查及監測胎心

率，測量體溫、脈搏、呼吸、血壓。

第二產程：子宮頸完全擴張到胎兒娩出

此階段可能持續數分鐘到數小時或更長的時間。胎兒產出除了靠子宮收縮外，另外就是要靠孕婦的用力。假使是由於產婦用力不好而造成產程延長，可經由醫護人員的教導與鼓勵，使產婦能正確有效的用力。最後，還可以使用真空吸引或產鉗來幫助胎兒快一點生下來。

第三產程：胎兒娩出到胎盤、臍帶娩出

在此階段主要是協助胎盤娩出及產道的檢查與修復縫合。並觀察預防產後出血。胎兒娩出剪斷臍帶後，護理人員會為寶寶擦身體、吸出口鼻分泌物。醫師會幫產婦子宮按摩，幫助胎盤排出。產婦可全身放鬆，此時比較不會有強烈疼痛感。

第四產程：胎盤娩出後二到四小時

胎盤娩出後，醫師檢視胎盤大小、形狀、重量及完整性。必要時為產婦進行會陰修補，送至產後恢復室觀察產婦的生命徵象（包括呼吸、心跳、血壓）、子宮收縮、惡露量等情形並做肌膚接觸。其目的在讓新生兒及早適應母親身上菌種，降低細菌感染機會。穩定體溫，並促進早期親子關係建立。

當產婦產後情形穩定後，就會由護理人員及家屬陪伴送回病房休息。醫護人員將教導按摩子宮方法，促進子宮收縮減少出血情形。觀察排尿、惡露量情形，提供產後照護內容。包括飲食衛教、母乳哺餵、會陰傷口照護、產後運動等。

自然生產的產婦可能會有會陰縫合傷口。一般的會陰傷口約三天就可癒合；在未被感染的狀態下，嚴重的傷口也多在一週內，表皮即能癒合。會陰傷口的腫脹或是疼痛的感覺，一般在產後十二小時到三十六小時左右，疼痛感較為強烈，隨後疼痛的程度就逐漸降低。在傷口癒合前，最重要的就是保持會陰部的清潔，避免細菌在此滋生。

由於產後會分泌惡露，初期又多為凝塊狀。故需要勤換棉墊；每次大小便後，應以煮過的溫開水裝入沖洗器內。由前往後清洗會陰部，以沖洗棉枝擦乾傷口。其他部位如大腿內側及雙臀則以衛生紙擦拭，維持會陰部的清潔。

在產後第一天，如果脹痛嚴重。可以詢問醫師是否進行會陰處冰敷，以緩解脹痛。產後第二天起，可在醫護人員指導之下。用溫水坐浴，也能有效減少傷口疼痛。不過，陰道的強度則需要一個月到一個半月的時間逐漸強化，產婦要記得在產後六週回診，以檢查會陰傷口復原的狀況。

目前雙胞胎妊娠，雖然不是剖腹生產之絕對適應症。不過雙胞胎陰道生產的難度比較高，建議要和婦產科醫師討

論。如果兩個胎兒的胎位都正常，陰道生產是可行的。雙胞胎（多胞胎）的待產過程需注意確實有兩個胎心音，以確保兩個寶寶沒有異常變化。

雙胞胎（多胞胎）出生的第一個寶寶與單胞胎寶寶分娩過程是一樣的，在第一個寶寶出生後。即刻檢查第二個寶寶胎頭的位置，等待第二個寶寶出生期間。應監視其胎心音是否正常或有無其他異常狀況發生，若第二個寶寶是臀位時。可刺破羊膜，抓住腳。使寶寶分娩，此時如有任何異常緊急狀況發生（如子宮破裂）。則必需立刻進行緊急剖腹生產。

當醫師告知本次懷孕可能是高危險妊娠，需經由完整的產前檢查。來早期預防懷孕過程可能發生之併發症，建議至就近的「高危險妊娠孕產婦及新生兒照護品質中度級、重度級急救責任醫院」生產。在人力及設備較完善的醫療院所，母親及嬰兒的安全較可獲得保障。

來源：認識產後憂鬱症

認識產後憂鬱症

部分婦女在生產後，會產生一些情緒低落或心情不穩定現象。但這些現象大部分會在幾天後消失，少部分症狀嚴重之個案。便需要專業介入協助治療。但因為這些症狀可能是不自覺，或常被家屬或周遭親友忽視。以致常無法及時給予適當的幫忙，而造成個人及家庭的困擾。甚至傷害等情況，因此；以下將以淺顯的方式簡介產後憂鬱症的可能原因、分類及處理方式等資訊。期喚起大家正確認識產後憂鬱症。

為什麼會發生產後憂鬱症？

產後憂鬱症發生的原因目前仍不明，可能跟生理、心理及社會因子有關。例如：周產期發生重大生活壓力事件、生產時體力耗費及生產經歷重大身心創傷等，亦可能引起產後憂鬱症；此外。產後媽媽須負擔照顧新生兒的角色，或因懷孕造成身體外觀的改變等。也會造成憂鬱。

產後情緒障礙的分類（產後憂鬱症是產後情緒障礙的一種）

哪些人容易發生產後憂鬱症？

一般認為造成產後憂鬱症的危險因子有下列幾項：

一過去曾是重度憂鬱症患者或為其他精神疾患，或前胎有產後憂鬱症，或平時有嚴重經前症候群或經前不悅症。

二懷孕過程中即有憂鬱或焦慮症狀者。

三生活中遭遇重大事件，如：失去親人、婚姻家庭問題、失業等。

四 社會支持或資源不足者。

五 懷孕或生產時出現併發症，如：妊娠高血壓、早產或生產併發症等。

如何知道自己有沒有可能有產後憂鬱？

我們建議產後媽媽可以利用下面兩個問題，進行簡易評估。

一 過去一個月，是否常被情緒低落、憂鬱或感覺未來沒有希望所困擾？

二 過去一個月，是否常對事物失去興趣或做事沒有愉悅感？

如果上述兩個問題的確發生在您的身上時，我們強烈建議您告訴您的配偶或尋求親友協助，或透過心理衛生機構協談及轉介。同時也可以將您目前的狀況告知您的婦產科醫師，家庭醫學科醫師或兒科醫師，或精神科身心科醫師，以適時提供診斷、會談及必要的藥物協助。如果常常會出現想要傷害自己的念頭時，應立即尋求醫療協助，以避免傷害的發生。

心理衛生資源

一、衛生福利部安心專線一千九百二十五（依舊愛我）：提供全年無休、二十四小時免費心理諮詢服務。

二、各縣市社區心理衛生中心：提供心理衛生宣導、教育訓練、諮詢、轉介、轉銜服務、資源網絡聯結、自殺防治、物質濫用防治及其他心理衛生等事項。

三、倘若您有哺餵母乳困擾時，可以打免付費諮詢專線八百到八十七萬零八百七十，尋求協助。

來源：超音波檢查：政府提供孕期3次超音波檢查

超音波檢查：政府提供孕期三次超音波檢查

超音波檢查政府提供孕期三次超音波檢查

超音波可以讓爸比媽咪看看肚子裡胎兒的狀況。

是醫師的得力助手，能監測胎兒心跳、進行胎兒各部位的生長測量，並偵測胎盤位置和羊水量多寡。

然而並非所有的胎兒異常狀況都可以透過超音波篩檢出來。

高層次超音波

詳細、全面的檢查胎兒的器官及組織

與一般超音波的差別，主要在於檢查的詳細程度。

高層次超音波就像是幫寶寶做全身性的檢查，主要目的在於偵測出胎兒是否有先天的構造異常。

並非每個孕媽咪都需要，建議可與產檢醫師討論後決定。

來源：越爬越聰明！寶寶爬行注意事項看這裡！

越爬越聰明！寶寶爬行注意事項看這裡！

爬行能幫助寶寶肌肉肢體的發展，並有助於整合視覺、空間等概念。爸媽們在開心陪伴寶寶爬行的同時，更要注意爬行空間的安全性！

「爬」對寶寶的好處

有句話說：七坐八爬九發牙。隨著年齡的增長，寶寶會發展出不同的能力。通常寶寶約在八至十個月大左右開始練習爬，一開始的爬行動作。會是肚子貼著地板，像是匍匐前進一樣。不過這階段寶寶的四肢力量還不夠，可能只能在原地揮動手腳。有些寶寶會因為手部力量發展得比腿部快，出現「倒退嚕」的動作。模樣真是可愛極了！

當寶寶手腳的肌肉發展得更有力，他們就會用手和膝蓋承重，讓肚子離地，再逐漸地以四肢對稱交替的前進爬行。其實「爬」這個動作，對於寶寶來說有著許多優點。透過爬行訓練肌肉的穩定度，往後在學習走路時也會更加順利。姿勢更標準。

好處一：

寶寶必須運用雙臂撐起身體，這樣的動作有助於增加肌肉的張力。以及承重力，爬行的過程也會增進四肢的協調性及平衡。進而讓寶寶在練習爬行時，學習如何克服障礙物。

好處二：

寶寶一旦學會爬行，當面前出現有興趣的玩具、物品時。他們就會開始思考，要如何透過爬來獲得。藉此培養出寶寶的好腦力。

五重點打造安全的居家環境

透過爬行這個動作，寶寶能盡情探索這個世界，也會對自己所處的環境充滿各種好奇心。當爸媽們發現，寶寶趴著的時候，小手小腳開始努力地揮動，那就表示寶寶想要學爬囉！在開心成長里程碑又進一步的同時，更重要的是，要為寶寶準備一個安全的學爬環境，也要為寶寶打造

一個足夠的爬行空間。

如何準備安全的居家空間呢？五大重點提醒各位爸媽：

重點一：準備一塊厚度適中的地墊

擔心家中的地板太過冰冷堅硬，那就為孩子準備一塊軟硬適中的遊戲地墊吧！能讓孩子爬得更好，也會比較好清理。

重點二：各種邊邊角角都要裝上保護墊

孩子還很脆弱，禁不起任何跌跌撞撞。爸媽們要謹記把家中的桌角、櫃子邊角等，貼上保護墊。或是減少擺設有堅硬邊角的家具，避免孩子撞到受傷。

重點三：插座要有防護蓋

剛開始學爬的孩子，對於各種物品都想摸摸看。在孩子的爬行高度中，最常碰到的就是插座了！一定要把家中的插座都裝上防護蓋，避免孩子誤碰觸電。

重點四：地板要隨時打掃

爸媽們每天都應該要維持打掃的好習慣，而孩子在爬行的過程中。爸媽們要時時刻刻盯著，並且留意地板上是否有鈕釦、小珠子、衛生紙屑。或是玩具的小零件，以免寶寶看到這些東西。就往嘴巴塞，或是塞住鼻孔、耳朵等。

重點五：家中樓梯要加裝安全柵欄

除了怕誤觸插座、誤食小零件，孩子學爬最怕的還有樓梯。一旦孩子爬上樓梯，一個不小心。都可能造成無法挽回的後果。家中若有樓梯，務必加裝安全柵欄，才能有效降低孩子在樓梯間玩耍受傷的風險。

爸媽們要了解，每位孩子都有自己的發展進程。通常寶寶的頸部肌肉發育較為成熟，上半身也比較有力量時。才能開始學爬。如果太過強迫，寶寶可能會因為挫折感太重，而失去對爬的興趣。

爸媽們平常可以在寶寶吃飽、睡飽的情況下，透過小遊戲。像是過山洞，或是玩具來吸引寶寶。都有助於寶寶爬得更順利，爬得更有自信心！

來源：身分轉變中-爸爸可以這麼做

身分轉變中-爸爸可以這麼做

媽媽在二百八十天的孕產過程中，身心會有很大的改變。多數爸爸一開始可能無法體會伴侶懷孕的辛苦，但爸爸若能在孕產過程中全心全意的投入。對每一個細節都產生好奇並積極參與，不僅對媽媽來說意義重大。也是孩子出生後幸福感的重要地基！

為加速掌握父親的角色，請把下列七項要點記下來，讓您與伴侶快樂期待寶寶的來臨！

一 一起參與產檢

政府提供公費產檢共有十四次，並有其他自費產檢項目，鼓勵爸爸可善用陪產檢假陪同媽媽產檢，諮詢醫師、助產師後共同決定所需的產檢自費項目。透過產檢更清楚了解不同階段的胎兒成長及母體變化，一同經歷孕育寶貝的神奇與奧妙，也讓另一半感受到您的貼心呵護。

二 瞭解懷孕及生產的資訊

現代資訊流通發達，透過像是書籍、雜誌、網站，都能獲得豐富且多元的知識資訊。

三 注意孕期營養均衡

懷孕後因為荷爾蒙的影響，飲食習慣可能不同於以往。有些媽媽因為孕吐而胃口不佳，有些媽媽則是胃口比懷孕前更好。當食物攝取太少或過多時，都可能導致營養不均衡。爸爸可以多關心另一半的營養狀況，準備合宜的食物，若需補充營養品、保健食品，建議諮詢專業醫師、藥師、營養師。

四 改善不良生活習慣

菸品對孕婦及胎兒會造成危害，二手菸、三手菸也是，如果您有抽菸習慣，請為了自己和親愛的家人努力戒菸吧！讓自己更健康，也能讓另一半在無菸環境下安心孕育寶寶。另外，爸爸也應陪伴另一半同步養成健康的飲食習慣。例如不吃高熱量食物、少吃油炸、勾芡、加工食品，或是宵夜、含糖飲料等。多選擇天然、當季、原型的食物，一起迎接健康新生活。

五 參加爸媽教室

許多產檢院所都會舉辦爸媽教室，邀請專業醫護人員、專家教授各種孕產、育兒知識。包括懷孕生產知識、生產減痛課程、哺餵母乳、新生兒照顧，請安排時間和伴侶一起去上課學習陪伴照顧的技巧。共同參與孕產過程。

六 準備孕產、育兒用品

懷孕期間要準備孕期、產後、育兒等相關用品，爸爸在此過程中也能認識這些產品的用途，同時學習相關育兒技巧，為將來的育兒做準備。

七 討論生產、哺乳及育兒計畫

面對新成員誕生後的生活變化，建議懷孕中後期的夫妻。雙方需要討論生產、哺乳及育兒計畫，例如生產方式、陪

產、如何坐月子、哺乳方式、是否要留職停薪或請育嬰假、孩子日後如何照顧及家務勞動分擔等等。這些都必須提前安排，彼此有共識。事先做好溝通及準備

來源：身心障礙父母的育兒資源與支持

身心障礙父母的育兒資源與支持

由於身心障礙者經常被視為是被照顧者、需依賴著他人或無法執照顧任務的角色，而被鼓成為父母，這種抱持身心障礙者適合為人父母的預設，是對身心障礙者的錯誤認知。低估身心障礙者作為父母的照顧能，或者忽現實生活中身心障礙者也能是照顧者、也能成為父母。由於身心障礙者的生限制或缺乏相關支持服務與資訊，身心障礙父母需要耗用多體、心或資源才能符合高期待的親職角色；社會大眾應尊重身心障礙者的意願和生育主導權。但應該期待或要求身心障礙父母獨滿足子的所有需求，在醫療或是教育等方面。提供社會資源來協助身心障礙父母順利度過育兒之路。

為提升婦女在懷孕與生產歷程中的適應與準備，國民健康署針對孕期重要健康議題。提供全國懷孕婦女含身心障礙者兩次的產前衛教評估與指導，給予完整的衛教服務與支持。協助婦女維持孕產期健康，了解孕期及哺育嬰幼兒可能會有的問題。做好準備，提升婦女於產前檢查的使用率。

身心障礙者在擔任父母角色時，可能會面臨許多照顧上的問題。因為每個人身體功能障礙不同、使用的輔具不同等，所面臨到的照顧問題便十分多元複雜。為提供身心障礙父母育兒時所需相關育兒輔具資訊，衛生福利部社會及家庭署多功能輔具資源整合推廣中心於「輔具資源入口網」輔具小博士專區，設置「育兒小博士」及「小博士愛輔具」主題介紹，提供輔具知識與新知。另外，也可透過向地方輔具中心專業人員諮詢。確認自己的需求與狀況，瞭解現有市面上的輔具產品。並搭配使用市面上多元的育兒相關產品，讓身心障礙者在面對照顧問題時。能使用最適切的產品、輔具與服務，提供孩童完善的照顧。

輔具資源入口網「育兒小博士」主題介紹

身心障礙者育兒輔具產品八大照顧分類介紹進食活動、清洗活動、穿著活動、如廁活動、睡眠活動、行動、育樂、環境安全。

來源：迎接寶寶的準備

迎接寶寶的準備

一、嬰兒用品準備

一準備之物品與數量應視季節和家庭狀況而定。

二選擇嬰兒立即需要物品，以後視嬰兒成長情形增添。

三 衣服易穿脫且耐洗，質料以棉質吸汗者為佳。

四 在尚未知道新生兒篩檢結果之前，請不要讓嬰兒衣物或用品接觸樟腦丸俗稱臭丸：樟腦丸或其氣味，以避免急性溶血性貧血之可能發生。

五 嬰幼兒乘車時，需使用平躺式汽車安全座椅，且置於後座面向後方。

二、孕婦住院用品待產包，亦可參考各醫療院所清單備妥

家長應讓每位嬰兒自出生之後固定由一位醫師提供整體兒童健康之照顧，不要經常換醫師。

來源：迎接誕生篇 不同產程注意事項

迎接誕生篇不同產程注意事項

不同產程注意事項

分娩的三個產程

第一產程：

又分為潛伏期和活動期。活動期特徵為胎頭下降速度加快，子宮頸變薄速度加快

潛伏期

住院後會進行下列的評估：包括子宮收縮開始的時間、收縮的頻率、持續時間和強度，落紅、羊膜破裂、胎動；陰道內診瞭解子宮頸變薄、擴張；確認孕婦的生產計畫和選擇。同時，護產人員會依各醫療院所規定評估胎兒心搏速率。如果產婦是因破水入院，也要觀察羊水性狀並預防破水過久增加感染的風險。

活動期

主要特徵是子宮收縮變強、變密及持續時間變長。在此階段也會經由陰道內診瞭解子宮頸變薄及擴張程度。

第二產程

是指子宮頸完全擴張到胎兒娩出

第二產程可能持續數分鐘到數小時或更長的時間。胎兒產出除了靠子宮收縮外，另外就是要靠孕婦的用力。假使產程延長，可經由醫護人員的教導與鼓勵，使產婦能正確有效的用力。若胎兒仍無法娩出，醫師可能會使用真空吸引或產鉗來幫助生產。

第三產程

是指胎兒娩出到胎盤娩出

第三產程是指胎兒娩出到胎盤娩出。在此階段主要是協助胎盤娩出及產道的檢查與修復縫合。並觀察預防產後出血。

來源：迎接誕生篇 新生兒哺育計畫

迎接誕生篇 新生兒哺育計畫

新生兒哺育計畫

在出生的頭六個月，嬰兒完全依賴一種食物。母乳含有多種好處，可以降低腹瀉及肺炎的感染率，減少過敏發生及嚴重度。哺育母乳可使媽媽的子宮早日恢復至正常大小，也可更快地恢復到孕前體重、減少乳癌、卵巢癌的發生率等，並促進和寶寶間親密關係。

母乳哺育 &

一 準媽媽要何時準備母乳哺育哺育要多久

準媽媽從懷孕開始就可以有哺餵母乳的心理準備，一旦感覺到胎動之後，就可開始進行乳房及乳頭的護理工作。世界衛生組織建議寶寶生下的頭六月可以純餵母乳，不必餵食水和其他任何食物，六個月後開始添加適當的副食品，並持續哺乳到兩歲或兩歲以上。如果母親因為醫療或者是其他原因無法完全哺乳時，在嬰兒一歲前應該使用嬰兒配方奶，請諮詢兒科醫師，並注意安全衛生及正確的沖泡使用方式。

二 媽媽產後及早和寶寶皮膚接觸有什麼好處？

產後儘快讓母子有皮膚直接接觸，讓寶寶感受媽媽的溫暖並嘗試尋找媽媽的乳頭。一方面享受親情，一方面刺激泌乳激素，讓奶水及早開始分泌。

三 媽媽產後住院期間和寶寶同室有什麼好處？

讓寶寶與媽媽親子同室，便於隨時應寶寶需求哺餵。同時也減少待在嬰兒室發生集體院內感染的風險，提供媽媽與醫護人員共同觀察寶寶的機會。以及早發現寶寶的問題。

四 如何促進奶水分泌

分娩後儘早哺餵母乳。

新生兒出生後即刻吸吮母乳，並經常的餵奶，不另添加牛奶，不以奶瓶、奶嘴及安撫奶嘴干擾寶寶的學習。

勤於餵奶－寶寶餓了就可餵奶，餵得愈多，奶量會愈多。

除餵母乳外，避免給寶寶配方奶及其他飲料與奶嘴。

當寶寶不在身邊時，可用手或擠奶器將乳汁擠出，並將乳汁冰存起來留給寶寶吃。

正確的吸吮方式及餵奶姿勢。

肚子餓就吃，口渴就喝。

充足的睡眠及愉快的心情。

五我如何正確哺餵母乳？

餵食前應先洗淨雙手。

舒適姿勢：可採取不同姿勢。

母親與寶寶必須緊密相貼：抱寶寶的姿勢，無論嬰兒抱在哪一邊。嬰兒的腹部與母親腹部應相貼，頭與雙肩朝向乳房。上嘴唇對著乳頭，嬰兒頭部不被扭轉或彎曲。頭與身體呈一直線。

寶寶已正確含住乳房：寶寶口中含入乳暈及下面組織兩大部分，嘴張得很大。下嘴唇外翻，下巴有接觸到乳房。慢而深地吸吮，可以看見寶寶有吞嚥的動作。

哺乳時媽媽手的正確姿勢：以型握法，大拇指在上，其他手指在下支撐乳房，不要碰到乳暈。

母乳哺育或嬰兒餵養相關資訊：母乳哺育手冊、母乳哺育衛教影片、母嬰親善院所、如何沖調嬰兒配方奶

倘若你有哺餵母乳困擾時，可撥打免費諮詢專線：八百到八百七十-八百七十尋求協助。

來源：迎接誕生篇 生產陣痛

迎接誕生篇 生產陣痛

產前教育-幫助準備與因應生產陣痛

懷孕、生產是一個正常的生理過程，子宮收縮引發陣痛或腰痠的感覺。陣痛使子宮頸變軟及擴張，因此。生產的陣痛是一種生理的正常變化。疼痛可能帶來不舒服，事實上。陣痛是經陰道生產的必要表徵，但是可以透過各種方法來減輕。不必過度畏懼。在心理上改變想法可以增加自己的信心，放開身體。肌肉才會比較放鬆，或者藉由減痛分娩改善生產疼痛。順利生產。

因為子宮頸正常情況下是要慢慢張開，產程的長短受到胎次、生產間隔、心理狀態、胎兒的胎方位與姿勢、準媽媽

的骨盆形狀與大小及子宮收縮等因素影響。因此，待產的過程需要一段時間，一般第一胎約需要十二到十八小時，第二胎約需要八到十小時。由於近年來準媽媽的營養狀態好，運動機會少。而且胎兒常常比較大，所以產程可能會出現比預期延長的情況。準父母要更加有耐性。

準父母最好在生產前幾個月就開始接受產前教育，瞭解生產的變化過程，自然舒緩疼痛的方式和各種鎮痛藥劑。

緩和生產不適感的基本知識與方法

一維持自己在最佳身心狀態：注意營養、保持良好的體能、維持愉快情緒。

二產前做充分準備：充分瞭解待產和生產的過程、備好自己喜歡的音樂、做出自己可以放心的正確決定、溝通與選擇能符合自己生產期望的陪伴者。

三生產時的因應：相信自己並接受正常生產就是需要一段時間、放鬆身體，盡量讓生產陣痛自然的開始、待產過程中自由活動或選擇舒服的姿勢、有持續性的支持與陪伴者。

來源：迎接誕生篇 產後健康管理

迎接誕生篇 產後健康管理

產後健康管理

生產之後，有哪些照護事項是媽媽要特別注意的呢

一陰道生產什麼時候可以下床、可以出院

答：正常分娩後，如無不適即可下床用餐和排尿（第一次下床需家人陪伴），但仍以休息為佳，若順利約三天左右即可出院。

二生產之後，怎麼保持會陰部的清潔

答：產後應該用衛生棉遮護會陰部以吸收產後排出物，並隨時更換。並且在每次排便後。用溫開水或消毒水由前往後沖洗會陰部。

三要如何保持全身清潔

答：滿月前宜採淋浴，不可使用盆浴，以防細菌進入子宮引起發炎。洗髮後迅速吹乾即可。

四生產後怎麼吃

答：應均衡攝取各類食物。產後常口渴，可多飲開水、牛奶及熱粥等易消化食物。

五 生產後，什麼時候可以開始有性生活

答：無產後排出物期間並傷口大致恢復後再行性生活較好。通常約在產後滿月以後，否則易感染或不適。

六 生產後為什麼要運動

答：產後選擇合適運動可增如腹肌收縮，促進子宮收縮，保持身材。

來源：這麼做，陪伴侶舒緩孕期不適

這麼做，陪伴侶舒緩孕期不適

一、時常孕吐反胃，沒有胃口

一 隨時準備好方便嘔吐的塑膠袋、垃圾桶。

二 吐完後為伴侶送上溫開水漱口，消除口腔餘味、避免食道灼傷。

三 蘇打餅乾、乾吐司或穀類食品，有助減少反胃不適。

四 此階段口腔保健很重要，建議可準備兒童牙刷，避免嘴巴張大引發嘔吐。

二、生活、身體變化大，心情好鬱卒

一 多陪伴侶聊天，搜集有趣的事物分享。

二 避免看太悲傷的書籍或電視、電影。

三 多一些體貼舉動和多說一些甜蜜話語。

四 情緒時常起伏過大時，產檢時請教醫護人員意見。

三、腰痠又背痛，好想趕快卸貨

一 可使用托腹帶、月亮枕。

二 避免伴侶久站、久坐、提重物。

三 每天可幫伴侶按摩、熱敷。

四、懷孕中後期，雙腳水腫了

一 準備舒適、寬鬆、平底、防滑的鞋子。

二 晚上準備溫水讓伴侶泡腳、幫忙按摩雙腳。

三 伴侶平躺時用枕頭墊高腿部促進循環。

四 留意飲食內容，減少鹽份攝取。

五、排便不順，讓人好煩躁

一 準備高纖維的蔬果。

二 每日補充足夠水分，體重公斤三十毫升日或是二千毫升日。

三 陪伴侶適度的運動，例如飯後散步、瑜珈、簡易伸展操。

四 嚴重時，可請教醫護人員意見。

六、夜間淺眠，翻來覆去睡不好

一 睡前不要吃宵夜或甜食，避免會增加胎動影響媽媽睡眠。

二 布置一個舒適的睡眠環境，包含溫度與光線。

三 嚴重時，可請教醫護人員意見。

七、頻尿跑廁所，好討厭啊

一 有些媽媽會因頻尿減少喝水，還是要提醒伴侶，白天方便如廁時，適量補充水分。

二 開車或長途交通時，請注意伴侶如廁的需求。

三 需注意半夜如廁動線是否安全，例如準備小夜燈。

來源：連假出遊天！親子外出旅遊注意事項

連假出遊天！親子外出旅遊注意事項

親子同遊的好處

親子同遊好處多！透過在旅行中實地參觀的機會，幫助孩子獲得日常中無法觸及的能力。並藉由旅行中的戶外活動，提高體力和協調能力。促進身心健康。

尤其，旅行中各種新的景象、聲音、氣味、觸感、味道，能刺激孩子感官，提升孩子的五感能力。例如：品嚐在地小吃，可增進嗅覺和味覺；接觸自然山海景觀，可增廣視覺和聽覺。

另一方面，旅行中會遇見許多初次見面的人。可讓孩子接觸更多元的人群，觀察每人的個別差異性。增加與人溝通的能力，從而擁有開放的眼光和態度。

以及最重要的，親子出遊可創造一家人的回憶！也許童年記憶會淡忘，但一張照片、一句話。都會讓孩子瞬間想起，將美好感受轉為長期記憶。伴隨小孩的成长。

帶孩子外出遊玩事前準備事項

親子同遊挑戰多！許多爸媽笑稱，帶孩子出遊一次就後悔，為何花錢找罪受？提醒父母，帶孩子外出遊玩可準備以下事項，讓遊興不減，也更安全不慌亂。

一 安全座椅不可少

根據交通部法規規定，二歲以下兒童不論體重多少。乘車都須乘坐「後向式安全座椅」，二到四歲、體重十八公斤以下兒童上車。也應優先選用後向式汽車安全座椅；且四歲以下都要坐汽車後座，同時繫上汽車安全座椅的安全帶予以固定。

此外，零至三個月寶寶不管乘坐汽車或大眾交通工具。最好準備提籃式安全座椅、臥座，裡頭有安全帶可扣住寶寶。頭部位置會有一個頭墊，將寶寶頭部固定。

雖然三個月後寶寶脖子發展較好，便可改成立座。但若是早產兒寶寶，因脖子和腦部較為脆弱。一歲內都應繼續使用躺式汽車安全座椅，以保護寶寶安全。

二 外出保溫寶寶頭部、多層次穿搭

一歲前寶寶體溫調控較差、易失溫，要注意保溫。而最大的失溫點在頭部，因此冬天時可幫寶寶戴帽子或圍巾。或使用揸巾時將頭遮住。

另一方面，寶寶穿衣原則儘量多層次、洋蔥式穿搭。由內而外依序可為紗衣、內衣，再加上一、兩件衣服。最外層則以較保暖的毛衣或外套為主，以因應寶寶的需求。方便更換穿脫。

爸媽帶寶寶出遠門時，多帶幾件衣服、包屁衣。尿布，當寶寶突然爆汗或溢出大便。備用衣物便能派上用場。

三 準備急救品和體溫計

外出最怕孩子受傷，爸媽可攜帶一些備用急救品，包括：紗布、生理食鹽水和抗生素藥膏。

如果孩子受傷了，爸媽可第一時間進行傷口護理。用生理食鹽水將傷口清潔乾淨，再用紗布沾生理食鹽水去輕拭傷口。把卡在裡面的砂石擦掉，以降低傷口後續感染的風險。

傷口清洗完畢後，可塗褐黴素、欣黴素等抗生素藥膏，初步護理之後再就醫，能預防傷口感染。

叮嚀爸媽，可隨身攜帶體溫計或耳溫槍。帶三個月內寶寶出門，可自備最接近體溫的電子肛溫計。量測時先使用耳溫槍，當體溫高於三十八。再使用肛溫計較為準確。

外出餵食寶寶的注意事項

對於還在哺餵母乳的寶寶，親餵媽媽可利用本網站：「[孕產婦關懷網站](#)」內的哺集乳室地圖（[圖](#)），就能以地圖搜尋附近的公共場所哺集乳室，方便隨時哺乳。

此外，如有瓶餵需求，想保存冷凍或冷藏母乳，可使用小型保溫器加上冰寶（保冷劑）。以九小時車程為例，可帶一瓶充分解凍好的母奶，以及一到二個未解凍的母乳袋。作法如下：

一出發後一小時內，寶寶餓了，可立即用熱水加熱那瓶已解凍的母奶餵食寶寶。同時拿出一個母乳袋出來解凍。

二待三、四小時後，此時寶寶肚子餓，之前拿出解凍的母乳袋已解凍，再加熱餵食即可。同時也拿出另一個母乳袋出來解凍，提供寶寶下一餐飲用。

寶寶副食品冰磚的保存，也可利用冰寶保冰。建議爸媽可準備水煮蛋、香蕉、地瓜備用，這些食物方便、天然且不易變質。只要放進容器裡，再用湯匙攪拌。便可當作一餐。

相信滿足寶寶的生理需求，就能降低哭鬧狀況，讓親子同遊達到親子同樂！

來源：運動後是否要避免即刻哺乳？

運動後是否要避免即刻哺乳？

適當運動對哺乳媽媽是安全及有利的，大部分哺乳媽媽運動前後的乳汁成分並無太大差別。輕度或中度的運動並不會導致乳酸在母乳中增加，寶寶對母乳的接受度在運動前後也無明顯差異。並不會影響寶寶的生長發育情形。

高強度的肌力、重力運動引起乳酸堆積，則有可能會改變母乳的味道。在適度體力活動期間和之後，補充大量水分。也可考慮在給寶寶餵奶或擠奶後才運動，這樣也可以幫助您在運動時保持舒適。只要在運動休息後再哺乳，母乳中乳酸含量就與運動前無差異。

來源：過多、過少都不行！孕期羊水多寡對母嬰的影響

過多、過少都不行！孕期羊水多寡對母嬰的影響

造成羊水量異常，可能和孕婦、胎兒有關聯。最重要是配合產檢，檢查胎兒是否有先天異常。孕婦是否有妊娠毒血症或糖尿病等併發症，找出原因才能做適當處理。孕媽咪不須過度驚慌，多了解羊水的相關問題，並在醫師專業的協助下，就能順利度過懷孕生產過程。

羊水有哪些功用？

羊水是在懷孕過程中，於羊膜腔內、環繞胎兒的液體。孕婦懷孕十六週後，羊水明顯增加，直到接近懷孕三十六週，羊水量可達一千左右。而在懷孕三十六週以後，羊水會開始減少，直到生產。

羊水的主要功用包括：

一 提供緩衝空間以保護胎兒：

孕婦肚子受到碰撞時，羊水能發揮緩衝、保護作用。

二 足夠空間避免發育受阻：

胎兒四肢及軀幹要有充分空間伸展，足夠的羊水能讓胎兒在子宮內的動作不受影響。

三 懷孕早期提供營養，幫助胎兒成長：

羊水中含有促進胎兒組織成長的成份，胎兒吸入後，能幫助肺部、腸胃等器官發育。此外，羊水也具有維持子宮內恆溫的作用。

四 胎兒生存的必要條件之一：

羊水提供胎兒呼吸道、消化道循環，同時也是胎兒尿液排泄的場所，是胎兒生長過程中的必備生存條件。

五 幫助順利生產：

羊水對產道有潤滑作用，可促進順利的分娩與生產。

評斷羊水量是否正常的方法

懷孕早期羊水是由胎盤及胎膜分泌出來，之後再加上胎兒呼吸道、消化道的分泌液，以及腎臟製造的尿液所組成。胎兒會藉由呼吸、吞嚥，以及胎盤血流來代謝處理羊水，如果生成或排泄的速度有異常，就可能出現羊水失衡的狀況。

羊水量的檢測可使用超音波，一般是以孕婦的肚臍為中心。將子宮分為右上、右下、左上、左下四個象限，分別測出每個象限當中。羊水的最大深度，加總計算的值若介於八到二十公分的範圍內屬正常。假如小於五公分，算是羊水過少。而大於二十五公分，則代表羊水過多。

羊水過「多」的原因及影響，又該如何處理？

了解羊水的作用及重要性後，產檢中若醫生發現孕媽咪的羊水量異常時。會做出評估，採取適當的措施。將影響降到最低。

羊水過多的原因可能是胎兒或是孕婦的問題：

胎兒的問題

常見可能原因如：胎兒消化道阻塞，沒辦法將羊水吞下進行再吸收；或是胎兒中樞神經系統異常造成無法吞嚥，而使羊水過多。

孕婦的問題

若檢查胎兒無異常，就要懷疑孕婦有妊娠糖尿病問題。血糖高可能導致胎兒多尿現象，排尿多就容易使羊水過多。

羊水過多如果不處理，會因為子宮太大而增加早產風險。處理羊水過多，可施行羊水抽取術，抽掉多餘的羊水；或評估使用藥物，減少胎兒的尿量。

羊水過「少」的原因及影響，又該如何處理？

羊水太少同樣不能輕忽，太少可能是：

一 破水：因外力使羊膜腔受撞擊或是發炎，進而破洞造成羊水流失。

二 胎兒腎臟沒有發育。

三 胎兒泌尿道系統阻塞。

四 胎盤功能變差。

五 孕婦有高血壓、腎臟病也會使羊水變少。

六 孕婦服用某些藥物。

七 孕婦水分攝取不足。

至於羊水太少的影響包括：

胎兒生長空間受限：羊水過少導致胎兒生長空間受限，體重無法增加，手腳伸展受到影響。

阻礙肺部發育。

可能增加胎兒畸形風險。

胎盤功能不足的胎兒窘迫。

嚴重恐造成胎死腹中。

當羊水過少時，會先針對胎兒或孕婦問題加以治療。其次醫護人員可能也會建議孕婦多臥床休息、補充水分，多喝水可促進孕婦血液循環、增加胎盤的血流。進而提升羊

水量。

另外，如果胎兒尚未足月。又有嚴重的羊水不足，可能會考慮使用溫的生理食鹽水灌注入羊膜腔的方式。來增加羊水量，但須防範感染。且灌入後也要同時監測胎心音及子宮收縮狀況。

對於胎兒已足月才發現有羊水過少的情形，或者羊水太少又合併有胎兒生長遲滯時，條件允許下，生產會是較適合的選擇。

來源：遲遲沒有產兆，孕媽咪會經歷的催生過程有哪些？

遲遲沒有產兆，孕媽咪會經歷的催生過程有哪些？

我快要生了嗎？當進入懷孕後期，採取自然生產的孕媽咪。不免會煩惱寶寶何時會出生，擔心生產當下手忙腳亂。不知所措。孕媽咪在確認懷孕時，產檢醫師會根據最後一次的月經週期，及胎兒的生長狀況來推算預產期，好讓孕媽咪了解寶寶大約何時會來報到。而胎兒足月之後，則會衛教孕媽咪透過產兆來判斷自己是否即將生產。

什麼是催生？哪些人需要催生？

催生，指的是已經足月的孕媽咪。本身出現宮縮、子宮頸擴張，或是已經進入產程。但因強度不夠，無法讓產程順利進行。因此使用藥物來強化子宮收縮，促使產程的進展。

過了預產期，都沒出現產兆。孕媽咪會被要求入院催生，由於胎兒足月後。胎盤功能會下降，時間拖得越長。胎盤將會逐漸老化及鈣化，羊水量也會減少。胎兒會面臨到血氧不足的問題，如又有胎便的產生。也會增加胎兒吸入引發肺炎的風險。

除了上述所提到的過期妊娠，以下情況的孕婦也可能需要經歷催生的過程：

一已經破水，產程卻沒有進展的孕媽咪，可能藉由催生來降低母嬰的感染風險；

二母體本身患有疾病，為避免病況惡化，可能建議在足月無產兆時進行催生；

三胎兒存在某些問題，無法準確評估其狀況，也可能會建議提早催生。

藥物催生對胎兒安全嗎？

目前使用的催生藥物有促進子宮頸軟化的前列腺素，以及強化子宮規律收縮的催產素，醫師會根據不同孕婦的狀況，給予前列腺素塞劑或是施打催生針。這兩種藥物都是人體會自然合成的激素，對於胎兒不會有負面影響。

其實不只是催生會用到，在正常的自然產中。催產素也常被使用於加強子宮收縮，幫助產程。以及防止產後大出血，因此是相當安全的。

催生如何進行？

當被通知需要催生時，孕媽咪只要在約定好的時間入院報到。護理人員會先進行胎心音、宮縮檢測，及內診檢查。確認子宮頸的變化，如須施打減痛分娩的孕婦。可於催生藥物使用前施打，經醫師評估後再注射催生藥物或是使用催生塞劑。如產程進展較緩慢，必要時會進行人工破水。加速產程，最後在子宮頸全開時。將胎兒順利娩出。

催生會讓產程變得更長、更痛嗎？

不少孕媽咪會害怕，催生是不是會讓產程變得比較慢。過程中也會比較痛，其實催生只是使用藥物來誘發產程。產程開始後，所有的過程都與自然進入產程一樣。也不會有催生後遺症。只是每位孕婦對於催生藥物的反應不同，產程時間及感受到的痛感因人而異。除非發生緊急狀況，像是產程遲滯、胎心音下降等。才有可能轉為剖腹產。

能以自然產痛、自然生產的方式迎接寶寶的誕生，是每位孕媽咪所希望的事。不過當無法掌握的情況發生時，在醫師的妥善安排下催生。會是更安全的做法，而且催生能讓孕婦在一切都做好準備的情況下。享受迎接新生兒的喜悅，孕媽咪不必過度恐懼。好好遵循醫師的建議即可！

來源：邁向獨立的過程！3歲前寶寶生活自我照顧能力分齡養成法

邁向獨立的過程！三歲前寶寶生活自我照顧能力分齡養成法

育兒三年，終於等到「媽媽，我自己來！」這句話！自己吃飯、穿衣、刷牙、上廁所，看起來是最平常不過的小事。但對零到三歲的幼童來說，卻是建立生活自我照顧能力的開始。這些簡單小事是為獨立生活打下基礎。

零到三歲階段是孩子模仿力、手部動作和自我意識快速發展的黃金時期，如果能儘量讓孩子習慣「自己做」。不僅能建立他們的自信，也能讓育兒路少一點拉扯。彼此都能感受成長的喜悅。

依年齡分階段養成生活自我照顧關鍵能力

零到一歲：從依賴中開始「嘗試參與」

這階段的寶寶可以從小的生活細節裡啟動自我照顧的基礎練習，例如：手捏副食品、握湯匙、抓食物。這些都是在訓練寶寶的手眼協調，雖然這階段會吃得滿桌、滿地。但請耐心撐過此「髒亂」的階段，寶寶會越做越好的。可從

兩方面去訓練他：

一 觸感：

這階段可提供多種不同材質、多樣化的物品讓他抓握、適應，增加他的感官刺激。

二 參與：

寶寶也喜歡有參與感，例如：讓他自己握奶瓶喝奶、大一點時幫忙拿尿片、或是洗澡時讓他自己用小方巾擦臉，讓寶寶有參與感，也是啟發他成就感的重要一環。

小叮嚀：

此階段不用要求寶寶做得好，而是讓他知道「這些事原來是可以自己動手的」。

一到二歲：從模仿到嘗試，孩子想自己來！

孩子是用眼睛去探索這個世界的，對身邊的大人也會特別感興趣，此時可以加長讓他參與的時間，增加生活流程。所以，一到二歲的幼兒可以逐漸增加步驟。例如：洗臉、擰毛巾掛好、拿襪子穿襪子穿鞋子等，是循序漸進的進步。然後也可以給予正面的鼓勵，例如：你好棒！會自己穿鞋子了！

小叮嚀：

這個階段的爸媽最容易犯一個錯誤，就是覺得「我來比較快」，但這樣的結果就是讓孩子失去學習機會，切記！只要孩子「肯做」、「願意做」、「有信心做」是最重要的。

二到三歲：自我意識強烈，開始建立生活習慣

這階段的孩子會發展出「我什麼都要自己做」、「我自己來」、「我不要」的這些情緒，爸媽可以讓孩子練習的項目也更多了，像是刷牙、如廁、穿脫衣物、整理玩具等，都可以讓孩子自己做。

也可以加上時間觀念，將這些事情和生活串聯起來，幫助孩子作息更正常。例如：吃晚飯刷牙收玩具換睡衣上廁所睡覺，像這樣習慣固定的儀式，將來就能更自律的管理自己。

善用遊戲與生活互動，自我照顧變好玩

對學齡前的孩子來說，玩是最自然的學習方式，生活自我照顧能力也能透過遊戲來建立，家長可以參考以下幾項遊戲：

一 角色扮演遊戲：

拿玩偶（如小熊）來「洗臉」、「刷牙」、「洗澡」，讓孩子練習

照顧「小熊」，間接學會照顧自己。

二 洗澡時間小任務：

給孩子一塊小毛巾，讓他練習擦洗自己的肚子、腳丫，洗完後自己擦乾身體，再慢慢教他穿衣服。

三 音樂律動搭配生活流程：

像是「洗手歌」、「穿鞋子歌」等，可以幫助孩子記住步驟並提高樂趣。

四 生活貼紙表：

每天完成一項如「自己刷牙」、「穿好鞋子」就給他貼一張星星，集滿就能換個小獎勵，孩子會很有動力。

透過這些日常互動，孩子會覺得生活技能不是「爸媽強迫」的任務，而是充滿成就感的遊戲挑戰。

爸媽該如何放手，又不放任？

任何生活技能的養成都沒有標準的時間表，總有一天他能獨立。孩子若真的學得較慢，父母也不用自責或責備。要有信心孩子只是還沒學會，並不是永遠都學不會。

一 孩子學習進度落後，只要再等等，不是誰有錯！

每個孩子的發展步調不同，有的孩子二歲就能自己如廁。有的則到三歲半才願意嘗試，家長不需要與其他孩子比較。而是觀察孩子的準備度，像是是否能夠聽懂簡單指令？是否願意模仿？與其急著「他會不會」，不如關注「他現在願不願意嘗試」，並在他願意時給予支持與鼓勵。

二 孩子做不好，我該出手幫忙嗎？

生活自我照顧能力的培養並非一路順利，在孩子願意「自己來」時，父母最大的任務就是「忍耐」。他衣服穿反了、飯吃得掉滿地，不代表他學不會，而是他正在練習中。

可以先讓孩子自己嘗試，再提供小小提示，像是：「襪子穿得不太舒服吧？我們來看看是不是反了？」這種合作式的方式比直接接手更能建立孩子的信心。

從依賴到獨立，是一條陪伴的路

生活自我照顧能力的建立，是孩子學會獨立、自信與責任感的開始。從一開始弄髒衣服、刷不乾淨牙齒，到後來他自豪地說出「我會自己來」。每一個小進步都將被看見，家長們不需要要求完美。只要每天多給孩子一些機會、多一點耐心，孩子終將會用自己的節奏。學會照顧自己，並一步步長成能照顧別人的大人。

來源：閱讀的重要性

閱讀的重要性

閱讀的重要性

「從孩子出生後，即可開始唸故事書給寶寶聽」已成為許多國家兒科醫療與教育界給家長的建議。因為儘早唸故事書給寶寶聽的互動方式，可以提供孩子穩定的成長環境。促進親子關係，不僅可以刺激認知及語言發展。還可以幫助孩子未來的情緒控制及社會適應等重要的能力，對嬰幼兒腦部的發育非常重要。嬰幼兒期的親子共讀，並不著重在認知學習。而是透過唸故事書，培養親子互動的感情。希望家長能夠從嬰兒期即開始建立親子共讀的習慣。

配合兒童年齡發展，您可以

～

零到三個月大時，父母可以將寶寶抱在懷裡。或躺在嬰兒床上，用溫柔輕鬆的聲音唸故事。並經常撫摸寶寶，讓寶寶熟悉父母溫柔的聲音。建立良好的親子關係。

三到六個月大的幼兒，對鮮艷顏色的圖案特別感興趣。父母可以將孩子抱在懷裡，使用柔軟的布書或可以發出聲音的童書。用溫柔的聲音唸出書本上的圖畫內容。

六個月到一歲大的幼兒，會開始想要模仿他人的說話及聲音。此時，父母可以抱著孩子。指著圖案說出物品或動物的名稱。這時期的幼兒可能會出現丟書、吃咬書或用手拍打有趣圖片的動作，這些都是他們用來認識書本的正常行為。

十二個月大以後的孩童，父母可以就孩子發展的情形。鼓勵孩子自己動手翻閱書本，從旁向孩子說出書本內容或圖片呈現的意涵。及試著用簡單的語彙與孩子溝通互動，漸進加深親子共讀的方式與時間。

一到二歲的孩童，建議父母多利用指圖命名的方式。即手指著圖片，並且同時說出圖片中的物品名稱或動作。然後鼓勵孩子跟著模仿大人說話仿說。

二歲以上的孩子，父母可以多利用「開放性問句」來跟孩子互動說故事，並鼓勵孩子開口回答問題。

三歲以上的孩子，父母可以再加入用手指文字帶著孩子閱讀。並且和孩子討論故事內容或大意，鼓勵孩子用自己的言語表達討論。父母也可以將故事內容與生活經驗結合，延伸討論話題。

來源：陪伴小小孩聊天~投報率最高的教育投資

陪伴小小孩聊天~投報率最高的教育投資

語言是人類特有的能力，一個新生兒如何從聽得懂到講

出單字，進而表達需求和意見，長期以來一直是人類學家和嬰幼兒發展學家感興趣的研究課題。研究已知胎兒時期就已發展出語言學習的能力，只要沒有受到造成發展異常的因素干擾，寶寶出生後浸潤在語言環境中，大部分自然就能發展出口語表達能力。然而從觀察孩子的語言發展歷程，會發現不同環境下孩子的發展程度有所不同，這就引起更多學者的關注，想瞭解是甚麼樣的後天因素影響孩子語言能力的發展。

一千九百九十五年美國人類發展學家以及心理學家長期追蹤兒童語言發展軌跡，發現零到三歲這三年間照顧者對寶寶講話的詞彙量。會影響到孩子三歲時能說的單詞數量，此相關影響從十八個月開始有差異。隨著年紀增長差異擴大，且影響持續到小學三、四年級時的學業表現。其他學者還指出，嬰幼兒期的詞彙量甚至會持續影響到國高中的學習能力請參考醫起育兒網-膝蓋上的五星級大學~~用共讀打破三千萬的差距。由此看來，小寶寶語言發展很重要的刺激因素是一需要身邊有一個多話的大人。

二千零九年加州大學團隊發表一篇研究論文，收集家有二到四十八個月寶寶的家庭中，照顧者和孩子間語言的互動。研究結果也看到，若大人很認真地常常和孩子講話，孩子會講的語詞會更多。此研究有個重要的發現是，若照顧者還同時引導孩子參與口語互動就是聊天啦，嬰幼兒階段的孩子不僅會的詞語量多，與未來學習力更有相關的表達能力和理解能力也跟著有顯著提高。所以，照顧者不僅要多話。還要和孩子有對話的互動，透過一來一往地問答和聊天。刺激孩子能動腦讓口語內容更豐富請參考如果相信這篇「睡前，講故事還是聊天。美國專家說四年後差異具大」損失就大了。

投報率最高的教育方式

多和嬰幼兒聊天就能促進發展，這種效果能夠持續多久呢加州大學的研究團隊在十年後再度召回當年參與研究的孩子們。這群已經九到十三歲的孩子接受智商測驗，三種語言發展測驗詞彙量、表達能力、理解能力。學者將這些測驗分數搭配孩子們小時候的語言分數，一起加以分析看看早期的語言經驗會如何影響學齡期的智能和語言能力。這是一個非常不容易進行的長期追蹤研究，研究團隊於二千零一十八年十月發表了續集報告，結果如下：

孩子出生後到十八個月前，以及二歲後所接觸到的語言刺激。與學齡期的智商分數和語言測驗沒有顯著相關，但是在十八到二十四個月這段期間。照顧者對孩子講話的詞彙量以及和孩子聊天的次數越多，孩子學齡期的智商分數和語言測驗分數越高。和二千零九年結論一樣，與孩子聊天次數越多的影響力比給予的詞彙量影響力要大。

一般社會學家關心家庭社經背景對孩子發展的影響力，這篇研究中也有分析。發現在十八到二十四個月這段期

間，如果家長能給予孩子豐富的語言經驗多和孩子講話、多和孩子聊天。那麼不論母親教育程度如何，都能夠讓孩子在學齡期的智商和語言測驗分數較好。不過若進一步分析，仍可看到母親的教育程度較高，對孩子發展的促進效果還是會比較大。

這個研究團隊十年的追蹤發現，孩子在十八到二十四個月期間。若家長能經常和孩子聊天，除了可提高孩子嬰幼兒時期的語言能力。還能影響孩子在九到十三歲時的智商分數和語言測驗分數。看來，小小孩家長平常帶孩子的時候，順便多跟孩子講話聊天，就可以為孩子打好十年後的學習力基礎。

那麼，家長如何和口語能力還不多的小小孩聊天很簡單。就是抱著孩子，打開一本童書。用學者們建議的”對話式共讀”方式，引導孩子參口語互動。其實就是聊天互動的方式。如此不僅為孩子提供較豐富的詞彙量，也能引起孩子有更多主動的口語互動，且和孩子講話，是每個家長在照顧孩子時都能進行的方式。哇喔，不用多花費很多金錢可以多利用圖書館圖書資源和時間反正原本就要花時間照顧孩子，就可以達到開發孩子腦部的好效果，哪一門投資的報酬率這麼高呢

來源：雙(多)胞胎早產預防

雙多胞胎早產預防

懷雙胞胎的孕婦，孕期併發症的風險較高，如：子癰前症、妊娠糖尿病；胎兒則可能增加早產的機率增加或有出生體重較輕的問題。由於人類子宮的空間有限，雙多胞胎讓子宮過度擁擠。可能造成提早子宮收縮而早產；又因必須多人分享空間和營養，讓雙多胞胎的寶寶體重都比相同懷孕週數的單胞胎輕。而通常出生體重愈低的早產兒面臨的問題愈多。

正常的單胞胎妊娠期平均約四十週；雙胞胎妊娠期則約三十六至三十七週，而且每多一胎妊娠期縮短約三週半。單胞胎早產的可能性只約十，雙胞胎則可能提高到五十，至於三胞胎或以上則高達近九十。雖然目前醫療院所新生兒科對早產兒的照顧能力大為提升，再加上安胎時期肺部成熟劑的使用。都使得早產兒的死亡率和併發症大大的減少；但早產兒對父母及所有照護者來說，都必須付出更大的心力。所以減少早產的發生率是重要的課題。孕婦本身應提高警覺，按時產檢。及早發現、及時治療，配合醫師的診治。以良好的產前及醫療照顧共同預防早產的發生。

懷孕期間亦可依妊娠情況選擇就近的「高危險妊娠孕產婦及新生兒照護品質中度級、重度級急救責任醫院」接受檢查及生產。

預防早產的生活注意事項：

一 戒除不良習慣，避免造成早產發生的行為：如吸菸、酗

酒、使用成癮藥物、檳榔等。

二 良好的營養、適當的增重、維持理想體重、保持心情愉悅。

三 避免過度用力的體能活動及過度勞累，

四 儘量臥床休息、避免陰道灌洗、減少性生活頻率、懷孕三十七週前避免乳房護理刺激乳頭，造成子宮收縮。

五 按時產檢，瞭解本身懷孕狀況及認識早產徵兆。

如有早產徵兆如：破水、陰道出血、腰酸或腹部悶痛，每小時宮縮超過六次以上並持續二小時，應立即就醫，並選擇設有新生兒加護病房的醫療院所待產或生產。

來源：雙胞胎兒童心理與社會人際發展

雙胞胎兒童心理與社會人際發展

心理學家社會心理發展廣泛適用於一般兒童發展，但是否各發展階段對雙多胞胎兒童分別可能帶來額外的挑戰。在小兒醫學網站分析如下，根據所提出心理社會發展理論。描述一般零至十二歲兒童在各發展階段必須學習的能力，以及各個不同的發展階段。雙多胞胎兒童因為兩個同時在一個共同環境，每一個階段有更多特殊挑戰。一千九百九十九。

階段一：基本的信任及不信任的學習

在一歲到兩歲左右，兒童通常會被妥善的照顧，並且得到足夠的愛，而逐漸發展出信任、安全感以及一個基本樂觀的態度。如果兒童未被妥善照顧，會缺乏安全感以及對人感到不信任。

雙胞胎兒童因為兩個人常在一起，所以安全感較大。也較能有信任感但是父母照顧忙碌、忽略他們、擁抱不多，或給予個別的注意力較少時。也容易讓嬰幼兒信任的發展出現遲緩的現象。也因為如此，這個階段的雙胞胎較容易停留在嬰幼兒彼此的互動，缺少與外界的探索。

階段二：自我成就感以及羞恥的學習

在兒童大約一歲半左右開始，到四歲之間，被妥善照顧的兒童會因為發現自己能夠有更多的控制能力而開始建立自信心，並且對此感到驕傲。這時候的兒童時常以「不要」來展現自己的控制能力。

雙胞胎彼此有伴，可以一起探索外界、一起學習、一起搗蛋、相互把風遮掩但是因為年齡相同，也常會被父母比較或責備，讓他們自我成就感與羞恥感的學習變得比較複雜。尤其龍鳳胎因為有男女性別不同的狀況，導致外界對他們若有性別刻板印象的期待。言語或動作上可能出現不同處理方式，例如責備文靜的男孩是「娘娘腔」。取笑

活潑的女孩是「男人婆」，這些狀況都會影響其成就感與羞恥心的適當建立。

階段三：自動自發以及罪惡感的學習

在兒童三歲以後，也就是開始懂得遊戲的年紀。一般會發展出一想像力藉由主動參與不同假想的活動擴展自己的技巧二和他人合作三學習領導以及遵守領導。

這個階段的兒童也會藉由一感到害怕二只能勉強參與團隊三必須繼續依賴大人四在假想的遊戲中發現自己的技巧有限，而發展出罪惡感。

雙胞胎則因為特殊情形，一生下來就有伴。所以在一出生就開始學習與另一半合作，但這個能力並不見得可以延用到必須與外界其他孩子合作的場景。有時反而對外界有疏離感。雙胞胎的孩子當必須與其他孩子一起活動時，有時候反倒會彼此依賴不願分開，也完全無法接受不同的對待方式。龍鳳胎孩子經常在一起活動，在家務分工上若只期待女孩多做些。甚至責備，會導致女孩的依附問題或照顧他人的過多責任男孩被責備或要求作領導。也會因為其發育狀況不及女孩而有挫折。

階段四：勤勞以及覺得能力不足的學習

通常學齡兒童正是處於這個階段，這個階段有時候可以一直延續到國中為止。這階段的兒童會一和同儕根據一定的規範建立關係二從自由的遊戲，到進行有目的及一定規則。甚至牽涉到團隊合作的活動三學習社會科學、閱讀、數學等科目，必須完成回家功課。且所學習的東西會隨著年紀增長一年比一年更難，生活上也學習更難的、更正式的生活所需技巧。如果早期發展充滿了成功的經驗以及能夠解決心理方面的危機，順利取得了信任、自我成就感以及自動自發，通常能夠較容易且有效率的勝任此階段的發展任務。但是對自己感到羞恥或充滿罪惡感的兒童，將會經歷失敗並覺得自己不如人。

雙胞胎潛在的競爭，會影響雙胞胎彼此的自信。父母與師長的比較，容易讓雙胞胎挫折。也因為和前一個階段類似的因素，雙胞胎經常兩人一起。有時會與團隊疏離。不過，雙胞胎因為年紀一樣所以學校的課業類似。所以可以彼此討論，一起念書。甚至互相學習。有些家長認為將雙胞胎安排在同一班可以方便家長和學校間的聯繫，小朋友也因為作業相同所以家長不必花費兩倍的時間去分別關心兩份不同的作業。但是也有家長認為如果把雙胞胎放置在同一班，會惡化小朋友彼此競爭的情形。也失去了必須開始獨立成長的機會與訓練，龍鳳胎會因為男女性別的認同。被家長親友或老師，有不同期待而影響其發展。

此外，在十二歲以後，一般兒童還要面對更多更難的人生任務。如果前四個階段的學習未能適當達成，以建立良好的基礎。那麼接續下去不同人生階段的發展議題，比方說親密感和獨立的發展、自我完整性和崩解。就會是更

複雜更難解的挑戰了。

來源：雙胞胎是同班，還是分班

雙胞胎是同班，還是分班

「雙胞胎孩子在學校到底是要同班，還是不同班」

一般我們會建議，如果在幼稚園的時候，就可以讓他們分班是最好的，因為這可以早一點讓他們發展自己的個性。父母最好事先和學校老師取得溝通，提醒老師尊重他們的個性，避免將他們處處拿來互相比較。在此，我們必須特別強調，老師的處理態度絕對是很重要的。至於同班或分班哪一種對雙胞胎最好，是沒有絕對的做法。但是，很重要地。當決定要分班的時候，一定要做一些準備工作。

在孩子入學前，父母親可以先去預定就學學校查詢：學校有沒有針對雙胞胎入學同班分班的政策。假如學校的既定政策，是要求雙胞胎分班。父母親最好先讓孩子知道為什麼要將他們分班，並觀察他們分班後的一些表現。讓他們試著說出他們的想法、感覺，同時。父母親的感受和正向的態度，也會影響他們對這件事的看法。當然，假如父母親在傾聽孩子們的聲音。瞭解孩子們在學校分班的一些情形後，而覺得目前這個政策不適合他們時。不妨嘗試與學校的相關人員溝通，若仍無法取得共識時。你可能就需要一些專家心理學家或者是兒童發展專家的協助，來幫助釐清問題的真相。共同找出何者才是對孩子們最好的方案。

有的時候，因為雙胞胎可能在某些性格行為上很相像。例如：一個比較調皮搗蛋，另外一個也是。學校老師就會比較頭痛。所以一定要事先就和老師充分地溝通，尊重他們各自的發展速度。不要處處比較，若大人只看他們的相同點。會造成他們很多的壓力。所以父母一定要跟雙胞胎的老師早一點溝通，讓老師清楚雙胞胎到底有哪些特質，預防造成他們分離與焦慮，或者是獨立性的一些問題。

另外，雙胞胎也有不同的性別、長得不像的時候。像是「異卵雙胞胎」，所以很自然地。他們會有不一樣的興趣，也可以很容易將他們區分。而且我們也發現到，雙胞胎中的女孩子常常會喜歡管她的雙胞胎弟弟或哥哥。這是社會化的一個現象，在這個現象中。雙胞胎男孩有時候會因為過多的保護，而減少自我獨立的狀況。但是當進了小學或是初中以後，這種情況就會完全轉變過來。所以我們要常常避免孩子有不足的感覺，也就是說。當他們在彼此互動的過程中，若是有一個永遠居於下方。我們就必須去強化依賴的那一個，因為每個人都有自己的一些長處。不應該一直被壓抑。

另外，異卵雙胞胎的孩子資質常常會不太一樣。所以若是一個要被留級，抑或是一個要跳班。另一個卻不能，對孩子來說。都是一個很大的打擊。所以，若是一開始。根據

各自的資質不同，而將兩個分在不同班級。就能夠減少這種壓力；相對地，若是兩個資質相當。將他們分班的話，也可以避免他們之間的競爭。

父母常常問到同班和分班的優缺點為何我們可以歸納出下列幾點：

分班的優點：

一、較少雙胞胎之間的競爭，也比較有機會發展各自的興趣和能力。

二、讓每個雙胞胎有他們自己的一些機會去交朋友，也可以讓比較依賴的那個雙胞胎，變得比較獨立一點。

三、他們的語言能力，也可藉由與別的孩子互動中有所增進，而不單只是停留在他們之間的。

四、當雙胞胎發生爭執，向父母告狀時，更容易出現他們之間的衝突。尤其若是在同班的話，常常是一個講完，另一個就沒得講。因此若是分開上學的話，他們就可以有各自和爸爸媽媽分享的話題。

同班的優點：

一、雙胞胎彼此有伴，可以互相照料。所以他們會比較有安全感、學習狀況良好可以互相監督、較為活潑熱心，另外。也比較容易適應學校的生活，不會依賴父母親而且較合群。

二、老師教學進度一致，方便父母及彼此相互輔導，且父母較容易掌握孩子在校內的表現。回家後，孩子可以告訴父母親對方在學校的情形，方便父母瞭解孩子。

三、方便父母接送，也比較容易照顧。

四、雙胞胎彼此感情會很好，而且常能相互模仿、相互合作。

分班的缺點：

一、因教學進度不同，輔導會比較困難。且常因課業的不同，而搞亂家庭秩序。

二、孩子剛由同班轉成分班時，需要特別輔導溝通，不要讓兩人以為是不乖所致。

三、不同的班級與導師，對他們的人格發展影響會不同。

四、由於會有不同的課外活動，接送上會比較不方便，也無法同時參加同時段的活動，例如：家長會等。

五、有事發生的話，彼此無法相互照應。

同班的缺點：

- 一、最常發生的事就是被老師和同學認錯人。
- 二、可能會彼此競爭傷害，例如：在成績方面，或是當能力差異太大時，弱者會有自卑感。
- 三、兩人彼此相互依賴、太黏，減少與其他同學交往的機會或者是一個比較主動，一個比較被動。
- 四、老師容易拿兩人做比較，形成彼此的壓力。
- 五、會愛說話、相互打小報告，也比較不專心讀書。

另外，如果雙胞胎中有一個是比較獨立、攻擊性強的。由他做領導者，另一個往往就會太過依賴。而沒辦法表達他自己。在這種情形下，如果雙胞胎一直是分班的話。好處是他們比較能夠發展自己的獨特性、自己的認同，而不會被籠統地說：「喔原來是雙胞胎」至於。若是同班的話，因為環境比較接近。所以會比較容易適應學校生活。總結來說，分班或合班並沒有絕對的好處或是壞處，最重要的是，老師、家長、雙胞胎和同儕之間的互動關係。

整體而言，雙胞胎不論關係多麼親密。他們都是獨一無二的個體，即使外表看來非常相似。但是他們還是有其特殊性。

來源：雙胞胎父母的生活調適

雙胞胎父母的生活調適

當雙胞胎出生後，照顧雙寶的幸福和辛苦是同時存在。夫妻從兩人世界轉為以親子為主的家庭生活，由於嬰幼兒是需要依附的新生命。父母親被雙胞胎的吃喝拉撒睡給忙壞了，如果「雙寶」作息不同步時。這段時間爸媽估計是沒有辦法睡個好覺了，當一個寶寶要睡覺時。另外一個正從午睡起來想要喝奶或者想要玩耍，再有活力的爸媽為了照顧和應付兩個嬰兒也會過度疲累。一定要和其他家庭成員配合協力照顧孩子和家務，在老公或者父母、公婆幫忙的時候也要抓緊時間補個覺。儘量保持好體力才能照顧好孩子。

雖然每一個嬰兒都不同，也許有的寶寶需求比較高。有的寶寶則比較隨和，仍可以為雙寶設定一個參考作息表。但並非一定要按表操課，因為要讓他們能同時間睡覺和吃東西通常很難。可能一個餓了而另外一個還不想吃，就先餵想吃的寶寶。不用等到另一個也想吃時才一起吃，原則是以前輩的需求為優先。不要強迫他們配合擬定的時間表。幾個月後，雙寶的作息時間就會變得較為固定且同步了！

雙胞胎父母在帶養嬰幼兒過程中，若是產生憂鬱及煩躁的情緒是非常正常的事情。不用覺得有罪惡感或不斷地

壓抑自己的情緒，若到忍無可忍的時刻。情況反而會更加嚴重。建議父母要學習敏感察覺自己的情緒起伏，在壓力情緒高漲的時刻，找尋親友或保母來協助照顧孩子及分擔家務，讓自己可以有喘口氣的機會。

雖然雙寶出生後，家庭支出及家事會倍增。影響時間與收支的分配，而且不論在家或外出。總是有孩子一起，讓夫妻兩人較少有單獨相處的機會。沒有時間與精力像以前一樣關心彼此，關於夫妻之間的感情經營。提醒爸爸媽媽多體諒彼此的辛勞與煩悶，對對方的抱怨、嘮叨多一點耐心與包容。建議利用孩子們睡著後的時間，睡前一起聊天分享彼此今天所發生的事情。或相約一起在家看個電影，保有夫妻的獨處時間。透過溝通討論及取捨中達成育兒與感情維繫的平衡點，夫妻一起參與扶養孩子的過程。會讓夫妻共同走過這段辛勞的育兒經歷，使彼此生活與對話更加豐富。讓家庭氣氛更和諧與親密。

來源：雙胞胎的養與教

雙胞胎的養與教

沒有兩個人是完全一模一樣，即使他們是同卵雙胞胎。

雙胞胎協會常常接受很多的訪問，常有人問我們說：「是不是應該讓他們衣服穿得一樣啊？」我們想特別強調：「對於雙胞胎的成長，我們很樂意分享他們相似的地方，可是，我們更希望他們擁有自己的獨特性。

以我自己的經驗為例，當我還小的時候。我父親最喜歡牽著我和姊姊的手，一邊一個。因為兩個人長得一模一樣，所以在散步時。總是招來許多人的注意，父親也因此更顯得意我相信。不少雙胞胎小的時候，也像我們一樣。會得到許多人的關注，而父母親喜歡打扮他們。正是為了讓大家分享父母的驕傲。當然也有一些雙胞胎的父母覺得照顧雙胞胎已經夠累的，因此他們外出時。並不希望引起太多人的注意，以免被問東問西而增加麻煩。所以他們就不喜歡把孩子打扮成一模一樣。

從以上敘述可以得知，是否要把孩子打扮成一模一樣，其實是依個別的喜好與需求不同而有別。所以我想穿衣服的問題應是順其自然，也是使孩子發展獨特個性的一個契機。而當孩子稍大些，可以自己做決定的時候。父母就不妨讓他們自己做決定吧另外，我們也常常鼓勵父母各自帶孩子出去。讓每個孩子有跟父母獨處的時間，而不是永遠把兩個放在一起。永遠同進同出。這些都是為了幫助發展他們的獨特性。

那麼，我們究竟應如何幫助我們的雙胞胎孩子，讓他們清楚地知道，他們是可以擁有他們的獨特性呢

對此我們有以下十種方法和小秘訣：

一、以正向的態度對待他們。

二、盡量叫他們的名字，而不是籠統地說：「這個雙胞胎」

三、提供每個孩子一個他們自己私有的空間、特別的角落。

四、鼓勵他們發展各自的友誼，有一樣的朋友，也要有不樣的朋友。

五、他們的髮型可以不一樣，衣服也可以不一樣。

六、他們的名字，並非一定要取相似、互補，或者發音一樣。

七、有的時候，可以分開時間吃東西，不一定要同時進行。

八、分班就讀。雙胞胎不一定要在同一班級上課。

九、讓他們擁有自己獨特的特質。

十、鼓勵他們發展自己的興趣和想法。

來源：難以預料的狀況題「早產」不是誰的錯

難以預料的狀況題「早產」不是誰的錯

「早產」不是誰的錯

當寶寶在滿二十週未滿三十七週誕生，我們稱之為「早產」。孕期就要多留意早產跡象，適度的安胎有益於寶寶的健康，是否持續安胎請與醫師討論。

為什麼會早產？

雖然目前有五十%的早產查不出原因，不過根據統計，可查出原因的早產主要可歸為五類問題：

一 感染問題

孕婦受到感染，如身體有發燒、子宮異常疼痛、陰道分泌物異常等，較有可能引起早產之風險。

二 子宮過度被撐大

像是懷雙（多）胞胎、羊水過多、子宮畸形。

三 有妊娠併發症

部分孕媽咪患有妊娠高血壓、胎盤早期剝離、前置胎盤等，都是早產的高危險群，必要時醫師會建議提前生產。

四 合併內外科疾病

如慢性高血壓、糖尿病、免疫疾病等。

五子宮頸閉鎖不全

導致子宮頸懷孕中就打開，也容易引發早產。

認識早產徵兆

懷孕未滿三十七週的媽咪卻有下列情況發生，應儘快就醫檢查，預防早產的發生。

一子宮收縮

一小時內有六次以上子宮收縮，類似月經來臨時的悶痛感。或是要來之前的脹痛感，達到不舒服的程度。且休息一小時仍無法改善。

二陰道出血

大量出血或少量持續性出血。

三破水

陰道流出大量水樣液體。

延伸閱讀：財團法人台灣早產兒基金會

來源：面對幼兒行為改變該如何因應

面對幼兒行為改變該如何因應

當媽媽再次懷孕時，會期望在二寶出生前後大寶能學會獨立，便嘗試讓大寶減少對還媽媽的依賴，會對大寶說「小寶寶出生後你就是哥哥姐姐囉！要學著自己吃飯、幫忙照顧弟弟妹妹、東西要分享…」等等，但大人都忽略了孩子心理的感受，其實大寶還只是個小孩。

面對家中小嬰兒的到來，大寶可能出現哭鬧、情緒失控、更黏媽媽、尿床尿褲子、不肯自己進食、或吸吮手指…等行為。這些原先自理行為的改變，是孩子表達需要被更加關注的表現。試圖從父母那獲得關愛與安撫，但父母忙於照顧新生兒。無暇顧及大寶的心理變化；所以，如何協助大寶調適。知道即使有小嬰兒到來，父母對他（她）的愛也不會減少？

緩解大寶焦慮的方式

一安排和大寶專屬的相處時間：單獨並專心地與大寶共享親子時間，給予更多關注與耐心傾聽，讓孩子感受爸媽的愛並沒有因小寶的到來而改變。

二讓大寶參與迎接小寶寶的準備：讓大寶成為迎接小寶寶的重要一份子，並緩緩地引導他如何照顧寶寶，賦予他

能夠勝任的事務與責任。

三 適切的期待與學習：對於大寶的新角色學習，須考量其年齡與心智的成熟度，基本上孩子要四歲以上，才能透過角色扮演來理解如何照顧弟妹。而四歲以前，過度要求大寶必須要事事禮讓二寶，則容易引起理解的困擾與情緒的失落。

從孩子的角度來看，得到爸媽的關注重要的事情；家庭在迎接新生命時。容易因注意力的移轉，而忽略一貫受到關注的大寶。因此，在照顧小寶寶之餘。別忘了給大寶（小哥哥小姐姐一些愛的擁抱、耐心傾聽和正向回應，例如：「有你的幫忙真好。你真是寶寶的好哥哥姊姊！」，細心的一起陪伴大寶順利度過這段磨合期，讓愛更柔軟、讓家更溫馨。

來源：順利度過「陣痛」這一關

順利度過「陣痛」這一關

生產是一個自然的過程，規律性的子宮收縮是讓孩子順利分娩的力量；待產婦先做好強化自我的心理準備。面對陰道自然生產時規則宮縮的不適感受，透過專業人員的協助。待產前學習放鬆技巧能協助減輕宮縮時的不適感，讓準媽咪能順利的度過生產過程。

認識產程：

產程分三階段

第一產程：規則宮縮到子宮頸全開

第二產程：子宮頸全開到胎兒娩出

第三產程：胎兒娩出到胎盤娩出

第四產程：產後二到四小時

宮縮的感覺：當子宮收縮開始時，會牽扯腹部、大腿、薦椎的肌肉而感到痠痛。因子宮口及陰道開始擴張而疼痛，規則的宮縮。則因肌肉收縮，推動胎兒進入產道。當胎頭下降進入產道時因胎頭壓迫而有排尿感與便意感。

第一產程規則宮縮約每三到五分鐘宮縮一次，每次宮縮持續約六十秒。初產婦第一產程比經產婦久，初產婦約十四小時。經產婦約七小時，因人而異。面對長時間的產程，產婦體力負荷較大。需要先生與家人、朋友的支持與關心，可以透過心理支持、語言上的鼓勵、親密的撫觸及慰藉。並配合口令來引導待產婦做舒緩動作，以度過規則宮縮過程。

協助的方式如下：

一 改變姿勢：走動可促進產程進展，當宮縮時，可選擇側

臥或床頭抬高採半坐臥式，保持上半身直立姿勢。

二個人舒適措施：排空膀胱、更換產墊、提供口腔護理給予少量水分或使用冰塊濕潤嘴唇、更換衣物依情況增加或減少衣物、溫水淋浴、使用生產球（協助產婦放鬆骨盆，幫助胎兒下降、迴轉，可助骨盆徑線移動）、適度按摩等。

三降低焦慮：護理人員隨時提供產程進展給產婦與陪伴的家人、朋友，提早告知將會發生不適症狀的原因及應對方式。做好心理準備，降低產婦心中焦慮。可聆聽輕柔的音樂或引導想像情境，能轉移疼痛的注意力。

四呼吸技巧：建議夫妻雙方一同參與醫療院所開辦的產前衛教課程-拉梅茲呼吸課程，可在懷孕七個月時開始練習。

拉梅茲呼吸法

第一階段子宮頸口開零至三公分當疼痛開始時，鼻子吸氣至胸部挺起，嘴巴吐氣至胸部平緩，維持至疼痛結束。

第二階段子宮頸口開三至七公分疼痛開始時，嘗試身體放鬆。先吐氣，再嘗試輕淺吸氣、吐氣互相交換。注意吸氣與吐氣需等量。

第三階段（子宮頸口開七至十公分）此時是疼痛最劇烈階段，約三分鐘宮縮一次。可嘗試將身體盡量放鬆，先吐氣。用嘴吸氣，再分四到六次呼氣。直到疼痛緩解。

待產過程若有醫療需要，可與醫師討論在第一產程活動期使用減痛分娩。降低疼痛程度，讓待產婦可以將力氣集中在第二產程。使生產更順利。

來源：預防懷孕貧血不能缺哪四大營養素？孕媽咪早餐怎麼吃？

預防懷孕貧血不能缺哪四大營養素？孕媽咪早餐怎麼吃？

各位孕媽咪覺得自己有「貧血」嗎？會覺得頭暈還是昏昏欲睡嗎？在備孕時及懷孕期間如果遇上「貧血」，其實不只孕媽咪會感覺到頭暈、疲倦、食慾不佳等症狀。若氧氣和營養素沒辦法充足地供應到寶寶身上，有可能導致早產、甚至流產的情形發生。也有可能造成寶寶出生後發展遲緩。依據國民健康署的調查結果，育齡女性平均約每五位就有一位有貧血情形，比例其實是不低的，若稍不注意營養就有可能遇上孕期貧血的問題。

想要均衡不貧血，孕媽咪飲食必備：葉酸、鐵質、維生素十二、蛋白質

想要遠離孕期貧血，就必須留意四大營養素：葉酸、鐵質、維生素十二、蛋白質是否足夠。

早餐是一天的開始，要提供足夠營養和熱量維持身體機能運作。備餐主要原則為「營養均衡」及「種類多樣化」，而孕媽咪「一人吃兩人用」。份量和營養攝取需多加留意，若要預防貧血。就更不能缺乏上述說的四大營養素。

建議早餐：鳳梨肉片三明治、芭樂一顆、無糖優酪乳二百。

一 吐司：澱粉

作為主食，富含澱粉是熱量來源，能給孕媽咪好體力。

二 豬肉：蛋白質、鐵質、維生素十二

提供寶寶肌肉生成所需的優質蛋白質，而鐵質、維生素十二都是預防和緩解貧血的關鍵。

三 鳳梨：維生素、鳳梨酵素

富含維生素助鐵質吸收，同時有鳳梨酵素加速肉類被消化，讓容易脹氣的孕媽咪可以多做搭配。如果沒胃口，鳳梨酸酸甜甜的也比較開胃。芭樂：維生素、葉酸、膳食纖維

早餐很難吃到水果，可以帶顆芭樂或買超商販賣的盒裝水果。芭樂不僅維生素加倍，還有葉酸幫助寶寶的神經系統發育，及膳食纖維餵養媽咪的腸道好菌，讓排便順暢。

四 優酪乳：鈣質、蛋白質、維生素十二

五 無糖優酪乳：除了補充每日所需的鈣質攝取量，優酪乳比牛奶更適合乳糖不耐者，還能促進鈣質吸收。

來源：食物與奶量如何拿捏？寶寶添加副食品後的餵食問題

食物與奶量如何拿捏？寶寶添加副食品後的餵食問題

寶寶六個月了，只喝母乳已無法滿足成長需求。媽咪可以開始準備給寶寶吃副食品，提供更完整均衡的營養。同時訓練咀嚼，為未來建立良好的飲食習慣。開始添加副食品時，媽咪可能會手忙腳亂，食物該怎麼挑？副食品與奶如何搭配？餵食過程又有哪些技巧呢？

六到九個月寶寶吃副食物的重點及原則

六個月大以後的寶寶光喝奶是不夠的，媽咪在準備副食品時。只要掌握幾個訣竅，有耐心。循序漸進，就能讓進食成為一段美好的親子時光。

食物選擇

副食品添加順序從穀類、蔬菜、水果、豆類、肉類到蛋類。

一開始選擇不易引起過敏的嬰兒米精或嬰兒米粉，接著再添加嬰兒麥精或嬰兒麥粉，然後再增加蔬菜泥、果泥等，原則上要從清淡食物開始。

六個月以後的寶寶易缺乏鐵質，選擇添加鐵質的嬰兒專用米精比一般米麩佳，米精應以水或奶調成糊狀餵食。

七個月以後開始嘗試增加魚、肉、豆腐等含蛋白質食物。

給寶寶的食材以新鮮、當季為主。

食物性質

剛接觸副食品，性質應由稀到稠，慢慢再到泥狀、固體。建議先給予液體食物，例如菜湯、稀飯湯。等寶寶適應後，再嘗試吃半固體食物。例如米糊、果泥、蔬菜泥、肉泥。水果像是香蕉、木瓜等，可用湯匙壓成泥，蔬菜應該壓碎用鐵網過濾。

餵食次數及份量

原則上從少量開始，並依寶寶接受程度做調整。此階段一天可以餵二到三次，每次二到三湯匙一湯匙十五克。再慢慢增加到半杯或一杯（一杯二百五十）。媽咪可視寶寶食慾狀況，食慾好，可適度增加一到二餐的點心。一次增加一種新食物，一到二星期再嘗試一種新食物。

每日各類食物餵食建議量：

穀類、嬰兒米精、嬰兒麥精二到三份。

蔬菜類：菜泥一到二湯匙。

水果類：果泥或鮮榨果汁一到二湯匙。

豆魚肉蛋類：開始給予蛋黃五到一份。

餵食技巧及奶量調整

一 寶寶開始吃副食品，媽咪千萬別用奶瓶餵，應該使用湯匙餵食，讓寶寶逐漸適應成人的飲食方式。

二 寶寶比較餓的時候餵食會比較順利，例如吃奶前一小時，然後視副食品吃了多少，可彈性調整下一次喝奶時間。

三 耐心很重要，假如寶寶露出皺眉或嫌惡的表情。但沒有明顯推拒時，很可能只是不習慣新食物。媽咪可再嘗試幾次，不要輕易就放棄。如果寶寶拒絕張口，或轉頭不吃。甚至哭鬧，這時候不要強迫他。先暫停一到二星期之後再試。

四 寶寶吃飽了就應該停止，不要要求把食物吃完。

五 選擇固定的地方餵食，避開電視干擾或玩具誘惑，讓進食更順利。

六 此階段母乳及配方奶每天哺餵二到三次，量的部分主要看寶寶需求。奶量會隨著副食品份量的增加而減少，副食品包含穀類、蔬菜、魚肉蛋的量若達到十二碗。可取代一餐的奶。

九到十二個月寶寶吃副食物的重點及原則

食物選擇

寶寶開始吃蛋、豆、魚、肉類的食物，此階段媽咪在餵食方面已經更得心應手了。要提醒的是用蛋類製作副食品，先從蛋黃開始。製成泥餵食，蛋白部分最好一歲後再給予。

媽咪也很常用大骨湯煮稀飯給寶寶吃，建議不要只給粥、飯等簡單主食。可以多些變化，例如加些磨碎的魚、肉、豆類等。讓營養更均衡。

食物性質

寶寶在咀嚼方面越來越熟練，這時候可以嘗試一般固體食物，視需求搗碎或剪碎，或是讓寶寶自己拿著餅乾或烤過的吐司吃。

餵食次數及份量

寶寶九個月以後，一天可以吃三到四次副食品，每餐給予半杯或一杯的量（一杯二百五十），並視寶寶食慾增加一到二餐點心。

每日各類食物餵食建議量：

穀類、嬰兒米精、嬰兒麥精三到四份。

蔬菜類：剁碎蔬菜二到四湯匙。

水果類：剁碎水果或鮮榨果汁二到四湯匙。

豆魚肉蛋類；開始嘗試給予高品質蛋白質食物一到十五份。

（一湯匙十五克）

餵食技巧及奶量調整

學習力強的寶寶會想學著自己進食，媽咪應該多鼓勵，建議準備不易摔破，容易使用的專屬湯匙、碗、盤等餐具。整個過程也許會弄的一團亂，媽咪要有耐心。不動怒，也

不強迫。如果吃不完，下次準備餐點時。量可以減少。而除了吃副食品，母乳或配方奶仍舊要持續，量的部分可依寶寶需求做調整。

來源：餵奶的姿勢

餵奶的姿勢

餵奶的姿勢

最重要的是，要找到一個舒服的姿勢。如果您是坐著餵奶，確定：

您的背能有依靠支撐。您的大腿和腳是輕鬆平放的。可以放在小凳子或厚書上。有一些枕頭可以支撐您的背及手臂並可幫您讓寶寶更靠近您。

您可以很舒服地躺著餵奶，尤其是在晚上的餵奶，您可以邊餵邊休息。頭及肩膀舒服地躺在枕頭上，側躺。在背後及兩膝蓋間墊著枕頭可能會比較舒服。

一旦您的寶寶吃的很順時，您可以用各種姿勢，不需使用枕頭，很輕鬆地在任何地方餵他吃奶。

抱寶寶的姿勢

不論您是如何抱寶寶，以下幾個基本要領都一樣。您自己的姿勢要很舒服而放鬆。

您的寶寶應靠近您。

他應面對著您的乳房，臉、胸部及腹部在同一平面成一直線。

他的鼻子及上唇正對著乳頭。他應很容易靠近乳房，不需扭轉或彎曲或伸展他的頭。

等到寶寶嘴張得很大時，再將寶寶貼近乳房，而不是移動您的乳房去靠近他。

在寶寶出生後的頭一個月，餵奶時媽媽不只是托著他的頭和肩膀，也應托著他的臀部。

*提醒：寶寶肚子貼著媽媽肚子、媽媽乳頭對著寶寶鼻子、抱寶寶來靠近乳房，而不是乳房靠近寶寶。

寶寶含奶的姿勢

寶寶應該含住大部分的乳暈。以前述的姿勢抱妳的寶寶，讓他的鼻子或上唇正對著您的乳頭。等他嘴巴張的像打哈欠般那麼大，您可以乳頭輕觸其嘴唇來鼓勵他。很快地將他抱近乳房，讓他的下唇儘可能遠離乳頭含住乳房。

*當寶寶含住乳房時確定：

寶寶嘴巴張的很大，含住大部份的乳暈。下巴貼著乳房。下唇外翻有時不易看到。

如果寶寶含的正確時，在快速吸幾口後會變成慢而深的吸吮，同時間隔著休息。頭幾天，當寶寶剛含上乳房時，您可能會覺得稍稍疼痛，但在幾分鐘之後疼痛感應消失。如果持續疼痛的話，可能是寶寶含的不好。此時以手指輕壓其嘴角，使其停止吸吮。再將乳房移出其嘴巴，重新試一次。如果疼痛持續的話可找醫療專業人員或合格的泌乳顧問幫忙。

通常寶寶吃到較後面的奶，因為脂肪較多比較飽足，會自己放開乳頭。

來源：餵母乳的十大迷思，如何促進乳汁分泌及問題處理

餵母乳的十大迷思，如何促進乳汁分泌及問題處理

在資訊爆炸、訊息真假參半的時代，很多謬思會讓人迷惘，進而對哺育母乳心生畏懼和敵意（例如餵母乳就很累會被小孩綁住、會乳腺炎、會喪失自己、會胸部變形等等族繁不及備載）；但靜心反思，難道餵配方奶的媽媽就很輕鬆？出門都不用顧小孩？都不會變老流失膠原蛋白？本來在決定生小孩，成為媽媽的時候就要知道這是一場截然不同的人生修練。不論哺餵母乳與否，當媽媽本就不輕鬆。重點還是在自我覺察、家庭伴侶合作育兒、愛你所選，選你所愛。

以下分享十大關於餵母乳的迷思，讓你有奶輕鬆餵。

一：我媽以前沒母乳我也沒母乳？

一：不置可否，的確有先天乳腺發育不全的個案。主要是因為雌激素分泌不夠進而影響到乳腺管的生長發育，但這在青春期就會有端倪。並不是婆婆媽媽們常說的我以前也沒母乳的主因，常見的原因主要還是跟泌乳機轉有關。產後有依寶寶生理需求移出奶水，身體會依據母體身體狀況分泌適量的乳汁反之。當多種可能原因（例如：產後大出血、沒有適時移出奶水導致乳房過於充盈等）導致身體的負回饋啟動，（增加。就會抑制奶水製造，以保護母體。但這並不是單向變化，全有全無。甚至再度泌乳都是可能的。

二：產後根本擠不出來，我一定沒有母乳？

二：其實奶量的多寡因人而異，身體很奇妙。子宮會因為孕育生命而改變，乳房也是。所謂的來奶是在產後的三到八天，所以剛生完擠不出奶是正常的喔！

泌乳機轉分三階段：

第一階段：其實在懷孕中期約十六到二十二週就開始製造奶水了！

第二階段：是產後第三天到第八天，隨著母體黃體素驟降、泌乳激素分泌增加。奶水分泌就會開始充沛，就是所謂的來奶。除了荷爾蒙影響，這階段的關鍵也會因為刺激越多（寶寶吸吮或規律擠奶）而正向回饋促進更多的乳汁分泌。

第三階段：是產後第九天開始，荷爾蒙的影響下降轉換為乳房自己控制。有需求有製造，這時候奶水移出（寶寶吸吮或擠乳）是泌乳機轉的關鍵。也是這個時期身體慢慢調整成供需平衡的狀態。

三：小孩親餵一直哭，一定是我沒有母乳？

哭其實有很多種原因，舉凡吃喝拉撒睡寶寶的溝通方式就是哭聲。育兒也是從零開始慢慢觀察、回應、試誤學習，更認識寶寶。了解寶寶的表達和的生理需求，依照寶寶需求餵奶。不論是親餵或是瓶餵，母乳或配方奶。都是我們需要了解進而磨合適合彼此的餵食方式，哭只是一個溝通方式。不一定是沒奶的單一答案。

四：餵母乳一定會經歷石頭奶，好痛好可怕？

四：其實餵母乳沒有要一定要經歷石頭奶，但我們要知道所謂產後石頭奶（乳房腫脹）的成因，才能防患於未然。

根據泌乳機轉，大部分媽媽會在產後三到八天進入所謂來奶階段。此時乳房的變化稱之為「生理性脹奶」，因為乳糖和水進入乳腺細胞。細胞變大，細胞間隙變緊密。所以會感覺乳房熱、腫、硬，每個人的感受強度不同但和石頭奶不同的是不會發燒。而且奶水流出是順暢的，所以此時的因應是「依照寶寶需求哺乳或是模擬寶寶需求三到四小時移出奶水」。若仍感受熱和脹的不舒服，可以適當的涼敷乳房和按摩肩頸。

石頭奶乳房腫脹，則是因奶水沒有適當的移出。乳房過度充盈，可能會水腫、緊繃、疼痛。進而奶水流出不太順暢，之後會有發燒的現象。這時的自救撇步是「涼敷消腫、解除疼痛、軟化乳房，以適當的方式移出奶水」。補充足夠的水分，但先避開發奶食物。關鍵還是在於移出奶水，若寶寶能有效率親餵為佳。再者手擠乳或疏乳，但不是暴力擠奶也不是完全不理喔！如有此症狀的媽媽建議可諮詢母乳友善的醫師，搭配哺乳期可使用的止痛藥更能儘速緩解症狀。

五：親餵好痛，乳頭乳房又會變形，又會腰酸背痛？

五：親餵不一定都會很痛，但痛的原因有多種可能，例如：剛開始適應的乳頭敏感、寶寶吸吮的方式扯到乳頭、局部皮膚感染、雷諾氏症、寶寶長牙不小心咬到等，不同原因的因應方式不同。乳房大小其實隨著年紀增長，地心引

力影響。胸型本來就會和年輕時不同，盡量避免過快的乳量變化。可以減少皮膚和組織被拉扯鬆弛，適度運動和伸展運動也有助於訓練胸大肌。至於腰酸背痛的部分，熟悉各種哺乳姿勢躺餵、生物哺育法、搖籃式等）。並要注意支撐（例如利用枕頭靠背、搖籃式手臂也要支撐等），再者懷孕時期本就會有骨盆前傾的生理變化。產後也需要時間修復和站坐姿重心的調整，也需要適度的肌力訓練找回核心肌群的肌力。這都是因人而異。

六：擠奶好麻煩，還會草莓奶，還容易乳腺炎？

六：擠奶的確不方便，但根據工作型態找尋合適自己的擠乳頻率也是可行的方式之一。目前臺灣根據性別平等工作法：子女未滿二歲須受僱者親自哺（集）乳者，除規定之休息時間外。雇主應每日另給哺（集）乳時間六十分鐘。受僱者於每日正常工作時間以外之延長工作時間達一小時以上者，雇主應給予哺（集）乳時間三十分鐘。現在的擠乳器有很多種：單邊、雙邊、手動、電動、無線等，選擇合適的擠乳工具和適當吸乳器的喇叭罩口徑，避免過強的吸力，就比較能避免乳頭受傷引起的草莓奶。乳腺炎的原因很多，生活壓力、過度刺激拉扯乳腺、塞奶後不當處理等都有可能，但最重要的是遇到乳腺炎還是要即早尋求醫師的協助診治，對症下藥。乳腺炎治療期依然是可以餵母奶的，就算當下不餵，也要適時的移出奶水，這也是治療過程之一而不是突然就停止不擠奶。

七：市售都有銜接母乳可選擇的奶粉，為什麼還要餵母乳？

根據國際四大期刊之一「刺絡針」二千零二十三年針對母乳哺育的系列報導提到，將母乳代用品改為「商業化的嬰兒配方」，避免產生嬰兒配方有可以取代母乳的錯覺。配方奶的發明是為了讓一些真的沒有母乳可喝的嬰兒能有營養和成長，但目前並沒有任何的配方奶可以有母乳裡的抗體或活性物質。但在行銷話術的渲染下，很容易讓媽媽自我懷疑。進而弱化了自己的生物本能，被商業化嬰兒配方洗腦以為非它不可。

八：哺餵母乳好多禁忌，媽媽的身心自由都被限制？

八：其實哺餵母乳就只是一個育兒生活型態，孕婦不是病人。餵母乳的媽媽不是犯人，很多禁忌大多是沒有實證的「不怕一萬只怕萬一」。以下舉例幾個常見對哺餵母乳的誤會

哺乳期能不能喝咖啡

根據建議，每日咖啡因三百以下是可以的一般人其實也是建議這個量。想喝的時候看一下成分表，當然還有觀察孩子的反應去做調整。如果寶寶會焦躁不安則需暫停。

哺乳期能不能喝酒

其實般人也不建議飲酒，還是建議能避免盡量避免而且

過量的酒精會抑制泌乳。

哺乳媽媽要不要吃保健食品？

不管是不是哺乳媽媽，只要保持營養均衡，保健食品沒有什麼非得吃不行。但值得一提的是維他命，因為國人普遍接觸陽光的頻率不高。再者從母乳過去給嬰兒的量很低，所以母乳寶寶建議一天補充四百。配方奶寶寶沒喝到一千毫升也建議一天補充四百。

母親吃益生菌能不能改善嬰兒可能或已發生的過敏症狀

其實益生菌的學理目前仍充滿未知，並沒有非常明確的實證醫學建議。所以並沒有建議母親該吃哪一種益生菌預防寶寶過敏或是寶寶應該吃什麼益生菌改善過敏，建議有症狀還是應該先就醫詢問醫師的建議。再依照個人體質狀態來考量需不需要吃。

九：哺乳期能不能染燙髮、霧眉、看牙、吃藥？

九：目前並沒有任何證據顯示，哺乳媽媽使用染髮劑或燙髮劑會對母乳寶寶產生影響。使用在頭皮上的用品就像用在皮膚上的藥品一樣，吸收到體內的量更少。不必擔心乳汁對寶寶有不良影響；不過當然要選擇合格的美髮師、美睫師及安全的產品。至於看牙、看病和吃藥，哺乳真的不是禁忌症。藥物會不會過奶，能不能使用。還是有藥典可以查的，抗生素不是哺乳禁忌症喔

十：親餵小孩很黏人會不獨立，離乳很麻煩？

十：其實孩子會黏主要照顧者是與生俱來的天性，親餵的孩子的確和媽媽的連結較強。媽媽要安撫起來也比較容易，但其他的照顧者有耐心。用其他的方式引導，孩子一樣可以和友善照顧者相處融洽。例如：依照寶寶生理需求，不要在過飢的時候才餵奶、嬰兒主導式瓶餵不灌奶再大一點友善的陪玩、親子共讀等。至於獨立和教養有關，父母學習放手，在安全範圍內讓孩子試誤學習、用愛與包容支持孩子探索，這才是培養出獨立自主的素養。

根據世界衛生組織建議哺乳至兩歲，並沒有所謂的六個月或一歲以後沒有營養要斷奶；而母乳裡面的抗體和白血球不僅是動態變化，也是目前配方奶不可能含有的成分。當然，一歲以後的孩子。建議飲食要慢慢轉為固體食物，喝奶為輔。但大童的持續哺乳，喝的不僅只是營養。而是安全感呀！如果孩子的確長大了，語言表達能力也不錯。媽媽又有點累想要休息離乳了，不妨可以試試「繪本溝通」、「情感轉移物」。以及再三地給孩子安全感的肯定，「不管有沒有喝內內。媽媽都愛你，也都在你身旁」。離乳真的只是一個過程，耐心陪伴孩子溝通引導，孩子終究會長大。

餵什麼奶是媽媽的自由意志，但我們有必要知情選擇而不用杯弓蛇影，或被一些哺乳迷思綁架。很多時候都是自

己嚇自己，太多的情勒「我是為妳好」。真的只是阻擋天性的自然，喝配方奶當然也會長大。不過如果有完整的產前教育、完善的產後支持，在能力可及的情況下。磨合出適合彼此的哺育方式，其實哺餵母乳真的沒有那麼多禁忌和痛苦。

來源：餵母乳的媽媽可以捐血嗎？

餵母乳的媽媽可以捐血嗎？

為了您的身體健康，避免因為想捐血救人，而忽略自己的狀況。依照捐血中心對捐血者健康評估的說明：婦女懷孕中或產後（含流產後）六個月以內者，及大手術未滿一年或一年內曾接受輸血者，應暫緩捐血。

一個健康的成年人，全身血量大約是體重的一百一十三；每次捐血二百五十。只占全身血量的五到六，適當的捐血可以促進新陳代謝。骨髓會加速造血，很快再補充新血。因此，對健康的人來說，捐血對健康是不會有影響的。哺乳期間提醒媽媽應均衡攝取六大類食物，且應主要來自天然食物。選擇含鐵質豐富的食物，如：深綠色蔬菜、紅肉、肝腎內臟、貝類、全穀雜糧。以補充哺乳期足夠的礦物質和維生素。

有關哺乳跟捐血的問題，各國都有不同的規定，大部分都是建議產後至少三到六個月，世界衛生組織建議停止授乳之後三個月才考慮捐血。

來源：餵藥的方法

餵藥的方法

寶寶在家服用藥物的注意事項

一應依醫師處方按時給藥，且非經醫師指示，不可自行增減藥量或停藥。

二藥物應在餵奶前或餵食後給，不可加在母乳或配方奶內，以免影響所給藥量及藥物吸收。

三可利用奶嘴、滴管、小湯匙、空針等，給寶寶餵藥。

早產兒居家常使用的藥物及注意事項：

一鐵劑：主要是補充鐵質或治療早產兒貧血，通常在餵食前三十分鐘服用，以利藥物吸收；服用鐵劑時寶寶的大便有時會呈黑色或深綠色是屬於正常的。

二多種維他命：少數寶寶服用時會有腹瀉現象，可先暫停服用，並告知醫生。

來源：髖關節篩檢

髖關節篩檢

髖關節發育不良，早期沒有明顯症狀。也不會痛，因此往往被家長忽略此問題。即使專業醫師也無法保證檢查出所有的病患。它可能造成日後不良於行的病痛與後遺症，而愈早發現愈容易治療，因此父母與醫師都必須一起提高警覺。

什麼是發展性髖關節發育不良

髖關節是連接骨盆及大腿的關節；台灣每一千名新生兒約一到二位有髖關節發育不良問題。

此症在嬰兒時期會表現出關節鬆脫，長大則有髖關節脫臼、長短腿、終身跛行、退化性關節炎等長期病痛。

愈早發現髖關節發育不良，愈容易治療。例如，六個月大之前檢查出來。可用吊帶矯治；六個月大之後檢查出來，往往需要徒手復位及石膏固定來治療；一旦延遲至開始步行後才發現。則需開刀手術方能復位（但以上治療方式會因人而異）。

早期髖關節發育不良可自然復原，但是若將嬰兒束縛於過緊的包巾中。使大腿處於伸直併攏的姿勢，會阻礙此自然復原。或惡化為脫臼。將大腿處於自然的屈曲外張姿勢，則有助於髖關節的發育。

早期發現的重要線索

危險因子：髖關節發育不良的女嬰比男嬰多，常見於臀位產的嬰兒（特別是兩膝伸直的臀位產）、有家族病史、第一胎羊水過少者，以及出生就有斜頸、兩腿姿勢不對稱、膝後翻、前足內翻等肢體變形的嬰兒，有以上危險因子的嬰兒應特別注意。

身體徵象：若您的寶寶有大腿外張受限圖一、長短腿圖二、髖關節動作時有聲響等現象，請告知您的兒科或家醫科醫師，特別留意髖關節的問題。

來源：高危險妊娠說明與責任醫院

高危險妊娠說明與責任醫院

隨著懷孕週數增加，孕婦的身體會因為胎兒成長而增加許多額外的工作，例如孕婦的心臟負擔在懷孕後期快速的增加、胎兒所有的新陳代謝必須經由母體的腎臟排出、胎兒生長所需要的營養也必須由母體提供等。孕婦的身體會很努力的去適應這些懷孕的變化，但是如果孕婦原本就有某些疾病，如先天性心臟病、慢性腎臟病等，就可能因為懷孕而導致臨床症狀加重。另外，孕婦也會因懷孕而出現如妊娠糖尿病、妊娠高血壓等疾病，這些都屬母體因素的高危險妊娠。

一般而言，大多數懷孕的胎兒都是正常的，但是也有少數

的胎兒患有先天疾病或有未足月早產之徵象，這是屬胎兒因素的高危險妊娠。

當醫師告知您有上述情形時，表示本次懷孕可能是高危險妊娠。需要經由完整的產前檢查，來早期預防懷孕過程可能發生之併發症。並建議在人力及設備較完善的醫療院所生產，如此。母親及嬰兒的安全較可獲得保障。

下列名單是經過衛生福利部「醫院緊急醫療能力分級評定基準」分級之「高危險妊娠孕產婦及新生兒照護品質中度級、重度級急救責任醫院」，當您在懷孕過程中出現任何緊急狀況時，這些責任醫院可提供您較完善的緊急醫療照護服務。準爸媽可依您的妊娠情況，選擇就近的責任醫院接受檢查及生產。

急救責任醫院分區名單依能力分級與公告日排序

來源：高齡妊娠的影響

高齡妊娠的影響

女性懷孕時年齡滿三十四歲以上，稱為高齡妊娠，此時如併有慢性疾病如高血壓、糖尿病、甲狀腺問題或關節炎等，會增加懷孕時母體與胎兒的併發症。而孕母年紀較大，體力較差。易導致全身不適症狀，故高齡產婦易發生的懷孕併發症包括妊娠高血壓、子癇前症、胎盤早期剝離、前置胎盤、妊娠糖尿病、早產等。分述如下

一 妊娠高血壓：

懷孕期間孕婦的血壓建議控制在一萬四千零九十以下，如控制不好即有可能產生妊娠高血壓，嚴重時會合併子癇前症或子癇症，如果孕前有慢性高血壓就可能會產生妊娠高血壓。

所謂子癇前症，即懷孕過程有高血壓與蛋白尿。合併頭痛、視模糊、上腹痛、小減少、胎兒發育遲滯、肝功能上升或凝血功能低，就屬於重子癇前症。會出現胎兒子宮內生長遲緩、胎盤早期剝、胎兒窘迫，嚴重時胎死腹中。因此，若子癇前症已危害到媽媽或胎兒的生命安全。建議提早生產，終止妊娠。才能解決這些併發症所帶來的危害。

二 妊娠糖尿病：

所謂的「妊娠糖尿病」一般可以分為兩種狀況，一種是懷孕前已診斷為糖尿病者；另外一種則是懷孕前沒有糖尿病病史。在懷孕時才發生或首次被診斷出有耐糖不良的高血糖現象，屬於糖尿病高危險群的孕婦。如有糖尿病家族病史（二等親內有糖尿病史）、肥胖症、曾有妊娠糖尿病史、高齡懷孕等等。應於確知懷孕時及早接受妊娠糖尿病篩檢。

孕婦如果有妊娠糖尿病，罹患子癇前症的風險會增加。另外也可能會造成胎兒過大，以及因為胎兒過大而剖腹生

產或發生生產併發症的機會上升。亦或有新生兒血糖過低或呼吸系統問題，所以在孕期要與醫師及營養師配合。適當的孕期飲食治療；了解孕母高血糖對胎兒可能的影響、如何預防高血糖、認識低血糖症狀與處理、居家自我測試及紀錄血糖，做飲食或藥物控制。以增進母嬰健康。而在產前持續施打胰島素的孕婦，孕期中應將血糖維持在正常範圍內七十到一百四十，避免母體血糖持續增高，造成新生兒次發性高胰島素血症或新生兒持久性低血糖反應。良好的控制血糖值，才能降低母親與胎兒的合併症。

確診有妊娠糖尿病的孕產婦，一般有家族遺傳的傾向。不過在產後大多會恢復正常，建議於產後六到十二週再次接受篩檢。評估是否會發生或發展成典型糖尿病。

三 胎盤早期剝離：

正常情況下是胎兒出來後胎盤才從子宮壁剝離下來。當懷孕二十週後至胎兒出生之前，胎盤從著床的子宮壁發生部份或全部分離的情形。則胎兒血液供應會受到阻斷，嚴重時若無法立即生產。會導致胎兒窘迫，甚至死亡。在胎盤早期剝離的情況下，子宮會因胎盤後積血而導致強直性收縮。此時不一定伴隨著陰道出血；當剝離的範圍較大時，可見到明顯的胎心音減速。孕婦也有可能出現瀰漫性血管內凝血功能障礙，導致產後大出血。

當孕婦合併有妊娠高血壓、子癇前症、高齡婦女、早期破水、多胞胎、葉酸缺乏、抽煙、外傷等都會增加胎盤早期剝離發生的機會。胎盤早期剝離是妊娠中後期的一種嚴重併發症，如果腹部遭到嚴重撞擊或發現陰道出血、子宮壓痛、腹背部疼痛。以及子宮異常收縮等情況，應馬上就醫。以免延誤診斷及治療，若不及時處理。會危及母親和胎兒的生命。

四 早產、低出生體重機率增加：

孕婦年紀越大，早產、低出生體重機率越大。依據國民健康署一百零九年出生統計年報，每一百位活產新生兒中有一百零二位出生時體重小於二千五百克低出生體重。有一千零五十三位為早產兒懷孕週數小於三十七週，如以產婦年齡分析。以二十五到二十九歲組別發生新生兒低出生體重比例最低每一百位新生兒中有八百六十二位；早產兒比例亦以二十五到二十九歲組別最低每一百位新生兒中有八百七十九位，而四十歲以上則高達每一百位新生兒中有一百五十五位。約為二十五到二十九歲組別的十八倍。

常見的婦科疾病如子宮內膜異位及其他疾病，如心臟病、糖尿病、腎臟病等在高齡婦女中出現的機率要比年輕的婦女高得多，這些都是可導致流產的因素。與適齡生育相比，當高齡產婦，還要承擔更多的風險。

總而言之，高齡孕婦除了本身較易具有潛在性的疾病，也容易有高危險妊娠的風險。假如你不得不當高齡孕婦，

請做好孕前、產前檢查。尤其是高齡初產婦從確診懷孕開始，應定期產檢，要特別注意血壓和尿液的檢查，以便及時發現及早治療。經醫師檢查發現之異常個案，給予轉介診治及提供遺傳諮詢與照護。

來源：高齡孕產婦的照護

高齡孕產婦的照護

現今結婚年齡普遍提高，晚婚使婦女生育第一胎的平均年齡已至三十零九歲內政部戶政司二千零二十年。國際上對高齡產婦的定義不同，醫學上以受孕時滿三十四歲的婦女為高齡產婦。卵子和精子的品質及量隨年齡增長而下降，易致不孕症。且較容易產生懷孕期和生產時的併發症，併發症的嚴重程度也較一般適齡孕婦來的高。對母體及胎兒健康情況的危害性較高，所以從孕前至孕期到產後的健康照顧。對促進胎兒及母體健康很重要

一 孕前健康檢查

計畫要懷孕的準爸爸準媽媽們，若家族有相關的遺傳疾病。或個人有某些疾病，建議做孕前健康檢查及孕前優生諮詢。可提早發現潛在的遺傳疾病，並及時給予適當的治療。將身體和心理都調適到最佳狀態後再懷孕，才能生育健康的下一代。

二 孕婦產前健康檢查

國民健康署提供十四次的孕婦產前檢查，針對高齡產婦補助產前遺傳診斷羊膜穿刺費用。由專業醫療團隊於產檢過程中觀察孕媽咪及胎兒的身體變化及健康狀況，適時提供照護服務。降低併發症的可能！請孕媽咪依懷孕週數按時回診產檢。

三 飲食

根據國人膳食營養素參考攝取量育齡婦女每日建議攝取四百微克葉酸，準備懷孕婦女在受孕前一個月至懷孕期間。每日攝取六百微克的葉酸，將身體調整至健康狀態。並維持理想體重，為懷孕做準備以供自身與胎兒所需。

懷孕期間不適合減重，維持正常的均衡飲食習慣即可，營養素攝取不足，對胎兒生長發育易造成傷害。孕婦體重應依懷孕前體重做適當調整，以增加十到十四公斤為宜。並注意體重增加的速度；原本就較肥胖的孕婦，則要注意不可增加過多的體重。否則容易併發高血壓、妊娠糖尿病和妊娠毒血症等，避免攝取脂肪多與高熱量的食物。

懷孕初期（零到三個月）若有噁心、嘔吐等現象，應少量多餐及選擇低脂肪且無刺激性的食物。早晨醒來時，可吃些五穀類食物。如餅乾、饅頭等改善孕吐；在懷孕末期，避免碳水化合物及脂肪攝食過多。造成體脂肪增加。

四 活動

孕媽咪懷孕期間產檢一切正常，依然可以從事一般的運動。根據研究顯示，懷孕期間每天運動三十分鐘。有助於加速產程、避免難產，降低罹患妊娠糖尿病等風險。因懷孕可能會耗去不少體力，孕媽咪如果懷孕前有固定慢跑運動的習慣。可以考慮將慢跑的里程數縮短一些，或是以其他的運動方式替代。如習慣原每天跑二公里，改以每天走四公里替代。不需要勉強自己走太快。如果是平常就沒有良好的運動習慣，懷孕時就是運動的最好時機，可選擇走路、孕婦瑜珈等較溫和的運動！

五 產後照護

高齡孕婦在產後經由適當的護理及調養使身體恢復至孕前狀態，也就是我們俗稱的「坐月子」。這段期間不宜過早負重及操勞家務，需充分休息、補充均衡且完整的營養。以恢復體力並調和精神和情緒。

生產時會消耗許多體力，產後婦產科醫師可能會開立子宮收縮藥。促進子宮復原及排出惡露，建議產後二週再開始採用麻油、酒等補品。可選擇補血及高生物價值蛋白質如：牛奶、雞蛋、海鮮等動物蛋白和黃豆製品等的食物，飲食宜清淡可口、易於消化吸收。富有營養、足夠的熱量及水分，促進傷口癒合。

產後在每次排便後，用溫開水或消毒水由前往後沖洗會陰部。約產後一週，會陰傷口或剖腹產傷口癒合後即可採擦浴、淋浴方式洗澡、洗頭；不適合洗盆浴避免感染。適當身體清潔、適度的沖洗，可放鬆身心、減少感染。有利於產後的復原，只要沐浴後迅速擦乾吹乾即可。

當體力恢復時可嘗試做些簡單的產後運動，促進肌肉張力。增加血液循環，有助於器官復舊及身材的恢復。運動中如有不適，可暫停或休息。在產後滿一個月，惡露乾淨、子宮完全恢復才可行性生活，否則易感染或出血。

來源：高齡生育不可忽略的事！產前遺傳診斷檢查（羊膜穿刺）何時該做及補助條件

高齡生育不可忽略的事！產前遺傳診斷檢查（羊膜穿刺）何時該做及補助條件

女性高齡懷孕比例攀升，潛在妊娠併發症風險也逐漸升高，特別是胎兒染色體異常的發生率。而產前遺傳診斷檢查（羊膜穿刺）就扮演重要角色。

現代人婚育年齡普遍延後，女性高齡懷孕比例隨之攀升。但隨著年紀增長，孕期潛在妊娠併發症風險也逐漸升高。特別是胎兒染色體異常的發生率。此時，產前遺傳診斷檢查（羊膜穿刺）就扮演重要角色，協助早期發現胎兒的潛在疾病狀況，是高齡孕婦不可忽視的保障。

高齡懷孕風險提高，媽媽要提高警覺

隨著準媽媽年紀增長，除增加懷孕的困難度外，受精卵染色體異常可能性同步上升，對寶寶健康產生潛在風險。國健署資料統計，一百一十三年高齡產婦比例上升至近四成。平均每二到三名孕媽咪就有一位是高齡孕婦，建議高齡準媽媽在孕前與懷孕期間都要留意營養補充、健康生活型態與運動。才能幫助胎兒健康發育。

高齡孕婦與年輕孕婦相比，較易出現妊娠糖尿病、子癲前症、難產與剖腹產風險。相關文獻指出，高齡孕婦自然流產率較高，主要是因卵巢機能與卵子發育能力隨年齡增長而改變，易導致染色體異常或胚胎發育異常。

胎兒染色體異常發生機率隨著母親年齡增長而提高，其中最常見染色體異常疾病前三名分別為多一條二十一號染色體的唐氏症、多一條十八號染色體的愛德華氏症（）與多一條十三號染色體的巴陶氏症（）。以唐氏症為例，三十歲以下產婦懷有唐氏症胎兒的機率約為一萬一千一百，三十四歲後風險升至一千四百八十五，而四十歲以上高齡產婦風險更高達一千一百零六。

什麼是羊膜穿刺？何時做？流程與檢查項目一次掌握

「羊膜穿刺」是目前最常用的產前遺傳診斷方式之一，可準確判斷胎兒是否存在染色體異常的重大遺傳疾病。

羊膜穿刺檢查大多安排在懷孕十六到十八週之間進行，此時羊水量適中、風險相對可控。

流程通常如下：

一 醫師評估與衛教

醫師會評估孕婦狀況並說明檢查內容、風險與注意事項，必要時須簽署同意書。

二 超音波引導下抽取羊水

檢查當日，醫師會透過超音波精準定位胎兒與胎盤位置。再以細針穿過孕婦腹部抽取約二十毫升的羊水，整個過程約五到十分鐘。通常無需住院。

三 實驗室分析

收集到的羊水會送往專業實驗室進行細胞培養與染色體分析，可檢測唐氏症、愛德華氏症、巴陶氏症等，以及其他染色體結構異常。

四 報告時間與風險提示

報告約需二到三週完成，若有異常，醫師會再提供進一步諮詢與協助。整體來說，羊膜穿刺風險相對低，約有千分之一至三的流產機率。

政府補助有幫助！羊膜穿刺補助資格與金額整理

為協助有需求的孕婦安心接受檢查，政府提供特定條件下的「產前遺傳診斷檢查」費用補助。根據衛福部二千零二十四年最新資料，補助內容如下：

補助對象：

符合以下其中一項即可申請補助

一 一百三十四歲以上孕婦

二 本人或配偶或家族有罹患遺傳性疾病

三 曾生育過異常兒

四 孕婦血清篩檢疑似染色體異常之危險機率高於一千二百七十

五 超音波篩檢胎兒可能有異常

六 胎兒疑似有基因疾病等

補助金額

每胎最高補助五千元，若是低收入戶或居住於優生保健措施醫療資源不足地區的孕婦，額外再補助採檢費用最高三千五百元，單案最高補助總金額達八千五百元。

如何申請：

資格符合的孕婦，會在產檢醫院協助下，填寫產前遺傳診斷申請表。

補助費用會由產檢醫院直接從應自行負擔的費用中扣除，受檢媽咪仍需自付差額。

掌握關鍵時機，安心迎接健康新生命

高齡懷孕雖潛藏風險，但透過規律產檢、科學診斷與良好生活習慣，仍然可以迎來健康寶寶。產前遺傳診斷不僅是醫學保障，更是準爸媽對下一代健康的關懷和責任。準媽媽務必把握羊膜穿刺檢查的時機，及早了解胎兒健康狀況。為迎接新生命做好準備。

來源：黑眼圈爸媽的育兒過渡期

黑眼圈爸媽的育兒過渡期

有了寶寶之後，新手爸媽都會面臨睡眠不足的困擾。為了配合寶寶的作息，睡眠被打斷是很平常的事。新生兒階段爸媽平均睡眠時間僅有五到六小時，通常寶寶六個月前還無法建立一覺到天明的作息。隨著寶寶的成長就會

逐漸調整，黑眼圈只是過渡期的印記。你也可以試試以下幾個方法來改善。

善用技巧拉長寶寶睡眠時間

新生兒的神經反射尚未成熟容易驚醒，可試試看包巾或防踢被包覆身體，模擬子宮內的感受，有了安全感就能睡得更安穩。

二到三個月後的寶寶，已漸漸能分辨白天、黑夜的差異。可以嘗試培養睡眠儀式，例如睡前聽故事、調整昏暗燈光、按摩等。讓寶寶建立良好睡眠習慣。

隨著月齡成長，調整睡前的奶量，讓飽足感來拉長寶寶喝奶間隔，並逐漸減少夜奶的次數。

把握時間休息或補眠

盡量跟著寶寶一同入睡（同室不同床），暫時將家務事及手機擱置一旁。

和伴侶協調分工，兩人輪流休息協力照顧寶寶。

盡量利用上班時的午休時間來補眠。

來源：龍鳳胎教養小撇步

龍鳳胎教養小撇步

一次生養一個小已經不容易，更別說一次來兩個或更多，事實上雙胞胎的父母，往往要付出比單胞胎父母雙倍甚至更多的心力。龍鳳胎的父母也是一樣辛苦，且龍鳳胎一男一女，還必須注意到性別及個性上的差異，難題更多了。不管是從出生到後續的教養，都有其特殊性。在這裡，雙胞胎協會得到一些來自國外及專家的看法，提供建議

一 經濟負擔

一般同性別雙胞胎有許多物品可共享，並藉此減少雙重花費。但龍鳳胎畢竟是一男一女，在某些事物的花費上。恐怕不能像同性別雙胞胎那樣方便。不過，除了衣物會有男女差別，其他物品都不需刻意分別在房間的布置上也可以中性裝飾取代性別顏色鮮明的裝潢。另外，衣物、娃娃車等非消耗型物品可以尋找二手貨，協會、社區或親朋好友，都是索取的對象。

二 個體發展

發展的快慢常讓新手父母緊張兮兮，特別是一次出生兩個孩子。父母更是容易一不小心就把孩子拿來比較，擔心這個或那個孩子發展有狀況等等。龍鳳胎也不例外。而龍鳳胎常遇到的問題是，同年齡的女孩向來比男孩發展得稍快些雖然也有反過來的狀況。但不管怎樣父母都可

以不必太過緊張，只要孩子仍持續在成長。且發展的程度仍在平均值內，就不需太過擔心。另外，比較特別的是。龍鳳胎中女生的發展稍快於男生時，這些微的領先可能會影響孩子的自尊發展。造成女孩子可能比較容易顛覆傳統的性別角色發展，成為龍鳳胎中較具支配性的那一個。有些男孩子容易會因為他的姐妹成熟得較快或較照顧他們而沒辦法自我獨立，不過通常在開始上學。有了自己的朋友後，他們會開始比較能夠建立自我。

三人際關係

一旦龍鳳胎開始上學，他們就會開始拓展同性別的人際關係，但若其中一個孩子比另一個還早準備好要開始交『外來的』朋友，有時會造成一些衝突。如果這樣的情形確實造成困擾，父母可以教導孩子彼此間都有各自交朋友的權利，同時也可以讓孩子們有各自的興趣或活動選擇，幫助孩子不過度依賴彼此。另外，其中一個龍鳳胎希望能有更多私人的空間也是常見的狀況。可以的話，能讓每個孩子都有屬於自己的空間。有助於孩子的獨立。

四性別發展

這可以說是龍鳳胎獨有的經驗。和其他單胞胎或同性別雙胞胎不同的是，他們從小就親暱相處的手足是異性。因此他們可以從自己的兄弟姐妹身上得到第一手的異性資訊，進而有效去除對異性的神秘感。能使龍鳳胎個別都能建立良好的性別認同根基，跟其他的小孩比起來。龍鳳胎的孩子也更能夠與其他的異性自在相處，在這樣的狀況下。龍鳳胎可能會出現較少的性別典型行為例如男生動作粗魯，女生溫和愛哭等。舉止上可能顯得比較中性，有些家長也許並不太期待這樣的狀況。但無論如何家長給予孩子足夠的支持，可以讓孩子更能夠適性成長。另外，龍鳳胎也更容易出現性別典型能力的互補。也就是說，一般我們期待男孩子的數理能力強、女孩子的語文能力強。但龍鳳胎可以因為長期的相處影響，在這些典型的能力上表現可能會較平衡。

五刻板印象

龍鳳胎父母也可能會依性別刻板印象以不同方式對待孩子，例如較照顧女生或較重視男生的需求。雖然說只要是人，就很難避免在對待不同的人時發生不公正的情況。但稍微不相同的對待，都可能讓敏感的孩子察覺。在不知不覺中影響到孩子的生活方式或身心發展。做為一個願意幫助孩子成為更好的人的父母，在這個部分首先要做到的是能夠「提高警覺」。父母之間可以互相提醒，自己也可以隨時問自己是否以刻板印象和孩子相處或限制了孩子只要能夠盡可能注意到不夠妥當的舉動。雖然當下可能已經無法收回，但只要注意到就有能力改變。一點點的改變，可以對孩子的生活影響很大。以上是一些關於教養龍鳳胎的小撇步，希望能幫助龍鳳胎的家庭在教養孩子上能夠更有方法。不過，每個家庭都有自己的故事。會有不同於其他家庭的地方，這些特殊性有時無法單單由上述的幾大方向全部涵蓋。最重要的還是家庭本

身的運用及努力，相信每個家庭都有專屬於自己的能量。
。找對了方法，不管是龍鳳胎的發展。或是家庭的情感和
經濟負荷，都會走出一條美好的路。

來源：requirements

三千一百一十一
六百零五
二到二千九百一十二
五十五
二萬零二百六十二

來源：navs

-零到零 --五十 ---四到八 -四到七十 --九萬零七十 --二 --六萬一
千五百一十五到零 -十二兆四千零二億九千二百七十二
萬七千零六 --二十五

----五十二萬四千三百四十六 --四百到一 -九十 --三百 --十三
萬六千九百六十四 --

--十一 ---

----五十二萬四千三百四十六 --四百到一 -九十 --三百 --十三
萬六千九百六十四 --

--十一 ---

----五十二萬四千三百四十六 --四百到一 -九十 --三百 --十三
萬六千九百六十四 --

--十一 ---

----五十二萬四千三百四十六 --四百到一 -九十 --三百 --十三
萬六千九百六十四 --

--十一 ---

-----八千九百四十五到四百七十九 ---十四到十四 ---二 --九
十 --三百 ---一

--十一 ---

-零到零 --五十 ---四到八 -四到七十 --二 --二十五到零 -十二兆
四千零二億九千二百七十二萬七千零六 --六萬一千五百
一十五

-----八千九百四十五到四百七十九 ---十四到十四 ---二 --九
十 --三百 -

-----一

--十一 ---

----五十二萬四千三百四十六 --四百到一 -九十 --三百 --十三
萬六千九百六十四

--十一 ---

----五十二萬四千三百四十六 --四百到一 -九十 --三百 --十三
萬六千九百六十四

--十一 ---

----五十二萬四千三百四十六 --四百到一 -九十 --三百 --十三
萬六千九百六十四

--十一 --

----五十二萬四千三百四十六 --四百到一 -九十 --三百 --十三
萬六千九百六十四

---十一

--十一 ---

來源：mismatch_log

一百五十
一百八十
一百九十一
三百一十三
三百一十六
三百二十三
三百二十七
三百三十四
四百七十一
四百七十六
四百八十一
四百八十六
四百九十一

來源：mismatch_log

一百五十
一百八十
一百九十一
三百一十三
三百一十六
三百二十三
三百二十七

三百三十四
四百七十一
四百七十六
四百八十一
四百八十六
四百九十一

來源：mismatch_log

一百五十
一百八十
一百九十一
三百一十三
三百一十六
三百二十三
三百二十七
三百三十四
四百七十一
四百七十六
四百八十一
四百八十六
四百九十一

來源：前端功能彙整

頁面製作用成繁體中文

功能列由左至右

一首頁

二懷孕孕媽紀錄

三小孩紀錄

四懷孕知識

五孕媽個人資訊

一首頁

加入碼右下小角落

第一框格胚胎嬰兒卡通圖片大頭貼大小、週數天數【上方
製作切換按鈕懷孕胚胎照片週數出生嬰兒週數】

第二框格左上半格照顧者協助每日注意事項；左下半格
歷史回顧按鈕；右半格照顧者任務清單勾選

第三框格身體成長變化折線圖【孕媽小孩切換按鈕】

二懷孕記錄

懷孕週數 預產期 最後月經日 新增按鈕

每日心情文字輸入、身體狀況輸入 大型日曆點選日期可以新增資訊

孕檢紀錄資訊 新增按鈕【平時預設看不見；設置按鈕可以點選紀錄顯示】

三 小孩紀錄 預設出生到三歲的紀錄

第一框格 懷孕胎數、小孩乳名、出生時間（年月日時分）、出生周數／身長（公分）／體重（公克）／頭圍／胸圍、生產方式（自然生產、產鉗、真空吸引、剖腹產、其他

第二框格 成長地圖 小孩成長照片 大型日曆，點選日期可以新增資訊 重要活動紀錄、小孩身體紀錄按鈕……等等

第三框格 成長時間軸【依照重要活動紀錄未完成的先鎖定已完成則打開】

四 懷孕知識

對話框像是對話

漢堡選單對話歷史紀錄

五 孕媽個人資訊

孕媽名字

身高、體重

懷孕月份胎數 新增欄位按鈕 寶寶乳名、預產期 最後月經日

心情歷程圖標多種表情符號

額外畫面歷史回顧

時間軸從懷孕紀錄至小孩成長紀錄文字和照片放一起

來源：mismatch_log

一百五十
一百八十
一百九十一
三百一十三
三百一十六
三百二十三
三百二十七
三百三十四
四百七十一
四百七十六

四百八十一
四百八十六
四百九十一

來源：20251125

一千一百二十五 中午十二：十五到十三：零

- 一 代理人（重複性質、自然語言處理）
- 二 這週先理解代理人概念
- 三 聲音（語氣、情緒）的分析
- 四 特定族群？（網紅）
- 五 預測後續、未來趨勢走向（生涯）
- 六 爬蟲（容易出錯）
- 七 評論（容易不真實）可以爬其餘資料
- 八 投資？（模擬測試難）
- 九 協助中小型創業（設定預算等）參考市面創業公司所使用的工具
- 十 代（團）購代理人可以協助整理表單圖片以及偵測金流匯款，整理後再交由給購買方（主要族群；後續新增功能）

問看看身邊朋友團購開團模式（純本身操作、不提物流）

買賣小平台購買下單格式、金額購買（在一個網站內解決）

十一 懶惰熊（）創業團隊參考對象

來源：20251202

一百二十二 中午十二：零到十三：零

- 一 可以朝共同學習、方式老師建議）
- 二 朝行事曆
- 三 朝心理疾病
- 四 旅遊導覽、規劃
- 五 企業功能（排班）
- 六 千一百二十八 想法：計算木材料及價格比較及推薦

來源：20251209

一百二十九 中午十二：十五到十三：零

- 一 計算材料大小及廠商價格，也可以思考剩下的邊角料可以如何運算，材料上運用金工、漆、光固化、線材【三模型】等等；三建模的設計平台
- 二 推薦系統（老師建議）：根據心情可以推薦電影、影視、書籍…
- 三 可以寫的心得報告推薦（現在可能推薦的不相符自己的想要的）
- 四 讓可以先看完影視、書籍內容後，寫出字的客觀性簡介或心得，再推薦給其他觀看者

來源：20251210-11

一千二百一十下午四百到五百

填寫社群申請單

一千二百一十一下午一千零三十到一千一百三十

一看見影印店老闆，想到代購的部分可以不用侷限於一種產業，但具體還沒想到可以如何使用

二之前專題大多是醫療，有一主題預知夢與新聞有甚麼連結、或者與諮商師溝通

三自媒體發展，可以協助賣家可以如何宣傳自己的帳號或商家

四旅遊，可以請偵測網路票價是否為優惠價，如果是直接自動買入或者提醒

五學習，跨領域學習平台、學習連結

六代理人是否可以跟生成式做結合，有推薦系統

先寫目前想法重點式交由給指導老師

主題

·代購、影印店減少繁瑣流程、不限領域 -思妤

·創新創業自媒體 -佳穎

·材料計算大小、比價 -育臻

·旅遊優惠價提醒 -凱恩

·學習 -子祈

·推薦書籍、影集、音樂等

可思考代理人推薦系統生成式

來源：20251216

一千二百一十六下午五：零到六：零

給導師主題：材料、創新創業結合代購

創新創業代購一小部分功能自媒體一小部分功能

資金

來源：20251230

一千二百三十中午一千二百三十到一千三百與指導老師討論

木材提案缺點專業性同學只有一位，所以討論性較低，如果要用製作無法可以更加深入核心

創新創業提案選定【行業別】後續的設計功能可以更加多元針對性困難問題痛點

行業別可以選定感興趣的【行業領域族群】更加深入創業困難點

協助行業創業

引起評審聽眾『共鳴度』

對於功能使用需要扮演的【角色】

專題走向傳統一問一答；現在交給代理人更多權限，可以幫我們做更多事情

系統可以用主機製作，後續用與系統主機做連線，達到在外方便修改建立更完善的資料庫

相關想法人力排班朋友們可出門時間

來源：20260119

二千零二十六萬零一百一十九晚上九百到十：零

思好代購蝦皮聊天回復不是很完善最大問題無法尋找使用者，除非剛好找到代購團

凱恩法律【專利侵權、肖像權】向量資料庫、【智慧助理】共享行事曆

佳穎像子祈的使用者可以專注更創意的東西，研發菜品；長輩可以快速點餐幫助提醒使用者使用者的材料問題材料成本要怎麼紀錄會比較好

育臻愛珍食商品更新不及時、延伸發想比較受限

法律專利權訴狀書、詢問法律問題、上傳專利書核對是否有相同的專利類似程度

來源：20260120

二千零二十六萬零一百二十晚上八百到九百與老師討論

前四點為組內討論

一後續會確認操作

二可能會有收費成本

三想法點子：智慧助理（結合行事曆、記帳、飲食）、法律專案、代購想法

四特色：整合生活上的功能？更加特別的功能？

排行程（雖然市面有，看是否想到更不一樣的功能）

跟市面不一樣的地方，分兩種個人、共享

後四點為與老師討論

一 智慧助理兩種不同的共享方式家庭式共享群組標籤共享

建議使用，前期調查可以更方便；功能有記帳【記帳雞】基礎記帳，可以更深入地去做使用看看，討論區，蒐集優缺點，看看有沒有可以理解功能做使用，或者設計上避開相同點一般使用者提出的問題等；多去看評論的意見

二 行事曆更貼近生活創業需要有更強烈的心

三代購代購為核心，要如何設計流程的話智慧比對也不錯但流程資訊處理要做發展二評要如何呈現處理流程

四法規向量資料庫，較多工作蒐集整理法律資料轉移資料庫，前端就可以變成很簡單，較困難的後端；以專題學習較多，但以競賽的話較吃虧

-使用者部分不太熟悉的話，可以如何讓這部分人更快上手

-針對某功能更深入的想法，功能不一定要多

-收斂兩、三個主題之間應用，功能慢慢確認

-可能會有次數限制，可以不全用製作，可以用傳統的部分製作

暫定主題決定智慧助理專題較為優勢行事曆、記帳提醒的功能、語音輸入、生成式回覆

一鍵輸入安排好整天行程、紀錄整天消費金額跟整天行程

代購核心流程較重要較為困難

法規以專題學習較多，但競賽較為吃虧看能不能結合到【用向量資料庫】

主題更貼近生活，調查工作需要更清楚，記帳功能記帳雞

查看使用者的評論和一些意見

代購的流程

來源：20260122

一百二十二晚上八百三十到一千

基礎初評前完成

進階複評前完成

附加不一定會完成的功能

記帳

一發票載具連動可能會有問題附加功能

二虛擬金流模擬無法用真實交易紀錄附加功能

三朋友出門一起開的共享帳本基礎功能

四歷史金額可以照『最新』或『次數最多』排列，如有相同的部分可以做選擇基礎功能

五輸入基本必要資訊，自動偵測消費分類進階功能需要再討論；可與行事曆做結合，變成更密切一點；看要不要做小互動養電子雞之類的附加功能

六金額分類分析基礎功能可以指出消費異常【待討論】

七設定每月基礎分類預算，提醒預算金額是否會超過基礎功能

八儲存目標金額基礎功能

九每月回顧歷史消費習慣進階功能

十幣值切換當下匯率附加功能待討論

十一拍照定位附加功能

十二輸入當下錢包金額，半自動平帳進階功能

十三訂閱制補充

十四預設帳戶可以先用一項現金，其他支付可以用新增基礎功能

十五直接用小算盤輸入消費金額基礎功能

來源：20260127

一百二十七晚上八百三十到九百三十

行事曆

基礎

一輸入相同行程會跳出之前設定的顏色類別時段

二不同類別行事曆用不同顏色區分

三篩選年月時可以選擇年月不用一個月一個月滑

四移動行程

五複製行程

六搜尋功能

進階

一行事曆結合記帳和照片回顧更完整紀錄一天發生的事

情

附加

- 一 結合倒數天數（距離開學剩餘…天）
- 二 不同行事曆都會跳通知
- 三 可新增活動標籤顏色
- 四 目標導向（先幫自己設立目標後，用助理去做提醒）
- 五 作息提醒

來源：20260130

一百三十晚上八：零到九：三十

一 記帳、行事曆、飲食紀錄可以有相關性

二 飲食紀錄有食物部分（暫不考慮）

三 可能會像日記角度出發重點：

練習技術、創意（記帳可能會有限制）、說明、連結資料庫（結構上）、可以從日記的角度看看（比較好發揮）

用連結到後端、用自然語言分類、「說」一句話寫進資料庫、如果直接拍照進入資料庫？、後端嚴謹前端簡單

建議：把記帳功能萃取、保留後續功能性、功能更收斂

缺了一個很有趣的亮點，說不太出的發光點

創意上的創意：說明紀錄

但有沒有另類的創意？

跳脫記帳帳本？發想：甚麼甚麼的紀錄（秒數、步數等）某個金錢的紀錄

讓主題變得更有趣

後續擴充很足夠，但技術可能需要實驗出

主要：先把功能收斂（重要點：技術處理不太一樣）

操作上：可能用說一句話，說明文字萃取出來，會不會把發票拍照儲存？

每月回顧文字、圖表等等輸入輸出

！功能明確的輸入輸出方式！

！！挑幾個不一樣功能做測試！！

情境上：甚麼功能可以用甚麼網站、開啟？

單純直接用網站可以

或者用等不熟悉的開啟

目標：尋找讓人很有同感的功能

記帳管理錢的部分，有沒有沒有想到的另外的可能性（可以讓評審會心一笑的）

說、拍、唱等不同功能輸入進資料

健康可以做成一個切入點

不同紀錄（飲食控制？）

文件給老師看，確認好的話可以思考資料庫

來源：20260203

二十三晚上八百三十

孕期紀錄的功能

一 孕期百科

二 懷孕記錄自動新增小孩狀況

三 情緒價值

四 活動資訊（抓周、性別趴）

五 相簿（超過容量付費）

六 小孩應該做的事情（爬、長牙）

七

定位的方向

產前記錄媽媽情緒

產後記錄小孩成長過程

來源：20260206

二十六晚上八百二十~

以記帳為基礎

一、懷孕紀錄【媽媽懷孕~小孩出生三歲】

一 孕期百科

二 懷孕身體記錄自動新增小孩狀況

三 情緒價值

四 活動資訊【抓周、性別趴】

五 相簿【超過容量付費】

六 小孩應該做的事情【爬、長牙】

七 懷孕~出生後用品預算

來源：20260209

二十九晚上九百到一每周推至少零到五次

二要傳訊息到群組

孕媽媽手冊育臻

一 基本初始檔案孕媽媽身體狀態過敏物質產前檢查等

二 孕期小知識

三 胎體變化

四 檢查項目紀錄表可分例行基本檢查跟篩檢

五 產檢時間表【每周】

六 危險徵兆檢測

七 生產計劃書【生產時醫生可以怎麼幫助你】

八 寶寶紀錄

九 孕媽媽小筆記日記

孕媽媽手冊佳穎

一 產檢日曆與任務

產檢前提醒以及注意事項

二 增加爸爸提醒

提醒爸爸可以幫媽媽按摩、提早準備待產包

三 生產計畫

按鈕點選直接生成一張圖

兒童健康手冊子祈

一 整合孕期、產後與幼兒成長相關紀錄於同一平台

二 降低家長在多個與紙本手冊之間切換的負擔

三 透過提供即時提醒與便利的日常使用方式

四 強化長期健康與成長紀錄的連續性與完整性

五 以紀錄、提醒與陪伴為核心，不取代醫療行為

統整

孕前

媽媽個人資訊（過敏原、疾病史…

懷孕問答（含孕期身體不適百科孕媽媽健康操

懷孕紀錄產檢周記、超音波檢查紀錄、檢查項目紀錄表、

回診提醒孕婦衛教手冊需再篩選

孕婦聊天機器人

懷孕知識小遊戲
爸爸任務（產檢包準備了嗎、幫媽媽按摩小腿
生產計劃書

孕後
小孩成長紀錄地圖（兒童健康手冊
超音波照、幼兒照紀錄

來源：20260210

二百一十晚上八百~

懷孕問題

三個階段可選擇使用

一可能使用提示詞工程完成懷孕功能
二根據規則精準回答
三微調模型

懷孕紀錄

考慮連到行事曆或是其他，因為資訊不一定記錄在資料庫

聊天機器人

人設閨密護理人員...

根據孕婦最需滿足的需求失落想東想西憂慮...情況制定
機器人說話方式

八排程

推播可以免費嗎？計費模式

主題的資料庫會比較特別

跟平台的不同：以日期當作紀錄

程式端用（前提是資料庫完整

工作流設計

一資料庫設計

二孕婦真正需求

三系統推撥

來源：20260221

二百二十一晚上九百～

詢問導師與導師解釋

通過使用者電子郵件
(我們想用直接連結登入)

(第九列五十字數)可改一百字
怕系統跟結合字數需要過長

!過敏原!五十字數(不確定字數要不要改多)疾病長度

自動編號
所以暫沒有修改

懷孕紀錄
解釋黃色是紅色是

完整紀錄開心、憤怒、悲傷、心跳加速
心情、身體狀態從完整敘述抓取所以字數暫時不長

待討論心情身體狀態每天一項或多項?多表格或標點符
號做區隔

拆分有需要值嗎

來源: 20260225

二百二十五晚上八百三十～

通過使用者電子郵件登入第三方登入

字數可先使用五十

過敏原字數長度代號、名稱、完整的過敏原

心情完整紀錄開心、憤怒、悲傷、心跳加速字數暫時不長
字數少沒問題

心情、身體狀態每天一項或多項一天無限制輸入次數，要
如何呈現

拆分有需要值嗎

不一定要製成資料庫表格，無訓練下可訓練好

向量資料庫因為我們有規範的資料

轉成向量資料庫

現有資料切割成

問題整理成後再轉成資料庫

一 可靠資料庫

來源：20260309

三十九中午一千二百到一千三百

端推送文件確認

後端思妤、凱恩

前端佳穎、子祈、育臻

會議記錄育臻

競賽文件佳穎

來源：20260317

三百一十七中午十三：零到一歷屆是用當、扣登入或者其他方式登入

二家庭群組的代碼？一次性永久性？爸爸怎麼加入？

流程：媽媽先建好資料（照小孩的數量）產生家庭代碼協助者加入

一過敏疾病、樹洞先不製作，後續看情況

二資料庫（系上）

三畫面版面

可以支援向量資料庫

一資料庫

二資料庫連結

三建立測試檔（三，五）

四檢查三第三正規式（最基本）

來源：20260325

三百二十五中午十二：十到一每個人每週至少推二、三次

二版面

三協助者不會是一個首頁功能（調整）

四首頁太死板，按鈕可以放在功能列，點進去可以看到資訊內容

五成長地圖優：日期、紀錄，左邊可以思考是否做滑動，做標記已完成的工作、活動

六顏色再換

七頁面參考、樣式畫面

八初評三本複評三本正式版一本共七本

九分工

第一章前言佳穎

第二章營運計畫佳穎

第三章系統規格凱恩

第四章專案時程與組織分工思好

第五章需求模型子祈、育臻

第六章設計模型子祈、育臻

第七章實作模型子祈、育臻

第八章資料庫設計思好

來源：20260330

三百三十中午一千二百到一千二百四十

一網站因為大部分現代人都會以手機開啟頁面網站，所以會先以手機畫面為主，後續會新增響應式網站

二版面設計

孕前孕後是否要分開

漢堡選單是否要留著

主要功能排列順序要更明確的功能位置

網站上面要有的功能對應到資料庫

日期以星期天為開始

產生版面的話可以請他用中文產生

三發想主題名稱及主題簡介二十字以內

四訓練模型心情不確定會不會偵測中文

下次開會四十九萬一千二百到一千三百三十

來源：20260331

三百三十一中午十二：零到十三：零與導師討論

先專心製作可以不用分部門

分工跟歷屆不一樣（嘗試將分工合再一起）

不一定需要完全分開

每個人都可以參與部分生成（生成式經驗）

後端部分暫時先不製作

- 一 模板後面介面會做修改（響應式網站、功能配對）
- 二 網站不一定要用程式碼慢慢刻，可以用生成（溝通經驗）做調整《不寫》
- 三 文件內容可以用生成，但需要理解自己在做什麼
- 四 參考部分版型「不完全包括所有功能」，一步一步將輸入版創造不同畫面結合不同的工具製作
- 五 先找看看哪個方案比較合適完成專案（先找資料）確認好可以先生成樣板《每個人都要確認過》
- 六 生成完後生成程式碼
- 七 生成的小地方需要注意有沒有要修改
- 八 等檔案完成

介面生成中文

子祈孕前孕後放一起；育臻孕前孕後分開

協助者畫面

資料庫記得先下載檔案做備用（以免遺失）

專案製作順序

一 模板、畫面（

二、資料庫程式碼（

三 文件生成（）

連假～結果

來源：20260409

四十九中午一千二百到一千三百三十

畫面要用成

功能列左到右

一首頁右下角名稱【加入碼】小孩卡通小圖片、懷孕週數【出生週數】小按鈕可以切換、照顧者協助清單勾選、變化折線圖、歷史回顧按鈕

二 懷孕純紀錄孕媽紀錄孕前生產孕後放一起預產期最後月經日大型日曆新增按鈕資訊【年月日】、孕檢按鈕切換可看不看【預設】、心情輸入

三 小孩純紀錄小孩資訊大型日曆新增按鈕、成長地圖類似孕檢按鈕【預設到三歲】、時間軸按鈕【預設鎖定完成打開】

四 懷孕知識下面要有對話框，像是或、歷史紀錄漢堡選單

五 孕媽個人資訊修改孕媽資訊按鈕、新增懷孕胎數小孩
資訊【新增欄位按鈕寶寶名稱、孕產期】、心情歷程的圖標
表情符號修改

來源：20260413

四百一十三 中午十二：零到十三：零（佳穎請假）

一 切換使用者
二 協助者清單（多查看全部清單、未來三天清單〔左右滑
〕、展開更多清單）
三 產檢紀錄改產檢、功能顯示
四 生長趨勢（寶寶畫面）新增切換身高體重按鈕
五 第二頁去掉產檢紀錄；月曆、紀錄同區塊（底部同色）；
新增修改調整

子祈新增修改畫面

育臻統整畫面

來源：20260414

四百一十四 中午一千三百到一千三百三十

小孩成長任務

畫面架構

資料輸入

下次討論期中考後五百一十二

來源：20260420

四百二十 中午一千二百到一千三百三十

競賽簡報六分鐘主要商業模式分析、產品介紹

一 背景環境改相關圖片根據的統計圖表、數據
二 資料調查報告說明數據要更完整
三 五力分析版面修改修改目標重點大字或調色、其餘變
小

畫面

一 清單畫面最多呈現五個、剩下放入查看全部
二 寶寶折線圖去掉標準虛線
三 電腦畫面（初評後）調整完整畫面（不用成集中式的）
四 頁首寶寶切換畫面（全部都放）
五 懷孕紀錄新增「格子表標題」、「日期」「正式產檢」框架
位置調整（產檢紀錄隱藏）『分一半檢查產檢』、心情標籤
去掉新增、「修改」按鈕變大

來源：20260427

四百二十七 中午十二：零到十三：三十

- 一 心情顯示紀錄用胎動次數去掉（改成有在產檢紀錄的資訊）
- 二 切換胎數不用切時間；孕期紀錄的切換位置移回原本位置
- 三 胎心率的標籤調整
- 四 去掉生產院所
- 五 剛出身標籤
- 六 月份切換單獨切年、月
- 七 新增里程碑、新增活動去掉
- 八 里程碑篩選選擇按鈕
- 九 個人區塊新增：照顧者名單
- 十 簡報檢查

五百一十一 開會：專題名稱（設計概念）

來源：20260511

五百一十一 中午一千二百到一千三百三十

- 一 文件要開始動工
- 二 前端畫面小改
- 三 協助者畫面輸入加入碼媽媽畫面跟照顧者畫面
- 四 註冊畫面身分挑選

來源：20260518

五百一十八 中午一千二百到一千三百三十

一 名稱投票

詞三票

詞四票發想延伸

詞兩票

三票備案

五票製作

兩票

- 二 手冊文件重要先動工
- 三 程式修改到、、、檔資料庫連結

來源：20260519

五百一十九 中午一千二百到一千三百三十與老師討論、佳穎請假

- 一 後端 前端 及 邏輯 是用 那些 程式 製作
- 一 前端
- 二 邏輯 教育 版的
- 三 後端
- 二 ...
- 三 多 嘗試 使用 不同 系統 製作
- 四 畫面 呈現 前端 大致 完成 接續 跟 資料庫 連結
- 五 下周、下下周 查看 程式碼 【需要 可以 運行】

下次 開會 與 老師 五百二十七 中午 一千三百

來源：123

(無中文內容)

來源：supabase0512

--
--

來源：supbase

--
--