

גיאומטריה דיפרנציאלית — תרגולים

חצ'טריאן-רזיאל יובל

תוכן עניינים

4	פתח דבר
5	1 תרגול: 1 סיווג עקומות ומשטחים ממעלה שנייה
5	1.1 התהליך בקצרה
9	1.2 טבלאות ייחוס: הצורות הקנוניות
9	1.2.1 עקומות ריבועיות ב- $\mathbb{R}^2$
9	1.2.2 משטחים ריבועיים ב- $\mathbb{R}^3$
10	1.3 תרגילים: עקומות ריבועיות ב- $\mathbb{R}^2$
18	1.4 תרגילים: משטחים ריבועיים ב- $\mathbb{R}^3$
26	1.5 סיכום הסיווגים
27	2 תרגול: 2 גיאומטריה דיפרנציאלית של עקומות במישור
27	2.1 עקומות פרמטריות
28	תרגילים
30	2.2 מהירות, רגולריות ואורך קשת
32	תרגילים
38	2.3 הוקטור המשיק והנורמלי
38	תרגילים
41	2.4 עקמומיות
43	תרגילים
45	2.5 משפטי יחידות
46	תרגילים
49	2.6 עקומות סגורות ועקמומיות כוללת
49	תרגילים
51	2.7 מקורות
52	3 תרגול: 3 עקמומיות בפרמטריזציה כללית, המעגל המשיק והאווולוט
52	3.1 עקמומיות בפרמטריזציה כללית
53	תרגילים
60	3.2 המעגל המשיק
61	3.3 האווולוט והאינוולוטה
65	תרגילים
75	3.4 מקורות
76	4 תרגול: 4 עקומות במרחב
76	4.1 מכפלה וקטורית
78	תרגילים
80	4.2 עקומות במרחב
81	4.3 מערכת פרנה-סרה
83	תרגילים

85	חשוב עקמומיות ופיתול	4.4
87	תרגילים	
105	מקורות	4.5
106	5 תרגול: 5 סכימת איינשטיין ומשטחים	5
106	סכימת איינשטיין	5.1
106	המוסכמה	5.1.1
110	שימושים מוכרים	5.1.2
118	סימטריזציה ואנטי-סימטריזציה	5.1.3
120	משטחים	5.2
120	הגדרות	5.2.1
122	שלוש הצגות מקומיות של משטח	5.2.2
124	דוגמאות	5.2.3
127	משטחי סיבוב	5.2.4
135	מקורות	5.3

פתח דבר

מערכי תרגול לקורס בגאומטריה דיפרנציאלית, קיץ 2026, תשפ"ו — 88201.

מרצה: ניקול צאירי

מתרגל: יובל חצ'טריאן-רזיאל

הגרסה המקוונת, הכוללת את הציורים האינטראקטיביים, זמינה בכתובת:

<https://yuval-khachatryan.github.io/Differential-Geometry-Recitations-Summer-2026>

הערות ותיקונים — נא לשלוח למייל של המתרגל, כפי שמופיע באתר הקורס, או לפתוח issue ב-GitHub.

1 תרגול: 1 סיווג עקומות ומשטחים ממעלה שנייה

כל תבנית ריבועית ניתנת להצגה, במערכת קואורדינטות מתאימה שתמיד קיימת, בצורה שאין בה איברים מעורבים $x_i x_j$ אלא ריבועים בלבד.

יתרה מזו, אפשר תמיד לבחור את מעבר הקואורדינטות כך שמטריצת המעבר תהיה אורתוגונלית ובעלת דטרמיננטה 1 — כלומר סיבוב של הצירים. בצירוף השלמה לריבוע, שאינה אלא הזהה של ראשית הצירים, מתקבלת הצורה הקנונית.

נזכיר שמעבר אורתוגונלי הוא איזומטריה: הוא משמר אורכים וזוויות. גם ההזהה היא איזומטריה, ולכן כל התהליך כולו הוא איזומטריה. מכאן שהצורה הגיאומטרית עצמה אינה מושפעת ממעבר הקואורדינטות — אליפסה נשארת אליפסה ואורכי הצירים שלה אינם משתנים; מה שמשתנה הוא רק מערכת הצירים שממנה אנו מתבוננים בה.

בתרגול זה נתאר את התהליך, ונבצע את הסיווג ב- $\mathbb{R}^2$ וב- $\mathbb{R}^3$.

1.1 התהליך בקצרה

המטריצה. כל משוואה ממעלה שנייה ב- $\mathbb{R}^n$ נכתבת בצורה

$$F(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^t A \mathbf{x} + b^t \mathbf{x} + c = 0$$

כאשר A סימטרית,

$$a_{ii} = x_i^2 \text{ לדקמה לש}, \quad a_{ij} = a_{ji} = \frac{x_i x_j \text{ לדקמה לש}}{2}$$

דוגמה. עבור $2x^2 - 6xy + y^2 + 4x - 2y + 5 = 0$ המקדם של xy הוא -6 , ולכן $a_{12} = a_{21} = -3$, ומכאן

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad c = 5$$

לכסון. מאלגברה ליניארית: מטריצה סימטרית ניתנת ללכסון אורתוגונלי. כלומר קיים בסיס אורתונורמלי $\mathcal{C} = \{q_1, \dots, q_n\}$ של וקטורים עצמיים, ואם P היא המטריצה שעמודותיה הן $q_1, \dots, q_n$ אז

$$P^t A P = \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = P^t$$

מטריצת מעבר. תזכורת כללית: אם A הפיכה ו- $\mathcal{C} = \{C_1(A), \dots, C_n(A)\}$ הוא הבסיס הנפרש על ידי עמודותיה, אז A פועלת כמטריצת המעבר $[I]_E^{\mathcal{C}}$, כאשר E הוא הבסיס הסטנדרטי. אצלנו $\mathcal{C}$ הוא בסיס הווקטורים העצמיים, ולכן

$$\mathbf{x} = P \mathbf{u}$$

כאשר $\mathbf{u}$ הוא וקטור הקואורדינטות ביחס ל- $\mathcal{E}$. מ- $P^{-1} = P^t$ מקבלים את הכיוון השימושי

$$\mathbf{u} = P^t \mathbf{x}$$

המשוואה החדשה. נציב $\mathbf{x} = P\mathbf{u}$, כאשר $\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_n)^t$. האיבר הריבועי:

$$\mathbf{x}^t A \mathbf{x} = (P\mathbf{u})^t A (P\mathbf{u}) = \mathbf{u}^t (P^t A P) \mathbf{u} = \mathbf{u}^t \Lambda \mathbf{u} = \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i^2$$

ובאותה דרך, האיבר הליניארי:

$$\mathbf{b}^t \mathbf{x} = \mathbf{b}^t P \mathbf{u} = (P^t \mathbf{b})^t \mathbf{u} = \sum_{i=1}^n \beta_i u_i$$

כלומר גם b עובר לקואורדינטות החדשות, $\beta = P^t b$. בסך הכול

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i u_i^2 + \sum_{i=1}^n \beta_i u_i + c = 0$$

האיברים המעורבים נעלמו.

השלמה לריבוע. משלימים לריבוע בכל קואורדינטה בנפרד. עבור i שעבורו $\lambda_i \neq 0$, מוציאים את λ_i מחוץ לסוגריים ומוסיפים ומחסרים את ריבוע מחצית המקדם של u_i :

$$\lambda_i u_i^2 + \beta_i u_i = \lambda_i \left(u_i^2 + \frac{\beta_i}{\lambda_i} u_i \right) = \lambda_i \left[\left(u_i + \frac{\beta_i}{2\lambda_i} \right)^2 - \left(\frac{\beta_i}{2\lambda_i} \right)^2 \right] = \lambda_i \left(u_i + \frac{\beta_i}{2\lambda_i} \right)^2 - \frac{\beta_i^2}{4\lambda_i}$$

האיבר הליניארי נבלע בתוך הריבוע: הביטוי $u_i + \frac{\beta_i}{2\lambda_i}$ הוא המשתנה המוזז, כלומר השלמה לריבוע היא בסך הכול הזזה של ראשית הצירים בכיוון q_i .

עבור i שעבורו $\lambda_i = 0$ אי אפשר להשלים לריבוע באותה קואורדינטה, והאיבר הליניארי $\beta_i u_i$ נשאר.

איסוף האיברים הליניאריים. ייתכן שיותר מקואורדינטה אחת מקיימת $\lambda_i = 0$ עם $\beta_i \neq 0$, ואז נשארים כמה איברים ליניאריים. במקרה כזה מבצעים **סיבוב נוסף בתוך גרעין** A — המרחב הנפרש על ידי הווקטורים העצמיים שהערך העצמי שלהם 0. סיבוב זה אינו נוגע כלל בחלק הריבועי, שכן A מתאפסת על הגרעין ואין שם איברים ריבועיים שיושפעו ממנו.

נניח שנשאר $\beta_2 u_2 + \beta_3 u_3$, ונסמן $\rho = \sqrt{\beta_2^2 + \beta_3^2}$. נגדיר קואורדינטות חדשות

$$\begin{pmatrix} u_2' \\ u_3' \end{pmatrix} = \frac{1}{\rho} \begin{pmatrix} \beta_2 & \beta_3 \\ -\beta_3 & \beta_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$$

המטריצה אורתוגונלית ובעלת דטרמיננטה 1 (בדקו!), ובקואורדינטות החדשות

$$\beta_2 u_2 + \beta_3 u_3 = \rho u_2'$$

כלומר כל האיברים הליניאריים התאספו לאיבר **יחיד**, והמשתנה u_3' נעלם מן המשוואה.

דוגמה. במשוואה $ax^2 = by + cz$ מתקיים $\lambda_1 = a$ ו- $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$, והחלק הליניארי הוא $by + cz$. בסימון $\rho = \sqrt{b^2 + c^2}$ נגדיר

$$v' = \frac{by + cz}{\rho}, \quad w' = \frac{-cy + bz}{\rho}$$

והמשוואה הופכת ל-

$$ax^2 = \rho v'$$

כאשר w' אינו מופיע בה כלל — כלומר **גליל פרבולי**.

לאחר האיסוף נשאר במשוואה לכל היותר איבר ליניארי אחד.

חיסול הקבוע החופשי. נניח שלאחר השלמה לריבוע ואיסוף האיברים הליניאריים נשאר איבר ליניארי יחיד, כלומר המשוואה היא

$$\sum_i \lambda_i U_i^2 = k + \mu u_j, \quad \lambda_j = 0, \mu \neq 0$$

נציב

$$U_j = u_j + \frac{k}{\mu}$$

וזוהי הזזה נוספת, בכיוון q_j בלבד. בקואורדינטה החדשה מתקבל

$$\sum_i \lambda_i U_i^2 = \mu U_j$$

הקבוע נעלם. הסיבה פשוטה: הזזה של u_j במרחק t משנה את האיבר μu_j בדיוק ב- μt , ומכיוון ש- $\mu \neq 0$ אפשר לבחור t שיבטל כל קבוע. לעומת זאת, כשאין איבר ליניארי כלל — אין במה לבלוע את הקבוע, והוא נשאר במשוואה.

שתי הצורות האפשריות. לאחר הסיבוב, השלמה לריבוע ואיסוף האיברים הליניאריים, כל משוואה ממעלה שנייה מגיעה לאחת משתי הצורות

$$\sum_i \lambda_i U_i^2 = k$$

או

$$\sum_i \lambda_i U_i^2 = \mu U_j$$

בצורה הראשונה הקבוע k הוא חלק מהותי מן הסיווג: הוא שקובע, יחד עם סימני λ_i , אם מדובר באליפסואיד, בהיפרבולואיד חד-יריעתי או דו-יריעתי, בחרוט או בקבוצה ריקה. בצורה השנייה אין קבוע כלל — בדיוק משום שהאיבר הליניארי בלע אותו. זו הסיבה שבטבלאות הייחוס הפרבולה נכתבת $x^2 = 4py$ והפרבולואיד $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$ — בלי קבוע — ואילו הגלילים, שאין בהם איבר ליניארי, נכתבים עם $= 1$.

הסיווג. נסמן ב- r את מספר הערכים העצמיים השונים מאפס ($r = \text{rank } A$), ב- f את מספר המשתנים החופשיים — אלה שאינם מופיעים כלל במשוואה הסופית — וב- ℓ את מספר האיברים הליניאריים שנשארו (0 או 1). תמיד מתקיים

$$n = r + \ell + f$$

שימו לב ש- $r = n$ פירושו גרעין טריוויאלי, ואז בהכרח $\ell = f = 0$; ואילו כאשר $r < n$ ומתקיים $f = 0$, בהכרח $\ell = 1$ — כלומר נשאר איבר ליניארי.

עקומות ב- $\mathbb{R}^2$:

הצורה	תנאי	f	ℓ	r
אליפסה	סימן באותו k זהים, סימנים	0	0	2
הריקה הקבוצה	מנוגד בסימן k זהים, סימנים	0	0	2
בודדת נקודה	$k = 0$ זהים, סימנים	0	0	2
היפרבולה	$k \neq 0$ מעורבים, סימנים	0	0	2
נחתכים ישרים זוג	$k = 0$ מעורבים, סימנים	0	0	2
פרבולה	—	0	1	1
מקבילים ישרים זוג	$k/\lambda > 0$	1	0	1
יחיד ישר	$k = 0$	1	0	1
הריקה הקבוצה	$k/\lambda < 0$	1	0	1

משטחים ב- $\mathbb{R}^3$:

הצורה	תנאי	f	ℓ	r
אליפסואיד	סימנים זהים, k באותו סימן	0	0	3
הקבוצה הריקה	סימנים זהים, k בסימן מנוגד	0	0	3
נקודה בודדת	סימנים זהים, $k = 0$	0	0	3
היפרבולואיד חד- או דו-יריעתי	סימנים מעורבים, $k \neq 0$	0	0	3
חרוט אליפטי	סימנים מעורבים, $k = 0$	0	0	3
פרבולואיד אליפטי	סימנים זהים	0	1	2
פרבולואיד היפרבולי	סימנים מעורבים	0	1	2
גליל אליפטי	סימנים זהים, k באותו סימן	1	0	2
הקבוצה הריקה	סימנים זהים, k בסימן מנוגד	1	0	2
ישר	סימנים זהים, $k = 0$	1	0	2
גליל היפרבולי	סימנים מעורבים, $k \neq 0$	1	0	2
זוג מישורים נחתכים	סימנים מעורבים, $k = 0$	1	0	2
גליל פרבולי	—	1	1	1
זוג מישורים מקבילים	$k/\lambda > 0$	2	0	1
מישור יחיד	$k = 0$	2	0	1
הקבוצה הריקה	$k/\lambda < 0$	2	0	1

כל שורה שבה $f \geq 1$ היא גליל: הצורה המתוארת ביתר המשתנים, נמתחת לאורך הכיוונים החופשיים. לכן טבלת $\mathbb{R}^3$ היא, למעשה, טבלת $\mathbb{R}^2$ בתוספת ממד אחד.

סימון. בתרגילים, במקום האינדקסים, נסמן את הקואורדינטות המסובבות ב- $\mathbb{R}^2$ ב- u, v, w וב- $\mathbb{R}^3$ את הקואורדינטות שלאחר ההזזה נסמן באותיות גדולות U, V, W ו- U, V בהתאמה.

האלגוריתם.

1. כתבו את המשוואה $\mathbf{x}^t A \mathbf{x} + b^t \mathbf{x} + c = 0$ עם A סימטרית.
2. מצאו את הערכים העצמיים מ- $\det(A - \lambda I) = 0$.
3. לכל ערך עצמי מצאו וקטור עצמי מ- $(A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$, ונרמלו אותו.
4. בנו את P שעמודותיה הווקטורים העצמיים המנורמלים.
5. חשבו $\mathbf{u} = P^t \mathbf{x}$ ו- $\beta = P^t b$.
6. כתבו את המשוואה החדשה $\sum_i \lambda_i u_i^2 + \sum_i \beta_i u_i + c = 0$.
7. השלימו לריבוע בכל משתנה שעבורו $\lambda_i \neq 0$.
8. סווגו לפי סימני λ_i והקבוע החופשי, וחשבו את המרכז או הקדקוד $\mathbf{x}_0 = P \mathbf{u}_0$ ואת הכיוונים הראשיים q_i .

1.2 טבלאות ייחוס: הצורות הקנוניות

1.2.1 עקומות ריבועיות ב- $\mathbb{R}^2$

שם	קנונית משוואה
מעגל	$x^2 + y^2 = R^2$
אליפסה	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
היפרבולה	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$
פרבולה	$x^2 = 4py$
ריקה קבוצה	$x^2 + y^2 = -1$
בודדת נקודה	$x^2 + y^2 = 0$
נחתכים ישרים שני	$x^2 - y^2 = 0$

1.2.2 משטחים ריבועיים ב- $\mathbb{R}^3$

שם	משוואה קנונית
כדור	$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$
אליפסואיד	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$
היפרבולואיד חד-יריעתי	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$
היפרבולואיד דו-יריעתי	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$
חרוט אליפטי	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$

שם	משוואה קנונית
פרבולואיד אליפטי	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$
פרבולואיד היפרבולי	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$
גליל אליפטי	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
גליל היפרבולי	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$
גליל פרבולי	$x^2 = ay$

1.3 תרגילים: עקומות ריבועיות ב- $\mathbb{R}^2$

שאלה 1.3.1.

סווגו את העקומה

$$3x^2 + 2xy + 3y^2 - 4x + 4y - 4 = 0$$

פתרון.

צורה מטריציונית.

$$(x \ y) \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + (-4 \ 4) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - 4 = 0$$

כלומר

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad c = -4$$

ערכים עצמיים.

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 3 - \lambda & 1 \\ 1 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = (3 - \lambda)^2 - 1 = (\lambda - 2)(\lambda - 4)$$

לכן $\lambda_1 = 2$ ו- $\lambda_2 = 4$.

וקטורים עצמיים. עבור $\lambda_1 = 2$ מתקבל $A - 2I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, כלומר $v_2 = -v_1$, ולאחר נרמול $q_1 =$

עבור $\lambda_2 = 4$ מתקבל $A - 4I = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, כלומר $v_2 = v_1$, ולאחר נרמול $q_2 =$
 $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^t$
 $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^t$

מטריצת המעבר.

$$P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^t = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^t A P = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

הקואורדינטות החדשות.

$$\cdot \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = P^t \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} x - y \\ x + y \end{pmatrix}$$

האיבר הליניארי החדש.

$$\beta = P^t b = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -8 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

המשוואה המסובבת.

$$2u^2 + 4v^2 - 4\sqrt{2}u - 4 = 0$$

השלמה לריבוע.

$$, 2u^2 - 4\sqrt{2}u = 2(u^2 - 2\sqrt{2}u) = 2\left[(u - \sqrt{2})^2 - 2\right] = 2(u - \sqrt{2})^2 - 4$$

ולכן

$$, 2(u - \sqrt{2})^2 + 4v^2 = 8$$

ובסימון $V = v, U = u - \sqrt{2}$, לאחר חלוקה ב-8:



$$\cdot \frac{U^2}{4} + \frac{V^2}{2} = 1$$

סיווג. שני הערכים העצמיים חיוביים — **אליפסה.**

מרכז וצירים. המרכז ב- $U = V = 0$, כלומר $u = \sqrt{2}, v = 0$:

$$\cdot \mathbf{x}_0 = P \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

המרכז הוא $(1, -1)$. אורך חצי הציר בכיוון q_1 הוא $\sqrt{4} = 2$, ובכיוון q_2 הוא $\sqrt{2}$; לכן הציר הארוך הוא בכיוון $q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)$.



מימין: העקומה בקואורדינטות המקוריות x, y ; משמאל: אותה עקומה בקואורדינטות הקנוניות U, V . הציר האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

שאלה 1.3.2.

סווגו את העקומה

$$x^2 + 4xy + y^2 - 6x - 6y = 0$$

פתרון.

צורה מטריציונית.

$$(x \ y) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + (-6 \ -6) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

כלומר

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \end{pmatrix}, \quad c = 0$$

ערכים עצמיים.

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 2 \\ 2 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)^2 - 4 = (\lambda - 3)(\lambda + 1)$$

לכן $\lambda_1 = 3$ ו- $\lambda_2 = -1$.

וקטורים עצמיים. עבור $\lambda_1 = 3$ מתקבל $A - 3I = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$, כלומר $v_2 = v_1$ ולכן $q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^t$. עבור

$\lambda_2 = -1$ מתקבל $A + I = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, כלומר $v_2 = -v_1$ ולכן $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^t$.

מטריצת המעבר.

$$P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = P^t, \quad P^t A P = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

הקואורדינטות החדשות.

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = P^t \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} x+y \\ x-y \end{pmatrix}$$

האיבר הליניארי החדש.

$$\beta = P^t b = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -12 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

המשוואה המסובבת.

$$3u^2 - v^2 - 6\sqrt{2}u = 0$$

השלמה לריבוע.

$$3u^2 - 6\sqrt{2}u = 3(u^2 - 2\sqrt{2}u) = 3\left[(u - \sqrt{2})^2 - 2\right] = 3(u - \sqrt{2})^2 - 6$$

ולכן

$$3(u - \sqrt{2})^2 - v^2 = 6$$

ובסימון $U = u - \sqrt{2}, V = v$, לאחר חלוקה ב-6:

$$\frac{U^2}{2} - \frac{V^2}{6} = 1$$


סיווג. סימנים מנוגדים — היפרבולה.

מרכז וצירים. ב- $U = V = 0$ מתקיים $u = \sqrt{2}, v = 0$:

$$\mathbf{x}_0 = P \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

המרכז הוא $(1, 1)$. ציר המוקדים מקביל ל- $(1, 1)$, $q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}$, והקדקודים נמצאים במרחק $\sqrt{2}$ מהמרכז לאורכו,

כלומר בנקודות $(0, 0), (2, 2)$, $\mathbf{x}_0 \pm \sqrt{2} q_1 = (2, 2), (0, 0)$.



מימין: העקומה בקואורדינטות המקוריות x, y ; משמאל: אותה עקומה בקואורדינטות U, V . הציר האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

שאלה 1.3.3

סווגו את העקומה

$$x^2 + 2xy + y^2 + 2x - 2y = 0$$

פתרון.

צורה מטריציונית.

$$(x \ y) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + (2 \ -2) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

כלומר

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad c = 0$$

ערכים עצמיים.

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 1 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)^2 - 1 = \lambda(\lambda - 2)$$

לכן $\lambda_1 = 2$ ו- $\lambda_2 = 0$.

וקטורים עצמיים. עבור $\lambda_1 = 2$ מתקבל $A - 2I = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ כלומר $v_2 = v_1$ ולכן $q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^t$. עבור $\lambda_2 = 0$ המערכת היא $v_1 + v_2 = 0$, ולכן $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^t$.

מטריצת המעבר.

$$P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = P^t, \quad P^t A P = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

הקואורדינטות החדשות.

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = P^t \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} x+y \\ x-y \end{pmatrix}$$

האיבר הליניארי החדש.

$$\beta = P^t b = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

המשוואה המסובבת.

$$2u^2 + 2\sqrt{2}v = 0$$

אין הזזה. ב- u המקדם הליניארי אפס, וב- v הערך העצמי אפס ולכן אי אפשר להשלים לריבוע — האיבר הליניארי נשאר. נחלק ב-2:



$$u^2 = -\sqrt{2}v$$

סיווג. פרבולה. הערך העצמי האפס אינו מנון את העקומה דווקא משום ש- $\beta_2 \neq 0$; אילו היה $\beta_2 = 0$ היינו מקבלים $u^2 = \text{const}$, כלומר זוג ישרים מקבילים או קבוצה ריקה.

קדקוד וכיוון. לא נדרשה הזזה, ולכן הקדקוד ב- $u = v = 0$:

$$\mathbf{x}_0 = P \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ציר הסימטריה מקביל ל- $(1, -1)$ ל- $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$, ומכיוון שמהמשוואה נובע $v \leq 0$, הפרבולה נפתחת בכיוון $-q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1)$.



מימין: העקומה בקואורדינטות המקוריות x, y ; משמאל: אותה עקומה בקואורדינטות הקנוניות U, V . הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

שאלה 1.3.4.

סווגו את העקומה, שייתכן שהיא מנוונת,

$$4xy + 4x - 4y - 4 = 0$$

פתרון.

צורה מטריציונית.

$$(x \ y) \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + (4 \ -4) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - 4 = 0$$

כלומר

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \end{pmatrix}, \quad c = -4$$

ערכים עצמיים.

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 2 \\ 2 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 4$$

לכן $\lambda_1 = 2$ ו- $\lambda_2 = -2$.

וקטורים עצמיים. עבור $\lambda_1 = 2$ מתקבל $A - 2I = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$, כלומר $v_2 = v_1$ ולכן $q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^t$. עבור

$\lambda_2 = -2$ מתקבל $A + 2I = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, כלומר $v_2 = -v_1$ ולכן $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^t$.

מטריצת המעבר.

$$P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = P^t, \quad P^t A P = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

הקואורדינטות החדשות.

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = P^t \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} x + y \\ x - y \end{pmatrix}$$

האיבר הליניארי החדש.

$$\beta = P^t b = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

המשוואה המסובבת.

$$2u^2 - 2v^2 + 4\sqrt{2}v - 4 = 0$$

השלמה לריבוע (הפעם ב- v):

$$-2v^2 + 4\sqrt{2}v = -2(v^2 - 2\sqrt{2}v) = -2\left[(v - \sqrt{2})^2 - 2\right] = -2(v - \sqrt{2})^2 + 4$$

ולכן

$$, 2u^2 - 2(v - \sqrt{2})^2 + 4 - 4 = 0$$

כלומר, בסימון $V = v - \sqrt{2}, U = u$,

$$.U^2 - V^2 = 0 \implies (U - V)(U + V) = 0$$

סיווג. סימנים מנוגדים אך הקבוע החופשי התאפס — **היפרבולה מנוונת**, כלומר זוג ישרים נחתכים.

נקודת החיתוך. ב- $U = V = 0$ מתקיים $u = 0, v = \sqrt{2}$:

$$.x_0 = P \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

הישרים. נציב $U = \frac{x+y}{\sqrt{2}}$ ו- $V = \frac{x-y}{\sqrt{2}}$. עבור $U - V = 0$:

$$, \frac{x+y}{\sqrt{2}} - \frac{x-y}{\sqrt{2}} + \sqrt{2} = \frac{2y}{\sqrt{2}} + \sqrt{2} = \sqrt{2}(y+1) = 0 \implies y = -1$$



ועבור $U + V = 0$:

$$. \frac{x+y}{\sqrt{2}} + \frac{x-y}{\sqrt{2}} - \sqrt{2} = \frac{2x}{\sqrt{2}} - \sqrt{2} = \sqrt{2}(x-1) = 0 \implies x = 1$$

הישרים הם $x = 1$ ו- $y = -1$, והם אכן נחתכים ב- $(1, -1)$.

אימות. הפולינום המקורי מתפרק לגורמים ומאשר את התוצאה:

$$.4xy + 4x - 4y - 4 = 4(x-1)(y+1)$$



מימין: העקומה בקואורדינטות המקוריות x, y ; משמאל: אותה עקומה בקואורדינטות U, V . הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

1.4 תרגילים: משטחים ריבועיים ב- $\mathbb{R}^3$

שאלה 1.4.1.

סווגו את המשטח

$$3x^2 + 2xy + 3y^2 + z^2 - 4x + 4y - 4z = 0$$

פתרון.

צורה מטריציונית.

$$, (x \ y \ z) \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + (-4 \ 4 \ -4) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

כלומר

$$.A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \\ -4 \end{pmatrix}, \quad c = 0$$

ערכים עצמיים. פיתוח לפי השורה השלישית:

$$. \det(A - \lambda I) = (1 - \lambda) \begin{vmatrix} 3 - \lambda & 1 \\ 1 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda) [(3 - \lambda)^2 - 1] = (1 - \lambda)(\lambda - 2)(\lambda - 4)$$

לכן $\lambda_3 = 1, \lambda_2 = 4, \lambda_1 = 2$

וקטורים עצמיים. עבור $\lambda_1 = 2$ מתקבל $A - 2I = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ ומכאן $v_2 = -v_1$ ו- $v_3 = 0$ כלומר

$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^t$ עבור $\lambda_2 = 4$ מתקבל $v_2 = v_1$ ו- $v_3 = 0$ כלומר $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^t$ עבור $\lambda_3 = 1$

מתקבל $A - I = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ וממנו $v_1 = v_2 = 0$ ו- v_3 חופשי, כלומר $q_3 = (0, 0, 1)^t$

מטריצת המעבר.

$$.P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^t A P = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

הקואורדינטות החדשות.

$$. \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = P^t \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (x - y)/\sqrt{2} \\ (x + y)/\sqrt{2} \\ z \end{pmatrix}$$

האיבר הליניארי החדש.

$$.\beta = P^t b = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8/\sqrt{2} \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4\sqrt{2} \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}$$

המשוואה המסובבת.

$$2u^2 + 4v^2 + w^2 - 4\sqrt{2}u - 4w = 0$$

השלמה לריבוע.

$$2u^2 - 4\sqrt{2}u = 2(u - \sqrt{2})^2 - 4, \quad w^2 - 4w = (w - 2)^2 - 4$$

ולכן

$$2(u - \sqrt{2})^2 + 4v^2 + (w - 2)^2 = 8$$

ובסימון $U = u - \sqrt{2}, V = v, W = w - 2$, לאחר חלוקה ב-8:



$$\frac{U^2}{4} + \frac{V^2}{2} + \frac{W^2}{8} = 1$$

סיווג. שלושה ערכים עצמיים חיוביים — אליפסואיד.

מרכז וצירים. ב- $U = V = W = 0$ מתקיים $u = \sqrt{2}, v = 0, w = 2$:

$$\mathbf{x}_0 = P \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

המרכז הוא $(1, -1, 2)$, ואורכי חצאי הצירים הם 2 בכיוון q_1 , $\sqrt{2}$ בכיוון q_2 , ו- $2\sqrt{2}$ בכיוון q_3 .



מימין: המשטח בקואורדינטות המקוריות x, y, z ; משמאל: אותו משטח בקואורדינטות הקנוניות U, V, W . הציר האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

שאלה 1.4.2

סווגו את המשטח

$$.x^2 + 4xy + y^2 + 2z^2 - 6x - 6y + 4z + 2 = 0$$

פתרון.

צורה מטריציונית.

$$, (x \ y \ z) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + (-6 \ -6 \ 4) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + 2 = 0$$

כלומר

$$.A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad c = 2$$

ערכים עצמיים.

$$. \det(A - \lambda I) = (2 - \lambda) [(1 - \lambda)^2 - 4] = (2 - \lambda)(\lambda - 3)(\lambda + 1)$$

$$. \lambda_3 = 2, \lambda_2 = -1, \lambda_1 = 3 \text{ לכן}$$

וקטורים עצמיים. עבור $\lambda_1 = 3$ מתקבל $A - 3I = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ ומכאן $v_2 = v_1$ ו- $v_3 = 0$ כלומר

$$. q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^t \text{ עבור } \lambda_2 = -1 \text{ מתקבל } v_2 = -v_1 \text{ ו-} v_3 = 0 \text{ כלומר } q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^t \text{ עבור } \lambda_3 = 2$$

$$. q_3 = (0, 0, 1)^t \text{ כלומר } v_1 = v_2 = 0 \text{ וממנו } A - 2I = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ מתקבל}$$

מטריצת המעבר.

$$. P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = P^t, \quad P^t A P = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

הקואורדינטות החדשות.

$$. \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = P^t \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (x+y)/\sqrt{2} \\ (x-y)/\sqrt{2} \\ z \end{pmatrix}$$

האיבר הליניארי החדש.

$$. \beta = P^t b = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -12/\sqrt{2} \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6\sqrt{2} \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$$

המשוואה המסובבת.

$$. 3u^2 - v^2 + 2w^2 - 6\sqrt{2}u + 4w + 2 = 0$$

השלמה לריבוע.

$$3u^2 - 6\sqrt{2}u = 3(u - \sqrt{2})^2 - 6, \quad 2w^2 + 4w = 2(w + 1)^2 - 2$$

ולכן

$$3(u - \sqrt{2})^2 - v^2 + 2(w + 1)^2 = 6$$

ובסימון $W = w + 1, V = v, U = u - \sqrt{2}$, לאחר חלוקה ב-6:



$$\frac{U^2}{2} + \frac{W^2}{3} - \frac{V^2}{6} = 1$$

סיווג. שני איברים חיוביים ואחד שלילי, האגף הימני חיובי — **היפרבולואיד חד-יריעתי.**

מרכז וציר. ב- $U = V = W = 0$ מתקיים $u = \sqrt{2}, v = 0, w = -1$:

$$\mathbf{x}_0 = P \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

המרכז הוא $(1, 1, -1)$, וציר ההיפרבולואיד מקביל לכיוון הערך העצמי השלילי, $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)$.



מימין: המשטח בקואורדינטות המקוריות x, y, z ; משמאל: אותו משטח בקואורדינטות הקנוניות U, V, W . הציר האנטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

שאלה 1.4.3.

סווגו את המשטח

$$4x^2 + 4y^2 + z^2 - 4xy + 2xz + 2yz - 8x - 8y - 2z + 9 = 0$$

פתרון.

צורה מטריציונית.

$$, (x \ y \ z) \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + (-8 \ -8 \ -2) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + 9 = 0$$

כלומר

$$.A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -8 \\ -8 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad c = 9$$

ערכים עצמיים. פיתוח הדטרמיננטה ופישוט נותנים

$$. \det(A - \lambda I) = -\lambda^3 + 9\lambda^2 - 18\lambda = -\lambda(\lambda - 3)(\lambda - 6)$$

$$. \lambda_3 = 0, \lambda_2 = 6, \lambda_1 = 3 \text{ לכן}$$

וקטורים עצמיים. עבור $\lambda_1 = 3$ מתקבל $A - 3I = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$; דירוג $(R_3 - R_1) \cup R_2 + 2R_1$

נותן $v_2 = v_3$, ומהשורה הראשונה $v_1 = v_2$, כלומר $q_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^t$. עבור $\lambda_2 = 6$ מתקבל $A - 6I =$

$\begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ -2 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -5 \end{pmatrix}$; מהשורה הראשונה $v_3 = 2(v_1 + v_2)$, והצבה בשורה השלישית נותנת $-9(v_1 + v_2) = 0$,

כלומר $v_2 = -v_1$ ו- $v_3 = 0$, ולכן $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^t$. עבור $\lambda_3 = 0$, חיבור שתי השורות הראשונות של A

נותן $v_1 + v_2 + v_3 = 0$, והצבה בשורה הראשונה נותנת $3v_1 - 3v_2 = 0$, כלומר $v_1 = v_2$ ו- $v_3 = -2v_1$, ולכן $q_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)^t$

מטריצת המעבר.

$$.P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 0 & -2/\sqrt{6} \end{pmatrix}, \quad P^t A P = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

הקואורדינטות החדשות.

$$. \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = P^t \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 0 & -2/\sqrt{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (x + y + z)/\sqrt{3} \\ (x - y)/\sqrt{2} \\ (x + y - 2z)/\sqrt{6} \end{pmatrix}$$

האיבר הליניארי החדש.

$$. \beta = P^t b = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 0 & -2/\sqrt{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -8 \\ -8 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -18/\sqrt{3} \\ 0 \\ -12/\sqrt{6} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6\sqrt{3} \\ 0 \\ -2\sqrt{6} \end{pmatrix}$$

המשוואה המסובבת.

$$3u^2 + 6v^2 - 6\sqrt{3}u - 2\sqrt{6}w + 9 = 0$$

השלמה לריבוע (רק ב- u ; ב- v אין איבר ליניארי, וב- w הערך העצמי אפס):

$$3u^2 - 6\sqrt{3}u = 3(u^2 - 2\sqrt{3}u) = 3\left[(u - \sqrt{3})^2 - 3\right] = 3(u - \sqrt{3})^2 - 9$$

ולכן, בסימון $W = w, V = v, U = u - \sqrt{3}$,

$$3U^2 + 6V^2 = 2\sqrt{6}W$$

ולאחר חלוקה ב- $2\sqrt{6}$:



$$W = \frac{\sqrt{6}}{4}U^2 + \frac{\sqrt{6}}{2}V^2$$

סיווג. שני ערכים עצמיים חיוביים, אחד אפס, והמקדם הליניארי בכיוון האפס שונה מאפס — פרבולואיד אליפטי. אילו היה $\beta_3 = 0$, היה מתקבל גליל אליפטי.

קדקוד וכיוון. ב- $U = V = W = 0$ מתקיים $u = \sqrt{3}, v = w = 0$:

$$\mathbf{x}_0 = P \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \sqrt{3} \mathbf{q}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

הקדקוד הוא $(1, 1, 1)$, ומכיוון ש- $W \geq 0$ המשטח נפתח בכיוון החיובי של $\mathbf{q}_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)$.



מימין: המשטח בקואורדינטות המקוריות x, y, z ; משמאל: אותו משטח בקואורדינטות הקנוניות U, V, W . הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

שאלה 1.4.4.

סווגו את המשטח

$$4xy - 2xz - 2yz + 3z^2 - 2x - 2y - 2z + 3 = 0$$

פתרון.

צורה מטריציונית.

$$\begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & -2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + 3 = 0$$

כלומר

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad c = 3$$

ערכים עצמיים. פיתוח ופישוט נותנים

$$\det(A - \lambda I) = -\lambda^3 + 3\lambda^2 + 6\lambda - 8 = -(\lambda - 4)(\lambda - 1)(\lambda + 2)$$

$$\text{לכן } \lambda_3 = 4, \lambda_2 = -2, \lambda_1 = 1$$

וקטורים עצמיים. עבור $\lambda_1 = 1$ מתקבל $A - I = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$; חיבור שתי השורות הראשונות נותן

$$v_1 + v_2 - 2v_3 = 0, \text{ ויחד עם השורה הראשונה מתקבל } v_1 = v_2 = v_3, \text{ כלומר } q_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^t. \text{ עבור}$$

$$\lambda_2 = -2 \text{ מתקבל } A + 2I = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 5 \end{pmatrix}; \text{ מהשורה הראשונה } v_3 = 2(v_1 + v_2), \text{ והצבה בשורה}$$

$$\text{השלישית נותנת } 9(v_1 + v_2) = 0, \text{ כלומר } v_2 = -v_1 \text{ ו- } v_3 = 0, \text{ ולכן } q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^t. \text{ עבור } \lambda_3 = 4$$

$$\text{מתקבל } A - 4I = \begin{pmatrix} -4 & 2 & -1 \\ 2 & -4 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}; \text{ מהשורה השלישית } v_3 = -(v_1 + v_2), \text{ והצבה בשורה הראשונה נותנת}$$

$$-3v_1 + 3v_2 = 0, \text{ כלומר } v_1 = v_2 \text{ ו- } v_3 = -2v_1, \text{ ולכן } q_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)^t$$

מטריצת המעבר.

$$P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 0 & -2/\sqrt{6} \end{pmatrix}, \quad P^t A P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

הקואורדינטות החדשות.

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = P^t \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (x + y + z)/\sqrt{3} \\ (x - y)/\sqrt{2} \\ (x + y - 2z)/\sqrt{6} \end{pmatrix}$$

האיבר הליניארי החדש.

$$\beta = P^t b = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{6} & -2/\sqrt{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6/\sqrt{3} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2\sqrt{3} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

המשוואה המסובבת.

$$u^2 - 2v^2 + 4w^2 - 2\sqrt{3}u + 3 = 0$$

השלמה לריבוע.

$$u^2 - 2\sqrt{3}u = (u - \sqrt{3})^2 - 3$$

ולכן, בסימון $W = w, V = v, U = u - \sqrt{3}$



$$U^2 - 2V^2 + 4W^2 = 0 \iff 2V^2 = U^2 + 4W^2$$

סיווג. סימנים מעורבים והקבוע החופשי התאפס — ולכן זהו **חרוט אליפטי** ולא היפרבולואיד: לכל קבוע מתקבלת אליפסה שגודלה גדל ליניארית עם $|V|$, וב- $V = 0$ היא מתכווצת לנקודה אחת.

קדקוד וציר. ב- $U = V = W = 0$ מתקיים $u = \sqrt{3}, v = w = 0$:

$$\mathbf{x}_0 = P \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \sqrt{3} q_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

הקדקוד הוא $(1, 1, 1)$, וציר החרוט מקביל לכיוון שסימן הערך העצמי שלו מבודד, $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)$.



מימין: המשטח בקואורדינטות המקוריות x, y, z ; משמאל: אותו משטח בקואורדינטות הקנוניות U, V, W . הציר האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

1.5 סיכום הסיווגים

סיווג	סימני הערכים העצמיים	תרגיל
אליפסה	$(+, +)$	1
היפרבולה	$(+, -)$	2
פרבולה	$(+, 0)$, עם איבר ליניארי בכיוון האפס	3
זוג ישרים נחתכים	$(+, -)$, קבוע חופשי אפס	4
אליפסואיד	$(+, +, +)$	5
היפרבולואיד חד-יריעתי	$(+, +, -)$	6
פרבולואיד אליפטי	$(+, +, 0)$, עם איבר ליניארי בכיוון האפס	7
חרוט אליפטי	$(+, +, -)$, קבוע חופשי אפס	8

2 תרגול: 2 גיאומטריה דיפרנציאלית של עקומות במישור

2.1 עקומות פרמטריות

מערכת קואורדינטות במרחב וקטורי מתאימה n -יות של מספרים לנקודות של המרחב, כך שלכל נקודה מתאימה n -יה.

פרמטריזציה מרחיבה את הרעיון הזה למשפחות רחבות יותר של קבוצות — אצלנו, תת-קבוצות של $\mathbb{R}^n$. נתחיל מהמקרה הפשוט ביותר, שבו תחום הפרמטרים הוא קטע.

הגדרה 2.1.1 — עקומה פרמטרית.

עקומה פרמטרית, או **פרמטריזציה של עקומה**, היא פונקציה רציפה $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$, כאשר $I \subseteq \mathbb{R}$ הוא קטע — פתוח, סגור או חצי-פתוח, חסום או לא חסום. ניתן לייצג עקומה כווקטור עמודה (או כווקטור שורה)

$$\alpha(t) = \begin{pmatrix} \alpha^1(t) \\ \alpha^2(t) \\ \alpha^3(t) \\ \vdots \\ \alpha^n(t) \end{pmatrix}$$

האינדקסים כתובים למעלה, ו- $\alpha^i(t)$ הוא הרכיב ה- i של הווקטור — לא חזקה.

הערה 2.1.2.

רציפות לבדה חלשה מכדי להגדיר עקומה: קיימות העתקות רציפות מקטע על ריבוע שלם (עקומות פאנו והילברט), והתמונה שלהן היא עצם דו-ממדי מלא — ובוודאי לא מה שהיינו רוצים לכנות עקומה. לכן נדרוש יותר: ש- α תהיה גזירה ברציפות, לפחות למקוטעין. בדרך כלל נניח $\alpha \in C^2$.

הערה 2.1.3 — עקומה פרמטרית היא מסלול, לא קבוצה.

ניתן להתייחס ל- t כאל **זמן**: דרך נוחה לחשוב על פרמטריזציה היא כעל נקודה הנעה במהלך קטע זמן, כאשר $\gamma(t)$ הוא מיקומה בזמן t . לכן מתארת את **המסלול** — האופן שבו עוברים על הקבוצה — ולא רק את הקבוצה עצמה, שהיא בסך הכול התמונה $\gamma(I)$.

מנקודת מבט זו ברור שפרמטריזציה אינה חייבת להיות חד-חד-ערכית: אותה קבוצה עצמה יכולה להתקבל ממסלולים שונים — במהירויות שונות, בכיוונים שונים, ואף תוך מעבר על אותה נקודה יותר מפעם אחת. כך למשל נקודה על מעגל נקבעת על ידי זווית, אך את אותה נקודה אפשר לתאר בזוויות רבות: הוספת סיבוב שלם, או מדידה בכיוון ההפוך, מחזירה אותנו אליה. לעומת זאת, כשאומרים ש- γ היא פרמטריזציה של קבוצה **נתונה**, כן נדרוש שהתמונה תהיה הקבוצה כולה.

תרגילים

שאלה 2.1.4.

מצאו פרמטריזציה לישר העובר דרך הנקודה p בכיוון הווקטור v , $v \neq 0$.

פתרון.

הישר הוא בדיוק הקבוצה

$$\{p + tv : t \in \mathbb{R}\},$$

ולכן הפרמטריזציה מיידית:

$$\gamma(t) = p + tv, \quad t \in \mathbb{R}$$

אם $p = (p_1, p_2)$ ו- $v = (v_1, v_2)$, אז רכיב-רכיב

$$\gamma(t) = (p_1 + tv_1, p_2 + tv_2)$$

ההכלה והכיסוי מידיים מהגדרת הישר: כל $\gamma(t)$ נמצא עליו, וכל נקודה שעליו היא מהצורה $p + tv$ עבור t מתאים.

שלוש דרכים לעבור על אותו ישר. אותו ישר מתקבל גם מ- $\tilde{\gamma}(t) = p + 2tv$, העוברת עליו במהירות כפולה, וגם מ- $\hat{\gamma}(t) = p - tv$, העוברת עליו בכיוון ההפוך. לשלוש הפרמטריזציות אותה תמונה בדיוק.

שאלה 2.1.5.

מצאו פרמטריזציה לאליפסה $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, כאשר $a, b > 0$, והראו שהיא מכסה את האליפסה כולה.

פתרון.

הרעיון. מעגל היחידה $x^2 + y^2 = 1$ מפורמטר על ידי $(\cos t, \sin t)$, משום שזהות היסוד $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$ היא בדיוק משוואתו. נכתוב את משוואת האליפסה בצורה דומה:

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$$

כלומר הזוג $\left(\frac{x}{a}, \frac{y}{b}\right)$ נמצא על מעגל היחידה. לכן נציב

$$\frac{x}{a} = \cos t, \quad \frac{y}{b} = \sin t$$

ומתקבלת

$$\gamma(t) = (a \cos t, b \sin t), \quad t \in [0, 2\pi]$$

הכלה. נציב במשוואת האליפסה:

$$\frac{(a \cos t)^2}{a^2} + \frac{(b \sin t)^2}{b^2} = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

ולכן כל נקודה מהצורה $\gamma(t)$ אכן נמצאת על האליפסה.

כיסוי. תהי (x, y) נקודה כלשהי על האליפסה. אז $\left(\frac{x}{a}, \frac{y}{b}\right)$ נמצאת על מעגל היחידה, ולכן קיים $t \in [0, 2\pi]$ יחיד המקיים $\frac{x}{a} = \cos t$ ו- $\frac{y}{b} = \sin t$. עבור t זה $\gamma(t) = (x, y)$, ולכן התמונה היא האליפסה כולה.

שאלה 2.1.6.

האם $\gamma(t) = (t^2, t^4)$ היא פרמטריזציה של הפרבולה $y = x^2$?

פתרון.

נסמן $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t))$, כלומר $\gamma_1(t) = t^2$ ו- $\gamma_2(t) = t^4$. נבדוק תחילה אם כל נקודה על העקומה מקיימת את משוואת הפרבולה:

$$\gamma_2(t) = t^4 = (t^2)^2 = \gamma_1(t)^2,$$

ולכן כל נקודה מהצורה $\gamma(t)$ אכן מקיימת $y = x^2$; כלומר **התמונה מוכלת** בפרבולה.

אבל זה אינו מספיק: פרמטריזציה של עקומה צריכה לכסות את **כל** העקומה. נשים לב ש-

$$\gamma_1(t) = t^2 \geq 0$$

לכל $t \in \mathbb{R}$, ולכן קואורדינטת ה- x של כל נקודה בתמונה היא אי-שלילית. לעומת זאת, על הפרבולה $y = x^2$ יש נקודות עם $x < 0$, למשל $(-1, 1)$, המקיימת $1 = (-1)^2$.

נראה שנקודה זו אינה בתמונה: אילו הייתה קיימת t עם $\gamma(t) = (-1, 1)$, היינו מקבלים $t^2 = -1$, ולמשוואה זו אין פתרון ממשי.

מסקנה. γ אינה פרמטריזציה של הפרבולה כולה, אלא רק של החצי הימני שלה,

$$\{(x, x^2) : x \geq 0\}.$$

שאלה 2.1.7.

מצאו את המשוואה הקרטזית של העקומה $\gamma(t) = (\cos^2 t, \sin^2 t)$, ותארו במדויק את התמונה שלה.

פתרון.

נסמן $x = \cos^2 t$ ו- $y = \sin^2 t$. מזהות היסוד הטריגונומטרית

$$x + y = \cos^2 t + \sin^2 t = 1,$$

ולכן כל נקודה על העקומה נמצאת על הישר $x + y = 1$.

גם כאן נבדוק מהי התמונה המדויקת. מכיוון ש- $\cos t \in [-1, 1]$, מתקיים

$$x = \cos^2 t \in [0, 1]$$

ובאותו אופן $y \in [0, 1]$. מצד שני, כאשר t עובר על הקטע $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ הפונקציה $\cos^2 t$ רציפה ויורדת מ-1 ל-0, ולכן לפי משפט ערך הביניים היא מקבלת **כל** ערך בקטע $[0, 1]$.

מסקנה. התמונה היא בדיוק הקטע

$$\{(x, y) : x + y = 1, 0 \leq x \leq 1\}$$

המחבר את $(1, 0)$ ל- $(0, 1)$, ולא הישר כולו. שימו לב שהעקומה עוברת על הקטע הזה הלך ושוב אינסוף פעמים.

שאלה 2.1.8.

תהי $\gamma(t) = (t^3 - 4t, t^2 - 4)$, $t \in \mathbb{R}$. הראו ש- γ אינה חד-חד-ערכית, ומצאו את נקודת החיתוך העצמי.

פתרון.

נחפש $t_1 \neq t_2$ שעבורם $\gamma(t_1) = \gamma(t_2)$. השוואת הרכיב השני נותנת

$$t_1^2 - 4 = t_2^2 - 4 \implies t_1^2 = t_2^2 \implies t_2 = \pm t_1$$

ומכיון ש- $t_1 \neq t_2$ נותר רק $t_2 = -t_1$.

נציב זאת ברכיב הראשון:

$$t_1^3 - 4t_1 = (-t_1)^3 - 4(-t_1) = -t_1^3 + 4t_1$$

ולכן

$$2t_1^3 - 8t_1 = 0 \implies 2t_1(t_1^2 - 4) = 0$$

כלומר $t_1 = 0$ או $t_1 = \pm 2$.

הפתרון $t_1 = 0$ גורר $t_2 = 0$, בסתירה ל- $t_1 \neq t_2$. נותרו $t_1 = 2$ ו- $t_2 = -2$. נציב ונודא:

$$\gamma(2) = (8 - 8, 4 - 4) = (0, 0)$$

$$\gamma(-2) = (-8 + 8, 4 - 4) = (0, 0)$$

מסקנה. $\gamma(2) = \gamma(-2) = (0, 0)$, ולכן γ אינה חד-חד-ערכית ונקודת החיתוך העצמי היא הראשית.

הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

2.2 מהירות, רגולריות ואורך קשת

2.2.1 הגדרה — וקטור המהירות והמהירות הסקלרית.

אם העקומה גזירה, וקטור המהירות שלה הוא

$$\alpha'(t) = \begin{pmatrix} \alpha^{1'}(t) \\ \alpha^{2'}(t) \\ \vdots \\ \alpha^{n'}(t) \end{pmatrix}$$

והוא נותן את כיוון התנועה ואת קצב השינוי הווקטורי. המהירות הסקלרית היא אורכו של וקטור זה,

$$v(t) = \|\alpha'(t)\|$$

2.2.2 הגדרה — פרמטריזציה במהירות יחידה.

אם $\|\alpha'(t)\| = 1$, אז $\alpha(t)$ נקראת פרמטריזציה במהירות יחידה, או פרמטריזציה אורך קשת.

2.2.3 הגדרה — פרמטריזציה רגולרית.

נאמר שהפרמטריזציה של עקומה $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ היא רגולרית אם לכל t הנגזרת $\alpha'(t)$ קיימת ומתקיים

$$\alpha'(t) \neq 0$$

נקודות t שבהן $\alpha'(t)$ אינה קיימת, או שבהן $\alpha'(t) = 0$, נקראות נקודות סינגולריות של α . בנקודה רגולרית קו המשיק לעקומה קיים, ולכן נתמקד בעקומות ללא נקודות סינגולריות.

2.2.4 הגדרה — גזירות ברציפות למקוטעין.

פונקציה $\alpha : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ נקראת **גזירה ברציפות למקוטעין** אם היא רציפה, וקיימת חלוקה $a = c_0 < c_1 < \dots < c_k = b$ כך שבכל קטע $[c_{i-1}, c_i]$ הפונקציה α גזירה ברציפות — כאשר בקצות הקטע מדובר בנגזרות חד-צדדיות.

הגדרה 2.2.5 — אורך עקומה.

תהי $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ גזירה ברציפות למקוטעין. אורך העקומה בקטע $[t_1, t_2]$ מוגדר על ידי

$$L = \int_{t_1}^{t_2} \|\alpha'(t)\| dt$$

כלומר האינטגרל של גודל וקטור המהירות. ב- $\mathbb{R}^2$, עבור $\alpha(t) = (\alpha^1(t), \alpha^2(t))$, מתקבל

$$L = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{(\alpha^{1'}(t))^2 + (\alpha^{2'}(t))^2} dt$$

הגדרה 2.2.6 — פרמטריזציות שקולות.

תהי $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ עקומה פרמטרית. נאמר ש- $\beta : J \rightarrow \mathbb{R}^n$ **שקולה** ל- α אם קיימת פונקציה $\varphi : J \rightarrow I$ רגולרית, חד-חד-ערכית ועל, כך ש-

$$\beta = \alpha \circ \varphi$$

הערה 2.2.7

זוהי למעשה הרחבה של המושג **החלפת קואורדינטות**. פרמטריזציות שקולות שומרות על תכונות כמו רגולריות, ועל מספר הפעמים שהפרמטריזציה עוברת בכל נקודה.

הגדרה 2.2.8 — פרמטריזציה טבעית.

נגדיר

$$s(t) = \int_0^t \|\alpha'(u)\| du = \int_0^t \sqrt{(\alpha^{1'}(u))^2 + (\alpha^{2'}(u))^2} du$$

פונקציה המתארת את האורך של α מזמן 0 עד זמן t . היא מונוטונית עולה ממש, ולכן הפיכה; אם נסמן את הפונקציה ההופכית ב- $t(s)$ ונציב, נקבל את **הפרמטריזציה הטבעית**

$$r(s) = \alpha(t(s))$$

בנוסף מתקיים

$$\frac{ds}{dt} = \|\alpha'(t)\|$$

סימולציה 2.2.9 — אותה נקודה, שתי פרמטריזציות של המעגל.

שתי פרמטריזציות של מעגל היחידה. הראשונה היא הפרמטריזציה הרגילה

$$\alpha(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta), \quad \theta \in [0, 2\pi]$$

והשנייה

$$\beta(x) = (\cos(e^x - 1), \sin(e^x - 1)), \quad x \in [0, \ln(2\pi + 1)]$$

הסימולציה זמינה בגרסה המקוונת.

טענה 2.2.10.

פרמטריזציות אורך קשת היא פרמטריזציה במהירות יחידה.

הערה 2.2.11.

גם ההיפך נכון: אם הפרמטריזציה היא בעלת מהירות יחידה עם פרמטר t , אז t הוא פרמטר אורך קשת, שכן $\|\alpha'(t)\| = 1$ ולכן

$$s = \int_0^t 1 \, du = t$$

תרגילים


שאלה 2.2.12.

חשבו את אורך הקשת של קו השרשרת $\gamma(t) = (t, \cosh t)$, החל מהנקודה $(0, 1)$.

התוצאה תשמש בהמשך בשאלה 2.4.9, בחישוב העקמומיות של קו השרשרת.

הערה 2.2.13 — קו שרשרת.

העקומה $\gamma(t) = (t, \cosh t)$ נקראת קו שרשרת, והשם אינו מקרי: זוהי בדיוק הצורה שאותה מקבלת שרשרת אחידה וגמישה לחלוטין, התלויה בחופשיות משני קצותיה תחת משקלה שלה (בלטינית *catena* — שרשרת). גלילאו שיער שהצורה היא פרבולה, אך היא אינה פרבולה; הפתרון הנכון, $y = \cosh x$, נמצא בשנת 1691 באופן בלתי תלוי על ידי הויגנס, לייבניץ ויוהאן ברנולי. שרשרת תלויה שטוחה יותר במרכז מפרבולה, ומתרוממת בתלילות רבה יותר בקצוות.



בכחול — שרשרת התלויה בין שתי נקודות; באדום ומקווקו — הפרבולה העוברת דרך אותן שתי נקודות ובעלת אותה נקודה נמוכה. קו השרשרת שטוח יותר בתחתית ותלול יותר בקצוות, ולכן הוא נמצא כולו מתחת לפרבולה.

פתרון.

הנקודה $(0, 1)$ מתקבלת עבור $t = 0$, שכן $\gamma(0) = (0, \cosh 0) = (0, 1)$.

וקטור המהירות. נגזור רכיב-רכיב. הרכיב הראשון הוא $\gamma^1(t) = t$ ולכן $\gamma^{1'}(t) = 1$. הרכיב השני הוא $\gamma^2(t) = \cosh t$, ומהגדרת הפונקציה $\cosh t = \frac{e^t + e^{-t}}{2}$ נקבל

$$\gamma^{2'}(t) = \frac{e^t - e^{-t}}{2} = \sinh t$$

ולכן

$$\gamma'(t) = (1, \sinh t)$$

המהירות הסקלרית.

$$\|\gamma'(t)\| = \sqrt{1 + \sinh^2 t}$$

ולפי הזהות $\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$ מתקיים $\cosh^2 t = 1 + \sinh^2 t$, ולכן

$$\|\gamma'(t)\| = \sqrt{\cosh^2 t} = \cosh t$$

בשוויון האחרון השתמשנו בכך ש- $\cosh t > 0$ לכל t , ולכן אין צורך בערך מוחלט.

אגב, מכאן גם נובע ש- γ רגולרית: $\|\gamma'(t)\| = \cosh t \geq 1 > 0$ ובפרט $\gamma'(t) \neq 0$.

אורך הקשת.

$$s(t) = \int_0^t \|\gamma'(u)\| du = \int_0^t \cosh u du = \sinh u \Big|_0^t = \sinh t - \sinh 0 = \sinh t$$

הפרמטריזציה הטבעית. כאן $s = \sinh t$ הפיכה, ולכן $t = \operatorname{arcsinh} s$, ואפשר לכתוב את קו השרשרת בפרמטריזציה טבעית במפורש:

$$r(s) = (\operatorname{arcsinh} s, \cosh(\operatorname{arcsinh} s)) = \left(\operatorname{arcsinh} s, \sqrt{1+s^2} \right)$$

כאשר בשוויון האחרון השתמשנו ב- $\cosh^2 = 1 + \sinh^2$.

לפני הגזירה נזכיר כיצד גוזרים את $\operatorname{arcsinh}$. נצא מהזהות $\sinh(\operatorname{arcsinh} s) = s$ ונגזור את שני האגפים לפי s ; לפי כלל השרשרת

$$\cosh(\operatorname{arcsinh} s) \cdot (\operatorname{arcsinh} s)' = 1$$

ומכאן

$$(\operatorname{arcsinh} s)' = \frac{1}{\cosh(\operatorname{arcsinh} s)} = \frac{1}{\sqrt{1+s^2}}$$

בשוויון האחרון השתמשנו שוב ב- $\cosh(\operatorname{arcsinh} s) = \sqrt{1+s^2}$. את הרכיב השני גוזרים בכלל השרשרת הרגיל:

$$\left(\sqrt{1+s^2} \right)' = \frac{2s}{2\sqrt{1+s^2}} = \frac{s}{\sqrt{1+s^2}}$$

כעת אפשר לוודא ישירות שזו אכן פרמטריזציה במהירות יחידה:

$$r'(s) = \left(\frac{1}{\sqrt{1+s^2}}, \frac{s}{\sqrt{1+s^2}} \right)$$

ולכן

$$\|r'(s)\| = \sqrt{\frac{1+s^2}{1+s^2}} = 1$$

קו השרשרת מוגדר לכל $t \in \mathbb{R}$, והציור שלהלן מציג את שתי הזרועות. בתרגיל זה מודדים את אורך הקשת החל מהנקודה $(0, 1)$ ימינה, כלומר עבור $t \geq 0$, ולכן רק החלק הזה מסומן. מכיוון ש- $\cosh$ זוגית, העקומה סימטרית ביחס לציר y , והזרוע השמאלית נותנת את אותו אורך: המרחק מ- $(0, 1)$ עד הנקודה שעבורה $t = -a$ הוא $\sinh a$ בדיוק, כמו בזרוע הימנית.

הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

הערה 2.2.14 — אורך קשת שלילי.

בהגדרה $s(t) = \int_0^t \|\alpha'(u)\| du$ אין דרישה ש- t יהיה חיובי. עבור $t < 0$ האינטגרל הוא מ-0 אחורה, ולפי המוסכמה $\int_0^t = -\int_t^0$ מתקבל $s(t) < 0$: הגודל $|s(t)|$ הוא אורך הקשת, והסימן מציין רק את הכיוון שבו התרחקנו מנקודת הבסיס $t = 0$.

אין בכך שום פגם, והסיבה היא ש-

$$\frac{ds}{dt} = \|\alpha'(t)\| > 0$$

ולכן s עולה ממש על כל התחום, ובפרט הפיכה שם. הפרמטריזציה המתקבלת היא במהירות יחידה גם עבור $s < 0$.
אצל קו השרשרת $s = \sinh t$ סורקת את $\mathbb{R}$ כולו, ולכן $r(s) = (\operatorname{arcsinh} s, \sqrt{1+s^2})$ מתארת את שתי הזרועות — עובדה שנשתמש בה בחישוב העקמומיות הכוללת בסוף הפרק.

שאלה 2.2.15.

הראו שהעקומה $\gamma(t) = \left(\frac{4}{5} \cos t, 1 - \sin t, -\frac{3}{5} \cos t\right)$ היא בעלת מהירות יחידה.

פתרון.

וקטור המהירות. נגזור כל רכיב בנפרד:

$$\left(\frac{4}{5} \cos t\right)' = -\frac{4}{5} \sin t, \quad (1 - \sin t)' = -\cos t, \quad \left(-\frac{3}{5} \cos t\right)' = \frac{3}{5} \sin t$$

ולכן

$$\gamma'(t) = \left(-\frac{4}{5} \sin t, -\cos t, \frac{3}{5} \sin t\right)$$

ריבוע המהירות.

$$\|\gamma'(t)\|^2 = \left(-\frac{4}{5} \sin t\right)^2 + (-\cos t)^2 + \left(\frac{3}{5} \sin t\right)^2 = \frac{16}{25} \sin^2 t + \cos^2 t + \frac{9}{25} \sin^2 t$$

נאסוף את שני האיברים עם $\sin^2 t$:

$$\frac{16}{25} + \frac{9}{25} = \frac{25}{25} = 1$$

ולכן

$$\|\gamma'(t)\| = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} = \sqrt{1} = 1$$

כלומר הפרמטריזציה היא במהירות יחידה.

שאלה 2.2.16.

חשבו את אורך הקשת של הספירלה הלוגריתמית $\gamma(t) = (e^{kt} \cos t, e^{kt} \sin t)$ החל מ- $t = 0$, כאשר $k \neq 0$ קבוע.

פתרון.

וקטור המהירות. כל רכיב הוא מכפלה של e^{kt} בפונקציה טריגונומטרית, ולכן נגזור לפי כלל המכפלה. הרכיב הראשון:

$$(e^{kt} \cos t)' = k e^{kt} \cos t + e^{kt} (-\sin t) = e^{kt} (k \cos t - \sin t)$$

והרכיב השני:

$$(e^{kt} \sin t)' = k e^{kt} \sin t + e^{kt} \cos t = e^{kt} (k \sin t + \cos t)$$

ולכן

$$\gamma'(t) = (e^{kt} (k \cos t - \sin t), e^{kt} (k \sin t + \cos t))$$

ריבוע המהירות. נוציא e^{2kt} החוצה:

$$\|\gamma'(t)\|^2 = e^{2kt} [(k \cos t - \sin t)^2 + (k \sin t + \cos t)^2]$$

נפתח את שני הריבועים:

$$(k \cos t - \sin t)^2 = k^2 \cos^2 t - 2k \cos t \sin t + \sin^2 t$$

$$(k \sin t + \cos t)^2 = k^2 \sin^2 t + 2k \sin t \cos t + \cos^2 t$$

בסכום, האיברים המעורבים $\mp 2k \cos t \sin t$ מתבטלים, ונשאר

$$k^2 (\cos^2 t + \sin^2 t) + (\sin^2 t + \cos^2 t) = k^2 + 1$$

לכן

$$\|\gamma'(t)\| = e^{kt} \sqrt{k^2 + 1}$$

אורך הקשת.

$$s(t) = \int_0^t \sqrt{k^2 + 1} e^{ku} du = \sqrt{k^2 + 1} \frac{e^{ku}}{k} \Big|_0^t = \frac{\sqrt{k^2 + 1}}{k} (e^{kt} - 1)$$

הפרמטריזציה הטבעית. נבודד את t מ-

$$s = \frac{\sqrt{k^2 + 1}}{k} (e^{kt} - 1)$$

נעביר אגפים ונקבל

$$e^{kt} = 1 + \frac{ks}{\sqrt{k^2 + 1}}$$

ולכן, בליקחת לוגריתם,

$$t(s) = \frac{1}{k} \ln \left(1 + \frac{ks}{\sqrt{k^2 + 1}} \right)$$

תחום הפרמטרים. אורך הקשת נמדד החל מ- $t=0$, ולכן $s \geq 0$. הלוגריתם מחייב בנוסף שהארגומנט יהיה חיובי, $1 + \frac{ks}{\sqrt{k^2 + 1}} > 0$, והתנאי הזה מתפרש אחרת לפי הסימן של k :

- אם $k > 0$, התנאי מתקיים לכל $s \geq 0$, ותחום ההגדרה הוא $[0, \infty)$. הספירלה מתרחקת מהראשית, ואורך הקשת גדל ללא חסם.
- אם $k < 0$, התנאי שקול ל-

$$s < \frac{\sqrt{k^2 + 1}}{|k|}$$

ותחום ההגדרה הוא $\left[0, \frac{\sqrt{k^2 + 1}}{|k|}\right)$. כאן הספירלה מתקרבת לראשית כאשר $t \rightarrow \infty$ ומקיפה אותה אינסוף פעמים, ובכל זאת אורך המסלול כולו סופי.

לחסם במקרה $k < 0$ הגענו בדרך **אלגברית**, מתחום ההגדרה של הלוגריתם. אפשר להגיע אליו גם בדרך **אנליטית**, כאורך המסלול כולו:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} s(t) = \frac{\sqrt{k^2 + 1}}{k} \left(\lim_{t \rightarrow \infty} e^{kt} - 1 \right) = \frac{\sqrt{k^2 + 1}}{k} (0 - 1) = -\frac{\sqrt{k^2 + 1}}{k} = \frac{\sqrt{k^2 + 1}}{|k|}$$

כאשר בשוויון האחרון השתמשנו ב- $k < 0$. שתי הדרכים נותנות את אותו מספר, וכך צריך להיות: תחום ההגדרה של s הוא בדיוק אוסף אורכי הקשת שהעקומה מגיעה אליהם, והחסם העליון שלו הוא אורך העקומה כולה.

הצבה. נציב את $t(s)$ ואת $e^{kt(s)}$ ב- $\gamma(t) = e^{kt} (\cos t, \sin t)$, ומתקבלת הפרמטריזציה הטבעית במפורש:

$$r(s) = \left(1 + \frac{ks}{\sqrt{k^2 + 1}} \right) \left(\cos \left[\frac{1}{k} \ln \left(1 + \frac{ks}{\sqrt{k^2 + 1}} \right) \right], \sin \left[\frac{1}{k} \ln \left(1 + \frac{ks}{\sqrt{k^2 + 1}} \right) \right] \right)$$

שאלה 2.2.17.

חשבו את אורך הקשת של האליפסה $\gamma(t) = (a \cos t, b \sin t)$, כאשר $a \neq b$.

פתרון.

וקטור המהירות.

$$\gamma'(t) = (-a \sin t, b \cos t)$$

ולכן

$$\|\gamma'(t)\| = \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t}$$

אורך הקשת.

$$s(t) = \int_0^t \sqrt{a^2 \sin^2 u + b^2 \cos^2 u} du$$

כאן נעצור. אינטגרל זה נקרא **אינטגרל אליפטי**, והשם עצמו בא מהבעיה הזו; מוכח שאי אפשר לבטא אותו באמצעות הפונקציות האלמנטריות.

מסקנה 2.2.18.

לא תמיד קיימת נוסחה מפורשת לפרמטריזציה הטבעית: אם אין ביטוי אלמנטרי ל- $s(t)$, אין כזה גם ל- $t(s)$, ולפיכך גם לא ל- $r(s)$.

הערה 2.2.19.

זהו דווקא המצב השכיח. לרוב האינטגרלים אין פונקציה קדומה הניתנת לכתיבה באמצעות הפונקציות האלמנטריות, וקו השרשרת והספירלה הלוגריתמית הם היוצאים מן הכלל.

הערה 2.2.20.

עם זאת, הפרמטריזציה הטבעית **קיימת** גם כשאין לה נוסחה: מתקיים $\|\gamma'(t)\| = \frac{ds}{dt} > 0$, ולכן $s(t)$ עולה ממש והפיכה. לכן היא בעיקר **כלי תיאורטי**: לכל עקומה רגולרית קיימת פרמטריזציה שקולה במהירות יחידה, וזה נוח בהוכחות. בפועל, כפי שנראה בהמשך, נפתח כלים לעבוד ישירות עם פרמטריזציה רגולרית כלשהי.

2.3 הוקטור המשיק והנורמלי

2.3.1 הגדרה — הוקטור המשיק.

הוקטור המשיק לעקומה הנתונה בפרמטריזציה אורך קשת הוא

$$T = \frac{d\alpha}{ds} = \alpha'(s)$$

אם $\alpha(t)$ היא פרמטריזציה רגולרית כלשהי, אז

$$T = \frac{\alpha'(t)}{\|\alpha'(t)\|}$$

מכיון ש- T הוא וקטור יחידה, קיימת פונקציה $\theta(s)$ כך ש-

$$T(s) = (\cos(\theta(s)), \sin(\theta(s)))$$

ו- θ נקראת **פונקציית הזווית**: היא מודדת את הזווית שהוקטור המשיק יוצר עם ציר ה- x .

2.3.2 הגדרה — הוקטור הנורמלי.

במישור נגדיר וקטור נוסף, ניצב ל- T , הנקרא **הוקטור הנורמלי** N (גם הוא וקטור יחידה), הנבחר כך ש-

$$\det \begin{pmatrix} T^1(s) & N^1(s) \\ T^2(s) & N^2(s) \end{pmatrix} = 1$$

באופן שקול, N הוא סיבוב של T בזווית $\frac{\pi}{2}$ נגד כיוון השעון:

$$N = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot T$$

2.3.3 הערה

משוואת העקומה אומרת לנו היכן אנחנו נמצאים בכל רגע נתון; הוקטור המשיק T והוקטור הנורמלי N מגדירים יחד **מערכת צירים מקומית נעה** לאורך העקומה. הוקטור המשיק נותן את הקירוב הליניארי הטוב ביותר לעקומה באותה נקודה, והוקטור הנורמלי מורה לאן העקומה פונה — שכן קצב השינוי של הוקטור המשיק ביחס לאורך הקשת מוגדר ישירות דרך הנורמל, $\frac{dT}{ds} = kN$.

תרגילים

2.3.4 שאלה

חשבו את T , את N ואת פונקציית הזווית $\theta(s)$ עבור המעגל ברדיוס R , הנתון בפרמטריזציה

$$\alpha(s) = \left(R \cos \frac{s}{R}, R \sin \frac{s}{R} \right)$$

פתרון.

בדיקת מהירות יחידה. נגזור כל רכיב לפי כלל השרשרת. הרכיב הראשון:

$$\left(R \cos \frac{s}{R}\right)' = R \cdot \left(-\sin \frac{s}{R}\right) \cdot \frac{1}{R} = -\sin \frac{s}{R}$$

והרכיב השני:

$$\left(R \sin \frac{s}{R}\right)' = R \cdot \cos \frac{s}{R} \cdot \frac{1}{R} = \cos \frac{s}{R}$$

כלומר הגורם $\frac{1}{R}$ שמגיע מכלל השרשרת מצטמצם מול ה- R החיצוני, ומתקבל

$$\alpha'(s) = \left(-\sin \frac{s}{R}, \cos \frac{s}{R}\right)$$

לכן

$$\|\alpha'(s)\| = \sqrt{\sin^2 \frac{s}{R} + \cos^2 \frac{s}{R}} = 1$$

כלומר s הוא אכן פרמטר אורך קשת ומותר להשתמש בנוסחאות של פרמטריזציה טבעית.

הוקטור המשיק.

$$T(s) = \alpha'(s) = \left(-\sin \frac{s}{R}, \cos \frac{s}{R}\right)$$

הוקטור הנורמלי. נכפול במטריצת הסיבוב:

$$N(s) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \frac{s}{R} \\ \cos \frac{s}{R} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\cos \frac{s}{R} \\ -\sin \frac{s}{R} \end{pmatrix}$$

שימו לב לפירוש הגיאומטרי: הנקודה על המעגל היא $R \left(\cos \frac{s}{R}, \sin \frac{s}{R}\right)$, ולכן N מצביע אל מרכז המעגל.

פונקציית הזווית. נדרש $T = (\cos \theta, \sin \theta)$, כלומר

$$\cos \theta = -\sin \frac{s}{R}, \quad \sin \theta = \cos \frac{s}{R}$$

נשתמש בזהויות $-\sin x = \cos \left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ ו- $\cos x = \sin \left(x + \frac{\pi}{2}\right)$, ונקבל

$$\theta(s) = \frac{s}{R} + \frac{\pi}{2}$$

שאלה 2.3.5.

חשבו את הוקטור המשיק T ואת הוקטור הנורמלי N של העקומה

$$\gamma(t) = (2 \cos t - \cos 2t, 2 \sin t - \sin 2t)$$

בנקודה המתאימה ל- $t = \frac{\pi}{4}$.

פתרון.

הנקודה. נציב $t = \frac{\pi}{4}$ ואז $2t = \frac{\pi}{2}$:

$$\gamma\left(\frac{\pi}{4}\right) = \left(2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - 0, 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - 1\right) = (\sqrt{2}, \sqrt{2} - 1)$$

וקטור המהירות. לפי כלל השרשרת $(\cos 2t)' = -2 \sin 2t$ ו- $(\sin 2t)' = 2 \cos 2t$. לכן הרכיב הראשון:

$$, (2 \cos t - \cos 2t)' = -2 \sin t - (-2 \sin 2t) = -2 \sin t + 2 \sin 2t$$

והרכיב השני:

$$, (2 \sin t - \sin 2t)' = 2 \cos t - 2 \cos 2t$$

כלומר

$$\gamma'(t) = (-2 \sin t + 2 \sin 2t, 2 \cos t - 2 \cos 2t)$$

נציב $t = \frac{\pi}{4}$, ושוב $2t = \frac{\pi}{2}$:

$$\gamma'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \left(-2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 2 \cdot 1, 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - 2 \cdot 0\right) = (2 - \sqrt{2}, \sqrt{2})$$

הוקטור המשיק המנורמל. נחשב תחילה את האורך:

$$\left\|\gamma'\left(\frac{\pi}{4}\right)\right\|^2 = (2 - \sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2 = (4 - 4\sqrt{2} + 2) + 2 = 8 - 4\sqrt{2}$$

ולכן

$$\left\|\gamma'\left(\frac{\pi}{4}\right)\right\| = \sqrt{4(2 - \sqrt{2})} = 2\sqrt{2 - \sqrt{2}}$$

ומכאן

$$T = \frac{1}{2\sqrt{2 - \sqrt{2}}} (2 - \sqrt{2}, \sqrt{2})$$

הוקטור הנורמלי. N מתקבל מסיבוב T בזווית $\frac{\pi}{2}$ נגד כיוון השעון, כלומר אם $T = (a, b)$ אז $N = (-b, a)$. לכן

$$N = \frac{1}{2\sqrt{2 - \sqrt{2}}} (-\sqrt{2}, 2 - \sqrt{2})$$

2.3.6 שאלה

חשבו את T , את N ואת פונקציית הזווית עבור קו השרשרת $\gamma(t) = (t, \cosh t)$.

התוצאה תשמש בהמשך בשאלה 2.4.9, בחישוב העקמומיות של קו השרשרת.

פתרון.

נרמול. ראינו כבר ש- $\gamma'(t) = (1, \sinh t)$ ו- $\|\gamma'(t)\| = \cosh t$. הפרמטריזציה אינה במהירות יחידה, ולכן נשתמש בנוסחה הכללית

$$T = \frac{\gamma'(t)}{\|\gamma'(t)\|} = \left(\frac{1}{\cosh t}, \frac{\sinh t}{\cosh t}\right)$$

הוקטור הנורמלי. נכפול במטריצת הסיבוב, שורה אחר שורה:

$$N = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\cosh t} \\ \frac{\sinh t}{\cosh t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot \frac{1}{\cosh t} + (-1) \cdot \frac{\sinh t}{\cosh t} \\ 1 \cdot \frac{1}{\cosh t} + 0 \cdot \frac{\sinh t}{\cosh t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{\sinh t}{\cosh t} \\ \frac{1}{\cosh t} \end{pmatrix}$$

פונקציית הזווית. מהדרישה $T = (\cos \theta, \sin \theta)$ נקבל

$$\cos \theta = \frac{1}{\cosh t}, \quad \sin \theta = \frac{\sinh t}{\cosh t}$$

ולכן

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \sinh t$$

כלומר

$$\theta(t) = \arctan(\sinh t)$$

נשמור תוצאה זו — היא תשמש אותנו בחישוב העקמומיות.

הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

2.4 עקמומיות

2.4.1 הגדרה — עקמומיות — הגדרה לא פורמלית.

העקמומיות של עקומה מודדת כמה מהר העקומה משנה את כיוונה, כלומר עד כמה העקומה היא עקומה. בכביש ישר אין צורך לסובב את ההגה כלל, ולכן העקמומיות של כביש ישר היא 0; מצד שני, בסיבוב חד יש צורך לסובב הרבה כדי להישאר על המסלול — שם העקמומיות היא גבוהה.

2.4.2 הגדרה — עקמומיות אבסולוטית.

תהי $\alpha(s)$ עקומה רגולרית הנתונה בפרמטריזציה אורך קשת, ויהי $T(s)$ וקטור היחידה המשיק לעקומה בנקודה s . העקמומיות האבסולוטית מוגדרת כגודל של נגזרת הוקטור המשיק לפי אורך קשת:

$$\kappa(s) = \left\| \frac{dT}{ds} \right\|$$

במילים אחרות, העקמומיות היא קצב השינוי של כיוון הוקטור המשיק ככל שמתקדמים מרחק יחידה לאורך העקומה.

2.4.3 הערה — מדוע דווקא הנגזרת השנייה.

העקמומיות אמורה למדוד עד כמה העקומה סטה מהישר המשיק. נתבונן בהעתקה

$$\Delta \alpha = \alpha(s + \Delta s) - \alpha(s)$$

ונשים לב שהמרחק של $\alpha(s + \Delta s)$ מהישר המשיק ב- $\alpha(s)$ הוא בדיוק גודל הרכיב של $\Delta \alpha$ בכיוון N , כלומר $|\Delta \alpha \cdot N|$, שכן הישר המשיק הוא הישר בכיוון T , וההיטל על N מודד את היציאה ממנו.


לפי טיילור

$$\Delta \alpha = \alpha'(s) \Delta s + \frac{1}{2} \alpha''(s) (\Delta s)^2 + o((\Delta s)^2)$$

ומכיון ש- $T = \alpha'$ ניצב ל- N , ההכפלה ב- N מאפסת את האיבר מסדר ראשון, ונשאר

$$\Delta \alpha \cdot N = \frac{1}{2} (\alpha''(s) \cdot N) (\Delta s)^2 + o((\Delta s)^2)$$

הפרמטריזציה היא באורך קשת, ולכן $\alpha' \perp \alpha''$, כלומר α'' מקבילה ל- N ומתקיים $|\alpha'' \cdot N| = \|\alpha''\|$. לכן המרחק מהישר המשיק הוא בקירוב $\frac{1}{2} \|\alpha''(s)\| (\Delta s)^2$, ו- $\frac{1}{2} \|\alpha''(s)\| = \|T'\|$ הוא בדיוק המקדם המודד אותו — וזו הסיבה להגדרה.



הגדרה 2.4.4 — עקמומיות מסומנת (מכוונת).

העקמומיות של עקומה מוגדרת להיות

$$k = \frac{d\theta}{ds},$$

כאשר

$$T = \begin{pmatrix} \cos(\theta(s)) \\ \sin(\theta(s)) \end{pmatrix}$$

מכאן מתקבל

$$T' = \frac{dT}{ds} = \frac{d\theta}{ds} \begin{pmatrix} -\sin(\theta(s)) \\ \cos(\theta(s)) \end{pmatrix} = kN$$

ובאותו אופן

$$N' = -kT$$

הערה 2.4.5 — שימו לב לסימון.

האות κ היא האות היוונית קאפא, ולא האות הלטינית k . בפרק זה κ מסמנת תמיד את העקמומיות האבסולוטית, ו- k תמיד את העקמומיות המסומנת.

הערה 2.4.6

מ- $T' = kN$ ומכך ש- $\|N\| = 1$ נובע

$$\kappa = \|T'\| = \|kN\| = |k|$$

כלומר κ היא הגרסה הלא-מסומנת של k : היא מודדת עד כמה העקומה מתעקלת, ו- k מוסרת גם לאיזה כיוון היא פונה.

הגדרה 2.4.7 — מערכת משוואות פרנה־סרה.

הוקטור המשיק והוקטור הנורמלי לפי פרמטריזציית אורך קשת מקיימים את מערכת המשוואות הדיפרנציאליות

$$\begin{cases} T' = kN \\ N' = -kT \end{cases}$$

כאשר $k(s)$ היא העקמומיות. בכתוב מטריוני

$$\begin{pmatrix} T' \\ N' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & k(s) \\ -k(s) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T \\ N \end{pmatrix}$$

תרגילים

שאלה 2.4.8

חשבו את העקמומיות של המעגל ברדיוס R בשתי הדרכים — את κ לפי ההגדרה האבסולוטית, ואת k לפי העקמומיות המסומנת — וודאו ש- $\kappa = |k|$.

פתרון.

נשתמש בפרמטריזציה ובחישובים מהתרגיל על T ו- N של המעגל.

דרך א: העקמומיות האבסולוטית. גזרנו $T(s) = \left(-\sin \frac{s}{R}, \cos \frac{s}{R} \right)$. נגזור אותו שוב, רכיב-רכיב, לפי כלל השרשרת:

$$\begin{aligned} \left(-\sin \frac{s}{R} \right)' &= -\cos \frac{s}{R} \cdot \frac{1}{R} = -\frac{1}{R} \cos \frac{s}{R} \\ \left(\cos \frac{s}{R} \right)' &= -\sin \frac{s}{R} \cdot \frac{1}{R} = -\frac{1}{R} \sin \frac{s}{R} \end{aligned}$$

ולכן

$$\frac{dT}{ds} = \left(-\frac{1}{R} \cos \frac{s}{R}, -\frac{1}{R} \sin \frac{s}{R} \right)$$

שימו לב שכאן, בשונה מהגזירה הקודמת, אין גורם R חיצוני שיצמצם את $\frac{1}{R}$, וזה בדיוק מקור העקמומיות. מכאן

$$\kappa(s) = \left\| \frac{dT}{ds} \right\| = \frac{1}{R} \sqrt{\cos^2 \frac{s}{R} + \sin^2 \frac{s}{R}} = \frac{1}{R}$$

דרך ב: העקמומיות המסומנת. ראינו ש- $\theta(s) = \frac{s}{R} + \frac{\pi}{2}$, ולכן

$$k = \frac{d\theta}{ds} = \frac{1}{R}$$

קיבלנו $\kappa = \frac{1}{R}$ ו- $k = \frac{1}{R}$, ואכן $\kappa = |k|$. כאן הסימן של k חיובי — כלומר המעגל בפרמטריזציה זו נסרק נגד כיוון השעון. אפשר לוודא זאת גם ישירות:

$$\frac{dT}{ds} = \frac{1}{R} \left(-\cos \frac{s}{R}, -\sin \frac{s}{R} \right) = \frac{1}{R} N$$

ולפי $T' = kN$ אכן $k = \frac{1}{R}$.

פירוש. ככל שהרדיוס קטן יותר, העקמומיות גדולה יותר — בדיוק כפי שמצפים.

שאלה 2.4.9

חשבו את העקמומיות המסומנת של קו השרשרת $\gamma(t) = (t, \cosh t)$, והביעו אותה גם כפונקציה של אורך הקשת s וגם כפונקציה של הפרמטר t . שימו לב ש- t אינו פרמטר אורך קשת.

פתרון.

נאסוף שתי תוצאות שכבר חישבנו עבור קו השרשרת. הראשונה היא פרמטר אורך הקשת

$$s = \sinh t$$

שחושב בשאלה 2.2.12. השנייה היא פונקציית הזווית של הוקטור המשיק

$$\theta = \arctan(\sinh t)$$

שחושבה בשאלה 2.3.6. בהצבה ישירה מתקבל

$$\theta = \arctan(s)$$

זהו הצעד המרכזי: פונקציית הזווית, כפונקציה של אורך הקשת, היא פשוט $\arctan$.


כעת נגזור לפי s :

$$k = \frac{d\theta}{ds} = \frac{d}{ds} \arctan(s) = \frac{1}{1+s^2}$$

לבסוף נחזור לפרמטר t : נציב $s = \sinh t$ ונשתמש שוב ב- $1 + \sinh^2 t = \cosh^2 t$, ומתקבל

$$k = \frac{1}{1 + \sinh^2 t} = \frac{1}{\cosh^2 t}$$

שימו לב ש- $k > 0$ תמיד, ושהעקמומיות שואפת ל-0 כאשר $|s| \rightarrow \infty$, הזרועות של קו השרשרת נעשות ישרות יותר ויותר.



בשלוש הנקודות מצויר הישר המשיק, בכל אחת לאורך אותו אורך קשת. בקדקוד, שבו $\kappa = 1$, העקומה נפרדת מהמשיק במהירות; בזרועות, שבהן $\kappa \approx 0.01$, היא כמעט מתלכדת איתו — שם קו השרשרת כמעט ישר.

שאלה 2.4.10.

אמתו במישרין את משוואת פרנה־סרה השנייה, $N' = -kT$, עבור מעגל היחידה $\alpha(s) = (\cos s, \sin s)$.

פתרון.

הוקטור המשיק.

$$\alpha'(s) = (-\sin s, \cos s)$$

ומתקיים $\|\alpha'(s)\| = 1$, כלומר s הוא פרמטר אורך קשת ו-

$$T(s) = (-\sin s, \cos s)$$

הוקטור הנורמלי.

$$N(s) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin s \\ \cos s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\cos s \\ -\sin s \end{pmatrix}$$

העקמומיות. זהו המקרה $R = 1$ של התרגיל הקודם, ולכן $k = 1$.

האגף השמאלי. נגזור את N :

$$N'(s) = (\sin s, -\cos s)$$

האגף הימני.

$$-kT = -1 \cdot (-\sin s, \cos s) = (\sin s, -\cos s)$$

שני האגפים שווים, ולכן $N' = -kT$ מתקיימת, כנדרש.

2.5 משפטי יחידות

2.5.1 משפט

תהי $v(s)$ פונקציה וקטורית המקיימת

$$\|v(s)\| = \text{const}$$

אזי

$$\frac{dv}{ds} \perp v(s)$$

2.5.2 הערה

נזכור כי $T = \frac{d\alpha}{ds}$, ולכן

$$\alpha = \int_0^s T du + \alpha_0$$

כאשר α_0 הוא קבוע המציין את נקודת ההתחלה של המסלול.

2.5.3 מסקנה

אם $T(s)$ ידוע וכן ידועה נקודת ההתחלה, אז המסלול ידוע.

משפט 2.5.4.

תהי $\alpha(s)$ עקומה בפרמטריזציה אורך קשת. אם ידועה נקודת ההתחלה α_0 , וכן ידוע הערך $T(0)$, אז הפונקציה $k(s)$ מגדירה חד-ערכית את $\alpha(s)$.

מסקנה 2.5.5.

$k(s)$ מגדירה עקומה יחידה בפרמטריזציה אורך קשת, עד כדי הזזה וסיבוב של המישור.

תרגילים

שאלה 2.5.6.

תהי $\alpha(s)$ עקומה בפרמטריזציה אורך קשת שעקמומיותה המסומנת קבועה, $k \equiv c$. הראו שאם $c = 0$ מדובר בישר, ושם $c \neq 0$ מדובר במעגל ברדיוס $\frac{1}{|c|}$.

פתרון.

שלב 1: פונקציית הזווית. לפי ההגדרה $k = \frac{d\theta}{ds} = c$, ולכן באינטגרציה

$$\theta(s) = cs + \theta_0$$

כאשר $\theta_0 = \theta(0)$.

שלב 2: הוקטור המשיק.

$$T(s) = (\cos(cs + \theta_0), \sin(cs + \theta_0))$$

שלב 3: שחזור העקומה. לפי הערה 2.5.2, $\alpha(s) = \int_0^s T(u) du + \alpha_0$

המקרה $c = 0$. אז $T \equiv (\cos \theta_0, \sin \theta_0)$ קבוע, ולכן

$$\alpha(s) = \alpha_0 + s (\cos \theta_0, \sin \theta_0)$$

וזו בדיוק המשוואה הפרמטרית של ישר העובר דרך α_0 בכיוון קבוע.

המקרה $c \neq 0$. נחשב את שני האינטגרלים בנפרד; בשניהם נשתמש בהצבה $w = cu + \theta_0$, שעבורה $dw = c du$, כלומר $du = \frac{dw}{c}$

$$\int_0^s \cos(cu + \theta_0) du = \frac{\sin(cu + \theta_0)}{c} \Big|_0^s = \frac{1}{c} (\sin(cs + \theta_0) - \sin \theta_0)$$

$$\int_0^s \sin(cu + \theta_0) du = \frac{-\cos(cu + \theta_0)}{c} \Big|_0^s = \frac{1}{c} (-\cos(cs + \theta_0) + \cos \theta_0)$$

נציב ונפריד בין האיברים הקבועים לאיברים התלויים ב- s :

$$\alpha(s) = \underbrace{\left[\alpha_0 + \frac{1}{c} (-\sin \theta_0, \cos \theta_0) \right]}_{=: P} + \frac{1}{c} (\sin(cs + \theta_0), -\cos(cs + \theta_0))$$

שלב 4: זיהוי. האיבר השני הוא וקטור שאורכו

$$\left\| \frac{1}{|c|} (\sin(cs + \theta_0), -\cos(cs + \theta_0)) \right\| = \frac{1}{|c|} \sqrt{\sin^2 + \cos^2} = \frac{1}{|c|}$$

כלומר

$$\|\alpha(s) - P\| = \frac{1}{|c|}$$

לכל s . זהו בדיוק התנאי לכך שכל נקודות העקומה נמצאות במרחק קבוע $\frac{1}{|c|}$ מהנקודה P , כלומר **מעגל** שמרכזו P ורדיוסו $\frac{1}{|c|}$.

התוצאה עקבית עם התרגיל על המעגל: שם קיבלנו $k = \frac{1}{R}$, וכאן $R = \frac{1}{|c|}$. לפי מסקנה 2.5.5 אלה הן העקומות היחידות בעלות עקמומיות קבועה, עד כדי הזהה וסיבוב.

שאלה 2.5.7

עקומה בפרמטריזציה אורך קשת מקיימת $k(s) = \frac{1}{1+s^2}$, ונתון $\alpha(0) = (0, 1)$ וכן $T(0) = (1, 0)$. שחזרו את העקומה.

פתרון.

לפי המשפט, הנתונים הללו קובעים את העקומה באופן יחיד; נשחזר אותה בפועל.

שלב 1: פונקציית הזווית. נשלב את k לפי אורך הקשת:

$$\theta(s) = \theta(0) + \int_0^s k(u) du = \theta(0) + \int_0^s \frac{du}{1+u^2}$$

והאינטגרל האחרון הוא $\arctan$, ולכן

$$\theta(s) = \theta(0) + \arctan(s)$$

מהתנאי $T(0) = (1, 0) = (\cos \theta(0), \sin \theta(0))$ נובע $\theta(0) = 0$, ולכן

$$\theta(s) = \arctan(s)$$

שלב 2: הוקטור המשיק. נבנה משולש ישר-זווית עם ניצבים 1 ו- s ויתר $\sqrt{1+s^2}$, ונקבל

$$T(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s)) = \left(\frac{1}{\sqrt{1+s^2}}, \frac{s}{\sqrt{1+s^2}} \right)$$

שלב 3: אינטגרציה. נחשב כל רכיב בנפרד.

הרכיב הראשון. נציב

$$u = \sinh w$$

ואז

$$du = \cosh w dw$$

ולפי $\cosh^2 = 1 + \sinh^2$

$$\sqrt{1+u^2} = \sqrt{1+\sinh^2 w} = \cosh w$$

הגבולות עוברים מ- $u = 0$ ל- $w = 0$, ומ- $u = s$ ל- $w = \operatorname{arcsinh}(s)$. המונה והמכנה מצטמצמים, ונשאר

$$\int_0^s \frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = \int_0^{\operatorname{arcsinh}(s)} \frac{\cosh w dw}{\cosh w} = \int_0^{\operatorname{arcsinh}(s)} dw = \operatorname{arcsinh}(s)$$

הרכיב השני. כאן נוח להציב משתנה אחר, ולכן נסמן אותו v כדי שלא יתבלבל עם w שלמעלה:

$$v = 1 + u^2$$

ואז

$$dv = 2u du \quad \Leftrightarrow \quad u du = \frac{dv}{2}$$

הגבולות עוברים מ- $u = 0$ ל- $v = 1$, ומ- $u = s$ ל- $v = 1 + s^2$, ולכן

$$\int_0^s \frac{u du}{\sqrt{1+u^2}} = \frac{1}{2} \int_1^{1+s^2} \frac{dv}{\sqrt{v}} = \sqrt{v} \Big|_1^{1+s^2} = \sqrt{1+s^2} - 1$$

שלב 4: הרכבה.

$$\begin{aligned} \alpha(s) &= \alpha_0 + \left(\operatorname{arcsinh}(s), \sqrt{1+s^2} - 1 \right) \\ &= (0, 1) + \left(\operatorname{arcsinh}(s), \sqrt{1+s^2} - 1 \right) \\ &= \left(\operatorname{arcsinh}(s), \sqrt{1+s^2} \right) \end{aligned}$$

בזה הסתיים למעשה הפתרון: מה שקיבלנו הוא פרמטריזציה במהירות יחידה, ולפי מסקנה 2.5.5 זו העקומה היחידה בעלת העקמומיות הנתונה, עד כדי הזזה וסיבוב. השלב הבא הוא רשות, והוא נועד לזהות את העקומה בשמה.

שלב 5: זיהוי (רשות). נסמן $t = \operatorname{arcsinh}(s)$, כלומר $s = \sinh t$. אז

$$\sqrt{1+s^2} = \sqrt{1+\sinh^2 t} = \cosh t$$

ולכן

$$\alpha = (t, \cosh t)$$

זהו בדיוק **קו השרשרת**, ומה שקיבלנו בשלב 4 הוא הפרמטריזציה הטבעית שחישבנו עבורו קודם.

אפשר היה לקצר. בשאלה 2.4.9 כבר חישבנו שעקמומיות קו השרשרת, כפונקציה של אורך הקשת, היא $\frac{1}{1+s^2}$, וזו בדיוק העקמומיות הנתונה כאן. מכיוון שגם תנאי ההתחלה מתאימים, משפט 2.5.4 נותן מיד שהעקומה היא קו השרשרת, בלי לשחזר דבר. השחזור שלמעלה מראה כיצד המשפט עובד בפועל.

2.6 עקומות סגורות ועקמומיות כוללת

2.6.1 משפט

בעקומה סגורה וחלקה מתקיים

$$\oint k ds = 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

2.6.2 הגדרה — העקמומיות הכוללת.

עבור עקומה פרמטרית חלקה $\alpha(s)$ הנתונה בפרמטריזציה אורך קשת, $s \in [a, b]$, העקמומיות הכוללת מוגדרת כאינטגרל של העקמומיות $k(s)$ לפי אורך הקשת:

$$\text{Total Curvature} = \int_a^b k(s) ds.$$

2.6.3 הערה

כאשר העקומה היא מישורית, העקמומיות היא קצב השינוי של זווית המשיק $\theta(s)$, ולכן לפי המשפט היסודי מתקיים

$$\int_a^b k(s) ds = \theta(b) - \theta(a).$$

כלומר העקמומיות הכוללת מודדת במישור בדיוק את הזווית המצטברת שבה וקטור המשיק מסתובב.

תרגילים

2.6.4 שאלה

חשבו את העקמומיות הכוללת של מעגל היחידה, פעם כשהוא נסרק **נגד** כיוון השעון ופעם **עם** כיוון השעון, וודאו את המשפט $\oint k ds = 2\pi n$.

פתרון.

נגד כיוון השעון. ניקח $\alpha(s) = (\cos s, \sin s)$, $s \in [0, 2\pi]$. ראינו כבר ש- s הוא פרמטר אורך קשת ושהעקמומיות היא $k = 1$ לכן

$$\oint k ds = \int_0^{2\pi} 1 ds = 2\pi.$$

כלומר $n = 1$.

עם כיוון השעון. ניקח $\beta(s) = (\cos s, -\sin s)$, $s \in [0, 2\pi]$. נגזור:

$$\beta'(s) = (-\sin s, -\cos s)$$

ומתקיים $\|\beta'(s)\| = 1$, כלומר גם כאן s הוא פרמטר אורך קשת ו- $T = (-\sin s, -\cos s)$

נחשב את הנורמל:

$$N = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin s \\ -\cos s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos s \\ -\sin s \end{pmatrix}$$

כעת נגזור את T :

$$T'(s) = (-\cos s, \sin s)$$

נשווה ל- kN :

$$kN = k(\cos s, -\sin s)$$

וכדי ששני האגפים יהיו שווים דרוש $k = -1$. לכן

$$\oint k ds = \int_0^{2\pi} (-1) ds = -2\pi$$

כלומר $n = -1$.

מסקנה. אותה קבוצת נקודות במישור, אך שני כיווני סריקה, נותנת $\pm 2\pi$. זו בדיוק המשמעות של הסימן בעקמומיות המסומנת, ובשני המקרים התקבל כפולה שלמה של 2π כנדרש במשפט.

הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

שאלה 2.6.5

עבור קו השרשרת $\gamma(t) = (t, \cosh t)$ חישבנו קודם (בתרגילים על העקמומיות) שפונקציית הזווית ואורך הקשת מקיימים $\theta = \arctan(s)$, ולכן העקמומיות המסומנת, כפונקציה של אורך הקשת, היא

$$k(s) = \frac{1}{1+s^2}$$

חשבו את העקמומיות הכוללת של קשת קו השרשרת בין $s = a$ ל- $s = b$, ואת העקמומיות הכוללת של קו השרשרת כולו.

פתרון.

חישוב ישיר. ראינו ש- $k(s) = \frac{1}{1+s^2}$, ולכן

$$\int_a^b k(s) ds = \int_a^b \frac{ds}{1+s^2} = \arctan(s)|_a^b = \arctan(b) - \arctan(a)$$

אימות מול ההערה. ראינו גם ש- $\theta(s) = \arctan(s)$, ולכן התוצאה שקיבלנו היא בדיוק

$$\theta(b) - \theta(a)$$

בהתאמה מלאה לזהות $\int_a^b k ds = \theta(b) - \theta(a)$.

קו השרשרת כולו. ניקח $a \rightarrow -\infty$ ו- $b \rightarrow \infty$. מכיוון ש-

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \arctan(b) = \frac{\pi}{2}, \quad \lim_{a \rightarrow -\infty} \arctan(a) = -\frac{\pi}{2}$$

נקבל

$$\int_{-\infty}^{\infty} k(s) ds = \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \pi$$

פירוש. לאורך קו השרשרת כולו וקטור המשיק מסתובב בסך הכול בזווית π : הוא מתחיל כמעט אנכי כלפי מטה בזרוע השמאלית, עובר אופקי בנקודה הנמוכה, ומסיים כמעט אנכי כלפי מעלה בזרוע הימנית. שימו לב שהעקומה אינה סגורה, ולכן אין סתירה למשפט שלפיו בעקומה סגורה מתקבלת כפולה שלמה של 2π .

2.7 מקורות

התרגילים בפרק זה מבוססים על, או מותאמים מתוך:

- *Geometry Differential Elementary* Pressley, Andrew 2010 Springer, edition, 2nd — סעיפים 1.1–1.3 ו-2.1–2.2.
- *Surfaces and Curves of Geometry Differential* Tapp, Kristopher 2016 Springer — פרק 1.

הפתרונות נכתבו במלואם כאן, ואינם מועתקים מספרי הפתרונות של המקורות.

3 תרגול: 3 עקמומיות בפרמטריזציה כללית, המעגל המשיק והאווולוט

3.1 עקמומיות בפרמטריזציה כללית

כבר ראינו שכל עקומה רגולרית ניתנת לפרמטריזציה מחדש לפי אורך קשת, אך קיומה של פרמטריזציה כזו אינו אומר שנוכל לרשום אותה במפורש: כבר עבור האליפסה אורך הקשת הוא אינטגרל אליפטי שאין לו ביטוי סגור. מכיון שכל ההגדרות שנתנו לעקמומיות נוסחו בפרמטריזציות אורך קשת, דרושות לנו נוסחאות המחשבות אותה מכל פרמטריזציה רגולרית נתונה.

נוסחאות כאלה קיימות, שכן העקמומיות היא תכונה של העקומה ולא של אופן המעבר עליה, עד כדי סימן. המעבר בין פרמטריזציה כללית לפרמטריזצית אורך קשת נעשה תמיד באותו אופן, ולכן נרשום אותו כאן פעם אחת.

למה 3.1.1 — גזירה לפי אורך קשת.

תהי $\alpha(t)$ עקומה רגולרית ויהי s פרמטר אורך הקשת שלה. אז לכל פונקציה גזירה f מתקיים לפי כלל השרשרת

$$\frac{df}{dt} = \frac{df}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = \|\alpha'(t)\| \cdot \frac{df}{ds},$$

ומכיון ש- $\frac{ds}{dt} = \|\alpha'(t)\| > 0$ אפשר לחלק ולקבל גם את הכיוון ההפוך

$$\frac{df}{ds} = \frac{df/dt}{ds/dt} = \frac{1}{\|\alpha'(t)\|} \cdot \frac{df}{dt}$$

שתי הנוסחאות שלהלן הוכחו בהרצאה.

משפט 3.1.2 — עקמומיות בקואורדינטות כלליות.

תהי $\alpha(t) = (x(t), y(t))$ עקומה רגולרית במישור. אז

$$k = \frac{x'y'' - x''y'}{\|\alpha'\|^3} = \frac{\det(\alpha', \alpha'')}{\|\alpha'\|^3}$$

מסקנה 3.1.3 — עקמומיות של גרף.

אם העקומה נתונה על ידי המשוואה $y = f(x)$, אז

$$k = \frac{f''}{\left(\sqrt{1 + (f')^2}\right)^3}$$

תרגילים

שאלה 3.1.4

תהי $a > 0$. חשבו את העקמומיות המסומנת של ההיפרבולה $x^2 - y^2 = a^2$ בענף שבו $x > 0$, בעזרת פרמטריזציה באמצעות $\cosh$ ו- $\sinh$.

פתרון.

הזהויות ההיפרבוליות. נפתח את ההגדרות $\cosh t = \frac{e^t + e^{-t}}{2}$ ו- $\sinh t = \frac{e^t - e^{-t}}{2}$ ונקבל את שתי הזהויות שישמשו אותנו:

$$\begin{aligned} \cosh^2 t - \sinh^2 t &= \frac{(e^t + e^{-t})^2 - (e^t - e^{-t})^2}{4} \\ &= \frac{(e^{2t} + 2 + e^{-2t}) - (e^{2t} - 2 + e^{-2t})}{4} \\ &= \frac{4}{4} = 1 \\ \cosh^2 t + \sinh^2 t &= \frac{(e^t + e^{-t})^2 + (e^t - e^{-t})^2}{4} \\ &= \frac{(e^{2t} + 2 + e^{-2t}) + (e^{2t} - 2 + e^{-2t})}{4} \\ &= \frac{2e^{2t} + 2e^{-2t}}{4} = \frac{e^{2t} + e^{-2t}}{2} = \cosh(2t) \end{aligned}$$

שלב 1: הפרמטריזציה (אפשר לדלג)

הזהות הראשונה נותנת מיד את הפרמטריזציה

$$\alpha(t) = (a \cosh t, a \sinh t), \quad t \in \mathbb{R}$$

שכן

$$(a \cosh t)^2 - (a \sinh t)^2 = a^2 (\cosh^2 t - \sinh^2 t) = a^2$$

מכיוון ש- $\cosh t > 0$ לכל t , מתקיים $x = a \cosh t > 0$, ולכן הפרמטריזציה נמצאת כולה בענף המבוקש. היא גם מכסה אותו כולו, שכן $\sinh$ מקבלת כל ערך ממשי, ולכן כל ערך אפשרי של y מתקבל.

שלב 2: נגזרות (אפשר לדלג)

$$\alpha'(t) = (a \sinh t, a \cosh t)$$

$$\alpha''(t) = (a \cosh t, a \sinh t)$$

שלב 3: רגולריות והנורמה (אפשר לדלג)

לפי הזהות השנייה מתקבל

$$\|\alpha'(t)\|^2 = a^2 \sinh^2 t + a^2 \cosh^2 t = a^2 \cosh(2t)$$

ומכיון ש- $\cosh(2t) \geq 1$ מתקיים $\|\alpha'(t)\| \geq a > 0$, כלומר הפרמטריזציה רגולרית. בנוסף

$$\|\alpha'(t)\|^3 = a^3 \left(\sqrt{\cosh(2t)} \right)^3$$

שלב 4: הדטרמיננטה (אפשר לדלג)

נסדר את α' ואת α'' כעמודות ונחשב:



$$\begin{aligned} \det(\alpha', \alpha'') &= \det \begin{pmatrix} a \sinh t & a \cosh t \\ a \cosh t & a \sinh t \end{pmatrix} \\ &= a \sinh t \cdot a \sinh t - a \cosh t \cdot a \cosh t \\ &= a^2 (\sinh^2 t - \cosh^2 t) \\ &= -a^2 \end{aligned}$$

שלב 5: העקמומיות (אפשר לדלג)

נציב ונקבל

$$k(t) = \frac{\det(\alpha', \alpha'')}{\|\alpha'(t)\|^3} = \frac{-a^2}{a^3 \left(\sqrt{\cosh(2t)} \right)^3} = \frac{-1}{a \left(\sqrt{\cosh(2t)} \right)^3}$$

פירוש. בקודקוד $t = 0$ מתקבל $k = -\frac{1}{a}$, וזהו הערך הגדול ביותר בערך מוחלט, כלומר שם ההיפרבולה מתעקלת ביותר. כאשר $t \rightarrow \pm\infty$ מתקיים $\cosh(2t) \rightarrow \infty$ ולכן $k \rightarrow 0$, בהתאם לכך שהענף מתיישר ומתקרב לאסימפטוטות $y = \pm x$. הסימן שלילי לכל אורך הענף: ככל ש- t גדל, וקטור המשיק פונה תחילה שמאלה ומעלה, בקודקוד הוא אנכי, ולאחר מכן ימינה ומעלה, כלומר הוא מסתובב עם כיוון השעון.



שתי התכונות שבפירוש, עבור $a = 1$. משמאל: הענף מצויר בקנה מידה גדול דיו כדי שייראה כיצד הוא מתלכד עם האסימפטוטות $y = \pm x$. כל העקמומיות מרוכזת בסביבת הקודקוד, ושם $\frac{1}{|k|} = a$; הזרועות נראות ישרות לעין. מימין: העקמומיות עצמה, שלילית תמיד, מינימלית בקודקוד ושואפת לאפס במהירות. שני הפנלים אומרים אותו דבר.

שאלה 3.1.5.

מצאו עקומה רגולרית במישור שמהירותה קבועה ושווה ל-4, ושעקמומיותה המסומנת מקיימת $k \equiv -3$.

פתרון.

שימו לב שהמהירות אינה 1, ולכן t אינו פרמטר אורך קשת, ואי אפשר להשתמש ישירות בנוסחאות שנוסחו עבור פרמטריזציית אורך קשת.

שלב 1: המשיק (אפשר לדלג)

המהירות קבועה ושווה ל-4, כלומר $\|\alpha'(t)\| = 4$, ולכן

$$\alpha'(t) = 4T(t) = 4(\cos \theta(t), \sin \theta(t))$$

כאשר $\theta(t)$ היא פונקציית הזווית של וקטור המשיק היחידה.

שלב 2: פונקציית הזווית (אפשר לדלג)

לפי הגדרת העקמומיות המסומנת k , ולפי למה 3.1.1, $\frac{d\theta}{ds} = k$

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{d\theta}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = k \cdot \|\alpha'(t)\| = (-3) \cdot 4 = -12$$

באינטגרציה נקבל

$$\theta(t) = -12t + \theta_0$$

כאשר θ_0 הוא קבוע.

שלב 3: אינטגרציה (אפשר לדלג)

נציב את $\theta(t)$ ונקבל

$$\alpha'(t) = 4 (\cos(-12t + \theta_0), \sin(-12t + \theta_0))$$

ונבצע אינטגרציה רכיב-רכיב:

$$\int 4 \cos(-12t + \theta_0) dt = \frac{4}{-12} \sin(-12t + \theta_0) = -\frac{1}{3} \sin(-12t + \theta_0)$$

$$\int 4 \sin(-12t + \theta_0) dt = \frac{-4}{-12} \cos(-12t + \theta_0) = \frac{1}{3} \cos(-12t + \theta_0)$$

ולכן

$$\alpha(t) = \alpha_0 + \frac{1}{3} (-\sin(-12t + \theta_0), \cos(-12t + \theta_0))$$

כאשר α_0 הוא וקטור קבוע.

שלב 4: בחירת הקבועים (אפשר לדלג)

הקבועים θ_0 ו- α_0 הם כיוון ההתחלה ונקודת ההתחלה, וכל בחירה שלהם נותנת פתרון. נבחר $\theta_0 = 0$ ו- $\alpha_0 = 0$ ונקבל

$$\alpha(t) = \frac{1}{3} (\sin(12t), \cos(12t))$$

שאלה 3.1.6


תהי γ עקומה מישורית רגולרית ויהי λ קבוע ממשי. העקומה המקבילה γ_λ מוגדרת על ידי

$$\gamma_\lambda(t) = \gamma(t) + \lambda N(t)$$

הראו שאם $\lambda k(t) \neq 1$ לכל t , אז γ_λ רגולרית, ושעקמומיותה המסומנת היא

$$k_\lambda = \frac{k}{|1 - \lambda k|}$$

$$\gamma_\lambda = \gamma + \lambda N \text{ for } \gamma(t) = (2\cos t, \sin t)$$



העקומה המקבילה $\gamma_\lambda = \gamma + \lambda N$ לאליפסה, עבור שלושה ערכים של λ . הקווים המנוקדים הם הנורמלים, וכולם באותו אורך. עבור $\lambda < 0$ המקבילה נמצאת מחוץ לאליפסה ועבור $\lambda > 0$ בתוכה, ובכל המקרים המרחק בין שתי העקומות קבוע. הגרסה האינטראקטיבית זמינה בגרסה המקוונת.

פתרון.

לאורך הפתרון נסמן את מהירות העקומה ב-

$$v(t) = \left\| \frac{d\gamma}{dt}(t) \right\|$$

ומכיוון ש- γ רגולרית מתקיים $v(t) > 0$ לכל t . שימו לב להבחנה בין שני סוגי הנגזרות: כל נגזרת המסומנת ב- $\frac{d}{dt}$ היא לפי הפרמטר, ואילו משוואות פרנה-סרה נוסחו לפי **אורך הקשת** s . המעבר בין השניים נעשה תמיד דרך למה 3.1.1.

שלב 1: גזירה (אפשר לדלג)

נגזור את γ_λ לפי הפרמטר t :

$$\frac{d\gamma_\lambda}{dt} = \frac{d\gamma}{dt} + \lambda \frac{dN}{dt}$$

את $\frac{dN}{dt}$ נחשב בשני צעדים. ראשית, לפי הלמה,

$$\frac{dN}{dt} = v(t) \cdot \frac{dN}{ds}$$

ושנית, לפי משוואות פרנה-סרה, $\frac{dN}{ds} = -kT$. נשלב את השניים ונקבל

$$\frac{dN}{dt} = -v(t) k T$$

בנוסף, מהגדרת הוקטור המשיק היחידה, $\frac{d\gamma}{dt} = v(t) T$. נציב את שני הביטויים ונוציא גורם משותף:

$$\frac{d\gamma_\lambda}{dt} = vT - \lambda v k T = v(1 - \lambda k) T$$

כלומר הנגזרת מקבילה תמיד ל- T , וכל המידע נמצא במקדם.

שלב 2: רגולריות (אפשר לדלג)

נסמן

$$\sigma(t) = 1 - \lambda k(t)$$

מהשלב הקודם, ומכיון ש- $\|T\| = 1$,

$$\left\| \frac{d\gamma_\lambda}{dt}(t) \right\| = v(t) |\sigma(t)|$$

מכיון ש- $v(t) > 0$, הגודל הזה חיובי אם ורק אם $\sigma(t) \neq 0$, כלומר אם ורק אם $\lambda k(t) \neq 1$, וזו בדיוק ההנחה. לכן γ_λ רגולרית.

שלב 3: הסימן קבוע (אפשר לדלג)

הפונקציה σ רציפה, שכן k רציפה, והראינו שאינה מתאפסת באף נקודה. לפי משפט ערך הביניים פונקציה רציפה שאינה מתאפסת בקטע שומרת על סימן קבוע, ולכן נוכל לסמן

$$\varepsilon = \text{sign}(\sigma) \in \{+1, -1\}$$

ומתקיים $\sigma = \varepsilon |\sigma|$. נשתמש בכך בשלב האחרון: מכיון ש- ε קבוע, הנגזרת שלו היא אפס.

שלב 4: הוקטורים של העקומה המקבילה (אפשר לדלג)

מהשלב הראשון,

$$T_\lambda = \frac{\frac{d\gamma_\lambda}{dt}}{\left\| \frac{d\gamma_\lambda}{dt} \right\|} = \frac{v \sigma T}{v |\sigma|} = \frac{\sigma}{|\sigma|} T = \varepsilon T$$

הוקטור הנורמלי מתקבל מהמשיק בסיבוב של 90° , והסיבוב הוא העתקה לינארית, ולכן אפשר להוציא את הסקלר:

$$N_\lambda = \varepsilon N$$

שימו לב שכאשר $\varepsilon = -1$ שני הוקטורים מתהפכים יחד, ולא רק אחד מהם. זו הסיבה שבסוף יתקבל ערך מוחלט.

שלב 5: העקמומיות (אפשר לדלג)

נחשב את $\frac{dT_\lambda}{ds_\lambda}$, כלומר את הנגזרת של T_λ לפי אורך הקשת של γ_λ , שאותו נסמן s_λ . שוב נשתמש בלמה, ונחשב בנפרד את המונה ואת המכנה.

במונה: מכיוון ש- ε קבוע אפשר להוציא אותו מהגזירה, ואז לעבור לגזירה לפי אורך הקשת של γ ולהשתמש בפרנה-סרה:

$$\frac{dT_\lambda}{dt} = \varepsilon \frac{dT}{dt} = \varepsilon v(t) \frac{dT}{ds} = \varepsilon v(t) k N$$

במכנה, לפי שלב 2,

$$\frac{ds_\lambda}{dt} = \left\| \frac{d\gamma_\lambda}{dt}(t) \right\| = v(t) |\sigma(t)|$$

נחלק, והמהירות $v(t)$ מצטמצמת:

$$\frac{dT_\lambda}{ds_\lambda} = \frac{dT_\lambda/dt}{ds_\lambda/dt} = \frac{\varepsilon v k N}{v |\sigma|} = \frac{\varepsilon k}{|\sigma|} N$$

מצד שני, לפי הגדרת העקמומיות המסומנת של γ_λ ולפי שלב 4,

$$\frac{dT_\lambda}{ds_\lambda} = k_\lambda N_\lambda = k_\lambda \varepsilon N$$

שני הביטויים הם כפולות של אותו וקטור N , ולכן אפשר להשוות את המקדמים:

$$k_\lambda \varepsilon = \frac{\varepsilon k}{|\sigma|}$$

ובחלוקה ב- ε , שאינו אפס,

$$k_\lambda = \frac{k}{|\sigma|} = \frac{k}{|1 - \lambda k|}$$

פירוש. התנאי $\lambda k \neq 1$ הוא בדיוק $\lambda \neq \frac{1}{k}$: העקומה המקבילה מאבדת את הרגולריות כאשר המרחק λ שווה ל- $\frac{1}{k}$.

3.2 המעגל המשיק

3.2.1 הגדרה — המעגל המשיק.

המעגל המשיק לעקומה בנקודה מסוימת מייצג את הקירוב המקומי הטוב ביותר לעקומה באותה נקודה, והוא מוגדר על ידי שאיפה של שלוש נקודות על העקומה לנקודה אחת.

בנקודות שבהן $k(t) \neq 0$, רדיוס המעגל המשיק הוא

$$R(t) = \frac{1}{\kappa(t)} = \frac{1}{|k(t)|}$$

ומרכזו הוא

$$c(t) = \alpha(t) + \frac{1}{k(t)} N(t)$$

3.2.2 הערה — רעיון ההוכחה.

נסתכל על העקומה בצירים שלה עצמה: נעביר את הראשית לנקודה $\gamma(s_0)$, וניקח כצירים את T ואת N באותה נקודה. העקומה רגולרית, ולכן מותר להניח שהיא נתונה בפרמטריזציה אורך קשת, ואז $\gamma' = T$ וגם $\gamma'' = kN$. לפי טיילור מתקבל

$$\gamma(s_0 \pm \delta) - \gamma(s_0) = \pm \delta T + \frac{\delta^2}{2} kN + o(\delta^2)$$

כלומר בצירי T ו- N שלוש הנקודות הן פשוט

$$(0, 0), \quad \left(\pm \delta, \frac{k}{2} \delta^2 \right)$$

במילים אחרות, בצירים שלה עצמה כל עקומה נראית עד כדי סדר שני כמו הפרבולה $y = \frac{k}{2} x^2$, וזהו מקורן של הקואורדינטות המסובבות שבהן נעשה החישוב בהרצאה.

כעת אפשר להעביר מעגל. שלוש הנקודות נמצאות על ישר אחד אם ורק אם $k = 0$, ולכן כאשר $k \neq 0$ קיים מעגל יחיד העובר דרכן. מטעמי סימטריה מרכזו נמצא על ציר N , נאמר בנקודה $(0, \rho)$, ומשוואת המעגל נותנת

$$\delta^2 + \left(\rho - \frac{k}{2} \delta^2 \right)^2 = \rho^2$$

ואחרי פתיחת הסוגריים וצמצום ב- δ^2 נשאר

$$1 - \rho k + \frac{k^2}{4} \delta^2 = 0$$


כלומר

$$\rho = \frac{1 + \frac{k^2}{4} \delta^2}{k} \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} \frac{1}{k}$$

שימו לב ש- ρ הוא הקואורדינטה של המרכז לאורך N , ולא רדיוס, ולכן אין זה מפתיע שיצא לו סימן: כאשר $k < 0$ המרכז נמצא בצדה השני של העקומה. הרדיוס הוא $|\rho|$, והוא שואף ל- $\frac{1}{|k|}$.

הציור שלהלן מראה את הרעיון הזה בצירי T ו- N . העקומה, הנקודה, הישר המשיק והוקטורים T ו- N קבועים בו, ורק המרווח δ משתנה: מסומנות שתי הנקודות $\gamma(s_0 \pm \delta)$, האנכים מהן לישר המשיק, המעגל העובר דרך שלוש

הנקודות, והרדיוס המחבר את נקודת הבסיס למרכזו. כאשר מקטינים את δ , המעגל הופך למעגל המשיק והרדיוס מתיישר על N .




המעגל העובר דרך שלוש הנקודות, בשני מרווחים, בצירי T ו- N של נקודת הבסיס. הישר האופקי הוא הישר המשיק, הקווים המנוקדים הם האנכים אליו, והקטע המקווקו הוא הרדיוס. כאשר המרווח קטן, הרדיוס מתיישר על N ואורכו עולה מ-1.346 ל-1.782, לעבר $\frac{1}{|k|} = 1.852$. הגרסה האינטראקטיבית, שבה אפשר להקטין את המרווח ברציפות, זמינה בגרסה המקוונת.

3.3 האולוט והאינוולוטה

3.3.1 הגדרה — האולוט.

האולוט של עקומה $\alpha(t)$ הוא אוסף מרכזי המעגלים המשיקים לעקומה:

$$E(t) = \alpha(t) + \frac{1}{k(t)} \cdot N(t)$$



האוולוט של האליפסה $\gamma(t) = (2\cos t, \sin t)$ הוא האסטרואידה. בארבע נקודות מצוירים המעגלים המשיקים והקטעים המחברים כל נקודה למרכז המעגל שלה; אוסף המרכזים הוא בדיוק העקומה הסגולה. הגרסה האינטראקטיבית זמינה בגרסה המקוונת.

הגדרה 3.3.2 — האינולוטה.

האינולוטה של עקומה $\alpha(t)$ היא עקומה $I(t)$ כך ש- $\alpha(t)$ היא האוולוט שלה.

הגדרה 3.3.3 — אינולוטה — הגדרה מפורשת.

תהי $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ עקומה רגולרית, ותהי $s_\alpha(u)$ פונקציית אורך הקשת שלה, הנמדדת מנקודה כלשהי $\alpha(u_0)$. אינולוטה של α היא העקומה

$$I(u) = \alpha(u) - s_\alpha(u) T_\alpha(u)$$

כאשר $T_\alpha = \frac{\alpha'}{\|\alpha'\|}$ הוא הוקטור המשיק היחידה של α .

הערה 3.3.4 — פירוש: חוט נפרם.

אפשר לחשוב על I כעל המסלול שמתאר קצהו של חוט מתוח הנפרם מן העקומה α , כשהפרימה מתחילה בנקודה $\alpha(u_0)$. הנימוק המלא מופיע בפתרון שאלה 3.3.11.

הערה 3.3.5

שימו לב שאמרנו **אינוולוטה** ולא **האינוולוטה**: לכל בחירה של נקודת ההתחלה u_0 מתקבלת עקומה אחרת, ולכן לעקומה יש **משפחה** של אינוולוטות. אפשר לרשום את המשפחה במפורש בעזרת פרמטר λ_0 ,

$$I(t) = \alpha(t) - (t + \lambda_0) \alpha'(t)$$

כאשר α נתונה בפרמטריזציה אורך קשת, ו- λ_0 הוא אורך ה"זנב" של החוט שטרם נפרם.

במקרה קיצוני זה בולט במיוחד: עבור נקודה בודדת מקבלים את כל המעגלים שמרכזם בנקודה.

למעשה יש בידינו **שתי** הגדרות שונות לאינוולוטה. הגדרה 3.3.2 מגדירה אותה על ידי **תכונה**: עקומה שהאולוט שלה הוא α . לעומת זאת הגדרה 3.3.3 נותנת **נוסחה** מפורשת. עדיין לא ראינו ששתי ההגדרות מתלכדות, וזה מה שנעשה כעת. הכלי לכך הוא חישוב הוקטורים והעקמומיות של העקומה שהנוסחה מגדירה.

למה 3.3.6 — הוקטורים והעקמומיות של האינוולוטה.

תהי α עקומה רגולרית שעקמומיותה המסומנת k , ותהי

$$I(u) = \alpha(u) - s(u)T(u)$$

אינוולוטה שלה, כאשר s הוא אורך הקשת של α הנמדד מ- $\alpha(u_0)$. נסמן $\varepsilon = \text{sign}(sk)$. אז בכל נקודה שבה $sk \neq 0$ מתקיים

$$T_I = -\varepsilon N, \quad N_I = \varepsilon T$$

והעקמומיות המסומנת של I היא

$$k_I = \frac{\varepsilon}{s}$$

הוכחה.

הנגזרת. נגזור את I לפי u לפי כלל המכפלה

$$I' = \alpha' - s' T - s T'$$

ומכיון ש- $\|\alpha'\| = s'$ וגם $\|\alpha'\| T$, שני האיברים הראשונים מצטמצמים ונשאר

$$I' = -s T'$$

לפי למה 3.1.1 ולפי משוואות פרנה-סרה

$$T' = \|\alpha'\| \frac{dT}{ds} = \|\alpha'\| k N$$

ולכן

$$I' = -s k \|\alpha'\| N$$

הוקטורים. מהשוויון האחרון $\|I'\| = |sk| \|\alpha'\|$, ולכן

$$T_I = \frac{I'}{\|I'\|} = -\varepsilon N$$

הוקטור N_I מתקבל מ- T_I בסיבוב של 90° , וסיבוב כזה מעביר את N ל- $-T$, ולכן

$$N_I = -\varepsilon \cdot (-T) = \varepsilon T$$

העקמומיות. נגזור את $T_I = -\varepsilon N$ לפי u , ונשתמש ב- $kT = -\|\alpha'\|$: $N' = -\|\alpha'\|$

$$\frac{dT_I}{du} = -\varepsilon N' = \varepsilon k \|\alpha'\| T$$

יהי s_I אורך הקשת של I . לפי למה 3.1.1

$$\frac{dT_I}{ds_I} = \frac{dT_I/du}{ds_I/du} = \frac{\varepsilon k \|\alpha'\| T}{|sk| \|\alpha'\|} = \frac{\varepsilon k}{|s| |k|} T = \frac{1}{s} T$$

שכן $\varepsilon k = \text{sign}(s) |k|$. מצד שני, לפי הגדרת העקמומיות המסומנת $k_I \varepsilon T = k_I N_I = \frac{dT_I}{ds_I}$, והשוואת שני

הביטויים נותנת $k_I \varepsilon = \frac{1}{s}$, כלומר $k_I = \frac{\varepsilon}{s}$.

3.3.7 — שתי ההגדרות מתלכדות.

תהי α עקומה רגולרית, ותהי $I = \alpha - sT$ העקומה שמגדירה הגדרה 3.3.3. אז האוולוט של I הוא α , כלומר I היא אינולוטה של α גם במובן של הגדרה 3.3.2.

הוכחה.

מהנוסחה $I = \alpha - sT$ נובע מיד

$$\alpha = I + sT$$

נותר להראות שהמחובר sT הוא בדיוק $\frac{1}{k_I} N_I$, שכן אז אגף ימין הוא האוולוט של I לפי הגדרה 3.3.1.


לפי למה 3.3.6 מתקיים $N_I = \varepsilon T$ וגם $k_I = \frac{\varepsilon}{s}$, ולכן

$$\frac{1}{k_I} N_I = \frac{s}{\varepsilon} \cdot \varepsilon T = sT$$

שכן ε מצטמצם. בהצבה מתקבל

$$\alpha = I + \frac{1}{k_I} N_I$$

כלומר α היא בדיוק האוולוט של I , כנדרש.



האינולוטה של מעגל היחידה. הקטעים הכתומים הם החוט המתוח: כל אחד מהם משיק למעגל, ואורכו שווה בדיוק לאורך הקשת שכבר נפרמה. קצה החוט משרטט את העקומה הסגולה. הגרסה האינטראקטיבית זמינה בגרסה המקוונת.

תרגילים

שאלה 3.3.8.

תהי $\gamma(s)$ עקומה מישורית בפרמטריזצית אורך קשת, ויהי

$$E(s) = \gamma(s) + \frac{1}{k(s)} N(s)$$

האוולוט שלה. נניח ש- $k'(s) \neq 0$ לכל s , ולשם הנוחות ש- $k'(s) > 0$, מה שאפשר להשיג על ידי החלפת s ב- $-s$. מכיוון שהפרמטריזציה היא באורך קשת, הסימן $'$ מציין כאן גזירה לפי s .

1. הראו שאורך הקשת של E הוא $-\frac{1}{k(s)}$, עד כדי תוספת קבוע.

2. חשבו את העקמומיות המסומנת של E .
3. הראו שכל הישרים הנורמליים ל- γ משיקים ל- E . מסיבה זו מתארים לעיתים את האוולוט כמעטפת של הישרים הנורמליים לעקומה.

פתרון.

שלב 1: גזירת האוולוט (אפשר לדלג)

נגזור את $E = \gamma + \frac{1}{k}N$ לפי s , אבר אבר. הנגזרת של המחובר הראשון היא $\gamma' = T$. את המחובר השני נגזור לפי כלל המכפלה:

$$\left(\frac{1}{k}N\right)' = \left(\frac{1}{k}\right)'N + \frac{1}{k}N'$$

לגורם הראשון, לפי כלל השרשרת,

$$\left(\frac{1}{k}\right)' = -\frac{k'}{k^2}$$

ולגורם השני, לפי משוואות פרנה-סרה, $N' = -kT$, ולכן $\frac{1}{k}N' = -T$. נחבר את שלושת האיברים:

$$E' = T - \frac{k'}{k^2}N - T = -\frac{k'}{k^2}N$$

שימו לב שהאיבר T הצטמצם. זהו הצעד המרכזי: **האוולוט נע תמיד בכיוון N** , כלומר בכיוון הנורמלי לעקומה המקורית.

שלב 2: אורך הקשת (אפשר לדלג)

מכיוון ש- $\|N\| = 1$,

$$\|E'\| = \left|\frac{k'}{k^2}\right| = \frac{k'}{k^2}$$

שכן $k' > 0$ לפי ההנחה ו- $k^2 > 0$. אורך הקשת של E הוא לכן

$$s_E = \int \|E'\| ds = \int \frac{k'}{k^2} ds$$

כדי לחשב את האינטגרל נשים לב ש-

$$\frac{d}{ds} \left(-\frac{1}{k}\right) = \frac{k'}{k^2}$$

ולכן

$$s_E = -\frac{1}{k} + \text{const}$$

שלב 3: הוקטורים של האוילוט (אפשר לדלג)

מהשלב הראשון

$$T_E = \frac{E'}{\|E'\|} = \frac{-\frac{k'}{k^2}N}{\frac{k'}{k^2}} = -N$$

הוקטור הנורמלי מתקבל בסיבוב של 90° , וסיבוב כזה מעביר את N ל- $-T$, ולכן

$$N_E = -(-T) = T$$

שלב 4: העקמומיות (אפשר לדלג)

נחשב את $\frac{dT_E}{ds_E}$. במונה,

$$\frac{dT_E}{ds} = -N' = kT$$

ובמכנה, לפי שלב 2, $\frac{ds_E}{ds} = \frac{k'}{k^2}$. לכן

$$\frac{dT_E}{ds_E} = \frac{dT_E/ds}{ds_E/ds} = \frac{kT}{\frac{k'}{k^2}} = \frac{k^3}{k'} T$$

מצד שני $\frac{dT_E}{ds_E} = k_E N_E = k_E T$ לפי שלב 3, ולכן

$$k_E = \frac{k^3}{k'}$$

שלב 5: הישרים הנורמליים (אפשר לדלג)

הישר הנורמלי ל- γ בנקודה $\gamma(s)$ הוא הקבוצה

$$\{\gamma(s) + \lambda N(s) : \lambda \in \mathbb{R}\}$$

ובבחירה $\lambda = \frac{1}{k(s)}$ מתקבלת בדיוק הנקודה $E(s)$. לכן $E(s)$ נמצאת על הישר הנורמלי.

נותר לבדוק את הכיוון. הישר הנורמלי מקביל לוקטור $N(s)$, ולפי שלב 3 הוקטור המשיק לאוילוט בנקודה זו הוא $T_E = -N(s)$, שגם הוא מקביל ל- $N(s)$. הישר עובר דרך $E(s)$ ומקביל למשיק ל- E שם, ולכן הוא הישר המשיק ל- E בנקודה $E(s)$.

שאלה 3.3.9.

תהי $a > 0$ קבוע. הראו שהאווילוט של הציקלואידה

$$\gamma(t) = a(t - \sin t, 1 - \cos t), \quad 0 < t < 2\pi$$

הוא

$$E(t) = a(t + \sin t, -1 + \cos t)$$

ושלאחר פרמטריזציה מחדש מתאימה אפשר לקבל את E מ- γ על ידי הזזה של המישור.

פתרון.

הפרמטריזציה כאן אינה באורך קשת, ולכן נסמן את המהירות ב- $\left\| \frac{d\gamma}{dt}(t) \right\|$ ונעבור לאורך קשת דרך למה
3.1.1.

שלב 1: הנגזרת והמהירות (אפשר לדלג)

$$\frac{d\gamma}{dt} = a(1 - \cos t, \sin t)$$

נשתמש בזהויות $1 - \cos t = 2 \sin^2 \frac{t}{2}$ ו- $\sin t = 2 \sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2}$, ונקבל

$$\frac{d\gamma}{dt} = 2a \sin \frac{t}{2} \left(\sin \frac{t}{2}, \cos \frac{t}{2} \right)$$

הוקטור בסוגריים הוא וקטור יחידה, ובתחום $0 < t < 2\pi$ מתקיים $\sin \frac{t}{2} > 0$, ולכן

$$v(t) = 2a \sin \frac{t}{2}$$

שלב 2: הוקטורים (אפשר לדלג)

מהשלב הקודם

$$T = \frac{1}{v} \cdot \frac{d\gamma}{dt} = \left(\sin \frac{t}{2}, \cos \frac{t}{2} \right)$$

ובסיבוב של 90°

$$N = \left(-\cos \frac{t}{2}, \sin \frac{t}{2} \right)$$

שלב 3: העקמומיות (אפשר לדלג)

נגזור את T לפי t :

$$\frac{dT}{dt} = \frac{1}{2} \left(\cos \frac{t}{2}, -\sin \frac{t}{2} \right)$$

ונשים לב שהוקטור בסוגריים הוא בדיוק $-N$. לפי הלמה

$$\frac{dT}{ds} = \frac{dT/dt}{ds/dt} = \frac{\frac{1}{2}(-N)}{2a \sin \frac{t}{2}} = -\frac{1}{4a \sin \frac{t}{2}} N$$

מצד שני $\frac{dT}{ds} = kN$, ולכן

$$k = -\frac{1}{4a \sin \frac{t}{2}}, \quad \frac{1}{k} = -4a \sin \frac{t}{2}$$

שלב 4: האוולוט (אפשר לדלג)

נציב בהגדרה:

$$\frac{1}{k} N = -4a \sin \frac{t}{2} \left(-\cos \frac{t}{2}, \sin \frac{t}{2} \right) = \left(4a \sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2}, -4a \sin^2 \frac{t}{2} \right)$$

נשתמש שוב באותן זהויות, בכיוון ההפוך: $4a \sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2} = 2a \sin t$ וגם $4a \sin^2 \frac{t}{2} = 2a(1 - \cos t)$. לכן

$$\frac{1}{k} N = (2a \sin t, -2a(1 - \cos t))$$

נחבר ל- γ :

$$E = a(t - \sin t + 2 \sin t, 1 - \cos t - 2 + 2 \cos t) = a(t + \sin t, -1 + \cos t)$$

שלב 5: זיהוי הציקלואידה (אפשר לדלג)

נציב $t = \tilde{t} - \pi$, כלומר נסמן מחדש את הפרמטר ב- $\tilde{t} = t + \pi$. לפי נוסחאות ההזזה $\sin(\tilde{t} - \pi) = -\sin \tilde{t}$ ו- $\cos(\tilde{t} - \pi) = -\cos \tilde{t}$, ולכן

$$E = a(\tilde{t} - \pi - \sin \tilde{t}, -1 - \cos \tilde{t})$$


נפריד את האיברים הקבועים:

$$E = a(\tilde{t} - \sin \tilde{t}, 1 - \cos \tilde{t}) + a(-\pi, -2)$$

המחובר הראשון הוא בדיוק $\gamma(\tilde{t})$, ולכן האוולוט מתקבל מהציקלואידה המקורית על ידי הזזה בוקטור $a(-\pi, -2)$.

הערה על תחום הפרמטר. בשאלה נתון $0 < t < 2\pi$, כלומר קשת אחת של הציקלואידה, אך הפרמטריזציה מחדש $\tilde{t} = t + \pi$ מזיזה את חלון הפרמטר ל- $\pi < \tilde{t} < 3\pi$. לכן מה שהראינו הוא שהאוולוט הוא ההזזה של הציקלואידה **בחלון הזה**, ולא של הקשת הנתונה עצמה.

אפשר לראות זאת גם ישירות: לקשת של γ יש חודים בשני קצותיה, ואילו ל- E יש חוד יחיד באמצע, ב- $t = \pi$, ולכן בתחום הנתון E מורכבת משתי **חצאי** קשתות. כדי לומר "האוולוט של הציקלואידה הוא אותה ציקלואידה מוזזת" יש להתייחס לציקלואידה כולה, $t \in \mathbb{R}$, ולא לקשת בודדת. בציור שלהלן מצוירות כמה קשתות, ושם החפיפה נראית מיד.



הציקלואידה והאוולוט שלה. בארבע נקודות מצוירים המעגלים המשיקים והקטעים המחברים כל נקודה למרכז המעגל שלה. האוולוט הוא קשת ציקלואידה החופפת למקורית, מוזזת בוקטור $a(-\pi, -2)$. הגרסה האינטראקטיבית זמינה בגרסה המקוונת.

שאלה 3.3.10

בסימוני התרגיל הקודם, ודאו ישירות שהציקלואידה היא אינוולוטה של האוולוט שלה: חשבו את הוקטור המשיק T_E ואת פונקציית אורך הקשת s_E של E , ובדקו שעבור בחירה מתאימה של קבוע האינטגרציה מתקיים

$$E(t) - s_E(t)T_E(t) = \gamma(t)$$

פתרון.

שלב 1: מה צריך להראות (אפשר לדלג)

לפי הגדרה 3.3.3, אינוולוטה של עקומה מתקבלת מהנוסחה "העקומה, פחות אורך הקשת שלה כפול הוקטור המשיק שלה". כאן העקומה שממנה יוצאים היא האוולוט E , ולכן עלינו לחשב שני גדלים של E עצמו: את הוקטור המשיק T_E ואת פונקציית אורך הקשת s_E , ורק אז לבדוק את השוויון.

שלב 2: תחום העבודה (אפשר לדלג)

התוצאות של שאלה 3.3.8 נוסחו תחת ההנחה $k' \neq 0$, ולכן נבדוק היכן היא מתקיימת כאן. מהתרגיל הקודם

$$k = -\frac{1}{4a \sin \frac{t}{2}}$$

ובגזירה לפי t מתקבל

$$\frac{dk}{dt} = \frac{\cos \frac{t}{2}}{8a \sin^2 \frac{t}{2}}$$

כדי לעבור לגזירה לפי אורך הקשת נחלק במהירות $\frac{ds}{dt} = 2a \sin \frac{t}{2}$, שהיא חיובית בתחום, ולכן הסימן נשמר:

$$k' = \frac{dk/dt}{ds/dt} = \frac{\cos \frac{t}{2}}{16a^2 \sin^3 \frac{t}{2}}$$

הביטוי חיובי עבור $0 < t < \pi$ ומתאפס ב- $t = \pi$, שם ל- E יש חוד. לכן נעבוד בתחום $0 < t < \pi$, ובתחום $\pi < t < 2\pi$ החישוב זהה עד להיפוך סימן.

שלב 3: המשיק ואורך הקשת של האוולוט (אפשר לדלג)

לפי שאלה 3.3.8,

$$T_E = -N, \quad s_E = -\frac{1}{k} + \text{const}$$

את שני הגדלים של הציקלואידה כבר חישבנו בתרגיל הקודם:

$$N = \left(-\cos \frac{t}{2}, \sin \frac{t}{2} \right)$$

$$-\frac{1}{k} = 4a \sin \frac{t}{2}$$

נבחר את קבוע האינטגרציה להיות אפס ונקבל

$$T_E = \left(\cos \frac{t}{2}, -\sin \frac{t}{2} \right)$$

$$s_E = 4a \sin \frac{t}{2}$$

שימו לב ש- $s_E(0) = 0$ זו בדיוק "הבחירה המתאימה" שבניסוח השאלה, ופירושה שאורך הקשת של E נמדד מהנקודה $E(0)$.

שלב 4: הצבה (אפשר לדלג)

נחשב תחילה את המכפלה

$$s_E T_E = 4a \sin \frac{t}{2} \left(\cos \frac{t}{2}, -\sin \frac{t}{2} \right) = \left(4a \sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2}, -4a \sin^2 \frac{t}{2} \right)$$

נשתמש באותן זהויות חצי-זוויות מהתרגיל הקודם, $4a \sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2} = 2a \sin t$ וגם $4a \sin^2 \frac{t}{2} = 2a(1 - \cos t)$, ונקבל

$$s_E T_E = (2a \sin t, -2a(1 - \cos t))$$

כעת נחסר מ- $E(t) = a(t + \sin t, -1 + \cos t)$ רכיב-רכיב. הרכיב הראשון:

$$at + a \sin t - 2a \sin t = a(t - \sin t)$$

והרכיב השני:

$$-a + a \cos t - (-2a + 2a \cos t) = a - a \cos t = a(1 - \cos t)$$

יחד:

$$E(t) - s_E(t) T_E(t) = a(t - \sin t, 1 - \cos t) = \gamma(t)$$

מסקנה. הציקלואידה היא אינולוטה של האוולוט שלה, כשהפרימה מתחילה בנקודה $E(0)$. יחד עם טענה 3.3.7, שלפיו האוולוט של אינולוטה הוא העקומה המקורית, מתקבלת התמונה המלאה: שתי הפעולות הפוכות זו לזו.

שאלה 3.3.11

חוט באורך ℓ מוצמד לנקודה $\gamma(0)$ של עקומה מישורית $\gamma(s)$ הנתונה בפרמטריזציית אורך קשת.

1. הראו שכאשר החוט נכרך על העקומה תוך שמירה על מתיחותו, קצהו מתאר את העקומה

$$I(s) = \gamma(s) + (\ell - s) T(s)$$

כאשר $0 < s < \ell$.

2. בניח שהעקמומיות המסומנת של γ אינה מתאפסת, נאמר $k(s) > 0$ לכל s . הראו שהעקמומיות המסומנת של I היא $\frac{1}{\ell - s}$.

פתרון.

חלק 1 (אפשר לדלג)

נתאר את מצב החוט ברגע שבו הוא נכרך על העקומה עד הנקודה $\gamma(s)$. החלק הכרוך מונח על העקומה מ- $\gamma(0)$ עד $\gamma(s)$, והפרמטריזציה היא באורך קשת, ולכן אורכו הוא בדיוק s . מכאן שאורך החלק החופשי הוא $\ell - s$.

החוט מתוח, ולכן החלק החופשי הוא קטע ישר. הוא יוצא מנקודת ההיפרדות $\gamma(s)$ בכיוון המשיק $T(s)$: אילו היה יוצא בכיוון אחר, היה אפשר לקצר אותו, בסתירה למתיחות. לכן קצה החוט נמצא בנקודה

$$I(s) = \gamma(s) + (\ell - s) T(s)$$

כנדרש.

חלק 2 (אפשר לדלג)

נרשום את I בצורה שבה מופיעה הלמה:

$$I(s) = \gamma(s) - (s - \ell) T(s)$$

זו בדיוק הנוסחה של למה 3.3.6, כאשר אורך הקשת נמדד מהנקודה שבה $s = \ell$, כלומר עם $\tilde{s} = s - \ell$.

בתחום $0 < s < \ell$ מתקיים $\tilde{s} < 0$, ולפי ההנחה $k > 0$, ולכן

$$\varepsilon = \text{sign}(\tilde{s}k) = -1$$

לפי הלמה

$$k_I = \frac{\varepsilon}{\tilde{s}} = \frac{-1}{s - \ell} = \frac{1}{\ell - s}$$

פירוש. ככל שהחוט מתקצר, כלומר $\ell \rightarrow s$, העקמומיות של I שואפת לאינסוף. זה מתאים לכך שבנקודה $s = \ell$ החוט נגמר, ושם לאינוולוטה יש נקודה סינגולרית.

שאלה 3.3.12

נתון קו השרשרת

$$\gamma(t) = (t, \cosh t)$$

ונתבון באינוולוטה שלו עבור $\ell = 0$, כלומר באינוולוטה שבה אורך הקשת נמדד מהנקודה הנמוכה $\gamma(0) = (0, 1)$.

1. הסיקו שבפרמטר t עצמו האינוולוטה נתונה על ידי

$$I(t) = \gamma(t) - \sinh(t) T(t)$$

2. הראו שמכאן מתקבלת הטריקס

$$x = t - \tanh t, \quad y = \frac{1}{\cosh t}$$

פתרון.

שלב 1: המהירות ואורך הקשת (אפשר לדלג)

נגזור:

$$\frac{d\gamma}{dt} = (1, \sinh t)$$

ולפי הזהות $\cosh^2 - \sinh^2 = 1$ מתקבל

$$\left\| \frac{d\gamma}{dt} \right\| = \sqrt{1 + \sinh^2 t} = \cosh t$$

אורך הקשת הנמדד מהנקודה הנמוכה, כלומר מ- $t = 0$, הוא לכן

$$s(t) = \int_0^t \cosh u \, du = \sinh t$$

זהו בדיוק התוכן של התנאי $\ell = 0$: אורך החוט שכבר נפרם, כשמתחילים מהנקודה הנמוכה, הוא $\sinh t$.

שלב 2: הנוסחה בפרמטר t (אפשר לדלג)

כאן נמצאת הנקודה המעניינת. ההגדרה בהגדרה 3.3.3 אינה מניחה פרמטריזציה אורך קשת: היא נוסחה עבור עקומה רגולרית כלשהי, ואומרת

$$I = \gamma - sT$$

לכן אין צורך לעבור לפרמטריזציה אורך קשת, ודי להציב את $s(t) = \sinh t$ שחישבנו בשלב הקודם:

$$I(t) = \gamma(t) - \sinh(t) T(t)$$

מעבר לפרמטר אחר היה רק מאריך את החישוב, בלי לשנות דבר בתוצאה.

שלב 3: הוקטור המשיק (אפשר לדלג)

מהשלב הראשון

$$T(t) = \frac{1}{\left\| \frac{d\gamma}{dt} \right\|} \cdot \frac{d\gamma}{dt} = \frac{1}{\cosh t} (1, \sinh t)$$

שלב 4: הצבה (אפשר לדלג)

נחשב תחילה את המחובר השני:

$$\sinh(t) T(t) = \frac{\sinh t}{\cosh t} (1, \sinh t) = \left(\tanh t, \frac{\sinh^2 t}{\cosh t} \right)$$

כעת נחסר מ- $\gamma(t)$ רכיב־רכיב. הרכיב הראשון מיידי:


$$t - \tanh t$$

ברכיב השני נאחד למכנה משותף ונשתמש שוב באותה זהות:

$$\cosh t - \frac{\sinh^2 t}{\cosh t} = \frac{\cosh^2 t - \sinh^2 t}{\cosh t} = \frac{1}{\cosh t}$$

$$I(t) = \left(t - \tanh t, \frac{1}{\cosh t} \right)$$

הערה. בנקודה $t = 0$ אורך החוט מתאפס, ולכן $I(0) = \gamma(0) = (0, 1)$. שם יש לטרקטריקס חוד, כפי שרואים בציור שלהלן.



קו השרשרת והאינוולוטה שלו עבור $\ell = 0$, כלומר כשהחוט נפרם מהנקודה $(0, 1)$. הקטעים הכתומים הם החוט המתוח: כל אחד מהם משיק לקו השרשרת, ואורכו שווה לאורך הקשת שנפרמה. קצה החוט משרטט את הטרקטריקס. הגרסה האינטראקטיבית זמינה בגרסה המקוונת.

3.4 מקורות

- 2010 Springer, edition, 2nd, *Geometry Differential Elementary* Pressley, Andrew
- *Euclidean in Surfaces Geometry: Differential in Course First A* Bolton, J. and Woodward M. L.
- 2018 Press, University Cambridge, *Space*
- 2016 Springer, *Surfaces and Curves of Geometry Differential* Tapp, Kristopher

4 תרגול: 4 עקומות במרחב

4.1 מכפלה וקטורית

המכפלה הווקטורית היא הכלי שבו נבנה את המסגרת הנעה של עקומה במרחב, ולכן נאסוף כאן את התכונות שישמשו אותנו.

הגדרה 4.1.1 — מכפלה וקטורית.

עבור $a = (a_1, a_2, a_3)$ ו- $b = (b_1, b_2, b_3) \in \mathbb{R}^3$, המכפלה הווקטורית שלהם מוגדרת על ידי

$$a \times b = (a_2 b_3 - a_3 b_2, a_3 b_1 - a_1 b_3, a_1 b_2 - a_2 b_1)$$

הערה 4.1.2 — כלל הזיכרון.

נוח לזכור את ההגדרה כפיתוח פורמלי של דטרמיננטה לפי השורה הראשונה,

$$a \times b = \det \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix},$$

כאשר e_1, e_2, e_3 הם וקטורי הבסיס הסטנדרטי. זהו כלל זיכרון בלבד, שכן בשורה הראשונה יושבים וקטורים ולא סקלרים, אך המקדמים שהוא מייצר הם בדיוק אלה שבהגדרה.

טענה 4.1.3 — תכונות יסודיות.

לכל $a, b, c \in \mathbb{R}^3$ ולכל סקלר λ מתקיים:

1. **אנטי-סימטריה:** $b \times a = -(a \times b)$, ובפרט $a \times a = 0$.
2. **בילינאריות:** $(a + \lambda c) \times b = a \times b + \lambda(c \times b)$, ובאותו אופן ברכיב השני.
3. **ניצבות:** $\langle a \times b, a \rangle = \langle a \times b, b \rangle = 0$.

הוכחה.

אנטי-סימטריה. בהחלפת התפקידים של a ו- b כל אחד משלושת הרכיבים בהגדרה מחליף סימן. למשל הרכיב הראשון הופך מ- $a_2 b_3 - a_3 b_2$ ל- $b_2 a_3 - b_3 a_2$, שהוא נגדי לו. עבור $a \times a$ נציב $b = a$ ונקבל $a \times a = -(a \times a)$, ולכן $a \times a = 0$.

בילינאריות. כל רכיב בהגדרה הוא צירוף של מכפלות שבהן מופיע רכיב אחד של a ורכיב אחד של b , ולכן הוא לינארי בכל אחד מהם בנפרד.

ניצבות. נחשב ישירות:

$$\langle a \times b, a \rangle = a_1 (a_2 b_3 - a_3 b_2) + a_2 (a_3 b_1 - a_1 b_3) + a_3 (a_1 b_2 - a_2 b_1)$$

נפתח את הסוגריים ונקבל שישה מחוברים,

$$, a_1 a_2 b_3 - a_1 a_3 b_2 + a_2 a_3 b_1 - a_1 a_2 b_3 + a_1 a_3 b_2 - a_2 a_3 b_1$$

והם מצטמצמים בזוגות. עבור b החישוב זהה, או לחלופין נשתמש באנטי-סימטריה.

טענה 4.1.4 — המכפלה המעורבת.

לכל $a, b, c \in \mathbb{R}^3$ מתקיים

$$, \langle a \times b, c \rangle = \det(a, b, c)$$

כאשר $\det(a, b, c)$ היא הדטרמיננטה של המטריצה ששורותיה a, b ו- c .

הוכחה.

נפתח את הדטרמיננטה לפי השורה השלישית:

$$. \det(a, b, c) = c_1 \det \begin{pmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{pmatrix} - c_2 \det \begin{pmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{pmatrix} + c_3 \det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{pmatrix}$$

שלושת המינורים הם

$$, a_2 b_3 - a_3 b_2, \quad a_1 b_3 - a_3 b_1, \quad a_1 b_2 - a_2 b_1$$

ולכן, עם הסימנים המתחלפים,

$$, \det(a, b, c) = c_1 (a_2 b_3 - a_3 b_2) + c_2 (a_3 b_1 - a_1 b_3) + c_3 (a_1 b_2 - a_2 b_1)$$

וזו בדיוק המכפלה הפנימית של c עם הווקטור שבהגדרת $a \times b$.

מסקנה 4.1.5 — אורך המכפלה.

לכל $a, b \in \mathbb{R}^3$ מתקיימת זהות לגראנז'

$$, \|a \times b\|^2 = \|a\|^2 \|b\|^2 - \langle a, b \rangle^2$$

ולכן, אם θ היא הזווית בין a ל- b ,

$$. \|a \times b\| = \|a\| \|b\| \sin \theta$$

בפרט $a \times b = 0$ אם ורק אם a ו- b תלויים לינארית.

הוכחה.

את זהות לגראנז' מקבלים בפתיחה ישירה של שני האגפים; שניהם מסתכמים באותם מחוברים. מכאן, לפי $\langle a, b \rangle = \|a\| \|b\| \cos \theta$,

$$, \|a \times b\|^2 = \|a\|^2 \|b\|^2 (1 - \cos^2 \theta) = \|a\|^2 \|b\|^2 \sin^2 \theta$$

ומכיון ש- $0 \leq \theta \leq \pi$ מתקיים $\sin \theta \geq 0$, ואפשר להוציא שורש בלי ערך מוחלט.

לבסוף, $a \times b = 0$ אם ורק אם $\|a\| \|b\| \sin \theta = 0$, כלומר אם אחד הווקטורים הוא אפס או $\theta \in \{0, \pi\}$, וזה בדיוק תנאי התלות הלינארית.

טענה 4.1.6 — פיתוח המכפלה המשולשת.

לכל $a, b, c \in \mathbb{R}^3$ מתקיים

$$. a \times (b \times c) = \langle a, c \rangle b - \langle a, b \rangle c$$

הוכחה.

שני האגפים לינאריים בכל אחד משלושת המשתנים, ולכן די לבדוק את הזהות על וקטורי הבסיס הסטנדרטי e_1, e_2, e_3 . נבדוק את הרכיב הראשון של האגף השמאלי ישירות מההגדרה.

נסמן $u = b \times c$, כלומר $u_1 = b_2 c_3 - b_3 c_2$ וכן הלאה. הרכיב הראשון של $a \times u$ הוא

$$a_2 u_3 - a_3 u_2 = a_2 (b_1 c_2 - b_2 c_1) - a_3 (b_3 c_1 - b_1 c_3)$$

נפתח ונאסוף לפי b_1 ולפי c_1 :

$$a_2 b_1 c_2 - a_2 b_2 c_1 - a_3 b_3 c_1 + a_3 b_1 c_3 = b_1 (a_2 c_2 + a_3 c_3) - c_1 (a_2 b_2 + a_3 b_3)$$

נוסיף ונחסר את המחובר החסר $a_1 b_1 c_1$ בכל אחד מהסוגריים:

$$, b_1 (a_1 c_1 + a_2 c_2 + a_3 c_3) - c_1 (a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3)$$

שכן התוספות $b_1 a_1 c_1$ ו- $c_1 a_1 b_1$ שוות ומבטלות זו את זו. הביטוי האחרון הוא בדיוק הרכיב הראשון של $b \times c$. עבור הרכיבים השני והשלישי החישוב זהה, בהחלפה מעגלית של האינדקסים.

טענה 4.1.7 — כלל המכפלה לגזירה.

תהייה $u(t)$ ו- $v(t)$ פונקציות וקטוריות גזירות ב- $\mathbb{R}^3$. אז

$$\frac{d}{dt} (u \times v) = \frac{du}{dt} \times v + u \times \frac{dv}{dt}$$

הוכחה.

נבדוק רכיב-רכיב. הרכיב הראשון של $u \times v$ הוא $u_2 v_3 - u_3 v_2$, ולפי כלל המכפלה לפונקציות סקלריות

$$\frac{d}{dt} (u_2 v_3 - u_3 v_2) = (u'_2 v_3 - u'_3 v_2) + (u_2 v'_3 - u_3 v'_2)$$

המחובר הראשון הוא הרכיב הראשון של $u' \times v$, והשני הוא הרכיב הראשון של $u \times v'$. שני הרכיבים הנותרים מתקבלים באותו אופן.

שימו לב שהסדר נשמר: מכיוון שהמכפלה הווקטורית אנטי-סימטרית, אסור להחליף את סדר הגורמים באגף ימין.

תרגילים

שאלה 4.1.8.

תהי $\{u, v\}$ זוג וקטורים אורתונורמליים ב- $\mathbb{R}^3$. הראו ש- $\{u, v, u \times v\}$ הוא בסיס אורתונורמלי של $\mathbb{R}^3$.

פתרון.

שלב 1: ניצבות (אפשר לדלג)

לפי טענה 4.1.3 הווקטור $u \times v$ ניצב ל- u ול- v , ולפי ההנחה u ו- v ניצבים זה לזה. לכן שלושת הווקטורים ניצבים בזוגות.

שלב 2: אורך (אפשר לדלג)

לפי מסקנה 4.1.5

$$\|u \times v\|^2 = \|u\|^2 \|v\|^2 - \langle u, v \rangle^2 = 1 \cdot 1 - 0 = 1$$

ולכן $\|u \times v\| = 1$. יחד עם ההנחה שגם u ו- v הם וקטורי יחידה, שלושת הווקטורים אורתונורמליים.

שלב 3: בסיס (אפשר לדלג)

קבוצה אורתונורמלית היא בפרט בלתי תלויה לינארית: אם $\alpha u + \beta v + \gamma (u \times v) = 0$, נכפול סקלרית ב- u ונקבל $\alpha = 0$, ובאותו אופן $\beta = \gamma = 0$. שלושה וקטורים בלתי תלויים ב- $\mathbb{R}^3$ מהווים בסיס.

שאלה 4.1.9

הראו שהמכפלה הווקטורית אינה אסוציאטיבית, כלומר שקיימים a, b, c שעבורם

$$(a \times b) \times c \neq a \times (b \times c)$$

פתרון.

דוגמה נגדית (אפשר לדלג)

ניקח $a = b = e_1$ ו- $c = e_2$. באגף שמאל

$$(e_1 \times e_1) \times e_2 = 0 \times e_2 = 0$$

שכן $a \times a = 0$ לפי טענה 4.1.3.

באגף ימין נשתמש בטענה 4.1.6:

$$e_1 \times (e_1 \times e_2) = \langle e_1, e_2 \rangle e_1 - \langle e_1, e_1 \rangle e_2 = 0 \cdot e_1 - 1 \cdot e_2 = -e_2$$

שני האגפים שונים, ולכן אין אסוציאטיביות.

4.2 עקומות במרחב

4.2.1 הגדרה — עקומה במרחב.

עקומה ב- $\mathbb{R}^3$ היא פונקציה

$$\gamma(t) = (\gamma^1(t), \gamma^2(t), \gamma^3(t))$$

והיא רגולרית בנקודה t_0 אם $\gamma'(t_0)$ קיימת ושונה מאפס. במקרה זה $\gamma'(t_0)$ הוא הוקטור המשיק לעקומה בנקודה.

4.2.2 הגדרה — אורך קשת במרחב.

תהי $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ עקומה רגולרית. אורכה הוא

$$L = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt = \int_a^b \sqrt{(\gamma^1'(t))^2 + (\gamma^2'(t))^2 + (\gamma^3'(t))^2} dt$$

ופרמטר אורך הקשת מוגדר על ידי

$$s(t) = \int_0^t \|\gamma'(u)\| du$$

4.2.3 הגדרה — המסגרת הנעה.

תהי $\gamma(s)$ עקומה במרחב בפרמטריזציית אורך קשת, שעקמומיותה

$$k(s) = \|T'(s)\|$$

אינה מתאפסת. אז מוגדרים

• הוקטור המשיק

$$T(s) = \gamma'(s)$$

• הוקטור הנורמלי הראשי

$$N(s) = \frac{1}{k(s)} T'(s)$$

• הוקטור הבי-נורמלי

$$B(s) = T(s) \times N(s)$$

$$N = \frac{T'}{\|T'\|} \text{ ו- } T = \frac{\gamma'}{\|\gamma'\|}$$

4.2.4 הערה — שימו לב לשינוי בהגדרות.

שתי נקודות שבהן ההגדרה במרחב שונה מזו שבמישור.

ראשית, במישור הגדרנו את N כסיבוב של T בזווית 90° , וסיבוב כזה אינו קיים במרחב. לכן N מוגדר כאן דרך T' עצמו, ומכאן שהוא מוגדר רק היכן ש- $T' \neq 0$.

שנית, ומאותה סיבה, העקמומיות במרחב היא $k = \|T'\|$ ולכן אי-שלילית תמיד, בעוד שבמישור k הייתה מסומנת. הסימן היה תלוי בבחירת הכיוון של N , ובמרחב אין בחירה כזו.

4.2.5 טענה — המסגרת אורתונורמלית וימנית.

בכל נקודה שבה $k \neq 0$, השלישייה $\{T, N, B\}$ היא בסיס אורתונורמלי ימני של $\mathbb{R}^3$, ומתקיים

$$T \times N = B, \quad N \times B = T, \quad B \times T = N$$

הוכחה.

T הוא וקטור יחידה לפי ההגדרה, ו- N הוא וקטור יחידה שכן חילקנו את T' באורכו. הניצבות של T ו- N נובעת מכך ש- $\|T\| \equiv 1$: בגזירת $\langle T, T \rangle = 1$ מתקבל $\langle T', T \rangle = 0$, ומכיון ש- N מקביל ל- T' גם $\langle N, T \rangle = 0$.

מכאן, לפי שאלה 4.1.8, $\{T, N, T \times N\}$ הוא בסיס אורתונורמלי, וזה בדיוק $\{T, N, B\}$. הזהויות המחזוריות הן התכונה הסטנדרטית של בסיס אורתונורמלי ימני.

4.3 מערכת פרנה-סרה

4.3.1 הגדרה — פיתול.

תהי $\gamma(s)$ עקומה במרחב בפרמטריזציית אורך קשת שעקמומיותה אינה מתאפסת. אז קיים סקלר $\tau(s)$, הנקרא **הפיתול של γ** , כך ש-

$$B'(s) = -\tau(s)N(s)$$

הוכחה.

צריך להראות ש- B' אכן מקביל ל- N ; הסקלר τ מוגדר אז כמקדם, והסימן המינוס הוא מוסכמה שתחסוך סימנים בהמשך.

B' **ניצב ל- B** . הווקטור B הוא וקטור יחידה, ולכן בגזירת $\langle B, B \rangle = 1$ מתקבל $\langle B', B \rangle = 0$. B' **ניצב ל- T** . נגזור את $B = T \times N$ לפי טענה 4.1.7:

$$B' = T' \times N + T \times N'$$

המחובר הראשון מתאפס, שכן $T' = kN$ ולכן $T' \times N = k(N \times N) = 0$. נשאר

$$B' = T \times N'$$

ולפי טענה 4.1.3 הביטוי הזה ניצב ל- T .

מסקנה. B' ניצב גם ל- B וגם ל- T , ומכיון ש- $\{T, N, B\}$ בסיס אורתונורמלי, המשלים הניצב ל- $\text{span}\{T, B\}$ נפרש על ידי N . לכן B' מקביל ל- N , כלומר $B' = -\tau N$ עבור סקלר τ מתאים.

משפט 4.3.2 — משוואות פרנה-סרה.

תהי $\gamma(s)$ עקומה במרחב בפרמטריזציית אורך קשת שעקמומיותה אינה מתאפסת. אז

$$\begin{cases} T' = kN \\ N' = -kT + \tau B \\ B' = -\tau N \end{cases}$$

ובכתיב מטריציוני

$$\begin{pmatrix} T' \\ N' \\ B' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & k & 0 \\ -k & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T \\ N \\ B \end{pmatrix}$$

הוכחה.

המשוואה הראשונה היא הגדרת N , והשלישית היא הגדרה 4.3.1. נותרה השנייה.

נשתמש בזהות $N = B \times T$ מטענה 4.2.5 ונגזור אותה לפי טענה 4.1.7:

$$N' = B' \times T + B \times T'$$

נציב את שתי המשוואות הידועות, $B' = -\tau N$ ו- $T' = kN$:

$$N' = (-\tau N) \times T + B \times (kN) = -\tau(N \times T) + k(B \times N)$$

לפי הזהויות המחזוריות $N \times T = -B$ וגם $B \times N = -T$, ולכן

$$N' = -\tau(-B) + k(-T) = -kT + \tau B$$

הערה 4.3.3.

המטריצה במשפט היא **אנטי-סימטרית**, כלומר שווה למינוס המשוחלפת שלה. זו אינה מקריות: היא הביטוי לכך שהמסגרת נשארת אורתונורמלית לאורך העקומה. גם קל יותר לזכור כך את המערכת, שכן די לזכור את שני המקדמים k ו- τ ואת מקומם.

טענה 4.3.4 — פיתול מודד יציאה ממישור.

תהי γ עקומה רגולרית ב- $\mathbb{R}^3$ שעקמומיותה אינה מתאפסת. אז התמונה של γ מוכלת במישור אם ורק אם $\tau \equiv 0$.

הוכחה.

נניח שהפרמטריזציה היא באורך קשת; זה אינו משנה לא את הפיתול ולא את השאלה אם העקומה מישורית.

כיוון ראשון. נניח שהעקומה מוכלת במישור $\langle v, N_0 \rangle = d$, כאשר N_0 וקטור יחידה קבוע. נגזור את $\langle \gamma, N_0 \rangle = d$ לפי s ונקבל

$$\langle T, N_0 \rangle = 0$$

ובגזירה נוספת, מכיוון ש- N_0 קבוע,

$$\langle T', N_0 \rangle = 0$$

אבל $T' = kN$ ו- $k \neq 0$, ולכן גם

$$\langle N, N_0 \rangle = 0$$

שני הווקטורים T ו- N ניצבים ל- N_0 , ולכן $B = T \times N$ מקביל ל- N_0 . שניהם וקטורי יחידה ו- B רציף, ולכן $B \equiv N_0$ או $B \equiv -N_0$; בשני המקרים B קבוע, ומכאן $B' = 0$ ולכן $\tau = 0$.

כיוון שני. נניח $\tau \equiv 0$. אז $B' = 0$, כלומר B וקטור קבוע. נגזור את המכפלה $\langle \gamma, B \rangle$:

$$\frac{d}{ds} \langle \gamma, B \rangle = \langle \gamma', B \rangle = \langle T, B \rangle = 0$$

ולכן $\langle \gamma, B \rangle$ קבוע, נאמר d . משמעות הדבר היא ש- γ מוכלת במישור $\langle v, B \rangle = d$.

טענה 4.3.5 — עקמומיות קבועה ופיתול אפס.

תהי $\gamma(s)$ עקומה במרחב פרמטריזציה אורך קשת שעקמומיותה k קבועה ופיתולה $\tau \equiv 0$. אז γ היא פרמטריזציה של קשת מעגל ברדיוס $\frac{1}{k}$.

הוכחה.

לפי טענה 4.3.4 העקומה מוכלת במישור Π הניצב ל- B הקבוע.

נתבונן בביטוי $\gamma + \frac{1}{k}N$ ונגזור אותו. מכיוון ש- k קבועה,

$$\frac{d}{ds} \left(\gamma + \frac{1}{k}N \right) = T + \frac{1}{k}N'$$

לפי פרנה-סרה, ומכיוון ש- $\tau = 0$,

$$N' = -kT + \tau B = -kT$$

ולכן

$$T + \frac{1}{k}(-kT) = T - T = 0$$

לכן $\gamma + \frac{1}{k}N$ הוא וקטור קבוע, נסמנו a . מכאן

$$\|\gamma - a\| = \left\| -\frac{1}{k}N \right\| = \frac{1}{k}$$

כלומר כל נקודות העקומה נמצאות במרחק קבוע $\frac{1}{k}$ מהנקודה a . יחד עם ההכלה במישור Π מתקבל שהעקומה מוכלת במעגל ברדיוס $\frac{1}{k}$ שמרכזו a .

תרגילים

שאלה 4.3.6

חשבו את T, N, B , את העקמומיות ואת הפיתול של העקומה

$$\gamma(t) = \left(\frac{4}{5} \cos t, 1 - \sin t, -\frac{3}{5} \cos t \right)$$

והראו שהיא מעגל. מצאו את מרכזו, את רדיוסו ואת המישור שבו הוא מונח.

פתרון.

שלב 1: הפרמטריזציה היא באורך קשת (אפשר לדלג)

נגזור:

$$\gamma'(t) = \left(-\frac{4}{5} \sin t, -\cos t, \frac{3}{5} \sin t \right)$$

נחשב את האורך בריבוע:

$$\|\gamma'\|^2 = \frac{16}{25} \sin^2 t + \cos^2 t + \frac{9}{25} \sin^2 t = \left(\frac{16}{25} + \frac{9}{25} \right) \sin^2 t + \cos^2 t = \sin^2 t + \cos^2 t = 1$$

ולכן $\|\gamma'\| = 1$ והפרמטריזציה היא באורך קשת. בפרט $T = \gamma'$.

שלב 2: עקמומיות ונורמל (אפשר לדלג)

נגזור שוב:

$$T'(t) = \left(-\frac{4}{5} \cos t, \sin t, \frac{3}{5} \cos t \right)$$

באותו חישוב כמו קודם $\|T'\| = 1$, ולכן

$$, k = 1$$

והנורמל הראשי הוא

$$.N = \frac{1}{k} T' = \left(-\frac{4}{5} \cos t, \sin t, \frac{3}{5} \cos t \right)$$

שלב 3: הבי-נורמל והפיתול (אפשר לדלג)

נחשב $B = T \times N$ לפי ההגדרה. הרכיב הראשון:

$$.T_2 N_3 - T_3 N_2 = (-\cos t) \left(\frac{3}{5} \cos t \right) - \left(\frac{3}{5} \sin t \right) (\sin t) = -\frac{3}{5} (\cos^2 t + \sin^2 t) = -\frac{3}{5}$$

הרכיב השני:

$$.T_3 N_1 - T_1 N_3 = \left(\frac{3}{5} \sin t \right) \left(-\frac{4}{5} \cos t \right) - \left(-\frac{4}{5} \sin t \right) \left(\frac{3}{5} \cos t \right) = 0$$

הרכיב השלישי:

$$.T_1 N_2 - T_2 N_1 = \left(-\frac{4}{5} \sin t \right) (\sin t) - (-\cos t) \left(-\frac{4}{5} \cos t \right) = -\frac{4}{5}$$

לכן

$$, B = \left(-\frac{3}{5}, 0, -\frac{4}{5} \right)$$

וזוהו וקטור קבוע. מכאן $B' = 0$, ולפי הגדרה 4.3.1

$$. \tau = 0$$

שלב 4: זיהוי המעגל (אפשר לדלג)

העקמומיות קבועה, $k = 1$, והפיתול מתאפס, ולכן לפי טענה 4.3.5 העקומה היא קשת מעגל ברדיוס $\frac{1}{k} = 1$. מרכזו הוא הווקטור הקבוע

$$, a = \gamma + \frac{1}{k} N = \left(\frac{4}{5} \cos t - \frac{4}{5} \cos t, 1 - \sin t + \sin t, -\frac{3}{5} \cos t + \frac{3}{5} \cos t \right) = (0, 1, 0)$$


כפי שאכן יצא קבוע.

המישור הוא זה שעובר דרך a וניצב ל- B , כלומר

$$\langle v - a, B \rangle = 0$$

ובהצבה $-\frac{3}{5}x - \frac{4}{5}z = 0$, כלומר

$$3x + 4z = 0$$



העקומה של התרגיל: מעגל היחידה שמרכזו $(0, 1, 0)$, המונח במישור $3x + 4z = 0$. המסגרת הנעה מצוירת בשלוש נקודות. שימו לב ש- T ו- N מסתובבים לאורך המעגל, ואילו B מצביע תמיד לאותו כיוון: זהו הביטוי הגרפי ל- $B' = 0$, כלומר $\tau = 0$. הגרסה האינטראקטיבית, שבה אפשר לסובב את המבט, זמינה בגרסה המקוונת.

4.4 חישוב עקמומיות ופיתול

משפט 4.4.1 — נוסחאות בפרמטריזציה כללית.

תהי $\gamma(t)$ עקומה רגולרית ב- $\mathbb{R}^3$ שעקמומיותה אינה מתאפסת. אז

$$k = \frac{\|\gamma' \times \gamma''\|}{\|\gamma'\|^3}$$

$$\tau = \frac{\langle \gamma' \times \gamma'', \gamma''' \rangle}{\|\gamma' \times \gamma''\|^2}$$

בפרמטריזציית אורך קשת הנוסחאות מתפשטות ל-

$$k = \|\gamma''\|$$

$$\tau = \frac{\det(\gamma', \gamma'', \gamma''')}{k^2}$$

הוכחה.

נוכיח תחילה את הנוסחה לפיתול בפרמטריזציית אורך קשת, ואז נסביר מדוע היא נשמרת בפרמטריזציה כללית.

המקרה של אורך קשת. מהגדרת הפיתול $\tau = -\langle N, B' \rangle$, ולכן

$$\tau = -\langle N, (T \times N)' \rangle = -\langle N, T' \times N + T \times N' \rangle = -\langle N, T \times N' \rangle$$

$$T' \times N = kN \times N = 0 \text{ שכן}$$

$$N = \frac{1}{k}\gamma'' \text{ ו-} T = \gamma' \text{ ונשים לב ש-}$$

$$N' = \frac{1}{k}\gamma''' - \frac{k'}{k^2}\gamma''$$

ולכן

$$\tau = -\left\langle \frac{1}{k}\gamma'', \gamma' \times \left(\frac{1}{k}\gamma''' - \frac{k'}{k^2}\gamma'' \right) \right\rangle$$

המחובר השני מתאפס: הוא כפולה של $\gamma' \times \gamma''$, שניצב ל- γ'' . נשאר

$$\tau = -\frac{1}{k^2} \langle \gamma'', \gamma' \times \gamma''' \rangle = \frac{1}{k^2} \langle \gamma''', \gamma' \times \gamma'' \rangle$$

כאשר בשוויון האחרון השתמשנו בטענה 4.1.4 ובכך שהחלפת שתי שורות בדטרמיננטה הופכת את סימנה. זו בדיוק הנוסחה המבוקשת, שכן בפרמטריזציית אורך קשת γ' ו- γ'' ניצבים ולכן $\|\gamma' \times \gamma''\| = \|\gamma''\| = k$.

המקרה הכללי. יהי s אורך הקשת. לפי כלל השרשרת

$$\frac{d\gamma}{dt} = \frac{ds}{dt} \frac{d\gamma}{ds}$$

ובגזירות נוספות מתקבל

$$\gamma' \times \gamma'' = \left(\frac{ds}{dt} \right)^3 \left(\frac{d\gamma}{ds} \times \frac{d^2\gamma}{ds^2} \right)$$

שכן כל האיברים הנוספים הם כפולות של $0 = \frac{d\gamma}{ds} \times \frac{d\gamma}{ds}$. באותו אופן

$$\langle \gamma' \times \gamma'', \gamma''' \rangle = \left(\frac{ds}{dt} \right)^6 \left\langle \frac{d\gamma}{ds} \times \frac{d^2\gamma}{ds^2}, \frac{d^3\gamma}{ds^3} \right\rangle$$

במנה שבנוסחת הפיתול המונה נושא $\left(\frac{ds}{dt} \right)^6$ והמכנה $\left(\frac{ds}{dt} \right)^6$, ולכן הגורם מצטמצם והביטוי אינו תלוי בפרמטריזציה. עבור העקמומיות, $k = \left(\frac{ds}{dt} \right)^3 \|\gamma' \times \gamma''\| = \left(\frac{ds}{dt} \right)^3 \|\gamma'\|^3$, ובחלוקה מתקבל k .

תרגילים

שאלה 4.4.2

חשבו את העקמומיות ואת הפיתול של הסליל

$$\gamma(\theta) = (a \cos \theta, a \sin \theta, b\theta)$$

כאשר $a > 0$ ו- b קבועים.

פתרון.

שלב 1: נגזרות (אפשר לדלג)

$$\gamma'(\theta) = (-a \sin \theta, a \cos \theta, b)$$

$$\gamma''(\theta) = (-a \cos \theta, -a \sin \theta, 0)$$

$$\gamma'''(\theta) = (a \sin \theta, -a \cos \theta, 0)$$

שלב 2: המכפלה הווקטורית (אפשר לדלג)

נחשב $\gamma' \times \gamma''$ רכיב-רכיב. הרכיב הראשון:

$$(a \cos \theta) \cdot 0 - b(-a \sin \theta) = ab \sin \theta$$

הרכיב השני:

$$b(-a \cos \theta) - (-a \sin \theta) \cdot 0 = -ab \cos \theta$$

הרכיב השלישי:

$$(-a \sin \theta)(-a \sin \theta) - (a \cos \theta)(-a \cos \theta) = a^2 \sin^2 \theta + a^2 \cos^2 \theta = a^2$$

לכן

$$\gamma' \times \gamma'' = (ab \sin \theta, -ab \cos \theta, a^2)$$

שלב 3: העקמומיות (אפשר לדלג)

נחשב את האורכים:

$$\begin{aligned}\|\gamma'\|^2 &= a^2 \sin^2 \theta + a^2 \cos^2 \theta + b^2 = a^2 + b^2 \\ \|\gamma' \times \gamma''\|^2 &= a^2 b^2 \sin^2 \theta + a^2 b^2 \cos^2 \theta + a^4 = a^2 b^2 + a^4 = a^2 (a^2 + b^2) \\ \text{מכאן } \|\gamma'\|^3 &= (a^2 + b^2)^{3/2} \text{ ו-} \|\gamma' \times \gamma''\| = a \sqrt{a^2 + b^2} \text{ ולכן} \\ k &= \frac{a \sqrt{a^2 + b^2}}{(a^2 + b^2)^{3/2}} = \frac{a}{a^2 + b^2}\end{aligned}$$

שלב 4: הפיתול (אפשר לדלג)

נחשב את המונה:

$$\begin{aligned}\langle \gamma' \times \gamma'', \gamma''' \rangle &= ab \sin \theta \cdot a \sin \theta + (-ab \cos \theta)(-a \cos \theta) + a^2 \cdot 0 = a^2 b \\ \text{המכנה חושב בשלב הקודם, } \|\gamma' \times \gamma''\|^2 &= a^2 (a^2 + b^2) \text{ ולכן} \\ \tau &= \frac{a^2 b}{a^2 (a^2 + b^2)} = \frac{b}{a^2 + b^2}\end{aligned}$$

שלב 5: בדיקות שפיות (אפשר לדלג)


שני הגדלים קבועים, ואינם תלויים ב- θ , כפי שמתבקש מהסימטריה של הסליל.

כאשר $b = 0$ מתקבל $\tau = 0$ וגם $k = \frac{1}{a}$, והעקומה היא אכן מעגל ברדיוס a במישור $z = 0$, בהתאם לטענה 4.3.4.

היחס $\frac{\tau}{k} = \frac{b}{a}$ קבוע גם הוא, ולכן הסליל הוא מקרה פרטי של הסעיף הבא.


$$\gamma(\theta) = (a \cos \theta, a \sin \theta, b\theta), \quad a = 1, b = 0.35$$

T
 N
 B



הסליל והמסגרת הנהה שלו בארבע נקודות. הגרסה האינטראקטיבית זמינה בגרסה המקוונת: אפשר לסובב את המבט, ולהזיז את b ולראות את הסליל משתטח למעגל ואת הפיתול יורד לאפס.

curvature and torsion of the helix, $a = 1$



העקמומיות והפיתול של הסליל כפונקציות של b , עבור $a = 1$ קבוע. ב- $b = 0$ מתקבל $\tau = 0$ והעקומה היא מעגל ברדיוס a , בהתאם לטענה 4.3.4. ככל שמותחים את הסליל העקמומיות יורדת, ואילו הפיתול עולה עד למקסימום

ב- $b = a$ ואז יורד.

שאלה 4.4.3.

עקומה רגולרית γ ב- $\mathbb{R}^3$ שעקמומיותה חיובית נקראת **סליל כללי** אם הוקטור המשיק שלה יוצר זווית קבועה θ עם וקטור יחידה קבוע a .

- הראו שאם γ היא סליל כללי, אז $\tau = \pm k \cot \theta$; בפרט היחס $\frac{\tau}{k}$ קבוע.
- הראו את הכיוון ההפוך: אם $\tau = \lambda k$, אז γ היא סליל כללי.

פתרון.

שלב 1: מהתנאי לזהות בין הוקטורים (אפשר לדלג)

נניח $\langle T, a \rangle = \cos \theta$ קבוע. נגזור לפי s :

$$\langle T', a \rangle = 0$$

ומכיוון ש- $T' = kN$ ו- $k > 0$,

$$\langle N, a \rangle = 0$$

הווקטור a ניצב ל- N , ולכן בבסיס האורתונורמלי $\{T, N, B\}$ הוא נפרש רק על ידי T ו- B :

$$a = \langle a, T \rangle T + \langle a, B \rangle B = \cos \theta T + \mu B$$

מכיוון ש- a וקטור יחידה, $\cos^2 \theta + \mu^2 = 1$, ולכן $\mu = \pm \sin \theta$.

שלב 2: גזירה שנייה (אפשר לדלג)

נגזור את $a = \cos \theta T \pm \sin \theta B$, שבו המקדמים קבועים:

$$0 = \cos \theta T' \pm \sin \theta B'$$

נציב פרנה-סרה, $T' = kN$ ו- $B' = -\tau N$:

$$0 = \cos \theta kN \mp \sin \theta \tau N = (k \cos \theta \mp \tau \sin \theta) N$$

ומכיוון ש- $N \neq 0$ המקדם מתאפס:

$$\tau = \pm k \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \pm k \cot \theta$$

שלב 3: הכיוון ההפוך (אפשר לדלג)

נניח $\tau = \lambda k$ עבור קבוע λ . נבחר θ כך ש- $\cot \theta = \lambda$, למשל $\theta = \operatorname{arccot} \lambda$, ונגדיר

$$a = \cos \theta T + \sin \theta B$$

נגזור ונשתמש בפרנה־סרה:

$$a' = \cos \theta kN + \sin \theta (-\tau N) = (k \cos \theta - \tau \sin \theta) N$$

נציב $\tau = \lambda k = k \cot \theta$:

$$k \cos \theta - k \cot \theta \sin \theta = k \cos \theta - k \cos \theta = 0$$

ולכן $a' = 0$, כלומר a וקטור קבוע.

הוא וקטור יחידה, שכן $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ ו- T, B אורתונורמליים, ומתקיים $\langle T, a \rangle = \cos \theta$. לכן הזווית בין המשיק לבין a קבועה, כלומר γ היא סליל כללי.

שאלה 4.4.4.

תהי α העקומה

$$\alpha(u) = e^u (\cos u, \sin u, 1), \quad u \in \mathbb{R}$$

1. הראו שהעקומה מונחת על החרוט $x^2 + y^2 = z^2$ בחלק שבו $z > 0$.
2. יהיו $0 < \lambda_0 < \lambda_1$. חשבו את אורך הקטע של α הכלוא בין המישורים $z = \lambda_0$ ו- $z = \lambda_1$.
3. חשבו את העקמומיות ואת הפיתול, והראו ששניהם פרופורציונליים ל- e^{-u} .

פתרון.

שלב 1: ההכלה בחרוט (אפשר לדלג)

נסמן $x = e^u \cos u$, $y = e^u \sin u$ ו- $z = e^u$. אז

$$x^2 + y^2 = e^{2u} (\cos^2 u + \sin^2 u) = e^{2u} = z^2$$

ומכיוון ש- $e^u > 0$ תמיד, העקומה נמצאת כולה בחלק שבו $z > 0$.

שלב 2: המהירות (אפשר לדלג)

נגזור רכיב-רכיב, לפי כלל המכפלה:

$$\frac{d}{du} (e^u \cos u) = e^u (\cos u - \sin u), \quad \frac{d}{du} (e^u \sin u) = e^u (\sin u + \cos u)$$

ולכן

$$\alpha'(u) = e^u (\cos u - \sin u, \sin u + \cos u, 1)$$

נחשב את האורך בריבוע. שני הריבועים הראשונים הם

$$, (\cos u - \sin u)^2 + (\sin u + \cos u)^2 = (1 - 2 \sin u \cos u) + (1 + 2 \sin u \cos u) = 2$$

שכן המחוברים המעורבים מתבטלים. לכן

$$, \|\alpha'(u)\|^2 = e^{2u} (2 + 1) = 3e^{2u}$$

$$. \|\alpha'\| = \sqrt{3} e^u \text{ ומכאן}$$

שלב 3: האורך בין שני המישורים (אפשר לדלג)

הרכיב השלישי הוא $z = e^u$, ולכן המישור $z = \ln \lambda$ נחתך בדיוק בערך הפרמטר $u = \ln \lambda$. הקטע המבוקש מתאים אפוא ל- $\ln \lambda_0 \leq u \leq \ln \lambda_1$, ואורכו

$$.L = \int_{\ln \lambda_0}^{\ln \lambda_1} \sqrt{3} e^u du = \sqrt{3} [e^u]_{\ln \lambda_0}^{\ln \lambda_1} = \sqrt{3} (\lambda_1 - \lambda_0)$$

התוצאה תלויה רק בהפרש הגבהים, וזו תכונה של החרוט: אורך הקשת פרופורציוני לגובה שנעבר.

שלב 4: הנגזרות הגבוהות (אפשר לדלג)

נגזור שוב, ושוב לפי כלל המכפלה. ברכיב הראשון

$$, \frac{d}{du} [e^u (\cos u - \sin u)] = e^u (\cos u - \sin u) + e^u (-\sin u - \cos u) = -2e^u \sin u$$

וברכיב השני

$$. \frac{d}{du} [e^u (\sin u + \cos u)] = e^u (\sin u + \cos u) + e^u (\cos u - \sin u) = 2e^u \cos u$$

לכן

$$, \alpha''(u) = e^u (-2 \sin u, 2 \cos u, 1)$$

ובאותו אופן, בגזירה נוספת,

$$. \alpha'''(u) = e^u (-2(\sin u + \cos u), 2(\cos u - \sin u), 1)$$

שלב 5: המכפלה הווקטורית (אפשר לדלג)

נחשב $\alpha' \times \alpha''$. הגורם e^{2u} מופיע בשני הווקטורים, ולכן אפשר להוציא e^{2u} ולעבוד עם $(\cos u - \sin u, \sin u + \cos u, 1)$ ו- $(-2 \sin u, 2 \cos u, 1)$.

הרכיב הראשון:

$$(\sin u + \cos u) \cdot 1 - 1 \cdot 2 \cos u = \sin u - \cos u$$

הרכיב השני:

$$1 \cdot (-2 \sin u) - (\cos u - \sin u) \cdot 1 = -(\sin u + \cos u)$$

הרכיב השלישי:

$$(\cos u - \sin u) 2 \cos u - (\sin u + \cos u) (-2 \sin u) = 2 \cos^2 u + 2 \sin^2 u = 2$$

לכן

$$\alpha' \times \alpha'' = e^{2u} (\sin u - \cos u, -(\sin u + \cos u), 2)$$

ובאותו צמצום כמו בשלב 2,

$$\|\alpha' \times \alpha''\|^2 = e^{4u} (2 + 4) = 6e^{4u}$$

שלב 6: העקמומיות והפיתול (אפשר לדלג)

לפי משפט 4.4.1

$$k = \frac{\sqrt{6} e^{2u}}{(\sqrt{3} e^u)^3} = \frac{\sqrt{6} e^{2u}}{3 \sqrt{3} e^{3u}} = \frac{\sqrt{2}}{3} e^{-u}$$

עבור הפיתול נחשב את המונה. הגורם המשותף הוא $e^{3u} \cdot e^u = e^{2u}$, והסוגריים הם

$$-2(\sin u - \cos u)(\sin u + \cos u) + 2(\sin u + \cos u)(\sin u - \cos u) + 2 = 2$$

שני המחוברים הראשונים נגדיים זה לזה, שכן $\cos u - \sin u = -(\sin u - \cos u)$. לכן

$$\tau = \frac{2e^{3u}}{6e^{4u}} = \frac{1}{3} e^{-u}$$

שניהם אכן פרופורציוניים ל- e^{-u} , כנדרש.

שלב 7: הערה (אפשר לדלג)

היחס


$$\frac{\tau}{k} = \frac{\frac{1}{3}e^{-u}}{\frac{\sqrt{2}}{3}e^{-u}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

קבוע, ולכן לפי שאלה 4.4.3 העקומה היא סליל כללי. אפשר לראות זאת גם ישירות:

$$T = \frac{1}{\sqrt{3}} (\cos u - \sin u, \sin u + \cos u, 1)$$

ולכן $\langle T, e_3 \rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}$ קבוע, כלומר המשיק יוצר זווית קבועה עם ציר z .

$$\alpha(u) = e^u (\cos u, \sin u, 1) \text{ on } x^2 + y^2 = z^2$$



הספירלה החרוטית על החרוט $x^2 + y^2 = z^2$. המשטח מצויר בשקיפות, כדי שאפשר יהיה לראות שהעקומה מונחת עליו ולא רק לידו. הגרסה האינטראקטיבית זמינה בגרסה המקוונת.

שאלה 4.4.5

תהי α העקומה

$$\alpha(u) = (\cosh u, \sinh u, u), \quad u \in \mathbb{R}$$

1. הראו שהעקומה מונחת על הגליל $x^2 - y^2 = 1$.

2. הראו שהעקומות והפיתול הם

$$k = \tau = \frac{1}{2 \cosh^2 u}$$

שלב 1: ההכלה בגליל (אפשר לדלג)

מיידית מהזהות ההיפרבולית

$$x^2 - y^2 = \cosh^2 u - \sinh^2 u = 1$$

העקומה מטפסת על הגליל ההיפרבולי הזה בקצב אחיד בכיוון z .

שלב 2: נגזרות ומהירות (אפשר לדלג)

$$\alpha'(u) = (\sinh u, \cosh u, 1)$$

$$\alpha''(u) = (\cosh u, \sinh u, 0)$$

$$\alpha'''(u) = (\sinh u, \cosh u, 0)$$

לחישוב המהירות נציב $\sinh^2 u = \cosh^2 u - 1$:

$$\|\alpha'\|^2 = \sinh^2 u + \cosh^2 u + 1 = (\cosh^2 u - 1) + \cosh^2 u + 1 = 2 \cosh^2 u$$

ולכן $\|\alpha'\| = \sqrt{2} \cosh u$, שכן $\cosh u > 0$.

שלב 3: המכפלה הווקטורית (אפשר לדלג)

הרכיב הראשון: $\cosh u \cdot 0 - 1 \cdot \sinh u = -\sinh u$

הרכיב השני: $1 \cdot \cosh u - \sinh u \cdot 0 = \cosh u$

הרכיב השלישי: $\sinh^2 u - \cosh^2 u = -1$

לכן

$$\alpha' \times \alpha'' = (-\sinh u, \cosh u, -1)$$

ובאותו חישוב כמו בשלב הקודם

$$\|\alpha' \times \alpha''\|^2 = \sinh^2 u + \cosh^2 u + 1 = 2 \cosh^2 u$$

שלב 4: העקמומיות והפיתול (אפשר לדלג)

$$.k = \frac{\|\alpha' \times \alpha''\|}{\|\alpha'\|^3} = \frac{\sqrt{2} \cosh u}{(\sqrt{2} \cosh u)^3} = \frac{\sqrt{2} \cosh u}{2\sqrt{2} \cosh^3 u} = \frac{1}{2 \cosh^2 u}$$

עבור הפיתול, המונה הוא


$$, \langle (-\sinh u, \cosh u, -1), (\sinh u, \cosh u, 0) \rangle = -\sinh^2 u + \cosh^2 u = 1$$

והמכנה חושב בשלב הקודם, ולכן

$$.\tau = \frac{1}{2 \cosh^2 u}$$

בפרט $\frac{\tau}{k} = 1$ קבוע, ולכן גם עקומה זו היא סליל כללי לפי שאלה 4.4.3, והזווית בין המשיק לציר הקבוע היא 45° .

$$\alpha(u) = (\cosh u, \sinh u, u) \text{ on } x^2 - y^2 = 1$$



העקומה

left(
coshu,
sinhu, *u*

right) על הגליל ההיפרבולי $x^2 - y^2 = 1$, המצויר אף הוא בשקיפות. הגרסה האינטראקטיבית זמינה בגרסה המקוונת.

שאלה 4.4.6

תהי $\gamma(s)$ עקומה במרחב בפרמטריזציה אורך קשת, שעבורה $k(s) > 0$ וגם $\tau(s) \neq 0$ לכל s . נסמן

$$\rho = \frac{1}{k}, \quad \sigma = \frac{1}{\tau}$$

1. נניח ש- γ כדורית, כלומר שהיא מונחת על ספירה שמרכזה a ורדיוסה r . חשבו את שלוש המכפלות $\langle T, \gamma - a \rangle$, $\langle N, \gamma - a \rangle$ ו- $\langle B, \gamma - a \rangle$, והסיקו ש-

$$\frac{\tau}{k} = \left(\frac{k'}{\tau k^2} \right)'$$

2. הסיקו גם ש-

$$\rho^2 + (\rho' \sigma)^2 = r^2$$

3. הראו את הכיוון ההפוך: אם מתקיים השוויון שבסעיף 1, אז γ מונחת על ספירה. מצאו את מרכזה ואת רדיוסה.

פתרון.

שלב 1: שרשרת של ארבע גזירות (אפשר לדלג)

נקודת המוצא היא שהעקומה מונחת על הספירה, כלומר

$$\langle \gamma - a, \gamma - a \rangle = r^2$$

נגזור לפי s ונקבל $2 \langle T, \gamma - a \rangle = 0$, כלומר

$$\langle T, \gamma - a \rangle = 0$$

נגזור שוב. לפי כלל המכפלה

$$\langle T', \gamma - a \rangle + \langle T, T \rangle = 0$$

ומכיון ש- $T' = kN$ ו- $\|T\| = 1$ מתקבל $1 = \langle T, T \rangle$, כלומר $k \langle N, \gamma - a \rangle + 1 = 0$, כלומר

$$\langle N, \gamma - a \rangle = -\frac{1}{k} = -\rho$$

נגזור בשלישית:

$$\langle N', \gamma - a \rangle + \langle N, T \rangle = \left(-\frac{1}{k} \right)' = \frac{k'}{k^2}$$

המחובר השני מתאפס, ולפי פרנה-סרה $N' = -kT + \tau B$, ולכן

$$-k \langle T, \gamma - a \rangle + \tau \langle B, \gamma - a \rangle = \frac{k'}{k^2}$$

ומכיון שהמכפלה הראשונה מתאפסת,

$$\langle B, \gamma - a \rangle = \frac{k'}{\tau k^2}$$

נגזור ברביעית:

$$\langle B', \gamma - a \rangle + \langle B, T \rangle = \left(\frac{k'}{\tau k^2} \right)'$$

שוב המחובר השני מתאפס, ולפי $B' = -\tau N$ ולפי מה שחישבנו בשלב השני,

$$-\tau \langle N, \gamma - a \rangle = -\tau (-\rho) = \tau \rho = \frac{\tau}{k}$$

בהשוואה מתקבל בדיוק השוויון המבוקש.

שלב 2: פירוק הוקטור והרדיוס (אפשר לדלג)

השלישייה $\{T, N, B\}$ היא בסיס אורתונורמלי, ולכן כל וקטור מתפרק לפי המכפלות הפנימיות שלו איתה. משלושת החישובים בשלב הקודם

$$\gamma - a = 0 \cdot T + (-\rho) N + \frac{k'}{\tau k^2} B$$

נפשט את המקדם האחרון. מכיון ש- $\rho = \frac{1}{k}$ מתקיים $\rho' = -\frac{k'}{k^2}$, ולכן

$$\frac{k'}{\tau k^2} = -\rho' \sigma$$

ומכאן

$$\gamma - a = -\rho N - \rho' \sigma B$$

הרדיוס מתקבל כעת מיד: שני הווקטורים N ו- B אורתונורמליים, ולכן

$$r^2 = \|\gamma - a\|^2 = \rho^2 + (\rho' \sigma)^2$$

שלב 3: הכיוון ההפוך (אפשר לדלג)

נניח כעת רק את השוויון $\frac{\tau}{k} = \left(\frac{k'}{\tau k^2}\right)'$, כלומר, בסימונים של השלב הקודם,

$$\tau \rho = -(\rho' \sigma)'$$

הפירוק שקיבלנו קודם מציע מיהו המרכז, ולכן נגדיר

$$a = \gamma + \rho N + \rho' \sigma B$$

ונראה שזהו וקטור קבוע. נגזור לפי s ונשתמש בפרנה־סרה:

$$a' = T + \rho' N + \rho(-kT + \tau B) + (\rho' \sigma)' B + \rho' \sigma (-\tau N)$$

נאסוף לפי שלושת וקטורי הבסיס:

$$a' = (1 - \rho k)T + (\rho' - \tau \rho' \sigma)N + (\rho \tau + (\rho' \sigma)')B$$

שלושת המקדמים מתאפסים. הראשון, שכן $\rho k = 1$ לפי ההגדרה. השני, שכן $\tau \sigma = 1$ ולכן $\rho' - \rho' = 0$. השלישי, שכן זו בדיוק ההנחה. לכן $a' = 0$ ו- a קבוע.

נותר לראות שהמרחק קבוע. נגזור את $\|\gamma - a\|^2 = \rho^2 + (\rho' \sigma)^2$:

$$(\rho^2 + (\rho' \sigma)^2)' = 2\rho\rho' + 2(\rho' \sigma)(\rho' \sigma)' = 2\rho\rho' + 2(\rho' \sigma)(-\tau\rho)$$

ובהצבת $\tau = \frac{1}{\sigma}$ מתקבל

$$2\rho\rho' - 2\rho\rho'\sigma\tau = 2\rho\rho'(1 - \tau\sigma) = 0$$

לכן $\|\gamma - a\|^2$ קבוע, נסמנו r^2 , והעקומה מונחת על הספירה שמרכזת a ורדיוסה r .

שאלה 4.4.7.

עקומת וויאני היא החיתוך של הספירה $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ עם הגליל $(x-1)^2 + y^2 = 1$. אפשר לפרמט אותה על ידי

$$\gamma(t) = \left(1 + \cos t, \sin t, 2 \sin \frac{t}{2}\right)$$

1. ודאו שהעקומה אכן מונחת על הספירה ועל הגליל.

2. חשבו את העקמומיות ואת הפיתול שלה.

3. היכן מתאפס הפיתול, ומה המשמעות של כך.

4. היעזרו בשאלה 4.4.6 וודאו במפורש ש-

$$\rho^2 + (\rho' \sigma)^2 = 4$$

פתרון.

שלב 1: ההכלה בספירה ובגליל (אפשר לדלג)

נחשב את ריבוע המרחק מהראשית, ונשתמש בזהות $\sin^2 \frac{t}{2} = \frac{1 - \cos t}{2}$:

$$(1 + \cos t)^2 + \sin^2 t + 4 \sin^2 \frac{t}{2} = 1 + 2 \cos t + \cos^2 t + \sin^2 t + 2(1 - \cos t)$$

האיברים $\cos^2 t + \sin^2 t$ נותנים 1, והאיברים ב- $\cos t$ מצטמצמים:

$$1 + 2 \cos t + 1 + 2 - 2 \cos t = 4$$

כלומר העקומה מונחת על הספירה שרדיוסה 2 ומרכזת בראשית.

עבור הגליל החישוב מיידי:

$$(x-1)^2 + y^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

שלב 2: שלוש נגזרות (אפשר לדלג)

$$\gamma'(t) = \left(-\sin t, \cos t, \cos \frac{t}{2} \right)$$

$$\gamma''(t) = \left(-\cos t, -\sin t, -\frac{1}{2} \sin \frac{t}{2} \right)$$

$$\gamma'''(t) = \left(\sin t, -\cos t, -\frac{1}{4} \cos \frac{t}{2} \right)$$

שלב 3: המהירות (אפשר לדלג)

$$\|\gamma'\|^2 = \sin^2 t + \cos^2 t + \cos^2 \frac{t}{2} = 1 + \cos^2 \frac{t}{2}$$

$$\text{ולפי } \cos^2 \frac{t}{2} = \frac{1+\cos t}{2} \text{ מתקבל}$$

$$\|\gamma'\|^2 = \frac{3+\cos t}{2}$$

שלב 4: המכפלה הווקטורית (אפשר לדלג)

נחשב את $\gamma' \times \gamma''$ רכיב-רכיב, ונשתמש שוב ושוב בזהויות חצי-הזווית.

הרכיב הראשון.

$$\cos t \left(-\frac{1}{2} \sin \frac{t}{2} \right) - \cos \frac{t}{2} (-\sin t) = -\frac{1}{2} \cos t \sin \frac{t}{2} + 2 \sin \frac{t}{2} \cos^2 \frac{t}{2}$$

$$\text{שכן } \sin t = 2 \sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2} \text{ נוציא } \sin \frac{t}{2} \text{ ונציב } \frac{1+\cos t}{2} : \cos^2 \frac{t}{2}$$

$$\sin \frac{t}{2} \left[-\frac{1}{2} \cos t + 1 + \cos t \right] = \frac{1}{2} \sin \frac{t}{2} (2 + \cos t)$$

הרכיב השני.

$$\cos \frac{t}{2} (-\cos t) - (-\sin t) \left(-\frac{1}{2} \sin \frac{t}{2} \right) = -\cos \frac{t}{2} \left[\cos t + \sin^2 \frac{t}{2} \right]$$

בסוגריים $\cos^2 \frac{t}{2} = \frac{1+\cos t}{2}$, ולכן הרכיב הוא $-\cos^3 \frac{t}{2}$.

הרכיב השלישי.

$$(-\sin t)(-\sin t) - \cos t(-\cos t) = \sin^2 t + \cos^2 t = 1$$

יחד

$$\gamma' \times \gamma'' = \left(\frac{1}{2} \sin \frac{t}{2} (2 + \cos t), -\cos^3 \frac{t}{2}, 1 \right)$$

שלב 5: אורך המכפלה (אפשר לדלג)

נסמן $c = \cos t$, ואז $\sin^2 \frac{t}{2} = \frac{1-c}{2}$ וגם $\cos^2 \frac{t}{2} = \frac{1+c}{2}$. נחשב

$$\|\gamma' \times \gamma''\|^2 = \frac{1}{4} \cdot \frac{1-c}{2} (2+c)^2 + \left(\frac{1+c}{2} \right)^3 + 1$$

נכניס למכנה משותף 8:

$$\frac{(1-c)(2+c)^2 + (1+c)^3 + 8}{8}$$

נפתח את שני המחוברים הראשונים,

$$(1-c)(4+4c+c^2) = 4-3c^2-c^3$$

$$(1+c)^3 = 1+3c+3c^2+c^3$$

ובחיבורם החזקות c^2 ו- c^3 מצטמצמות:

$$\|\gamma' \times \gamma''\|^2 = \frac{13+3c}{8}$$

שלב 6: העקמומיות (אפשר לדלג)

נציב בנוסחה של משפט 4.4.1:

$$k = \frac{\|\gamma' \times \gamma''\|}{\|\gamma'\|^3} = \frac{\sqrt{\frac{13+3\cos t}{8}}}{\left(\frac{3+\cos t}{2}\right)^{3/2}}$$

המונה הוא $\frac{\sqrt{13+3\cos t}}{2\sqrt{2}}$ והמכנה הוא $\frac{(3+\cos t)^{3/2}}{2\sqrt{2}}$, והגורם $2\sqrt{2}$ מצטמצם:

$$k = \frac{\sqrt{13+3\cos t}}{(3+\cos t)^{3/2}}$$

שלב 7: הפיתול (אפשר לדלג)

נחשב את המונה $\langle \gamma' \times \gamma'', \gamma''' \rangle$:

$$\frac{1}{2} \sin \frac{t}{2} (2+c) \sin t + \left(-\cos^3 \frac{t}{2} \right) (-\cos t) + 1 \cdot \left(-\frac{1}{4} \cos \frac{t}{2} \right)$$

נציב $\sin t = 2 \sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2}$ ונוציא $\cos \frac{t}{2}$ מכל המחוברים:

$$\cos \frac{t}{2} \left[\sin^2 \frac{t}{2} (2+c) + \cos^2 \frac{t}{2} c - \frac{1}{4} \right]$$

בסוגריים נציב את זהויות חצי-הזווית, ושני המחוברים הראשונים מצטמצמים יפה:

$$\frac{(1-c)(2+c)}{2} + \frac{(1+c)c}{2} = \frac{2-c-c^2+c+c^2}{2} = 1$$

ולכן הסוגריים שווים ל- $\frac{3}{4}$, $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$, והמונה הוא $\frac{3}{4} \cos \frac{t}{2}$.

נחלק במכנה שחושב בשלב 5:

$$\tau = \frac{\frac{3}{4} \cos \frac{t}{2}}{\frac{13+3\cos t}{8}} = \frac{6 \cos \frac{t}{2}}{13+3\cos t}$$

שלב 8: היכן מתאפס הפיתול (אפשר לדלג)

המכנה חיובי תמיד, שכן $13+3\cos t \geq 10$, ולכן $\tau = 0$ אם ורק אם $\cos \frac{t}{2} = 0$, כלומר

$$t = \pi \pmod{2\pi}$$

שם $\gamma(\pi) = (0, 0, 2)$, כלומר הקוטב העליון של הספירה. בנקודה זו ההנחה $\tau \neq 0$ של התרגיל הבא אינה מתקיימת, וגם $\sigma = \frac{1}{\tau}$ אינו מוגדר, ולכן כל דיון המשתמש ב- σ מוגבל לתחומים שאינם כוללים אותה.

שלב 9: רעיון האימות (אפשר לדלג)

מרכז הספירה הוא הראשית, כלומר $a = 0$ ולכן $\gamma - a = \gamma$. לפי הפירוק שבשלב 2 של שאלה 4.4.6,

$$\gamma = -\rho N - \rho' \sigma B$$

ולכן

$$\rho' \sigma = -\langle B, \gamma \rangle$$

זהו הצעד שחוסך את העבודה: במקום לגזור את ρ ולהסתבך בשברים, די לחשב מכפלה פנימית אחת, ואת $\gamma' \times \gamma''$ כבר חישובנו בשלב 4.

שלב 10: חישוב המכפלה הפנימית (אפשר לדלג)

נסמן שוב $c = \cos t$, ונחשב

$$\langle \gamma' \times \gamma'', \gamma \rangle = \frac{1}{2} \sin \frac{t}{2} (2+c)(1+c) - \cos^3 \frac{t}{2} \sin t + 2 \sin \frac{t}{2}$$

$$\text{נציב } \sin t = 2 \sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2} \text{ ונוציא } \sin \frac{t}{2}:$$

$$\sin \frac{t}{2} \left[\frac{1}{2} (2+c)(1+c) - 2 \cos^4 \frac{t}{2} + 2 \right]$$

$$\text{בסוגריים נציב } \cos^4 \frac{t}{2} = \frac{(1+c)^2}{4}$$

$$, \frac{2+3c+c^2}{2} - \frac{1+2c+c^2}{2} + 2 = \frac{1+c}{2} + 2 = \frac{5+c}{2}$$

ולכן

$$\langle \gamma' \times \gamma'', \gamma \rangle = \frac{\sin \frac{t}{2} (5+c)}{2}$$

$$\text{נחלק ב-} \frac{\sqrt{13+3c}}{2\sqrt{2}} \text{ ונקבל } \|\gamma' \times \gamma''\| =$$

$$\langle B, \gamma \rangle = \frac{\sqrt{2} \sin \frac{t}{2} (5+c)}{\sqrt{13+3c}}$$

שלב 11: ההצבה (אפשר לדלג)

משלב 6

$$\rho = \frac{1}{k} = \frac{(3+c)^{3/2}}{\sqrt{13+3c}}$$

ומהשלב הקודם

$$(\rho'\sigma)^2 = \langle B, \gamma \rangle^2 = \frac{2 \sin^2 \frac{t}{2} (5+c)^2}{13+3c}$$

נציב $c = 1 - 2 \sin^2 \frac{t}{2}$ ונחבר מעל מכנה משותף:

$$\rho^2 + (\rho'\sigma)^2 = \frac{(3+c)^3 + (1-c)(5+c)^2}{13+3c}$$

שלב 12: הצמצום (אפשר לדלג)

נפתח את המונה. ראשית

$$(3+c)^3 = 27 + 27c + 9c^2 + c^3$$

ושנית

$$(1-c)(25+10c+c^2) = 25 - 15c - 9c^2 - c^3$$

בחיבורם האיברים ב- c^2 וב- c^3 מצטמצמים לגמרי, ונשאר


$$52 + 12c = 4(13 + 3c)$$

ולכן

$$\rho^2 + (\rho'\sigma)^2 = \frac{4(13+3c)}{13+3c} = 4$$

זהו בדיוק r^2 עבור $r = 2$, כפי שמתחייב משאלה 4.4.6. הקריטריון אומת.

Viviani: $\gamma(t) = (1 + \cos t, \sin t, 2\sin \frac{t}{2})$



עקומת וויאני על הספירה שרדיוסה 2. העקומה היא חיתוך הספירה עם הגליל המשורטט בקו דק, ולכן כל נקודותיה במרחק קבוע מהראשית.

4.5 מקורות

- 2010 Springer, edition, 2nd, *Geometry Differential Elementary* Pressley, Andrew
- *Euclidean in Surfaces Geometry: Differential in Course First A* Bolton, J. and Woodward M. L.
- 2018 Press, University Cambridge, *Space*
- 2016 Springer, *Surfaces and Curves of Geometry Differential* Tapp, Kristopher

5 תרגול: 5 סכימת איינשטיין ומשטחים

5.1 סכימת איינשטיין

5.1.1 המוסכמה

בביטויים שמופיעים בהם אינדקסים רבים, סימני הסכום תופסים את רוב השורה ומסתירים את הטיעון עצמו. סכימת איינשטיין היא מוסכמת כתיבה שמאפשרת להשמיט אותם, וכך טיעונים שכוללים כמה סכומים מקוננים נעשים קצרים ופשוטים יותר. אין בה מתמטיקה חדשה, אלא דרך רישום בלבד.

יש לה יתרון נוסף, ואולי החשוב מן השניים: ביטוי הכתוב כהלכה בסכימת איינשטיין יוצא כמעט מעצמו בלתי תלוי בבחירת הבסיס. נראה בהמשך מדוע זה כך, ומדוע דווקא כללי הכתיב של המוסכמה הם שמבטיחים זאת.

למשל, במקום

$$\sum_i \sum_j \sum_k \sum_l \sum_m A_{klm}^{ij} w_i w_j v^k v^l v^m,$$

נכתוב פשוט

$$A_{klm}^{ij} w_i w_j v^k v^l v^m.$$

הגדרה 5.1.1 — הסכם הסכימה של איינשטיין.

אינדקס שמופיע פעמיים באותו ביטוי, פעם אחת למטה ופעם אחת למעלה, מובן כאינדקס שסוכמים עליו את כל ערכיו, וסימן הסכום עצמו אינו נכתב:

$$\sum_{i=1}^n a_{1i} v^i = a_{1i} v^i$$

הגדרה 5.1.2 — אינדקס סכימה ואינדקס חופשי.

יהי ביטוי הכתוב בסכימת איינשטיין.

- **אינדקס סכימה** הוא אינדקס שמופיע בדיוק פעמיים, פעם אחת למטה ופעם אחת למעלה. סוכמים עליו, והוא אינו מופיע בתוצאה.
- **אינדקס חופשי** הוא אינדקס שמופיע פעם אחת בלבד, ובאותו גובה בכל אגפי המשוואה. אין סוכמים עליו.

למשל, בביטוי $u^i = a_j^i v^j$ האינדקס j הוא אינדקס סכימה והאינדקס i הוא אינדקס חופשי. מכיוון שנשאר אינדקס עליון אחד, התוצאה היא וקטור.

הערה 5.1.3 — מה סופר כל סוג של אינדקס.

אינדקס חופשי סופר משוואות, ואינדקס סכימה סופר מחוברים. כדי לראות זאת במפורש, נכתוב ב- $\mathbb{R}^2$ את הביטוי $u^i = a_j^i v^j$ במלואו

$$\begin{aligned} u^1 &= a_1^1 v^1 + a_2^1 v^2 \\ u^2 &= a_1^2 v^1 + a_2^2 v^2. \end{aligned}$$

האינדקס החופשי i נותן כאן **שתי משוואות**, אחת לכל אחד מערכיו, ואינדקס הסכימה j נותן **שני מחוברים** בתוך כל משוואה. ב- $\mathbb{R}^3$ היה אותו ביטוי עצמו שלוש משוואות של שלושה מחוברים כל אחת.

הערה 5.1.4 — שינוי שם של אינדקס.

אינדקס סכימה הוא משתנה כבול, ולכן מותר לשנות את שמו בלי לשנות את הביטוי:

$$a_j^i v^j = a_k^i v^k$$

אינדקס חופשי אינו כבול, ואסור לשנות את שמו באגף אחד בלבד. שינוי השם של אינדקס סכימה הוא הצעד השימושי ביותר בחישובים שנראה בהמשך.

הערה 5.1.5 — תחום האינדקס.

תחום הריצה של האינדקס אינו נכתב, והוא נקבע לפי ההקשר: ב- $\mathbb{R}^2$ האינדקס רץ עד 2, ב- $\mathbb{R}^3$ עד 3, ובאופן כללי ב- $\mathbb{R}^n$ עד n .

הערה 5.1.6 — מדוע בדיוק פעמיים.

הסכום

$$\sum_{i=1}^n a_i v^i u^i$$

מוגדר היטב, ובכל זאת אינו חוקי בסכימת איינשטיין, שכן i מופיע בו שלוש פעמים. אין זו גזירה שרירותית, אלא הדרישה שמבטיחה שהביטוי לא יהיה תלוי בבחירת הבסיס. את ההסבר עצמו נוכל לתת רק לאחר שנדון בהחלפת בסיס, ולכן הוא מובא בהערה 5.1.27 בסוף הסעיף הבא, שם גם נראה זאת במספרים. בשלב זה נסתפק בכלל, ואם דרוש לנו סכום כזה נכתוב את סימן הסכום במפורש.

הערה 5.1.7 — המוסכמה היא חצי-פורמלית.

סכימת איינשטיין היא קיצור כתיבה, וכמו כל קיצור לסכומים היא פועלת בכך שהיא מבקשת מהקורא לשחזר בעצמו את מה שלא נכתב. זה בדיוק מקור הנוחות שלה, וגם מקור הטעויות. כמה מלכודות שכדאי להכיר:

1. **תחום הסכימה אינו נכתב**, ולכן אותה נוסחה עצמה אומרת דברים שונים על עקומה ועל משטח.
2. **אינדקס עליון ומעריך נראים אותו הדבר**. בביטוי v^2 אין דרך לדעת מן הסימון אם הכוונה לקואורדינטה השנייה של v או ל- v בריבוע.
3. **סדר האינדקסים משמעותי**, וקל לאבד אותו בכתיבה מהירה.
4. **מיקום האינדקסים אינו ערובה להתנהגות**. בהמשך התרגול נראה שמיקום האינדקס אמור ללמד כיצד האובייקט משתנה בהחלפת בסיס. אף על פי כן, יש אובייקטים הנכתבים בסימון אינדקסים, למשל Γ_{ij}^k , שאינם מקיימים את חוקי ההשתנות שמיקום האינדקסים מרמז עליהם. הסימון עצמו אינו יכול להזהיר אותנו מכך.
5. **ביטוי שהמוסכמה אינה מגדירה נראה תקין לחלוטין**. בביטוי $a_i v^i u^i$ האינדקס i מופיע שלוש פעמים, ולכן המוסכמה אינה מגדירה אותו, אך שום דבר בכתיב אינו מסמן זאת.

נדגיש שסכימת איינשטיין היא סימון נוסף בארגז הכלים, ולא סימון ברירת המחדל מכאן והלאה. נמשיך להשתמש בסימן הסכום הרגיל בכל מקום שבו הוא מתאים יותר, למשל כאשר הסכום קצר, כאשר תחום הסכימה טעון הבהרה, או כאשר אנו מצטטים מקור שכותב אותו במפורש. ככלל אצבע, אין דבר כזה "הסימון הטוב ביותר", שכן טיבו של סימון נמדד ביחס למה שעושים בו. סכימת איינשטיין טובה בדיוק במקומות שבהם ניהול האינדקסים היה מטושטש את הטיעון, ופחות טובה במקומות אחרים.

5.1.1.1 תרגילים

שאלה 5.1.8.

בכל אחד מהביטויים הבאים, מהם אינדקסי הסכימה, מהם האינדקסים החופשיים, ומהו סוג התוצאה (סקלר, וקטור או מטריצה)?

1. $a_j^i v^j$
2. $a_{ij} v^i v^j$
3. $a_j^i b_k^j$
4. $a^{ij} v_{ji}$

פתרון.

פתרון (אפשר לדלג)

1. האינדקס j הוא אינדקס סכימה, שכן הוא מופיע פעם למטה ופעם למעלה, והאינדקס i הוא חופשי. נשאר אינדקס אחד, ולכן התוצאה היא וקטור.
2. שני האינדקסים i ו- j הם אינדקסי סכימה, כל אחד מהם מופיע פעם למטה ופעם למעלה. לא נשאר אף אינדקס חופשי, ולכן התוצאה היא סקלר.
3. האינדקס j הוא אינדקס סכימה, והאינדקסים i ו- k חופשיים. נשארו שני אינדקסים, ולכן התוצאה היא מטריצה, והיא בדיוק מכפלת המטריצות.
4. שני האינדקסים הם אינדקסי סכימה, ולכן התוצאה היא סקלר.

שאלה 5.1.9.

כתבו במפורש, כסכום מלא, את הביטויים הבאים ב- $\mathbb{R}^3$:

1. $a_{ij} v^i v^j$
2. $a_j^i v^j = u^i$

פתרון.

סעיף 1 (אפשר לדלג)

שני האינדקסים הם אינדקסי סכימה, ולכן מדובר בסכום כפול, כלומר בתשעה מחוברים:

$$a_{ij} v^i v^j = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 a_{ij} v^i v^j$$

ובכתיבה מלאה

$$\begin{aligned}a_{ij}v^i v^j &= a_{11}v^1 v^1 + a_{12}v^1 v^2 + a_{13}v^1 v^3 \\&+ a_{21}v^2 v^1 + a_{22}v^2 v^2 + a_{23}v^2 v^3 \\&+ a_{31}v^3 v^1 + a_{32}v^3 v^2 + a_{33}v^3 v^3.\end{aligned}$$

סעיף 2 (אפשר לדלג)

כאן j הוא אינדקס סכימה ו- i הוא אינדקס חופשי. לפי הערה 5.1.3 האינדקס החופשי סופר משוואות, ולכן מדובר בשלוש משוואות נפרדות, שבכל אחת מהן סכום של שלושה מחוברים:

$$\begin{aligned}u^1 &= a_1^1 v^1 + a_2^1 v^2 + a_3^1 v^3 \\u^2 &= a_1^2 v^1 + a_2^2 v^2 + a_3^2 v^3 \\u^3 &= a_1^3 v^1 + a_2^3 v^2 + a_3^3 v^3.\end{aligned}$$

זוהי בדיוק כפל המטריצה A בווקטור v , שורה אחר שורה.

שאלה 5.1.10.

אילו מן הביטויים הבאים כתובים כהלכה בסכימת איינשטיין, ומה הפסול בשאר?

1. $a_i v^i u^i$
2. $a_{ij} v^i = b^j$
3. $a_j^i b_k^j = c_k^i$
4. $a_{ij} v^i w^j$

פתרון.

פתרון (אפשר לדלג)

1. **אינו חוקי.** האינדקס i מופיע שלוש פעמים, ואינדקס סכימה חייב להופיע בדיוק פעמיים, פעם למטה ופעם למעלה. שימו לב, כפי שצוין בהערה 5.1.6, שהסכום עצמו מוגדר היטב ורק המוסכמה אינה מבטאת אותו, והטעם לכך מוסבר בהערה 5.1.29. אם דרוש לנו סכום כזה, נכתוב את סימן הסכום במפורש.
 2. **אינו חוקי.** האינדקס j הוא חופשי, אך באגף שמאל הוא מופיע למטה ובאגף ימין למעלה. אינדקס חופשי חייב להופיע באותו גובה בשני האגפים.
 3. **חוקי.** האינדקס j הוא אינדקס סכימה, והאינדקסים i ו- k חופשיים ומופיעים באותו גובה בשני האגפים.
 4. **חוקי.** שני האינדקסים הם אינדקסי סכימה, כל אחד מהם מופיע פעם למטה ופעם למעלה, ולכן התוצאה היא סקלר.
-

5.1.2 שימושים מוכרים

בסעיף זה נרשום מחדש בסימון אינדקסים אובייקטים שכבר מוכרים לנו מאלגברה לינארית. נראה תוך כך שגובה האינדקס אינו נתון לבחירתנו, אלא נקבע לפי מה שהאובייקט עושה, כלומר כמה וקטורים הוא בולע ומה הוא מחזיר. בסוף הסעיף נראה שהגובה נקבע גם לפי אופן ההשתנות של האובייקט בהחלפת בסיס, ושתי הקביעות הללו מתלכדות.

הערה 5.1.11 — וקטורים ובסיס.

נסמן ב- $e_1, \dots, e_n$ את וקטורי הבסיס של $\mathbb{R}^n$. המוסכמה היא שאינדקסים של איברי הבסיס נכתבים למטה, וקואורדינטות של וקטור נכתבות למעלה. לכן וקטור $v \in \mathbb{R}^n$ נכתב

$$v = v^1 e_1 + v^2 e_2 + \dots + v^n e_n = v^i e_i$$

הערה 5.1.12 — אינדקס עליון כעמודה ואינדקס תחתון כשורה.

כדאי לאמץ תמונה חזותית שמסייעת מאוד, אף שאינה דרישה פורמלית: אובייקט בעל אינדקס עליון נחשוב עליו כעל וקטור עמודה, ואובייקט בעל אינדקס תחתון כעל וקטור שורה.

הרווח מכך מידי. הכיווץ

$$, a_i v^i$$

שבו נפגשים אינדקס תחתון ואינדקס עליון, הוא בדיוק מכפלת שורה בעמודה, כלומר כפל מטריצות רגיל שתוצאתו סקלר. גם כלל הגבהים של המוסכמה מקבל כך פירוש פשוט: סוכמים בדיוק כאשר יש שורה מצד אחד ועמודה מצד שני, וזה המצב היחיד שבו כפל מטריצות מוגדר.

באותו אופן, בביטוי $a_j^i v^j$ האינדקס העליון של a מציין את מספר השורה והתחתון את מספר העמודה, ולכן הביטוי נקרא כפשוטו ככפל מטריצה בווקטור עמודה.

הגדרה 5.1.13 — הדלתא של קרונקר.

הדלתא של קרונקר מוגדרת על ידי

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

כלומר היא מטריצת היחידה.

הערה 5.1.14 — שני מיקומי אינדקסים לדלתא.

את הדלתא של קרונקר נפגוש בשני מיקומי אינדקסים, ולכל אחד מהם תפקיד משלו.

- δ_{ij} , שני האינדקסים למטה, כאשר הדלתא היא המכפלה הסקלרית של $\mathbb{R}^n$. המכפלה הסקלרית היא תבנית בילינארית, כלומר היא בולעת שני וקטורים ומחזירה סקלר, ולכן שני האינדקסים שלה למטה.
- δ_j^i , אינדקס אחד למטה ואחד למעלה, כאשר הדלתא היא העתקת הזהות, או כאשר היא משמשת לכיווץ אינדקסים, למשל $\delta_j^i a_k^j = a_k^i$.

ב- $\mathbb{R}^n$ ובבסיס הסטנדרטי שתי המטריצות זהות מספרית, ולכן ההבחנה נראית מיותרת. היא תיעשה הכרחית כאשר נעבור למשטחים, שם התפקיד של δ_{ij} יעבור לאובייקט אחר.

כדוגמה ראשונה לשימוש בדלתא נביא את המכפלה הסקלרית. חשוב להדגיש מראש שאין זו הדרך היחידה ואף לא בהכרח הדרך הנוחה לרשום מכפלה סקלרית, והיא מובאת כאן בעיקר כדי להמחיש כיצד הדלתא עובדת.

טענה 5.1.15 — המכפלה הסקלרית כהמחשה לשימוש בדלתא.

לכל $v, w \in \mathbb{R}^n$ מתקיים

$$v \cdot w = v^1 w^1 + v^2 w^2 + \dots + v^n w^n = \delta_{ij} v^i w^j$$

הוכחה.

האינדקס i אינו יכול להיסכם בביטוי $v^i w^i$, שכן הוא מופיע פעמיים למעלה. לכן נכתוב את הסכום בעזרת הדלתא של קרונקר, שמאפסת את כל המחוברים שבהם $i \neq j$:

$$\delta_{ij} v^i w^j = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \delta_{ij} v^i w^j = \sum_{i=1}^n v^i w^i$$

וזהו בדיוק המכפלה הסקלרית.

הדלתא הצליחה כאן מפני שהיו לנו שני אינדקסים עליונים לזוג זה לזה, וזה בדיוק תפקידה. אין להסיק מכך שהדלתא היא כלי סכימה כללי, ובאמת היא נכשלת במשימה הפשוטה מכולם.

נשאלת השאלה כיצד נרשום את הסכום $v^1 + v^2 + \dots + v^n$. לא v^i , שכן זהו אינדקס חופשי המציין קואורדינטה בודדת, וגם לא $\delta_{ij} v^i$, ששווה ל- v_j ולכן רק מוריד את גובה האינדקס במקום לסכום עליו. המוסכמה סוכמת רק כאשר שני אינדקסים נפגשים בגבהים שונים, ולכן כדי לסכום אינדקס אחד עלינו לספק את השני בעצמנו. לשם כך נגדיר אובייקט חדש.

הגדרה 5.1.16 — וקטור האחדים.

נסמן ב-1 את הווקטור שכל קואורדינטותיו שוות ל-1, ונכתוב את רכיביו 1_i לכל i בצורת שורה, ו- 1^i לכל i בצורת עמודה. אז לכל וקטור v מתקיים

$$1_i v^i = v^1 + v^2 + \dots + v^n$$

הערה 5.1.17 — מתי אחדים ומתי קרונקר.

כדאי להבחין בין שני התפקידים. תפקידה של הדלתא של קרונקר הוא לזווג שני אינדקסים זה לזה, ולכן היא הכלי הנכון כאשר יש שני אובייקטים לכווץ. תפקידו של וקטור האחדים הוא לספק אינדקס שני כאשר יש רק אחד, ולכן הוא הכלי הנכון לסכימה של אינדקס בודד. השוואה אחת מבהירה את ההבדל:

$$\delta_{ij} v^i v^j = (v^1)^2 + \dots + (v^n)^2 = \|v\|^2$$

ולעומת זאת

$$1_i 1_j v^i v^j = (v^1 + \dots + v^n)^2$$

שני הביטויים בעלי אותה צורה בדיוק, והם אובייקטים שונים לגמרי. בכתיב הסכומים הרגיל ההבדל ביניהם מיטשטש.

הערה 5.1.18 — שני האובייקטים תלויים בבסיס.

גם δ_{ij} וגם 1_i מוגדרים ביחס לבסיס הסטנדרטי, ואינם אובייקטים בלתי תלויים בבסיס. זו נקודה שנחזור אליה כאשר נעסוק במשטחים.

טענה 5.1.19 — תבנית בילינארית.

תהי $B : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ תבנית בילינארית, הפועלת לפי $Bu \mapsto (u, v)$. נסמן את רכיביה b_{ij} , בשני אינדקסים תחתונים, שכן היא בולעת שני וקטורים ומחזירה סקלר. אז

$$B(u, v) = v^i b_{ij} u^j$$

טענה 5.1.20 — העתקה לינארית.

תהי A מטריצה המייצגת העתקה לינארית $T_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ הפועלת לפי $Av \mapsto v$. נסמן את רכיביה a_j^i , אינדקס אחד למעלה ואחד למטה, שכן היא בולעת וקטור ומחזירה וקטור. אז

$$(Av)^i = a_j^i v^j.$$

הערה 5.1.21 — מדוע דווקא במיקום הזה.

מדוע כותבים a_j^i ולא a_i^j . שני הכתיבים מופיעים במקורות, והבחירה תלויה בתפקידו של האובייקט. עבור העתקה לינארית הכתיב המקובל הוא a_j^i , ולכך שתי סיבות המחזקות זו את זו: האינדקס העליון הוא זה ששורד את הכיווץ עם v , והוא בדיוק האינדקס העליון של וקטור התוצאה; ולפי הערה 5.1.12 האינדקס העליון מציין שורה והתחתון עמודה, ולכן $a_j^i v^j$ נקרא ישירות ככפל מטריצה בווקטור עמודה.

הכתיב a_i^j מופיע כאשר סדר המשבצות הפוך, כלומר כאשר המשבצת הראשונה היא זו הבולעת וקטור. חשוב להדגיש שמה שנושא את המשמעות הוא **סדר** המשבצות ולא הגובה בלבד: a_j^i ו- a_i^j מצינים את אותו רכיב עצמו, ואילו a_i^j הוא מיקום אחר. מכיוון שהיסט הגבהים קטן וקל להתעלם ממנו בכתיבה מהירה, זו אחת המלכודות שהוזכרו בהערה 5.1.7.

הערה 5.1.22 — גובה האינדקס נושא מידע.

שלוש הדוגמאות האחרונות מצייתות לאותו כלל. שני אינדקסים למטה מצינים אובייקט הבולע שני וקטורים ומחזיר סקלר, ואילו אינדקס אחד למטה ואחד למעלה מציין אובייקט הבולע וקטור ומחזיר וקטור. גובה האינדקס רושם מה האובייקט עושה.

טענה 5.1.23 — עקבה.

תהי A מטריצה ריבועית עם רכיבים a_j^i . אז

$$a_i^i = a_1^1 + a_2^2 + \dots + a_n^n = \text{trace}(A)$$

הערה 5.1.24 — המטריצה ההופכית.

מוסכמה שכדאי להכיר מראש. אם (g_{ij}) היא מטריצה הפיכה, מסמנים את רכיבי המטריצה ההופכית שלה ב- g^{ij} , כלומר

$$g^{ik} g_{kj} = \delta_j^i$$

זהו סימון מקובל, והוא מבלבל: g^{ij} נראה כאילו הוא אותו אובייקט עצמו שהאינדקסים שלו הועברו למעלה, ואין זה כך, אלא מדובר במטריצה אחרת לגמרי. שום דבר בסימון אינו מסמן שבוצע היפוך. בהמשך הדרך מיקום האינדקסים כאן אכן מתיישב עם שאר המוסכמה, אך בשלב זה אין זה גלוי. נשתמש בסימון מפני שכך נהוג במקורות, ומוטב לקרוא אותו כשם ולא כתיאור.

טענה 5.1.25 — החלפת בסיס.

תהי P מטריצת המעבר בין הבסיסים, כלומר $e'_j = P_j^i e_i$. אז הקואורדינטות של וקטור מקיימות

$$v^i = P_j^i v'^j$$

הוכחה.

נכתוב את אותו וקטור בשני הבסיסים ונציב את חוק המעבר:

$$v = v^i e_i = v'^j e'_j = v'^j P_j^i e_i$$

שני האגפים הם צירוף לינארי של אותם וקטורי בסיס e_i , ולכן המקדמים שווים, כלומר $v^i = P_j^i v'^j$.

הערה 5.1.26 — קו־וריאנטי וקונטרה־וריאנטי.

כאן מתגלה הסיבה לכל מוסכמת הגבהים. איברי הבסיס, שאינדקסם למטה, משתנים לפי P , ואילו הקואורדינטות, שאינדקסן למעלה, משתנות לפי P^{-1} . שני חוקי ההשתנות הפוכים זה לזה, ולכן הביטוי $v^i e_i$ אינו משתנה כלל בהחלפת בסיס, וזה בדיוק הווקטור עצמו. אובייקט שאינדקסו למטה נקרא **קו־וריאנטי**, ואובייקט שאינדקסו למעלה נקרא **קונטרה־וריאנטי**. מונחים אלה אינם מופיעים בהרצאה, אך הם מקובלים בספרות ובסיכומים, ולכן כדאי להכירם.

הערה 5.1.27 — אי־תלות בבסיס.

עתה אפשר להשלים את ההסבר שהובטח בפתיחת התרגול ובהערה 5.1.6. ביטוי הכתוב כהלכה בסכימת איינשטיין מזווג כל אינדקס תחתון עם אינדקס עליון. האינדקס התחתון משתנה לפי P והעליון לפי P^{-1} , ולכן בכל זיווג כזה נפגשים P אחד ו- P^{-1} אחד, והם מצטמצמים לפי

$$P_i^k (P^{-1})_l^i = \delta_l^k$$

לכן כל הגורמים שנוצרו בהחלפת הבסיס מתבטלים, והביטוי כולו יוצא בלתי תלוי בבסיס. בסכום $\sum_i a_i v^i u^i$, לעומת זאת, יש P אחד ושני גורמי P^{-1} . אין צמצום, נשאר גורם עודף, והסכום משתנה עם הבסיס.

הערה 5.1.28 — דוגמה מפורשת במישור.

נבדוק זאת במספרים. ב- $\mathbb{R}^2$ נבחר את הבסיס החדש

$$e'_1 = e_1 + e_2, \quad e'_2 = e_1 + 2e_2$$

ולכן מטריצת המעבר והמטריצה ההופכית לה הן

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

ניקח וקטור v שקואורדינטותיו $v^1 = 2$ ו- $v^2 = 5$, ואובייקט a בעל אינדקס תחתון שרכיביו $a_1 = 1$ ו- $a_2 = 4$.

הקואורדינטות החדשות של v מתקבלות לפי $v'^i = (P^{-1})_j^i v^j$, כלומר

$$v'^1 = 2 \cdot 2 + (-1) \cdot 5 = -1 \quad v'^2 = (-1) \cdot 2 + 1 \cdot 5 = 3$$

ואילו הרכיבים החדשים של a מתקבלים לפי $a'_j = P_j^i a_i$, כלומר

$$a'_1 = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 4 = 5 \quad a'_2 = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 4 = 9$$

נשים לב שכל ארבעת הרכיבים השתנו: הווקטור עבר מ- $(2, 5)$ ל- $(-1, 3)$, והאובייקט התחתון מ- $(1, 4)$ ל- $(5, 9)$. ובכל זאת, נחשב את הכיווץ בשני הבסיסים:

$$a_i v^i = 1 \cdot 2 + 4 \cdot 5 = 22$$

ומצד שני

$$a'_i v'^i = 5 \cdot (-1) + 9 \cdot 3 = -5 + 27 = 22$$

התקבל אותו מספר בדיוק, אף שאף אחד מן הרכיבים שנכנסו לחישוב לא נשאר כשהיה. זהו בדיוק תוכנה של הערה 5.1.27: הכיווץ $a_i v^i$ הוא גודל של האובייקטים עצמם, ולא של הקואורדינטות שבהן בחרנו לרשום אותם.

הערה 5.1.29 — אותה דוגמה עבור הסכום הפסול.

נוסיף לדוגמה הקודמת וקטור u שקואורדינטותיו $u^1 = u^2 = 1$. קואורדינטותיו החדשות הן

$$u'^1 = 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 = 1 \quad u'^2 = (-1) \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 0$$

ונחשב את הסכום המשולש בשני הבסיסים:

$$\sum_{i=1}^2 a_i v^i u^i = 1 \cdot 2 \cdot 1 + 4 \cdot 5 \cdot 1 = 22$$

ולעומת זאת

$$\sum_{i=1}^2 a'_i v'^i u'^i = 5 \cdot (-1) \cdot 1 + 9 \cdot 3 \cdot 0 = -5$$

קיבלנו 22 בבסיס אחד ו-5 בשני. הסכום הזה אינו מודד אפוא שום גודל של האובייקטים עצמם, אלא תלוי בבסיס שבו נכתב, וזו הסיבה שהמוסכמה אינה מתירה אינדקס המופיע שלוש פעמים.

5.1.2.1 תרגילים

שאלה 5.1.30

פשטו את הביטויים הבאים:

1. $\delta_j^i \delta_i^j$
2. $\delta_j^i \delta_k^j \delta_i^k$
3. $\delta_j^i g_{ik} \delta_l^k$
4. $\delta_{ij} a^{ij}$

פתרון.

סעיפים 1 ו-2 (אפשר לדלג)

נשתמש בכיווץ $\delta_j^i a_k^j = a_k^i$, כלומר בכך שהדלתא של קרונקר משנה את שם האינדקס שהיא נפגשת בו. בסעיף 1

$$\delta_j^i \delta_i^j = \delta_i^i = n$$

שכן δ_i^i הוא סכום איברי האלכסון של מטריצת היחידה, ויש בו n מחוברים ששווים כולם ל-1.

בסעיף 2 נכוץ פעמיים באותו אופן:

$$\delta_j^i \delta_k^j \delta_i^k = \delta_k^i \delta_i^k = \delta_i^i = n$$

סעיף 3 (אפשר לדלג)

נכוץ תחילה את הדלתא השמאלית עם g_{ik} . האינדקס i הוא אינדקס סכימה, ולכן

$$\delta_j^i g_{ik} = g_{jk}$$

ועתה נכוץ את הדלתא הימנית:

$$g_{jk} \delta_l^k = g_{jl}$$

לכן הביטוי כולו שווה ל- g_{jl} . שימו לב שהאינדקסים j ו- l נשארו חופשיים לאורך כל החישוב, ולכן התוצאה היא מטריצה ולא סקלר.

סעיף 4 (אפשר לדלג)

שני האינדקסים הם אינדקסי סכימה, ולכן מדובר בסכום כפול. לפי הגדרת הדלתא כל מחובר שבו $i \neq j$ מתאפס, ונשארים רק המחברים שבהם $i = j$:

$$\delta_{ij} a^{ij} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \delta_{ij} a^{ij} = a^{11} + a^{22} + \dots + a^{nn}$$

שאלה 5.1.31.

תהיינה A, B מטריצות ריבועיות. הוכיחו בעזרת סכימת איינשטיין ש-

$$\text{trace}(AB) = \text{trace}(BA)$$

פתרון.

פתרון (אפשר לדלג)

נסמן $C = AB$. רכיבי המכפלה הם $c_j^i = a_k^i b_j^k$, ולכן לפי טענה 5.1.23

$$\text{trace}(AB) = c_i^i = a_k^i b_i^k$$

נסמן $D = BA$. באותו אופן $d_j^i = b_k^i a_j^k$, ולכן

$$\text{trace}(BA) = d_i^i = b_k^i a_i^k.$$

בביטוי האחרון שני האינדקסים i ו- k הם אינדקסי סכימה, ולכן לפי הערה 5.1.4 מותר להחליף את שמותיהם זה בזה. נחליף $i \leftrightarrow k$ ונקבל

$$b_k^i a_i^k = b_i^k a_k^i = a_k^i b_i^k$$

כאשר במעבר האחרון השתמשנו בכך שהרכיבים הם סקלרים, וכפל סקלרים הוא חילופי. קיבלנו בדיוק את הביטוי שהתקבל עבור $\text{trace}(AB)$, ולכן שני העקבות שווים.

שאלה 5.1.32.

תהי A מטריצה מסדר $n \times n$ עם רכיבים a^{ij} , ויהי $v \in \mathbb{R}^n$. רשמו בסכימת איינשטיין את הביטויים הבאים:

1. סכום כל רכיבי המטריצה.
2. הווקטור שרכיביו הם סכומי השורות של המטריצה.
3. ההפרש $(v^1 + \dots + v^n)^2 - ((v^1)^2 + \dots + (v^n)^2)$.

פתרון.

סעיפים 1 ו-2 (אפשר לדלג)

בסעיף 1 עלינו לסכום על שני האינדקסים, ושניהם עליונים, ולכן נספק שני אינדקסים תחתונים בעזרת וקטור האחדים:

$$1_i a^{ij} 1_j = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a^{ij}.$$

בסעיף 2 עלינו לסכום על האינדקס השני בלבד ולהשאיר את הראשון חופשי:

$$a^{ij} 1_j = \sum_{j=1}^n a^{ij}.$$

כאן j הוא אינדקס סכימה ו- i חופשי, ולכן התוצאה היא וקטור, כנדרש.

סעיף 3 (אפשר לדלג)

לפי הערה 5.1.17 המחבר הראשון הוא $1_i 1_j v^i v^j$ והמחבר השני הוא $\delta_{ij} v^i v^j$. לכן ההפרש הוא

$$1_i 1_j v^i v^j - \delta_{ij} v^i v^j = (1_i 1_j - \delta_{ij}) v^i v^j$$

אגב, פתיחה ישירה מראה שההפרש שווה ל- $\sum_{i < j} 2 \cdot v^i v^j$.

שאלה 5.1.33.

הוכיחו שהעקבה אינה תלויה בבחירת הבסיס. כלומר, אם $A' = P^{-1}AP$ היא המטריצה המייצגת את אותה העתקה לינארית בבסיס אחר, הראו ש- $\text{trace}(A') = \text{trace}(A)$.

פתרון.

פתרון (אפשר לדלג)

בסימון אינדקסים, השוויון $A' = P^{-1}AP$ נכתב

$$a_j'^i = (P^{-1})_k^i a_l^k P_j^l$$

נחשב את העקבה, כלומר נציב $j = i$ ונסכום:

$$\text{trace}(A') = a_i'^i = (P^{-1})_k^i a_l^k P_i^l$$

הרכיבים הם סקלרים, ולכן מותר לשנות את סדר הכפל. נכתוב תחילה את שני הגורמים שמעורב בהם i :

$$(P^{-1})_k^i a_l^k P_i^l = P_i^l (P^{-1})_k^i a_l^k$$

עתה i הוא אינדקס סכימה המחבר את P עם P^{-1} , וסכום זה הוא בדיוק רכיב של המכפלה PP^{-1} , כלומר

$$P_i^l (P^{-1})_k^i = \delta_k^l$$

נציב ונכווץ:

$$\delta_k^l a_l^k = a_k^k$$

וזוהי בדיוק $\text{trace}(A)$, כנדרש.

5.1.3 סימטריזציה ואנטי-סימטריזציה

הגדרה 5.1.34 — אופרטורי הסימטריזציה והאנטי-סימטריזציה.

יהי T_{ij} אובייקט בעל שני אינדקסים. נגדיר

$$T_{\{ij\}} = \frac{1}{2} (T_{ij} + T_{ji})$$

ונקרא לו החלק הסימטרי, וכן

$$T_{[ij]} = \frac{1}{2} (T_{ij} - T_{ji})$$

ונקרא לו החלק האנטי-סימטרי.

הערה 5.1.35 — הערה על הסימון.

בקורס זה נשתמש בסוגריים מסולסלים לסימטריזציה, כפי שנעשה בהרצאה. בחלק מן המקורות, ובפרט בספרי הלימוד, נהוג לסמן את החלק הסימטרי בסוגריים עגולים, $T_{(ij)}$. הסימון לחלק האנטי-סימטרי, בסוגריים מרובעים, $T_{[ij]}$. זהה בכל המקורות.

טענה 5.1.36 — פירוק יחיד.

כל אובייקט T_{ij} בעל שני אינדקסים נכתב באופן יחיד כסכום של חלק סימטרי וחלק אנטי-סימטרי,

$$T_{ij} = T_{\{ij\}} + T_{[ij]}$$

הוכחה.

הקיום מיידי מן ההגדרות:

$$T_{\{ij\}} + T_{[ij]} = \frac{1}{2} (T_{ij} + T_{ji}) + \frac{1}{2} (T_{ij} - T_{ji}) = \frac{1}{2} T_{ij} + \frac{1}{2} T_{ij} = T_{ij}$$

ליחידות, נניח ש- $T_{ij} = S_{ij} + A_{ij}$ כאשר S סימטרי ו- A אנטי-סימטרי. נחליף את שמות האינדקסים ונקבל

$$T_{ji} = S_{ji} + A_{ji} = S_{ij} - A_{ij}$$

ולכן, בחיבור ובחיסור של שתי המשוואות,

$$S_{ij} = \frac{1}{2} (T_{ij} + T_{ji})$$

וכן

$$A_{ij} = \frac{1}{2} (T_{ij} - T_{ji})$$

אלה בדיוק ההגדרות, ולכן הפירוק יחיד.

5.1.3.1 תרגילים

שאלה 5.1.37.

יהי S^{ij} סימטרי, כלומר $S^{ij} = S^{ji}$, ויהי A_{ij} אנטי-סימטרי, כלומר $A_{ij} = -A_{ji}$. הוכיחו ש-

$$S^{ij} A_{ij} = 0$$

פתרון.

פתרון (אפשר לדלג)

שני האינדקסים הם אינדקסי סכימה, ולכן מותר להחליף את שמותיהם זה בזה:

$$S^{ij} A_{ij} = S^{ji} A_{ji}$$

עתה נשתמש בשתי ההנחות. לפי הסימטריות $S^{ji} = S^{ij}$, ולפי האנטי-סימטריות $A_{ji} = -A_{ij}$, ולכן

$$S^{ji} A_{ji} = S^{ij} (-A_{ij}) = -S^{ij} A_{ij}$$

קיבלנו שהביטוי שווה למינוס עצמו, כלומר

$$, 2S^{ij} A_{ij} = 0$$

$$. S^{ij} A_{ij} = 0 \text{ ומכאן}$$

שאלה 5.1.38.

יהי T_{ij} אובייקט כלשהו בעל שני אינדקסים ויהי τ וקטור. הוכיחו ש-

$$, T_{ij} \tau^i \tau^j = T_{\{ij\}} \tau^i \tau^j$$

כלומר שהחלק האנטי-סימטרי אינו תורם דבר לתבנית הריבועית.

פתרון.

פתרון (אפשר לדלג)

לפי טענה 5.1.36 נפרק את T ונקבל

$$. T_{ij} \tau^i \tau^j = T_{\{ij\}} \tau^i \tau^j + T_{[ij]} \tau^i \tau^j$$

נטפל במחומר השני. המכפלה $\tau^i \tau^j$ סימטרית באינדקסים i ו- j , שכן $\tau^i \tau^j = \tau^j \tau^i$, ואילו $T_{[ij]}$ אנטי-סימטרי. לכן לפי שאלה 5.1.37 המחומר השני מתאפס, ונשאר רק המחומר הראשון.

הערה: מדוע זה מוכר לנו (אפשר לדלג)

זו הסיבה שבתרגול 1 יכולנו להניח שהמטריצה של עקומה או משטח ממעלה שנייה היא סימטרית. תבנית ריבועית אינה מבחינה בין T לבין החלק הסימטרי שלה, ולכן אפשר תמיד להחליף את המטריצה בחלקה הסימטרי בלי לשנות את העקומה.

5.2 משטחים

5.2.1 הגדרות

נעבור עתה לנושא השני של התרגול. עד כה עסקנו בעקומות, שהן אובייקטים חד-מימדיים, ומכאן ואילך נעסוק במשטחים, שהם דו-מימדיים. נתחיל בהגדרות הכלליות, ולאחר מכן נצטמצם למקרה שמעניין אותנו בקורס.

הגדרה 5.2.1 — הומאומורפיזם.

יהיו X ו- Y שני מרחבים טופולוגיים. פונקציה $f : X \rightarrow Y$ נקראת **הומאומורפיזם** אם היא מקיימת את שלוש התכונות הבאות:

1. f היא חד-חד-ערכית ועל, כלומר היא התאמה חד-חד-ערכית בין נקודות X לנקודות Y .
2. f רציפה.
3. הפונקציה ההופכית $f^{-1} : Y \rightarrow X$ רציפה אף היא.

אם קיים הומאומורפיזם בין X ל- Y , אומרים ש- X ו- Y **הומאומורפיים** ומסמנים $X \cong Y$.

הערה 5.2.2 — מה הומאומורפיזם מזהה.

הומאומורפיזם מגדיר מתי שני מרחבים שקולים מבחינה טופולוגית, כלומר מתי ניתן לעוות, למתוח או לכווץ מרחב אחד כדי לקבל את האחר, בלי לקרוע אותו ובלי להדביק חלקים נפרדים.

הגדרה 5.2.3 — יריעה.

יריעה ממדית n היא מרחב טופולוגי M שלכל נקודה בו יש סביבה פתוחה הומאומורפית למרחב $\mathbb{R}^n$. באופן פורמלי, לכל נקודה $p \in M$ קיימת סביבה פתוחה U והומאומורפיזם $\phi : U \rightarrow V$, כאשר V היא קבוצה פתוחה ב- $\mathbb{R}^n$.

הערה 5.2.4 — יריעה נראית מקומית אוקלידית.

אינטואיטיבית, יריעה היא מרחב שכאשר מסתכלים עליו מקרוב, כלומר בסביבה המקומית של כל נקודה, הוא נראה ומתנהג כמו מרחב אוקלידי $\mathbb{R}^n$.

הגדרה 5.2.5 — מפה ואטלס.

תהי $M \subseteq \mathbb{R}^3$. **מפה** היא פונקציה $r : U \rightarrow M$ חד-חד-ערכית מקבוצה פתוחה $U \subseteq \mathbb{R}^2$ אל M . **אטלס** הוא אוסף של מפות שמכסות את M כולה.

הגדרה 5.2.6 — יריעה דיפרנציאבילית.

יריעה דיפרנציאבילית היא יריעה המצוידת באטלס שבו לכל שתי מפות ϕ_i ו- ϕ_j ההרכבה $\phi_i^{-1} \circ \phi_j$ היא חלקה מסוג C^k עבור k כלשהו. במשפטים שלנו נדרוש $k = 2$.

הערה 5.2.7 — ההבדל בין משטח ליריעה.

משטח הוא מקרה פרטי של יריעה, ושני הבדלים מבחינים ביניהם:

1. משטח מוגבל למימד 2 בלבד, בעוד שיריעה יכולה להיות מכל מימד.
 2. משטח משוכן במרחב $\mathbb{R}^3$, ואילו יריעה מוגדרת בפני עצמה, ללא תלות במרחב חיצוני העוטף אותה. לכן ביריעה אפשר לחקור תכונות פנימיות בלבד.
- עתה נגיע להגדרה המרכזית. נאמר בקצרה שמשטח רגולרי הוא קבוצה ב- $\mathbb{R}^3$ שנראית מקומית כמו מישור דו-מימדי, וההגדרה המדויקת מפרטת מה בדיוק נדרש.

הגדרה 5.2.8 — משטח רגולרי.

תת-קבוצה $M \subseteq \mathbb{R}^3$ נקראת **משטח רגולרי** ממימד 2 אם לכל נקודה $p \in M$ קיימות סביבה פתוחה $V \subseteq \mathbb{R}^3$ המכילה את p , קבוצה פתוחה $U \subseteq \mathbb{R}^2$, והעתקה $\bar{x} : U \rightarrow V \cap M$ המקיימת את שלושת התנאים הבאים:

1. ההעתקה

$$\bar{x}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

היא מסוג C^∞ , כלומר כל הנגזרות החלקיות שלה מכל סדר קיימות ורציפות.

2. ההעתקה $\bar{x}$ היא חד-חד-ערכית ועל $V \cap M$, רציפה, ובעלת פונקציה הופכית רציפה $\bar{x}^{-1} : V \cap M \rightarrow U$.

3. לכל נקודה $q \in U$ הנגזרות החלקיות

$$\bar{x}_u = \frac{\partial \bar{x}}{\partial u}, \quad \bar{x}_v = \frac{\partial \bar{x}}{\partial v}$$

הן בלתי תלויות לינארית.

הגדרה 5.2.9 — תנאי הרגולריות.

התנאי השלישי, שלפיו $\bar{x}_u$ ו- $\bar{x}_v$ בלתי תלויות לינארית, שקול לתנאי

$$\bar{x}_u \times \bar{x}_v \neq 0$$

שכן המכפלה הווקטורית של שני וקטורים מתאפסת אם ורק אם הם תלויים לינארית, כפי שראינו בתרגול 4 בעזרת זהות לגראנז'.

הערה 5.2.10 — מערכת קואורדינטות וסביבה קואורדינטית.

שני שמות שכדאי להכיר. ההעתקה $\bar{x}$ נקראת **מערכת קואורדינטות מקומית** בסביבה של p , והקבוצה $V \cap M$ נקראת **סביבה קואורדינטית** של p .

בקצרה, משטח רגולרי הוא משטח שניתן לכסות אותו במפות חלקות ורגולריות. שני דגשים בהגדרה. הראשון, הכיסוי הוא באטלס, כלומר באוסף של מפות מקומיות, ולא בהכרח במפה אחת. השני, המפות חייבות להיות חלקות, כלומר בלי קצוות חדים, וגם רגולריות, שכן הנגזרות אינן מתאפסות ולכן אין למשטח נקודות חוד, שפיצים או קיפולים.

הגדרה 5.2.11 — המישור המשיק.

המישור המשיק למשטח בנקודה $p = \bar{x}(u, v)$ מסומן ב- $T_p M$ ומוגדר על ידי

$$T_p M = \text{span} \{ \bar{x}_u, \bar{x}_v \}$$

הגדרה 5.2.12 — וקטור הנורמל היחידה.

וקטור הנורמל היחידה של המשטח מוגדר על ידי

$$N(u, v) = \frac{\bar{x}_u \times \bar{x}_v}{\|\bar{x}_u \times \bar{x}_v\|}$$

הערה 5.2.13 — מדוע ההגדרות הללו תקינות.

תנאי הרגולריות הוא בדיוק מה שמבטיח את שתי ההגדרות האחרונות. מכיוון ש- $\bar{x}_u$ ו- $\bar{x}_v$ בלתי תלויים לינארית, הפרישה שלהן היא מישור דו-מימדי ולא ישר או נקודה, ומכיוון ש- $\bar{x}_u \times \bar{x}_v \neq 0$ אפשר לחלק בנורמה שלה ולקבל וקטור יחידה. את המישור המשיק נפתח בהמשך, וכאן נסתפק בהגדרתו.

5.2.2 שלוש הצגות מקומיות של משטח

בהגדרת המשטח הרגולרי הופיעה פרמטריזציה מקומית. בפועל, משטחים מגיעים אלינו בשלוש צורות שונות, ומשפט הפונקציה הסתומה מלמד שהשלוש שקולות מקומית. נציג את השלוש, ונשתמש בשקילות הזו שוב ושוב.

משפט 5.2.14 — שלוש הצגות מקומיות.

תהי $M \subseteq \mathbb{R}^3$ ותהי $p \in M$. שלושת התנאים הבאים שקולים בסביבה מקומית של p :

1. גרף. לאחר שינוי שמות הצירים במידת הצורך, M היא מקומית הגרף של פונקציה חלקה, למשל $z = f(x, y)$.
2. פרמטריזציה רגולרית. קיימת קבוצה פתוחה $U \subseteq \mathbb{R}^2$ והעתקה חלקה $\bar{x} : U \rightarrow \mathbb{R}^3$, חד-חד-ערכית עם הופכית רציפה, שדרגת המטריצה היעקובית שלה היא 2.
3. קבוצת אפסים. קיימת סביבה פתוחה $W \subseteq \mathbb{R}^3$ של p ופונקציה חלקה $F : W \rightarrow \mathbb{R}$ כך ש- $M \cap W = \{F = 0\}$ ומתקיים $\nabla F \neq 0$ בכל נקודה של $M \cap W$.

השקילות בין הסעיף הראשון לשלישי היא בדיוק משפט הפונקציה הסתומה המוכר מחשבון אינפיניטסימלי, ואותה נפרט. את השקילות לסעיף השני נצטט כאן, וההוכחה תושלם בהמשך או בתרגיל בית.

משפט 5.2.15 — משפט הפונקציה הסתומה.

תהי $F : W \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה חלקה על קבוצה פתוחה $W \subseteq \mathbb{R}^3$, ותהי $p \in W$ נקודה שבה $F(p) = 0$ ו- $\nabla F(p) \neq 0$.

מכיוון ש- $\nabla F(p) \neq 0$, לפחות אחת הנגזרות החלקיות אינה מתאפסת. נניח למשל

$$\frac{\partial F}{\partial z}(p) \neq 0$$

ואז קיימת סביבה של p שבה אפשר לחלץ את z כפונקציה חלקה של שני המשתנים האחרים, כלומר קיימת f חלקה כך ש-

$$\{F = 0\} = \{z = f(x, y)\}$$

באופן סימטרי, אם $\frac{\partial F}{\partial x}(p) \neq 0$ מחלצים את x כפונקציה של y ו- z , וכן הלאה.

הערה 5.2.16 — מדוע נדרש שינוי שמות הצירים.

המשפט אינו מבטיח שנוכל לחלץ דווקא את z , אלא רק שנוכל לחלץ אחד מן המשתנים. איזה מהם, נקבע לפי הנגזרת החלקית שאינה מתאפסת. לכן בסעיף הראשון של משפט 5.2.14 נכתב "לאחר שינוי שמות הצירים במידת הצורך", וזוהי הסתייגות מהותית ולא טכנית, כפי שנראה בתרגיל הקונס.

עתה נפנה לשקילות בין הפרמטריזציה ובין הגרף. כאן דרגת המטריצה היעקובית היא הכלי, וכדאי לראות שהיא אינה אלא תנאי הרגולריות שכבר פגשנו.

טענה 5.2.17 — דרגה שניים, מינורים ומכפלה וקטורית.

תהי $\bar{x}(u, v) = (x, y, z)$ העתקה חלקה מ- $\mathbb{R}^2$ ל- $\mathbb{R}^3$. המטריצה היעקובית שלה היא מטריצה מסדר 3×2 ,

$$D\bar{x} = \begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \\ z_u & z_v \end{pmatrix},$$

ולה שלושה מינורים מסדר 2×2 , המתקבלים בבחירת שניים מן השורות. אז שלושת התנאים הבאים שקולים:

1. הדרגה של $D\bar{x}$ היא 2.
2. לפחות אחד משלושת המינורים אינו מתאפס.
3. $\bar{x}_u \times \bar{x}_v \neq 0$.

הוכחה.

השקילות בין שני התנאים הראשונים היא עובדה מאלגברה לינארית: דרגת מטריצה היא הסדר המקסימלי של מינור שאינו מתאפס, ולמטריצה מסדר 3×2 הדרגה היא 2 אם ורק אם קיים מינור מסדר 2 שאינו מתאפס.

לשקילות עם התנאי השלישי נחשב את המכפלה הווקטורית במפורש:

$$\bar{x}_u \times \bar{x}_v = (y_u z_v - z_u y_v, z_u x_v - x_u z_v, x_u y_v - y_u x_v)$$

נשים לב מה הם שלושת הרכיבים. הרכיב השלישי הוא

$$x_u y_v - y_u x_v = \det \begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{pmatrix}$$

כלומר בדיוק המינור של השורות x ו- y . הרכיב הראשון הוא המינור של השורות y ו- z , והרכיב השני הוא המינור של השורות x ו- z עד כדי סימן. לכן המכפלה הווקטורית מתאפסת אם ורק אם שלושת המינורים מתאפסים, וזוהי בדיוק השקילות המבוקשת.

מסקנה 5.2.18 — המינור קובע מעל איזה מישור.

המינור שאינו מתאפס אינו רק מעיד על רגולריות, אלא גם אומר לנו מעל איזה מישור קואורדינטות המשטח הוא גרף. אם המינור של השורות x ו- y אינו מתאפס, כלומר

$$\det \begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{pmatrix} \neq 0$$

אז לפי משפט הפונקציה ההופכית ההעתקה $(u, v) \mapsto (x, y)$ הפיכה מקומית, ולכן u ו- v הם פונקציות חלקות של x ושל y . נציב זאת ברכיב השלישי ונקבל

$$z = z(u(x, y), v(x, y)) = f(x, y)$$

כלומר המשטח הוא מקומית גרף מעל מישור xy . באופן סימטרי, מינור אחר נותן גרף מעל מישור הקואורדינטות המתאים לשורותיו.

הערה 5.2.19 — מה למדנו על תנאי הרגולריות.

כאן מתקבל פירוש נוסף לתנאי $\bar{x}_u \times \bar{x}_v \neq 0$ שכבר הופיע בהגדרה 5.2.9. התנאי אינו רק דרישה טכנית שמאפשרת להגדיר נורמל, אלא הוא בדיוק התנאי שמבטיח שהמשטח הוא מקומית גרף של פונקציה חלקה, והרכיב הגדול ביותר של המכפלה הווקטורית מצביע על מישור הקואורדינטות שמעליו נוה לרשום את הגרף.

5.2.3 דוגמאות

טענה 5.2.20 — גרף של פונקציה חלקה הוא משטח רגולרי.

תהי $U \subseteq \mathbb{R}^2$ קבוצה פתוחה ותהי $g : U \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה חלקה. אז הגרף

$$\Gamma(g) = \{(u, v, g(u, v)) : (u, v) \in U\}$$

הוא משטח רגולרי ב- $\mathbb{R}^3$.

הוכחה.

ניקח את הפרמטריזציה $\bar{x}(u, v) = (u, v, g(u, v))$ ובדוק את שלושת התנאים.

התנאי הראשון מתקיים, שכן שני הרכיבים הראשונים הם פונקציות לינאריות והשלישי הוא g , שהיא חלקה לפי ההנחה.

התנאי השני מתקיים גם הוא: ההעתקה חד-חד-ערכית, שכן אם $\bar{x}(u_1, v_1) = \bar{x}(u_2, v_2)$ אז בפרט שני הרכיבים הראשונים שווים ולכן $(u_1, v_1) = (u_2, v_2)$. ההופכית היא ההטלה $(x, y, z) \mapsto (x, y)$, שהיא רציפה.

לתנאי השלישי נחשב

$$\bar{x}_u = (1, 0, g_u), \quad \bar{x}_v = (0, 1, g_v)$$

ולכן

$$\bar{x}_u \times \bar{x}_v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & g_u \\ 0 & 1 & g_v \end{vmatrix} = (-g_u, -g_v, 1)$$

והרכיב השלישי הוא 1, ולכן הווקטור אינו מתאפס לעולם.

הערה 5.2.21 — גרף מתכסה במפה אחת.

גרפים הם הדוגמאות הפשוטות ביותר למשטחים, שכן אפשר לכסות אותם בסביבה קואורדינטית אחת. נראה בהמשך שאין זה המצב עבור משטחים אחרים.


שתי דוגמאות ראשונות הן גרפים, ולכן לפי הטענה הן משטחים רגולריים ללא כל בדיקה נוספת.

הערה 5.2.22 — פרבולואיד אליפטי.

יהיו $a, b > 0$ ותהי

$$g(u, v) = \frac{u^2}{a^2} + \frac{v^2}{b^2}, \quad (u, v) \in \mathbb{R}^2$$

הגרף של g נקרא פרבולואיד אליפטי. חתכיו במישורים $z = c$ עבור $c > 0$ הם אליפסות, וחתכיו במישורים $x = 0$ ו- $y = 0$ הם פרבולות.



הפרבולואיד האליפטי עבור $a = b = 1$, עם חתך אופקי אחד המראה אליפסה וחתך אנכי אחד המראה פרבולה.


הערה 5.2.23 — פרבולואיד היפרבולי.

יהיו $a, b > 0$ ותהי

$$g(u, v) = \frac{u^2}{a^2} - \frac{v^2}{b^2}, \quad (u, v) \in \mathbb{R}^2$$

הגרף של g נקרא **פרבולואיד היפרבולי**, וצורתו צורת אוכף. בכיוון אחד הוא נראה כפרבולה הפונה למעלה ובכיוון האחר כפרבולה הפונה למטה, ולכן בראשית הצירים אין לו מינימום ואין לו מקסימום.

$$z = x^2/a^2 - y^2/b^2$$



הפרבולואיד ההיפרבולי עבור $a = b = 1$. שני החתכים האנכיים דרך הראשית מראים את שתי הפרבולות הפונות לכיוונים מנוגדים.

הדוגמה הבאה מגיעה בהצגה השלישית, כקבוצת אפסים, והיא מראה כמה משטחים בבת אחת.

הערה 5.2.24 — היפרבולואידים וקונוס אליפטי.

יהיו $a, b, c > 0$ ותהי

$$F(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}$$


נחשב את הגרדיאנט ונקבל

$$\nabla F = \left(\frac{2x}{a^2}, \frac{2y}{b^2}, -\frac{2z}{c^2} \right)$$

והוא מתאפס אם ורק אם $x = y = z = 0$. מכיוון ש- $F(0, 0, 0) = 0$, נובע ממשפט 5.2.14 שלכל $k \neq 0$ הקבוצה $\{F = k\}$ היא משטח רגולרי, שכן היא אינה מכילה את הראשית ולכן הגרדיאנט אינו מתאפס באף נקודה שלה.

מתקבלים שני משטחים שונים לפי סימן k . עבור $k > 0$ הקבוצה היא **היפרבולואיד חד-יריעתי**, ועבור $k < 0$ היא **היפרבולואיד דו-יריעתי**.

המקרה $k = 0$ שונה במהותו. הקבוצה $\{F = 0\}$ היא **קונוס אליפטי**, והיא כן מכילה את הראשית, שבה הגרדיאנט מתאפס. לכן המשפט אינו חל בנקודה זו, והקונוס אכן אינו משטח רגולרי בראשית, כפי שנראה בשאלה 5.2.36.



שלוש רמות של אותה פונקציה F עבור $a = b = c = 1$. משמאל $k > 0$, היפרבולואיד חד־יריעתי; באמצע $k = 0$, הקונוס האליפטי, והנקודה המסומנת היא הראשית שבה הגרדיאנט מתאפס; מימין $k < 0$, היפרבולואיד דו־יריעתי.

הערה 5.2.25 — שתי משוואות שאינן מגדירות משטח.

חשוב לראות שלא כל משוואה מגדירה משטח, ושהתנאי על הגרדיאנט אינו מיותר. שתי דוגמאות:

1. המשוואה $xy = 0$ מגדירה את איחוד שני מישורי הקואורדינטות $x = 0$ ו- $y = 0$. הקבוצה אינה משטח רגולרי בנקודות החיתוך שלהם, שכן שם היא נראית כשני דפים הנחתכים ולא כמישור בודד.
2. המשוואה $x^2 + y^2 = 0$ מגדירה את ציר z בלבד, שהוא ישר. זו אינה קבוצה דו־מימדית כלל.

5.2.4 משטחי סיבוב

מקור נוח למשפחות שלמות של דוגמאות הוא סיבוב של עקומה סביב ציר.

הגדרה 5.2.26 — משטח סיבוב.

משטח סיבוב ב- $\mathbb{R}^3$ הוא משטח M שנשמר כקבוצה תחת סיבובי $\mathbb{R}^3$ סביב ישר קבוע, הנקרא **ציר הסיבוב** של M .

הגדרה 5.2.27 — הפרמטריזציה של משטח סיבוב.

יהי I קטע פתוח ותהי

$$\alpha(v) = (f(v), 0, g(v)), \quad v \in I$$

עקומה רגולרית ללא נקודות חיתוך עצמי במישור $y = 0$, המקיימת $f(v) > 0$ לכל $v \in I$. בפרט α אינה פוגשת את ציר z . הקבוצה הנסרקת בסיבוב α סביב ציר z היא

$$M = \{(f(v) \cos u, f(v) \sin u, g(v)) : u \in \mathbb{R}, v \in I\}$$

והעקומה α נקראת **העקומה היוצרת של M** .


הגדרה 5.2.28 — מקבילים ומרידיאנים.

המעגל הנסרק על ידי נקודה בודדת של העקומה היוצרת נקרא **מקביל**, והעקומה המתקבלת מסיבוב העקומה היוצרת בזווית קבועה נקראת **מרידיאן**. כל מקביל הוא חיתוך של M עם מישור אופקי $z = \text{const}$, וכל מרידיאן הוא חיתוך של M עם חצי מישור ששפתו ציר הסיבוב.

הערה 5.2.29 — קווי רוחב וקווי אורך.

עבור הספירה, המקבילים והמרידיאנים הם בדיוק קווי הרוחב וקווי האורך המשמשים בגיאוגרפיה של כדור הארץ.

generating curve, one parallel, one meridian



משטח סיבוב כללי. העקומה היוצרת מסומנת בכהה, מקביל אחד ומרידיאן אחד מסומנים אף הם, וציר הסיבוב הוא ציר z .

טענה 5.2.30 — משטח סיבוב הוא רגולרי.

בסימוני הגדרה 5.2.27, הפרמטריזציה

$$\bar{x}(u, v) = (f(v) \cos u, f(v) \sin u, g(v))$$

מקיימת את תנאי הרגולריות בכל נקודה.

הוכחה.

נחשב את שתי הנגזרות החלקיות:

$$\bar{x}_u = (-f(v) \sin u, f(v) \cos u, 0)$$

$$\bar{x}_v = (f'(v) \cos u, f'(v) \sin u, g'(v))$$

וכן

נחשב את המכפלה הווקטורית:

$$\bar{x}_u \times \bar{x}_v = (f \cos u \cdot g' - 0, 0 - (-f \sin u) g', -f \sin u \cdot f' \sin u - f \cos u \cdot f' \cos u)$$

נפשט כל רכיב ונקבל

$$\bar{x}_u \times \bar{x}_v = (f g' \cos u, f g' \sin u, -f f')$$

כאשר ברכיב השלישי הוצאנו $-f f'$ והשתמשנו ב- $\sin^2 u + \cos^2 u = 1$.

נחשב את הנורמה בריבוע:

$$\|\bar{x}_u \times \bar{x}_v\|^2 = f^2 (g')^2 \cos^2 u + f^2 (g')^2 \sin^2 u + f^2 (f')^2 = f^2 ((f')^2 + (g')^2)$$

לפי ההנחה $f(v) > 0$ ולכן $f^2 > 0$. העקומה α רגולרית, כלומר $\alpha' = (f', 0, g') \neq 0$ ולכן $(f')^2 + (g')^2 > 0$. מכפלת שני גורמים חיוביים חיובית, ולכן המכפלה הווקטורית אינה מתאפסת לעולם.

הערה 5.2.31 — משטח סיבוב כקבוצת אפסים.

כאשר העקומה היוצרת היא מן הצורה $\alpha(v) = (f(v), 0, v)$, כלומר כאשר הרכיב השלישי הוא הפרמטר עצמו, אפשר לתאר את משטח הסיבוב גם כקבוצת אפסים על ידי המשוואה

$$x^2 + y^2 = (f(z))^2$$

זו הצגה שימושית, שכן היא מאפשרת לבדוק רגולריות בעזרת הגרדיאנט במקום בעזרת הפרמטריזציה.

עתה שתי דוגמאות. שתיהן מתקבלות מסיבוב עקומות שכבר פגשנו או שקל לתאר.

הערה 5.2.32 — קטנואיד.

הקטנואיד מתקבל מסיבוב קו שרשרת סביב ציר z . יהי $k > 0$ קבוע, ותהי העקומה היוצרת


$$\alpha(v) = \left(k \cosh \frac{v}{k}, 0, v \right), \quad v \in \mathbb{R}$$

ואז הפרמטריזציה של המשטח היא

$$\bar{x}(u, v) = \left(k \cosh \frac{v}{k} \cos u, k \cosh \frac{v}{k} \sin u, v \right)$$

מכיוון ש- $k \cosh \frac{v}{k} > 0$ לכל v , העקומה היוצרת אינה פוגשת את הציר, ולכן לפי טענה 5.2.30 הקטנואיד הוא משטח רגולרי.

catenoid: $f(v) = k \cosh(v/k)$



הקטנואיד עבור $k = 1$. העקומה היוצרת, קו שרשרת, מסומנת בכהה במישור $y = 0$.


הערה 5.2.33 — פסאודוספירה.

הפסאודוספירה מתקבלת מסיבוב הטרקטריסה סביב ציר z . העקומה היוצרת היא

$$\alpha(v) = (\operatorname{sech} v, 0, v - \tanh v), \quad v > 0$$

ומכיון ש- $\operatorname{sech} v > 0$ לכל v , גם כאן העקומה אינה פוגשת את הציר ולכן המשטח רגולרי. הטעם לשם יתברר כאשר נעסוק בעקמומיות גאוס.

pseudosphere: rotate the tractrix



הפסאודוספירה. העקומה היוצרת, הטרקטריסה, מסומנת בכהה במישור $y = 0$.

הערה 5.2.34 — כאשר העקומה היוצרת פוגשת את הציר.

ההנחה $f(v) > 0$ אינה קוסמטית. אם העקומה היוצרת כן פוגשת את ציר הסיבוב, עלולות להיווצר נקודות שבהן המשטח אינו רגולרי. לדוגמה, סיבוב הישר $z = x$ סביב ציר z נותן קונוס, ובקודקודו המשטח אינו רגולרי. זהו בדיוק המצב שנבחן בתרגיל הבא.

5.2.4.1 תרגילים

שאלה 5.2.35.

הוכיחו שההיפרבולואיד הדו־יריעתי

$$x^2 + y^2 - z^2 = -1$$

הוא משטח רגולרי. עשו זאת בשתי דרכים, פעם בעזרת גרפים ופעם בעזרת קבוצת אפסים.

פתרון.

דרך ראשונה: גרפים (אפשר לדלג)

נחלץ את z מן המשוואה. מתקיים $z^2 = 1 + x^2 + y^2$, ומכיוון שהאגף הימני גדול או שווה ל-1, בפרט $z^2 \geq 1$ ולכן $z \neq 0$. לכן הקבוצה מתפרקת לשני חלקים זרים,

$$z = \sqrt{1 + x^2 + y^2} \quad \text{ו} \quad z = -\sqrt{1 + x^2 + y^2}$$

ובכל אחד מהם z הוא גרף של פונקציה המוגדרת על כל $\mathbb{R}^2$.

הפונקציה $g(x, y) = \sqrt{1 + x^2 + y^2}$ חלקה על כל $\mathbb{R}^2$, שכן הביטוי תחת השורש גדול או שווה ל-1 ולכן חסום מלרע על ידי מספר חיובי, והשורש הוא פונקציה חלקה בסביבת כל נקודה כזו. לכן לפי טענה 5.2.20 כל אחת משתי היריעות היא משטח רגולרי, וגם האיחוד שלהן, שכן כל נקודה נמצאת באחת מהן בלבד.

דרך שנייה: קבוצת אפסים (אפשר לדלג)

נגדיר $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2 + 1$, ואז הקבוצה שלנו היא $\{F = 0\}$. נחשב

$$\nabla F = (2x, 2y, -2z)$$

הגרדיאנט מתאפס רק בראשית הצירים, אך הראשית אינה על המשטח, שכן $F(0, 0, 0) = 1 \neq 0$. לכן $\nabla F \neq 0$ בכל נקודה של הקבוצה, ולפי משפט 5.2.14 הקבוצה היא משטח רגולרי.

הערה: המשטח אינו קשיר (אפשר לדלג)

שימו לב שהדרך הראשונה חשפה מידע נוסף. המשטח מתפרק לשתי יריעות זרות, אחת עם $z \geq 1$ ואחת עם $z \leq -1$, ולכן הוא אינו קשיר. זו דוגמה לכך שמשטח רגולרי אינו חייב להיות קשיר, שכן ההגדרה היא מקומית בלבד ואינה דורשת דבר על הקשר בין חלקים רחוקים של המשטח.

שאלה 5.2.36

יהי הקונוס

$$C = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = \sqrt{x^2 + y^2} \right\}$$

הוכיחו ש- C אינו משטח רגולרי.

פתרון.

הערה מקדימה: מה צריך להוכיח (אפשר לדלג)

כדי להוכיח שקבוצה אינה משטח רגולרי לא די להראות שפרמטריזציה אחת נכשלת, שכן ייתכן שפרמטריזציה אחרת תצליח. יש לשלול את כל הפרמטריזציות האפשריות בבת אחת.

הכלי לכך הוא משפט 5.2.14. אם C היה משטח רגולרי, אז בסביבת הראשית הוא היה מקומית גרף של פונקציה חלקה מעל אחד משלושת מישורי הקואורדינטות. נשלול את שלוש האפשרויות, ובכך נשלול כל פרמטריזציה.

שלב 1: הקונוס אינו גרף מעל מישור yz (אפשר לדלג)

נניח בשלילה שבסביבת הראשית C הוא גרף מן הצורה $x = h(y, z)$, כלומר שהקואורדינטה x נקבעת על ידי y ו- z .

יהי $t > 0$ קטן. נבדוק שתי נקודות:

$$(-t, 0, t) \in C \quad \text{ו} \quad (t, 0, t) \in C$$

ואכן שתיהן על הקונוס, שכן $\sqrt{t^2 + 0^2} = |t| = t$ בשני המקרים.

לשתי הנקודות אותם y ואותו z , כלומר $(y, z) = (0, t)$, אך רכיבי ה- x שלהן הם t ו- $-t$, והם שונים שכן $t > 0$. לכן x אינו פונקציה של y ושל z , בסתירה להנחה.

שלב 2: הקונוס אינו גרף מעל מישור xz (אפשר לדלג)

החישוב סימטרי לחלוטין לשלב הקודם, בהחלפת התפקידים של x ושל y . הנקודות $(0, t, t)$ ו- $(0, -t, t)$ שתיהן על הקונוס ובעלות אותם $(x, z) = (0, t)$, אך רכיבי ה- y שלהן שונים. לכן y אינו פונקציה של x ושל z .

שלב 3: נשארה רק אפשרות אחת, והפונקציה יחידה (אפשר לדלג)

לפי שני השלבים הקודמים, האפשרות היחידה שנותרה היא ש- C הוא מקומית גרף מן הצורה $z = f(x, y)$. הקבוצה C קובעת את f באופן יחיד: נקודה (x, y, z) נמצאת ב- C אם ורק אם $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, ולכן בהכרח

$$f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$$

לכן, אם C הוא משטח רגולרי, הפונקציה הזו חייבת להיות חלקה בסביבת הראשית, ובפרט דיפרנציאבילית בנקודה $(0, 0)$. נראה שאין זה כך.

שלב 4: הפונקציה אינה דיפרנציאבילית בראשית (אפשר לדלג)

נניח בשלילה ש- f דיפרנציאבילית ב- $(0, 0)$, ונסמן ב- df_0 את הדיפרנציאל שלה שם. מתקיים $f(0, 0) = 0$, ולכן הגדרת הדיפרנציאביליות אומרת

$$f(w) = df_0(w) + o(\|w\|)$$

כלומר השארית קטנה מסדר גודל מ- $\|w\|$ עצמו.

יהי $v \in \mathbb{R}^2$ וקטור כלשהו שאינו אפס, ונציב $w = tv$ עבור $t > 0$ קטן. נחשב את האגף השמאלי ישירות מן הנוסחה של f :

$$f(tv) = \sqrt{t^2 (v^1)^2 + t^2 (v^2)^2} = t \|v\|$$

מצד שני, לפי דיפרנציאביליות ולינאריות הדיפרנציאל,

$$f(tv) = t \cdot df_0(v) + o(t)$$

נשווה, נחלק ב- $t > 0$ ונשאיף $t \rightarrow 0^+$. השארית $o(t)$ מחולקת ב- t שואפת לאפס, ולכן

$$df_0(v) = \|v\|$$

עתה נחזור על אותו חישוב בדיוק בכיוון הנגדי $-v$. גם כאן

$$f(t(-v)) = t \|-v\| = t \|v\|$$

ולכן באותו אופן

$$df_0(-v) = \|v\|$$

אך df_0 היא העתקה לינארית, ולכן

$$df_0(-v) = -df_0(v) = -\|v\|$$



קיבלנו $\|v\| = -\|v\|$, כלומר $\|v\| = 0$, בסתירה לכך ש- $v \neq 0$.

שלב 5: סיכום הסתירה (אפשר לדלג)

הראינו שאם C היה משטח רגולרי, הוא היה חייב להיות מקומית גרף מעל מישור xy , ושהפונקציה המתאימה אינה דיפרנציאבילית בראשית. לכן C אינו משטח רגולרי.

אפשר לתאר את הסתירה גם באופן גיאומטרי. הקירוב הלינארי בכיוון v עולה בשיפור $\|v\| > 0$, ולכן בכיוון הנגדי הוא חייב לרדת. אך $f = \sqrt{x^2 + y^2} \geq 0$ בכל נקודה, ולכן אינה יכולה לרדת מתחת לערכה בראשית. במילים פשוטות, לקונוס יש חוד בקודקודו, ולחוד אין מישור משיק.

נשים לב שהקושי הוא רק בראשית. הקבוצה $C \setminus \{(0, 0, 0)\}$, כלומר הקונוס בלי קודקודו, כן משטח רגולרי.



הקונוס $z = \sqrt{x^2 + y^2}$. מימין המשטח, והנקודה המסומנת היא הקודקוד. משמאל החתך במישור $y = 0$, שהוא $z = |x|$, ובו רואים את החוד: השיפוע מימין לראשית הוא $+1$ ומשמאלה -1 , ולכן אין ישר משיק אחד.

5.3 מקורות

- ניקול, הרצאה 4 בקורס.
- אלעד עטיא, חוברת תרגולים - גיאומטריה אנליטית ודיפרנציאלית, פרק 2, 2017.
- ראובן, גיאומטריה אנליטית ודיפרנציאלית, סיכומי הרצאות, 2023.
- 2010 Springer, edition, 2nd, *Geometry Differential Elementary* Pressley, Andrew
- *Euclidean in Surfaces Geometry: Differential in Course First A* Bolton, J. and Woodward M. L.
- 2018 Press, University Cambridge, *Space*
- 2016 Springer, *Surfaces and Curves of Geometry Differential* Tapp, Kristopher