

9.1 טורים, כללי

הגדרות

1. סדרת הסכומים החלקיים

תהי $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרה ממשית. נגדיר סדרה חדשה $(S_k)_{k=1}^\infty$ שהיא סדרת הסכומים החלקיים של a_n , המוגדרת ע"י $\forall k \in \mathbb{N} S_k = \sum_{n=1}^k a_n$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} S_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^k a_n = \sum_{n=1}^\infty a_n \text{ נסמן}$$
$$(S_k)_{k=1}^\infty = \left(\sum_{n=1}^k a_n \right)_{k=1}^\infty = \sum_n a_n S_k \text{ הסדרה}$$

בכל מקרה, נסמן את הסדרה

1.1 טור חסום

נאמר שהטור $\sum_n a_n$ חסום אם הס"ח $(S_k)_{k=1}^\infty$ היא סדרה חסומה.

2. טור

למילה 2 משמעויות:

1. S_k סדרת הסכומים החלקיים של a_n היא טור הסדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$.

2. אם קיים הגבול $\sum_{n=1}^\infty a_n = L$, נאמר ש- L הוא טור הסדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$.

(א) אם $L \in \mathbb{R}$, נאמר שהטור מתכנס ושסכום הטור הוא L

(ב) אם $L \in \{-\infty, \infty\}$, נאמר שהטור $\sum_n a_n$ מתבדר לאינסוף (מינוס אינסוף)

2. טור זנב וטור הזנב

יהיו $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרה ממשית, $(S_k)_{k=1}^\infty$ שהיא סדרת הסכומים החלקיים של a_n $N \in \mathbb{N}$ ו- a_n טור ה- N זנב של a_n הוא הטור $\sum_{n=N+1}^\infty a_n = a_{N+1}, a_{N+2}, \dots, a_{N+n}, \dots$ ואינו קשור לסדרת הסכומים החלקיים (S_k) !

אם טור ה- N זנב של a_n מתכנס, נסמן את גבול הטור $\sum_{n=1}^\infty a_n = \sum_{n=1}^N a_n + \sum_{n=N+1}^\infty a_n$

לעומת זאת, ה- N זנב של הטור $\sum_n a_n$ הוא $(S_{k+N})_{k=1}^\infty$ המוגדר $\forall k > N S_K = a_{N+1} + a_{N+2} + a_k \dots = \sum_{n=1}^k a_k - \sum_{n=1}^N a_N$

סימון: x^+, x^- בהינתן $x \in \mathbb{R}$ נסמן

$$\begin{cases} x^- = \frac{|x|-x}{2} = \max\{-x, 0\} \geq 0 \\ x^+ = \frac{|x|+x}{2} = \max\{x, 0\} \end{cases}$$

אזי מתקיים $x = x^+ - x^-$ וגם $|x| = x^+ + x^-$

משפטים

1. התכנסות טורים הנדסיים

ראשית נציין שסדרה תיקרא סדרה הנדסית אם קיימים $a_1, q \in \mathbb{R}$ המקיימים $\forall n \in \mathbb{N} a_n = a_1 q^{n-1}$ בנוסף, נשים לב שהסדרה $q_k = q^k, q_1 = q \in \mathbb{R}, \forall k \in \mathbb{N}$ מתכנסת אם $|q| \leq 1$, ואם כך בפרט גם אפסה.

נשים לב ש- S_k מקיימת:

$$\forall k \in \mathbb{N} S_k = \sum_{n=1}^k a_n = a_1 + a_1 \cdot q + \dots + a_1 q^{k-1} = a_1 (1 + q + q^2 + \dots + q^{k-1}) = a_1 \frac{1 - q^k}{1 - q} \quad (*)$$

כאשר $(*)$ תקפה לכל $q \neq 1$
 ולכן, אם q_k לא אפסה הסכום ימשיך לגדול לכל k , אזי משלילת הנ"ל נקבל ש- S_k מתכנסת $\iff q_k$ מתכנסת $\iff |q| \leq 1$
 אם $a_1 = 0$, אזי $a_n = a_1 q^{n-1} = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$ ולכן $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 0$.
 אחרת נשאל: האם הטור $\sum_n a_n$ מתכנס? אם $a_1 \neq 0$, תלוי ב- q :

$$q = 1 \quad \text{אזי } a_n \text{ קבועה, ולכן לא תתכנס לכל } a_1 \neq 0, \text{ שכן } \sum_{n=1}^k a_n = k \cdot a_1 \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \infty, \forall k \in \mathbb{N}$$

$|q| > 1$ משום ש- $a_1 \neq 0$, לפי הנ"ל S_k לא תתכנס וכן a_n לא אפסה.

$$|q| < 1 \quad \text{אזי מתקיים } \lim_{k \rightarrow \infty} S_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^k a_n \stackrel{(*)}{=} \lim_{k \rightarrow \infty} a_1 \frac{1 - q^k}{1 - q} = \frac{a_1}{1 - q} \quad \text{והטור מתכנס (בפרט הסדרה אפסה)}$$

2. טור מתכנס רק אם הסדרה אפסה

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \quad \text{אזי } \sum_n a_n \text{ מתכנס,}$$

הוכחה נסמן $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = L \in \mathbb{R}$. אזי מתקיים

$$\forall k \in \mathbb{N} \quad \sum_{n=1}^k a_n = a_k + \sum_{n=1}^{k-1} a_n \iff a_k = \sum_{n=1}^k a_n - \sum_{n=1}^{k-1} a_n \iff \lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^k a_n - \sum_{n=1}^{k-1} a_n = L - L = 0$$

3. התבדרות הטור ההרמוני

$$\forall m \in \mathbb{N} \quad \sum_{n=1}^{2^{m-1}} = S_{2^{m-1}} \geq \frac{m+1}{2} \quad \text{נוכיח באינדוקציה על } m \text{ שמתקיים}$$

$$\bullet \text{ בסיס } m=1: S_{2^{1-1}} = S_1 = 1 \geq \frac{1+1}{2} = 1 \quad \text{מתקיים}$$

$$\bullet \text{ צעד נניח שמתקיים } S_{2^{m-1}} \geq \frac{m+1}{2}, \text{ נוכיח שמתקיים } S_{2^m} \geq \frac{m+2}{2}$$

$$\begin{aligned} S_{2^m} &= S_{2^{m-1}} + h_{2^{m-1}+1} + h_{2^{m-1}+2} + \dots + h_{2^m} = \\ &= S_{2^{m-1}} + \frac{1}{2^{m-1}} + \frac{1}{2^{m-1}+1} + \dots + \frac{1}{2^m} + \frac{1}{2^m} \geq S_{2^{m-1}} + 2^{m-1} \left(\frac{1}{2^m} \right) \stackrel{\text{step}}{\geq} \\ &\stackrel{\text{step}}{\geq} \frac{m+1}{2} + \frac{2^{m-1}}{2^m} = \frac{m+1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{(m+1)+1}{2} \end{aligned}$$

כנדרש.

לכן נקבל ש- S_{2^k} תת הסדרה של S_k מקיימת $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k+1}{2} = \infty$ ולכן אינה חסומה, אזי ממשפט הירושה גם S_k אינה חסומה ועל כן אינה מתכנסת, כנדרש.

4. אריתמטיקה של טורים מתכנסים

תהיינה $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרות ממשיות ויהא $c \in \mathbb{R}$ נתון. אזי מתקיים:

1. אם הטור $\sum_n a_n$ מתכנס, אזי הטור $\sum_n (ca_n)$ מתכנס ומתקיים $\sum_{n=1}^\infty (ca_n) = c \cdot \sum_{n=1}^\infty a_n$
2. אם $c \neq 0$, והטור $\sum_n (ca_n)$ מתכנס, אזי הטור $\sum_n (a_n)$ מתכנס ומקיים $\sum_{n=1}^\infty a_n = \frac{1}{c} \sum_{n=1}^\infty (ca_n)$
3. תוספת אם הטורים $\sum_n a_n, \sum_n b_n$ מתכנסים, אזי הטור $\sum_n (a_n + b_n)$ מתכנס ומקיים $\sum_{n=1}^\infty (a_n + b_n) = \sum_{n=1}^\infty a_n + \sum_{n=1}^\infty b_n$

5. קריטריון קושי לטורים מתכנסים

הטור $\sum_n a_n$ מתכנס אם

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall k, p \in \mathbb{N} \quad N < k \Rightarrow \left| \sum_{n=k+1}^{k+p} a_n \right| < \varepsilon$$

הוכחה

נשים לב שמתקיים $\left| \sum_{n=k+1}^{k+p} a_n \right| = \left| \sum_{n=1}^{k+p} a_n - \sum_{n=1}^k a_n \right| = |S_{k+p} - S_k|$ ולכן הגדרה זו שקולה לקריטריון קושי להתכנסות סדרות, כנדרש.

6. טור מתכנס אם טור ה-N-זנב מתכנס

יהי $N \in \mathbb{N}$. הטור $\sum_n a_n$ מתכנס אם טור ה-N-זנב שלו $\sum_n a_{n+N}$ מתכנס, ואז מתקיים $\sum_{n=1}^\infty a_{n+N} = \sum_{n=1}^\infty a_n - \sum_{n=1}^N a_n$.

הוכחה

נשים לב שכאשר נגדיר S_k סדרת הסכומים החלקיים של a_n , ואת T_k סדרת הסכומים החלקיים של a_{n+N} , מתקיים

$$\forall k \in \mathbb{N} \quad T_k = \sum_{n=N+1}^k a_n = \sum_{n=1}^k a_n - \sum_{n=1}^N a_n = S_k - S_N$$

והרי בין אם הטור מתכנס או לא, $S_N \in \mathbb{R}$ קבוע ואינו תלוי ב-k ועל כן מאריתמטיקה של גבולות T_k - S_k מתכנסים ומתבדרים יחדיו, כנדרש.