חשבון אינפיניטסימלי 1 - הרצאה 3

הערה

סיכום קצר

- **הנושא המרכזי:**
- **הרעיון המרכזי / מה לקחת מההרצאה:**

---

1. מושגים והגדרות מרכזיים

חשוב

הגדרות ותכונות נשמרות

---

2. סיכום ההרצאה

נושא 1

הערה

הערות והסברים

(אי)רציונלים



משפט

הרציונליים צפופים בממשיים, כלומר:
לכל $a,b\in\mathbb{R}$ קיים $q\in\mathbb{Q}$ עם
$a<q<b$

הוכחה:

$$(n-1)(b-a)\le 1<n(b-a)$$

(לגבי שמה קרובה $\frac{1}{n}$ ועוד משהו אחר)



$$\frac{m-1}{n}\le a<\frac{m}{n}$$
$$\Downarrow$$
$$\frac{1}{n}(m-1)\le a<\left(\frac{1}{n}\right)\cdot m$$

הוכחה:

$0<b-a$ מעקרון ארכימדס עם $x=1$, $b-a=h$
נקבל שקיים $n\in\mathbb{Z}$ עם $\boxed{(n-1)(b-a)\le 1<n(b-a)}$

נשתמש שוב בעיקרון ארכימדס
עם $x=a$, $h=\frac{1}{n}$, נקבל שיש $m\in\mathbb{Z}$:

$$\boxed{\frac{m-1}{n}\le a<\frac{m}{n}}$$

רואים ש $a<\frac{m}{n}$ ו- $\frac{m}{n}\in\mathbb{Q}$
נותר להראות ש $\frac{m}{n}<b$
נניח בשלילה ש- $\frac{m}{n}\ge b$ (נקווה להגיע לסתירה)

$$\frac{m-1}{n}\le a<b\le\frac{m}{n}$$

נקבל: $b-a<\frac{m}{n}-a\le\frac{m}{n}-\frac{m-1}{n}=\frac{1}{n}$

$1<n(b-a)\ /:n \Rightarrow \frac{1}{n}<b-a$

$b-a\le\frac{1}{n}$

יש סתירה.

משפט: קיים מס' לא רציונלי (שריבועו 2)

הוכחה:

$X=\{x\in\mathbb{R} \mid x>0 \wedge x^2<2\}$

$Y=\{y\in\mathbb{R} \mid y>0 \wedge y^2>2\}$



$1\in X,\ 100\in Y$

לכן הן לא ריקות.

ראינו שלכל $x\in X$ ו- $y\in Y$ $x^2<2<y^2$

כלומר $x^2<y^2$ ולכן $x<y$

מאקס' השלמות נקבל $c\in\mathbb{R}$

שהוא חסם מלעיל של X וחסם מלרע של Y

נוכיח ש $c^2=2$ ו- $c\notin\mathbb{Q}$

א. נוכיח $c^2=2$: די להראות 2 דברים:

$c^2 \not> 2$, $c^2 \not< 2$

לא גדול   לא קטן

ההוכחה הזאת מאוד דומה

נראה רק:

$c\not<2$:

נניח בשלילה $c<2$ (נקווה להגיע לסתירה)

נחפש $0<\varepsilon\in\mathbb{R}$ כך ש $(c+\varepsilon)^2<2$

זה ייתן סתירה:

$c+\varepsilon>c$ $c+\varepsilon\in X$ וסתירה לכך

ש-c חסם מלעיל של X.

$(c+\varepsilon)^2<2 \Leftrightarrow (c^2+2c\varepsilon+\varepsilon^2)<2 \Leftrightarrow$

$2c\varepsilon+c^2<2 \Leftrightarrow 2c\varepsilon<2-c^2 \Leftrightarrow$

$\varepsilon<\frac{2-c^2}{2c}$

ניקח $\varepsilon=\frac{2-c^2}{3c}$

נוכיח שאכן: $(c+\varepsilon)^2<2$

ראשית נוכיח ש $\varepsilon<c$:

$\varepsilon<c \Leftrightarrow \frac{2-c^2}{3c}<c \Leftrightarrow 2-c^2<3c^2$

$\Leftrightarrow 2<4c^2 \Leftrightarrow 1<2c^2$

וזה מתקיים כי $1\in X$ ולכן $c\geq1$

ולכן $2c^2\geq2$.

(עכשיו $(c+\varepsilon)^2<2 \Leftrightarrow c^2+2c\varepsilon+\varepsilon^2<2$

$\Leftrightarrow \varepsilon(2c+\varepsilon)<2-c^2$

$\varepsilon(2c+\varepsilon)<\underbrace{\varepsilon\cdot3c}_{2-c^2}$

$\Leftrightarrow 2c+\varepsilon<3c$

$\Leftrightarrow \varepsilon<c$

נוכיח $c\notin\mathbb{Q}$

נניח בשלילה ש- $c\in\mathbb{Q}$ אזי יש $m,n\in\mathbb{Z}$

כך $c=\frac{m}{n}$

בה"כ (בלי הגבלת הכלליות) נניח m ו-n זרים,

$c^2=2$. לכן $\frac{m^2}{n^2}=2$ ולכן $m^2=2n^2$

2 מחלק את m^2.

מהמשפט היסודי של האריתמטיקה,

$\boxed{2 \text{ מחלק את } m}$ אזי יש $k\in\mathbb{Z}$

כך $m=2k$

מכיוון ש- $m^2=2n^2$

אזי $4k^2=2n^2$

כלומר $2k^2=n^2$

ולכן 2 מחלק את n^2, כמו קודם

2 מחלק את n.

2 מחלק את m ו-n וסתירה לזרות שלהם.