חשבון אינפיניטסימלי 1 - הרצאה 1

הערה

סיכום קצר

- **הנושא המרכזי:**
- **הרעיון המרכזי / מה לקחת מההרצאה:**

1. מושגים והגדרות מרכזיים

חשוב

הגדרות ותכונות נשמרות

2. סיכום ההרצאה

נושא 1

הערה

הערות והסברים

yoni.zohar@biu.ca.il

zorich - mathematical analysis

טענה: לכל x,y ממשיים מתקיים בדיוק אחד מהמקרים הבאים:

x>y, x=y, x< y

הוכחה:

ראשית נוכיח שלפחות אחד התנאים מתקיים.

$\exists$ נניח $(x < x)$, סתירה ולכן $x > x$

$\neg(\forall x \forall y (x \leq y \wedge y \leq x))$ - $M \not\models$ לפי ההגדרות

כלומר $(x = y) \wedge (x \leq y)$

אז יתכן ש $x = y$ כי $x \neq y$ אין $(x \leq y)$

מתקיים הלוגיות:

$$(x \leq y) \wedge (x \geq y) \rightarrow$$

אבל $(x \leq y)$, נסכור הנתון $x \neq y$,

מהגדרת "$<$" נקבל $x < y$.

שנית נוכיח שלא ייתכן ששני תנאים מתקיימים.

אז יתכן ש $x = y$ - $x \neq y$, לפי "$<$", כלומר

עבור: $x = x$ - $x \neq y$

שניות הצליל שגרישון והשלישי מתקיימים, נסרל

$x \leq y$ - $y \leq x$. מיוקס הוונל, שמטרות $x = y$

ורוצה $x < y$ ולכן $x \neq y$. סתירה.

הוכחה ללמה 1>0:

טענה $1 > 0$

הוכחה: משלמה קודמת בפונקציה מלמדת ימין מתקיים
מתי: טכ $0 = 1$ $0 < 1$,
מתקיים יותר טוטלי לכפל $0 \neq 0$,
נניח בשלילה ש $0 < 1$, משלמה קודמת יוצא ש $0 < 1 \cdot 1$,
מתקיים טוטלי לכפל $0 < 1$.
כלומר אף $0 < 1$ יכול $0 < 1$, כלומר משהו מתקיים מהשלושת
מתקיימים. לפי יתכן, סתירה.

$$\neg(x > y)$$
$$\neg(x = y)$$
$$\neg(x \geq y \wedge x \neq y)$$
$$x \neq y$$
$$\neg(x \geq y) \vee x = y \implies$$
$$\implies \neg(x \geq y)$$
$$x \leq y \vee \underbrace{y \leq x}_{\text{לא מתקיים}}$$
$$x > y$$

$x \neq y$ נניח $\neg(x > y)$
נוכיח $x > y$
$\neg(x > y)$