אלגברה ליניארית 1 - הרצאה 5

הערה

סיכום קצר

- **הנושא המרכזי:**
- **הרעיון המרכזי / מה לקחת מההרצאה:**

1. מושגים והגדרות מרכזיים

חשוב

הגדרות ותכונות נשמרות

2. סיכום ההרצאה

נושא 1

הערה

הערות והסברים

$M+n$.

③ קבוצה שיש לה k איברים מקיימת

② $M+n$ שייכת ל Λ

① $M+n \in \Lambda$ אז M.


אזי, $\Lambda \neq \emptyset$ תת קבוצה של $\mathbb{N}$ נקראת אינדוקטיבית אם לכל $n \in \Lambda$ מתקיים $n+1 \in \Lambda$.


הגדרה: יהי $\Lambda \neq \emptyset$ תת קבוצה של $\mathbb{N}$. נגדיר

$$\Lambda+1 := \left\{ m+n \;\middle|\; \begin{array}{l} m \in \mathbb{N} \\ n \in \Lambda \end{array} \right\}$$

לדוגמה:

משפט: יהי $\Lambda \neq \emptyset$ תת קבוצה של $\mathbb{N}$. אזי $\Lambda \supseteq \mathbb{N}$ אם"ם Λ אינדוקטיבית.


הוכחה: יהי V מ"ו מעל שדה F ויהיו U, W ⊆ V תת
1 ⊆ נוכיח U+W ⊆ U : כי U ⊆ U+W .
U+W ⊆ W נוכיח ⊆ : כי W ⊆ U+W .
U+W ⊆ V נוכיח ⊆ : כי U+W ⊆ V .
2 נוכיח U+W ⊆ U∩W : אין U+W ∈ U∩W
I נוכיח U+W ⊆ C : אין U+W ∈ C
C + C = C



צירופים ליניאריים והמרחב הנפרש

הגדרה: יהי $\mathbf{V}$ מ"ו מעל שדה $\mathbb{F}$. ותהי $\mathbf{S} \subseteq \mathbf{V}$ ת"ק

ויהי $v \in \mathbf{V}$ הוא צ"ל של $\mathbf{S}$ אם קיימים $\vec{s_1}, \dots, \vec{s_n} \in \mathbf{S}$ כך ש-


$$\begin{aligned} \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F} \\ v = \alpha_1 \vec{s_1} + \dots + \alpha_n \vec{s_n} \end{aligned}$$

הגדרה: יהי $\mathbf{V}$ מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, ותהי $\mathbf{S} \subseteq \mathbf{V}$

נגדיר את $\underbrace{sp(\mathbf{S})}_{span(\mathbf{S})}$ (המרחב הנפרש ע"י $\mathbf{S}$) :

אם $sp(\mathbf{S}) = \emptyset$ נגדיר $sp(\mathbf{S}) := \{\emptyset\}$

אם $\mathbf{S} \neq \emptyset$ אז : $$sp(\mathbf{S}) := \left\{ \alpha_1 s_1 + \dots + \alpha_n + s_n \middle| \begin{array}{c} n \in \mathbb{N} \\ s_1, \dots, s_{n \in \mathbf{S}} \\ \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F} \end{array} \right\}$$



דוגמה:

$$1+2x \in sp\left\{1+x+x^2, 1+x, 2x^2\right\} \mathbf{V}=\mathbb{R}_2\left[x\right]$$

פתרון: נסדוק האם קיימים $\alpha,\beta,\gamma\in\mathbb{R}$ כך ש-

$$\alpha(1+x+x^2)+\beta(1+x)+\gamma(2x^2)=1+2x$$
$$(\alpha+\beta)+(\alpha+\beta)x+(\alpha+2\gamma)x^2=1+2x$$

השוואת מקדמים $\left\{\begin{array}{l}\alpha+\beta=1\\\alpha+\beta=2\\\alpha+2\gamma=0\end{array}\right\}$

יש סתירה על $\left\{\begin{array}{l}\alpha+\beta=1\\\alpha+\beta=2\end{array}\right\}$

ולכן $1+2x\notin sp(\mathrm{S})$

טענה: יהי $\mathbf{V}$ מ"ו מעל $\mathbb{F}$ ותהי $\mathrm{S}\subseteq\mathbf{V}$

אזי (1) $\mathrm{S}\subseteq sp(\mathrm{S})$

ו (2) $sp(\mathrm{S})$ תת מרחב של S

ו (3) לכל תת מרחב $\boldsymbol{k}\subseteq\mathbf{V}$ מתקיים:

$$sp(\mathrm{S})\subseteq K \impliedby \mathrm{S}\subseteq K$$

הוכחה: יהי $\mathbf{V}$ מ"ו מעל $\mathbb{F}$. ותהי $\mathrm{S}\subseteq\mathbf{V}$

(1) נוכיח $\mathrm{S}\subseteq sp\mathrm{S}$: יהי $v\in\mathrm{S}$

$$v=1\cdot v\in sp(\mathrm{S})$$
ולכן $\mathrm{S}\subseteq sp(\mathrm{S})$

(2)

נחלק למקרים:

כאשר $\mathrm{S}=\emptyset$ אזי לפי הגדרה $sp(\mathrm{S})=\{\emptyset\}$ וזה אכן ת"מ

כאשר $\mathrm{S}\neq\emptyset$ נוכיח $sp(\mathrm{S})$ ת"מ לפי קריטריון המקוצר:

1. נראה $0\in sp(\mathrm{S})$: S לא ריקה ולכן קיים לפחות איבר אחד, נבחר אחד כזה באופן שרירותי. נסמן $\vec{s}$

$$\vec{0}=\underbrace{0}_{\mathbb{F}}\cdot\underbrace{\vec{s}}_{\mathrm{S}}\in sp\mathrm{S}$$

2. יהי $v,u\in sp(\mathrm{S})$ ויהי $\alpha\in\mathbb{F}$.

$v \in sp(\mathrm{S})$ ולכן $s_1, \dots s_n \in \mathrm{S}$ קיימים $\alpha_1, \dots \alpha_n \in \mathbb{F}$ כך ש

$$v = \alpha_1 s_1 + \cdots + \alpha_n s_n$$

$u \in sp(\mathrm{S})$ ולכן $\tilde{s_1}, \dots \tilde{s_k} \in \mathrm{S}$ קיימים $\beta_1, \dots \beta_k \in \mathbb{F}$ כך ש

$$v = \beta_1 \tilde{s_1} + \cdots + \beta_k \tilde{s_k}$$

כעת

$$v + \alpha u = (\alpha_1 s_1 + \cdots + \alpha_n s_n) + \alpha(\beta_1 \tilde{s_1} + \cdots + \beta_k \tilde{s_k})$$

$$= \underbrace{\alpha_1}_{\in \mathbb{F}} \underbrace{s_1}_{\in \mathrm{S}} + \cdots + \underbrace{\alpha_n}_{\in \mathbb{F}} \underbrace{s_n}_{\in \mathrm{S}} + \cdots + \underbrace{\beta_1}_{\in \mathbb{F}} \underbrace{\tilde{s_1}}_{\in \mathrm{S}} + \cdots + \underbrace{\beta_n}_{\in \mathbb{F}} \underbrace{\tilde{s_n}}_{\in \mathrm{S}}$$

ולכן לפי ה $v + \alpha u \in sp(\mathrm{S})$: $sp.$

סה"כ $sp(\mathrm{S})$ ת"מ של V

מסקנה

יהי V מעל $\mathbb{F}$ ותהי $\mathrm{S} \subseteq \mathrm{V}$ אזי

$$sp(\mathrm{S}) = \mathrm{S} \iff \mathrm{S} \quad \text{ת"מ}$$

טענה: יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$ ותהיינה $A, B \subseteq \mathrm{V}$

אזי

$$spA \subseteq spB \impliedby A \subseteq B$$

הוכחה: יהי $\mathbf{V}$ מ"ו מעל $\mathbb{F}$ ותהיינה $A, B \subseteq \mathbf{V}$ כך ש $A \subseteq B$

