

Pb1

1. Use Gaussian elimination and pivoting technique to solve

$$1.19x_1 + 2.11x_2 - 100x_3 + x_4 = 1.12$$

$$14.2x_1 - 0.112x_2 + 12.2x_3 - x_4 = 3.44$$

$$100x_2 - 99.9x_3 + x_4 = 2.15$$

$$15.3x_1 + 0.110x_2 - 13.1x_3 - x_4 = 4.16$$

$$\begin{aligned} x_1 &= 0.176776 \\ x_2 &= 0.012692 \\ x_3 &= -0.020661 \\ x_4 &= -1.183264 \end{aligned}$$

Pb2

2. Find the inverse of the matrix A where

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} A \text{ inverse} &= \\ &= \begin{bmatrix} 0.279693 & -0.08046 & 0.038314 & -0.015326 \\ -0.08046 & 0.37931 & 0.057471 & -0.022989 \\ 0.038314 & 0.057471 & 0.210728 & -0.084291 \\ -0.015326 & -0.022989 & -0.084291 & 0.233716 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Pb3

3. Use Crout factorization for a tri-diagonal system to solve the problem

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

```
x1 = 1.436364  
x2 = 2.309091  
x3 = 2.490909  
x4 = 1.163636
```