

Unpolarized: C_{ep} two-angle scans at characteristic kinematics
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 0.5\,\mathrm{GeV}$, max C_{ep}=0.000
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 1\,\mathrm{GeV}$, max C_{ep}=0.000
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 1.8\,\mathrm{GeV}$, max C_{ep}=0.000
ϕ'_γ
$\phi_{P,\mathrm{in}}$
$\phi_{P,\mathrm{in}}$
$\phi_{P,\mathrm{in}}$
C_{ep}
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0



Unpolarized: $C_{e\gamma}$ two-angle scans at characteristic kinematics
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 0.5\,\mathrm{GeV}$, max $C_{e\gamma}$=0.000
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 1\,\mathrm{GeV}$, max $C_{e\gamma}$=0.000
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 1.8\,\mathrm{GeV}$, max $C_{e\gamma}$=0.000
ϕ'_γ
$\phi_{P,\mathrm{in}}$
$C_{e\gamma}$
0 1 2 3 4 5 6
0 2 4 6
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0



Unpolarized: $C_{p\gamma}$ two-angle scans at characteristic kinematics
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\rm in} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 0.5\,\mathrm{GeV}$, max $C_{p\gamma}$=0.992
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\rm in} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 1\,\mathrm{GeV}$, max $C_{p\gamma}$=0.987
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\rm in} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 1.8\,\mathrm{GeV}$, max $C_{p\gamma}$=0.990
ϕ'_γ
$\phi_{P,\rm in}$
$C_{p\gamma}$
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Unpolarized: $C_{e|p\gamma}$ two-angle scans at characteristic kinematics
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 0.5\,\mathrm{GeV}$, max $C_{e|p\gamma}$=0.000
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 1\,\mathrm{GeV}$, max $C_{e|p\gamma}$=0.000
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 1.8\,\mathrm{GeV}$, max $C_{e|p\gamma}$=0.000
ϕ'_γ
$\phi_{P,\mathrm{in}}$
$C_{e|p\gamma}$
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0



Unpolarized: $C_{p|e\gamma}$ two-angle scans at characteristic kinematics
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 0.5\,\mathrm{GeV}$, max $C_{p|e\gamma}$=0.992
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 1\,\mathrm{GeV}$, max $C_{p|e\gamma}$=0.987
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 1.8\,\mathrm{GeV}$, max $C_{p|e\gamma}$=0.990
ϕ'_γ
$\phi_{P,\mathrm{in}}$
$\phi_{P,\mathrm{in}}$
$\phi_{P,\mathrm{in}}$
$C_{p|e\gamma}$
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0



Unpolarized: $C_{\gamma|ep}$ two-angle scans at characteristic kinematics
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 0.5\,\mathrm{GeV}$, max $C_{\gamma|ep}$=0.992
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 1\,\mathrm{GeV}$, max $C_{\gamma|ep}$=0.987
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 1.8\,\mathrm{GeV}$, max $C_{\gamma|ep}$=0.990
ϕ'_γ
0
1
2
3
4
5
6
$\phi_{P,\mathrm{in}}$
$C_{\gamma|ep}$
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Unpolarized: M_e two-angle scans at characteristic kinematics
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\rm in} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 0.5\,\mathrm{GeV}$, max M_e=0.000
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\rm in} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 1\,\mathrm{GeV}$, max M_e=0.000
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\rm in} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 1.8\,\mathrm{GeV}$, max M_e=0.000
ϕ'_γ
0
1
2
3
4
5
6
0
2
4
6
$\phi_{P,\rm in}$
$\phi_{P,\rm in}$
$\phi_{P,\rm in}$
M_e
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0



Unpolarized: M_p two-angle scans at characteristic kinematics
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\rm in} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 0.5\,\mathrm{GeV}$, max M_p=0.000
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\rm in} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 1\,\mathrm{GeV}$, max M_p=0.000
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\rm in} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 1.8\,\mathrm{GeV}$, max M_p=0.000
ϕ'_γ
$\phi_{P,\,\rm in}$
M_p
0
1
2
3
4
5
6
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0



Unpolarized: M_γ two-angle scans at characteristic kinematics
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 0.5\,\mathrm{GeV}$, max M_γ=0.000
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 1\,\mathrm{GeV}$, max M_γ=0.000
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 1.8\,\mathrm{GeV}$, max M_γ=0.000
ϕ'_γ
$\phi_{P,\mathrm{in}}$
M_γ



Unpolarized: F_3 two-angle scans at characteristic kinematics
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 0.5\,\mathrm{GeV}$, max F_3=0.000
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 1\,\mathrm{GeV}$, max F_3=0.000
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 1.8\,\mathrm{GeV}$, max F_3=0.000
ϕ'_γ
$\phi_{P,\mathrm{in}}$
$\phi_{P,\mathrm{in}}$
$\phi_{P,\mathrm{in}}$
F_3
0
1
2
3
4
5
6
0
2
4
6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0