

low_Egamma L electron + Tx proton: max P_W regions
region 3 (L electron + Tx proton)
region 1 (L electron + Tx proton)
region 0 (L electron + Tx proton)
region 2 (L electron + Tx proton)
ϕ_γ [rad]
$\phi_{P,\mathrm{in}}$ [rad]
P_W
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

L electron + Tx proton characteristic max P_W configuration



w_purity_low_egamma_ltx_region_0 P_W=0.331768
region: low_Egamma_LTx_region_0
outgoing-state purity: 1
kinematic point: high_s_high_theta_in_low_Egamma
incoming state: $|L_e\rangle \otimes |T_{x,p}\rangle$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=1.96352
$\theta_{\rm in}$=1.57079, ϕ_ℓ=1.66897, ϕ_P=4.81056
E_γ=0.25, ϕ_γ=1.66897
Q^2=19.6484, x_B=0.994382, t=-17.4401, W^2=0.990843, y=0.957519
$\theta(\ell', \gamma)$=175.01 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:

ℓ	E= 2.2244	p_x= -0.2180	p_y= 2.2137	p_z= -0.0000
P	E= 2.4141	p_x= 0.2180	p_y= -2.2137	p_z= 0.0000
ℓ'	E= 2.2125	p_x= 0.0245	p_y= -2.2123	p_z= 0.0000
P'	E= 2.1761	p_x= 0.0000	p_y= 1.9635	p_z= 0.0000
q_γ	E= 0.2500	p_x= -0.0245	p_y= 0.2488	p_z= 0.0000





L electron + Tx proton characteristic max P_W configuration




```
w_purity_low_egamma_ltx_region_1  P_W=0.320094
region: low_Egamma_LTx_region_1
outgoing-state purity: 1
kinematic point: high_s_high_theta_in_low_Egamma
```

incoming state: $|L_e\rangle \otimes |T_{x,p}\rangle$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=2.0264
$\theta_{\rm in}$=1.57079, ϕ_ℓ=2.65072, ϕ_P=5.79231
E_γ=0.25, ϕ_γ=2.65072
Q^2=14.9516, x_B=0.959022, t=-13.2712, W^2=1.51871, y=0.755498
$\theta(\ell',\gamma)$=123.996 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= -1.9618 p_y= 1.0486 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= 1.9618 p_y= -1.0486 p_z= 0.0000
ℓ' E= 2.1556 p_x= 0.2205 p_y= -2.1442 p_z= 0.0000
P' E= 2.2330 p_x= 0.0000 p_y= 2.0264 p_z= 0.0000
q_γ E= 0.2500 p_x= -0.2205 p_y= 0.1178 p_z= 0.0000






L electron + Tx proton characteristic max P_W configuration
3D momenta
p_x [GeV]
p_y [GeV]
p_z [GeV]
w_purity_low_egamma_ltx_region_2 P_W=0.308113
region: low_Egamma_LTx_region_2
outgoing-state purity: 1
kinematic point: high_s_high_theta_in_low_Egamma
incoming state: $|L_e\rangle \otimes |T_{x,p}\rangle$
s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=2.00644
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=0.687223, ϕ_P=3.82882
E_γ=0.25, ϕ_γ=0.687223
Q^2=16.4452, x_B=0.972157, t=-14.5969, W^2=1.35084, y=0.819743
$\theta(\ell', \gamma)$=134.476 deg
four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= 1.7195 p_y= 1.4112 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= -1.7195 p_y= -1.4112 p_z= 0.0000
ℓ' E= 2.1736 p_x= -0.1933 p_y= -2.1650 p_z= 0.0000
P' E= 2.2149 p_x= 0.0000 p_y= 2.0064 p_z= 0.0000
q_γ E= 0.2500 p_x= 0.1933 p_y= 0.1586 p_z= 0.0000
Transverse plane
Leading initial-ensemble/final-state components (N=2, retained=99.4%)
h_e=-1, h_p=-1, h_γ=+1
electron L, proton Tx
phase=1.62, Re=-1.16e+00, Im=2.30e+01
h_e=-1, h_p=+1, h_γ=+1
electron L, proton Tx
phase=-2.09, Re=-2.91e+00, Im=-5.12e+00
ensemble-weighted final-state |A|^2 fraction

L electron + Tx proton characteristic max P_W configuration