
mid_Egamma L proton: max $C_{e\gamma}$ regions
region 1 (L proton)
region 0 (L proton)
region 2 (L proton)
ϕ_γ [rad]
$\phi_{P,\mathrm{in}}$ [rad]
$C_{e\gamma}$
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

L proton characteristic max $C_{e\gamma}$ configuration



c_e_gamma_mid_egamma_l_proton_region_0 C_{e\gamma}=0.000889349
region: mid_Egamma_L_proton_region_0 final-pair delta_xy=0.178039 rad
outgoing-state purity: 0.99974
kinematic point: high_s_high_theta_in_mid_Egamma
incoming state: $\frac{1}{2}\sum_{h_e}\rho(h_e, L_p)$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=2.21987
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=1.66897, ϕ_P=4.81056
E_γ=1, ϕ_γ=4.61421
Q^2=10.9308, x_B=0.541961, t=-19.7041, W^2=10.118, y=0.977369
$\theta(\ell', \gamma)$=10.2009 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= -0.2180 p_y= 2.2137 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= 0.2180 p_y= -2.2137 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.2286 p_x= 0.0980 p_y= -1.2247 p_z= 0.0000
P' E= 2.4099 p_x= 0.0000 p_y= 2.2199 p_z= 0.0000
q_γ E= 1.0000 p_x= -0.0980 p_y= -0.9952 p_z= 0.0000





L proton characteristic max $C_{e\gamma}$ configuration



c_e_gamma_mid_egamma_l_proton_region_1 C_{e\gamma}=0.000660521
region: mid_Egamma_L_proton_region_1 final-pair delta_xy=0.178039 rad
outgoing-state purity: 0.805001
kinematic point: high_s_high_theta_in_mid_Egamma
incoming state: $\frac{1}{2}\sum_{h_e}\rho(h_e, L_p)$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=2.21987
$\theta_{\rm in}$=1.57079, ϕ_ℓ=0.294524, ϕ_P=3.43612
E_γ=1, ϕ_γ=4.81056
Q^2=7.46474, x_B=0.446912, t=-12.7427, W^2=10.118, y=0.809408
$\theta(\ell', \gamma)$=10.2009 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= 2.1286 p_y= 0.6457 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= -2.1286 p_y= -0.6457 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.2286 p_x= -0.0980 p_y= -1.2247 p_z= 0.0000
P' E= 2.4099 p_x= 0.0000 p_y= 2.2199 p_z= 0.0000
q_γ E= 1.0000 p_x= 0.0980 p_y= -0.9952 p_z= 0.0000







L proton characteristic max $C_{e\gamma}$ configuration
3D momenta
P'
ℓ
P
q_γ
ℓ'
p_x [GeV]
p_y [GeV]
p_z [GeV]
c_e_gamma_mid_egamma_l_proton_region_2 C_{e\gamma}=0.00055819
region: mid_Egamma_L_proton_region_2 final-pair delta_xy=0.178039 rad
outgoing-state purity: 0.728316
kinematic point: high_s_high_theta_in_mid_Egamma
incoming state: $\frac{1}{2}\sum_{h_e}\rho(h_e, L_p)$
s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=2.21987
$\theta_{\rm in}$=1.57079, ϕ_ℓ=3.04342, ϕ_P=6.18501
E_γ=1, ϕ_γ=4.61421
Q^2=6.43386, x_B=0.410531, t=-10.8439, W^2=10.118, y=0.759452
$\theta(\ell', \gamma)$=10.2009 deg
four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= -2.2137 p_y= 0.2180 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= 2.2137 p_y= -0.2180 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.2286 p_x= 0.0980 p_y= -1.2247 p_z= 0.0000
P' E= 2.4099 p_x= 0.0000 p_y= 2.2199 p_z= 0.0000
q_γ E= 1.0000 p_x= -0.0980 p_y= -0.9952 p_z= 0.0000
Transverse plane
p_x [GeV]
p_y [GeV]
Leading initial-ensemble/final-state components (N=6, retained=98.0%)
h_e=+1, h_p=+1, h_γ=+1 electron h=+1, proton L
phase=3.00, Re=-3.57e-01, Im=4.96e-02
h_e=+1, h_p=+1, h_γ=-1 electron h=+1, proton L
phase=-0.14, Re=1.97e-01, Im=-2.74e-02
h_e=-1, h_p=+1, h_γ=-1 electron h=-1, proton L
phase=1.61, Re=-5.65e-03, Im=1.41e-01
h_e=+1, h_p=-1, h_γ=+1 electron h=+1, proton L
phase=-0.14, Re=8.59e-02, Im=-1.19e-02
h_e=-1, h_p=-1, h_γ=-1 electron h=-1, proton L
phase=-1.53, Re=3.46e-03, Im=-8.66e-02
h_e=-1, h_p=+1, h_γ=+1 electron h=-1, proton L
phase=-1.53, Re=2.81e-03, Im=-7.04e-02
ensemble-weighted final-state |A|^2 fraction