

Unpolarized: $C_{\ell p}$ two-angle scans at characteristic kinematics
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\rm in} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 0.25\,\mathrm{GeV}$, max $C_{\ell p}$=0.016
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\rm in} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 1\,\mathrm{GeV}$, max $C_{\ell p}$=0.015
ϕ'_γ
$\phi_{P,\rm in}$
$\phi_{P,\rm in}$
$C_{\ell p}$
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0



Unpolarized: $C_{\ell\gamma}$ two-angle scans at characteristic kinematics
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 0.25\,\mathrm{GeV}$, max $C_{\ell\gamma}$=0.000
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 1\,\mathrm{GeV}$, max $C_{\ell\gamma}$=0.000
ϕ'_γ
$\phi_{P,\mathrm{in}}$
$\phi_{P,\mathrm{in}}$
$C_{\ell\gamma}$
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0



Unpolarized: $C_{p\gamma}$ two-angle scans at characteristic kinematics
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 0.25\,\mathrm{GeV}$, max $C_{p\gamma}$=0.000
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 1\,\mathrm{GeV}$, max $C_{p\gamma}$=0.000
ϕ'_γ
$\phi_{P,\mathrm{in}}$
$\phi_{P,\mathrm{in}}$
$C_{p\gamma}$
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Unpolarized: $C_{\ell|p\gamma}$ two-angle scans at characteristic kinematics
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 0.25\,\mathrm{GeV}$, max $C_{\ell|p\gamma}$=0.000
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 1\,\mathrm{GeV}$, max $C_{\ell|p\gamma}$=0.000
ϕ'_γ
$\phi_{P,\mathrm{in}}$
$\phi_{P,\mathrm{in}}$
$C_{\ell|p\gamma}$
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Unpolarized: $C_{p|\ell\gamma}$ two-angle scans at characteristic kinematics
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 0.25\,\mathrm{GeV}$, max $C_{p|\ell\gamma}$=0.000
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 1\,\mathrm{GeV}$, max $C_{p|\ell\gamma}$=0.000
ϕ'_γ
$\phi_{P,\mathrm{in}}$
$\phi_{P,\mathrm{in}}$
$C_{p|\ell\gamma}$
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0



Unpolarized: $C_{\gamma|\ell p}$ two-angle scans at characteristic kinematics
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 0.25\,\mathrm{GeV}$, max $C_{\gamma|\ell p}$=0.000
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 1\,\mathrm{GeV}$, max $C_{\gamma|\ell p}$=0.000
ϕ'_γ
$\phi_{P,\mathrm{in}}$
$\phi_{P,\mathrm{in}}$
$C_{\gamma|\ell p}$

Unpolarized: M_ℓ two-angle scans at characteristic kinematics




Unpolarized: M_p two-angle scans at characteristic kinematics
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 0.25\,\mathrm{GeV}$, max M_p=-0.000
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 1\,\mathrm{GeV}$, max M_p=-0.000
ϕ'_γ
$\phi_{P,\mathrm{in}}$
$\phi_{P,\mathrm{in}}$
M_p
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0



Unpolarized: M_γ two-angle scans at characteristic kinematics
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 0.25\,\mathrm{GeV}$, max M_γ=-0.000
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 1\,\mathrm{GeV}$, max M_γ=-0.000
ϕ'_γ
$\phi_{P,\mathrm{in}}$
$\phi_{P,\mathrm{in}}$
M_γ



Unpolarized: F_3 two-angle scans at characteristic kinematics
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 0.25\,\mathrm{GeV}$, max F_3=0.000
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 1\,\mathrm{GeV}$, max F_3=0.000
ϕ'_γ
$\phi_{P,\mathrm{in}}$
$\phi_{P,\mathrm{in}}$
F_3
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Unpolarized: $P_{\mathrm{GHZ}+}$ two-angle scans at characteristic kinematics
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 0.25\,\mathrm{GeV}$, max $P_{\mathrm{GHZ}+}$=0.280
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 1\,\mathrm{GeV}$, max $P_{\mathrm{GHZ}+}$=0.394
ϕ'_γ
$\phi_{P,\mathrm{in}}$
$\phi_{P,\mathrm{in}}$
$P_{\mathrm{GHZ}+}$
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0



Unpolarized: P_W two-angle scans at characteristic kinematics
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 0.25\,\mathrm{GeV}$, max P_W=0.240
$s = 21.5\,\mathrm{GeV}^2$, $\theta_{\mathrm{in}} = 1.57\,\mathrm{rad}$
$E_\gamma = 1\,\mathrm{GeV}$, max P_W=0.226
ϕ'_γ
$\phi_{P,\mathrm{in}}$
$\phi_{P,\mathrm{in}}$
P_W
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0