
high_Egamma TxTx: max $C_{p\gamma}$ regions
ϕ_γ [rad]
$\phi_{P,\mathrm{in}}$ [rad]
$C_{p\gamma}$
region 0 (TxTx)
region 1 (TxTx)
region 2 (TxTx)
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


TxTx characteristic max $C_{p\gamma}$ configuration
3D momenta
p_x [GeV]
p_y [GeV]
p_z [GeV]
P
q_γ
P'
ℓ'
c_p_gamma_high_egamma_txtx_region_0 C_{p\gamma}=0.987346
region: high_Egamma_TxTx_region_0 final-pair delta_xy=0 rad
kinematic point: high_s_high_theta_in_high_Egamma
incoming state: $|T_{x,e}T_{x,p}\rangle$
s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=0.0956529
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=4.71239, ϕ_P=1.5708
E_γ=1.8, ϕ_γ=1.5708
Q^2=7.42301e-12, x_B=2.4338e-12, t=-2.36711, W^2=3.92981, y=0.147798
$\theta(\ell',\gamma)$=180 deg
four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= -0.0000 p_y= -2.2244 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= 0.0000 p_y= 2.2244 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.8957 p_x= -0.0000 p_y= -1.8957 p_z= 0.0000
P' E= 0.9429 p_x= 0.0000 p_y= 0.0957 p_z= 0.0000
q_γ E= 1.8000 p_x= 0.0000 p_y= 1.8000 p_z= 0.0000
Transverse plane
p_x [GeV]
p_y [GeV]
ℓ
Leading initial-ensemble/final-state components (N=4, retained=100.0%)
h_e=-1, h_p=+1, h_γ=-1 electron Tx, proton Tx
phase=-1.57, Re=1.82e-09, Im=-1.62e-01
h_e=+1, h_p=-1, h_γ=+1 electron Tx, proton Tx
phase=-1.57, Re=1.82e-09, Im=-1.62e-01
h_e=-1, h_p=-1, h_γ=+1 electron Tx, proton Tx
phase=-1.57, Re=-1.04e-08, Im=-1.38e-01
h_e=+1, h_p=+1, h_γ=-1 electron Tx, proton Tx
phase=-1.57, Re=-1.04e-08, Im=-1.38e-01
ensemble-weighted final-state |A|^2 fraction


TxTx characteristic max $C_{p\gamma}$ configuration
3D momenta
p_x [GeV]
p_y [GeV]
p_z [GeV]
c_p_gamma_high_egamma_txtx_region_1 C_{p\gamma}=0.986578
region: high_Egamma_TxTx_region_1 final-pair delta_xy=0.981748 rad
kinematic point: high_s_high_theta_in_high_Egamma
incoming state: $|T_{x,e}T_{x,p}\rangle$
s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=0.151482
$\theta_{\rm in}$=1.57079, ϕ_ℓ=3.82882, ϕ_P=0.687223
E_γ=1.8, ϕ_γ=0.589049
Q^2=0.00414797, x_B=0.00132874, t=-2.40031, W^2=3.99742, y=0.151276
$\theta(\ell',\gamma)$=176.176 deg
four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= -1.7195 p_y= -1.4112 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= 1.7195 p_y= 1.4112 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.8884 p_x= -1.4966 p_y= -1.1515 p_z= 0.0000
P' E= 0.9502 p_x= 0.0000 p_y= 0.1515 p_z= 0.0000
q_γ E= 1.8000 p_x= 1.4966 p_y= 1.0000 p_z= 0.0000
Transverse plane
p_x [GeV]
p_y [GeV]
Leading initial-ensemble/final-state components (N=8, retained=100.0%)
h_e=+1, h_p=-1, h_γ=+1 electron Tx, proton Tx — phase=-1.99, Re=-5.58e-02, Im=-1.25e-01
h_e=-1, h_p=+1, h_γ=-1 electron Tx, proton Tx — phase=-1.14, Re=5.67e-02, Im=-1.23e-01
h_e=-1, h_p=-1, h_γ=+1 electron Tx, proton Tx — phase=-2.02, Re=-5.06e-02, Im=-1.05e-01
h_e=+1, h_p=+1, h_γ=-1 electron Tx, proton Tx — phase=-1.11, Re=5.16e-02, Im=-1.03e-01
h_e=+1, h_p=+1, h_γ=+1 electron Tx, proton Tx — phase=1.16, Re=3.25e-02, Im=7.42e-02
h_e=-1, h_p=-1, h_γ=-1 electron Tx, proton Tx — phase=-1.13, Re=3.37e-02, Im=-7.17e-02
h_e=-1, h_p=+1, h_γ=+1 electron Tx, proton Tx — phase=1.13, Re=2.94e-02, Im=6.19e-02
h_e=+1, h_p=-1, h_γ=-1 electron Tx, proton Tx — phase=-1.10, Re=3.04e-02, Im=-5.97e-02
ensemble-weighted final-state |A|^2 fraction


TxTx characteristic max $C_{p\gamma}$ configuration
3D momenta
p_x [GeV]
p_y [GeV]
p_z [GeV]
c_p_gamma_high_egamma_txtx_region_2 C_{p\gamma}=0.986578
region: high_Egamma_TxTx_region_2 final-pair delta_xy=0.981748 rad
kinematic point: high_s_high_theta_in_high_Egamma
incoming state: $|T_{x,e}T_{x,p}\rangle$
s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=0.151482
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=5.59596, ϕ_P=2.45437
E_γ=1.8, ϕ_γ=2.55254
Q^2=0.00414797, x_B=0.00132874, t=-2.40031, W^2=3.99742, y=0.151276
$\theta(\ell',\gamma)$=176.176 deg
four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= 1.7195 p_y= -1.4112 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= -1.7195 p_y= 1.4112 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.8884 p_x= 1.4966 p_y= -1.1515 p_z= 0.0000
P' E= 0.9502 p_x= 0.0000 p_y= 0.1515 p_z= 0.0000
q_γ E= 1.8000 p_x= -1.4966 p_y= 1.0000 p_z= 0.0000
Transverse plane
Leading initial-ensemble/final-state components (N=8, retained=100.0%)
h_e=-1, h_p=+1, h_γ=-1 electron Tx, proton Tx — phase=-1.99, Re=-5.58e-02, Im=-1.25e-01
h_e=+1, h_p=-1, h_γ=+1 electron Tx, proton Tx — phase=-1.14, Re=5.67e-02, Im=-1.23e-01
h_e=+1, h_p=+1, h_γ=-1 electron Tx, proton Tx — phase=-2.02, Re=-5.06e-02, Im=-1.05e-01
h_e=-1, h_p=-1, h_γ=+1 electron Tx, proton Tx — phase=-1.11, Re=5.16e-02, Im=-1.03e-01
h_e=-1, h_p=-1, h_γ=-1 electron Tx, proton Tx — phase=1.16, Re=3.25e-02, Im=7.42e-02
h_e=+1, h_p=+1, h_γ=+1 electron Tx, proton Tx — phase=-1.13, Re=3.37e-02, Im=-7.17e-02
h_e=+1, h_p=-1, h_γ=-1 electron Tx, proton Tx — phase=1.13, Re=2.94e-02, Im=6.19e-02
h_e=-1, h_p=+1, h_γ=+1 electron Tx, proton Tx — phase=-1.10, Re=3.04e-02, Im=-5.97e-02
ensemble-weighted final-state |A|^2 fraction