

A
MGH259, oligodendroglioma G3
cohort 1
IDHA17, astrocytoma G2
cohort 2
C1b (z)
2
1
0
-1
-2
Gi* (FDR<0.05)
Hotspot
Coldspot
B
Mac
Reactive-Ast
Vasc
MES
Inflammatory-Mac
Oligo
MES-Hyp
MES-Ast
chromatin-reg
AC
OPC
Prolif-Metab
Neuron
NPC
Cohort 1
Cohort 2
Specific co-loc. - avoidance
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
Fraction of sections
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
C
Cohort 1 (GSE237183)
Cohort 2 (Hoefflin)
q < 0.05
n.s.
Endothelium
Pericytes
C1Q+ TAM
Microglia-like TAM
SPP1+/lipid TAM
Classical monocyte (FCN1/VCAN/S100A8/9)
-2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Enrichment inside C1b hotspots
(Stouffer z; MSR null, depth-adjusted)
D
Endothelium
Pericytes
C1Q+ TAM
Target score (z, mean ± SE)
0.75
0.50
0.25
0.00
0
1
2
3
4
5
≥6
Distance to nearest C1b hotspot (spots; 0 = inside)