

Chap 10 - 4

Gauss 公式



10.4.1. Gauss 公式

设函数 $P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z)$ 在空间有界闭区域 Ω 上有连续偏导数, Ω 的边界是分片光滑的闭曲面, 则有公式

$$\oiint_{S^+} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV$$

(三重积分与在其边界上的第二型曲面积分的关系)

证明的思路

类似 **Green** 公式的证明

$$\text{先证 } \iint_{S^+} R dx dy = \iiint_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dV$$


1) 考虑 Ω 是 xy 型区域

$$\Omega = \{(x, y, z) | z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y), (x, y) \in D\}$$

2) 再考虑 Ω 是一般区域

将 Ω 分割成几个正规区域应用 1) 的结论

同理证关于 P, Q 的等式





高斯

Guass. Carl

Friedrich

(1777 – 1855)



- 数学神童，聪颖过人
- 尺规作正十七边
- 博士论文：代数基本定理
- 涉猎广泛，成果丰硕 — 数学：分析、数论、复变函数代数、非欧几何、统计数学等，以其名定义的数学名词多达数十个；天文学、物理
- 献身科学 精益求精 追求完美



“宁可发表少些，但要的是成熟的成果”

“假如别人和我一样专心和持久的思考数学真理，他也会作出同样的发现。”

➤ 最伟大的数学家

如果我们把十八世纪数学家想象成为一系列高山峻岭，那么最后一座使人肃然起敬的峰巅就是高斯

能从九霄云外的高度按照某种观点掌握浩瀚星空和深奥数学的天才



在邮票、
钱币上的
数学家



例 计算曲面积分

$$I = \iint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy$$

其中 S 是椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的外侧

例 计算 $I = \iint_S x dy dz + 2xy dz dx - 2z dx dy$

其中 S 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $(0 \leq z \leq h)$ 的下侧

(需要加一块曲面使之成为封闭曲面)



例 计算

$$\iint_S \frac{x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma}{x^2 + y^2 + z^2} dS$$

其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 是其外法向量的方向余弦

H.W 习题 10

29 (2) (4) (6) (7)



由于

$$\iint_{S^+} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}^0 dS$$

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} dV$$

得到 **Guass** 公式的向量形式

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}^0 dS = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} dV$$

dS

(与 Green 公式
形式完全一致)



10. 4. 2. 通量与散度

若给定向量场 $F = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$

那么称曲面积分

$$\Phi = \iint_S F \cdot n^0 dS$$

为向量函数 F 的通过定侧曲面 S 的**通量**

而称

$$\operatorname{div} F \stackrel{\text{def}}{=} \nabla \cdot F = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

称为向量函数 F 的**散度**



例 设向量 $F = (x^2 y, y^2 z, z^2 x)$, 求散度

$$\left. \operatorname{div} F \right|_{(2,1,-2)}$$

H.W

习题 10

31 (2) 32 (2) (4)



10.4.3 Stokes 公式 *

设双侧曲面 S 的边界为空间闭曲线 C^+ ,

正方向与 C^+ 的 S 的正侧成右手系

设 S 是分片光滑的双侧曲面, 闭曲线 C^+ 是其

边界, 向量值函数 $F = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$

在包含 S 的空间区域内有连续偏导数, 则

$$\oint_{C^+} Pdx + Qdy + Rdz \\ = \iint_{S^+} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$



借助行列式，公式可记为

$$\oint_{C^+} Pdx + Qdy + Rdz = \iint_{S^+} \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

例 计 $\oint_C zdx + xdy + ydz$ ，其中 C 是平面
算 $2x + 3y + z = 6$ 被三个坐标平面所截的三角形 S
的
边界，其正向与 S 上侧成右手系



例 计算

$$I = \int_C (y - z)dx + (z - x)dy + (x - y)dz$$

曲线 C 为 $\begin{cases} x^2 + y^2 = R^2 \\ x + z = R \end{cases}$, 积分方向从 x 轴的正向

看沿逆时针

H.W 习题 10

34 (2) (3)



10.4.4 旋度

对向量场 $F=(P, Q, R)$, 定义

$$\operatorname{rot} F = \nabla \times F = \left(\begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ Q & R \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial z} & \frac{\partial}{\partial x} \\ R & P \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ P & Q \end{vmatrix} \right)$$

为函数 F 的旋度

若 L 为 F 定义区域内的定向曲线, 则称

$$\int_L F \cdot d\mathbf{r} = \int_L Pdx + Qdy + Rdz$$

为 F 沿 L 的环量



例 求向量场 $F = \{xy, yz, -y^2\}$ 在点 $(1, -1, 3)$

的旋度

➤ Stokes 公式的向量形式

若记 $\mathbf{r} = (x, y, z)$, 那么 $d\mathbf{r} = (dx, dy, dz)$, 这样

Stokes 公式可以写成形式

$$\oint_{C^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{S^+} \text{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}^0 dS$$



H.W

习题 10

36 (1)

37 (2) (3)