

这门课首要的是教我们学  
会如何思考

---

G· polya

# Chap 1

---

函数

# Chap 1.1

---

## 实数集

## 1.1.1 集合

- 具有某种属性的事物的全体称为**集合**

$\uparrow$                        $\uparrow$   
 $a$  (**元素**)                       $A$

$a$  是  $A$  的元素:  $a \in A$  ;     $a$  不是  $A$  的元素:  $a \notin A$  ;

- 表示法:    1 ) 列举  
              2 ) 说明属性

$A = \{ x \mid \text{使 } x \text{ 属于 } A \text{ 的属性} \}$

- 集合的运算

并 ( **和** ) :  $A \cup B$  ( $A+B$ ) ;    交 ( **积** ) :  $A \cap B$  ( $AB$ )

差 :  $A \setminus B$

## 1.1.2 实数集

□ 实数集  $\mathbf{R}$ : 有理数集 ( $\mathbf{Q}$ ) + 无理数集

□ 有理数集的特性

1) 有序性

2) 对加减乘除运算的封闭性 (构成数域)

3) 稠密性

➤ 通过长度: 有理数  $\rightarrow$  数轴上的点;

有理数  $\leftarrow$  数轴上的点?  $(\sqrt{2})$

□ 实数集多具一个特性: 完备性 (或连续性)

实数  $\leftrightarrow$  数轴上的点 (一一对应)

➤ 在极限运算下依然是封闭的

### 1.1.3 区间

---

#### □ 有界区间

设  $a < b$ , 那么

开区间  $(a, b) = \{ x \mid a < x < b, x \in \mathbf{R} \}$

闭区间  $[a, b] = \{ x \mid a \leq x \leq b, x \in \mathbf{R} \}$

半开闭区间  $[a, b) = ?$ ,  $(a, b] = ?$

#### □ 无界区间

$(-\infty, b) = \{ x \mid x < b, x \in \mathbf{R} \}$

$(-\infty, +\infty) = ?$   $[a, +\infty) = ?$

一般区间表示： $I$ （大写英文字母）

---

## □ 邻域

若  $a \in \mathbf{R}$ ,  $\delta > 0$ , 则

$U(a, \delta) = (a - \delta, a + \delta)$  :  $a$  的  $\delta$  邻域

$\overset{\circ}{U}(a, \delta) = (a - \delta, a) \cup (a, a + \delta)$  :  $a$  的去心  $\delta$  邻域

## 1.1.4 一些符号

$\in$  : 属于;

$\notin$  : 不

$\forall$  : 属于任给、任意的;

$\exists$  : 存在

$\Rightarrow$ : 蕴含着, 必要条件;  $\Leftarrow$ : 源于, 充分条件

---

$\Leftrightarrow$ : 等价

$\stackrel{def}{=}$  定义为

$\max E$   $E$  中最大者;

$\min E$   $E$  中最小者

➤ 用逻辑符号表达某些数学语言较简洁

例如命题:

对任意一个实数  $a$ , 必定存在实数  $b$ , 使得  $b > a$

可以表为:

$$\forall a \in \mathbf{R}, \exists b \in \mathbf{R} : b > a$$



### 1.1.4 不等式

---

$$1) \quad |x - a| < \delta \iff a - \delta < x < a + \delta$$

$$2) \quad |x \pm y| \leq |x| + |y|, \quad |x - y| \geq ||x| - |y||$$

3) *A-G* 不等式

$x_1, x_2, \dots, x_n$  均非负数

$$\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}$$

4) *Bernoulli* 不等式

$x \geq 0$  , 且  $n$  为正整数, 则

$$(1 + x)^n \geq 1 + nx$$

例  $\sqrt[n]{a} - 1 \leq \frac{a - 1}{n} \quad (a > 1)$

## 1.1.6 实数集的界

- **上界** 设  $E$  为非空实数集,  $\exists M \in \mathbf{R}$ ,  
 $\forall x \in E: x \leq M$ , 称  $M$  是  $E$  的一个**上界**.(下  
界?)

$E$  既有上界又有下界称为**有界**的

➤ **有界等价表达:**  $\exists M > 0, \forall x \in E: |x| \leq M$

- **上确界** 最小上界 (怎样确切描述?)

$E$  为非空实数集,  $\exists \beta \in \mathbf{R}$ ,

(1)  $\forall x \in E: x \leq \beta$ ; (2)  $\forall \delta > 0, \exists x_\delta \in E: x_\delta > \beta - \delta$

称  $\beta$  为  $E$  的**上确界**. (下确界?)

## ➤ 确界存在性公理 集合有上界必有上确界

---

H.W

习题 1

2, 3 (1) (2), 4, ( 其中 (3) 题  $-n(3^n + (-3)^n)$  )

5 (1) (2), 6

补充题 1, 3 (选做)

# Chap 1.2

---

函数

## 1.2.1 概念与表示

### □ 什么是函数


简言之

函数是数集间的对应关系

设  $D$  是一个数集

$$\forall x \in D, x \xrightarrow{f} y \in R$$

记为  $y = f(x), x \in D;$  或  $f: D \rightarrow R$



函数在  $D$  上  $x_0$  的对应的  $f(x_0)$  称为函数在  $x_0$  的**值**

---

有时记为  $f|_{x_0}$

□ 自变量的字母是可以改变的符号

$$y = f(\Delta), \quad \Delta \in X$$

□ 函数的表示: 只要给出两个要素

1 ) 定义域    2 ) 对应关系

可以用解析式, 也可以用图表等方式

## ➤ 解析式有时分段表示

例 随飞机托运行李（千克）与价格（元）的关系

$$p = \begin{cases} 0 & 0 \leq m \leq 20 \\ 12(m - 20) & 20 < m \leq 200 \end{cases}$$

例 Dirichlet 函数

$$D(x) = \begin{cases} 1 & x \text{ 为有理数} \\ 0 & x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

- Dirichlet，现代函数概念的定义人  
解析数论的奠基者。

（从证明费马大定理  $n=5$  情况开始，贡献颇多）



## 1.2.2 函数特性

### □ 奇偶性

➤ 如何确定函数的奇偶性？

例 指出下列函数奇偶性

$$1) f(x) = x + \tan x \quad 2) f(x) = x \sin^3 x$$

$$3) f(x) = \frac{\cos x}{x} \quad 4) f(x) = \frac{2^x - 1}{2^x + 1}$$

### □ 有界性

➤ 有界联系区间

➤ 如何叙述“无界”



## □ 单调性

---

- 区别单调与严格单调
- 单调联系区间

## □ 周期性

- 周期不唯一，通常指最小正周期
- 若  $f(x)$  的周期为  $T$ ，那么  $f(ax+b)$  的周期为  $\frac{T}{a}$
- 周期函数一定有最小正周期吗？

$$D(x) = \begin{cases} 1 & x \text{ 为有理数} \\ 0 & x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

## 1.2.3 函数的运算

### □ 加减乘除

$$f+g, \quad f-g, \quad fg, \quad f/g$$

### □ 复合

$$f \circ g: \quad (f \circ g)(x) = f(g(x))$$

$$f(x) = \begin{cases} 1 & |x| \leq 1 \\ 0 & |x| > 1 \end{cases}, \quad \text{求 } f(f(x))$$

例  $y = 2^{\sin 3x}$  由  $y = 2^u$ ,  $u = \sin v$ ,  $v = 3x$  复合而成

链式结构:  $y - u - v - x$

$$\text{例 } f(x) = \begin{cases} 2x & 0 \leq x \leq 1 \\ x^2 & 1 < x \leq 2 \end{cases}, \quad g(x) = \ln x, \quad \text{求 } \begin{matrix} f(g(x)) \\ g(f(x)) \end{matrix}$$

例 求  $f(x)$ , 若

---

$$1) f\left(x + \frac{1}{x}\right) = x^2 + \frac{1}{x^2};$$

$$2) f\left(\frac{x+1}{x-2}\right) = 2x - 1$$

□ 反函数

➤ 单射, 满射, 双射

设 函数  $f: X \rightarrow Y$

若  $x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$

则称  $f$  为单射的

若  $R(f)=Y$  , 则称  $f$  为满射的

---

若  $f$  为既是单射又是满射的  
则称  $f$  为双射的

➤ 单射函数  $f(x)$  在其值域  $R(f)$  上可定义反函数

$$y = f(x), \quad x \in X \quad \Leftrightarrow \quad x = f^{-1}(y), \quad y \in R(f)$$

此时图形与原函数图形重合

➤ 当反函数表示为

$$y = f^{-1}(x), \quad x \in R(f)$$

图形与原函数图形关于直线  $y=x$  对称

## 1.2.4 初等函数

### □ 基本初等函数

$$f(x) = c, \quad x^\alpha, \quad a^x, \quad \log_a x$$

$$\sin x, \quad \cos x, \quad \tan x, \quad \cot x, \quad \sec x, \quad \csc x$$

$$\arcsin x, \quad \arccos x, \quad \arctan x, \quad \cdots$$

### □ 初等函数

初等基本函数经过有限次四则运算和复合而成

例如：双曲函数

$$\operatorname{sh} x \stackrel{\text{def}}{=} \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \operatorname{th} x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

## 1.2.5 隐函数、参数和极坐标表示的函数

### □ 隐函数


方程  $F(x, y) = 0$  确定的函数

$$x^2 + y^2 = 9 \Rightarrow \begin{array}{l} \text{在 } y \geq 0 \text{ 确定 } y = \sqrt{9 - x^2} \\ \text{在 } y \leq 0 \text{ 确定 } y = -\sqrt{9 - x^2} \end{array}$$

$2x - y = 2 \arctan(y - x)$  虽然不能得出表达式,  
同样可以确定函数

$$y = f(x)$$

任意给  $x_0$ , 可以确定唯一  $y_0$



□ 参数方程表示的函数

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases} \quad t \in I$$

有时对一个  $x$ ,  
对应的  $y$  不唯一

## □ 极坐标表示的函数

$$r = r(\theta)$$

与直角坐标的关系（在 1 - 1 情况下）

$$x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$$

（若  $r(\theta)$  以  $2\pi$  为周期，讨论可在  $0 \rightarrow 2\pi$  或  $-\pi \rightarrow \pi$ ）

➤ 怎样考察极坐标表示函数的图像

**周期性** 周期  $T$ ，图形绕原点角度  $T$  重复

**对称性** 以  $-\theta$  代  $\theta$  方程不变，图形关于极轴上下对称

以  $\pi - \theta$  代  $\theta$  方程不变，图形关于  $\theta = \pi/2$  左右对

称  
描点作图



例 考察下列极坐标表示函数的图像

1)  $r = a \cos \theta$

2)  $r = a(1 - \cos \theta)$

3)  $r^2 = a^2 \cos 2\theta$

# H.W

---

## 习题 1

8 (2) (4) (7), 9 (2) (4), 10 (2),

11, 14, 15 (1) (2) (5)

17, 22 (2) (4) (6), 24, 25 (1) (2) (3)

# 本章要点

---

## □函数概念

$$y = f(x), x \in D$$

其中  $x$  仅是一个符号, 可代之以任何量  $\Delta$ , 只要  $\Delta \in D$

## □复合函数的复合过程: 链式结构

## □极坐标形式的函数

$$r = \Phi(\theta)$$

了解  $\theta$  和  $r$  的几何意义, 与直角坐标系的关系, 图形的描绘