W-4.2.1 심폐소생술(CPR)

● 조사위원 확인 사항

- (1) 심폐소생술 팀 역할과 권한 숙지
- (2) 응급 Cart & 제세동기 가져오기: 반드시 4분 이내
- (3) 제세동기관리-사용법, 예방점검, 제세동기 사용관련 교육
- (4) CPR교육 및 훈련-2016년 5월(이론), 12월(모의훈련) 시행
- (5) 대상: 전 직원
- (6) 주제: 심폐소생술 및 제세동기 사용교육 & 모의훈련
- (7) 교육시간: 2년에 1회, 1시간 이상
- (8) 원내교육 강사진: 내과전문의 및 마취통증의학과 전문의
- (9) 응급 Cart 비치물품 목록 일치 여부 확인
- (10) CPR팀 운영 : DNR여부확인 ->비상연락처(주1020/야1182) ->

CPR방송코드: CPR+해당층+장소

(11) CPR팀 활성화 : 최초 발견자 30초 이내 CPR시작 -> CPR팀,제세동기 방송 후 **4분내 도착**하여 CPR시행

정규 시간 심폐소생술 방법

환자발견

반응확인(어깨를 두드리며 "여보세요" "괜찮으세요?")

주위 도움 요청 및 제세동기 준비

방송요청 (1020) 및 CPR팀 요청



맥박과 무호흡 또는 비정상호흡 확인

10초 이내 확인



심폐소생술 시행 C->A->B

성인 (가슴압박:인공호흡 30:2) 소아,영아 (1인 30:2 / 2인 15:2)



제세동기 도착->심장리듬분석

제세동 필요: 1회 시도 즉시 CPR 지속(2분간) 제세동 불필요: CPR 지속

정규시간외 심폐소생술방법 (휴일,야간)

환자발견

반응확인(어깨를 두드리며"여보세요" "괜찮으세요?")



주위 도움 요청 및 제세동기 준비

당직의 연락(1182) / 정규시간 외 CPR팀 요청



맥박과 무호흡 또는 비정상호흡 확인

10초 이내 확인



심폐소생술 시행 C->A->B

성인 30:2 / 소아,영아 (1인 30:2 / 2인 15:2)



제세동기 도착->심장리듬분석

제세동 필요 : 1회 시도 즉시 CPR 지속 제세동 불필요 : CPR 지속

[심폐소생술 팀 역할 및 권한]

구성원	역 할					
팀의 리더: 내과전문의	• 심폐소생술팀 전체 지휘, 처방 총괄적인 권한과 책임					
주치의나 담당의	 흉부압박술 시행 ,제세동실시, 중심정맥관/비위관 삽입, 동맥혈 채취 주요 처치를 시행, 필요한 약처방 심폐소생술 자료를 취합하여 정리, 의무기록에 기록 필요시 전원의뢰서를 작성하여 전원 의뢰 					
병동 수간호사나 선임 간호사 및 마취과 간호사	 제세동기 준비하고 모니터 부착 정맥로를 확보, 약물처방에 따른 주입 심폐소생술에 필요한 연락을 시행 기관삽관 등 전문 기도술 상황 시 보조 업무 심폐소생술 진행사항을 기록 보호자에게 연락 					
원무과와 이송직원	 부족한 장비 확보 담당 (산소통, 심전도, 제세동기) 필요 시 상급의료기관으로 전원시 구급차 대기 주변 통제 및 정리 					

● Biphasic 제세동기 사용법 (수술실, 7병동 보유)





- ☐ Defibrillator 'on'
- □ Paddle에 충분한 젤리(전도물질)
- 바르기(피부화상 예방)
- □ Energy 선택
 - 성인: monophasic 360J, biphasic 150~200J

- 소아: 2J/kg에서 4J/kg까지 늘림
- □ Paddle이나 본체의 'Charge' 버튼을 눌러 충전
- □ 정확한 위치에 Paddle을 대기
 - Sternum: 우측 쇄골과 흉골이 만나는 부위
 - Apex: 좌측 유두 바깥쪽
- □ 충전 상태를 확인한 후 다른 사람이 접촉하지 않도록 경고하고, 자신도 떨어져 있음을 확인
- □ Discharge 버튼을 눌러 shock 시행
 Paddle을 대어 충격을 직접 시행하는 것은 의사만 가능

E-cart 보유장소 및 공유부서			원내 CPR zone		제세동기	제세동기 보유장소 및 공유부서		
충	보유부서	공유부서	*	CPR zone	층,보유부서	기종	공유부서	
2층	외래주사실	관절센터, 척추센터 외래	2층	외래 주사실				
3 *	내과간호사실	내과, 임상병리, 영상의학과	3층	내시경실	5층, 수술실	Biphasic	지하, 1층, 2층, 3층, 4층	
4층	비수술센터	비수술센터, 운동재활센터	4층	비수술센터	70/122			
5층	수술실	수술실	6층	병동 회복실				
6층	6병동	6병동	7층	병동 회복실	7층,7병동	Biphasic	6병동, 7병동, 8층	
7층	7병동	7병동, 8층, 영양실	8층 <u>이상층</u>	7층 병동 <u>회복실</u>				
별관	피부비뇨기과	피부비뇨기과	별관	쳐치실	피부과	AED	피부과	

● 제세동기 충전 확인 및 점검

- 1) 코드를 꽂아 놓아 충전을 시켜놓습니다.
- 2) 자동제세동기는 배터리 잔량 확인
- 3) 충전확인법: 제세동기 점검표에 주 2회(월, 목요일) 점검, 코드를 뺀 후에 전원을 켜보고 다시 코드를 꽂아 불빛을 확인
- 4) 부속물품 구비: 제세동기 점검표를 하여 정기적으로 관리를 합니다.(전원 및 충전상태 확인 (AC power/배터리 불빛 확인)과 물품: Electrode patch, Electrical jelly, Record용지, Pad, Pad cable)

● AED(자동 제세동기) 사용법 : 피부과 보유



CPR사후 보고체계: CPR 모니터링 기록지 작성하고 부서장에게 보고
 -> 24시간내 CPR모니터링 기록지 작성-> QPS위원회에 제출하고 해당부서장은 문제점 분석 후 개선활동 시행