

마취진료 모니터링 규정	마추	진료	모니티	爿릵	규정
--------------	----	----	-----	----	----

관리번호	W-5.2.3	제정일	2013년 02월 15일
승인책임자	병원장	최근개정일	2016년 10월 31일
검토책임자	규정관리위원장	시행일	2016년 12월 01일
주무부서	진료부, 마취과	검토주기	3년
관련근거	의료기관인증기준 5.2.3	검토예정일	2019년 10월 30일

## |. 목적

안전한 마취진료를 위하여 환자가 회복되기까지 환자상태를 모니터링하고 이를 근거로 회복실 퇴실을 결정하기 위함이다.

## Ⅱ. 규정

- 1. 마취 중 상태를 모니터링하고 기록한다.
  - 1) 마취 중(수술하는 동안) 상태 모니터링
    - (1) 전신마취 시 산소포화도, 비침습적 혈압, 호흡, 심박수, 심전도, 호기말 이산화탄소농도 등을 측정한다. (환자 상태에 따라 침습적 혈압측정, 마취깊이(각성상태-BIS), 중심정맥압, 소변량, 체온 등을 감시하고 기록한다.)
    - (2) 비침습적 혈압, 심박수는 5분마다 측정하여 기록하고, 침습적 혈압인 경우에는 5분마다 기록하고, 산소포화도, 심전도, 호흡수, 호기말 이산화탄소농도 등을 30분 간격으로 기록 하며 소변량, 수액량, 출혈량, 수혈량은 마취 종료 시 기록한다.
    - (3) 부위마취의 경우 환자 감시기로 비침습적 혈압, 심박수는 5분마다 측정하여 기록하고, 산소포화도, 심전도 및 호흡수는 30분마다 기록한다.
- 2. 회복 중 환자상태를 모니터링하고 기록한다.
  - 1) 회복실 상태 모니터링
    - (1) 부위마취를 시행한 환자 중 생리학적 모니터링이 필요치 않다고 판단된 경우에는 회복실에서 모니터링을 하지 않고 바로 병실로 이동할 수 있다.
    - (2) 회복실 환자는 산소포화도, 비침습적 혈압, 심박수, 호흡 등을 연속적으로 관찰하고 최소 5분 단위로 기록한다.
    - (3) 회복실에서 환자가 수술 전 의식수준을 되찾고, 심폐 억제의 위험이 없다고 판단될 때까지 환자상태를 감시하고 기록한다.
    - (4) 회복실 입실 및 퇴실시간을 기록한다.
- 3. 회복실 퇴실기준에 따라 적격한 자가 퇴실을 결정하고 시행한다.
  - 1) 회복실 퇴실 기준
    - (1) 회복실 퇴실 여부는 마취통증의가 결정하며 지정된 평가도구(PAR score : Post Anesthesia Recovery Score)를 사용한다.
    - (2) 환자의 상태가 안정되었다고 판단될 경우 반사능력, 호흡, 순환, 의식 및 피부색깔을 확인 후 PAR score의 총 점수가 9점 이상인 경우 퇴실한다.
  - 2) 특별한 환자에 대한 퇴실기준
    - (1) PAR score가 9점에 이르지 못하고 퇴실기준 미달 시 마취통증의는 집도의에게 이를 알려 이학적 검사를 시행하고, 필요 시 영상 및 혈액 검사를 실시하는 등의 확인 절차를 거친다.



- (2) 마취진료 후 특정 진료영역(대학병원이나 상급병원 응급실)으로 이동 시에는 수술의료진 및 마취간호사 각 1명 이상 동행하고 환자 이송 중에도 환자 상태를 모니터링 할 수 있도록 한다.
- (3) 사지 수술 및 수상, 마비 또는 부위마취로 인해 움직일 수 없는 환자의 경우 해당부위의 반사 능력 평가는 마취통증의의 판단에 따른다.

## Ⅲ. 참고

대한마취과학회, 마취과학 제 4판, 군자출판사(2002)

## [별첨]

별첨 1. 마취 후 회복 기준 척도(PAR score: Post-Anesthesia Recovery score)

입안자	규정관리위원장	
승인책임자	병원장	
서명일		



[별첨 1] 마취 후 회복 기준 척도(PAR score : Post-Anesthesia Recovery score)

기 준	점 수	활동 능력				
	2	명령 또는 자발적으로 4 팔-다리 운동 가능				
반사능력	1	명령 또는 자발적으로 2 팔-다리 운동 가능				
	0	명령 또는 자발적으로 모든 팔-다리 운동 불가능				
2 심호흡 및 기침 가능						
호 흡	1	호흡 곤란 또는 호흡 운동 제한				
	0	무호흡				
	2	마취전 혈압의 ± 20% 이내				
순 환	1	마취전 혈압의 ± 20 -50% 이내				
	0	마취전 혈압의 ± 50% 이상				
	2	완전 회복				
의식상태 1		부르면 눈 뜸				
	0	무반응				
	2	분홍색				
피부색깔	1	창백, 음울, 얼룩짐, 황달				
	0	청색증				

점수	PAR-Score(ad/re/dis)								
Awake	2	1	0	2	1	0	2	1	0
Activity									
Respiration									
Circulation									
Consciousness									
Color									
Total score		·	·						