


- 직원간 정보공유방법 (공기매개, 비말전파, 접촉전파)
 - 1) 병실문앞, 병실안 침상에 격리표시
 - 2) 의무기록 환자 관리 클릭하여 감염관리에 내용을 입력한다.
 - 3) 감염관리 내용이 입력된 환자는 전산 화면에 팝업창 통하여 감염정보를 인지한다.
 - 4) 환자인식밴드에 격리 표지를 이용하여 환자 감염정보를 공유한다.
 - 5) 검체에 격리표시
- EMR 상 감염환자 확인 (처방/간호 화면에 국한)

– 60 –

- 환자인식밴드용 감염환자 표식 태그(A:공기/ B:혈액/ C:접촉/ D:비말)



- 격리형태 별 보호구 사용 지침

● 반드시 적용 ○ 오염이 우려되는 경우 적용

	표준주의	공기주의	비말주의	접촉주의
표준주의	—	●	●	●
1인실	○	●	○	○
손위생	●	●	●	●
장갑	○	○	○	●
가운	○	○	○	●
마스크	○	●	●	○
보안경	○	○	○	○

- 개인보호구 착용 및 탈거 순서

1) 착용 : 손위생 ⇒ 가운 ⇒ 마스크 ⇒ 보안경 ⇒ 장갑

2) 탈거 : 장갑 ⇒ 가운 ⇒ 손위생 ⇒ 보안경 ⇒ 마스크(병실 밖에서 탈거)
⇒ 손위생

● 전파경로별 표준예방지침 [병실문 앞 게시용]

표준예방지침준수	표준예방지침준수	표준예방지침준수
윌스기념병원	윌스기념병원	윌스기념병원
<h3>공기예방지침</h3>  <p>1인실 또는 병실 코호트 병실 문을 닫아주세요</p>  <p>병실 들어가기 전후 손위생 실시</p>  <p>N95 마스크 착용 병실 나오면 벗어주세요</p>  <p>이동제한 이동 중 환자 수송용 마스크 착용 이동 후처에 환자의 이동 정지</p> <p>면회 시 간호사실에 먼저 문의해 주세요!!</p>	<h3>접촉예방지침</h3>  <p>1인실 또는 병실 코호트 병실 문을 닫아주세요</p>  <p>병실 들어가기 전후 손위생 실시</p>  <p>병실 들어가기 전 가운/장갑 착용</p>  <p>병실 나오면 손서대로 벗어주세요</p>  <p>이동제한 이동 후처에 환자의 이동 정지</p> <p><small>환자 이동물품, 가운물품(가운/장갑, 장갑, 가운, 신발) 사용 후처에 먼저 문의해 주세요!!</small></p> <p>면회 시 간호사실에 먼저 문의해 주세요!!</p>	<h3>비말예방지침</h3>  <p>1인실 또는 병실 코호트 병실 문을 닫아주세요</p>  <p>병실 들어가기 전후 손위생 실시</p>  <p>환자와의 거리 1M 이내이면 반드시 착용 병실 나오면 벗어주세요</p>  <p>이동제한 이동 중 환자 수송용 마스크 착용 이동 후처에 환자의 이동 정지</p> <p>면회 시 간호사실에 먼저 문의해 주세요!!</p>

● 역격리 지침 [병실문 앞 게시용]

표준예방지침준수 윌스기념병원

역격리 지침



의사의 지시가 있을 경우
1인실 이용



병실 들어가기 전 후
손위생




외부음식, 생과일, 채소, 꽃
반입금지

- 침습적 처치 시 가운, 마스크, 장갑 착용
- 방문객은 제한하도록 한다.
(12세 미만 어린이 방문금지)

환자 사용물품-개별물품사용(개인용 혈압기, 체온계, 토니켓 준비)

면회 시 간호사실에 먼저 문의해 주세요!!

● 입원환자 격리절차



● 격리병실 사용기준

No.	제목	심사기준
1	면역억제 (보호격리)	<ul style="list-style-type: none"> ● 격리대상 1) ANO가 500/mm³ 이하인 경우로서 감염의 위험이 있는 경우 2) AIDS 환자 ● 격리기간 1) ANO가 3일간 계속하여 500/mm³ 이상 또는 감염의 위험이 소실될 때까지 2) 면역기능이 현저히 회복될 때까지
2	VRE 양성	<ul style="list-style-type: none"> ● 격리대상 : 여러 가지 검체(대변, 항문도말, 회음부, 액와부, 배꼽, 상처, 요관, 인공항문 부위 등)에서 실시한 배양검사 또는 POR 검사 결과에서 양성으로 확인된 경우 ● 격리기간 : 1~2주 간격을 두고 실시한 VRE 배양검사가 3회 연속 음성일 때까지
3	결핵	<ul style="list-style-type: none"> ● 격리대상 : chest X-Ray 상 황동성 호흡기 결핵이 의심되는 치료경험이 없는 초치료 환자의 경우. 균이 증명되기 전이라도 격리인정 ● 격리기간 : 객담 도말검사상 3회 연속(수일간격)음성으로 나와 전염력이 없다고 판단될 때까지
4	제1군 법정감염 병	<ul style="list-style-type: none"> ● 격리대상 : 제1군 법정 감염병 확진 혹은 의사 환자 ● 격리기간 1) 콜레라, 세균성이질, 장출혈성대장균감염증: 항생제치료 종료 48시간이 지난 후 24시간 간격으로 대변에서 그 결과가 2회 이상 음성인 때 2) 장티푸스, 파라티푸스: 항생제 치료 종료 48시간이 지난 후 24시간 간격으로 대변에서 그 결과가 3회 음성인 때
5	홍역, 수두 유행성이 하선염	<ul style="list-style-type: none"> ● 격리대상 : 진료 상 입원이 필요하다고 인정되는 경우 ● 격리기간 1) 홍역: 발진이 시작된 후 4일까지 격리 2) 수두: 모든 수포에 가피가 앉을 때까지 격리 3) 유행성이하선염: 종창이 사라진 후 3일까지 격리
6	로타바이 러스 창자염	<ul style="list-style-type: none"> ● 격리대상 : 임상 진단(Viral Antigen 양성)이 확인된 경우 인정 단, 36개월 이상 연령의 경우 대변을 가릴 수 없는 경우에 인정
7	음	<ul style="list-style-type: none"> ● 격리대상 : 입원이 필요한 타 질환이 병발된 경우 인정