

Efficacy and safety of PPIs for diabetes mellitus in patients with GERD: a meta-analysis

Lv N, et al. Arch Med Sci. 2024 Sep 7;21(5):1956-1964.

연구 개요

- 연구 설계: 체계적 문헌고찰 및 메타분석
- 연구 대상: 제2형 당뇨병이 동반된 GERD 환자
- 대상 문헌: 2023년 12월 이전까지 발표된 무작위 대조 시험(RCT)
- 데이터베이스: Web of Science, Cochrane Library, PubMed, Embase
- 평가 지표: 내시경적 치료 효과, 공복혈당(FBG), 증상 완화율, 당화혈색소(HbA1c), 이상반응 발생률 등

연구 목적

제2형 당뇨병(T2DM)에 위식도역류질환(GERD)이 동반된 환자에서 PPI의 임상적 유효성 및 안전성 평가

임상적 해석

T2DM 동반 GERD 환자에서 PPI 병용 투여의 임상적 이점

식도 점막 보호 및 증상 개선

위산 분비를 억제하여 식도 점막에 대한 위산의 자극과 손상을 줄이고, GERD 증상 개선

식이 및 영양 섭취 정상화

역류로 인한 통증과 불편감을 완화함으로써 환자의 식이 패턴을 개선하고, HbA1c, FBG 수치 개선에 간접적 기여

항염증 작용을 통한 혈당 조절

위산 분비 억제에 따른 소화기계 염증 감소가 전신 염증 반응을 완화하여 전반적인 혈당 수치 개선에 영향

주요 결과

GERD 개선 효과

내시경 치료 반응률

PPI군 대조군
69.32% vs. 5.45%

증상 개선률

PPI군 대조군
92.94% vs. 54.65%

PPI 병용 시
현저한 GERD 개선 효과

혈당 조절 효과

HbA1c 변화

대조군 대비
-0.41% 추가 감소

공복혈당 (FBG)

대조군 대비
-10.15mg/dL 추가 감소

PPI 병용 시
경미하지만 유의한 혈당 개선

안전성



이상반응 발생률

PPI군 대조군
10.78% vs. **11.88%**

두 군 간 부작용 발생률에
유의미한 차이 없음

PPI는 제 2형 당뇨병이 동반된 위식도 역류질환(GERD) 환자의 혈당 조절을 효과적으로 개선할 수 있습니다.