

CKD 중증도와 위마비(Gastroparesis)의 연관성: 입원 및 외래 대규모 데이터 기반 후향적 분석

Wang X,et al. J Pers Med. 2025 Dec 4;15(12):600.

배경 및 목적

- CKD 환자는 상복부 불편감, 오심, 구토, 조기 포만감 등 상부 위장관 증상을 흔히 경험
- 이러한 증상은 전해질 이상이나 체액 과다로 오인되어 위마비가 간과되는 경우가 많음
- 본 연구는 입원 및 외래 데이터를 모두 활용한 대규모 인구 기반 분석을 통해 CKD와 위마비의 연관성을 규명하고자 함

위마비(Gastroparesis)란?

기계적 폐쇄가 없음에도 불구하고 위 배출이 지연되는 위 운동 기능 장애로, 음식물의 소화와 영양 흡수를 저해하는 질환



- 오심
- 구토
- 복부 팽만감
- 조기 포만감 등

방법



위마비 환자 3,579,372명
분석 (CKD 유무 포함)




오심, 구토를 주증상으로
외래 방문한 환자
6,263,251명 분석

위마비 정의: ICD-10-CM 진단코드

분석 방법: CKD 단계별 위마비 유병률 및 위험도 비교, 성향점수매칭(PSM)을 통한 보정 분석


결과

입원 환자 코호트 (NIS)



" CKD 환자에서 위마비 유병률 증가,
ESRD에서 최대 위험 확인 "

외래 환자 코호트 (TriNetX)



" CKD 환자에서 위마비 위험 증가 확인 "

결론

CKD는 위마비 위험 증가와 연관되어 있으며,
특히 진행성 CKD 및 ESRD 환자에서 위마비에 대한 정기적인 평가와 조기 관리가 필요할 것이다.