HTE 데이터 기반 반응조건 추천 연구 보고서

팔라듐 교차 짝지음 반응의 수율 예측 및 반응 조건 우선순위 추천

팀명 윤멘토님과아이들

윤연서 (멘토) · 이경은 (멘티) · 김탁우 (멘티)

2026 년 11 월

목차

요약 3

1. 문제 정의 4

1.1 배경 4

1.2 문제 정의 4

1.3 평가 기준 4

2. 관련 연구 및 기존 서비스 5

2.1 선행 연구 5

2.2 기존 서비스 6

3. 연구 방법 7

3.1 용어 정의 7

3.2 데이터 8

3.3 모델 9

3.4 평가 방법 10

4. 결과 12

4.1 수율 예측 12

4.2 BH 조건 추천 12

4.3 SM 제로샷 조건 추천 13

4.4 SM 순차 최적화 14

5. 모델 해석 15

5.1 Buchwald–Hartwig 15

5.2 Suzuki–Miyaura 16

6. 서비스 프로토타입: ReactPilot 18

7. 차별점 및 활용 방안 19

7.1 차별점 19

7.2 활용 방안 19

8. 결론 및 향후 계획 19

참고문헌 20

요약

신약 공정 개발에서는 새 기질(substrate, 결합을 형성하는 두 반응물)이 도입될 때마다 리간드, 염기, 용매로 구성된 수백 가지 반응 조건 중 최적 조건을 찾기 위해 반복적인 스크리닝이 필요하다. 본 연구는 공개 고처리량 실험(HTE) 데이터 두 종(Buchwald–Hartwig 3,955 건, Suzuki–Miyaura 5,760 건)을 이용해, 미학습 기질(unseen substrate)에 대한 수율 예측과 반응 조건 우선순위 추천 모델을 개발하였다.

모델은 시약별 분자 표현(RDKit 2D 기술자 + Morgan 지문)을 입력으로 하는 LightGBM 회귀 모델이며, 기질 단위 그룹 교차검증으로 평가하였다. 주요 결과는 다음과 같다.

- Suzuki–Miyaura 제로샷 조건 추천(대상 반응의 실험 데이터 없이 384 개 조건 순위화)에서 상위 20 개 안에 준최적 조건이 포함되는 비율(hit@20)은 87%로, 무작위(38%) 대비 크게 높았다. 동일한 분자 표현을 쓰는 능형 회귀 대비 regret@8 이 평균 10.4%p 낮았다(95% 신뢰구간 [−20.3, −2.7]).
- Buchwald–Hartwig 미학습 기질에서 준최적 조건 도달까지의 기대 실험 수가 무작위 3.9 회에서 1.3 회로 약 65% 감소하였다.
- 순차 모델 기반 최적화(SMBO)에서 준최적 조건 도달까지의 실험 수가 무작위 27.1 회에서 13.7 회로 감소하였다.
- SHAP 분석 결과, 모델이 의존한 특징은 산화적 첨가, 촉매 피독, 붕소 종의 활성화 등 알려진 반응 메커니즘과 일치하였다.

이 모델을 추천 엔진으로 하는 웹 프로토타입 ReactPilot 을 구현하였다.

1. 문제 정의

1.1 배경

팔라듐 촉매 교차 짝지음 반응(cross-coupling)은 의약품 합성에서 C–N, C–C 결합 형성에 가장 널리 쓰이는 반응군이다. 동일한 반응이라도 기질이 바뀌면 최적의 리간드, 염기, 용매가 달라지며, 수율은 0%에서 90% 이상까지 분포한다.

조건 공간(condition space)은 각 변수의 조합으로 증가한다. 본 연구에서 다룬 Suzuki–Miyaura 데이터는 리간드 12 종, 염기 8 종, 용매 4 종으로 반응당 384 개 조건을 갖는다. 제약 산업에서는 이를 96-웰 또는 384-웰 플레이트 기반 HTE 로 스크리닝하지만, 기질 확보와 분석 비용이 발생하고 신규 기질마다 스크리닝을 반복해야 한다.

1.2 문제 정의

본 연구의 핵심 질문은 다음과 같다. 미학습 기질이 주어졌을 때, 축적된 HTE 데이터만으로 어떤 반응 조건부터 실험해야 하는가. 이를 세 가지 과제로 정의하였다.

표 1. 과제 정의

과제	입력	출력	적용 단계
수율 예측 (회귀)	기질과 반응 조건	예측 수율(%)	실험 전 반응 가능성 판단
제로샷 조건 추천	미학습 기질 쌍	전체 조건의 순위	1 차 스크리닝 플레이트 설계
순차 최적화	누적 실험 결과	다음 배치 조건 4 개	후속 스크리닝 플레이트 설계

1.3 평가 기준

추천 모델의 가치는 실험 횟수 절감으로 측정된다. 따라서 수율 예측 오차(MAE)와 함께, 추천 상위 k 개만 실험했을 때의 수율 손실(regret@k), 최적 조건 포함 확률(hit@k), 준최적 조건 도달까지의 실험 수를 주요 지표로 사용하였다. 비교 기준 모델(baseline)은 무작위 선택, 이력 기반 순위, 선형 회귀 모델이다.

2. 관련 연구 및 기존 서비스

2.1 선행 연구

Ahneman 등(2018)은 Buchwald–Hartwig 반응 4,608 건을 HTE 로 측정하고, 시약의 양자화학 기술자를 입력으로 한 랜덤 포레스트로 수율을 예측하였다. 이 데이터는 이후 반응 수율 예측의 표준 벤치마크가 되었다. Chuang 과 Keiser(2018)는 동일 데이터에서 기술자를 무작위 특성으로 대체해도 유사한 성능이 나온다는 점을 근거로, 모델이 화학 정보를 실제로 활용하는지 검증해야 한다고 지적하였다.

Perera 등(2018)은 Pfizer 의 유동 반응기 기반 HTE 플랫폼으로 Suzuki–Miyaura 반응 5,760 건을 측정하였다. Schwaller 등(2021)은 반응 SMILES 를 입력으로 하는 트랜스포머 모델(Yield-BERT)로 두 데이터의 수율을 예측하였고, Shields 등(2021)은 베이지안 최적화가 숙련 화학자보다 적은 실험으로 최적 조건에 도달함을 보였다. Strieth-Kalthoff 등(2022)은 실패 반응이 보고되지 않는 문헌 데이터의 편향을 지적하며, 실패 결과까지 포함한 HTE 데이터의 가치를 강조하였다.

표 2. 선행 연구 비교

연구	모델	평가 방식	본 연구와의 차이
Ahneman 등, 2018	랜덤 포레스트 + 양자화학 기술자	무작위 분할, 첨가제 단위 분할	기질 단위 그룹 교차검증, 추천 지표 평가
Schwaller 등, 2021	트랜스포머(Yield-BERT)	무작위 분할 중심	추천 성능과 실험 절감량 직접 측정
Shields 등, 2021	베이지안 최적화(GP)	순차 최적화	과거 데이터 기반 제로샷 추천 포함
본 연구	LightGBM + 분자 표현	그룹 교차검증, 부트스트랩 신뢰구간	수율 예측, 제로샷 추천, 순차 최적화를 단일 모델로 평가

선행 연구 역시 기존 알고리즘(랜덤 포레스트, 트랜스포머, 가우시안 과정)과 화학 표현을 결합해 모델을 구성하였다. 본 연구는 같은 접근을 따르되, 실제 사용 시나리오인 미학습 기질 조건 추천에 맞춘 평가 설계와 지표에서 차별화된다.

2.2 기존 서비스

표 3. 관련 서비스

서비스	주요 기능	ReactPilot 과의 차이
Yoneda Labs	클라우드 기반 반응 조건 추천 및 최적화	가장 유사한 서비스. ReactPilot 은 검증 지표와 추천 근거를 함께 제시
Atinary SDLabs	자율 실험실 연동 베이지안 최적화 플랫폼	자동화 장비 전제. ReactPilot 은 기존 HTE 플레이트 워크플로에 바로 적용
SYNTHIA (Merck)	역합성 경로 설계	반응 경로 설계 도구. 조건 최적화는 범위 밖
Reaxys, SciFinder	문헌 반응 데이터베이스	보고된 성공 조건 검색. 실패 데이터 기반 예측 없음
IBM RXN	생성물 예측, 역합성	생성물 구조 예측. 수율 및 조건 순위는 다루지 않음

3. 연구 방법

3.1 용어 정의

표 4. 주요 용어

용어	정의
HTE (High-Throughput Experimentation, 고처리량 실험)	96-웰, 384-웰 플레이트에 조건 조합을 배치해 수백 개 반응을 병렬로 수행하는 실험 방식
수율 (yield)	투입한 기질 대비 목적 생성물로 전환된 비율(%)
기질 (substrate)	결합을 형성하는 두 반응물. BH 는 할로젠화 아릴과 아민, SM 은 친전자체와 친핵체
리간드, 염기, 용매, 첨가제	팔라듐 촉매에 배위해 반응성을 조절하는 분자, 반응을 촉진하는 염기, 반응 매질, 작용기 내성 평가용으로 투입한 분자
분자 표현 (molecular representation)	분자 구조를 수치 벡터로 변환한 것. 본 연구는 시약마다 RDKit 2D 기술자 12 종과 Morgan 지문 64 비트를 사용
분자 기술자 (descriptor)	분자량, 위상 극성 표면적(TPSA) 등 분자 구조로부터 계산한 물리화학적 수치
Morgan 지문 (fingerprint)	분자 내 부분 구조(substructure)의 존재 여부를 비트(0/1)로 나타낸 벡터. 반경 2(ECFP4 에 해당)
LightGBM	그래디언트 부스팅 결정 트리(GBDT) 구현체. 특성 간 비선형 상호작용을 학습
시드 앙상블 (seed ensemble)	난수 시드만 달리해 학습한 동일 구조 모델 여러 개의 예측을 평균하는 방법. 예측 분산을 줄임
MAE (평균 절대 오차)	예측 수율과 실제 수율 차이의 절댓값 평균(%p)
regret@k	해당 반응의 최고 수율 − 추천 상위 k 개 중 최고 수율(%p). 상위 k 개만 실험했을 때의 수율 손실
hit@k	추천 상위 k 개 안에 최적(또는 준최적) 조건이 포함될 확률
준최적 조건 (near-optimal)	해당 반응의 최고 수율과 5%p 이내의 조건
그룹 교차검증 (Leave-One-Group-Out)	특정 기질(쌍)의 모든 반응을 학습에서 제외하고 그 기질로 평가하는 방식을 모든 기질에 반복. 미학습 기질 상황을 재현
부트스트랩 95% 신뢰구간	평가 그룹을 복원 추출로 1,000 회 재표집해 구한 성능 차이의 분포 범위. 구간이 0 을 포함하지 않으면 유의한 차이로 판단
SHAP (SHapley Additive exPlanations)	개별 예측을 각 특성의 기여도로 분해하는 모델 해석 방법

3.2 데이터

두 데이터 모두 원 연구에서 시약 조합을 전수(full factorial) 실험한 HTE 데이터로, 수율 0%의 실패 반응까지 모두 포함한다. 성공 사례 위주로 보고되는 문헌 데이터와 달리 조건 공간 전체의 정답이 존재하므로, 조건 추천 모델의 학습과 평가에 적합하다.

표 5. 데이터 구성

데이터	형성 결합	변수	반응 수
Buchwald–Hartwig (BH), Ahneman 등, 2018	C–N	할로젠화 아릴 15 종(아렌 5 종 × Cl·Br·I), 리간드 4, 염기 3, 첨가제 22	3,955
Suzuki–Miyaura (SM), Perera 등, 2018	C–C	친전자체 7, 친핵체 4(기질 쌍 15 개), 리간드 12, 염기 8, 용매 4	5,760




그림 1. BH 기질별 평균 수율. 이탈기(열)와 아렌(행)에 따라 평균 수율이 2%에서 59%까지 달라진다.

수율 변동의 구조를 확인하기 위해 전체 데이터에 두 가지 선형 모델을 적합하고 결정계수(R^2)를 비교하였다. 두 모델 모두 시약 정체를 원-핫 인코딩한 변수만 사용하였다.

- 주효과 모델(main-effect model): 각 시약의 효과가 독립적으로 더해진다고 가정한다. 리간드의 효과는 기질과 무관하게 일정하다.
- 2 차 상호작용 모델(two-way interaction model): 주효과에 모든 시약 쌍의 상호작용 항을 추가한다. 예를 들어 특정 기질과 특정 리간드의 조합에 고유한 보정값이 존재한다.

상호작용 항을 추가하면 R^2가 BH 0.71 에서 0.90 으로, SM 0.51 에서 0.78 로 증가하였다. 즉 시약 간 상호작용이 수율 변동의 상당 부분을 설명하며, 비선형 상호작용을 학습할 수 있는 모델이 필요하다. 다만 원-핫 기반 상호작용 모델은 학습에 등장한 시약 조합에만 계수를 가지므로 미학습 기질에는 적용할 수 없다. 따라서 시약을 정체가 아닌 구조 기반 분자 표현으로 입력해야 한다.




그림 2. 주효과 모델과 2 차 상호작용 모델의 결정계수(R^2) 비교.

3.3 모델

모델은 하나의 반응(시약 조합)을 입력받아 수율을 출력하는 회귀 모델이다. SM 을 기준으로 구성은 다음과 같다.

- 입력: 친전자체, 친핵체, 리간드, 염기, 용매 5 종 시약 각각의 분자 표현. 시약마다 RDKit 2D 기술자 12 종(분자량, TPSA, 회전 가능 결합 수 등)과 Morgan 지문 64 비트(C–Cl, 피리딘 질소 등 부분 구조의 존재 여부)를 계산해 연결(concatenate)하고, 데이터 내 분산이 0 인 특성을 제거하여 반응당 약 210 차원 특성 벡터를 구성한다.
- 출력: 예측 수율(%).

시약을 원-핫 인코딩이 아닌 구조 기반 표현으로 입력하므로, 미학습 기질도 구조적으로 유사한 학습 시약의 정보를 활용해 예측할 수 있다. LightGBM 은 "C–Cl 부분 구조가 있고 리간드가 XPhos 이면 수율이 낮다"와 같은 특성 간 조건부 규칙을 트리 분기로 학습하므로, 3.2 절에서 확인한 시약 간 상호작용을 표현할 수 있다.

예측 모델은 동일 하이퍼파라미터에 난수 시드만 달리한 LightGBM 5 개의 시드 앙상블이다. 중첩 교차검증(nested cross-validation)으로 하이퍼파라미터 후보 30 개를 탐색한 결과 성능 차이가 0.2%p 수준에 그쳐, 고정 하이퍼파라미터를 최종 모델로 채택하였다.

추천은 예측 수율을 기준으로 한다. 제로샷 추천에서는 대상 반응의 모든 조건에 대해 수율을 예측하고 내림차순으로 순위화한다. 순차 최적화는 순차 모델 기반 최적화(Sequential Model-Based Optimization, SMBO)로 구성하였다. 베이지안 최적화와 같은 반복 구조(예측 → 실험 → 재학습)에서 대리 모델(surrogate model)로 LightGBM 앙상블을 사용하며, 매 배치마다 누적 결과로 재학습한 뒤 미실험 조건 중 예측 수율 상위 4 개를 다음 배치로 선택한다.

표 6. 최종 모델 구성

구성 요소	내용
입력	기질, 리간드, 염기, 용매(BH 는 첨가제)의 분자 표현. 시약당 RDKit 2D 기술자 12 + Morgan 지문 64 비트
예측 모델	LightGBM 회귀, 시드 앙상블 5 개
출력	조건별 예측 수율 및 순위
순차 최적화	SMBO. 초기 4 개 무작위 실험 후 배치 크기 4 로 9 회 반복(총 40 회), 배치마다 재학습

3.4 평가 방법

실제 사용 시나리오는 미학습 기질에 대한 추천이므로, 모든 평가는 그룹 교차검증으로 수행하였다. BH 는 기질 15 종 각각을 시험 그룹으로 두고 나머지 14 종으로 학습하였다(15-fold). SM 은 기질 쌍 15 개 각각을 시험 그룹으로 두고 나머지 14 쌍(5,376 건)으로 학습하였다. 방법 간 성능 차이는 시험 그룹 단위 부트스트랩(1,000 회) 95% 신뢰구간으로 판단하였다.

표 7. 비교 기준 모델

모델	설명
무작위 (random)	조건을 무작위로 선택. 기댓값을 해석적으로 계산
조건 평균 기준선	학습 기질에서 같은 조건의 평균 수율로 예측. 기질 정보 미사용
이력 기반 순위 (historical ranking)	과거 데이터에서 평균 수율이 높았던 조건 순으로 추천
능형 회귀 + 분자 표현	최종 모델과 같은 분자 표현을 쓰는 선형 모델(Ridge)
상호작용 선형 모델	원-핫 인코딩한 시약과 모든 2 차 상호작용 항을 쓰는 베이지안 능형 회귀

모델	설명
무작위 특성 대조군 (random-feature control)	분자 표현을 같은 차원의 고정된 무작위 비트로 대체한 LightGBM

4. 결과

4.1 수율 예측

학습에 등장한 시약의 새로운 조합(무작위 분할)에서 LightGBM 의 MAE 는 BH 4.0%p(R^2 0.96), SM 6.8%p 로, 조건 평균 기준선(BH 6.8, SM 10.8)보다 크게 낮았다.

미학습 기질에서도 오차가 감소하였다. 조건 평균 기준선은 18.1%p, 동일 분자 표현의 능형 회귀는 15.8%p, LightGBM 은 11.8%p 였다. LightGBM 과 능형 회귀의 차이는 −4.0%p(95% 신뢰구간 [−6.4, −1.3])로 유의하였다. 분자 표현과 비선형 상호작용을 학습하는 트리 모델이 모두 성능에 기여하였다.

표 8. BH 미학습 기질의 수율 예측 오차

모델	입력	MAE (%p)
조건 평균 기준선	조건 정보만 사용	18.1
능형 회귀	분자 표현	15.8
LightGBM	분자 표현	11.8

4.2 BH 조건 추천

BH 미학습 기질마다 리간드 4 종 × 염기 3 종 = 12 개 조건을 순위화하고, (기질, 첨가제) 330 개 상황에서 추천 성능을 평가하였다. hit@3 은 85%로 무작위(25%) 대비 크게 높았고, 준최적 조건 도달까지의 기대 실험 수는 무작위 3.9 회에서 1.3 회로 약 65% 감소하였다.

Chuang 과 Keiser(2018)의 지적에 따라 무작위 특성 대조군과 비교하였다. 대조군의 hit@3 은 74%로 낮아졌고, regret@3 차이는 +0.54%p(95% 신뢰구간 [+0.18, +0.92])로 분자 표현이 유의하게 우수하였다. 모델이 무작위 식별자가 아닌 화학 구조 정보를 활용함을 확인하였다.




그림 3. BH 미학습 기질에서 추천 상위 k 개 안에 최적 조건이 포함될 확률(hit@k).

4.3 SM 제로샷 조건 추천

SM 은 조건 공간이 384 개로 넓어 추천 성능의 차이가 크게 나타난다. 미학습 기질 쌍에 대해 대상 반응의 실험 데이터 없이 384 개 조건을 순위화하였다.

표 9. SM 제로샷 조건 추천 성능 (기질 쌍 15 개 평균)

모델	regret@1 (%p)	regret@8 (%p)	hit@8 (준최적)	hit@20 (준최적)
무작위	50.0	19.7	19%	38%
이력 기반 순위	23.5	13.9	47%	60%
능형 회귀 + 분자 표현	24.3	15.3	40%	53%
상호작용 선형 모델	14.8	6.3	60%	80%
LightGBM + 분자 표현	10.6	5.0	60%	87%

LightGBM 의 regret@8 은 동일 분자 표현의 능형 회귀보다 평균 10.4%p 낮았다(95% 신뢰구간 [−20.3, −2.7]). 상호작용 선형 모델 대비 −1.3%p([−3.0, −0.3]), 이력 기반 순위 대비 −8.9%p([−17.3, −2.3]), 무작위 대비 −14.7%p([−19.8, −9.7])로 모든 비교에서 유의하게 우수하였다.




그림 4. SM 미학습 기질 쌍에서의 hit@20(상위 20 개 안에 준최적 조건 포함 비율).

4.4 SM 순차 최적화

실제 스크리닝은 1 차 플레이트 결과를 반영해 후속 플레이트를 설계한다. 이 과정을 나머지 14 쌍의 과거 데이터가 주어진 조건(warm start)에서 재현하였다. 초기 4 개 조건을 무작위로 실험한 뒤, 배치 크기 4 로 9 회(총 40 회) SMBO 를 수행하였다.

준최적 조건 도달까지의 실험 수는 무작위 27.1 회, 이력 기반 순위 16.5 회, LightGBM 13.7 회였다. 누적 20 회 시점의 regret 은 무작위 대비 8.3%p([−11.6, −5.1]), 이력 기반 순위 대비 6.5%p([−14.2, −0.6]) 낮았다. 이력 기반 순위는 기질과 무관하게 같은 조건을 우선 추천하므로, 최적 조건이 다른 염화 아릴 기질에서 큰 손실을 보였다. LightGBM 은 초기 배치 결과를 반영한 직후(5 회차)부터 regret 을 빠르게 줄였다.




그림 5. SM 순차 최적화에서 누적 실험 수에 따른 regret(15 쌍 평균). 낮을수록 좋다.

5. 모델 해석

추천 결과를 실험 현장에서 활용하려면 모델의 판단 근거가 화학적으로 타당해야 한다. SHAP 으로 특성별 기여도를 계산하고, 시약별 평균 수율과 함께 알려진 반응 메커니즘과 비교하였다.

5.1 Buchwald–Hartwig




그림 6. BH 모델의 SHAP 요약. 상위 특성일수록 예측에 대한 기여가 크다.




그림 7. BH 시약별 평균 수율(이탈기, 리간드, 염기).

표 10. BH 모델 해석과 화학적 근거

데이터 및 SHAP 관찰	화학적 해석
기질 특성의 기여가 가장 큼. 상위 부분 구조는 방향족 C–Cl(평균 수율 6% 대 40%)과 메톡시기(20% 대 36%)	촉매 순환의 첫 단계인 산화적 첨가(oxidative addition)는 C–Cl 결합에서 가장 느리고, 전자 공여성 메톡시기가 이를 더 늦춘다. 4-클로로아니솔의 평균 수율은 1.9%
같은 C–Cl 이라도 피리딘 고리는 수율이 높음(2-클로로피리딘 43.5%)	전자 결핍성 헤테로아렌은 C–Cl 결합의 산화적 첨가를 촉진한다

데이터 및 SHAP 관찰	화학적 해석
리간드 중 XPhos 가 가장 낮음(20% 대 34~41%)	이 반응에서는 tert-부틸기 등 입체적으로 크고 전자가 풍부한 포스핀 리간드가 유리하다
에스터 치환 아이소옥사졸 첨가제가 가장 불리(9~20%)	아이소옥사졸의 N–O 결합에 팔라듐이 산화적 첨가하며 촉매가 피독된다(Ahneman 등, 2018). 전자 끄는 에스터기가 이 부반응을 촉진한다

5.2 Suzuki–Miyaura




그림 8. SM 모델의 SHAP 요약.

표 11. SM 모델 해석과 화학적 근거

데이터 및 SHAP 관찰	화학적 해석
이탈기별 평균 수율 I 59.5% > OTf 44.6% > Br 41.5% > Cl 22.1%	산화적 첨가의 반응성 순서(I > OTf > Br > Cl)와 일치한다
SHAP 1 위는 친핵체의 TPSA 로, 붕소 종을 구분하는 역할. BF_3K 염(25.5%)이 보론산(52.2%)보다 크게 낮음	트라이플루오로보레이트는 금속 교환(transmetalation) 전에 보론산으로 가수분해되어야 하므로 이 조건에서 느리다
두자리(bidentate) 리간드(Xantphos, dppf)가 수율을 낮춤	두자리 리간드는 팔라듐 착물의 배위 구조를 바꾼다. 이 조건에서는 한자리 리간드인 PPh_3(53%)가 가장 우수하고 Xantphos(16%)가 가장 불리하였다

모델이 의존한 특징은 산화적 첨가, 촉매 피독, 붕소 종 활성화라는 알려진 메커니즘과 일치하였다. 이는 모델의 추천이 우연한 상관이 아닌 화학적으로 타당한 정보에 기반함을 뒷받침하며, 서비스에서 추천 근거를 제시하는 기반이 된다.

6. 서비스 프로토타입: ReactPilot

연구 결과를 실제 스크리닝 워크플로로 구현한 웹 프로토타입이다. Pfizer 공개 SM 데이터 15 쌍을 대상으로, 사용자가 반응을 선택하면 모델이 384 개 조건의 순위를 제시하고 추천 순서대로 실험을 진행하는 과정을 재현한다. 실험 결과는 데이터에 기록된 실측 수율을 사용한다.




그림 9. ReactPilot 화면. 반응 선택, 시약 3D 구조와 추천 순위, 진행 현황과 검증 지표.

표 12. ReactPilot 입출력

구분	내용
사용자 입력	반응(기질 쌍) 선택, 다음 배치 실행, 3D 구조 확인할 시약 선택
추천 순위	384 개 조건(리간드 × 염기 × 용매)의 예측 수율 순위. 배치 결과 반영 시 재계산
실험 기록 및 수렴 곡선	실험 조건별 실측 수율, 현재 최고 수율, 무작위 선택과의 비교
적용 영역 (applicability domain)	학습 데이터에 동일 기질을 포함한 반응 수 표시
검증 지표	미학습 반응 15 개에서 측정한 추천 성능(hit@20 87% 등)

예시 화면의 6-클로로퀴놀린 + 인다졸 보론산 반응에서는 첫 번째 추천 실험에서 최고 수율(93.7%) 대비 5%p 이내의 조건을 찾았다. 같은 반응에서 무작위 선택 시 기대 실험 수는 43 회이다.

7. 차별점 및 활용 방안

7.1 차별점

- 검증 투명성: 미학습 반응 기준의 추천 성능과 신뢰구간을 사용자에게 공개한다. 기존 상용 서비스는 대체로 내부 검증 지표를 공개하지 않는다.
- 설명 가능성: SHAP 기반 해석이 알려진 반응 메커니즘과 일치함을 확인하였으며, 이를 추천 근거로 제시할 수 있다.
- 경량 구조: GBDT 앙상블로 일반 PC 에서 학습과 추론이 가능하다. 데이터 보안이 중요한 제약사가 온프레미스로 설치해 자사 HTE 데이터로 재학습할 수 있다.
- 워크플로 호환성: 자동화 장비 없이 기존 96-웰, 384-웰 플레이트 기반 HTE 에 추천 순위만 추가하면 된다.

7.2 활용 방안

주요 고객은 제약사와 위탁개발생산(CDMO) 기업의 공정 개발 조직이다. 신규 기질에 대해 1 차 스크리닝 조건을 추천받고, 결과를 입력해 후속 배치를 추천받는 방식으로 활용한다. 본 연구 결과 기준으로 BH 에서는 준최적 조건 도달까지의 실험이 약 65%, SM 순차 최적화에서는 약 50% 감소한다. 사내 축적 HTE 데이터로 재학습하면 각 기업의 주력 반응에 특화된 추천이 가능하다.

8. 결론 및 향후 계획

본 연구는 공개 HTE 데이터 두 종으로 미학습 기질의 수율 예측과 반응 조건 우선순위 추천 모델을 개발하고, 이를 웹 프로토타입으로 구현하였다. 분자 표현 기반 LightGBM 은 동일 표현의 선형 모델 대비 수율 예측(BH MAE 15.8 → 11.8%p)과 제로샷 추천(SM regret@8 15.3 → 5.0%p)에서 유의하게 우수하였고, 무작위 대비 준최적 조건 도달까지의 실험 수를 BH 65%, SM 순차 최적화 약 50% 줄였다. 모델의 판단 근거는 알려진 반응 메커니즘과 일치하였다.

향후 계획은 다음과 같다.

- 타 기관 HTE 데이터 및 다른 반응 유형(아마이드 결합 형성 등)으로 확장

- 실제 스크리닝에 추천 순위를 적용한 전향적 검증(prospective validation)
- 사용자 데이터 업로드 및 재학습 기능 구현

참고문헌

[1] Ahneman, D. T., Estrada, J. G., Lin, S., Dreher, S. D., Doyle, A. G. (2018). Predicting reaction performance in C–N cross-coupling using machine learning. Science, 360, 186–190.

[2] Chuang, K. V., Keiser, M. J. (2018). Comment on "Predicting reaction performance in C–N cross-coupling using machine learning". Science, 362, eaat8603.

[3] Perera, D., Tucker, J. W., Brahmbhatt, S., et al. (2018). A platform for automated nanomole-scale reaction screening and micromole-scale synthesis in flow. Science, 359, 429–434.

[4] Schwaller, P., Vaucher, A. C., Laino, T., Reymond, J.-L. (2021). Prediction of chemical reaction yields using deep learning. Machine Learning: Science and Technology, 2, 015016.

[5] Shields, B. J., Stevens, J., Li, J., et al. (2021). Bayesian reaction optimization as a tool for chemical synthesis. Nature, 590, 89–96.

[6] Strieth-Kalthoff, F., Sandfort, F., Kühnemund, M., et al. (2022). Machine learning for chemical reactivity: the importance of failed experiments. Angewandte Chemie International Edition, 61, e202204647.

[7] Ke, G., Meng, Q., Finley, T., et al. (2017). LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree. Advances in Neural Information Processing Systems, 30.

[8] Lundberg, S. M., Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. Advances in Neural Information Processing Systems, 30.