

## 2010 年第一届全国大学生数学竞赛决赛

### (数学专业) 试卷

#### 一、填空题 (共 8 分, 每空 2 分)

(1) 设  $\beta > \alpha > 0$ , 则  $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x^2} - e^{-\beta x^2}}{x^2} dx =$  \_\_\_\_\_.

(2) 若关于  $x$  的方程  $kx + \frac{1}{x^2} = 1 (k > 0)$  在区间  $(0, +\infty)$  中有惟一实数解, 则常数  $k =$  \_\_\_\_\_.

(3) 设函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上连续. 由积分中值公式有

$$\int_a^x f(t) dt = (x - a)f(\xi) \quad (a \leq \xi \leq x < b).$$

若导数  $f'_+(a)$  存在且非零, 则  $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{\xi - a}{x - a}$  的值等于 \_\_\_\_\_.

(4) 设  $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 6$ , 则  $[(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{b} + \vec{c})] \cdot (\vec{a} + \vec{c}) =$  \_\_\_\_\_.

二、(10 分) 设  $f(x)$  在  $(-1, 1)$  内有定义, 在  $x = 0$  处可导, 且  $f(0) = 0$ . 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right) = \frac{f'(0)}{2}.$$

三、(12 分) 设  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上一致连续, 且对于固定的  $x \in [0, \infty)$ , 当自然数  $n \rightarrow \infty$  时  $f(x + n) \rightarrow 0$ . 证明函数序列  $\{f(x + n) : n = 1, 2, \dots\}$  在  $[0, 1]$  上一致收敛于 0.

四、(12 分) 设  $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$ ,  $f(x, y)$  在  $D$  内连续,  $g(x, y)$  在  $D$  内连续有界, 且满足条件:

(1) 当  $x^2 + y^2 \rightarrow 1$  时,  $f(x, y) \rightarrow +\infty$ ;

(2) 在  $D$  内  $f$  与  $g$  有二阶偏导数,  $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = e^f$  和  $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} \geq e^g$ .

证明:  $f(x, y) \geq g(x, y)$  在  $D$  内处处成立.

五、(共 10 分) 分别设  $R = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1; 0 \leq y \leq 1\}$

$$R_\varepsilon = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1 - \varepsilon; 0 \leq y \leq 1 - \varepsilon\}.$$

考虑  $I = \iint_R \frac{dx dy}{1 - xy}$  与  $I_\varepsilon = \iint_{R_\varepsilon} \frac{dx dy}{1 - xy}$ , 定义  $I = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} I_\varepsilon$ :

(1) 证明  $I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ ;

(2) 利用变量替换:  $\begin{cases} u = \frac{1}{2}(x+y) \\ v = \frac{1}{2}(y-x) \end{cases}$  计算积分  $I$  的值, 并由此推出  $\frac{\pi^2}{6} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ .

六、(13 分) 已知两直线的方程:  $L: x = y = z, L': \frac{x}{1} = \frac{y}{a} = \frac{z-b}{1}$ .

(1) 问: 参数  $a, b$  满足什么条件时,  $L$  与  $L'$  是异面直线?

(2) 当  $L$  与  $L'$  不重合时, 求  $L'$  绕  $L$  旋转所生成的旋转面  $\pi$  的方程, 并指出曲面  $\pi$  的类型.

七、(20 分) 设  $A, B$  均为  $n$  阶半正定实对称矩阵, 且满足  $n-1 \leq \text{rank } A \leq n$ . 证明存在实可逆矩阵  $C$  使得  $C^T A C, C^T B C$  均为对角阵.

八、(15 分) 设  $V$  是复数域  $\mathbb{C}$  上的  $n$  维线性空间,  $f_j: V \rightarrow \mathbb{C}$  是非零的线性函数,  $j = 1, 2$ .

若不存在  $0 \neq c \in \mathbb{C}$  使得  $f_1 = c f_2$ , 证明: 任意的  $\alpha \in V$  都可表为  $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$  使得

$$f_1(\alpha) = f_1(\alpha_2), f_2(\alpha) = f_2(\alpha_1).$$