

问：前两年体检就检查出来患有冠心病，一直都在接受治疗，但是效果不怎么好。一直都是有心绞痛，忍受了这么多年，我真的怕了。想问一下冠心病，心绞痛怎么治疗？

答：冠心病是一种心脏疾病，会导致心绞痛等症状。治疗方面，如果血管病变不是很严重，可以使用药物治疗。如果血管病变比较严重，需要通过微创支架植入治疗或者手术搭桥治疗。

问：我前些日子觉得身体不舒服，而且总是起夜，觉得尿急，但是尿量不多，尿道口还总是疼痛，在冬季复发主要是天气渐渐转冷，去医院检查，医生说慢性前列腺炎。为什么冬天前列腺炎容易复发？

答：冬季天气渐渐转冷，患者炎症发作诱发夜尿次数增多，出现尿道梗阻的症状。此外，老年患者在冬季要注意保暖，不要着凉，不要用冷水洗手，不要喝酒。在饮食上要注意多吃蔬菜，水果，避免便秘，这是因为便秘会导致尿频或排尿困难，加重病情。一些患者因为怕尿频而采取少喝水的办法调理病情，这种方法也是不可取的。

问：我母亲今年54岁，经常出现头晕现象，而且头晕得很厉害，有时候连躺在床上转动头时都会晕。去测量血压只有40-60左右，检测血液、尿样均正常，医生诊断为血压偏低，但不是贫血。在进行治疗后血压升到80左右时症状就会减轻很多；但

答：根据您的描述，头晕和低血压可能是由于内分泌失调引起的。建议结合中药治疗来缓解症状。您可以咨询医生或中医师，以获取更详细的建议和治疗方案。

问：我父亲年近五十，最近总是头晕跟喝晕就一样。去医院什么也没检查出来。医生说是神经性头晕，开药吃也不见好。备注：他干活的时候不头晕，不干活的时候头晕。吃什么药好？

答：根据您的情况，您父亲在干活时不头晕，在不干活时才头晕，这可能与活动有关。除了神经性头晕外，还有其他可能的原因，如高血压病、颈椎病、美尼尔症等。另外，消化道问题也可能引起不适。建议您父亲检查血压和血脂情况，如果正常，可以考虑就诊消化科进行进一步检查。

问：前段时间我的饮食不好，每次吃饭的时候都没有食欲，体重也下降了，饭后还出现恶心，呕吐食物还出现了进行性的吞咽困难，钡餐检查结果是食管癌随即最了手术，手术顺利现在身体正在恢复阶段，要接受化疗，不知道恶性肿瘤化疗期间的饮食应该注意哪些方面。想得到怎样的帮助:请问恶性肿瘤化疗期间的饮食？

答：化疗期间需要注意补充足够的营养，以提高免疫力和抵抗力，减少化疗的不良作用。在饮食调理上，应该补充足够的优质蛋白，可以选择低脂肪的鸡肉、鱼肉和奶制品，也可以食用富含植物蛋白的豆类食品。

问：近两年肠胃一直不适，具体表现为：1.畏凉性食品，喝凉水、水果都可能引起肠胃不适；2.消化能力差，刚吃完饭经常有饱胀感，嗝气，有

答：根据您的描述，您可能患有胃寒和胃炎。建议口服温胃舒胶囊、法莫替丁片和阿莫西林胶囊，并经常做腹部电热宝热敷，避免刺激性饮食和腹部受凉，不吃冷饮。此外，还建议自己摸索适合自己的饮食规律，逐步提高胃肠抵抗力和适应能力。如果体重低于标准体重，可以考虑每天晚餐前皮下注射胰岛素来增加体重。请注意，这只是初步的建议，如果症状持续或加重，请及时就医。

问：今天刚检查是肛瘘，需要手术治疗，请问：当天住院什么时间能手术？需要家属护理吗？大概费用多少？（轻的低位性肛瘘）

答：一般来说，手术时间需要根据医生的安排和病情的严重程度来定，具体需要咨询医生。手术后需要有专人进行护理和看护，家属可以自行决定是否需要陪护。费用方面需要根据当地医院的价格规定来定，一般需要在医院进行咨询和了解。对于低位性肛瘘，手术后效果比较好，建议及时进行治疗。

问：最近这几天我感觉自己很恶心头晕，就去医院做了一个检查，过了几天之后，检查结果出来了，医生告诉我是眩晕症病发。眩晕症的病因有哪些？

答：眩晕症的病因主要有脑血管性眩晕、内耳疾病、药物性眩晕、神经系统疾病、心理因素等。其中，脑血管性眩晕是最常见的一种，缺血性和出血性均可引起，以后者多见，通常起病较急。内耳疾病也是常见的病因之一，如良性阵发性位置性眩晕、前庭神经炎等。药物性眩晕是由于某些药物的副作用引起的，如抗生素、镇静剂等。神经系统疾病如多发性硬化、帕金森病等也可引起眩晕症状。心理因素如焦虑、抑郁等也可能导致眩晕症状。

问：我朋友前一段时间经常会感到口干舌燥的，一个人无缘无故的消瘦下去，去医院检查说是得了糖尿病，现在她的血糖有点偏高，医生开了点药调理，吃了一段时间血糖是有下降。听说血糖高饮食也很关键。

答：糖尿病患者的饮食控制很重要，需要注意的饮食禁忌有：易于使血糖迅速升高的食物，含热量较高的食物，烟、酒以及辛辣等刺激性食物等。饮食应清淡，口味不宜太重，太辣太咸的东西都不适宜给糖尿病患者吃。

问：你好我的血糖早上空腹是5.9，餐后是4.6.是不是有点高呀？接近糖尿病的边缘了？请指教

答：根据您提供的血糖数据，您的空腹血糖为5.9，餐后血糖为4.6。根据正常范围，您的血糖水平都在正常范围内，不属于糖尿病。建议您不要过于担心，但如果出现低血糖症状，如心悸、头晕、乏力等，应及时进食补充血糖。另外，建议您定期进行体检，以便及早发现病情并进行治疗。

问：原发性高血压，服药前95到140，没到医院专门看过。目前口服厄贝沙坦片和倍他乐克，各一片0.15/天。血压控制效果不明显，服药后85到130左右，下午会升高。

答：建议患者按照医生的处方规定服用药物，同时注意饮食和生活习惯的调整，如低盐、低糖低脂饮食、戒烟限酒，多运动。此外，建议患者到医院进行血液化验、肾脏及血管的超声检查，以便及时发现并治疗可能存在的并发症。

问：高血压低压106高压144算不算高得很。我问一下高压144低压106算不算高的很

答：高压144低压106，根据中国高血压防治指南指导分级为2级高血压。建议进一步心内科诊治，行心电图、眼底、肾功能等相关检查明确有无高血压并发症。

问：我肚子右边疼痛，自己觉得是肝部，因为自己老是不愿吃饭，闻见油味就恶心，到医院检查，果然是肝出了问题，得了肝癌，我就想知道我这样，要咋办好。得了肝癌要咋办好？

答：肝癌是一种恶性肿瘤，早期手术治疗是根本的方法，治疗效果与治疗时机有关，越早治疗效果越好。肝癌的治疗方法包括手术切除、肝移植、介入治疗、化疗、放疗等，具体治疗方法需要根据患者的具体情况而定。治疗后的护理和后期的治疗也是非常重要的，需要患者和家属重视。

问：尿酸过高，手、脚关节痛曾经的治疗情况和效果：2016年初开始治疗一直吃“秋水仙碱”来控制尿酸，饮食也特别注意，每三四个月脚踝痛，偶尔痛到需要打止痛针，2017开始夜间小便痛，B超显示有尿道结石，吃过一段排结石的药，半年后查出肾结石，去打过一次肾结石，同时也吃一些排结石的药，可是尿酸一直未降下来，2018年初到今常常痛风发作脚痛，两次结石痛，10月又打了一次肾结石。请问，尿道结石导致小便困难，每天继续喝2千毫升的水对肾会有负担吗？目前的症状来看，什么治疗比较能缓解？痛风一直没好脚裸痛有什么治疗能缓解？

答：尿酸过高导致痛风，需要进行综合治疗。治疗方面，首先需要注意饮食，避免摄入高嘌呤食物，如动物内脏、骨髓、海味等。而水果、蔬菜、牛奶、鸡蛋等则不含嘌呤，可以多食用。此外，多喝水有助于尿酸从肾脏排出。药物方面，可以选择降低血尿酸的药物，如别嘌呤醇。对于关节疼痛症状，可以使用非甾体类抗风湿药，如消炎痛、布洛芬等，来缓解疼痛。以上是对“痛风一直没好脚裸痛有什么治疗能缓解”这个问题的建议，希望对您有帮助，祝您健康！

问：我两年前脚肿，而且很痛，去医院检查发现是痛风，这两年一直被痛风折磨着，今年又检查出来因为痛风引起了高血压，不知道有什么好的治疗方法，用什么药治疗比较好？

答：你好，对于你的情况，治疗痛风的药物方面可以选择降低血尿酸的药物，如别嘌呤醇。此外，还可以使用非甾体类抗风湿药物，如消炎痛、布洛芬等，来缓解关节疼痛症状。对于高血压的治疗，建议你咨询医生，根据具体情况选择合适的药物治疗。

问：下腰痛、尿流滴沥、排尿次数增多。之前去医院查出有前列腺囊肿，医生开的药也吃了，可是没有什么用处。我想知道前列腺囊肿有效的治疗方法哪些好。

答：前列腺囊肿的治疗方法有药物治疗和引流术治疗。患者在选择治疗方法时应该去有资质的医院进行相应的检查再医治。

问：最近感冒导致了慢性肾炎的发作感冒长时间的也不好如何治疗慢性肾炎效果最好。如何治疗慢性肾炎效果最好

答：建议采用中医疗法“三维益肾”平衡修复疗法，全方位修复肾脏组织细胞，消除炎症，有效改变病理特征，解决肾小球肾病引起的水肿、血尿、高血压等症状，是治疗慢性肾炎效果最好的方法之一。同时，也需要注意保暖，避免感冒等疾病的发作加重肾炎的症状。

问：我是一名中年男性，今年四十一岁了，我以前得过慢性前列腺炎症，听说这个病对于性功能是有一定的影响的，我想知道如果慢性前列腺炎症之后如果性功能差，那应该怎么办啊？

答：对于慢性前列腺炎症导致性功能差的问题，需要积极治疗，首先要确诊，然后选择相应的抗炎药物进行治疗，同时注意生活习惯，不要过度纵欲，不要频繁手淫等。

问：最近，自己觉得不舒服，然后就到医院去做了个检查和验血，结果下来，医生说是糖尿病，所以想问一下应该怎么办。

答：糖尿病是一种慢性疾病，需要长期的管理和治疗。治疗糖尿病的目标是控制血糖水平，减少并发症的发生。饮食控制是糖尿病管理的重要方面，需要避免摄入过多的含糖食物和饮料，尽量选择低糖、低脂、高纤维的食物。此外，适量的运动也有助于控制血糖，可以选择适合自己的运动方式，如散步、跑步、游泳等。药物治疗也是糖尿病管理的一部分，根据医生的建议，按时按量服用药物。此外，定期复查血糖、血压、血脂等指标，及时调整治疗方案。糖尿病是一种需要长期管理的疾病，建议与医生保持良好的沟通，按照医生的建议进行治疗和管理。

问：妻子这几天忙着收拾家我都没在家都是她自己干，累坏了经常说自己的关节疼，也没在意后来疼的厉害还有点发烧，去医院检查说是痛风，这个病的分期和症状表现是什么呢。

答：痛风的自然病程可分为四期，即无症状高尿酸血症期、急性期、间歇期、慢性期。临床表现如下：急性痛风性关节炎多数患者发作前无明显征兆，或仅有疲乏、全身不适和关节刺痛等。典型发作常于深夜因关节痛而惊醒，疼痛进行性加剧，在12小时左右达高峰，呈撕裂样、刀割样或咬噬样，难以忍受。受累关节及周围组织红、肿、热、痛和功能受限

问：自己是肾阴虚还是肾阳虚。肾阳虚症状:腰痛；畏寒、肢冷、手脚冰凉；头晕乏力；气短；自汗；尿频、大便溏、五更泻；浮肿；脱发；阳痿早泄、不孕不育

答：根据提供的症状，初步判断为肾阳虚。肾阳虚的症状包括腰痛、畏寒、肢冷、手脚冰凉、头晕乏力、气短、自汗、尿频、大便溏、五更泻、浮肿、脱发、阳痿早泄、不孕不育等。治疗肾阳虚可以通过中医药调理和改善生活习惯来改善症状。

问：我很苦恼，我因为工作原因得了这个病，我的饮食也很不规律，去看了很久都没有治好。我还有老婆孩子，不想让家里人担心，我想知道前列腺炎引起睾丸疼痛怎么办？

答：前列腺炎是由炎症感染导致的，当患有前列腺炎的时候，炎症会沿着生殖系统侵犯睾丸，引起睾丸也会发炎。同时前列腺炎可出现疼痛的症状，疼痛也会放射至睾丸，引起睾丸疼痛。建议及时就医，进行及时得当的治疗，以免影响生殖系统，造成性功能下降或引起不育。

问：医生你好，最近老是发些不正常，跟老婆那个事情的时候不太顺利，每次都是几分钟就射精了，虽然老婆也没有说什么，但是自己的感觉不太舒服，觉得自己是不是得了阳痿早泄，不知道阳痿早泄能治疗得好不？咨询一下阳痿早泄该怎么治疗？

答：阳痿早泄的治疗方法因病因而异，常见的引起早泄的原因包括心理紧张、结构性因素、包皮过长、精神紧张、压力大、注意力不集中、长期手淫导致前列腺疾患等等。治

疗时需要明确病因，可以去正规医院做检查，然后进行针对性的治疗。此外，平时可以多吃一些具有补肾固精作用的食物，养成良好的生活习惯。

问：长期服用卡托普利，降压不明显男60患者男，60岁，高血压病史5年，脑出血三次，长期口服卡托普利，血压维持在100/150mmhg，偶有头晕不适三天前在当地医院行生化检查无明显异常，心电无异常，无过敏史是否需要加用或改用其他降压药

答：根据患者的情况，他已经在口服卡托普利一段时间了，但降压效果不明显。因此，建议他咨询医生，考虑加用或改用其他降压药物来更好地控制他的血压。一些推荐的药物包括依那普利、吲达帕胺、硝苯地平缓释片等。这些药物比较经济，效果还可以，但具体的效果还需要经过治疗才能知道。最好在医生的指导下进行药物调整。

问：我家小孩快一岁一个月，刚开始学走路，是老人带，小孩就自己扶着墙左右走，有半个月了，我发现小孩左脚稍微有点向外撇，不是很明显。怎么办

答：小孩子刚开始学走路，有些姿势不标准是正常的，需要家长耐心引导和训练。建议家长多让孩子自己走，不要让他扶东西，可以给孩子提供一些玩具或者球等，让他自己去拿，这样可以锻炼孩子的平衡能力。同时，家长也要注意周围环境，避免孩子磕碰受伤。

问：我的伴儿几年前患了荨麻疹，时不时起一些大大小小的风团，他又感觉很痒，一起这个他总感觉很难受，他这个是血管性的荨麻疹，这种荨麻疹有什么方法治阿？，荨麻疹中又血管性水肿怎么治？

答：血管性荨麻疹的治疗方法包括使用H1受体拮抗剂口服，对于伴有喉头水肿、低血压及有明显胃肠道症状的患者，可以给予0.1%肾上腺素皮下或肌肉注射。异丙肾上腺素或肾上腺素雾化吸入也是一种治疗选择。此外，口服6-氨基己酸或止血芳酸也可以作为治疗的选择。

问：前列腺钙化引发的后果有哪些

答：前列腺钙化引发的后果包括：1、前列腺钙化灶一般是炎症遗留的瘢痕，如果不及时的治疗还会诱发精囊炎、睾丸炎、附睾炎等，还会出现阳痿早泄等性功能异常，不仅会影响性生活质量还会影响到生育功能。2、前列腺结石是指在前列腺组织或腺泡中形成的结石。前列腺结石本身可无症状，出现症状多半是由于前列腺增生、尿道狭窄或慢性前列腺炎。但前列腺钙化灶不可能完全消失，只要在一定的范围内，如无不适症状，影响不大。3、慢性前列腺炎时会造成精子的成活率低，精液液化时间延长，致使受孕率降低。

问：这段时间孩子总有些嗜睡，看了中医调理了一个月，没有什么大的效果，后来去了医院检查，医生诊断是患了嗜睡症。导致嗜睡症的病因有哪些？

答：嗜睡症的病因有很多种，其中包括糖尿病、甲状腺机能减退等。此外，最新统计显示，接种甲流疫苗后患上嗜睡症的概率也比未接种者高出很多。

问：有什么治疗食道癌的好中医方子中医对食道癌有什么好的配方呢，现在老人疼的利害，也吃不下饭请问有什么比较好的中医方子来减轻一下老人的痛苦？

答：中医治疗食道癌需要根据患者的病情、体质等进行辨证施治，才能明确药方。现在

首要目的是减轻老人的痛苦，使老人吃好睡好，两便正常。中医通过内服加外敷来减轻癌痛，且不会产生耐药性，缓解痛苦效果好。对于食道癌不能正常入食的病人，中医中药有个很好的汤剂，称为“开关汤”。此汤对于大多数饮食困难的患者效果都很好，能让病人很快正常饮食，保持体力。中药具有活血化瘀，清热解毒，软坚散结等作用，能有效控制病情发展，缓解临床症状，提高病人生活质量，延长生命。

问：最近这段时间，总觉得头晕眼花，看东西时间长，眼睛就会干涩的很，总是要眨眼睛，不停的用手去揉，眼睛全都是红血丝，点了滴眼液，没什么效果，都好几天了，还是这样，难受的很。眼干眼涩是什么原因？

答：眼干眼涩的常见原因有维生素A缺乏、长时间使用电子设备、中老年人泪液分泌功能减退以及干眼症等。建议您去医院做个检查，明确病因后再对症治疗。同时，多吃含有维生素A的食物也有助于保护眼睛健康。

问：我想知道白癜风会引起其他并发症吗，因为自己本身是遗传的白癜风，但是不知道会不会引起哪些的并发症？

答：白癜风通常不会伴发其他疾病，但是极少数情况下会伴发自身免疫性内分泌疾病，如甲状腺疾病，糖尿病，恶性贫血，异位性皮炎，斑秃，支气管哮喘等。其中甲状腺功能障碍最常见，糖尿病也在白癜风中非常普遍，但是白癜风与这些疾病间的相关性的确切程度是仍不能确定的。

问：最近一段时间老是觉得我的胃口不是很好，有的时候上厕所就会发信有便血的症状，而且现在就是一一直在失眠，有的时候还会呕吐。结肠炎出现的早期症状？

答：结肠炎的早期症状包括腹痛、腹泻、便秘和大量便血。建议您去正规医院找专科医生进行检查，并接受对症治疗。如果还有其他疑问，可以随时咨询我。

问：我高血压病20年了，现在收缩压高，舒张压低请专家给于治疗方法想得到的帮助

：治疗办法，服降压药20年了，造成舒张压低，请给于治疗办法

答：根据您的描述的情况，您可能患有单纯老年收缩期高血压。建议您暂时使用氨氯地平降压药物进行治疗。此外，您还应该注意饮食和生活习惯的调整，如多喝水、低脂低盐饮食、适当进行锻炼等。同时，定期测量血压以监控病情的变化。如果症状持续或加重，请及时就医咨询专业医生的意见。

问：我最近老是感觉心烦意乱的、而且脾气特别的大、我今年都60了、55岁才绝经的、当时也没什么特别的感觉、最近在吃安神的药物、睡眠质量也不好、睡觉特别的轻、请问到了60岁还会得更年期综合征吗？。60岁会得更年期综合征吗？

答：60岁的女性也有可能出现更年期综合症状，包括阵发性烘热、出汗、胸闷、气短、心悸、眩晕、血压忽高忽低等心血管症状，以及易于激动、紧张、有时忧郁、好哭和皮肤异样感觉等精神神经症状。建议平常注意饮食，不要长期使用药物治疗。

问：父亲患有癫痫，一直在采用药物治疗，最近发作时会感觉到胸闷，呼吸不畅的现象，发作后头会出现晕眩，想知道癫痫患者发作时胸闷怎么办呢？癫痫患者发作时胸闷怎么办

答：癫痫发作时，家人或护理人员应该帮助患者保持呼吸通畅。可以让患者坐起来或半坐着，以减轻胸闷感。同时，可以给患者提供新鲜空气，打开窗户或使用风扇。如果患者有呼吸困难的状况，可以使用氧气面罩或呼吸机来辅助呼吸。此外，还可以使用镇静

剂或抗焦虑药物来缓解患者的紧张情绪，从而减轻胸闷感。重要的是，家人或护理人员应该密切观察患者的症状，并及时就医寻求专业的医疗帮助。

问：我最近手腕处酸疼，尤其是骨头关节处疼的比较严重，受凉沾凉水之后会头痛加剧，后来发现手关节都红肿了，贴几贴膏药还是疼，去了医院就检查出了痛风了。想知道痛风平时怎么调理？患上痛风怎么做调理？

答：痛风的调理主要是通过控制尿酸水平来缓解症状和预防病情进展。多喝水可以增加尿量，促进尿酸的排泄，同时也可以稀释尿液，减少尿酸的沉积。此外，痛风患者应该注意饮食，避免高嘌呤食物的摄入，如动物内脏、海鲜、啤酒等。适当控制体重，避免过度劳累和受凉，也有助于缓解症状。在痛风病发时，可以采取冰敷，降低发热状态，同时取到很好的镇痛效果。

问：：一个同事的爷爷这两天诊断出来了前列腺癌，是中期，想问问现在到了前列腺癌中期，怎么样治疗比较好？想得到怎样的帮助：前列腺癌中期怎么治疗

答：对于前列腺癌中期的治疗，建议采用综合治疗方法。这包括手术、放疗和内分泌治疗等手段。手术可用于切除肿瘤组织，而放疗和内分泌治疗可以帮助减少肿瘤生长和扩散。综合治疗方法可以提高治疗的成功率。同时，与医生密切合作，并遵循医生的建议和治疗计划也是非常重要的。希望你的同事的爷爷能够早日康复！

问：我才不到五十岁，手背上这些年就开始长老年斑了，颜色很深，还挺多的，特别难看，很影响个人形象，想通过什么办法去掉。

答：老年斑是一种皮肤病，目前医疗技术上没有特效药物可以治疗老年斑，只能通过一些物理手术进行去除，如二氧化碳激光、液氮冷冻、铒激光等技术手段去除，或直接刮除、手术切除。日常护理可以有效地改善老年斑的状态，使皮肤的状态有所回升。老年斑和维生素E的缺乏有很大关系，因此可以常吃醋加蜂蜜可以改善。

问：血脂升高程度的界定：如胆固醇或甘油三酯什么水平为轻度升高？什么水平为中度升高？什么水平为重度升高？谢谢！

答：血脂升高程度的界定标准如下： 1. 总胆固醇（TC）：轻度升高为5.18-6.19mmol/L，中度升高为6.20-7.79mmol/L，重度升高为≥7.80mmol/L。 2. 甘油三酯（TG）：轻度升高为1.70-2.25mmol/L，中度升高为2.26-5.64mmol/L，重度升高为≥5.65mmol/L。

问：肺癌临终症状都有哪些肺癌晚期临终前症状问题，现在已经晚期了，我们想知道肺癌晚期临终前症状，还请专家详细解答肺癌晚期临终前症状都有哪些

答：肺癌晚期症状因人而异，但临终前症状和晚期症状相似，包括咳嗽、呼吸困难、吞咽困难、消瘦乏力等。建议采用中医治疗，缓解症状，控制病情，增强免疫力和及时补充身体的维生素等作用。同时，保持一个好的治疗心态。

问：我还年纪轻轻就被查出患有严重的糖尿病，身体的体重实在是太吓人了，想问问糖尿病患者不能吃什么啊，医生告诉我好多，我也没记住，希望专家能够给我一个详细的解答，谢谢！想得到怎样的帮助:糖尿病患者不能吃什么？

答：糖尿病患者应该避免食用高糖食物，如糖果、蛋糕、巧克力等。此外，他们还应该

限制摄入高脂肪食物，如油炸食品、猪肉、牛肉等。另外，糖尿病患者应该控制摄入高盐食物，如咸菜、腌制食品等。饮食应该以低脂、低糖、低盐为主，多摄入蔬菜、水果、全谷类食物和瘦肉。最好咨询医生或营养师，制定适合自己的饮食计划。

问：我怀孕已经39周了，最近检查出来血糖高，我不知道怎么会发生这样的状况，怀孕期间检查除开这个，我们全家都有点担心会影响胎儿，所以就想问一下这时候会有影响吗？

答：在怀孕39周的时候出现血糖增高，之前不存在高血糖，对胎儿是没有影响的。因为胎儿马上临产，已经基本成熟，糖尿病对胎儿最主要的影响就是体重增长过快，发育加快等影响。检查出来这个平时不要吃含糖高的食物。

问：专家您好，我结婚有段日子了，最近发现阴茎勃起时有时硬度不够，为这事我很苦闷，所以想咨询一下专家为何有时阴茎勃起硬度总是不够啊？谢谢

答：阳痿的原因有很多种，包括精神因素、神经病变、前列腺炎、生殖系统病变、药物影响、内分泌失调等等。此外，手淫过频也可能会引起阳痿。

问：两个月前开始经常会觉得咬东西没有力气，一开始是咬不动肉，然后慢慢的连咬面包都觉得困难了，去医院检查考虑是重症肌无力。现在想知道重症肌无力有哪些症状。重症肌无力有哪些症状？

答：重症肌无力的症状主要是肌肉无力。常见症状包括一侧或双侧眼外肌麻痹，如上睑下垂、斜视和复视，重者眼球运动明显受限，甚至眼球固定，但瞳孔括约肌不受累。面部及咽喉肌受累时出现表情淡漠、苦笑面容；连续咀嚼无力、饮水呛咳、吞咽困难；说话带鼻音、发音障碍等。累及胸锁乳突肌和斜方肌时则表现为颈软、抬头困难，转颈、耸肩无力。四肢肌肉受累以近端无力为重，表现为抬臂、梳头、上楼梯困难，腱反射通常不受影响，感觉正常。

问：你好，我大叔他今年59岁了，患糖尿病有好多年了，一直吃药一直看医生，就是效果不好，现在越来越厉害了，请问有什么治疗的好办法吗？请问糖尿病的治疗方法

答：糖尿病的治疗需要根据患者的个体情况来确定，包括血糖水平、胰岛功能以及是否有并发症等。治疗方案应该是个体化的，不能盲目用药，以免延误病情。治疗糖尿病需要从以下五个方面入手：药物治疗、饮食疗法、运动疗法、糖尿病教育和血糖监测。如果其中一个环节做得不好，都会影响治疗效果。

问：自从自己检查出来得了前列腺炎之后就一直都在积极的接受治疗可是现在还是没有得到好的效果这些天经常会感觉尿频尿急比较严重平时的生活中需要注意什么。前列腺炎的患者不能做什么？

答：前列腺炎患者需要注意忌酒少吃辛辣食物；防止受凉和感冒避免久坐每小时要活动一次；通便、坐浴和提肛锻炼降的性生活；多喝水不憋尿保持排尿通畅；多吃蔬菜水果补充前列腺所需维生素和锌。

问：最近总是感觉自己头晕晕的，有些难受，之后感觉食欲也不是很好，去医院做了身体检查才知道患有高血压，这应该怎么解决？

答：患有高血压的人需要注意饮食的合理安排，避免暴饮暴食，多吃含有纤维素和维生素的食物，同时也要多吃一些清淡的食物，多吃一些含有丰富蛋白质的豆制品，或者瘦

肉和粥类的食物，同时也要保持体内水分的平衡，要控制饮食中胆固醇的摄入量，要做好戒烟戒酒，注意经常地进行身体锻炼。

问：医生您好，我检查血糖空腹正常，1小时后为9.46，两小时后正常，胰岛素空腹正常，餐后一小时为126,餐后两小时为71是不是有问题

答：根据你的检查结果来看，餐后1小时的血糖偏高，但还未达到糖尿病的诊断标准，属于糖耐量稍有异常的情况。你可以先通过改变生活方式来调整，减少摄入含糖高的食物，增加蔬菜和水果的摄入量，多进行运动，控制体重，不要饮酒。这样的措施应该就可以缓解问题。如果有其他疑问，请及时告诉我。

问：帕金森病的症状有哪些？治疗帕金森病有效疗法有什么？姥姥老是手部震颤，这是怎么回事？。是帕金森吗？什么原因导致的

答：帕金森病是一种神经系统退行性疾病，常见症状包括：1-手部震颤；2-肌肉僵硬；3-运动迟缓；4-平衡障碍；5-语言障碍。治疗方法包括药物治疗、手术治疗和康复治疗。手部震颤是帕金森病的常见症状之一，但也可能是其他疾病的表现，需要到医院进行详细检查确定病因。建议到正规医院进行检查，寻求专业医生的帮助。

问：我这个学期脚跟骨痛了3-4次都是睡醒和座着座的痛起来的不动它就不痛就是走路按它还有扭脚的时候痛这和尿酸高有关系？

答：根据你所描述的情况，可能与尿酸高有关，需要考虑高尿酸血症、痛风的可能性。痛风目前还不能根治，但适当的药物及饮食控制可以防止痛风的复发，可以使用别嘌醇以及秋水仙碱治疗，要远离海鲜和少吃肉制品。

问：网上看了你对痛风病友的回复感觉治疗思路清晰。我发痛风已有十几年从一开始发作不吃啥药一星期就自然好了到现在发作时吃双氯芬酸钠十来天症状稍有好转肠胃感觉不好受药就停了，但2天关节红肿疼痛又来了。我想问医生上述二种药可以长时间服用吗？一个月？二个月？

答：痛风的治疗主要是通过降低血尿酸水平来缓解症状和预防痛风发作。双氯芬酸钠是一种非甾体抗炎药，可以缓解痛风发作时的关节疼痛和炎症。然而，长期使用双氯芬酸钠可能会导致肠胃不适等副作用。因此，对于长期治疗痛风的患者，医生通常会根据病情和个体差异来选择合适的药物治疗方案。建议您咨询医生，根据医生的指导进行治疗，并遵循医生的建议进行用药。

问：我的父亲因为这几年饮食上一直没有注意，运动也不多，导致得了糖尿病，一直也有在吃药治疗，但是还是不见好，我们全家都很担心，该怎么办啊？我想问一下除了吃药，饮食上要注意些什么啊？。我想问一下糖尿病患者饮食上应该注意些什么啊？糖尿病人能吃生姜吗？

答：糖尿病患者饮食上应该注意控制饮食总热量，减少脂肪和胆固醇的摄入，增加膳食纤维的摄入，控制碳水化合物摄入量，避免暴饮暴食，多吃蔬菜水果，少吃高糖高脂肪的食物。生姜可以作为调味品使用，但是糖尿病患者应该注意控制食用量，不要过量食用。

问：我作为一个糖尿病患者每天最在意的就是控制自己的血糖，让它保持在一个稳定的水平，所以在饮食方面有很多禁忌，最近很想吃水果，不知道糖尿病患者适合吃哪种水果

答：糖尿病患者适合吃苹果，因为苹果的性凉、味甘，具有补心益气、生津止咳、健胃和脾、除烦、解暑、醒酒等功效。苹果中的糖分吸收缓慢而均匀，可以降低血糖，尤其是餐后血糖，对糖尿病有较好的疗效。

问：前段时间就闹过一次上腹部疼痛了，输液了以后就好了，现在又感觉疼痛，医生说我这个情况出现的那么多，建议我去医院做下检查，看看是不是患上了胆结石了，我想知道胆结石有什么症状呀？

答：胆结石的症状包括上腹疼痛，疼痛可能会放射到肩和背部。此外，还可能伴有低烧、恶心、呕吐、寒战、大汗淋漓甚至黄疸等症状。这些症状与胃肠和肝脏疾病的症状相似，所以容易被误诊。在确诊时，医生还会考虑其他疾病因素对手术和麻醉的影响，比如高血压、冠心病、糖尿病等。

问：其实我也不知道是什么原因，自从得了白癜风就没有去过外面玩了，怎么还是没有消退，为什么治疗白癜风需要长期用药为什么治疗白癜风需要长期用药

答：白癜风是一种与自身免疫缺陷有关的疾病，因此它不容易治愈且容易复发。这也是为什么长期用药是治疗白癜风的常规做法。长期用药可以帮助控制病情，减少白斑的扩散，并促进色素的恢复。此外，白癜风患者还需要保持良好的心态，避免过度焦虑和压力，注意防晒以保护皮肤。治疗白癜风需要耐心和坚持，与医生密切合作，根据个体情况制定合适的治疗方案。

问：我之前得过前列腺炎，已经有很长一段时间没有发作了，但是我听他们说前列腺炎是没有办法治疗好的，我非常的害怕，所以我想问一下，有过前列腺炎治疗后还能复发吗？

答：前列腺炎是一种常见的男性疾病，如果及时治疗并完全恢复，是可以避免复发的。但是，前列腺炎的复发与个体差异有关，有些人可能会出现复发的情况。因此，即使已经治愈，也需要定期去医院进行检查，以确保病情的稳定。此外，还应注意保持良好的生活习惯，如不手淫，戒除烟酒，多锻炼身体，提高免疫力，避免劳累和熬夜等刺激，以减少前列腺炎复发的风险。

问：银屑病对皮肤的危害是什么呢我前几天在医院刚被确诊的银屑病，想知道银屑病对皮肤的危害是什么呢？有什么好的治疗办法？银屑病对皮肤的危害是什么呢？

答：银屑病是一种慢性炎症性皮肤病，对皮肤有一定的危害。它会导致皮肤出现红斑、鳞屑、瘙痒等症状，严重影响患者的生活质量。银屑病还可能引起关节炎，导致关节疼痛和肿胀。此外，银屑病还可能对患者的心理健康产生负面影响，引起焦虑、抑郁等情绪问题。因此，治疗银屑病非常重要。中医治疗效果较好，可以减轻症状并降低复发的可能性。建议您到专业的银屑病医院进行科学的诊断，然后根据诊断结果进行有针对性的治疗。同时，加强日常的银屑病护理保健，有助于早日康复。

问：上述症状到医院问诊，医生让住院检查，在三甲医院医生说症状不是冠心病，像神经官能症，通过冠状CT造影检查为左冠状动脉降前支【LAD】有斑块，中度堵塞需要医生帮助提供远程诊断:希望医生提供一些医疗建议

答：医生建议进行心电图、心脏彩超、抽血化验心肌酶谱等检查，以了解心脏方面的情况。由于已经做了冠状动脉造影，发现左冠状动脉降前支有斑块和中度堵塞，可能会影响供血，建议服用阿司匹林、肠影片、辛伐他丁等药物降低血脂。

问：继发性癫痫病人的饮食要注意什么呢？嫂子是继发性癫痫病人，请问这种疾病的饮食应该注意什么？我想了解一下继发性癫痫病人的饮食要注意什么？

答：继发性癫痫是一种由其他疾病或因素引起的癫痫发作。对于继发性癫痫患者的饮食，需要注意以下几点： 1. 禁忌饮酒：酒及酒精饮料可能诱发癫痫发作，所以患者应该避免饮酒或戒酒。 2. 避免过度饥饿和暴饮暴食：过度饥饿会导致低血糖，而低血糖是癫痫发作的主要原因之一。暴饮暴食后会导致大量胰岛素释放，降低血糖浓度，从而促使癫痫发作。因此，患者应该避免过度饥饿和暴饮暴食。 3. 补充维生素和减少某些微量元素摄入：癫痫患者的血液中可能含有较多的钙、镁等元素，这可能导致抽搐发作。患者应该补充维生素B6，因为它常被用作辅助治疗。此外，增加维生素E的摄入也是有益的，因为它具有抗氧化作用，可以预防抽搐发作。

问：我患有哮喘已经有七八年的时间了，不是我不治疗，实在是觉得没有什么办法了，我几乎没有停止过治疗的，一直在找一个治疗的方法的但是没有什么好的效果，所以就有点放弃了，可是最近我感觉有点受不了了，每次发作的时候都感觉特别的难受的，不知道怎么样才可以治疗的。老年哮喘多长时间能治好呢?慢性咳嗽变异性哮喘该吃些什么？

答：哮喘是一种慢性疾病，需要长期治疗。治疗哮喘的方法包括药物治疗和非药物治疗。药物治疗包括吸入类固醇、支气管扩张剂、抗过敏药物等。非药物治疗包括避免过敏原、保持室内空气清新、保持室内湿度适宜、适当锻炼等。老年哮喘的治疗方法和年轻人的治疗方法基本相同，但老年人的身体机能下降，需要注意药物的剂量和使用方法。慢性咳嗽变异性哮喘的治疗方法包括药物治疗和非药物治疗。药物治疗包括吸入类固醇、支气管扩张剂、抗过敏药物等。非药物治疗包括避免过敏原、保持室内空气清新、保持室内湿度适宜、适当锻炼等。但是，哮喘是一种慢性疾病，需要长期治疗，不能期望在短时间内治愈。建议您及时就医，听从医生的建议，积极配合治疗。祝您早日康复！

问：男性为什么会患上前列腺炎我35岁，被诊断患上了前列腺炎，我想咨询一下专家男性为什么会患上前列腺炎？男性为什么会患上前列腺炎？前列腺炎好治吗？应该如何治疗才好？

答：前列腺炎是由尿路感染直接蔓延或身体其他部位的感染灶血行播散引起的，还有一些因素也可能引起前列腺炎，如过度饮酒，性刺激久坐，衣物过紧和会阴损伤等。临床表现为排尿异常，尿道分泌物，精神衰弱，疼痛等等。如果不及时治疗可能会引起前列腺癌，性功能障碍，不育等症状。建议及时到正规专科医院查明病因，针对性治疗。

问：我不爱吃药，刚发现有高血压，听说高血压不吃药也可以控制，听说通过食疗降压对身体好，还没有副作用，不知道是不是真的，我想问一下这种病不吃药怎么控制？

答：高血压可以通过食疗来控制，需要注意饮食清淡，不要吃太油腻的食物，多吃青菜

水果，多喝水，多运动，保持好心情，不要熬夜，养成有规律的生活，不要生气。

问：又流过几次，最后一次是前天，到医院医生说是长了一个血管瘤，就用药点掉了，可今天突然又流血了，不知道怎么回事，问一下医生用不用化验血？或者做什么检查，总这样流鼻血也不是办法啊

答：根据病人的描述，可能是血管瘤引起的鼻出血。鼻出血的病因有局部因素和全身因素，局部因素包括鼻外伤、鼻炎、鼻中隔偏曲等，全身因素包括高血压、血液系统疾病、内分泌失调等。建议病人检查血常规和凝血功能，控制血压和血糖，多喝水，多吃水果补充维生素。

问：患有糖尿病5年了，病情现在基本上可以稳定住了，担心以后会有一些后遗症出现，一般糖尿病患者都有哪些后遗症呢

答：糖尿病患者可能会出现心脑血管疾病、肾脏疾病、皮肤感染、指尖溃烂、眼底出血等等后遗症。

问：最近我感觉我的身体不太好，有一点腰酸乏力，头晕耳鸣，我去医院检查一下，医院告知我有一点儿肾阴虚，我想补一下。所以我想问，肾阴虚补肾的方法有哪些？

答：肾阴虚可以通过食疗调理和中成药物治疗来补充。食疗方面，可以多吃山药、枸杞、桑葚子、百合等食物。中成药物方面，可以选择中成药物治疗。此外，还可以去中医科诊脉，看看舌苔辩证调理，中药汤剂治疗。肾阴虚的症状多表现为腰酸乏力、头晕耳鸣、盗汗、失眠、多梦等，具体治疗方法需要根据平时病情的不同而定。

问：我是上个月才来人生中的第一次月经，不是很了解，为什么会痛，你能帮我解答一下这种情况是什么问题？

答：第一次月经轻微的疼是正常，作为女性来讲，一般都或多或少的在月经前后会出现腹痛，腰痛等症状，这就叫痛经。痛经是由于子宫内合成的前列腺素导致子宫剧烈收缩引起的。平时多注意保暖。如果疼痛严重影响日常生活，建议咨询医生。

问：最近一年常常会出现胸骨中下段疼痛的情况，像针刺一样，有时候在吃饭之后明显一些，症状时轻时重的，没有去检查，这段时间觉得症状好像更加频繁一些了，不知道是什么原因造成的，要怎么治疗呢？

答：根据您的症状描述，可能是心绞痛，需要进一步检查确诊。建议去心脏内科做详细检查，包括心电图等，以便及时治疗。

问：医生你好，我想咨询一下。腰椎骨质增生有哪些治疗方法？什么时候适合做手术什么时候适合其他治疗方法？曾经的治疗情况和效果：贴过膏药,什么方法治疗腰椎骨质增生？

答：腰椎骨质增生是一种骨关节退行性改变的表现，常见于中老年人，表现为关节边缘骨质增生，病人常感到关节僵硬、疲劳和疼痛。治疗方法包括手术和非手术治疗。非手术治疗包括药物治疗、物理治疗、中医治疗等。手术治疗包括椎间融合、人工椎间盘置换等。治疗方法的选择应根据患者的具体情况而定。贴膏药等方法只能缓解疼痛，不能治愈病情。

问：我最近这段时视力开始出现了一些问题了，看什么东西都是特别模糊不清楚的，问下视力模糊是什么原因？

答：视力模糊的原因有很多，包括屈光不正，如近视、远视和散光，白内障等等，多见于中老年人。眼底疾病，比如视网膜病变，黄斑病变也可能导致视力模糊。此外，眼部疲劳也有可能引起轻度的视力模糊。因此，建议您及早到医院检查，明确病因并给予对症治疗，不要盲目用药。

问：我最近感觉自己身体非常不好，去医院做了一个全面的体检，结果发现了我得了前列腺炎，不过还好是慢性的。那我就不那么害怕了，我想问一下慢性前列腺炎吃什么食物好？

答：得了慢性前列腺炎，多吃新鲜的蔬菜和水果，特别是要少吃辛辣刺激性的食物。要积极的进行治疗，引起慢性前列腺炎，最常见的原因是生活习惯，饮食习惯，作息时间都不规律。平时饮食太过于辛辣刺激，坐的时间特别久。

问：本人35岁偶然发现有血压高，医生说我有高血压，上医院检查原发性和继发性也没什么结果，目前正在吃降压药，血压有时正常有时高，请问我是得了高血压吗。天天吃降压药能分辨出原发性和继发性吗，高血压好治疗吗

答：高血压是一种常见的疾病，如果血压只是偏高有可能是原发性的，如果对于年轻人血压升高比较多以及存在肾脏或者是心脏损伤有可能是继发性的。需要结合自己的病情以及辅助检查，比如肾脏超声，心脏超声，心电图等，来确定是否是原发性或继发性高血压。对于高血压一般是需要长期使用降血压药物维持治疗的，不能够随便停药。

问：张大伯前段时间脚步关节痛风刚好最近又复发了，目前脚步以拇指关节处红肿不敢走路！到医院检查后被确诊为痛风病，医生开了芬必得。我想请问一下痛风用什么药物见效快点？

答：痛风是一种代谢性疾病，主要是由于体内尿酸过多，导致尿酸盐在关节和软组织中沉积，引起炎症反应。芬必得是一种非甾体抗炎药，可以缓解痛风症状，但是不能治愈病情。除了药物治疗，患者还需要注意饮食，避免高嘌呤食物，多喝水，控制体重。此外，痛风贴也可以缓解疼痛和红肿，但是不能替代药物治疗。

问：我家里的老人日前觉的腹胀，刚开始认为是消化不好，可是近期感觉腹胀明显，腰围增大、体重增长、下肢浮肿。想知道怎么治疗。肝腹水都有哪些治疗方法有效

答：对于肝腹水的治疗，我建议采用中医中药全面调理，这可以通过改善体质，扶正祛邪、补气养血的功效来提高机体免疫力。对于预防腹水的产生，一般建议输注人血白蛋白；而如果已经有腹水产生，可以选择药物排水或手术排水的方式进行治疗，其中药物排水是最常用的方法。如果条件允许，可以考虑使用臌症丸，它具有排水消肿、除湿健脾、祛邪扶正的双重功效，在快速排除腹水的同时，不会对肝脏造成二次伤害。但是，请您务必咨询医生的建议，因为每个人的具体情况可能有所不同。

问：病情描述:医院检查是萎缩性胃炎，最近很痛，肚子里感觉很烧，吃药没有什么效果；曾经治疗情况和效果:现在一直吃西药想得到怎样的帮助:怎样治疗老年慢性萎缩性胃炎呢

答：根据您的病情描述，您可能需要进行三联疗法治疗。三联疗法是指同时使用甲硝唑

、黄连素和质子泵抑制剂奥美拉唑来治疗胃炎。此外，您还可以使用吗丁啉和丽珠得乐等药物来缓解疼痛和不适感。除了药物治疗，您还需要注意饮食和生活习惯的调整，如少吃辛辣、油腻食物，避免饮酒和吸烟等。建议您咨询医生，根据具体情况制定治疗方案。祝早日康复！

问：我父亲一直在乡下生活，老人家比较勤俭，平时特别节省，有病也不肯去医院，终于病倒了，邻居打电话我才知道，把我父亲接到城里一检查，医生说是得了糖尿病，已经属于中期的了。想得到怎样的帮助:请问糖尿病中期能治好吗，治好后再注意什么

答：糖尿病不能根治，目前临床用药不是治愈糖尿病，而是防止和延缓糖尿病并发症的出现。治疗康复后，您需要注意以下几点：一、饮食：合理的饮食，吃饭七成饱。二、运动：根据自身情况适当运动，以微汗为宜。三、良好的心态与有规律的生活节奏。这些措施可以帮助您控制病情并减少并发症的发生。

问：诱发癫痫因素哪些较常见？感觉自己有一点不对头，但是我没有在意，结果几天前就突然晕倒，伴有抽搐，想问一下诱发癫痫因素哪些较常见？哪些是常见的诱发癫痫因素？

答：常见的诱发癫痫因素包括一氧化碳中毒、低血糖、急慢性肾功能衰竭、高血压脑病、各种全身感染等全身因素，此外，长期大量饮酒也是一种常见的诱发癫痫的因素。

问：我去医院做完体检给医生看的时候医生说我是患上了甲减这个病，我以前没有听过这个，甲减是什么病啊？应该是怎么治疗的？

答：甲减是甲状腺功能低下的一种情况，也被称为甲状腺功能减退症。甲状腺是人体内分泌系统的一部分，负责产生甲状腺激素，调节新陈代谢和身体的能量消耗。当甲状腺无法产生足够的甲状腺激素时，就会导致甲减。甲减的症状包括疲劳、体重增加、皮肤干燥、便秘、记忆力减退等。甲减的原因可以是甲状腺炎、自身免疫疾病、手术或放射治疗等。治疗甲减的主要方法是通过甲状腺片进行补充治疗。这些制剂含有甲状腺激素，可以帮助补充甲状腺功能不足的情况。然而，治疗时需要控制药物的剂量和服用时间，以避免产生依赖作用。通常情况下，医生会根据患者的具体情况来确定合适的剂量和用药方案。此外，饮食也对甲减的治疗有一定影响。患者应避免摄入会导致甲状腺肿大的食物，如海带、紫菜等含碘食物。然而，适量摄入含碘食物对甲减患者是有益的，因为甲状腺激素中含有碘元素。总之，甲减是甲状腺功能低下的一种情况，通过甲状腺片进行治疗可以缓解症状。在治疗过程中，需要注意控制药物剂量和服用时间，避免依赖作用的产生。此外，饮食上要避免摄入会导致甲状腺肿大的食物，适量增加含碘食物的摄入。最好在医生的指导下进行治疗和管理。

问：我的父亲就是糖尿病患者，所以我也就遗传了这个疾病，但是我没有像父亲那样身体虚弱，我想知道得了二型糖尿病都会有什么症状？

答：二型糖尿病的症状因人而异，但常见的症状包括多尿、烦渴、多饮、善饥多食、疲劳、体重减轻、虚弱。女性患者还可能出现皮肤瘙痒的症状，有时并发白念珠菌等真菌性阴道炎，瘙痒更严重，常伴以白带等分泌。

问：我高血压已经长达8年了，可能是体重超标的缘故吧，在这八年的时间里受尽折磨，接受的降压治疗也无济于事，医院跑了无数家，病情却还是时好时坏，这该怎么办呢？请问高血压最佳治疗方法有哪些？

答：高血压的最佳治疗方法包括以下几个方面：

1. 改善生活方式：保持良好的生活习惯对控制高血压非常重要。包括戒烟限酒、减少咖啡因摄入、避免过度劳累、保持充足的睡眠等。
2. 饮食调整：控制盐的摄入量，减少高盐食物的摄入，多食用新鲜蔬菜水果，适量摄入低脂肪、低胆固醇的食物，限制高糖、高脂肪、高胆固醇的食物。
3. 体重控制：如果体重超标，减轻体重对控制高血压非常重要。可以通过合理的饮食控制和适量的运动来达到减重的目的。
4. 运动锻炼：适量的有氧运动，如快走、慢跑、游泳等，可以帮助降低血压。建议每周进行至少150分钟的中等强度有氧运动。
5. 药物治疗：如果生活方式改变和非药物治疗无法有效控制血压，医生可能会考虑开具降压药物。根据个体情况，医生会选择合适的药物类型和剂量。

除了上述治疗方法，还可以尝试一些辅助疗法，如中医按摩、针灸等。但在尝试这些辅助疗法之前，建议先咨询医生的意见。

总之，高血压的治疗需要综合多种方法，包括改善生活方式、饮食调整、体重控制、运动锻炼和药物治疗等。建议用户与医生进行详细的沟通，制定个体化的治疗方案。

问：刘主任您好？我头颤已多年，去北京多家医院，都诊断为特发性震颤，不是帕金森病，不能治。在回答其他人的问题时我感觉您讲的有一定的道理，所以特求教与您，希帮我解除病痛。谢谢

答：特发性震颤是一种病因不明的疾病，主要累及上肢和头部。主要表现为做精细动作时出现手抖，如写字、持筷子、扣纽扣等。情绪紧张、疲劳时手抖更明显，而在精神松弛或休息时会减轻或完全消失。喝酒后症状可能会减轻。神经系统检查除手抖外无其他异常。目前，药物治疗是治疗这种疾病最有效的方法。服药可以改善症状，但停药后症状可能会复发，所以这种治疗方法只能起到暂时缓解的作用。特发性震颤的进展非常缓慢或者不进展，对日常生活的影响不大。

问：两年前就查出来有前列腺炎一直没好好治过，去医院检查过血，尿，彩超，前列腺液，支原体，衣原体，都说没事，但我还是尿频尿急尿不尽，该检查什么了

答：您好！您描述的尿频、尿急、尿不尽的症状可能与前列腺炎有关。建议您尝试传统中药治疗，例如当归、莲须、大云、灵脾、沙苑子、菟丝子、杜仲、巴戟天、桑葚、金樱子、刺猬皮、海狗粉、云苓、枸杞、牛膝、阳古粉、白鱼鳔等。这些传统中药据称可以改善前列腺内外部状态，消除炎症，促进前列腺康复。它们声称可以直接改善前列腺的病理状况，并可能为前列腺炎提供潜在的根治治疗。请在使用前咨询医生以了解更多细节和确保安全性。

问：我最近小便出血了，去医院做了检查，医生说的有前列腺炎，还跟我说现在患有这种病的男性是很多的，是可以治疗好的，不必太担心了，不知道患有这样疾病的男性的比率是多少？

答：前列腺炎是男性生殖器官中最大的一个附属性腺，它所分泌的前列腺液是精液的重要组成部分。前列腺炎是一种常见的疾病，临床发现，25%~50%的男性曾经遭受过此病的困扰。

问：结婚好几年没有孩子，我怀疑是自己的输精管堵塞了，想问问输精管堵塞了该怎么治疗？

答：输精管堵塞的治疗方法主要有两种，一种是输精管吻合术，另一种是肿物切除术。输精管吻合术适用于输精管出现梗阻，手术方法是切除梗阻段，然后两端吻合，从而可以治疗输精管堵塞。肿物切除术适用于输精管堵塞是因为精索、精囊、前列腺肿瘤或囊肿压迫造成的，肿物切除之后就可以治愈输精管堵塞。

问：我由于工作的原因平时饮食总是不规律，最近去体检发现有轻度的脂肪肝，请问轻度脂肪肝的原因及治疗是什么呢？

答：轻度脂肪肝是由于多种的原因造成的脂肪在肝脏当中过度的坠积，从而形成脂肪肝。饮食不规律是脂肪肝的一个常见原因。此外，肥胖、高血压、高血脂、糖尿病等也是脂肪肝的常见原因。轻度的脂肪肝是不需要特殊的治疗，平时要注意饮食方面，要低脂饮食，低盐饮食，注意观察血糖的情况，注意完善肝功能，血脂相关检查，多运动，多吃蔬菜水果。

问：的小便次数变得好多，一天跑厕所都跑不急，而且小便时还会有疼痛感，特别的难受。急性前列腺炎有什么症状？

答：急性前列腺炎的症状包括性功能障碍、尿道的灼热感和蚁行感、会阴、肛门部位的疼痛，甚至可能放射至腹股沟、腰骶部、阴茎、睾丸等部位。此外，急性前列腺炎还可能引发结膜炎、虹膜炎、关节炎和神经炎等并发症。患者可能会出现心情忧郁、乏力、失眠等心理症状。此外，前列腺炎还会累及尿道，导致轻度的尿频、尿痛、尿急等症状。

问：如何预防乳腺癌术后并发症的出现？患有乳腺癌，进行了手术，想知道如何预防乳腺癌术后并发症的出现？想请问一下医生应该怎样护理手术后的乳腺癌患者才能防止并发症的出现？

答：手术后的乳腺癌患者需要注意护理，以预防并发症的出现。其中，保持通畅的引流非常重要，应适当推迟拔管时间，只有当引流液为淡黄色，且引流量少于20ml时，才可以拔管。此外，一旦出现上肢淋巴水肿，应避免在患侧上肢输液，以免加重患侧上肢的肿胀，同时应予以抬高患肢及用弹力绷带适度加压。

问：我一直都有哮喘，经常夜里咳嗽睡不着觉，有时还会感觉到胸闷气短，很是难受，吃了一些药但总不见效果。想询问一些有效地治疗哮喘的方式。应当怎么进行哮喘疾病的治疗呢

答：有效地治疗哮喘的方式之一是锻炼疗法。锻炼可以增强机体免疫能力，提高身体的整体健康。可以选择进行全身性保健运动，如广播操和步行，练习腹式呼吸和短促吸气等呼吸体操，游泳，以及用冷水洗脸和洗脚等方式进行锻炼。然而，哮喘的治疗因人而异，不同的人可能需要不同的治疗方法。因此，最好咨询医护人员，根据个人的情况获得专业的建议和指导。

问：我从初中月经初潮开始就有痛经了这么多年过来了很是煎熬现在工作后痛经对我的工作也产生了影响这个问题困扰我很久了心里很着急可是不知道该怎么办请问解决痛经的方法有哪些呢？

答：痛经是一种常见的症状，可以通过一些一般治疗和药物治疗来缓解症状。一般治疗

包括进行体育锻炼增强体质，平日注意生活规律，劳逸结合，适当营养及充足睡眠，重视月经生理的宣传教育，通过解释说服消除病人恐惧、焦虑及精神负担，加强经期卫生，避免剧烈运动、过度劳累和防止受寒。药物治疗包括口服避孕药和前列腺素合成抑制剂。口服避孕药是治疗原发性痛经的首选药物，前列腺素合成抑制剂能抑制前列腺素合成使子宫张力和收缩性下降达到治疗痛经的目的。

问：我患糖尿病已有两年半，两年来血糖一直不稳定，主要靠打胰岛素（一在两次）来控制血糖。我的血糖在一天之内低的时候在2点几，高的时候在20几，很难控制。请问怎样做才能让血糖稳定下来？

答：糖尿病患者血糖波动大，低血糖发生率低，建议控制血糖。使用胰岛素泵治疗是最好的选择。在使用胰岛素的时候，剂量偏小点，尽量减少低血糖的发生。

问：我的大爷前段时间检查出患有前列腺钙化，我想问下前列腺钙化应该怎么治才会好？

答：前列腺钙化可以采用抗生素治疗，搭配物理疗法。抗生素治疗可以帮助消除炎症，但无法从根本上杀灭细菌、病原体及致病微生物等。物理疗法可以改善局部血液循环，有助于炎症的消散，但只作为一种辅助治疗方法。

问：帕金森病的手抖有什么特征表现08年得的帕金森，一直在持续吃药。情况有所好转，但是目前还是有手抖的症状。帕金森病的手抖有什么特点？

答：帕金森病的手抖特点是起初往往是单侧的手抖，样子像“搓泥丸”或“数钞票”一样。但在门诊中，不少人前来就诊时，因为早期不重视，往往已经发展为双侧抖动、肢体僵硬，甚至走路时双手已不会摇摆，严重影响生活质量。发病率超过2%，现在40岁至50岁的中年人发病并不少，尤其是40岁至50岁的中年女性，发病人数有所增加，发病趋势呈现出“女少男老”的新特点。如果老年人是单纯因为情绪激动等原因引起的手抖，则它自然会随着情绪的变化而消失，不应惊慌。如果是疾病原因引起的，则应该及时找医生检查，以明确病因，及时治疗。

问：最近，我发现自己的手经常不自觉的抖动起来，而且根本停不下来，导致吃饭的时候，都不能够很好的夹菜，吃饭显得异常困难，食欲明显下降。得了帕金森病的患者应该如何治疗？

答：帕金森病的治疗方法有多种，其中推荐采用理疗，如按摩、水疗，和体育疗法，如关节活动、步行、平衡及语言锻炼、面部表情肌操练等。同时应争取患者家属配合，鼓励患者多主动运动，尽量推迟药物治疗时间。如果疾病严重影响患者的日常生活和工作，可能需要药物治疗。帕金森病也被称为特发性帕金森病或震颤麻痹，是一种常见的锥体外系疾病。

问：您好，医生！我有高血压几年了，低压100高压175，平时油的东西吃的也少，以前一直服药，最近一年没有服药，上次因为感冒不舒服到当地的卫生院量了下血压！挺高的，医生给我开了硝苯地平片和卡托普利片，请问我需要一直吃药吗？？还需要注意哪些事项？

答：您好！对于高血压患者来说，持续服药是非常重要的。高血压是一种慢性疾病，需要长期控制和管理。即使您的饮食习惯较好，但仍然需要药物来帮助降低血压。硝苯地

平片和卡托普利片是常用的降压药物，可以有效地控制血压。建议您按照医生的指导，持续服药。除了药物治疗，您还需要注意以下事项：1. 饮食方面，建议您采用低盐饮食和低脂肪饮食，避免食用过多的油腻食物。2. 生活习惯方面，建议您戒烟限酒，避免情绪激动，保持心情愉快。3. 如果您同时患有高血脂，需要同时进行治疗，因为高血脂会影响降压效果。4. 在选择降压药物时，最好在当地医生的指导下进行选择，可以选择缓释片口服，如波依定或硝苯地平缓释片，这样可以使血压更加稳定。5. 同时，多吃些新鲜的水果和蔬菜对您的健康也是有好处的。希望以上信息对您有帮助！如果您还有其他问题，请随时向我提问。

问：我有高血压六七年了。现在口服非洛地平缓释片。感觉有时血压还是有点高90—140。检查过也治疗过。我还有鼻窦炎鼻息肉。做过手术。做过四年，今年复发又做了一次。非洛地平缓释片是不是影响我的手术。

答：建议您咨询医生是否需要更换药物，硝苯地平（心痛定）和尼莫地平是治疗高血压的常规药物。同时，控制饮食，少吃盐，多吃蔬菜水果，有助于降低血压。

问：苯磺酸氨氯地平片降低压效果好，还是降高压效果好。5mg一天一片早上还是140，还的服卡托普利一日三次，一次半片。血压120-130，如何调整

答：根据参考答案，苯磺酸氨氯地平是一种长效降压药物，适合长期控制血压，而卡托普利是一种短效降压药物，不建议长期使用。建议患者在专科医生的指导下，配合使用依纳普利或赖诺普利进行降压治疗。

问：我父亲脑血栓半年，用腹龙抗栓丸，阿司匹林半年，现已扶拐棍能走。医生建议半年时间了，用血疗法治，效果更好。请问，血疗能治脑血栓吗，对身体有伤害怕？

答：根据目前的医学研究，血疗在治疗脑血栓方面的效果尚无明确证据。腹龙抗栓丸和阿司匹林是常用的抗血栓药物，可以预防和治疗脑血栓。建议您继续坚持规律服药，并配合一定的康复训练和针灸治疗。具体的诊疗方案还需要在医生的指导下进行，因为无法面诊患者，无法全面了解病情。请您一定到医院就诊，听从医生的建议进行治疗。

问：月经不调了呢，来月经时间总是提前，而且月经期的时候就是血量非常的多，小肚子也是疼痛不舒服啊，我想知道自己月经不调是怎样引起的啊月经不调怎样的原因？

答：月经不调可能是由于器质性病变或是功能失常引起的，许多全身性疾病如血液病，高血压病，肝并内分泌并流产，宫外孕，葡萄胎，生殖道感染、肿瘤(如卵巢肿瘤、子宫肌瘤)等均可引起月经失调。

问：今年我看新闻说，一些老年病开始，年轻化了，有点担心自己的身体，就去了一家医院做了一次，全面的检查，发现自己有了胆结石，不知道胆结石有什么危害？想得到怎样的帮助:胆结石有什么危害？

答：胆结石是一种常见的疾病，如果不及时治疗，会对身体造成很大的危害。胆结石的典型症状为腹痛，多发生在饱餐或进高脂肪餐后数小时内，或腹部受到震动后，表现为中上腹、右上腹持续性钝痛，逐渐加重至难以忍受的剧痛程度。此外，还常伴随发热、黄疸等，有的还会出现恶心、呕吐、背痛、寒战甚至昏迷。因此，如果发现自己有胆结石的症状，应该及时就医，接受治疗。

问：最近一段时间我的龟头总是很痒严重的时候甚至连走路都没有办法又不好意思去医院我在网上查过好像是得了龟头炎我该怎么办呢请问龟头炎的症状有哪些呢？是哪些原因导致的呢？糖尿病龟头炎治疗该怎么办？

答：龟头粘膜的炎症称为龟头炎，它通常由感染和局部刺激等因素引起。龟头炎的症状可能包括龟头红肿、疼痛、瘙痒、溢液、糜烂和糠状物等。在糖尿病患者中，龟头炎可能更为常见，并且可能更严重。在处理糖尿病患者的龟头炎时，除了处理炎症本身外，还应该控制血糖水平。最好的建议是咨询医生，以确保得到正确的诊断和治疗。医生可能会建议使用抗真菌药物来清除感染，并给予其他措施来缓解炎症和症状。同时，保持局部清洁和干燥，避免使用刺激性的化学物质和清洁剂。另外，要注意个人卫生，每天用温水清洗阴茎，并确保彻底洗净尿道口。如果您有其他健康问题或需要特殊的治疗，最好咨询专业医生以获取个性化的建议。

问：我妈这几天晚上老是睡不好，她说老是感觉耳朵里面有声音，也形容不出是什么声音，这种现象是不是耳鸣呢，女人耳鸣是什么原因呢？

答：根据您的症状，可能是耳鸣。女性耳鸣的原因有很多，可能是耳部疾病，比如外耳道炎、鼓膜穿孔、耳硬化症、听神经瘤等，也可能是身体其他器官的疾病，比如脑供血不足、高血压、低血压、糖尿病等。此外，药物的副作用、长期噪音的影响、不良的生活习惯等也可能是导致耳鸣的原因。建议您带妈妈去医院进行检查，以确定可能的原因，并进行相应的治疗。

问：我好友的老爷爷，会常常忘记时间和家的位置，比如不晓得今天是何年何月何日，不晓得自己在何地，出了家门就找不到家，常常忘记东西放在哪里了，到附近的一家医院就诊确诊为老年痴呆。一般老年痴呆症病者会有哪些症状？

答：老年痴呆症是一种常见的老年疾病，其症状主要表现为记忆力减退，认知能力下降，情感变化等。早期可能表现为忘记一些日常琐事，随着病情的加重，会忘记自己的身份和家人的身份，甚至不认识自己的家人。此外，老年痴呆症还可能表现为语言障碍、行为异常、失眠等症状。

问：我患有乙肝好几年了，人消瘦了很多，而且食欲不好，吃什么都不容易消化，最近这段时间还有点想吐的感觉。也去医院治疗过，但是也没有什么好转。女性乙肝遗传吗

答：乙肝是一种慢性病，有一定的传染性，但没有遗传性。治疗乙肝主要是通过吃保肝药物和生活调理来控制病情。患有乙肝的人应该避免抽烟和喝酒。

问：甲减的症状初期有什么？最近总是感觉身体很怪，吃的明明不多体重却增加很多，怕冷，穿的比别人多，甲减的症状初期有什么？甲减的症状初期有什么？

答：甲减早期的症状包括怕冷、少言乏力，表情淡漠、唇厚舌大，皮肤干燥发凉，记忆力减退，智力低下等。此外，还可能出现厌食、腹胀、便秘，性欲减退和面部浮肿。甲状腺功能减退的原因主要有几个，一是生活于地甲肿流行的地区，二是自家免疫性疾病，三是甲状腺手术、放射治疗及抗甲状腺药物，或者是由于甲状腺炎症或者垂体疾病引起的。

问：最近我的双腿很是麻木，而且一点力气也没有，走路还要扶着拐杖才行，而且隔三差五的感冒，后来去医院检查，医生说都很正常，又换了一家医院，才检查出是重症肌无力。重症肌无力发病症状对患者的影响是什么？

答：重症肌无力是一种自身免疫性疾病，患者的免疫系统攻击自身的神经肌肉接头，导致肌肉无力和疲劳。患者常常感到肌肉无力、麻木、疲劳，尤其是在运动或活动后更为明显。重症肌无力还可能导致呼吸肌肉无力，严重时可能需要呼吸机辅助呼吸。此外，患者还可能出现吞咽困难、双眼下垂、视力模糊等症状。

问：自己的身体不是很好、大夫诊治之后就说是患有肺水肿、需要进行护理吃些营养食物、还需要主意的治疗呼吸困难的、能够治愈病症情况。肺水肿怎么进行护理治疗呢？

答：高压氧可以提高肺泡内压力和肺组织间压力，阻止毛细血管渗出。高压氧可以使呼吸道内气泡体积缩小或破碎，从而通畅呼吸道。高压氧下血氧含量增加，肺泡内氧分压与肺毛细血管内氧分压差增大，氧从肺泡弥散入血的量相应增加。这样可以纠正心、脑、肾等重要脏器的缺氧状态，防止肺水肿急性期因缺氧而致死。

问：几年来血压一直是低压92—98，高压125—135。没有任何不舒服，也没有服用药片，都是泡饮些茶水。请问医生，山楂与枸杞子泡沸水喝，和山楂与葛根泡沸水喝，哪种对治疗低压高的效果更好、更有效

答：根据提供的资料，患者的血压属于轻度高血压，建议从生活习惯和饮食习惯入手加以控制和调理，同时积极参加体育锻炼。饮茶只有保健功效，对于已发生的疾病并无治疗的功效。对于提到的两种配伍，后者更适合一些。

问：前列腺炎怎么老是治不好，很难治，还易复发？。前列腺炎怎么老是治不好，很难治，还易复发，请问这是什么类型的前列腺炎，并且怎么治疗。没有过敏史怎么才能把它治好

答：前列腺炎是一种常见的男性疾病，治疗起来确实有一定的难度，并且容易复发。前列腺炎的治疗需要根据具体情况进行，建议进行相关辅助检查以明确诊断，并决定进一步的治疗方式。常用的辅助检查包括泌尿系彩超测残余尿和尿常规，还可以进行前列腺液常规细菌培养等检查。根据检查结果，医生可以制定个体化的治疗方案，包括药物治疗、物理治疗和手术治疗等。对于没有过敏史的患者，可以根据医生的建议选择合适的治疗方法，积极配合治疗，提高治愈的机会。同时，注意保持良好的生活习惯，如避免长时间坐着、保持规律的排尿等，也有助于预防前列腺炎的复发。

问：我平时身体健康，但是最近总是感觉身体不太舒服，主要是尿痛，去医院检查说是前列腺炎，问一下吃药能治疗好前列腺炎吗？

答：吃药很大几率能治好前列腺炎的，前列腺炎一般吃药两周后，症状会明显缓解，停药3-5天，再进行第二个疗程的治疗，症状会更加改善，达到比较好的效果。辅助每天温水坐浴，定时排出前列腺液，不要久坐，不要熬夜。

问：和老婆结婚多年也没有孩子，老人都很着急，和老婆去检查，原来我是少精症，那么少精子症的治疗有哪些方法？

答：少精子症的治疗方法有两种，一种是采用生精激活疗法治疗，另一种是中医治疗。中医治疗主要以补肾益精，疏通精道为治疗原则。根据阴阳气血的不足和病邪的性质，

可以进行相应的治疗。服用添精生髓、滋肾水益肾阴的中药，可以营养精子，补充精子运动能量，增加精子数量。生精激活疗法则是利用特殊的导管进入尿道，通过压力将导管内的生精药物逆行渗透，进入前列腺、射精管和精囊腺及附睾、睾丸，同时配合电子经络导平机，促使药物吸收，刺激其分裂增殖，从而促进精子的生成。

问：脑出血半个多月，做了开颅手术，现在意识清醒，右侧还是不能动，不能说话亲戚高血压突发脑出血，现在刚转到普通病房，每天就是输液，效果不太明显还有什么方法能快点好？

答：患者因为高血压突发脑出血，做了开颅手术，现在意识清醒，但右侧不能动，不能说话。输液效果不太明显，想知道还有什么方法能快点好。对于脑出血的患者，只要各生命体征平稳，出血也已吸收的情况下7-14天内就可以开始正规的康复治疗了，而且康复治疗开始的越早后期功能恢复的也是越好的。患者现在的症状是因为脑出血压迫神经所导致，可以在针灸的同时配合理疗，康复治疗，以及舌针和舌按摩等综合治疗这样可以恢复的更好。

问：检查尿酸540，痛风从开始发病到现在反复发作三次了，怎么治疗？这个能不能根治，脚痛风发作痛苦，不敢下床，一直吃药控制。尿酸高，痛风反复发作怎么治疗最好？

答：尿酸高可能与痛风有关，建议挂内科，进行详细的体检，以明确诊断。治疗方面，建议服用秋水仙碱片和布洛芬。此外，平时应注意饮食，以清淡食物为主，多吃蔬菜，多喝水。这些措施可以帮助控制尿酸水平和减少痛风发作的次数。但是，痛风是一种慢性疾病，目前尚无根治的方法，因此需要长期的药物治疗和生活方式的调整来控制病情。希望这些建议对您有帮助，祝您健康！

问：最近老是发生一些怪事，早上正在刷牙的时候，面部突然一阵抽搐般的疼痛，非常的厉害，从前从没试过的，跟朋友说起，她说估计是三叉神经痛，那么这个病一般有啥特点的啊？三叉神经痛一般有哪些症状？

答：三叉神经痛是一种发生在面部三叉神经分布区内反复发作的阵发性剧烈神经痛，多数于40岁起病，多发生于中老年人，女性尤多，其发病右侧多于左侧。该病的特点是：在头面部三叉神经分布区域内，发病骤发，骤停、闪电样、刀割样、烧灼样、顽固性、难以忍受的剧烈性疼痛。容易与牙痛混淆。

问：女，27岁。请问这是直肠息肉，还是痔疮，需要到医院做检查吗？平常偶有便血，除了便血，没有其他症状，请问以后改怎么办？

答：根据您的描述，您可能患有痔疮。痔疮是一种常见的肛肠疾病，常表现为便血、直肠不适等症状。建议您尽快就诊，通过医生的专业诊断，以确定痔疮的确切情况并获得正确的治疗建议。在就诊之前，您可以尝试一些自我护理措施来改善症状。例如：

1. 注意饮食：饮食清淡，避免辛辣刺激性食物，多吃富含纤维的蔬菜和水果，保持大便通畅，避免便秘。
2. 坐浴：使用高锰酸钾坐浴，每天坐浴15-20分钟，可起到杀菌消炎、缓解疼痛的作用。
3. 保持卫生：保持肛门清洁，每天用温水轻轻清洁肛周区域，避免用力擦拭。

请记住，以上仅为一些初步的建议，并不能替代专业医生的诊断和治疗。建议您尽快就诊，以便获得更准确的诊断和个性化的治疗方案。祝您早日恢复健康！

问：最近常常感觉有胸闷的症状，有时候喘不过起来，觉得好像是缺氧，氧气不够用似的，前几天晚上正在睡觉，感觉喘不过气而被憋醒了，做起来深呼吸几次，再放松放松就好了，一连几天都是这样，去医院检查是慢性心力衰竭，开了点药，医生说让回家修养

答：你好，慢性心衰的饮食需注意。首先，需要控制食盐的摄入量，每日食盐控制在5克左右，不吃腌制食品，最好不吃用碱或小苏打制作的食品。其次，可以采用少食多餐的方式，每日食物可分4至5次食用，严禁吃得过饱。此外，适当补充维生素B1和维生素，有利于保护心肌。如果缺钾，可以食用含钾高的海带、紫菜、瘦肉、橘子等食物。另外，选用低热量、低盐、富含维生素、易于消化、不易产气的食物也是比较适合的。希望这些饮食调整能够帮助你更好地管理慢性心衰。如果还有其他问题，可以随时向我咨询。

问：您好我今年35岁了，最近总是觉得尿尿时有点不正常，不知道是不是得了前列腺，能否请专家给讲一下这个前列腺炎都有什么症状？请问如果得了前列腺炎应该怎么医治？

答：前列腺炎是一种常见的男性疾病，症状包括性欲降低、射精痛、射精过早、影响精液质量、尿道口流白、血精、乏力、头晕、失眠等。长期持久的前列腺炎还可能引起身体的不良反应，如结膜炎、关节炎等病变。建议患者积极到专业男科医院进行治疗，平时应多注意清淡饮食，积极锻炼。

问：你好，请问男性精子活力低能怀孕吗？上个月去医院检查，医生说我是精子活力低，难怀孕，请问这种病能治好吗？问男性精子活力低能怀孕吗？怎样治疗才好呢？

答：精子活力低，也被称为弱精症（asthenozoospermia），指的是精子的运动能力较差，难以前进，造成它们难以穿过子宫颈管，到达输卵管与卵子结合。弱精症的常见原因包括睾丸生精上皮不完全成熟或受损、精液量少、精浆成分异常（例如附睾、精囊、前列腺的炎症）以及抗精子抗体的存在。为有效治疗弱精症，建议在正规的专科医院进行全面检查，以确定具体原因并接受有针对性的治疗。这样做可以显著提高受孕的机会。

问：我一直在控制自己在怀孕时候得饮食，但是我还是在妊娠期的时候的了糖尿病，现在很是困扰，不知道这个时候得了这个病，我应该吃什么比较好呢？，妊娠期糖尿病吃什么比较好呢？

答：妊娠期糖尿病的患者应该控制糖类的摄入量，不吃高糖的水果和零食，多吃青菜，低盐低脂低糖饮食，适当多活动，定期检测血糖。祝健康。

问：我这两年来觉得身体很不舒服，去检查后才知道患有糖尿病，想好好治好这个病，想问糖尿病病人有具体哪些食物的禁忌？

答：糖尿病病人需要注意饮食，避免摄入过多的糖分和热量较高的食物，同时也需要注意酒精的摄入。含糖量高的食物不能碰，如糖果、蛋糕等甜食，淀粉量高的食物也要控制，如米饭、面条、土豆、番薯等。此外，热量较高的食物也不能多吃，如瓜子、核桃、花生等坚果。酒精也不能碰，因为长期摄入过量的酒精会加重肝脏的负担。建议糖尿病病人在饮食方面咨询专业医生或营养师，制定适合自己的饮食计划。

问：我这几天呼吸老是不通畅，而且还有点闷的慌，有时候气短气促，我怕自己是不是得了什么病了，去检查医生说可能是肺水肿，需要进一步治疗，我想问下这个病一般都怎么治的。得了肺水肿都得怎么治才好？

答：肺水肿是一种严重的疾病，需要及时治疗，以减轻病情，防止病情恶化。治疗的方法主要是针对病因进行治疗，同时也要进行支持性治疗，以维持足够的血氧供应和呼吸功能。具体治疗方法需要根据病情而定，建议尽快去医院进行检查，然后针对性的治疗，这样对病情康复是有好处的。

问：我患高血压十年原先吃0号管用，现在不起作用了，换了地平也不管用血压在105、至165之间，请问我应吃什么药？谢谢！

答：建议您在当地医生的指导下选择降压药，同时注意低盐饮食、低脂肪饮食和避免情绪激动。常用的降压药有心痛定、波依定和硝苯地平缓释片等，建议选择缓释片口服，以使血压更平稳。请勿间断口服药物，以免引起并发症。祝您早日康复！

问：我患有糖尿病多年，一直控制的还算不错吧，当然也曾经因为糖尿病住过院，现在每天需要做的就是测血糖，吃降糖药，想吃点什么东西都不行，饮食注意什么啊？

答：建议患有糖尿病的人们在饮食方面应该注意平衡膳食，控制总热量的前提下，尽可能做到谷类、肉类、蛋、奶、蔬菜及水果种类齐全，以便获取均衡营养。此外，建议选择升糖指数低的蔬菜，如黄瓜、西红柿、青菜、芹菜等；水果如柚子、猕猴桃、草莓、青苹果；蛋白选择优质蛋白如瘦肉、牛奶、鱼类等；主食最好选择粗粮，如玉米面、荞麦面、燕麦面做成的馒头。

问：头晕心悸胸闷，舌头有齿痕，发白，厚大不清楚，有时口干舌燥，胃口不好，以前饮食不规律。中医说脾胃虚弱内湿，睡眠质量也不好。有时候很饿，就是不想吃东西，大便很湿。

答：你好，根据你描述的症状，可能是脾胃虚弱内湿导致的。建议你可以先吃些补中益气丸或者人参归脾丸进行治疗，效果不行的话再吃些中药即可。

问：前两天身体不适去医院检查，医生告诉我我患上了慢性精囊炎，想请问一下慢性精囊炎怎么治疗，精囊炎的治疗快速方法是？精囊炎的治疗快速方法是？精囊炎怎么治疗精囊炎能食疗吗？

答：慢性精囊炎的治疗方法包括卧床休息，保持大便通畅，避免过多的性行为，以减少性器官充血程度。此外，可以定期进行精囊前列腺推拿，以增进血液循环，促进炎症物质的排出。食疗方面，目前没有明确的证据表明食物可以直接治疗精囊炎，但保持良好的饮食习惯和充足的水分摄入有助于身体的康复。如果症状严重或持续不缓解，建议咨询专业的男科医生进行进一步的诊断和治疗。

问：前就检查出有前列腺炎的，用药治疗一段时间之后情况就比较好一点了，可是最近因为应酬不顾上这么多，喝了酒，也吃了一些辣的东西，现在发现龟头发红了。

答：你好，根据你所描述的情况初步考虑存在龟头炎的可能性比较大，多是由于致病菌感染引起的，需要尽快做一个分泌物涂片检查，明确诊断致病菌的种类，然后根据不同致病菌选择相应的外用药物进行治疗。

问：我的儿子目前4岁半，今儿在外面和几个小朋友疯玩的时候，突然发现发现气喘，有哮鸣音，大夫检查后说孩子是什么运动性哮喘，试问这是怎呢回事啊？到底什么是运动性哮喘？如何防治呢？

答：运动性哮喘是一种在运动或剧烈活动期间发作的哮喘症状。它通常在运动开始后的几分钟内发生，持续几分钟到几小时。这种情况是由于运动引起气道狭窄和炎症反应所导致的。运动性哮喘的主要原因是运动时呼吸急促导致气道变窄。其他可能的原因包括气道冷空气和干燥空气的刺激，以及运动引起的体液丢失。运动性哮喘的主要症状包括喘息、气短、咳嗽和胸闷感。有些人还可能出现咳黏液、嗜酸性粒细胞增多和体力活动能力下降的症状。治疗运动性哮喘的方法包括使用短效支气管舒张剂来缓解症状，如沙丁胺醇。在运动前使用这些药物可以预防发作。另外，还可以通过运动预热、避免剧烈运动、在干燥天气中加湿、避免冷空气等方法来减轻症状。总的来说，孩子患有运动性哮喘并不是一件严重的事情。只要注意使用适当的药物和采取相应的预防措施，可以很好地控制病情，让孩子能够安全地参与体育运动和其他剧烈活动。如果症状持续存在或加重，建议咨询儿科医生进行进一步评估和治疗建议。

问：近半年多来，我右膝只要坐下过半小时左右，再站起来就会感觉疼痛而且有站不直的感觉，偶尔有时股骨也会连着疼，冷，麻。还有我在19岁时摔过一跤，当时是膝盖着地，后来很肿，因为年轻也就熬过去了，时间久了，自己就痊愈了。想得到的帮助：请问医生我现在的症状会是什么情况？

答：根据您的描述，您右膝在坐下过半小时后站起来会感到疼痛，并且有站不直的感觉。您还提到在19岁时摔过一跤，膝盖肿胀，但后来自愈了。根据这些症状和历史，可能是骨关节炎引起的。骨关节炎是一种关节疾病，常见于中老年人，但也可在年轻人中发生。这种疾病会导致关节疼痛、僵硬和功能障碍。治疗骨关节炎可以采用中西医结合的方法，其中包括使用氨基葡萄糖和硫酸软骨素进行治疗，同时结合中医的补肾、活血化瘀、通经活络治疗。建议您咨询医生进行进一步的诊断和治疗。

问：一天内血糖什么时候最高？是三餐后一小时吗？高低与吃的量多少有关吗？在什么时候测血糖最能发现问题？

答：血糖的高低与吃的量、成份中含糖量有关，三餐后两小时的血糖最能发现问题。建议有糖尿病的患者要注意低糖低盐的饮食，同时也要注意低脂的饮食。

问：最近的天气总是阴阴的，我的腿脚和手总是感觉很疼，几乎无法站立和行走，甚至连抬手都觉得很困难，关节处的还会有点红肿和发热，感觉特别的不舒服。怎么样的方法可以治愈风湿性关节炎？

答：您好！对于风湿性关节炎的治疗，可以尝试以下方法：

1. 药物治疗：阿司匹林、非甾体消炎药（如布洛芬）等可以缓解疼痛和减轻炎症。免疫抑制剂（如环磷酰胺、硫唑嘌呤）可以控制疾病的进展。此外，皮质激素也被用于缓解急性发作期间的炎症。
2. 生活方式改变：保持适当的体重，避免过度疲劳和过度活动。选择适合的运动方式，如水中运动、瑜伽或散步，可以帮助增强肌肉和关节的稳定性。
3. 物理疗法：热敷或冷敷可以缓解疼痛和炎症。物理治疗师可以教您关节保护和活动训练，以改善关节灵活性和功能。
4. 中医治疗：中医有很多针对风湿性关节炎的治疗方法，如针灸、中草药、推拿等。可以咨询中医师以获取更多治疗建议和方案。
- 5.

饮食调整：摄入富含抗氧化剂的食物，如蔬菜、水果和鱼类，有助于减轻炎症。避免食用高脂肪和高糖分的食物，因为这些食物可能会加重炎症反应。 请注意，以上建议仅供参考。最好在专业医生的指导下制定个性化的治疗计划。及早就医并遵循医生的建议，可以更好地管理和控制风湿性关节炎的症状。祝您早日康复！

问：两周之前出现了左边的脸疼痛，当时以为可能是牙痛，因为里面的牙头肉也有些疼痛，可是现在左边的脸不碰都会痛啊，张嘴的时候都有些痛啊，今天早上去看医生了，医生说是三叉神经痛，到底是怎么回事呢，好治吗？请问怎么治疗三叉神经痛？

答：三叉神经痛是一种神经性疾病，病因可能是由于三叉神经受到压迫或损伤，引起神经痛。西药治疗多临时止痛，但对肝脏和肾脏损伤都很大，且手术的复发性又很高。中医中药针灸的方法治疗一段时间可以根治，无副作用，特别适合老年人和体质虚弱者。建议您尝试中医中药针灸的方法治疗一段时间。

问：我患有痛风一年了啊，也治疗过的，我现在处于发作间歇期，我听说也要好好注意的，所以想知道下日常生活中注意什么？

答：痛风是由于体内嘌呤代谢紊乱和尿酸排泄减少导致的，所以痛风病人在日常生活中要限制高嘌呤食物的摄入，并且要多饮水，多排尿，可以促进尿酸代谢，降低血尿酸，只要血尿酸降至正常水平，痛风就不会发作。

问：我患有痛风还几年了，最近总是发作，真的让我痛不如生，我都不知道该怎么办好了，非常的难受，我现在想了解一下，我这个痛风发作我到底应该怎么办呢？

答：痛风是一种代谢性疾病，主要与尿酸含量过高有关，临床上痛风发作时，如果症状很明显，难以忍受的话可以考虑静脉推注或者静脉滴注糖皮质激素治疗，平时要注意严格低嘌呤饮食，注意合理作息。不要熬夜。

问：我是前几天的时候出去和朋友去吃饭了，回来后才知是那个朋友患有乙肝的情况，当时我非常害怕被传染，我去检查后说我是感染了，所以，还能治够愈么？

答：乙肝是一种慢性病毒性肝炎，目前尚无完全治愈的方法，主要是通过控制病情来维持肝功能的稳定。治疗乙肝的方法包括药物治疗和生活方式管理。药物治疗可以帮助抑制病毒复制和减轻肝脏炎症，但并不能完全清除病毒。生活方式管理包括注意休息，避免过度劳累，戒烟限酒，保持良好的营养和健康的生活习惯。定期复查肝功能也是非常重要的，以监测病情的变化和调整治疗方案。治疗乙肝的费用因个人情况和治疗效果而异，无法确定具体的费用。如果已经感染了乙肝病毒，应该及时就医，接受医生的指导和治疗，同时注意保肝药物的调理，保持肝功能正常。

问：你好，头晕，呕吐，天旋地转。发病时间及原因：1星期，早上准备起床时，感觉床在翻滚，起不来，过一会起来后就恶心、呕吐。治疗情况：脑部CT没问题。医院挂了两天吊针。请问眩晕症的症状和治疗方法？

答：眩晕是一种复杂的症状，可能与多种疾病有关，如血压高、血压低、动脉硬化、脑瘤、贫血、内耳疾病和胃肠功能异常等。需要结合病史和检查等确定眩晕的类型，才能确定治疗方法。

问：40岁左右发现得了高血压，开始使用降压药，最近两年一直吃倍他乐克，但这两天好象不太管用，血压在160/120不知现在有什么特效药。

答：根据您的描述，您40岁左右发现患有高血压，并且最近两年一直使用倍他乐克作为降压药。但是最近两天您发现倍他乐克好像不太管用，您的血压达到了160/120。根据您的情况，我建议您可以考虑使用其他的降压药物。常用的降压药物有利尿药、 β 受体阻断药、钙离子阻断药、转换酶抑制剂和复合制剂等。其中，北京降压0号、拜心通和代文等长效药物是首选，可以持续降压。另外，如果出现头晕症状，可以随身携带心痛定或卡托普利，在血压升高时舌下含化，可以快速降低血压。控制血压在140/90以下非常重要，因为高于180/90很容易引发脑出血。此外，保持良好的心情、清淡的饮食和适量的散步也是很重要的。如果您对药物的选择有疑问，建议您咨询专业的医生，以便得到更准确的建议。

问：前几年我的大伯死于肝脏海绵状血管瘤的病，我也不知道是什么病，今天去上班的时候，同事说她的父亲不舒服，去医院检查也是肝脏有海绵状血管，肝脏海绵状血管瘤怎么治疗？

答：肝脏海绵状血管瘤在成人中普遍存在，是一种慢性病。小血管瘤不影响健康，不需要治疗。如果血管瘤大，它可能会对组织造成压迫症状。如果症状更明显，应尽快进行外科治疗。要注意休息，合理饮食，不要吃太辣的食物，饮食要经常，适当锻炼，注意个人卫生。

问：我这几天感觉也没怎么喝水喝多了啊就是有些尿频呢还有尿急呢有时尿尿还有刺痛感觉呢过后症状就能缓解呢去男科检查了一下呢医生说我这是前列腺炎不是太严重呢除了吃药也得注意饮食才行。前列腺炎除了吃药还得注意什么

答：前列腺炎的治疗除了药物治疗和物理治疗外，自我调养在治疗和防止复发方面也非常重要。禁烟酒少食辛辣食物，防止过劳，适当锻炼，注意保暖，特别是节制性生活等。建议你积极到医院泌尿科进行相关检查，明确诊断，对症治疗。

问：我喝水多点，尿就比较频繁，每次尿的量都很大，看清楚是尿量很多哦，请问你看这个还会是前列腺炎引起的尿频吗（喝水一多点，我尿量就很大的）麻烦了，看清楚题目回答，谢谢

答：这种情况可能是正常现象，因为人体需要保持水分平衡，所以喝水多了就会尿频，尿量也会增加。但是如果伴随着其他症状，如尿急、尿痛、尿色发黄等，就需要考虑是否存在前列腺炎等疾病。

问：我现在总是会感觉情绪不好，经常会出现吃的挺多了，可是却总是会感觉身体没有力气，而且还经常会口干口苦得，经常会出现尿频的现象，已经检查过了是得了糖尿病了。糖尿病人的饮食注意什么呢？

答：糖尿病人的饮食需要特别注意，他们需要遵循“三宜三不宜”的健康食谱。首先，他们应该多吃蔬菜、水果和全谷类食物，这些食物富含纤维和维生素，有助于控制血糖。其次，他们应该适量摄入低脂肪的蛋白质，如鱼、鸡肉和豆类。最后，他们应该限制摄入高脂肪、高糖分和高盐的食物，如油炸食品、甜点和加工食品。此外，糖尿病患者还应该注意饮食的规律性，避免过度饮食和暴饮暴食。如果有其他特殊情况或需要，建议咨询营养专家或医生的建议。

问：老公身体一直特别的好，前天上班的时候突然头晕晕倒，同事送老公到医院才发现患上了脑出血，请问脑出血疾病怎么治疗呢？

答：脑出血是一种严重的疾病，治疗的主要目的是促进瘫痪肢体和语言障碍的功能恢复，改善脑功能，减少后遗症以及预防复发。治疗过程中需要防止血压过高和情绪激动，避免再次出血。此外，生活要规律，饮食要适度，大便不宜干结。

问：我爱人今年44岁，前几天出差回来血压突然升高，低血压116，高血压170，之前也累的话血压会升高，平时血压正常，到现在没服用过降压药。不知有什么好的方法能控制血压吗？

答：建议您先到医院进行检查，确定血压是否真的升高，是否需要及时降压处理。同时，建议您注意饮食健康，减少高盐、高脂、高糖的食物摄入，多吃蔬菜水果，适量运动，保持心情愉悦，避免过度疲劳。

问：我外公上了年纪后身体就不好得了脑更塞，去年的时候发作过一次，我们在医院陪着他治疗了一个多月后才出院，最近又复发了，想问一下多发脑梗塞最好的治疗方法。

答：针对脑梗塞的治疗需要长期管理，包括控制高血压、高血脂、糖尿病等基础病变，定期到医院复查，按医生嘱咐规律服药。常用药物包括抗血小板聚集类药物、脑保护营养药物和益气活血开窍止痛药物。

问：想了解一下痛风的早期症状是什么左脚大拇指疼痛，发热，左膝关节窝面肌腱有小块，触之疼痛并带动左脚大拇指疼痛。查血两次，尿酸含量均正常，一次三百多，最近一次才两百多。几个医院医生均不能确诊。想了解一下痛风的早期症状是什么？

答：痛风的早期症状通常表现为关节疼痛和红肿，尤其是在大脚趾上出现结晶。痛风发作时，疼痛往往在午夜加重，同时还可能出现发热和关节积液的症状。此外，痛风还可能侵犯其他关节，如脚腕和踝关节，导致相应部位的疼痛和红肿。对于痛风患者，建议采取低嘌呤低能量饮食，保持合理体重，戒酒，多饮水，每日饮水量应在2000毫升以上。此外，还应避免暴食、酗酒、受凉受潮、过度疲劳和精神紧张，穿舒适的鞋子，防止关节损伤。在治疗上，应慎用影响尿酸排泄的药物，如某些利尿剂和小剂量阿司匹林，并注意防治伴发病，如高血压、糖尿病和冠心病等。

问：平时有高血压，一般都在舒张压140，收缩压在90左右，请问应注意什么饮食？血压药吃阿替洛尔片呢，请问用换什么血压药吗？

答：对于高血压患者，建议采用低盐饮食，并配合中药辨证施治，这样可以获得较好的治疗效果。低盐饮食可以帮助控制血压，而中药辨证施治可以根据患者的具体情况进行个体化治疗。另外，关于阿替洛尔片的使用，建议咨询医生，以了解是否需要更换其他血压药物。

问：医生，我这几天总是感觉心慌，觉得自己的心跳特别的快，我没有心脏病，只是最近才有这种感觉的。所以我想问问60岁以上的老人每分钟心跳多少次是正常的？

答：正常人每分钟心跳应在60-100次之间，超过或低于都属于不正常之列。但是不同年龄心跳次数有所不同。60岁以上老年人心跳可减慢，但最慢不能低于每分钟50次，运动员或强体力劳动者，由于心排量比正常人明显增大，心跳次数可在45次左右。发热、情绪激动、精神紧张、恐吓等均可有一次性心跳次数加快，这是机体正常调

节的反映。

问：为什么我在四十几岁的时候长老年斑了？。？四十五岁，手脚、脸上都有老年斑，目前没有到医院看。没有为什么会出现老年斑，是内分泌失调还是脏器衰竭？如何改善？

答：老年斑是皮肤色素沉着的一种表现，通常是由于年龄增长、紫外线照射、内分泌失调等因素引起的。在四十多岁时出现老年斑是比较常见的，但也需要注意是否存在其他疾病的影响。建议去医院进行相关检查，以确定是否存在血液方面的问题。同时，平时可以多摄入富含维生素C的食物，如柑橘、草莓、猕猴桃等，这些食物有助于抑制黑色素的生成。此外，还可以多食用一些具有排毒功效的食物，如木耳、海带、银耳等，帮助身体排出毒素，改善皮肤问题。

问：平时血压一直都很正常，今天午饭后，出现头晕，自己量了一下血压，140。。隔了一段时间又测了一次，145。。请问，血压突然升高是什么原因引起的？怎么解决？

答：平时血压一直都很正常，今天午饭后突然出现头晕，自己量了一下血压，显示为140，之后隔了一段时间又测了一次，显示为145。突发的血压升高可能是情绪过度紧张、劳累、睡眠不佳、寒冷环境等因素引起的，并不一定表示就是高血压。高血压的诊断应反复测量并排除继发性高血压才能确诊。建议您注意休息，保持低盐饮食，避免情绪激动，保持心情平静。如果有持续的不适，建议咨询医生进行进一步的检查和评估。

问：您好医生最新尿频小腹胀去医院检查是前列腺炎请问怎么治疗谢谢尿频小腹胀

答：根据您的描述，您被诊断为前列腺炎，该疾病是男性泌尿系统的常见疾病，分为4型，不同类型的前列腺炎在治疗上是不尽相同的。一般来说，1型、2型和3A型需要抗生素的治疗，3B型需要 α 受体拮抗剂的治疗，4型的无需进行治疗。建议您根据医生的建议进行治疗，同时注意饮食健康，避免辛辣刺激食物，多喝水，保持良好的生活习惯。祝您早日康复！

问：我已经打算要宝宝有半年了，这段时间一直都很积极的准备要孩子，可是老婆却一直都没有怀上，就很奇怪，到医院做了检查之后是我的问题，我的精子不液化导致了不孕不育。精子不液化可以治好吗？

答：精子不液化是慢性前列腺炎的一种表现。在这种情况下，容易出现不孕症。因此，建议您进行详细的检查，积极治疗原发病，精子不液化的现象就会消失。

问：我父亲高血压已有5.6年,常年一天三次吃降压药,高压仍在160低压110,降压药也换过多次,效果不明显,请问专家该如何治疗

答：您好！针对您父亲的高血压情况，我建议您进一步提供一些信息。您父亲都吃过哪些降压药？他的心率是多少？一般来说，可以考虑联合用药，例如硝苯地平、卡托普利和倍他乐克。如果这样的联合用药仍然没有达到理想的效果，建议您带父亲去检查一下，看是否存在原发性高血压。如果您对我的回答满意，请点击"采纳为满意答案"，表示对我们工作的肯定与支持。谢谢！

问：晚上尿频要起来好几次去上厕所，而且感觉憋不住，天冷的时候更加严重，试过睡前少喝点水也不行，一有尿意就必须马上就尿不然就会尿在裤子里，这种情况怎么办？

答：这个问题可能是尿频的症状，可能是由于尿路感染、膀胱炎、前列腺炎等引起的。建议尽快到医院的泌尿外科进行检查，以明确诊断。如果确诊为细菌感染，医生可能会给你开抗生素药物进行治疗。在治疗期间，多喝水，多吃新鲜蔬菜水果，避免疲劳和熬夜，这样有助于加快康复。

问：我的一个朋友最近吃的很多，人却瘦得厉害，在我们的督促下去医院检查，结果医生告诉他他是糖尿病二型，他当时很郁闷，不知道怎么就会得了这种病的，他现在也不知道自己应该注意些什么。二型糖尿病患者平时在生活中应该注意什么呢？

答：糖尿病是一种终生性疾病，需要患者遵医嘱按时用药，饮食上要注意低糖、低脂、低热量，主食控制在八成饱，多食用蔬菜，少吃面食和米饭。在食用土豆、藕、山药等淀粉含量高的食物时要注意减少相应的主食量。含糖量高的水果以及干果尽量不要食用。血糖控制平稳的情况下可以在两餐之间少量食用含糖量低的水果。黄瓜和西红柿可以代替水果食用。此外，平时要注意生活起居规律，加强体育锻炼。希望对您有帮助，祝您健康！

问：甘油三脂0.66,胆固醇6.33,高密度脂蛋白1.80,低密度脂蛋白2.

24,谷丙转氨酶20.9你好医生麻烦你帮我解释一下…我这严重吗？胆固醇高…其他三项我不懂…希望你能给我点建议…谢谢

答：患者可能患有高胆固醇血症，建议服用贝特类药物，定期复查血脂和肝功。

问：我血压高，近两年吃的是复方罗布麻，现在没什么效果，应该换什么要比较好，高压170，低压120.

答：复方罗布麻是一种国家淘汰的药物，其效果不好。您的高血压属于3级高血压，需要使用有效的药物来控制血压。建议您采取一些措施来控制高血压，如低脂低盐饮食，减少食盐的摄入量，并继续药物治疗，口服平稳、长效降压药物如拜新同、代文等，可以联用。

问：患慢性肾炎有一年的时间，一年内反复发作了两次，是一直没有治疗彻底吗？该如何预防慢性肾炎复发？现在想吃点好的能彻底治好慢性肾炎的中药。我的症状主要是睡眠不好，总感觉累，眼睛干涩看不清楚东西，有时头晕，腰疼。中药治疗慢性肾炎效果好吗

答：慢性肾炎的治疗方法主要是对症治疗，旨在减轻症状、控制疾病进展和预防复发。针对您提到的睡眠不好、总感觉累、眼睛干涩看不清楚东西、头晕和腰疼等症状，可以考虑以下建议：

1. 保持良好的生活习惯：规律作息、适量的运动、充足的休息和避免过度疲劳都有助于改善睡眠质量和减轻疲劳感。
2. 控制饮食：适量减少盐的摄入，少吃高蛋白食物，选择低盐饮食有助于降低肾脏负担和水肿症状。
3. 用眼科护理：注意保护眼睛，避免长时间用眼、频繁眨眼，可以尝试使用人工泪液来缓解干涩和模糊视觉。
4. 注意头晕及腰疼：保持良好的姿势，避免突然起立或长时间保持一种姿势，也可以考虑适当的物理治疗和理疗。
5. 请注意，中药治疗慢性肾炎的效果尚无明确证据支持。如果您想尝试中药治疗，建议在专业医生的指导下进行，并确保选择正规的医疗机构或中医师。中医治疗不能替代西医治疗，应作为辅

助治疗使用。 为了预防慢性肾炎的复发，除了以上建议外，您还需要定期复诊，按照医生的指导进行治疗和监测。同时，避免受凉、感染、过度劳累等因素，保持心情舒畅，适当减轻压力，有助于维持和改善肾功能。最重要的是，跟医生建立良好的沟通，及时就诊，听从专业建议。祝您早日康复！

问：我的腿不知道怎么回事总是感觉非常疼痛，下雨阴天会加重，有时半夜睡着还会痛醒，去医院检查是痛风，不知道痛风病人要禁食哪些食物呢痛风病人要禁食哪些食物呢？

答：痛风是一种尿酸代谢异常导致的疾病，尿酸过高是其主要表现。痛风病人需要禁食一些食物，以控制尿酸的生成和排泄，减轻症状和预防痛风发作。禁食的食物包括动物内脏、鱼子、骨髓、沙丁鱼、牡蛎、小虾皮、鲭鱼、淡菜、肉糜、肝、肾、脑、蛤蜊、蟹、鱼、肉汤、鸡汤、豌豆、扁豆、蘑菇等。此外，痛风病人还应该避免摄入各种强烈的调味品和加强神经兴奋的食物，如酒（特别是啤酒）、茶、咖啡、辣味品等。

问：脑炎引发的癫痫后遗症，现在每天都会发作几次，每次发作就是暂时性无意识、跌倒。曾经在癫痫医院救治，主要用药卡马西平.治疗后，发作的情况有所减轻.不知道能否做手术治好？

答：癫痫是一种慢性疾病，需要长期用药控制病情。手术治疗只适用于少数病例，需要医生综合考虑患者的具体情况后决定是否进行手术治疗。因此，建议您继续按照医生的建议，长期用药控制病情。如果病情有所改善，可以再次咨询医生是否适合手术治疗。

问：你好，请问一下，帕金森氏综合征是一种怎样的病，是什么情况？有哪些症状？希望详细解说一下，知道的麻烦解答一下，谢谢

答：帕金森氏综合征是一种神经系统疾病，主要是由于脑部神经细胞的死亡或受损导致的。这种疾病会导致肌肉僵硬、震颤、运动缓慢、平衡困难等症状。帕金森氏综合征的症状通常会逐渐加重，严重影响患者的日常生活。

问：我得了胃病至今有一年多了！查过胃镜，是浅表性胃炎和十二指肠溃疡。主要症状：心闷.气紧.有时呼吸困难.我只想知道气紧是胃病所至吗？

答：建议患者去医院做心电图检查，以明确是否存在冠心病。虽然气紧是胃病的常见症状之一，但也有可能是其他疾病所致，如冠心病等。因此，需要进一步检查以明确诊断。

问：我61了，高压154低压81算高血压吗，还用吃药吗。体检时量的血压，没治疗过我认为是压差大点，用不用服治高血压的药，如需服药，吃什么药好，谢谢！

答：根据您描述的血压情况，154/81是高血压的范围。建议您服用苯磺酸左旋氨氯地平片来降压。这种药物每天一次，一次一片，降压效果平缓。建议您服药三天后一天量两次血压，早晚各一次，平静状态下量。请您咨询医生以获取更详细的建议。

问：我总是感觉人晕晕的，特别是这几天胃口突然就变得很大，没做什么事情肚子就饿了，东西也越吃越多，人也有感觉无力了，特别是晚上睡觉的时候汗流的很厉害，后来我上医院去检测了血糖医生告诉我患的是糖尿病。糖尿病患者在生活中应该注意什么

答：糖尿病患者需要注意饮食，以谷类为主，多吃蔬菜水果和薯类，每天吃奶类、大豆及其制品，常吃适量的鱼、禽、蛋和瘦肉，减少烹调油用量，吃清淡少盐。食不过量，

天天运动，保持健康体重，三餐分配要合理，零食要适当。每天足量饮水，合理选择饮料，如饮酒应限量，吃新鲜卫生的食物。

问：怎么预防和治疗脑梗塞？检查为轻微脑梗塞告诉如何脑梗塞初期如何治疗和预防。怎么预防和治疗脑梗塞？

答：脑梗塞是一种严重的疾病，但在初期阶段，采取预防和治疗措施可以改善病情并降低后遗症的风险。以下是一些建议：

预防脑梗塞的措施包括：

1. 控制高血压：保持血压在正常范围内是预防脑梗塞的重要措施之一。定期测量血压并按医生的建议进行治疗是必要的。
2. 控制糖尿病：糖尿病患者患脑梗塞的风险较高。保持良好的血糖控制，并遵循医生的治疗建议。
3. 健康饮食：均衡的饮食是预防脑梗塞的重要因素。减少高盐、高脂肪和高胆固醇的摄入，增加水果、蔬菜和全谷物的摄入。
4. 戒烟和限制饮酒：烟草和酒精的摄入都与脑梗塞的发生有关。戒烟和限制饮酒可以显著降低患脑梗塞的风险。

对于轻微脑梗塞的治疗，以下是一些常见的方法：

1. 药物治疗：医生可能会给您开具药物，如抗血小板药物（如阿司匹林）或抗凝血药物，以减少血栓形成的风险。
2. 生活方式改变：同样适用于预防脑梗塞的建议，如健康饮食、戒烟和限制饮酒。
3. 物理治疗：物理治疗有助于促进肌肉功能恢复和康复过程。您可以咨询医生或物理治疗师，以获取更多相关信息。
4. 康复训练：康复训练可以帮助您逐渐恢复平衡、协调和日常活动能力。与康复医师合作进行定制的康复计划是一种有效的治疗方法。

请记住，在任何情况下，对于脑梗塞的治疗和预防措施，最好咨询您的医生。他们可以根据您的个体情况制定适合您的治疗方案。

问：今天去县医院看了，医生说是中耳炎，我让他开点药，他说不用，经常给她擦擦保持耳朵干燥，这能好吗？家里老年人说用露霉素水滴滴就好了，我也不敢试怎么办？

答：中耳炎多数是由于耳道潮湿引起的，保持耳朵干燥可以减少病情的发生。老年人建议使用露霉素水滴滴，这种药物是一种抗生素，可以杀死细菌，但是使用药物需要医生的指导，不要随意使用。如果您对医生的建议不满意，可以去另一家医院咨询。

问：我的身体一直以来都是比较胖的，以前经常喜欢吃一些甜食，可是现在都不敢吃了，是因为得了糖尿病了，经常会尿频，口干舌燥的想喝水，现在的饮食有什么需要注意的。有糖尿病怎么饮食好那？

答：糖尿病的患者需要注意饮食，选择低糖饮食，并加强体育锻炼。如果血糖控制不好，可能需要使用降糖药物进行治疗。水果是不能吃的，但可以多吃蔬菜，如黄瓜和柿子。

问：您好：我想问一下，我睾丸疼痛是怎么回事，往往是一边疼痛，昨天右边的疼今天就成左边了，以前也疼过，去医院做过几次B超都说没什么事，往往是今天很疼痛，晚上睡一觉第二天就好了，疼痛往往是在有性幻想之后，请问这是什么原因。

答：睾丸疼痛可能是由于睾丸附睾炎、真菌感染或前列腺炎等问题引起的。睾丸是男性的重要生殖腺体，如果出现问题，可能会直接影响到以后的生育和性功能。建议您积极到医院做个睾丸彩超等相关检查，及早给予对症处理。平时要注意局部卫生，多喝水，禁止不洁性交，避免外伤等。

问：前列腺炎引起的早泄是不是前列腺炎好了早泄就会消失去医院看过，确诊为慢性前列腺炎，慢性前列腺炎好了以后早泄症状是不是会消失、

答：是的，患者在前列腺炎被完全治愈后，早泄症状会有所缓解甚至完全消失。但是患者需要进行一段时间的性功能康复治疗，才能使性能力达到理想的状态。希望对您有帮助，祝您健康！

问：男，站立的时候会头晕，坐着与躺着都没问题。请问是什么原因？？有高血压，正在服药中。血脂也有点高，但近期也控制了饮食。心脏与颈椎也有轻微的毛病，但去过医院治疗并没有大毛病。

答：根据您的描述，您在站立时会感到头晕，但坐着和躺着时没有问题。您提到自己有高血压并正在服药，血脂也有点高，但近期已经控制了饮食。此外，您还提到心脏和颈椎有轻微的问题，但已经去医院治疗过并没有大问题。根据这些信息，可能的原因有高血压、血脂异常、心脏问题或颈椎问题。我建议您继续积极治疗高血压，注意饮食习惯，少吃脂肪含量高的食物，多吃蔬菜水果等清淡食物。

问：我的糖尿病也有好多年了，这些过得并不容易，总是在饮食方面下功夫，总担心自己的饮食不注意而导致自己的病症出现恶化的情况，那该怎么调节饮食会好呢？糖尿病怎么调节饮食？

答：糖尿病患者需要严格控制饮食中的热量摄入。在血糖控制较好的情况下，可以选择一些含糖量较低的水果，如苹果、橙子、柠檬、菠萝、草莓和樱桃等。此外，还应该注意合理搭配食物，控制碳水化合物的摄入量，避免过多的糖分和淀粉。同时，定期监测血糖水平，根据医生的建议进行饮食调节，保持良好的生活习惯和规律的运动。如果有其他疑问，建议咨询医生或专业营养师的意见。

问：我最近身体不舒服检查了一下发现得了痔疮，而且上厕所的时候发现肛门有点痛，想了解一下痔疮会引起肛门的疼痛吗？

答：痔疮是一种常见的肛肠疾病，会引起不同的临床症状，如便血、便秘、疼痛等。肛门疼痛是其中一种常见的症状，可能会影响患者的生活质量。因为痔疮会导致肛门周围的组织充血、水肿、炎症等，所以在排便时会感到疼痛。如果痔疮严重，可能会出现肛门坠胀、肛门瘙痒等症状，严重影响患者的生活质量。因此，及时治疗痔疮是非常重要的。可以采用药物治疗、温水坐浴等方式缓解症状，同时要注意饮食健康，避免便秘的发生。如果症状严重，建议及时就医。

问：我感觉前列腺炎加重了，疼痛感频繁了想得到怎样的帮助:因为最近疼痛感突然变得频繁了，我怀疑会不会是病情加重了，如果只用药物治疗的方法会康复吗？

答：建议患者及时就医，进行前列腺液的检查，以确定病情的具体原因。药物治疗是前列腺炎的主要治疗方法，可以使用抗生素和中成药，如热林清等。同时，建议患者注意饮食健康，避免辛辣刺激性食物，多喝水，保持良好的生活习惯。

问：我今年37岁，女，社区组织我们检查身体，我的血压是130/90，这属于高血压吗？如果是的话有什么药物降压吗，或者平时生活中应注意些什么呢，请医生帮帮忙，解答一下我这是高血压吗怎么治疗

答：根据你提供的血压信息，130/90是低压在临界值，目前暂不能诊断高血压。

建议你观察一段时间，改天在安静休息几分钟后再次测量。在平时注意控制食盐摄入量，适当进行锻炼，保持规律作息和愉悦的心情。目前情况看来没有太大问题，但请继续关注并采取健康生活习惯。

问：我心里素质不是很好，容易紧张，多顾虑。再加上我肠胃不好，工作等方面的压力。头发白了很多，染发7年了。5个月前开始，头的左边、后脑、顶部每天都痛。一阵一阵的，有点搏动感、有时顶部有锥痛感觉、用手压太阳穴附近很舒服。晚上不痛，早上起来左边和后面痛，中午一般顶部痛。有时肌肉有点跳动和刺痛，坐一会手脚容易麻木。有时上班过程中头顶很痛，手脚有抖的感觉，痛起来想呕，过一会就好些，近来视力好像不好。做了头部，颈部检查都正常。吃了降压药，正天丸、头痛宁、中药也不见好。请问医生：我应做那些检查？吃什么药？怎样自我调节？

答：根据您的描述，您可能正在经历慢性头痛的症状。慢性头痛是指头痛持续时间较长，通常超过15天的头痛。慢性头痛的原因可能是多种多样的，包括紧张型头痛、偏头痛、颈源性头痛等。由于您已经做了头部和颈部检查，结果都正常，可能需要进一步的检查来确定头痛的原因。您可以咨询医生进行详细的评估和建议。在自我调节方面，您可以尝试以下方法来缓解头痛和减轻压力：

1. 改善生活习惯：保持规律的作息时间，充足的睡眠，避免过度劳累和熬夜。
2. 减少压力：学习放松技巧，如深呼吸、冥想和瑜伽等，寻找适合自己的放松方式。
3. 饮食调节：避免过度饮酒和咖啡因摄入，保持饮食均衡，增加摄入富含维生素B和镁的食物，如全谷物、坚果和绿叶蔬菜。
4. 锻炼身体：适度的有氧运动可以释放身体的紧张情绪，增加身体的抵抗力。
5. 寻求支持：与家人、朋友或专业人士交流，分享自己的压力和困扰，寻求支持和理解。

请记住，以上建议仅供参考，如果您的症状持续存在或加重，建议及时咨询医生进行进一步的诊断和治疗。祝您早日康复！

问：我的皮肤一直都不好，经常的得一些皮肤病，是这几天的时候就又得了荨麻疹，现在身上有些水肿，荨麻疹有什么症状？

答：荨麻疹是一种常见的皮肤病，会出现风疹块，局部会感受到刺痛以及麻麻的感觉。会经常性的突然出现，几个小时后恢复，退了以后不会留下痕迹，但是会反复的发作。自觉瘙痒，可伴有腹痛、恶心、呕吐和胸闷、心悸、呼吸困难，少数有发热、关节肿胀、低血压、休克、喉头水肿窒息症状等。

问：我很多朋友说只有中老年人才会出现此病症，得高血压已经很久了，经常觉得头晕，头痛，恶心，高血压高危人群标准是什么？

答：高血压的高危人群是指血压未得到控制，但仍然很高的人群。这些人容易出现高血压相关的心脑肾视网膜等并发症。高血压的高危人群具有某些危险特征，易患高血压疾病。这些特征包括肥胖、酗酒、精神因素（如精神压力大、焦虑、性格急躁，尤其是A型性格人群更容易患高血压）、高血压家族史等。

问：我是一个32岁的男性，从昨天晚上开始，就有尿频、尿急的感觉，小便还有灼热感，但每次都尿不了多少，想知道急性前列腺炎症状有哪些？

答：根据病人的症状描述，可以怀疑他患有急性前列腺炎。急性前列腺炎的症状包括尿频、尿急、尿痛、尿不尽等。此外，急性前列腺炎还可能伴随着发热、寒战、肌肉酸痛等全身症状。通过直肠指检，可以发现前列腺明显增大、肿胀、触痛。

问：我在怀孕的时候就长了很多的斑，尤其是脸上，特别的明显，老人都说生完孩子会下去，可是我家宝宝都一周岁了，还是老样子，本来我的皮肤就很白，现在斑很多看起来非常的难看。想得到怎样的帮助：佛山激光祛斑多少钱？有没有后遗症？

答：激光祛斑是一种常见的治疗色素斑的方法，但需要多次治疗才能完全去除，而且有可能会复发。激光祛斑的价格因医院和机构而异，需要咨询当地的整形机构或医院。激光祛斑有可能会出现红肿、瘀斑等后遗症，需要在医生的指导下进行治疗。

问：宝宝今年三岁了正是胡吃乱吃的年龄可能由于摄入的东西太多导致宝宝长期有腹泻的毛病而且经常是吃了药就好不吃药就犯病请问长期这样下去会对宝宝有什么危害呢？。宝宝长期腹泻会造成哪些危害？

答：长期腹泻会降低宝宝的身体抵抗力，引起营养不良、贫血和维生素缺乏等问题。这些会使宝宝对传染病和各种感染的抗病能力减弱。腹泻时，宝宝对营养的吸收会受到严重障碍，导致能量供给不足，宝宝可能会感到头晕、口干、四肢疲乏、心慌气短，甚至出现营养不良的表现。长期腹泻还会影响宝宝的生长发育和健康状况。

问：一朋友经常性月经不调，每次来月经都会心慌气短的，而且还会小腹疼痛，经血不畅的情况，她一直都没有用药治疗，现在感觉情况更加严重了，请问医生，我朋友的情况应该如何治疗效果好呢？

答：建议您的朋友口服妇康片，一次5片，一日2次。但是在服用妇康片的同时，不宜同时服用藜芦、五灵脂、皂荚及其制剂。如果情况严重，建议及时就医。

问：王姐这几个月体重下降的很厉害，一直没见好，而且有一些比较严重的面色发黄，经常会因为长期的站立会有一些身体疲劳，还会有些食欲亢进，像是甲亢，还会有什么症状呢。甲亢的人会有什么不好的症状呢？甲亢的危害主要体现在哪方面？

答：甲亢患者会有容貌上的改变，承受着巨大心理压力。甲亢患者还可能引起糖尿病。甲状腺素可以抑制胰岛素的作用，甲亢时这种作用更强，且可以促进葡萄糖的吸入，因此引起糖尿病。建议多吃含维生素的食物，保护肝脏，饮食清淡，平常要多锻炼身体，不要喝酒。另外最好是到医院做一个病因检查，以便好好对症治疗。

问：因为身体消瘦的厉害，我开始休息了，之后去医院进行检查化验，结果发现我竟然患上了糖尿病，请问能介绍一下糖尿病的相关知识和治疗方法吗？饮食上需要注意哪些？我最近时不时会出现头晕，这和糖尿病有关系吗？糖尿病人有时候忽然头晕怎么回事？

答：糖尿病是一种慢性代谢性疾病，主要表现为血糖升高，常见的症状有多饮、多尿、多食、消瘦等。糖尿病的治疗方法主要是控制血糖，但是长期服用降糖药物会引起很多的并发症。中医治疗疾病则是通过患者不同的体质，不同的病情，根据个体对证治疗。饮食上需要注意控制碳水化合物的摄入，多吃蔬菜水果，少吃高糖高脂肪的食物。糖尿病患者出现头晕可能是因为糖尿病并发了心脑血管病变引起的。

问：前列腺炎困扰好几个月了，从开始就一直治疗，到现在症状是没有了但是还是有点说不出的难受，精液检验也正常，前不久一起共事的同事告诉我说跑步对前列腺增生好，跑步对前列腺增生有何影响？

答：跑步对前列腺增生没有直接的预防作用，但是通过跑步锻炼身体来增强整体的抵抗

力，有一定的优点。所以可以考虑通过体育锻炼等来强化体质，改善身体状况。此外，饮食方面，多摄入有营养的蔬菜和水果也有助于修整前列腺。

问：我一直都听别人说糖尿病是的，特别可怕的，但是最近我因为身体不舒服去医院检查的时候发现我因为身体不舒服，但是我又我又没有任何症状，所以我想问糖尿病患者都有哪些症状？

答：糖尿病患者可能没有任何症状，需要通过体检或者血糖检查才能发现。典型的症状是三多一少，即多饮、多尿、多食、消瘦，体重会进行性下降的。

问：我家老人年前感觉肝区不舒服，经检查确诊为乙肝小三阳肝功能不正常。想了解得了乙肝小三阳能活多久?应该怎么治疗乙肝小三阳？乙肝小三阳的治疗建议

答：乙肝小三阳患者应该及时到正规医院治疗，选择适合病情的治疗方法，避免治疗误区。肝功能异常患者不要盲目服药治疗，以免加重肝脏负担，导致疾病恶化。乙肝小三阳患者的寿命与治疗方法、病情严重程度、是否合并其他疾病等因素有关，不能一概而论。平时饮食注意清淡为宜，营养均衡。

问：我的姑妈患有二型糖尿病已经有好多年了，一直都在吃一些治疗糖尿病的药物，可是现在年龄大了，身体抵抗力下降，导致病情越来越严重。二型糖尿病的症状有哪些？

答：二型糖尿病的症状主要有胰岛素抵抗和胰岛素分泌缺陷两种类型。其中，胰岛素抵抗型的病人多肥胖，由于胰岛素抵抗，胰岛素敏感性下降，血中胰岛素增高以补偿其胰岛素抵抗，但相对病人的高血糖而言，胰岛素分泌仍相对不足。这类病人早期症状不明显，仅有轻度乏力、口渴，常在明确诊断之前就可发生大血管和微血管并发症。饮食治疗和口服降糖药多可有效。另一部分病人以胰岛素分泌缺陷为主，临床上需要补充外源性胰岛素。

问：婆婆身体稍有点偏胖，平明身体也挺好的，可最近婆婆老是会很多尿，经常跑厕所，饭量加大，但却反而瘦下来了，于是我们带老人家去医院看医生，人家医生说婆婆是患了糖尿病。

答：婆婆的症状可能是糖尿病引起的，建议先去医院检查一下确切的病因，然后进行针对性治疗或进行干预。另外在饮食和心情上做下调整是可以预防复发的，祝早日康复！

问：您好，我的朋友得了糖尿病，一直在吃药治疗，效果还是挺好的，可是最近有点发展了，有很多并发症陆陆续续出现了，听有的人说糖尿病可以手术治疗了，真的是这样吗？，糖尿病手术治疗效果好不好？

答：手术治疗糖尿病的效果和适应症 手术治疗糖尿病是一种新的治疗方法，对于一些糖尿病患者可能是有效的。然而，手术治疗后的长期效果尚不明确，目前主要适用于重度肥胖患者。对于一般情况下的糖尿病患者，饮食运动和控制体重是首选的治疗方法。

问：姐夫刚刚才做过开颅手术，现在已经回家休养一阵子了。感觉在家吃一些药物姐夫都有一些心理反胃的表现，效果反正不是很好。癫痫开颅手术后的护理该怎么去做？癫痫开颅手术后的护理该怎么去做

答：癫痫开颅手术后需要家人每天观察患者的生命体征，包括体温、脉搏、呼吸、血压。在饮食方面，应给予高蛋白、高热量的食物，如蛋、乳、鸭、肉类等，保证每日摄入

足够的营养，促进恢复。为增进食欲，进食前可作轻微活动4-5分钟食谱应经常改变，并注意色香味，胃口欠好时，可少量多餐。

问：我有个同事最近月经乱了套，经量明显增多，而且身体动不动就感觉疲乏，脸色也没有原来红润了，她以为没什么也就没在意，只到有一次洗澡时发现腹部胖了很多，而且有点腰痛。第二天就去医院检查，B超显示她子宫内长了一个子宫肌瘤，大小为8.

1*10.3CM,医生告诉她，用药物是没办法把这么大的肌瘤祛除掉的，需要动手手术切除肌瘤。患有子宫肌瘤真的要切除吗？有没有什么后遗症？

答：子宫肌瘤是一种常见的妇科疾病，如果肌瘤较大，最好的方法是动手术切除。手术后可能会出现一些不良反应，如卵巢衰竭、更年期症状、肥胖、高血压、心脏病、骨质疏松症等。术后三个月，如有时还能感到拿重一点东西肚子和腰部不舒服，可以再去医院复诊。

问：你好！我现在血糖8.5糖化血红蛋白7.5是糖尿病吗？本来就有高血压病，我该怎么办？恳请回复

答：根据您提供的血糖和糖化血红蛋白的数值，8.5和7.5，糖尿病的可能性比较大。为了更准确地诊断是否患有糖尿病，还可以进行餐后两小时血糖的检查。此外，您还提到有高血压病，这也需要注意。对于糖尿病和高血压病的处理，饮食和运动是非常重要的。建议您注意饮食，控制碳水化合物摄入量，增加蔬菜和水果的摄入，避免高糖食物和饮料。此外，适量的运动也有助于控制血糖和血压。定期复查也是必要的，以便及时调整治疗方案。如果您有任何疑问或需要进一步的帮助，建议您咨询医生或专业医疗机构。

问：我近期总是会尿频尿急，感觉很不舒服，所以我想问一下尿频怎么办？

答：尿频的治疗方法因尿频的原因而异。如果是由于糖尿病、尿崩症、急性肾衰竭等多尿性尿频引起的，需要降低血糖水平，使用治疗肾衰的药物。如果是由于膀胱炎、尿道炎、前列腺炎等炎症性引起的尿频，需要使用抗生素药物治疗。

问：前列腺肥大可以手术治疗吗？最近前列腺特别的肿胀，而且小便时也特别的困难，好像是前列腺肥大，可以手术治疗吗？前列腺肥大可以手术治疗吗

答：前列腺肥大可以手术治疗，但是治疗方法应根据病因进行选择。对于前列腺肥大的症状，如尿频、尿急、尿痛、尿流变弱等，应到正规的医院进行检查，查明病因，对症治疗。治疗方法包括药物治疗、手术治疗等。如果病情较为严重，药物治疗无效，可以考虑手术治疗。

问：医生，我有无菌性慢性前列腺炎，多年经过多次物理及中药治疗仍没根治。有可以根治的中药方吗？在健康网找到一个中药方，说

答：根据您的描述，您患有无菌性慢性前列腺炎多年，经过多次物理和中药治疗仍未能根治。对于前列腺炎的治疗，中医辨证治疗和电切手术是常见的治疗方法之一。中医辨证治疗是根据患者的具体病情和体质特点，通过辨证施治的方法来调理身体，达到治疗疾病的目的。对于前列腺炎，中医辨证治疗可以通过调理气血、活血化瘀、清热解毒等方法来改善炎症状况，缓解症状，并逐渐达到根治的效果。电切手术是一种微创手术，通过将电切环经尿道送入前列腺增生部位，利用高频电流逐步切除增生的前列

腺组织，从而达到治疗的效果。电切手术可以有效地切除前列腺增生组织，缓解炎症症状，并且具有较低的创伤和恢复时间。需要注意的是，每个人的病情和体质都有所不同，治疗效果也会有差异。因此，建议您尽快就医，由专业医生根据您的具体情况进行治疗和制定方案的制定。医生会根据您的病情综合考虑中医辨证治疗、电切手术等治疗方法的适用性，并为您制定个性化的治疗方案。

问：我最近经常尿频，开始不在意，后来在老婆的建议下去医院检查了下，说是前列腺炎，那么这个病是怎么引起的？

答：前列腺炎大多数是由于细菌感染引起的，但也可能是因为生活中的一些不良习惯，如劳累、着凉、过量饮酒、经常吃有刺激性的食物、过频的性生活等。建议多喝温开水，稀释尿液浓度，不要憋尿，节制性生活，防止受寒着凉。如果症状严重，建议及时就医。

问：，医院检查未查出任何问题。医生开了西药吃了半个月，症状消除了，但是严重毁了性功能。最近尿频尿急尿不尽又犯了。请问到底什么原因？吃点什么药比较好？

答：根据症状描述，可能是前列腺炎引起的尿频尿急尿不尽。建议尝试中成药桂附地黄丸或中药调治，以避免西药对性功能的影响。同时，建议到医院进一步检查以确定病因。

问：血压低压110高压140要注意什么低压和高压都高多少怎么饮食或者锻炼

答：血压低压110高压140属于高血压前期，需要引起重视。建议在医生的指导下进行治疗，同时改变不良生活习惯和饮食习惯。饮食应保持清淡均衡，多食高纤维食物，减少进补、甜食和高胆固醇饮食。多吃蔬菜、豆制品、瘦肉、公鸡肉、兔肉、海蜇和鱼类，尤其应多吃富含纤维素的蔬菜，以减少胆固醇在肠内的吸收。

问：如果出现了耳鸣要怎么办呢？我是晚上睡觉时喜欢出现耳鸣，不是很影响睡眠，睡着了就好了，第二天也很好。晚上睡觉耳鸣怎么办？

答：耳鸣的原因有很多种，包括神经性的、传导性的、高血压导致的等等。建议您去耳鼻喉科就诊，以明确导致耳鸣的具体原因。对于晚上睡觉时出现的耳鸣，如果不影响睡眠且第二天感觉良好，可以先观察一段时间。如果耳鸣持续出现或者影响到您的生活质量，可以考虑使用一些药物治疗。例如，百合散是一种常用的中药治疗耳鸣的药物，可以将百合研成粉末，用温水冲服每日两次。此外，甲钴胺分散片、银杏叶片和维生素B1片也可以考虑使用。但是，请您在使用药物之前一定要咨询医生的意见。

问：我一直都觉得我的身体不错，而且我一直都有在运动，生活作息也十分的正常，每次体检结果都非常的好，可是我一直没有孩子，去做精子检查的时候，说我得了无精症。有什么因素会导致无精？

答：无精症是指精液中没有精子或精子数量极少，导致男性不育。无精症的原因有很多，包括先天性睾丸功能生精障碍，输精管堵塞，前列腺炎等。

问：我以前基本没有得过什么病，身体很健康，连感冒都很少得，结果最近总觉得尿频，然后去医院检查发现得了糖尿病，我想来咨询一下这个病在饮食上应该注意什么？

答：糖尿病患者饮食上应该注意控制总热量和体重，减少食物中脂肪，尤其是饱和脂肪酸含量，增加食物纤维含量，使食物中碳水化合物、脂肪和蛋白质的所占比例合理。

控制膳食总能量的摄入，合理均衡分配各种营养物质。

问：你好!请问下大家支气管炎有什么症状？最近经常咳嗽，这种情况已经有一个多月了，又感冒症状，胸闷，气促，咳嗽，持续一个星期了，这样子下去会不会引起其它的症状？

答：支气管炎的症状主要包括咳嗽、咳痰和喘息或气急。咳嗽是由于支气管粘膜充血、水肿或分泌物积聚引起的，严重程度因病情而异，一般晨间咳嗽较重，白天较轻，晚间睡前可能有阵咳或排痰。咳痰是因为夜间睡眠后支气管内积聚痰液，起床后或体位变动时刺激排痰，通常在清晨排痰较多，痰液一般为白色粘液或泡沫状，偶尔可能带血。喘息或气急是由于支气管痉挛引起的，可能伴有哮鸣音。早期可能没有气急的症状，但在病情反复发作数年并发阻塞性肺气肿时，可能出现不同程度的气急，先有劳动或活动后出现气喘，严重时即使轻微活动也会出现气喘，生活可能受到影响。这些都是支气管炎的主要症状，需要引起注意。试试干椴草茶调理，这个是一种安全健康的绿茶疗法，专门用于调理支气管炎。

问：外阴及阴道口瘙痒有灼热感，而且阴道口长有几粒小豆豆，分泌物增多，有异味，呈黄色或乳白色。这种情况持续2个月了，伴有尿频尿急等症状。

答：根据症状描述，可能是阴道炎症引起的。阴道炎症有多种类型，包括非特异性阴道炎、滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎、老年性阴道炎及阴道嗜血杆菌性阴道炎等。建议就诊妇科医生，进行检查并使用敏感抗生素治疗。

问：我的身体一直都很好，可是最近却觉得特别累，而且下体还瘙痒，还有异味，红肿特别难受还有白色的斑点，就去医院检查，医生说是外阴白斑。外阴白斑是如何引起的呢？

答：外阴白斑的引起原因有多种，包括感染、炎症刺激、内分泌失调、其他疾病等。感染和炎症刺激是外阴白斑的主要原因，如乱用药物、治疗不当，也可能导致或加重白斑病的形成与发展。此外，患糖尿病、白癜风、外阴湿疹、外阴瘙痒等疾病也可能引起外阴白斑。日常生活中应注意生活压力及情绪的调节，保持情绪乐观，心情开朗。这一点，患者家属应积极配合，使其树立战胜疾病的信心。

问：前几年的了痛风病，很是难受，尤其是现在到了雨天，腿部关节酸痛的都不能走路，让我很是痛苦，我想通过饮食上调节下，我想知道饮食上需要注意什么。

答：病情分析：痛风是一种代谢性疾病，主要是由于体内尿酸过多，导致尿酸盐在关节沉积，引起关节炎症。饮食上需要注意控制摄入高嘌呤食物，减少肉类、海鲜、动物内脏等食物的摄入，多吃粗粮、蔬菜、水果等碱性食物，避免过度饮酒，多喝水，保持体重正常。此外，多喝多酚咖啡可以提高尿酸排出率。

问：感冒快好时候突然天旋地转的头晕转头或低头都会加剧还有恶心呕吐的症状吃点东西就会吐曾经的治疗情况和效果：吃了些感冒药有什么治疗办法？

答：根据你的描述，你这种情况可能与低血压或颈椎问题有关。我建议你可以试着服用眩晕停或盐酸倍他司汀片进行治疗。此外，近期请确保充足的睡眠时间，避免食用辛辣刺激的食物，可以尝试少食多餐，避免食用不易消化的食物。如果症状持续或加重，建议咨询医生进一步诊断和治疗。

问：最近总是觉得身体不舒服，然后去医院检查，有前列腺炎，我真的非常担心，治疗前列腺的最好方法，有哪些呢？

答：前列腺炎是一种常见的男性疾病，治疗方法有很多种。首先，你应该去当地正规医院进行检查，以确定确诊。在治疗方面，除了药物治疗外，还可以采取一些生活方式的改变来缓解症状和促进康复。例如，饮食上要避免辛辣刺激的食物，戒烟戒酒，多饮水，避免久坐，熬夜和劳累，长时间骑车或开车等。此外，还要避免过度手淫和房事，保持规律的生活作息，适当进行身体锻炼等。另外，你还可以适当地服用一些补肾壮阳的食物进行调理和补充。

问：医生，你好，上次去检查的时候医院的报告是我有轻度的脂肪肝，我想问下轻度的脂肪肝需要治疗吗？平时生活中我应该多注意点什么东西轻度的脂肪肝需要治疗吗？

答：脂肪肝是指脂肪在肝内的过度蓄积。一旦患了脂肪肝，应如何处置呢？轻度的脂肪肝一般不需要特殊治疗，但需要注意生活方式和饮食习惯，以减轻肝脏负担，防止病情进一步恶化。建议找出病因，有的放矢采取措施。如长期大量饮酒者应戒酒。营养过剩、肥胖者应严格控制饮食，使体能恢复正常。有脂肪肝的糖尿病人应积极有效地控制血糖。营养不良性脂肪肝患者应适当增加营养，特别是蛋白质和维生素的摄入。调整饮食结构，提倡高蛋白质、高维生素、低糖、低脂肪饮食。不吃或少吃动物性脂肪、甜食（包括含糖饮料）。多吃青菜、水果和富含纤维素的食物，以及高蛋白质的瘦肉、河鱼、豆制品等，不吃零食，睡前不加餐。适当增加运动，促进体内脂肪消耗。每天跑步，每小时至少6公里才能达到减肥效果。仰卧起坐或健身器械锻炼都是很有益的。药物辅助治疗，脂肪肝并不可怕，早期发现积极治疗，一般都能痊愈，且不留后遗症。值得指出的是，脂肪肝的预防工作应从儿童做起，尤其是独生子女，想吃什么就给什么，活动又少，一旦变成“小胖墩”，恐已有脂肪肝了。以上是对“轻度脂肪肝需要治疗吗”这个问题的建议，希望对您有帮助，祝您健康！

问：孩子有点咳嗽呼吸不畅，像是有支气管哮喘，其实还没有做专业的检查，我只是在网上查的症状和支气管哮喘相似，痰液很多，胸闷气短喘不上来气，应该做什么样的诊断呢支气管哮喘有什么样的方法来诊断呢？

答：对于有典型症状和体征的患者，可以通过临床诊断来确定是否患有支气管哮喘。对于不典型病例，可以进行支气管舒张或激发试验来确诊。

问：一直来都以为公公得类风湿关节炎，因为公公年轻的时候生活很苦的，他的症状是主要是关节疼痛，这个月还肿了起来，而且内部还发热，到医院去做了详细的检查，结果说是痛风。

答：痛风的临床表现包括受累关节及周围组织红、肿、热、痛和功能受限，部分患者可有发热、寒战、头痛、心悸和恶心等全身症状。痛风是一种慢性疾病，目前还不能完全治愈，只能通过药物来控制病情的发展。

问：朱医生，您好！我痛风一年了，起初不知道是痛风，后面去医院检查才知道尿酸过高（619）引发痛风。其他都正常，痛风部位是脚踝内测附近，我想请问一下您我能治好么。

答：对于痛风，可以通过药物治疗和饮食控制来控制症状和预防发作。药物治疗方面，根据血尿酸水平的情况，可以使用碳酸氢钠片、苯溴马隆或别嘌醇等药物。在痛风急性

发作时，可以使用秋水仙碱镇痛，平时轻微的疼痛可以使用吲哚美辛和扶他林软膏。此外，饮食控制也非常重要，需要避免食用嘌呤含量高的食物。至于能否治愈痛风，痛风是一种慢性疾病，目前尚无完全治愈的方法，但通过合理的治疗和生活方式的调整，可以有效控制症状和预防发作。因此，与医生密切合作，按照医生的建议进行治疗和管理是非常重要的。

问：患有前列腺囊肿，这些日子感觉更加严重了，还有肛门和睾丸疼痛、下腹部有胀痛、排尿时有隐隐阵痛这些症状出现。谁能告诉我前列腺囊肿治愈用什么方法有效。

答：前列腺囊肿的治疗方法包括药物治疗和手术治疗。药物治疗可以通过使用抗生素来消除感染，还可以使用消炎药物来减轻疼痛和炎症。手术治疗可以通过切开囊肿并排空其内容物来治疗。具体的治疗方法应根据病情选择，建议您咨询医生以获取更详细的治疗方案。希望这个回答对您有帮助。

问：一直就感觉胃胀，不舒服，口臭，感觉肚子和口里的火气很大。才到照了胃镜和幽门螺旋杆菌，说有慢性胃炎，胆汁反流，之后又建议照了胆囊没事，幽门螺旋是阳性++。吃了一阶段医院开的药，我感觉一点效果都没有，能不能治好啊，口不臭怎么治疗？

答：你好，胃胀、口臭等不适考虑消化不良、胃炎等消化道疾病，病因主要是饮食不合理，烟酒药物刺激，细菌感染等，其中幽门螺杆菌是主要致病菌，能抵抗胃酸，很难根治。建议正规医院消化内科就诊，做一下血常规，肝肾功，血脂血糖，电解质，肝胆彩超等，药物主要是质子泵抑制剂，胃粘膜保护剂，抗生素等，中西医结合治疗效果更好。忌辛辣刺激性食物，劳逸结合，保持好心态很重要。

问：我隔壁的一个大爷，最近一段时间经常感到人很不舒服，他儿子带他去检查说是脑溢血，住院治疗1一段话时间有好转，现在出院在家了调理，听说脑出血会猝死，他们家里人都很担心，想咨询看看脑溢血治疗后后遗症要注意什么？

答：脑出血是一种严重的疾病，需要及时治疗。治疗后，患者需要注意一些事项，以避免后遗症的发生。首先，需要定期检查，采取服药措施，降低或稳定血压，防止血压突然增高。其次，需要早期发现动脉硬化，降低血脂及胆固醇，以保持血管的弹性。此外，患者需要保持乐观的心态，避免精神紧张和疲劳，防止动脉硬化和血压上升。最后，需要注意劳逸结合，合理安排工作，保证足够睡眠，避免过劳过累。

问：患者系一慢阻肺并肺部感染、冠心病患者，因咳嗽、咳痰、胸闷、气促入院，经抗感染、护心、利尿等治疗后病情无缓解，第三天患者突发呼吸困难，端坐呼吸，肺部可闻及湿性罗音及较多痰鸣音，抽血检查脑钠肽明显升高，予以硝普钠、速尿等治疗

答：根据患者的临床症状和检查结果，可能存在心衰的可能性较大。心衰是一种心脏功能减退的疾病，常见于冠心病患者。患者入院时出现咳嗽、咳痰、胸闷、气促等症状，经过抗感染、护心、利尿等治疗后病情未见好转。第三天患者突发呼吸困难，端坐呼吸，肺部可闻及湿性罗音及较多痰鸣音。抽血检查发现脑钠肽明显升高，这是一种心衰的生物标志物。因此，医生给予了硝普钠、速尿等治疗，这是心衰的常规治疗方法。

问：咳嗽变异性哮喘吃什么药好呢我咳嗽变异性哮喘有十多年了，最近有开始发作，咳嗽胸闷。咳嗽变异性哮喘吃什么药好呢？怎么治疗呢？

答：咳嗽变异性哮喘是一种慢性疾病，需要长期的治疗和护理。治疗的目标是缓解症状、控制炎症、预防发作，并提高生活质量。常用的药物治疗包括口服甘草合剂、阿奇霉素和喘定。此外，患者还应注意休息，禁烟酒，禁辛辣食物，增强免疫力，预防感冒，并注意吸吸氧。

问：叔叔一向患有高血压，平时会定时服用降压药的，但三天前，叔叔突然右边脸瘫痪了，口齿不清，不停地流口水，右眼也不能合上，带去医院检查，医生说他是脑梗塞。脑梗塞有什么最佳治疗方法。

答：脑梗塞的治疗方法包括活血化瘀，抗血小板聚集的拜阿司匹林，清除氧自由基的依达拉奉，尤瑞克林等药物，同时积极降压，营养神经的药物胞磷胆碱，以及活血的丹参滴丸也可以使用。建议到好点的医院做个头颅的磁共振看看。

问：我上星期去医院检查医生说我患了糖尿病，请问刚得了糖尿病能治好吗？现在自己好担心，想趁现在没有严重想去治疗一下，请问有什么好的治疗方法吗？

答：糖尿病是一种代谢紊乱综合征，长期坚持规范治疗控制血糖是最重要的。治疗方法包括控制饮食，坚持适量运动锻炼，合理用药。建议您及时就医，听从医生的建议，积极配合治疗，保持良好的生活习惯，控制血糖，预防并发症的发生。

问：前因有时突然心慌气闷，心跳加速，做了24小时心电图，这是结果:窦性心律，阵发性心房颤动，频发房性早搏，部分连发，部分呈二联律，见105阵短房性心动过速，偶发室性早搏，部分I通道，3通道ST段下移>1mm。心脏彩超显示并无器质性病变。

答：根据患者的病情描述和24小时心电图结果，患者存在阵发性心房颤动、频发房性早搏、105阵短房性心动过速、偶发室性早搏等情况，但心脏彩超未显示器质性病变。建议患者进行射频消融术治疗。

问：我最近一段时间总是感觉睾丸胀痛明显，特别是性生活后，疼痛更加明显，很担心患有要命的疾病，我想问一下，这病好治吗？睾丸疼痛的治疗方法？

答：睾丸疼痛的原因有很多，如睾丸炎、睾丸肿瘤、睾丸囊肿、睾丸鞘膜积液、附睾炎、精索静脉曲张、精囊炎、前列腺炎等。这些疾病都会导致睾丸疼痛的症状。睾丸是男性的重要生殖腺体，如果出现问题，会直接影响到生育和性功能。建议患者进行相应的检查，明确诊断后进行针对性的治疗，以便尽早康复。

问：膝盖右肿痛一个多月，一月前去医院检查说是滑膜炎，用针抽出来的是血，用了一段消炎针症状缓解，现又复发，抽出的还是血，行动困难。医生诊断为骨性关节炎和滑膜炎，建议行关节置换手术

答：滑膜炎是膝关节滑膜的炎症，常见于老年人的膝关节骨关节炎。它主要是由于软骨退变和骨质增生引起的机械性和生物化学性刺激，导致膝关节滑膜水肿、渗出和积液等症状。在年轻人中，滑膜炎通常是由急性创伤或慢性损伤引起的。急性外伤包括膝关节扭伤、半月板损伤、侧副韧带或交叉韧带损伤，可能导致关节内积液或积血，表现为急性膝关节外伤性滑膜炎。长期慢性膝关节劳损或轻微外伤，加上风、寒、湿邪的侵袭，

可能导致慢性膝关节滑膜炎。医生建议最好采用外用药物治疗，如邱医堂膏药，它可以通过外敷舒筋活血、消肿止痛、活血散淤、祛风散寒的作用，改善膝关节的血液循环，保护滑膜，减少炎症渗出，促进关节液吸收，从而缓解关节僵硬、水肿和疼痛的症状，促进功能恢复。

问：我是05年生的孩子，生完孩子以后一直在家带孩子，后来就出现心慌，气短，失眠等一些列的症状，特别是脖子很难受，去医院检查，是甲亢，我想咨询一下，甲亢到底是一种什么样的病？

答：甲亢是一种多脏腑受病、多病机并存的复杂的病理过程，病位在颈部，临床上呈现的颈肿、怕热汗出、心悸心烦、消谷善饥、性急易怒、指舌颤动、形体消瘦等症状。治疗上常通过疏肝理气、清肝泻火、健脾化痰、滋阴降火、滋补肝肾、宁心安神、祛痰散结、活血通络、驱除邪毒等多种方法、多个环节，借以达到调整人体内环境失调的病理状态。

问：血压140、100，有一个多月，自身感觉不明显，偶尔有头晕和胸闷现象。心电图显示窦性心率，T波地平。生理周期正常。已经做过尿常规和血液检查，没有三高现象，尿液检查也正常。吃了一周左右降压药和一个月营养心肌的药效果不好。怎样降低血压？改善心脏供血问题。

答：根据用户的情况，以下是一些建议来降低血压和改善心脏供血问题：

1. 饮食调整：采用低盐饮食，减少钠的摄入量。避免食用高热量、高脂肪和高糖的食物，多食用鱼类和绿色蔬菜。这些食物有助于降低血压和改善心脏供血。
2. 药物治疗：如果血压控制不理想，可以考虑使用缬沙坦等降压药物。但是，药物治疗应该在医生的指导下进行，不要随意使用药物，以免造成症状恶化。
3. 注意生活习惯：保持适当的体重，避免过度劳累和精神紧张。规律锻炼，适量运动有助于降低血压和改善心脏供血。
4. 定期复查：定期进行血压监测和心电图检查，以及其他必要的检查，以评估治疗效果和排除其他潜在的心血管问题。

请注意，以上建议仅供参考，具体的治疗方案应根据医生的建议和个人情况来确定。建议您咨询专业医生以获取更准确的诊断和治疗建议。

问：以前没发现过有任何病，不知道怎么就突然高了，想问医生，如何调理，把血压降下来。谢谢:需要医生帮助提供远程诊断：如何把血压降下来

答：高血压是一种慢性疾病，调理高血压需要综合治疗，包括药物治疗和生活方式改变。药物治疗方面，可以使用降压药物来帮助降低血压。在选择药物时，需要根据个体情况和医生的建议来确定最合适的药物。此外，生活方式改变也非常重要。例如，保持健康的饮食习惯，减少盐的摄入量，增加蔬菜水果的摄入量，限制饮酒和咖啡因的摄入，适量进行有氧运动，保持适当的体重等。这些措施可以帮助降低血压并改善整体健康状况。建议您咨询医生的意见，根据个体情况制定最合适的治疗方案。

问：我是一位30岁痛风患者，原关节痛反复发作，肝脏不好(转氨酶轻度升高)，肾功能正常。前不久急性发作过后，开始吃痛风排酸胶囊治疗5个月后，尿酸由原来的755毫摩尔/升降低379毫摩尔/升，王医生建议下一步，饮食治疗同样重要，并说要遵从一定的饮食原则，想了解下痛风病人的饮食怎么做。痛风患者的饮食中那些食物能吃?痛风病不能吃什么？

答：痛风患者需要注意饮食，避免摄入高嘌呤食物，以减少尿酸的产生和摄入。同时，

痛风患者需要保持适当的体重，避免过度肥胖，因为肥胖会增加尿酸的产生和摄入。此外，痛风患者需要多喝水，以促进尿酸的排泄。痛风患者可以适量食用低嘌呤食物，如牛奶、豆腐、鸡蛋、鱼类、瘦肉、蔬菜、水果等。痛风患者不可以吃各种动物内脏、脑髓、浓肉汤、鸡汤、鱼汤、海蛤蟹、各种海鱼、沙丁鱼、鲳鱼、鳝鱼、鲑鱼、淡菜、粗面粉、全麦片、各种豆类、花生、菠菜、鲜豆荚等。祝健康。

问：我突然再睡梦中头晕旋而惊醒，后来一起床就头晕，一躺下也头晕。我试了一下，卧躺下不头晕，翻身不头晕。坐着起来不头晕。低头弯腰不头晕。这是怎么回事，我做了脑CT正常，心电图正常，颈椎多普勒是血流量减少。我有劲椎病，高血压，低压90-100.高压正常。心脏早搏。请专家指教，是什么原因，还需要做什么检查，怎样治疗。

答：根据病人的描述，可能是由于颈椎病引起的血流量减少导致的头晕。建议到医院神经内科做相关检查，如血常规，血沉，血糖，血脂分型，确定病因后处理比较好，不要盲目治疗，以免贻误病情。注意休息,禁忌辛辣食物以及烟酒。具体治疗由当地医生根据病人具体情况决定。

问：您好！请问，前列腺钙化了，需要多久的时间才能治愈呢？谢谢您！

答：治疗前列腺钙化需要采用去湿热与活血化瘀的中药配方，对于顽固性前列腺结石服用前列腺散同时要配合利尿的中药。快的话，60天内前列腺结石会缩小或消失，钙化斑会从前列腺表面脱落，被排出体外。中药治疗克服了西医治疗对前列腺的破坏性。

问：有前列腺炎，吃了7，8天的药一个疗程有有点好转，慢性前列腺炎一般光吃药，多长时间才能治愈。那药还继续吃还是再去医院检查，吃药太慢有快的方法吗，如果有一般要多少钱，前列腺炎如果不吃药了还会反复吗。

答：前列腺炎的治疗时间因人而异，一般需要持续几周到几个月的时间。如果您已经吃了7、8天的药，但没有明显好转，建议您再去医院检查，以便医生根据您的具体情况调整治疗方案。同时，您也可以咨询医生是否有更快的治疗方法。关于药物的具体剂量和费用，这需要根据您的具体情况和医生的建议来确定。前列腺炎如果不及时治疗或治疗不彻底，可能会反复发作。因此，建议您按照医生的指导进行治疗，遵守医嘱，以提高治愈的机会。

问：请问血压100到140，是什么情况引起的血压高，我平时吃舒筋活络的药有关系吗，我应该注意不吃什么食物。

答：高血压是一种无法彻底根治的疾病，药物只能起到控制的作用。平时的保养非常重要，包括规律的生活作息和适当的锻炼身体。在饮食方面，应该少吃高脂肪食物，如排骨和五花肉，而多吃一些胡萝卜、芹菜、山楂、枣和花生，这些食物有降压的效果。如果调理效果不明显，应该咨询实际诊断医生，根据个人情况选择药物治疗。

问：孩子这几天总是念叨不舒服，有的时候还会头晕，自己总说是得了脑梗，但是看着不太像，但是家里人也很担心，也不知道该怎么办。想问下老人脑梗塞症状都有哪些呢？

答：脑梗塞是一种脑血管疾病，常见于老年人，特别是那些患有心脏病、高血压和高血脂的人。脑梗塞的主要症状是偏瘫，即身体的一侧出现无力或麻木。除了偏瘫，脑梗塞

还可能伴随其他症状，如头晕、言语困难、视力模糊、失去平衡能力等。治疗脑梗塞的方法包括药物治疗和预防措施。药物治疗方面，常用的药物包括钙通道阻滞剂、降压药和降脂药，以控制血压和血脂水平。此外，还可以使用抗血小板药物来防止血小板聚集。预防方面，建议保持健康的生活方式，如戒烟、限制饮酒、控制体重、定期锻炼等。如果您的孩子出现类似的症状，建议尽快就医，由专业医生进行诊断和治疗。

问：我最近上下楼梯都会感觉膝盖痛，一直以为是缺钙了，吃了好多钙片也没效果，已经有好长时间了，最近感觉有点严重了，只好去医院检查，才发现是骨质增生，想了解下这个病要怎么治疗？

答：骨质增生是一种常见的骨骼疾病，常见于老年人，但也有年轻人患上的情况。骨质增生会导致关节疼痛和僵硬，影响日常生活。治疗方法包括推拿、按摩、针灸、牵引、椎管注射等，同时要注意多休息，避免受凉，不要久站。在医生的指导下综合治疗，疼痛严重时也可以做封闭注射或是使用抗骨质增生的膏药外贴。

问：年纪大了，视力越来越模糊，照镜子的时候，发现眼球混浊的很，看东西的时候，感觉眼前总是有蚊子在飞，干涩的厉害，点了眼药水，没什么效果，去医院做了检查，确诊我得的是飞蚊症。飞蚊症怎么治？

答：飞蚊症的治疗方法有多种，其中神效睛明丸搭配能调整脏腑及改善体质的处方用于飞蚊症疗效显著，短期内可使黑影变淡变无。如果病患出现头重胸闷、食少口苦、尿黄而短，可以搭配三仁汤加减治疗；如果出现面黄无华、少气无力、食少便溏，可以搭配参苓白术散加减治疗；如果出现心烦少寐、胸胁满闷、口苦咽干，可以搭配加味逍遥散加减治疗；如果出现失眠健忘、头晕耳鸣、腰膝酸软，可以搭配杞菊地黄丸加减治疗。

问：爷爷的年纪大了之后就经常的腿疼腰疼的，每天都在家里做理疗，医生说是风湿性关节炎，现在手指的关节变形的很厉害，生活几乎很难自理，对于风湿性关节炎疾病该咋治疗才能见效啊？风湿疾病的治疗措施哪些最好呢？

答：风湿性关节炎是一种常见的风湿病，常见的症状就是关节畸形和功能障碍，指关节丧失其正常的外形和活动范围受到限制，如膝不能完全伸直，手的掌指关节有尺侧偏斜，关节半脱位等。这些改变都与软骨和骨遭破坏有关。治疗风湿疾病多是选择药物治疗的，治疗的原则是早期诊断和尽早合理、联合用药，常用的抗风湿病药物就是非甾体抗炎药，此类药物因可抑制前列腺素的合成而迅速产生抗炎止痛作用，对解除疼痛有较好效果，但不能改变疾病的病程。

问：我现在怀孕36周了自从怀孕以后血压就开始升高，以前一直都是110的70，最近这几次都是160.90，我很担心啊，我去医院检查了一下，医生说我是妊高症，我也不清楚到底怎么回事，不知道会不会影响孩子！

答：根据你的描述，你是妊高症，也就是妊娠期合并高血压综合征。一般情况下，你需要在绝对安静的环境中休息，减少疲劳，并按时服用医生开的降压药物。妊高症对胎儿的影响通常不会太大，但仍然需要密切关注。

问：我是外阴炎的患者，而且每年都会复发一次，让我很头痛，不知道有什么好的方法，我平时很注意卫生的，但不知为什么老是这样子，有什么好的治疗办法？谢谢外阴炎的治疗

答：外阴炎的治疗方法包括夫妻双方进行治疗。外阴阴道炎往往是性传播性疾病。患病

妇女的丈夫的包皮皱褶、尿道和前列腺中可能存在病原体。如果仅女性进行治疗而忽略了男性治疗，男性可能会被感染而导致复发。同时在性生活时使用避孕套可以减少夫妻间相互感染的风险。除了治疗患病夫妻双方，还有其他治疗外阴炎的方法。此外，识别复发的潜在原因并加以解决也很重要。

问：乙肝病变前的征兆是什么？在一年前就有开始，症状大概就是头晕，全身乏力，眼花，几次差点昏厥且在这些症状出现时，我的食欲会下降，但不至低血糖。

答：根据病人的描述，乙肝病变前的征兆可能是头晕、全身乏力、眼花、几次差点昏厥，以及食欲下降。乙肝的症状主要表现为消化道症状，如厌油、恶心、食欲不振，也可能出现黄疸，表现为眼黄、尿黄等，也有人乏力等症状。建议进行肝功能和乙肝病毒DNA检查，以确诊是否为乙肝病毒携带者。如果肝功能正常，一般不需要治疗。

问：我最近上厕所的时候觉得前列腺有一些隐隐作痛的感觉，总感觉尿急，尿频，尿疼痛的症状，该怎么办呢？

答：根据症状描述，可能是前列腺炎引起的。前列腺炎是前列腺组织的炎症，常见症状包括尿急、尿频、尿痛、会阴部或会阴部以上疼痛等。建议及时就医，医生会根据病情给出相应的治疗方案。可以根据情况使用抗生素进行抗菌消炎治疗，从而促进炎症感染的消退和恢复，促进健康的恢复。然后不要吃辛辣的食物和一些刺激性的东西来避免更多的疼痛。你可以用药物来缓解它，结束一些坏习惯。

问：我母亲最近有很明显的消瘦，而且也十分的喜欢喝水，带母亲去医院验了一下血糖，结果发现我母亲患有糖尿病了，医生给开了一些药，并且嘱咐在饮食上要十分的注意，不知道糖尿病患者不能吃什么食物。糖尿病不能吃什么食物那？

答：糖尿病患者不能吃的食物包括精制糖、糖制的各种糕点、罐头、果酱、冰激凌等。此外，还应尽量少吃土豆、粉条、红小豆、绿豆、山药、藕、芋头、胡萝卜、洋葱、蒜苗、肥肉、动物油性油脂以及蛋黄、肾、肝、肚等动物内脏。肥胖者还应少吃核桃、葵花子、花生等高热量食物。

问：轻、中度高血压中老年人应该吃什么降压药好一点，怎么个用法：是一直坚持吃还是等血压稳定之后可停止吃血，还有就是阿司匹林肠溶片要一直吃吗？上次医生说让我阿司林不要停掉，其它药可以停掉，可现在血压又回高啦！

答：对于轻度一级高血压的情况，可以通过饮食控制、适度运动、保持良好心态等方式进行控制，不需要马上使用药物治疗。如果是中重度高血压，建议尽早使用药物治疗，并规律使用药物，避免频繁更换降压药。阿司匹林肠溶片是一种抗血小板药物，主要用于预防心血管疾病。如果医生建议您使用阿司匹林肠溶片，建议您按照医生的建议进行使用，不要随意停药。如果您有任何疑问，建议您咨询医生的意见。

问：慢性前列腺炎有哪些特殊症状我不知道是不是前列腺炎，就是最近有点尿频尿急，想问下医生:慢性前列腺炎有哪些特殊症状？慢性前列腺炎有哪些特殊症状？

答：慢性前列腺炎的症状多样，轻重亦千差万别，有些可全无症状，有些则浑身不适。常见的症状大致有以下几个方面。排尿不适、性功能障碍。疼痛以及常见的身体症状。建议去正规的专科医院进行检查治疗。前列腺炎是比较复杂的疾病，如果没有及时的进行治疗，可能导致男性出现一些并发症。同时建议日常中多注意休息。

问：我本来血糖事二十多（二型糖尿病）后来通过药物治疗很快降到6.多（此时用的比较好的药）后来我咨询医生后医生说可以使用低廉点的药物了，我就开始使用消渴丸加二甲双胍现在又降到5.多了请问我还需要药物治疗么？

答：如果你已经确诊是糖尿病的话，说明药物的治疗效果很好，你可以根据血糖情况，逐渐减少药物的用量。然而目前来说，还不能完全停止使用药物，因此你仍需要继续进行药物治疗，但可以根据自己的血糖情况适量减少用量。此外，为了确定适当的药物用量，仍需要监测血糖水平。记得与医生保持沟通，按照医生的建议进行治疗。

问：怎么壮阳最有效？肾虚的治疗方法?食疗方法仅供日常生活中养肾而用，达不到彻底治愈肾虚的效果;如果肾虚严重者，应该用中药调理肾虚。请问一下大家怎么壮阳最有效呢？

答：根据你的描述，你可能患有肾阳虚，这种情况一般是由于熬夜、性生活不节制、手淫等引起，会引起腰膝酸软、耳鸣、头晕、记忆力差等。中药治疗调理最好，壮阳最好的还是鹿茸，不过比较昂贵，建议平时可以吃金匮肾气丸，平时多吃山药、动物肾脏等。

问：我发现我现在眼睛下方长了很多黑色斑，开始是一小块的，慢慢黑斑越长越大块，可能长得是老年斑，请问患有老年斑要如何治疗最好呢，如何祛除老年斑效果最好呢？如何祛除老年斑最有效呢？怎么祛除老年斑效果最好？

答：要祛除老年斑，可以尝试以下方法： 1. 防晒：老年斑的形成与阳光照射有关，因此，使用防晒霜或遮阳伞等防晒措施可以减少老年斑的产生和加重。 2. 化妆品：选择含有美白成分的护肤品，如维生素C、熊果素等，可以帮助淡化老年斑。 3. 激光治疗：激光治疗是一种常用的祛除老年斑的方法。激光可以通过瞬间高能量的作用，破坏斑块中的色素，达到祛斑的效果。但是，激光治疗需要专业医生进行操作，治疗过程可能会有一定的不适感和恢复期。 4. 化学剥脱：化学剥脱是一种通过使用化学物质来去除皮肤表面的斑块的方法。这种方法需要在医生的指导下进行，治疗过程中可能会有一定的刺激和恢复期。 5. 微针治疗：微针治疗是一种通过微针刺激皮肤，促进皮肤再生和修复的方法。这种方法可以帮助淡化老年斑，但需要多次治疗才能达到理想效果。 需要注意的是，每个人的皮肤状况和老年斑的严重程度不同，因此最好在专业医生的指导下选择适合自己的治疗方法。此外，保持良好的生活习惯，如合理饮食、充足睡眠和适度运动，也有助于改善皮肤状况和预防老年斑的产生。

问：我小叔叔最近出现了尿频尿急和尿灼痛。以前并没有这个现象。身体很棒。后来由于生意越做越好，就开始了酒席上的生活，冬天火锅夏天烧烤。酒更是喝的来劲。我不知道跟这个有没有关系，总之是啤酒肚子也上来了。毛病也出来了。做个体检被查出是前列腺炎。这病怎么样治疗效果好？

答：前列腺炎是由多种因素引起的。吸烟、饮用过量的酒精、食用辛辣食物以及频繁手淫都可能导致前列腺炎的发生。对于治疗前列腺炎，建议您到正规的男科专业诊所就诊，并根据医生的建议进行治疗。此外，保持健康的生活方式、定期体检以及保持积极的态度都是非常重要的。

问：尿不尽，尿尿后感觉还有一点尿没尿完，要使劲尿出来那一点点尿，每次都反复尿几次，，刚上了厕所又感觉急了。。做过B超，验过尿，医生开过药缩泉胶囊，吃了效果不大。应看哪个科室，如何治疗。

答：根据症状描述，可能是前列腺炎或者尿道炎引起的，建议就诊泌尿科医生，进行进一步检查，如前列腺指检、前列腺液检查等，以明确诊断。治疗方面，可以根据病因进行针对性治疗，如抗生素治疗、消炎药物治疗等。同时，也可以进行一些辅助治疗，如热水坐浴、饮食调理等。建议避免辛辣刺激食物，多喝水，保持良好的生活习惯。

问：我想知道那小三阳者肝功正常该如何治疗？平时应该注意什么呢，有没有什么好的治疗方法呢，平时在饮食上面有没有什么需要注意的地方呢，有没有什么需要忌口的食物呢？有什么比较好的建议吗？

答：小三阳患者肝功正常的治疗方法主要是针对乙型肝炎病毒进行治疗。目前常用的治疗方法包括抗病毒治疗和免疫调节治疗。抗病毒治疗主要是使用抗病毒药物，如干扰素和核苷酸类药物，以抑制病毒复制和减少病毒载量。免疫调节治疗主要是通过增强机体免疫力，帮助机体清除病毒。

平时，小三阳患者需要注意以下几点： 1. 定期复查肝功能和病毒载量，及时调整治疗方案。 2. 避免饮酒和吸烟，因为这些会对肝脏造成进一步损害。 3. 注意饮食均衡，多摄入富含维生素和蛋白质的食物，避免暴饮暴食和油腻食物。 4. 避免接触有毒物质和化学品，以免对肝脏造成损害。

5. 保持良好的生活习惯，避免过度劳累和精神压力。 在饮食方面，小三阳患者应该注意以下几点： 1. 避免食用生冷食物和生鱼片等生食，以免感染其他病毒或细菌。 2. 控制盐的摄入量，避免食用过咸的食物，以预防水肿和高血压。 3. 避免食用过多的油腻食物和煎炸食品，以减轻肝脏负担。 4. 多摄入富含维生素和蛋白质的食物，如新鲜蔬菜、水果、鱼类和瘦肉等，以帮助肝脏修复和保持健康。

总之，小三阳患者应该积极治疗乙型肝炎病毒感染，注意生活习惯和饮食调理，以保护肝脏健康。如果有任何疑问或需要进一步的建议，请咨询专业医生。

问：：大王的癫痫病有三年多了，平时的时候一旦癫痫发作就会开始抽搐，然后伴随吐白沫、四肢僵硬、翻白眼、脸色发紫等等症状，一直都在治疗，但是一直都没有治好，大王一直很愁这个病，身体也越来越不好了，请问中老年人患上癫痫以后能够治好吗？想得到怎样的帮助：中老年人患上癫痫以后能够治好吗

答：癫痫见于各类人群，对于中老年人患上癫痫后能否治愈的问题，治疗的原则是采用药物口服治疗。大多数情况下，药物治疗可以控制病情，少数情况下可以完全治愈。如果患者坚持用药两年以上并且没有发作，有希望治愈的可能性。但如果患者仍然有癫痫发作，可能需要终生服药。

问：我总是感觉自己贫血。只要有几顿饭吃不好，或者是休息不好的话，就会头晕。所以我一直在补血，可是没有什么太好的效果，想知道谁有好的补血的办法告诉我一下好吗？

答：你好，你的情况是可以查下血压看是不是正常的，同时注意平时的生活习惯为好的。建议要注意休息，不要有过大的压力，增加全面的营养，保持良好的心情，增强体质，增加抵抗力，是有利于调理这个情况的。贫血的原因有很多种，可能需要进一步的检查和诊断才能确定最适合的治疗方法。祝健康。

问：家里有人检查出尿酸在650左右，有十多年的痛风病史，面对这种情况我们都很担心，不知道该从何下手去治疗，感觉很不好受，很痛苦。治疗痛风的有效方法是什么

答：痛风是一种由于尿酸代谢异常引起的疾病，主要表现为关节疼痛和炎症。治疗痛风的有效方法包括药物治疗和生活方式改变。药物治疗方面，可以使用西药秋水仙碱来降低尿酸水平。此外，还可以使用中药进行治疗。在生活方式方面，需要注意饮食调节，尽量少吃含有嘌呤高的食物，如豆制品、海鲜和啤酒等。同时，保持适当的体重和进行适量的运动也是很重要的。综合采取药物治疗和生活方式改变可以有效控制痛风的发作和症状。

问：我是31岁的女性，身高1.60米，体重60公斤，现在血压平均值是140、100，经化验血糖、血脂、肝功、肾功都正常。想得到的帮助：我想知道能不能降血压，我想不吃降压药，通过减肥、饮食调理来试一下能否达到将血压的可能。

答：建议您使用降压药物来控制血压，同时平时需要低盐低脂饮食。虽然减肥、饮食调理等方法可以帮助降低血压，但是对于血压已经达到140/100的情况，单纯通过这些方法是很难达到降压的效果的。

问：我跟我老公结婚很多年了，一直没有孩子，家里双方老人都很着急，我们去医院一检查，说他患有弱精症，很难有孩子，现在我们都很有焦虑，想知道有没有什么小妙招可以解决这个问题。弱精症怀孕小妙招有哪些？

答：弱精症的情况不建议试孕，即使受孕也有可能造成流产，会带来很大危害，建议先进行治疗，治疗需要根据每个人的病情决定，由于病情不同，适用的治疗方法也不同。建议到正规专业的“科技型”快孕医院对症治疗，在医生指导下对症治疗。

问：唉我是一个商人，平时的应酬非常的多啊，自然而然的就得了脂肪肝，现在都已经是中度了，千万不敢变成重度的脂肪肝啊，不知

答：重度脂肪肝的症状在临床表现中较为明显，一般症状可有：明显四肢乏力、无食欲、腹胀、厌油腻、恶心、呕吐、右肩背疼痛发胀感、右上腹不适、血压降低、口干、口苦、口臭、大便不规则等症状。若重度脂肪肝伴有肝功能异常，可有严重体力不支、恶心、呕吐、厌油、腹胀等肝系加重的症状；部分重度脂肪肝因肝功能下降、血浆蛋白降低，可伴有腹水、双下肢水肿、低钠、低钾血症等症状。当重度脂肪肝的症状极为严重的话，将有可能转为肝硬化阶段，因此，脂肪肝患者若出现类似症状，要给予高度重视、及时正规治疗乃为关键。另外，重度脂肪肝患者中西药治疗的同时，必须讲究饮食的合理化和质量化，养成良好的饮食习惯，规律饮食，并注意适量锻炼，修养身心，在饮食、锻炼上尽量来辅助减少肝脏内脂肪的过度蓄积，所以说，脂肪肝食疗对疾病的治疗及预后是很关键的。

问：中药能调理晚期食道癌吗食管下端-贲门癌表现，纵膈、腹腔、腹膜后淋巴结转移。因当时血糖高、血压高，没有进行任何肿瘤方面的治疗。中药治疗的话，还有没有可能缓解进食困难问题？还有没有比做支架更好的办法？

答：中药治疗晚期食道癌的效果因人而异，取决于病情和个体差异。综合治疗是晚期食道癌的主要治疗手段，可以延长患者的生存时间并减轻症状。中药治疗可能在调理方面起到一定的作用，但具体效果需要根据病情确定。建议在专家的指导下，根据病情制定治疗方案，可以尝试中医中药治疗，希望您早日康复。

问：尿频、尿道有尿不尽刺激感，有服用过药物，效果不好，彩超显示前列腺有2个结石。请问有前列腺结石没治好会引起前列腺炎吗？

答：前列腺结石常常会阻塞腺管，导致前列腺液排泄不畅，容易引起尿路及前列腺感染。同时，前列腺结石中常隐藏有大量细菌，将前列腺结石压碎后做细菌培养，可见大量细菌生长。因此，前列腺结石常可作为感染核心，储存细菌，而抑菌的抗生素却难以进入结石发挥作用。因此，前列腺结石非常容易引起反复的尿路感染，甚至引起前列腺的炎症。

问：我总是感觉自己的心跳比别人都要快，运动之后或者是劳累之后会感到心慌胸闷，做了心电图提示窦性心跳过快。请问一下窦性心跳过快是什么原因引起的？

答：窦性心跳过快可以由多种原因引起，如情绪激动、剧烈运动、体力劳动、喝酒、浓茶、浓咖啡或吸烟等。为了确定具体原因，可以进行一些检查，如血液检查或甲状腺彩超，以排除甲亢等疾病。此外，还可以进行动态心电图检查，以排除心肌缺血引起的胸闷气短，以及排除其他病理因素导致的窦性心动过速。在日常生活中，注意适当运动也是很重要的。

问：最近半夜总是会醒来，醒来之后就很长时间都睡不着，想东想西的，一直都无法入睡，有轻度的失眠症状，想知道可以吃些什么有助于治疗失眠呢？轻度失眠要吃什么好呢？

答：你可以尝试吃一些小米粥来治疗轻度失眠。小米粥性微寒，有健脾、和胃、安眠之功效。小米中的色氨酸含量在所有谷类中独占鳌头，食后可促进胰岛素的分泌，提高进入脑内色氨酸的量，能起良好的助眠作用。

问：晚上睡不着，且到半夜一两点会很兴奋，一般到两点之后才能睡着，晚上不做梦，第二天上午会头晕，并且想睡觉，但每次睡眠不会超过半小时，且多梦。

答：根据您的描述，您可能正在经历失眠和多梦的问题。为了改善这种情况，您可以尝试一些方法。首先，睡前放松心情，避免思考问题或进行脑力活动。您可以选择进行一些适当的体力活动，如散步，以帮助放松身心。此外，一些食物可能有助于促进睡眠，例如牛奶、水果（如苹果、香蕉、梨等）、糖水、小米粥、酸枣仁粥和莲子粉粥等。然而，不建议轻易使用催眠镇静药物，因为它们可能会产生副作用并导致依赖。如果问题持续存在，建议您寻求心理医生的帮助，以找出可能的心理原因并获得更专业的建议。

问：自从得了糖尿病以后一直控制着饮食，不敢吃一些多糖的食物，最近碰见了一个老中医，他告诉我说其实得了糖尿病以后多吃一些粗粮，恢复的效果会更好，问问各位糖尿病能够吃哪些粗粮呢？

答：糖尿病患者可以选择玉米、荞麦、薏米、黑米等粗粮，这些粗粮中的纤维素含量较高，可以降低血糖和胆固醇，有助于控制糖尿病。但是，像红薯之类的含淀粉比较多的粗粮还是要控制。此外，需要注意粗粮细做，细粮粗做，保持每天能量供应比例碳水化合物占50%—60%。

问：以前有过几年手淫，正常男人一般坚持多久不射为正常时间呢？我和媳妇做过几次，但是第一次几分钟就射了，第二次就达到十多分钟，正常么？还是经过一段时间后会坚持比较长的时间呢？

答：根据参考答案，早泄的原因有很多，如精神因素、过度手淫、包皮过长、神经敏感

度高、前列腺炎、内分泌紊乱等。治疗方案因病而异，最好到医院检查确诊。平时可以多吃壮阳食物，注意作息规律，不要过度手淫。

问：这三四年来经常感到脚关节有肿痛感，关节周围有红肿现象，有时疼痛加重，肢体容易疲倦无力。上周在医生的建议下做了尿液检查，尿酸增高是痛风症状，想知道痛风能喝绿茶吗?痛风能喝绿茶吗

答：痛风是因为尿酸代谢障碍引起的疾病，喝茶与痛风的诱发没有直接关系，可以饮用。但是，应该选择清淡的茶，不要喝浓茶。

问：慢性前列腺炎好半年了。症状轻。以后怎么注意和治疗。

答：根据您的描述，您患有慢性前列腺炎已经半年了，症状轻。目前情况可以考虑前列腺微波治疗，同时需要注意生活习惯，避免烟酒、熬夜和劳累。

问：老人得了过敏性鼻炎怎么办？鼻炎有好几年了，老是鼻子抽的难受有鼻涕，冬天早上起床穿衣服就流鼻涕，怎么办？。3年前做过一次微创手术，维持了几个月，现在一犯医疗所的医生打2针就好了。现在医生不在。鼻炎怎么治？

答：过敏性鼻炎没有特效药物可以治愈，可能与患者自身的过敏体质有关。治疗的关键是找到过敏原并尽量避免接触。另外，在发作期间可以使用抗组胺药物如扑尔敏来缓解症状。此外，加强锻炼有助于提高免疫力，发作期间可以使用氟替卡松喷鼻剂来治疗。

问：我是一个轻度的糖尿病人，现在不是很严重，听说糖尿病人注意饮食会很快好起来的。问一下轻度糖尿病人的食物有什么？

答：轻度糖尿病患者的饮食没有太多禁忌，但是需要注意控制饮食，少吃甜的和水果，同时可以通过药物治疗来控制血糖，防止血糖过高过低。如果血糖过低会引起头晕四肢无力，可以喝一些糖水进行缓解。

问：自己小区里有位大爷到医院抢救不及时就当场去世了，说是患了脑梗塞，所以想要了解一下脑梗塞的症状是什么？

答：脑梗塞是一种脑血管阻塞导致的脑部缺血性疾病。病人通常会有梗塞前短暂性脑缺血发作的病史，这包括颈内动脉系统短暂性缺血发作和椎基底动脉系统短暂性缺血发作。短暂性脑缺血发作是由颅内动脉疾病引起的短暂或短暂的局灶性脑或视网膜功能障碍。

问：我患有糖尿病多年，很多水果都不能吃，最近是各种瓜果上市的季节，自打患上糖尿病以来，我什么水果都没有吃过了，最近特别想吃些水果，想问您一下，糖尿病人可吃的水果有哪些？

答：糖尿病患者可以吃一些水果，如苹果、梨、橘子、草莓、猕猴桃、西瓜等，但应该注意控制食用量和时间，尽量在血糖控制理想时再吃水果，这样对血糖的影响会比较小。建议空腹血糖控制在6.0毫摩尔每升，餐后两个小时血糖不要超过8.0毫摩尔每升时食用，每次不要超过100克。

问：爷爷现在随着年龄的不断的增加身上的疾病是越来越多了呢，所以现在需要经常的吃药打针的，这段时间又感觉到自己的头疼头晕的特别的厉害呢，所以这段时间就去医院做了个检查才知道是得了脑部的动脉硬化呢想得到怎样的帮助:爷爷的这种脑部的动

脉硬化需要怎么治疗才好呢，不知道需要吃什么药物才好呢

答：脑动脉硬化是一种老年人常见的疾病，需要用一些改善循环的药物来治疗，如丹参片，静脉用的药物有长春西汀，奥扎格雷等。此外，还需要注意控制血压、血脂等因素，保持良好的生活习惯，如戒烟限酒、适量运动等。具体的治疗方案需要根据医生的建议来制定。

问：我女儿12岁，平时身体还是比较好的。但是一到感冒发烧就会发扁桃体炎要吊点滴几天才会慢慢好转，我们很是担心。上星期又传染了感冒，又发扁桃体炎，这次是化脓性扁桃体炎。请问化脓性扁桃体炎的症状和治疗方法有哪些？化脓性扁

答：化脓性扁桃体炎的症状包括咽喉疼痛、咽部红肿、咽喉灼热感、吞咽困难、发热、头痛、乏力等。治疗方法主要包括药物治疗和手术治疗。药物治疗方面，可以使用抗生素如阿莫西林来控制感染，同时也可以使用消炎药物和止痛药物来缓解症状。对于反复发作的化脓性扁桃体炎，扁桃体切除手术是一种常见的治疗方法，手术后可以减少扁桃体炎的发作。

问：目前症状主要表现为胸闷气短、乏力、但不咳嗽，经当地医院检查为肺结核，我想咨询一下专家，如果真是肺结核的话，如何治疗

答：肺结核是一种呼吸道传染病，由结核杆菌感染引起。治疗肺结核需要选择抗结核药物，如异烟肼、利福平等，并在医师的指导下进行系统治疗。同时，注意个人卫生，不要随地吐痰，注意休息，保持心情舒畅，忌食油腻辛辣刺激性食物，忌烟酒。祝健康。

问：我的血压是158‘98是高血压吗吃什么药？。我是一55岁的老年人。男性。

现在退休在家。我平时身体还好，没有大的毛病。前几天我觉得头有点晕。有时会有些头痛。后来去社区诊所看一下，医生说是血压有些高到了158的98。说情况不是很要紧。我想问一下我这咱情况，吃点什么药最好。。男性老年55岁，最近去检查得知，有些血压高。到了158/98。想请教吃什么药为好

答：高血压是一种常见的疾病，需要及时治疗。对于这位55岁的男性老年人，医生建议采用药物治疗。但是药物治疗可能会有副作用，而且需要长期服用。因此，可以考虑采用一些自然疗法来辅助治疗，如灵芝降压疗法。灵芝是一种中药材，具有降血压的作用。可以将灵芝制成粉末或者口服液，每天服用一定剂量，可以有效地降低血压。此外，还可以通过改变饮食习惯、增加运动量等方式来控制血压。但是，这些方法需要长期坚持才能有效果，建议在医生的指导下进行治疗。

问：宫颈癌的症状表现是什么身边很多人得了宫颈癌，请问医生宫颈癌的具体症状表现有哪些？请问医生宫颈癌的具体症状表现有哪些？

答：宫颈癌的症状表现主要包括阴道流血和阴道排液。阴道流血在年轻患者中常表现为接触性出血，即在性生活、妇科检查或便后出血。出血量可能多也可能少，取决于病灶的大小和侵及间质内血管的情况。早期出血量较少，晚期病灶较大时可能出现大量出血，严重时甚至可能引起致命性大出血。年轻患者也可能出现经期延长、周期缩短、经量增多等症状。而老年患者常常主诉绝经后不规则阴道流血。另外，宫颈癌患者还常常出现阴道排液增多的情况，排出的液体可能是白色或血性的，稀薄如水样或米汤样，有时还伴有腥臭味。晚期因癌组织破溃、坏死和继发感染等原因，可能会有大量脓性或米汤样的恶臭白带排出。如果发现自己出现了这些症状，建议立即到医院进行检查和治疗。

问：最近总是感觉头晕，尤其是蹲下再起来的时候，让我感觉两眼发黑，要晕倒的感觉啊，不知道为什么这样，有很多人说是有可能是因为我的血压低，到底血压低是什么原因造成的呢？

答：低血压是指血压低于正常水平，主要分为急性低血压和慢性低血压两种。急性低血压表现为晕厥和休克，而慢性低血压则分为体质性低血压和体位性低血压两种。体位性低血压是指从平卧位突然转变为直立位，或长时间站立时发生低血压，严重者可引起晕厥，其典型症状是直立时血压下降，有衰弱感，但无汗，发病机理可能是植物神经系统功能失调，引起直立时小动脉收缩功能障碍所致。因此，蹲下再起来时感觉头晕，两眼发黑，有可能是体位性低血压引起的。建议您及时就医，进行相关检查和治疗。

问：膀胱痉挛的手术治疗有些什么？

答：膀胱痉挛的手术治疗方法有很多种，包括经尿道前列腺气化电切术、经尿道等离子前列腺切除术、经尿道等离子前列腺剜除、前列腺电切术、前列腺电切手术、经尿道前列腺等离子汽化电切术、经尿道前列腺电切(TURP)术、汽化前列腺电切术、经尿道前列腺切除术、硬膜外自控镇痛、非泌尿手术、前列腺电切除术、尿道前列腺剜除术、TURP手术、耻骨上前列腺手术、尿道前列腺切除术、TURVP术、前列腺电切术、前列腺汽化电切术、经尿道前列腺电切术、前列腺等离子电切术、电切术、经尿道前列腺电切除术、前列腺增生症电切术、经尿道膀胱肿瘤电切术、前列腺切除术、Brindley技术、膀胱造瘘术等。

问：平常没有测量血压的习惯，今天一测，低压145，高压180，可是没有头晕的症状，这是为什么？这算高血压吗曾经的治疗情况和效果：无应该注意些什么

答：用户的血压高于正常值，但没有头晕等症状，这可能是因为高血压的早期症状不明显，或者用户的身体已经适应了高血压的状态。需要注意的是，高血压是一种慢性疾病，如果长期不加以控制，会增加心脑血管疾病的风险。建议用户定期测量血压，保持健康的生活方式，如控制饮食、适量运动、戒烟限酒等，必要时可以咨询医生并服用降压药物。

问：想要咨询一下，出现脑出血的阶段喝一些什么汤好呢？而且在引发脑出血之后应该做好哪些护理措施呢？怎么办，怎样改善自己的病情状况呢？治疗脑出血汤有哪些？

答：病人在引发脑出血后，可以适当的喝一些猪脑汤或猪肝汤，这样可以帮助补充营养，减轻病情。平时应该保持饮食清淡，多喝白开水，注意均衡膳食，少食多餐。在护理方面，需要保持安静，避免剧烈运动，保持通风，保持室内环境舒适，避免情绪激动等。同时，需要遵医嘱进行治疗，如控制血压，降低颅内压等。

问：本人72岁，二年前查出糖尿病。身高1.57m，体重55kg.未用药。运动家节食。今天测空腹8.2.去年侧过糖化不超标。请问该如何降糖？。运动加节食该如何治疗

答：根据您的情况，除了运动和饮食调理外，建议您咨询医生，了解适合自己的降糖药物治疗方案，以保持血糖稳定，避免糖尿病并发症的出现。

问：我膝盖于上月中旬得了痛风性关节炎，经输液服药后已基本好转，前晚在沙发上把腿伸直休息时，爱人不慎坐在膝盖上，痛了会无更多反应，昨天及今天上午走路只有轻微疼感，但今天下午回家休息么，膝盖有轻微肿，走路有较大疼痛感，非常困难。请那位帮忙诊断下，谢谢！

答：病人的膝盖在外伤后出现了轻微肿痛，走路有较大疼痛感，非常困难。这种情况可能是因为外伤后引起的。建议病人及时就医，进行进一步的检查和治疗。

问：我这段时间总是出现尿尿次数增多尿很急，迫不及待地需要排尿，尿疼，尿疼痛的问题。有的人跟我讲是男性男性前列腺炎症，有的人跟我讲是泌尿系感染，所以想问下男性前列腺炎初期是什么症状？

答：根据病情描述，可能是男性前列腺炎或泌尿系感染引起的尿路感染。男性前列腺炎初期症状包括尿频、尿急、尿痛、排尿不畅等，具体症状还要根据病情来定。建议到男科医院做前列腺液等检查，确定病因，根据检查结果采取相应的治疗措施。同时，注意饮食健康，避免辛辣刺激性食物，多喝水，保持良好的生活习惯。

问：躺下调整呼吸症状减轻，立起后气短加重，经检查肺部及心脏无毛病，心脏彩超提示：室间隔稍增厚，左室舒张功能减退。想得到的帮助：请问医生如何治疗用药。

答：根据你描述的症状和检查结果，可能是高血压性心脏病，出现轻度心衰症状。建议你首先要控制血压稳定，注意休息，避免过度劳累和熬夜。饮食方面要注意清淡，少摄入盐分，并且避免食用油腻、甜食和咸食品，尤其是要避免食用咸鸭蛋和咸菜等高盐食物。希望这些建议对你有帮助，祝你健康！

问：你好医生：现在怀孕7个月了，去医院抽血化验血糖有点高，空腹血糖5.3，吃葡萄糖1小时候是10，两小时后7.3。然后回来自己每天抽血检查，开始5天的空腹血糖是5.2，饭后两小时的是6.8左右，昨天早上和今天早上的空腹血糖是7.

1，饭后的血糖是6.5左右，请问医生怎么办

答：根据您提供的信息，您的空腹血糖和餐后血糖都略高，但并不需要服药，可以通过饮食控制和运动来控制血糖。建议您采用低糖低脂肪饮食，尽量减少面食的摄入，多食用蔬菜，加强体育锻炼，保持良好的心态，定期监测血糖。同时，建议您注意休息，保持心情愉悦。

问：我家婆今年已经56岁了，她老人家上个星期到医院检查出肺癌，还处于早期，请问肺癌怎么治疗效果最好？看着她这么大年纪了还受病痛的折磨，我们协心里也是不舒服，感谢医生的回答了！请问肺腺癌该如何治疗

答：肺腺癌的治疗方法包括手术、放疗、化疗和靶向治疗等。对于早期的肺腺癌，手术是常见的治疗方法，可以通过切除肿瘤来达到治疗的目的。放疗可以通过高能射线照射肿瘤区域，杀死癌细胞。化疗可以通过使用药物来杀死癌细胞。靶向治疗是一种针对肿瘤细胞特定变异的治疗方法，可以通过抑制肿瘤细胞的生长和扩散来达到治疗的效果。具体的治疗方案需要根据患者的具体情况来确定，建议咨询专业医生进行详细的诊断和治疗方案制定。祝愿您的婆婆早日康复！

问：耳鸣耳朵感觉是木的是左耳老年人耳朵突然嗡嗡响而且感觉耳朵是木的听声音总感觉在后面耳朵也有点听不清楚请问医生是什么问题该怎么解决。

答：根据您的症状描述，可能是突发性耳聋，建议去医院做电测听检查，明确诊断。治疗方面，可以使用扩张血管的药物输液治疗，但是恢复效果因人而异。

问：以前无任何症状，前两天去量血压是三级高血压，高压170，低压100，大夫给我开了杜仲平压分散片和复方三维亚酸胶丸，请问还有什么特效药可以治疗，谢谢。

答：根据您的描述，您被诊断为高血压3级，医生给您开了杜仲平压分散片和复方三维亚酸胶丸，但这些药物不太正规。建议使用正规降压药物，同时注意休息，低脂饮食，适度运动。

问：我最近因为压力很大，经常感到有一些无力，而且特别容易累，很容易就干不下去活，因为看了一些报道，很害怕自己得了渐冻人的病，所以想要问一下渐冻人的临床表现特征。渐冻人是怎么回事？能治好么？

答：渐冻人是一种罕见的神经系统疾病，主要表现为肌肉无力、僵硬、震颤、萎缩等症状，病情会逐渐加重，最终导致瘫痪。但是，这种疾病的发病率很低，一般不会轻易得到。用户的症状可能是因为其他原因引起的，建议去医院进行检查以确定病因。对于治疗，需要对症治疗，适当锻炼，注意呼吸道、消化道的功能，如出现情绪低落，可以以抗抑郁治疗等。此外，还要多翻身以防止褥疮发生。但是还是建议去医院进行检查，以防止病情恶化。

问：我最近这一段时间是尿频，尿急，就去医院检查一下医生说是患有前列腺炎了，我想知道这种病是什么原因造成的呢。前列腺炎是什么原因造成的？

答：前列腺炎的原因有两个，一个是男士内裤的设计不合理，导致男性胯下长期在高温潮湿的环境中，成为病毒细菌滋生的温床；另一个是部分性病患者是以淋菌性尿道炎常见，淋球菌经尿道和前列腺管进入前列腺而诱发前列腺炎。

问：本人右膝关节痛疼已有半年白天较轻晚上12点至2点左右较重天亮后缓解目前行动还算自如只是下蹲3至5分钟后双膝痛疼加重想站起来很困难.膝盖内则前有酸疼感.拍片后说是骨性关节炎.吃了扶他林药片效果不明显.本人还有糖尿病.心脏病.

还有什么方法可以治疗吗？（不手术的前提下）

答：根据您的症状描述，可能是骨性关节炎引起的疼痛。建议您注意保暖，避免过度劳累，可以采用局部封闭治疗，如热敷或冷敷，也可以尝试神灯照射，口服壮骨关节丸辅助补钙。但是需要注意的是，您同时患有糖尿病和心脏病，需要在医生的指导下进行治疗。

问：我父亲身体很好就是这几天老是头昏、脸上苍白、四肢无力、老想睡觉、吃不下饭去，人都瘦了不少了。吃了点药物效果很差我们就去医院检查了下说我父亲是重度贫血不知道要怎么治疗才好啊

答：贫血是指血液中红细胞数量或质量不足，导致氧气输送不足的一种疾病。贫血可以分为缺铁性贫血，营养不良性贫血，慢性病贫血等类型，需要查明病因治疗。治疗方面可以使用复方阿胶浆，硫酸亚铁，叶酸，维生素B12等药物进行治疗。同时，多吃大枣，阿胶等食物也可以起到补血的作用。

问：以前是近视的，戴近视眼镜有点头晕，昨天戴了600度眼镜不头晕，这是在说明我的视力在退步吗？度数在增加吗？有人说可能是散光，我想问一下，象我这年龄的有得这病的吗？。没有治疗过，只是去眼镜店配过眼镜，不过好几年没戴了希望视力能提高点

答：根据您的描述，您戴近视眼镜有点头晕，但戴了600度眼镜不头晕，这可能是因为您的近视度数增加了，也可能是因为您的眼睛出现了散光。散光是一种常见的眼部疾病，不仅年轻人会得，中老年人也有可能患上。建议您到正规眼科医院进行检查，了解自己的眼部情况。至于近视手术，手术风险虽然存在，但是选择正规眼科医院，遵循医生的建议，手术风险可以降到最低。建议您在了解清楚自己的眼部情况后，再考虑是否进行手术。

问：家里的老人因为前段时间老是说尿频尿急尿痛，因为只是上火引起，但是这段时间症状加重了，检查以后说有尿路结石，因为没有这方面的常识，所以想知道尿路结石怎么办？

答：尿路结石的病人可以通过体外碎石、药物治疗和手术治疗来治疗。药物治疗和饮食调理是治疗尿路结石的首选方法，如果病情严重，需要手术治疗。平时要注意饮食，少吃豆腐制品。

问：癫痫患者会出现什么幻觉吗家里老人总是说眼前有奇怪的影像出现，有的时候看东西还有重影，老人本身患有癫痫病，平时会好好的发呆，手脚还会发抖，我想了解一下癫痫患者会出现什么幻觉吗？癫痫患者会出现什么幻觉吗

答：癫痫病患者常常会出现幻觉或错觉，其中视幻觉是比较常见的一种表现。他们可能会突然看到一些并不存在的图形或人物。此外，癫痫病在临床上有不同的症状表现，其中一些症状属于癫痫病的早期表现。了解癫痫病的早期症状可以有效地发现病情，并及时进行治疗和预防。

问：我今年58了，最近老是阳萎早泄，不知道这是不是前列腺炎，应该如何治疗?不是很了解这个病，寻求高人相助,这个病严重吗？可以治愈吗？

答：根据您的描述，您最近出现了阳痿和早泄的情况。这些症状可能与前列腺炎有关，但不能确定。建议您咨询医生进行进一步的检查和诊断。关于治疗，如果阳痿是由于思虑过度导致的，可以选择清心滋肾的物品进行治疗，以调理气血不足，对阳痿和早泄有良好的治疗效果。但是，盲目地服用补肾壮阳的物品可能会适得其反，使病情加重。因此，建议您在治疗前咨询医生，以获得正确的治疗方案。

问：我老公不知道怎么搞得在医院体检查出来前列腺炎，拿了一些压药物回来吃，好不容易快好了，现在怎么睾丸又疼了，怀疑是前列腺炎引起的，我想问前列腺炎引起的睾丸痛该怎么办？

答：前列腺炎可以引起睾丸痛，需要及时治疗。建议咨询当地医生，根据医生的指导服药治疗。

问：这几天不知道为什么脸上出现了好多黑点，好难看呀，以前也都没有发生过这种现象，我用了一些药膏擦了也没什么用，我想问一下怎样才能去掉这些黑点？

答：根据您的描述，您可能是出现了老年斑。老年斑是一种自然老化的现象，由于生理

下降和代谢减缓引起的。一般出现在脸上和手上。建议您平时多喝水，多吃一些运动，保持乐观的心态，不要太在意这些黑点。

问：我有脱肛有好几年了，每次上厕所都不敢用力而且上完厕所都还要用手把它拖进去，最近又严重了走路的时候九都会感觉脱肛。脱肛会出现的的症状是什么？

答：脱肛的症状包括肛门不适、肛门疼痛、便秘、排便困难、便血、肛门瘙痒、肛门湿疹、肛门炎症、肛门失禁等。如果长期脱垂将致阴部神经损伤产生肛门失禁、溃疡、肛周感染、直肠出血、脱垂肠段水肿、狭窄及坏死的危险，应以手术治疗为主。建议您及时就医，祝您健康！

问：最近总是觉得头重脚轻，精神也不太好，以为是感冒了，但是昨天突然间晕倒了，被送到医院醒来之后也觉得天旋地转，恶心，想吐，医生说是眩晕症。眩晕症有哪些危害之处？

答：眩晕症会对人体造成一些危害。首先，在眩晕发作期间，患者会感到头晕、恶心、呕吐，给患者带来很大的痛苦。其次，眩晕症还会对耳蜗和前庭器官造成损害，导致耳鸣、耳聋、共济失调等问题。此外，如果不及及时治疗，眩晕症还可能导致思维下降、头痛痴呆、脑血栓、脑溢血、半身不遂、中风偏瘫等严重后果。对于中老年患者来说，多次发作还可能影响脑血管调节机能和大脑微循环，加重脑供血不足，甚至诱发脑梗塞等疾病。

问：可能是工作压力太大的原因，近来我的睡眠一直不好，经常失眠，造成第二天工作精神极度不好，注意力不集中，有没有比较好的治疗失眠的办法治疗失眠有没有什么好的方法呢？

答：失眠是指无法入睡或保持睡眠的情况，可能是由于工作压力过大导致的。失眠会对身体各个系统的功能产生负面影响，可能引发冠心病、高血压、糖尿病、精神分裂症等并发症。治疗失眠可以采用中药结合针灸和心理疏导的综合方法。中药可以通过调节身体的阴阳平衡来改善睡眠质量，针灸可以刺激特定的穴位来促进睡眠。此外，心理疏导也是治疗失眠的重要方法，可以通过放松技巧、认知行为疗法等来帮助缓解压力和焦虑，提高睡眠质量。建议您咨询医生或中医师，根据具体情况制定适合您的治疗方案。

问：总是会吃东西在吞咽的时候有困难，心情很烦，是很难受的，而且最近这段时间只能吃流质的食物是比较舒服的，甚至最近这段时间经常会吃不下，身体难受，去检查是食管癌，不晓得有什么注意的事项。食管癌的患者，有什么注意的吗？食道癌的预防措施是什么？

答：食管癌的患者需要注意以下几点：

1. 饮食方面，由于吞咽困难，建议选择流质或半流质的食物，如汤、果汁、糊状食物等，以减轻不适感。同时，要保证摄入足够的营养，多吃富含维生素和微量元素的食物，如水果、蔬菜等。
2. 避免吸烟和饮酒，烟草和酒精是食管癌的危险因素之一。长期吸烟和大量饮酒会增加患食管癌的风险。
3. 定期进行体检和随访，及时发现和治疗食管癌的早期病变，提高治愈率和生存率。
4. 保持良好的心态，积极面对治疗和康复过程，避免过度焦虑和压力。
5. 遵循医生的治疗方案，按时服药和接受治疗，定期复查，配合医生的指导进行康复训练。

问：我最近感觉尿特别多、总是有尿、以前都不怎么喝水、现在还爱喝水、喝的还特别多饭吃的也比以前多、体重反而减轻、视力还越来越不好到医院验的血糖、升高医生说是糖尿病。糖尿病患者宜吃什么水果？忌吃什么水果？

答：糖尿病患者应该注意饮食，不宜吃含葡萄糖和能很快分解成葡萄糖的食物，但有些水果虽然很甜，但含葡萄糖类成分不多，甚至还有降血糖作用，适合糖尿病人食用。如柚子、荔枝、枸杞子、香蕉等。此外，纯植物的金奈玛特选茶也有降糖效果，可以有效阻止并发症形成。

问：最近的时候感觉关节的地方也是有点疼痛的，胡来到医院进行检查，医生说我的情况是骨关节炎的，我现在主要是看看有什么好点的治疗方式的，我看看什么样的药物可以起到最好的效果的。什么药治骨关节炎好？

答：骨性关节炎的治疗方式有药物治疗和手术治疗两种。药物治疗包括透明质酸钠、氨基葡萄糖和非甾体镇痛抗炎药等。透明质酸钠可以改善滑液组织的炎症反应，增强关节液的粘稠性和润滑功能，保护关节软骨，促进关节软骨的愈合与再生，缓解疼痛，增加关节的活动度。氨基葡萄糖可以阻断骨关节炎的发病机制，促使软骨细胞合成具有正常结构的蛋白多糖，改善关节活动，缓解关节疼痛，延缓骨关节炎病程。非甾体镇痛抗炎药可以抑制环氧化酶和前列腺素的合成，对抗炎症反应，缓解关节水肿和疼痛。手术治疗适用于药物治疗无效的情况。生活护理方面，要多晒太阳，注意防寒湿，保暖，使膝关节得到很好的休息。疼痛缓解后，每日平地慢走一两次，每次20-30分钟。尽量减少上下台阶，跑步等使膝关节负重的运动，避免，减少关节软骨的磨损，不得已上下台阶时最好扶楼梯或手杖。要长时间处于一种姿势，更不要盲目地做反复屈伸膝关节，揉按髌骨，抖晃膝关节等运动。锻炼股四头肌功能，让股四头肌强壮有力，可减轻膝关节疼痛。

问：痛风的症状是什么痛风有哪些症状表现痛风的症状是什么前段时间腿疼，去医院检查才知道自己是得了痛风，年纪轻轻的就得了这个病，我妈老说我是因为冬天穿裙子冻得，好难过啊现在。痛风的症状是什么？痛风有哪些症状表现？

答：痛风的症状主要包括急性痛风性关节炎、痛风石和慢性关节炎。痛风性关节炎表现为关节红、肿、热、痛，常见于大脚趾、踝关节、膝关节等处，疼痛剧烈，常伴有发热、寒战等全身症状。痛风石是由于长期高尿酸血症引起的尿酸盐沉积在关节周围软组织和内脏器官中形成的结节，常见于耳廓、指尖、肘部等处。慢性关节炎则是由于反复发作的急性痛风性关节炎引起的关节破坏和畸形，表现为关节肿胀、变形、活动受限等症状。痛风的发病与饮食有关，应避免进食高嘌呤食物，如动物内脏、海鲜、肉类等，多食用水果、蔬菜、牛奶、鸡蛋等低嘌呤食物。同时，多饮水有助于促进尿酸排泄。药物治疗方面，可选用降低血尿酸的药物如别嘌醇，也可使用非甾体类抗炎药如消炎痛、布洛芬等缓解关节疼痛症状。

问：不知不觉来了一身毛病，尤其是晚上，大半夜的还尿急尿痛尿不尽，不尿又给憋得难受的要死。不知道该怎么办？想得到怎样的帮助:如何治疗尿急尿痛尿不尽？

答：这个问题描述了尿急、尿痛和尿不尽的症状，这些症状可能与前列腺疾病有关。前列腺炎和前列腺增生是常见的前列腺疾病，它们会导致尿频、尿急、尿痛和尿不尽等症状。尿频是指排尿次数增多，但总尿量不多；尿急是指一有尿意就必须马上排尿，否则

可能发生尿失禁；尿痛是指排尿时感到疼痛。这些症状往往同时出现，尤其是在前列腺炎和前列腺增生的情况下。前列腺炎分为急性和慢性两种，急性前列腺炎会出现尿频、尿急、尿痛等症状，还可能伴有发热、寒战、头痛等全身症状；慢性前列腺炎则会出现尿频、尿急、尿不尽、尿线细分叉、夜尿次数增多、尿无力、排尿困难等症状，还可能伴有腰酸腹痛、阴茎痛、睾丸、会阴、肛门不适等症状。如果出现尿频、尿急、尿痛和尿不尽等症状，建议到医院进行进一步检查，明确病因，并根据病因进行针对性的治疗。

问：2012年春季开始感觉尿频尿等待，不疼，现在有点尿分叉。不腰疼。:需要医生帮助提供远程诊断：医院检查前列腺炎，用药前列康和非那雄胺，有效果，但是后期效果不明显，就停药了。今年4月1日B超检查，前列腺炎表现（表面毛糙）。现在用的中药，结合怕打腹部和腹股沟、艾灸关元穴，坚持每天早上慢跑。能治愈吗？

答：您好！前列腺炎是男性常见的疾病，西医对此无法提供很好的治疗方法，而中医中药有其独特的治疗经验。建议您尽快咨询医生以获取准确的诊断和个人化的治疗方案。中医中药可能对某些患者有益，但对于具体的草药种类和剂量，最好咨询医生或专业的中医师。他们可以为您提供确切的指导，以确保治疗的安全性和有效性。祝您早日康复！

问：我的父亲近来感觉头疼，有的时候会突然说不出话来，经常说自己头昏，吃不下东西，走路的时候也没有以前稳健，有点歪歪扭扭的。脑梗塞前期有哪些症状？

答：根据病人的症状，可能存在脑梗塞的风险。脑梗塞前期的症状包括头晕、头痛、突然说不出话来、头昏、吃不下东西、走路不稳等。这些症状可能是缺血性脑梗的先兆，需要及时就医。

问：我是一名前列腺患者，这个病症一直影响着我的生活和工作，平时总是尿频，尿急尿流中断，最近听朋友说微创手术可以有效缓解这个病症，请问前列腺微创手术需要多少钱？

答：前列腺微创手术的费用因地区、医院、手术方式和麻醉药物的不同而有所差异。一般来说，手术费用大约在2千元到5千元左右。需要注意的是，手术的成功率并不是100%，如果手术不成功，可能需要进行第二次手术，因此手术费用也会因个人情况而异。

问：老年痴呆的早期症状是什么呢？爷爷最近老是出现记忆力下降，不知道是不是老年痴呆症的症状，听说老人很容易患

答：老年痴呆症是一种发生在老年期及老年前期的退行性脑病，主要表现为记忆力下降、思维能力减退、判断力和注意力不集中等症状。患者的日常生活能力也会下降，可能出现无法自理、幻听幻觉等情况。老年痴呆症对患者和家人都会带来很大的痛苦和困扰。建议患者注意各种感染，保持有规律的生活，按时睡眠、起床，避免熬夜，劳逸结合。对于症状严重的老人，可以采用物理和中医的治疗方法，相比单纯药物控制，这些方法起效更快，没有毒副作用，更适合老人的体质。

问：今年七十多了，最近吃的比较多，人却偏瘦了，平时老人的身体一向很好的，为了安全起见，就带她去医院做了一次全身检查，最后结果是得了糖尿病。哪种方法降糖比较有效果呢？

答：一般建议最好是服用中药来降糖治疗。西药降糖的药理作用主要是通过刺激受损的胰腺细胞，分泌胰岛素来降糖的。中医中药则采用自然平衡免疫疗法来降糖，中药无副作用，降糖效果显著。中药可以恢复全身各器官的代谢平衡，对于糖尿病的治疗有很好的效果。

问：白内障，2009年9月治疗过。现在复发，左眼象蒙了一层塑料布一样，右眼视网膜复发。在当地医院治疗过，效果不理想，现在复发。请问白内障手术时间什么时候合适小儿先天性白内障要检查什么？

答：手术时间应该在病人感到工作和生活有困难，阅读不方便时进行。特别是对双眼老年性白内障，视力明显减退，生活自理发生困难或工作上的需要，即使白内障还未成熟，也应行手术，并安放人工晶体。

问：发病时间及原因；心悸心慌无精神无食欲夜晚睡不着体重无明显变化病发于11月
血压一直不稳定忽高忽底曾经的治疗情况和效果：11月住院治疗7天12月住院15
天效果不太明显现在主要症状:食欲不振睡眠不好用什么药物治疗效果比较好点

答：根据病史描述，患者可能患有高血压性心脏病，治疗高血压是治疗该病的关键。对于原发性高血压病，应根据分级治疗的原则，选用合适的降压药和其他非药物治疗措施，使血压控制在适宜的水平，避免增加心脏负担的因素，以防发生心力衰竭。对于继发性高血压，要针对引起血压升高的原发病进行治疗。对于已发生高血压性心脏病，而心脏功能处于代偿期，要避免能增加心脏负担的因素，如体力劳动、高盐饮食、上呼吸道感染、烟酒及精神刺激等。对于高血压性心脏病处于失代偿期，已发生左心衰竭者要积极治疗心力衰竭，减轻心脏前后负荷，予以扩血管药物、利尿、强心治疗。心力衰竭纠正后，血压要保持在可控制的范围内。若患者呈现心肌收缩力低下或反复发生心力衰竭者，可用地高辛维持量口服治疗，同时治疗各种合并症，如高脂血症、糖尿病、冠心病，防止心力衰竭复发。建议患者到医院就诊，由专业医生根据患者具体情况制定治疗方案。

问：我近来测量血压都在110-140左右，有几次在90-120左右，我的血压正常，我24岁之前血压一直不是太正常，近来再吃卡普托里吃了一星期的时间了，什么时间段量血压比较准确？

答：一般晨起时候测量血压比较准确，但是任何时候测量血压都可以，只要是在安静状态下测量。高血压的诊断需要在安静状态下，非同日，三次测量以上大于140/90才能确定。建议去医院做个24小时动态血压监测，这个是比较准确的。

问：我去前开始患有高血压，几次住院效果不是很好，目前一般情况不理想，最近又开始复发了，高压180低压140，现在都不知道该怎么办好，心里很郁闷。请问30多岁高血压怎么办30多岁高血压怎么办呢？30岁得高血压怎么办？

答：高血压是一种常见的慢性病，需要长期治疗。治疗方面需要服用降压药和降血脂药，同时饮食方面要以清淡为主，少吃动物的内脏及胆固醇的食物，多吃芹菜，尤其是其根，可以有辅助的降压作用。此外，还需要多锻炼身体以增强体质，注意休息，避免劳

累，不要熬夜，避免情绪激动，保持心情舒畅。需要长期治疗，不能根治。

问：你好，我有前列腺炎的，一直在用药，但效果在我身上并不明显，总是犯病，那天喝酒时听别人说喝酒对前列腺炎不好，想问一下前列腺炎可以喝酒吗？

答：喝酒对前列腺炎不好，会刺激炎症，加重病情。前列腺炎的人通常会有脾肾虚的情况，如果脾肾不虚，就不会患前列腺炎。如果你的炎症好了，但脾肾还是虚弱的话，过一段时间可能还会再次发病，这就是为什么前列腺炎很难治愈，容易反复发作的原因。治疗前列腺炎应该从根本上治疗，可以尝试使用安全无副作用的自然健康组合。

问：在最近，我家一位老人，感觉身体不舒服，去医院进行检查，检查出来是胃癌中期的病，我们一家人都很着急，想不通为啥就得了这种病，所以想问胃癌中晚期还有救吗？

答：胃癌是一种常见的恶性肿瘤，如果能够及早发现和治疗，治愈的机会会更大。但是即使是中晚期的胃癌，也可以进行介入治疗，来延缓肿瘤细胞的快速发展，同时可以进行靶向治疗。

问：我这段时间身体总是容易感到头晕，上厕所次数却多了起来，偶尔还会有点尿痛，后来感觉越来越不对劲，就去医院做了检查，医生确诊我是患有淋病，我有点不敢相信，请问什么叫淋病，发病都有哪些症状？

答：淋病是一种由淋球菌引起的性传播疾病，主要通过性接触传播。淋病的症状通常在感染后一到三周内出现，但有时可能需要更长时间才会出现。淋病的症状包括尿道口瘙痒、尿道口分泌物增多、尿频、尿急、尿痛等。女性淋病的症状还包括外阴瘙痒、尿道口冲洗、粘膜水肿等。如果不及时治疗，淋病可能会引起严重的并发症，如不孕症、输卵管炎等。

问：我好长时间身上长了好多小白点，一开始没有注意，最近发下小白点都连成片了，赶紧去医院检查了一下，检查结果是我患了白癜风疾病，我想知道白癜风冷冻效果好吗？想得到怎样的帮助:白癜风冷冻效果好吗？

答：白癜风是一种慢性病，治疗起来比较困难，需要长时间的配合治疗。冷冻治疗是一种常见的治疗方法之一，但并不是所有患者都适合这种治疗方法。治疗效果的好坏取决于个体情况和病情严重程度。因此，最重要的是找到适合自己的治疗方法，对症对因治疗，并坚持治疗。只有这样，白癜风是可以完全治愈的。

问：医生你好，我想要咨询一下，甲状腺亢进有何症状，请帮忙解答一下，谢谢。

答：甲状腺功能亢进症的症状主要有以下几方面：易消瘦、甲状腺肿大、食欲大增、脾气暴躁、心慌、大便频繁、突眼、多汗、怕热等症状。部分患者会有特殊表现，如淡漠型甲亢，多发于老年人，表现为消瘦、食欲减退、烦躁、心律失常。还有患者会出现Graves眼病，表现为良性突眼或浸润性突眼，伴有眼睛红、水肿，甚至出现复视。此外，胫前可出现黏液性水肿，患者小腿下段的皮肤变厚变硬，存在圆形斑块样结节症状严重的还会出现甲亢危象，患者怕热、多汗、手抖、高热不退、黄疸、心率加快、谵妄。

问：自从2年前自己开了一个加工厂后，工作变得特别的忙碌，总是顾不上吃饭和饮食，生活没有什么规律，最近尿频，尿急，医生诊断有无菌性前列腺炎。请问无菌性前列腺炎治疗方法是什么？

答：无菌性前列腺炎的治疗方法包括以下几个方面： 1. 药物治疗：根据医生的建议，可能会使用抗生素来治疗感染。抗生素的选择和使用方法应该根据具体情况来确定，所以建议您咨询医生的意见。 2. 休息：适当休息是非常重要的，可以帮助身体恢复和抵抗炎症。请合理安排工作和休息时间，避免过度劳累。 3. 控制性生活或手淫的频率：过度的性生活或手淫可能会刺激前列腺，导致炎症加重。建议您适度控制性生活或手淫的频率，避免过度刺激前列腺。 4. 多喝水：多喝水可以帮助排尿，稀释尿液中的有害物质，有助于缓解炎症。建议您多喝白开水，而不是茶叶水或其他刺激性饮料。 5. 热敷：热敷可以帮助缓解疼痛和炎症，可以使用热水袋或烤垫等进行热敷。请注意不要过度热敷，以免烫伤皮肤。 此外，还建议您保持生活规律化，合理安排工作和休息时间，避免熬夜和过度劳累。同时，忌烟酒和辛辣刺激性食物，这些食物可能会刺激前列腺，加重炎症。如果症状持续或加重，请及时咨询医生的意见。

问：专家我貌似有前列腺肥大，前列腺肥大治疗方法有哪些啊？可以彻底治疗好么，没治疗好会有什么并发症不？有什么特效的方法啊？你好，前列腺增生治疗办法有哪些？上海做一个前列腺增生手术大概要多少钱？

答：前列腺肥大的治疗方法有很多种，具体的治疗方法取决于病情的严重程度和个体差异。一般的治疗方法包括药物治疗、手术治疗和微创治疗等。药物治疗常用于轻度病例，可通过减轻症状和缩小前列腺的大小来改善尿路症状。手术治疗通常用于严重病例，包括经尿道切除、经腹腔或经阴道手术等。微创治疗是一种相对较新的方法，如经尿道激光治疗、微波治疗和射频治疗等，可以减少手术创伤和恢复时间。总之，选择适合自己的治疗方法应该在医生的指导下进行。 至于是否可以完全治愈前列腺肥大，这取决于病情的严重程度和个体差异。一些轻度病例可以通过适当的治疗方法使症状得到明显改善，但并不一定能完全治愈。对于严重病例可能需要更长时间的治疗和持续的管理。 如果前列腺肥大没有得到治疗，可能会出现一些并发症，如尿路感染、尿潴留、尿石症等。因此，及时治疗前列腺肥大是非常重要的，以预防并发症的发生。 至于特效的方法，每个人的病情和体质不同，可能会有不同的治疗效果。您可以与您的医生详细讨论，根据您的具体情况选择最合适的治疗方法。 对于前列腺增生手术的价格，这可能会因地区和医院的不同而有所差异。我是一名AI助手，无法提供具体的价格信息。建议您咨询当地的医院或医生，他们将能够给出更准确的答案。

问：单纯性紫癜该如何治疗?我的双下肢经常出现深紫色的瘀斑，不痛不痒，能自行消退，月经期尤为严重，身体其他一切正常。单纯性紫癜好不好治好她？头疼的很！单纯性紫癜该如何治疗

答：单纯性紫癜（指的是在不明原因下的紫癜）的治疗方法多样。治疗的选择取决于症状的严重程度、病史和个体情况。以下是一些常见的治疗方法： 1. 观察和监测：对于症状轻微的患者，医生可能会建议定期观察和监测，以确保病情稳定。 2. 药物治疗：药物治疗是治疗单纯性紫癜的常见方法。常用的药物包括皮质激素（如地塞米松、泼尼松等）、免疫抑制剂（如环孢素、噻唑胺等）以及抗凝血药物（如阿司匹林、克鲁地欣等）。具体的药物治疗方案需要根据个体情况而定，所以建议您咨询专

业医生的意见。 3.脾切除术：对于一些慢性或反复发作的病例，脾切除手术可能会被考虑。脾切除术可以减少脾脏对血小板的破坏，从而提高血小板的数量。 4 .其他治疗方法：在某些情况下，还可以尝试其他治疗方法，如静脉免疫球蛋白（IVIG）治疗、抗rhesusD免疫球蛋白（Rh免疫球蛋白）治疗等。 请注意，具体的治疗方案应该根据您的个体情况由专业医生确定。建议您尽快咨询专业医生，以便获得准确的诊断和治疗建议。祝您早日恢复健康！

问：叔叔患糖尿病已有20年，平时靠打胰岛素和降糖药物控制病情，病情也比较稳定，没有进展，但他还是想多了解下这个病，想问一下，糖尿病患者会出现哪些并发症呢？

答：糖尿病并发症分为急性和慢性两种，急性并发症包括糖尿病酮症酸中毒、非酮症性高渗性昏迷、糖尿病乳酸性酸中毒、低血糖昏迷；慢性并发症包括感染、糖尿病肾病、眼部病变、糖尿病足。

问：我原来很胖的，可最近不知道为什么整个人都瘦了下来，经常疲倦人不舒服的，食欲也越来越好了，好像都吃不饱一样，我上医院去做了血糖的检查后，医生告诉我患的是糖尿病，糖尿病患者应该要注意什么呐？糖尿病患者应该要注意什么呐？

答：一旦达到血糖控制的目的，应当开始长期有规律的治疗，包括心理治疗、饮食治疗、运动治疗、口服降糖药和注射胰岛素治疗，同时应加强糖尿病知识宣教。其中，饮食治疗是糖尿病治疗的基础，运动有助于血糖的利用，改善胰岛素敏感性，改善生活质量，降低死亡率。在饮食和运动不能使血糖达到满意控制时，应使用药物治疗。

问：我双耳出现耳鸣现象一年多了，曾吃了过药，但无多大作用。请问是怎么回事？该如何治疗？（有糖尿病，是母亲遗传造成的，现年38岁，男，现血糖吃了药已控制在正常范围内）

答：耳鸣是一种常见的症状，可能有多种原因导致。根据您的描述，您已经出现耳鸣一年多了，并且之前吃药没有多大作用。在这种情况下，我建议您尽快就医，进行详细的检查和诊断，以确定耳鸣的具体原因，并制定相应的治疗方案。可能的原因包括中耳炎、鼓膜炎、耳膜内陷等。此外，脑动脉硬化也可能导致脑缺血的表现，需要注意。因此，您需要咨询专业医生，进行进一步的检查和治疗。祝您早日康复！

问：我在医院检查尿酸偏高，手脚都有些痛。由于工作原因我平常的应酬比较多，不能严格的按照要求去忌口。我想了解一下除了饮食禁忌以外的一些治疗痛风的方法。怎么样治疗痛风？

答：痛风发作时，可以采用以下方法治疗。首先，可以用冰袋冷敷到肿胀部位，有助于减轻疼痛。如果疼痛无法忍受，可以使用非甾体镇痛药，如双氯芬酸钠。此外，可以尝试使用肉桂和蜂蜜按摩关节痛处，可以缓解疼痛。另外，经常活动关节，做一些伸展运动，有助于赶走尿酸结晶。晚上临睡前可以用痛风手足泡浴剂泡脚，至少30分钟，可以减轻疼痛，并促使尿酸结晶溶解排出体外。此外，可以配合使用稳定降尿酸的中药，以预防复发。例如，可以使用痛风排酸胶囊来抑制尿酸，这种药物具有降尿酸和对肾脏的双重保护功能。中药是一种温和的治疗方法，可以帮助身体恢复。

问：我之前患有轻微慢性前列腺炎，后来经过药物治疗有好转，感觉好的差不多了，可是因为精神性的，总想上厕所，没有尿也总想上厕所，而且现在性欲减退。

答：根据您的描述，您可能仍然受到前列腺炎的影响。建议您多吃一些清热生津、养阴润肺的食物，如百合、糯米、蜂蜜、花生、鲜山药、白木耳、红枣、莲子、甘蔗等。此外，海鲜、海参、芝麻、核桃等滋阴补肾的食物也可以多吃。这些食物有助于改善前列腺炎的症状，希望对您有所帮助。

问：我的身体一直很健康，没有到大医院检查过。今年感觉自己的身体不舒服。耐不住家人要求去做了检查。说我有慢性肾炎，请问慢性肾炎吃什么药好？我之前吃过一段时间药了，有没有其他的推荐呢？

答：常用的治疗慢性肾炎的药物主要包括ACEI和ARB药物。这些药物不仅能够控制高血压，还能减少蛋白尿并延缓肾损害的进展。除了这些药物之外，还有一些传统中药的选择，如黄葵胶囊以及含有虫草成分的保肾药物，如金水宝胶囊、凌志胶囊和百令胶囊。此外，阿司匹林和双嘧达莫等抗血小板聚集药物也具有保护肾脏的作用。然而，请务必在医生的指导下使用这些药物，并告知医生你之前使用过的药物，以便获得更准确的建议。

问：最近这些天，总感觉浑身不舒服，所有关节酸痛的很，遇着风就更疼，就像是针刺的一样，钻心的疼，关节红肿的很，试过很多方法，都无法缓解，好像在全身游走，去医院检查，医生说是痛风病。痛风病有哪些症状？

答：痛风病的症状主要表现在关节部位，尤其是脚的各个关节上面。症状包括：1.尿酸持续升高；2.患病部位出现硬包，以肿胀形式出现，在周围会有暗红色或者紫红色的反应；3.患者会感到疼痛，刺痛感特别明显。治疗方面，需要控制饮食，加强水分的吸收以及各种碱性物质的摄入。同时，选择正规的治疗方法，如秋水仙素来控制痛风的发作。

问：高血压？有高血压7年了，一直吃利血平来降压，一天用一次，但最近压力大，情绪不稳定，血压高压达到170，一天吃三次，才可降到***，想问一下有什么好药物或好方法来降压吗？

答：你好，根据你的描述，你已经有高血压7年了，一直在服用利血平来控制血压。然而，最近你遇到了压力大和情绪不稳定的问题，导致血压升高。除了药物治疗外，还有一些其他方法可以帮助你降低血压。首先，你可以尝试一些放松和减压的方法，如深呼吸、冥想、瑜伽或按摩。这些方法可以帮助你缓解压力和稳定情绪，从而降低血压。其次，你可以考虑增加体育锻炼。适度的有氧运动，如快走、慢跑或游泳，可以帮助降低血压。每周至少进行150分钟的有氧运动是推荐的。此外，饮食也对血压有影响。你可以尝试采用DASH饮食法，即低盐、低脂、高纤维的饮食。增加水果、蔬菜、全谷物和健康蛋白质的摄入，减少盐和饱和脂肪的摄入，有助于降低血压。

最后，如果你的血压仍然无法得到有效控制，你可以咨询医生，了解其他药物选项。医生可以根据你的具体情况，为你调整药物治疗方案。请记住，高血压是一种需要长期控制的疾病，除了药物治疗，合理的生活方式和心理健康管理也非常重要。如果你有任何进一步的问题或需要更详细的建议，请咨询医生。

问：我今年31岁，女。平时我的胃就不好，中午吃饭吃的有点饱，不停的打嗝，特别难受，用了很多方法，不见缓解，想问一下，这种现象该怎么治疗？

答：根据症状描述，可能是因为进食过饱过急引起的打嗝，也可能是因为慢性病导致的。建议避免进食过饱过急，不要在打嗝时饮用冷饮，不要做剧烈运动。如果症状持续，建议就医，加强胃动力治疗，以缓解症状。

问：我今年处于进去中年。去医院检查出来是前列腺炎。给我开了西药，可我本人是比较喜欢中药的，那么喝中药治疗前列腺炎有效吗？我要该怎么办呢？还需要注意一些什么呢？

答：中药治疗前列腺炎需要更长的时间，药效作用慢，需要至少一个月以上的时间。同时，需要注意饮食规律，禁忌辛辣刺激食物，少熬夜，禁止吸烟喝酒，多锻炼身体，提高自身抵抗力。

问：我高血压吃了这么多年的药物，现在的效果药物见效已经越来越小了，早上起床的时候还会有头晕的现象，原发性高血压的治疗方法有哪些呢？

答：原发性高血压是一种家族遗传性疾病，需要长期规律服用药物进行治疗。继发性高血压则多见于其他疾病或不良生活习惯，可以通过手术等方式进行缓解。建议及时明确具体病因，并规律服用降血压药物，同时注意饮食和保持良好的精神状态。

问：十五岁血压高。3年前血压就高过一直也没吃药。最近血压又高了，尔且吃药了。吃药了就下来了。过几个小时又高了早上血压160/104左右。想咨询专家到底什么原因？具体做什么检查？

答：建议患者养成良好的生活习惯，注意饮食健康，保证睡眠充足，避免熬夜，多吃水果和蔬菜，多喝水。建议患者排除遗传性高血压，保证大便正常，到正规中医院心内科进行检查和治疗。

问：年龄50岁，从去年开始脸上开始长老年斑，手上也有。用过祛斑的产品，没有效果，是不是祛斑的产品不治疗老年斑呢？要有什么办法可以减轻老年斑呢？

答：老年斑是由于细胞代谢机能减退，体内脂肪氧化产生的老年色素沉积在细胞体上形成的。祛斑产品可能对老年斑的效果有限。建议采取其他方法来减轻老年斑，如改善饮食习惯，多吃丰富的食物纤维、维生素C、维生素B、维生素D、钙、磷、钾等微量元素和矿物质。

问：我叔叔前几个月得了脑梗塞，脸色看上去很不好，总是有点红红的，就连身体也常常是有些僵硬的，现在手臂都抬不起来，腿脚也不是很好使。如何能有效的治疗脑梗塞？

答：脑梗塞的治疗主要是综合治疗和个体化治疗。在不同的疾病发展阶段，需要根据不同的病情和病因采取有针对性的治疗措施。治疗的目标是改善和恢复缺血区的血液供应，促进脑微循环，阻断和终止脑梗死的病理进程，并预防和治疗缺血性脑水肿。在急性期，应早期使用脑细胞保护治疗，采取综合性措施，保护缺血周边半暗带的脑组织，避免病情加重。

问：你好医生，我前列腺炎早泄，我想知道吃什么中药可以治愈啊？（希望您能给我一个方法治疗）我治疗了好长时间一直没好，快崩溃了。现在急需好一点方法，谢谢您了，万谢！

答：前列腺炎早泄是一种常见的男性疾病，治疗方法有很多种。首先，你需要检查一下前列腺液，看看是否有细菌感染。如果有细菌感染，那么抗感染治疗是必要的。另外，你还需要检查一下是否有包皮的问题，如果有的话，可能需要进行手术治疗。对于无菌性前列腺炎，可以考虑联合中药补肾治疗，这对于早泄的治疗也有一定的帮助。

问：想确定看是不是糖尿病然后看有什么药可以控制和缓解？

答：如果您想确定是否患有糖尿病，建议您去医院进行相关检查，如血糖、糖化血红蛋白等检查。对于糖尿病的治疗，药物治疗是其中的一种方式，但具体的药物需要根据患者的情况而定。常用的药物包括口服降糖药、胰岛素等。此外，控制饮食、增加运动等也是控制糖尿病的重要措施。建议您在医生的指导下进行治疗。

问：糖尿病史已经有两年了，平时很多东西不知道可以吃还是不可以吃，导致吃的东西都十分的单调，想了解一下糖尿病能吃哪些食物？

答：糖尿病的患者需要控制饮食，选择低糖食物是很重要的。黄瓜、青瓜、草莓等水果是糖尿病患者可以吃的食物。此外，糖尿病患者还可以选择低糖的蔬菜，如菠菜、芹菜、苦瓜等。此外，糖尿病患者可以选择低脂肪的食物，如鸡胸肉、鱼类、豆腐等。另外，全谷类食物如糙米、全麦面包也是糖尿病患者可以选择的食物。但是，糖尿病患者应该避免高糖食物，如糖果、蛋糕、甜点等。最好咨询医生或营养师的建议，制定适合自己的饮食计划。

问：胆结石手术后什么症状。我母亲三年前，做个胆摘除手术，但是现在听老人家说胆那个位置，还是有些疼，怎么办谢谢回复。想问问吃什么药，好一点

答：根据症状描述，可能存在胆管梗阻或胆管结石的可能性，需要进一步检查。建议平时以清淡饮食为主，避免进食油腻性较大的食物，可以服用些消炎、利胆的药物，但是仍需要去医院检查下彩超或者MRCP以便排除有无新发胆管结石可能。

问：近来我出现龟头红肿，分泌物增多，很难受也很烦恼，做了一番详细的检查说我得了包皮龟头炎，不治疗会好吗？

答：包皮龟头炎是一种常见的男性生殖器官炎症，如果不及时治疗，可能会导致其他炎症的发生，如尿道炎和前列腺炎。因此，不治疗的话，龟头炎是不会自愈的。建议多注意休息，避免劳累受凉，注意个人卫生，暂禁性生活，可给药物治疗，必要时进行包皮环切手术。

问：我有多年的尿频尿急尿不尽排尿不畅偶然有些痛在性方面也降低了质量，之前服用过一些消炎的药，效果不是很好，想知道有多年的尿频尿急尿不尽，该怎么治疗？

答：需要进一步去医院的泌尿科进行前列腺液的化验检查，尿分析的化验检查，泌尿系统彩超检查，残余尿量检查来进一步明确疾病的诊断，根据检查结果，可以选择药物治疗，也可以选择物理治疗。多喝水，不要吃辛辣食物。

问：我也不知道怎么了，最近有半月了吧，我总是睡不着，要不一睡着就做梦，还经常在梦中惊醒，我原以为这是正常现象，过几天就好了，可是到现在二十天了都这样，就是老做梦。希望得到的帮助：多梦的食疗方法？

答：失眠多梦的食疗方法可以帮助缓解失眠带来的痛苦，可以尝试一些食疗方法来改善失眠多梦的情况。养心安神肉材料莲子、龙眼肉各30克，百合20克，瘦猪肉25

0克。用法将瘦猪肉洗净，切小块，与莲子、龙眼肉、百合共入沙锅内，加适量清水，置文火上煲熟，加少许调味品服食。每晚1次。功效补益气血，养心安神。主治神经衰弱，气血虚弱，失眠多梦，体倦乏力，食欲不振等。桃杞鹌鹑蛋材料核桃肉15克，枸杞子10克，鹌鹑蛋12个，番茄酱适量。用法把核桃肉放入盐开水中浸泡，枸杞子用清水泡后上笼蒸5分钟，鹌鹑蛋用文火煮熟，去壳后撒上干生粉。再将鹌鹑蛋和核桃肉放入油锅炸至金黄色，把枸杞子及番茄酱加入即可服食。隔日1次，连服数剂。功效温阳益气，益智补脑。主治神经衰弱肾阳不足，头昏脑涨，健忘失眠，神疲乏力。有助于改善多梦的部分食品：小米性微寒，具“健胃、和脾、安眠”之功效。研究发现，小米中含有丰富的色氨酸，其含量在所有谷物中独占鳌头。另外，小米含丰富的淀粉，食后使人产生温饱感，可以促进胰岛素的分泌，提高进入脑内色氨酸的量。小米熬成粥，临睡前食用，可使人安然入睡。龙眼其味甘、性温，具补心益脑、养血安神之功效。临睡前饮用龙眼茶或取龙眼加白糖煎汤饮服均可，对改善睡眠有益。水果中含有果糖、苹果酸以及浓郁的香味，可诱发机体产生一系列反应，生成血清素，从而有助于进入梦乡。莲子莲肉味涩性平，莲心味苦性寒，均有养生安神之功效。《中药大辞典》称其可治“夜寐多梦”。研究表明，莲子含有莲心碱、芸香甙等成分，具镇静作用，可促进胰腺分泌胰岛素，使人入眠。睡前可将莲子用水煎，加盐少许服用；或将莲子煮熟加白糖食用。核桃味甘性温，是一种很好的滋补营养食物，能治疗神经衰弱、健忘、失眠、多梦。取粳米、核桃仁、黑芝麻，慢火煨成稀粥食用，可用白糖调食，睡眠前食用。

问：你好，我老是鼻子不通气，总以为是感冒了，但是吃了感冒药也不见好，这段时间去医院检查过几次，医生说是鼻甲肥大。鼻甲肥大是怎么回事？

答：鼻甲肥大是一种常见的鼻腔疾病，会导致鼻腔阻塞，影响呼吸功能。鼻甲肥大的临床症状各异，当影响鼻腔的生理功能时，会出现呼吸障碍，引发血氧浓度降低，影响其它组织和器官的功能与代谢，而出现一些如头痛、头晕、记忆力下降，胸痛、胸闷、精神萎靡等，甚至会并发肺气肿、肺心病、哮喘等严重并发症。因此，发现上述症状，应及时治疗。

问：我这一段时间的时候总是感觉尿频尿急，开始的时候就以为是前列腺炎又复发了，就买了一些药物吃，可是效果却不是很好，后来的时候去了医院检查，才知道是得了泌尿结石，我想了解一下泌尿结石的症状有哪些？泌尿结石的症状有哪些？

答：泌尿系结石是肾、输尿管、膀胱、尿道结石的总称。症状包括突然发生的剧烈腰痛、牵引少腹，尿频、尿急、尿痛、尿色混浊，甚至尿中有血或砂石。泌尿系结石可引起尿路损伤、梗阻，并发感染，致使肾功能受损。中医文献称石淋、砂淋、血淋（尿血明显者）等。如果您出现这些症状，建议及时就医。

问：我出现了高血压症状，所以现在正在使用降压药的方法来帮助稳定血压，但是不知道什么原因，我吃降压药，很长一段时间的血压一直没有降下来，高血压吃药降不下来怎么回事？

答：高血压患者使用降压药时，血压无法降下来可能是由于错误的使用方法、盲目购买药物、耐药性或其他原因导致的。建议患者按照医生的建议正确使用降压药，避免盲目购买药物，定期复查血压，同时注意饮食合理、适量运动、减轻精神压力等，以帮助稳定血压。如果血压仍无法降下来，建议及时就医，寻求专业医生的帮助。

问：我阿姨可能是因为年龄大了，最近一两年脸上长了很多斑，她自己也不知道自己长的什么斑，不知道怎么就长出来了，想知道斑的种类有哪些？

答：斑分为活性斑和定性斑。活性斑有分为黄褐斑、妊娠斑、蝴蝶斑、晒斑、黑斑、肝斑。定性斑又分为雀斑、老年斑、色素斑、胎斑、暗疮印。根据阿姨的情况，她可能长了一些定性斑和活性斑，需要进一步了解她斑的具体情况才能确定斑的种类。

问：儿童尿频尿急挂什么科

答：儿童尿频尿急可能是由于水的摄入量过多，肾脏对于水的排泄出现异常，糖尿病、尿崩症等疾病，以及泌尿系统的疾病，包括炎症、前列腺疾病、结石，甚至肿瘤等引起的。治疗尿频尿急，要根据症状以及病人的年龄选择治疗方法。如果是综合医院建议挂儿科,如果是省级儿童专科医院建议挂儿童泌尿科。

问：我有时候脚痛，脚背红肿，发麻，胀痛，影响平时正常走路。去医院检查，医生说是痛风。医生开了药，打了止痛针后症状得到了缓解。但是过了一段时间，我的脚又开始疼痛了。痛风脚肿痛怎么办？

答：痛风是一种代谢性疾病，是由于体内尿酸代谢紊乱，导致尿酸盐在关节和周围软组织沉积，引起炎症反应，从而导致关节疼痛、肿胀、红肿等症状。痛风的症状多发生在脚的各个关节上面，如足背、足跟、踝关节等，症状发生时会有疼痛、肿胀、红肿、发热等表现，严重时会影响正常走路。治疗痛风的方法包括药物治疗和生活方式调整，药物治疗主要是通过降低血尿酸水平来缓解症状和预防病情进展，生活方式调整包括控制饮食、减轻体重、避免饮酒等。

问：我患有前列腺炎、开始症状很轻、就是有时会有尿频尿急的现象、而现在有时却有会阴部疼痛感、有时用手按压也会有疼感、有尿意时也有不适、请问要如何来缓解呢？前列腺炎会阴疼痛如何缓解？

答：前列腺炎的治疗通常需要药物治疗和物理治疗相结合，单纯的药物治疗效果可能不够理想。此外，自我调养也非常重要，可以通过禁烟酒、少食辛辣食物、避免过劳、适当锻炼、注意保暖以及节制性生活来帮助治疗和预防复发。

问：今年5月分突然感觉心跳加速，心慌气短，血压升高，之后症状逐渐消失。之后几个月不时的发作，后来有感觉心跳不是那么快了，但是又随着出现头疼，颈部酸痛，胃部饱胀，上顶难受的症状，四肢无力，心情焦虑等症状，请问怎么办？什么叫植物神经紊乱？植物神经功能紊乱的症状

答：根据病人的症状描述，可能是植物神经功能紊乱，这种疾病的诊断主要以临床表现为主，建议采用中药配合心理治疗可以达到很好的治疗效果。中药可以起到调理情绪，

醒脑开窍、疏肝涤痰、调理气血,调整机体的脏腑功能及平衡阴阳的作用。中药副作用小、标本兼治。

问：本人前段时间被诊断出患有前列腺囊肿，有时候有排尿困难的现象，不知道该怎么办了，想知道一些相关的治疗方法，前列腺囊肿的常用治疗方法有哪些

答：前列腺囊肿的常用治疗方法有保守治疗和手术治疗两种。保守治疗可以采用中药内服和外用贴敷等方法。手术治疗适用于较大的囊肿或有症状的小囊肿。

问：我血压早晨起床测量为160/78,稍活动后便可较低，咨询医生什么时间吃药最好，吃什么药好，我现在吃寿比山已经2年时

答：根据用户的血压情况，建议用户采取一些生活方式的改变来管理血压。首先，建议用户采用低盐饮食和低脂肪饮食，这有助于控制血压。此外，用户应该戒烟和限制酒精摄入，同时避免情绪激动，这些因素都可能对血压产生影响。如果用户同时有高血脂的情况，也需要进行相应的治疗，否则降压效果可能不佳。关于药物治疗，建议用户在当地医生的指导下选择降压药物。常用的降压药物包括心痛定等。最好选择缓释片，如波依定或硝苯地平缓释片口服，这样可以使血压更加稳定。此外，多吃一些水果和蔬菜对血压也有好处。根据用户提供的信息，用户已经吃寿比山药物2年。寿比山是一种中药，具有降压的作用。但是，我建议用户在当地医生的指导下进行药物治疗选择，因为医生可以根据用户的具体情况来确定最适合的药物治疗方案。

问：我月经一直都不正常，但是唯一不会改变的就是每次来月经的时候我总是会出现痛经的现象，经常都痛的会耽误了工作，好几次都是这样，后来的时候听老人家说可能是盆腔炎引起的。，盆腔炎会不会引发痛经啊？

答：盆腔炎会引发痛经。盆腔感染是引起痛经的重要原因之一。盆腔感染是指女性内生殖器及周围的结缔组织、盆腔腹膜发生的炎症。它是妇科常见病，严重的盆腔炎可能引起弥漫性腹膜炎、感染性休克等严重后果，而轻度的盆腔炎则可能导致痛经的发生。痛经会给病人带来痛苦，并且可能影响妇女的身心健康。所以，盆腔炎确实会引发痛经。如果您有疑问或需要进一步了解，请咨询医生。希望我的回答能够帮到您。

问：前段时间家中的老人身体不舒服，有时候还会大小便失禁，听别人说很可能是癫痫病，心里非常担心但是对这个又不了解，所以想问一下癫痫病的早期症状有哪些？

答：癫痫病的早期症状包括突然意识丧失、倒地头后仰、痉挛出现吼叫、四肢抽搐、口吐白沫、面色青紫、两眼上翻，有时伴有大小便失禁。发作后会对过程不能回忆，全身疼痛乏力，表现为局部或者一侧肢体抽搐，若癫痫放电扩展延至全身。这些早期症状是癫痫病的常见表现，如果您的家人有类似的状况，建议您立即就医咨询专业医生，以便尽早确诊和治疗。

问：专家你好，我去医院检查，医生说是高尿酸血症，警惕一定要重视，不然会引发痛风关节炎病，想请问专家是不是高尿酸一定会引发痛风关节炎病？高尿酸一定会引发痛风吗？

答：高尿酸血症是痛风发生的必要条件但非唯一条件，必须同时具备另一条件即自然免疫系统的被激活，高尿酸血症才能发展为痛风。沉积在关节局部的尿酸盐结晶分为炎性和非炎性两种。非炎性的尿酸盐结晶不参与痛风炎性的反应过程，不会激活免疫反应，

最终自溶。炎性的尿酸盐结晶可被白细胞所识别、吞噬，是激活自然免疫系统、引起痛风发作的尿酸盐结晶。因此高尿酸不一定会引发痛风，必须同时具备另一条件即自然免疫系统的被激活，高尿酸血症才能发展为痛风。

问：关节红肿热痛，发作频繁，大概每月发作一次，每次发作的时候下肢沉重，行走不便，服用过不少药物，效果都不好痛风不能吃什么？痛风病人痛风要服用啥药？

答：痛风是一种嘌呤代谢障碍引起的高尿酸血症，主要表现为关节红肿热痛。痛风患者在饮食上需要注意避免摄入高嘌呤的食物，如动物内脏和豆制品。此外，痛风患者还应该遵守以下饮食原则：保持理想体重，摄入适量的碳水化合物，限制蛋白质摄入，减少脂肪摄入，增加水的摄入量，减少盐的摄入，禁止饮酒，少用刺激性调味品和香料，限制嘌呤的摄入。此外，痛风患者不宜使用抑制尿酸排出的药物。

问：患者年龄:我是有一次发烧后得的癫痫病，现在是一直吃药来控制，也会发作。想知道一直这样吃药对身体有危害吗？。吃多了关于癫痫类的药对身体有危害吗？

答：癫痫是一种慢性疾病，药物治疗是常见的控制方法。然而，长期使用癫痫药物可能会对身体产生一些危害。具体来说，常见的副作用包括头晕、嗜睡、注意力不集中、记忆力下降、情绪波动等。此外，长期使用某些药物还可能导致骨质疏松、贫血、肝功能异常等。因此，对于长期使用癫痫药物的患者，应定期进行身体检查，以及监测药物的血药浓度，以确保药物的疗效和安全性。

问：如果是非气质性的早泄怎样治疗，精神性的或是习惯性的，因为我为治疗早泄做过包皮环切背神经阻断，效果还是不行，又从网上购买过所谓的早泄汤，血钻野燕麦，结果都不见好转习惯性早泄

答：男性的早泄可能与前列腺炎有关。射精管开口于前列腺部。前列腺有炎症的时候会影响到射精管功能，出现早泄，射精无力等症状。对于非气质性的早泄，治疗方法可以包括药物治疗、心理治疗和物理治疗。药物治疗可以使用一些抗抑郁药物、局部麻醉药物或延迟射精药物。心理治疗可以包括性治疗、行为疗法和心理咨询等。物理治疗可以包括物理疗法、锻炼和改善生活习惯等。然而，每个人的情况都是不同的，最好咨询专业医生以获得个性化的治疗建议。

问：患上鼻窦炎已经几年了感觉对身体伤害很大近来头晕头痛愈发严重了鼻窦窥镜手术也做过效果不大记忆力下降了这让我有些着急请问我这个病该怎么治疗呢？

答：鼻窦炎是鼻的附属器官，医学上常将鼻窦称为副鼻窦。鼻窦炎引起的症状有流黄脓鼻涕、头痛头昏、慢性咳嗽、久治不愈或反复咽炎等。治疗鼻窦炎一般的药物只能缓解不能完全治愈。建议采用在鼻内窥镜下用鼻内窥镜特殊器械直接作用于蹭位置手术，只需要打开鼻窦口直接清除病灶组织，手术精细一次性治疗手术。同时服用玉屏风散、霍胆丸等药物，减少感冒。

问：我的父亲是患者了糖尿病了，现在一直是在吃药来控制血糖的，家里的饭菜也是特别的注意的，怕让他的血糖再升高了，现在我看到有许多人用针灸来治病，不知道糖尿病人适不适合。

答：针灸治疗糖尿病的适用范围是有限的，只有2型糖尿病患者可以使用针灸治疗，而1型糖尿病患者则必须要补充胰岛素。

问：医生你好，最近总是感觉到有些前列腺痛的，而且这段时间晚上都要起来上夜尿了，请问哪一个医院治前列腺炎最好的？深圳市医院前列腺炎治疗哪家好的

答：前列腺炎的症状包括尿频、尿急、尿痛，严重时可能出现排尿困难和尿潴留。有时还可能出现脓尿或终末血尿。建议尽早去正规医院进行检查和治疗。

问：60岁，今年痛风发作四次了，这次比前三次严重，疼的不能下地。并且红肿，贴了止痛消炎贴不管用。曾经治疗情况和效果：没有到医院治疗过，喝降酸茶，刚喝几天。想得到怎样的帮助：应急止痛，吃什么药特效，今后注意什么？

答：根据您的描述，您可能正在经历一次严重的痛风发作。痛风是一种关节疾病，最常见于足部的第一跖趾关节，表现为红肿疼痛，活动受限。为了确诊痛风，您需要进行X线检查、血常规和肾功能检查，以了解尿酸水平，因为痛风患者的尿酸水平通常高于正常值。对于急性期的痛风发作，可以使用秋水仙碱或非甾体抗炎药物来控制疼痛。秋水仙碱是一种常用的药物，可以缓解痛风引起的疼痛和炎症。非甾体抗炎药物也可以缓解疼痛和炎症，但需要在医生的指导下使用。除了药物治疗，您还需要注意日常生活中的一些饮食和生活习惯。首先，避免饮酒，因为酒精会增加尿酸的产生，加重痛风症状。其次，减少摄入高嘌呤食物，如海鲜、动物内脏等，因为这些食物会增加尿酸的含量。此外，保持适当的体重和进行适量的运动也是预防痛风发作的重要措施。由于您的症状比较严重，建议您尽快就医，接受专业医生的诊断和治疗。医生会根据您的具体情况制定合适的治疗方案，并给予您更详细的指导和建议。祝您早日恢复健康！

问：近一段时间，每天到了下午就感觉头疼、头晕，量了几次血压，有时正常有时又偏高一点。前年血脂高吃过一段时间的降脂药，降到2点几后就停药了。有好几天了，具体原因是否和血压或血脂高有关呢，自己也不清楚。请专家诊断。

答：根据您的描述，您近期出现的头疼、头晕的症状可能与血压和血脂高有关。血压和血脂高可能导致血液循环不畅，进而引起头疼、头晕等症状。肝阳上亢是中医的一种病理概念，可能与您的症状有关。建议您去看中医，进行进一步的诊断和调理。平时可以喝绿豆汤，注意避免辛辣的食物。

问：我最近体检查出血压高，也买了药，买了测血压的仪器，可以每天在家给测血压，已经吃了一个多月的药了，也见好了，但是不知道正常后还能吃药吗，想了解高血压病人血压正常了还吃药吗？

答：高血压是一种慢性疾病，需要长期控制和管理。药物是治疗高血压的重要手段之一，但药物治疗并不能完全治愈高血压，而是通过降低血压来控制病情。因此，即使血压在正常范围内，也需要继续服用药物来维持血压的稳定。

问：我最近总是感觉腰特别酸，平时愿意出汗，腿也疼，拉尿的时候，很不舒服，尿道口火辣辣的，而且尿不净，尿疼，晚上总是上厕所，后来去医院那里拍了B超，发现得了前列腺炎这个疾病，医院那边的医生说不能喝酒了，想问一下，前列腺炎这个疾病的人为什么不能喝酒？一般都用什么治疗办法

答：前列腺炎是一种男性疾病，酒精本身也是一种性腺毒素，会使男性的性腺中毒，引起性功能障碍，导致男性出现阳痿、不育等病症。对于已经有男性的性功能障碍的慢性的前列腺炎这种男性疾病病人，治疗本身就比较棘手，而大量饮酒无疑是雪上加霜，使治疗难上加难。治疗前列腺炎这种男性疾病中药调理，配合饮食作息，才是王道，这

个病没有速效和特效，治病要找到病因和症结所在，单一的吃药不找到真正的根本的病因，是治标不治本的，不然从哪里爬起来还会从哪里跌倒。希望病人理解这句话的意思，对治疗和恢复有所启迪。

问：最近一段时间小便有点困难还有尿急尿频尿不尽感是不是患上前列腺增生了？。怎样才能预防前列腺增生呢这个病好治吗？

答：前列腺增生是一种常见的男性疾病，症状包括小便困难、尿急、尿频和尿不尽感。根据你的描述和年龄，前列腺增生的可能性较大。建议你去专科医院确诊，并及早接受治疗，以免错过最佳时机。预防前列腺增生的措施包括饮食调理、避免辛辣刺激食物、戒酒、少骑自行车、保持心情舒畅、治疗泌尿生殖系统疾病、参加适当的体育活动等。前列腺增生是可以治愈的，及时接受正规治疗可以获得痊愈。祝你早日康复！

问：尿急尿多，是怎么回事？每次当尿放完了，还很急，放到最后就非常急可不管多急也放不出了，之前检查过前列腺和B超，医生都说没事，我真的不知道去看什么科了一点好转都没有

答：尿急尿多的症状可能是泌尿系统感染引起的。建议您再次就医，进行尿常规检查来确定是否存在感染。如果确诊为泌尿系统感染，可以考虑口服抗生素治疗。如果口服治疗效果不佳，可能需要输液治疗。此外，您应该多饮水，避免辛辣、冷凉食物，避免饮酒。

问：我老公今年35岁了，他最近过兴生活的时候总是打不起精神，而且最近两个月总是尿频，尿不尽，我在网上查了查症状很像是前列腺炎，但是他才三十多岁想得到怎样的帮助:想知道三十多岁的男性也会得前列腺炎吗

答：是的，三十多岁的男性也有可能得前列腺炎。虽然前列腺炎一般是中年男性容易患上的疾病，但年轻男性也有可能患上前列腺炎，尤其是在一些特殊情况下。如果你的丈夫出现了打不起精神和尿频的症状，这些症状确实与前列腺炎相似。为了确诊，建议你让你的丈夫去男科医院做一个检查，然后听听医生的建议。医生会根据检查结果给出相应的治疗方案。希望你的丈夫早日康复！

问：前段时间发现自己说话都不利索有时候手脚感觉到发麻后来去医院检查脑梗塞住院住了一段时间现在是好多了但是还是偶尔会犯现在是天天在吃药平时饭量不大也不知道该注意些什么东西。请问老年人脑梗塞应该注意些什么？饮食上注意些什么？（）

答：老年人脑梗塞需要注意的问题包括饮食、运动、药物等方面。饮食上需要注意控制总的脂肪量，减少动物脂肪的摄入，烹调时不用动物油而用植物油，限制饮食中的胆固醇，每日应在300毫克以内。运动方面需要适当进行有氧运动，如散步、慢跑、游泳等，每周至少进行3次，每次30分钟以上。药物方面需要按照医生的建议进行用药，不要随意更改药物剂量或停药。同时，定期进行体检，监测血压、血脂、血糖等指标，及时发现问题并进行调整。

问：最近总是会感觉鼻塞流鼻涕、有时候甚至头痛有朋友说是鼻窦炎请问医生鼻窦炎会引起什么症状不知道能不能治好？鼻窦炎会引起什么症状能治好不？

答：鼻窦炎是一种常见的疾病，常见症状包括鼻塞、流鼻涕、头痛、头晕、脑胀、失眠、健忘、心烦意乱、容易发脾气、注意力不集中等。鼻窦炎还可能影响周围组织发炎，

尤其是眼病如中心性视网膜炎等。鼻窦炎的治疗方法包括药物、手术、中医中药等，但具体治疗方案需要根据病人的情况进行详细检查和判断。目前，根治鼻窦炎应以药物和手术治疗为主。

问：昨天上厕所的时候，有点尿血，非常吓人，就去医院检查了下，说是前列腺炎，之前一直有尿频尿急的正常，偶尔会尿痛，前列腺红肿，现在一直在消炎，但还是很难受。前列腺炎会血尿吗？

答：前列腺炎可以引起血尿，血尿是指尿液中红细胞排泄异常增多，是泌尿系统可能有严重疾病的讯号。医生会通过检查尿液离心沉淀后，用显微镜来检查，如果每个高倍视野中有5个以上的红细胞，就叫血尿。若是仅仅在显微镜下查出红细胞，而眼睛看起来有血的尿，叫做镜下血尿；如果眼睛能看出尿呈“洗肉水样”或带血色，甚至尿中有血丝或血凝块，叫做肉眼血尿。所以，血尿并不是都能被眼睛发现的。用眼睛能看出尿中有血，说明血尿较严重，应赶紧查明原因，积极治疗。

问：ASA II～III级的II型糖尿病的推荐药有些什么？

答：异丙酚和咪达唑仑。这两种药物在ASA II-III级的II型糖尿病患者中可能被用于麻醉和镇静。

问：最近发现右脚大拇指和2-3关节异常疼痛，并且又红又肿，到医院检查后医生跟我患上了痛风，尿酸值也很高，服用了秋水仙碱但是效果不是很理想，尿酸值始终没有降下来，医生说尿酸降不下来还会再次复发。不知道治痛风外用药有吗

答：治疗痛风的外用药效果不好，一般使用口服药物秋水仙碱，别嘌醇，碳酸氢钠，芬必得，苯溴马隆等对症治疗。多喝水，少食含动物内脏食物及豆腐等含嘌呤高的食物，定期复查尿酸，将尿酸控制早正常水平，可以减少痛风的发作的。痛风药物治疗的效果越早越好，早期治疗可使症状迅速缓解，而延迟治疗会使炎症不易控制。

问：风湿性关节炎病已经20多年了，一直没治好，现在浑身疼，尤其是腰，背，腿，走路疼，睡觉翻身都疼吃过很多药都不管用，最近停了雷公藤药，该吃中药也不管用，疼的更厉害了想请教大夫现在应该怎样治疗才有效

答：建议您去医院的针灸科进行针灸治疗，这可以很好地缓解疼痛。一般来说，每个疗程为10天，可以采用扎针加烤电的方式。此外，还可以考虑外科疗法，包括不同的矫形手术、人工关节置换和滑膜切除等。需要注意的是，手术不能治愈疾病，只能改善关节功能和生活能力。另外，代替疗法也是一种选择。利用纯天然锯峰齿鲛（大青鲨）软骨粉治疗风湿性关节炎已经在世界各发达国家得到广泛应用，并取得了临床疗效验证。膏药治疗也是一种选择，膏药具有高有效成分含量、缓慢析出、长期持久的作用，可以切实改善局部疗效。此外，物理治疗、康复训练、职业训练和心理治疗等也是综合治疗的重要组成部分。加强锻炼，保持良好的心态，注意避免潮湿的环境，劳逸结合，预防和控制感染也是非常重要的。最重要的是，建议您咨询专业的医生，根据您的具体情况制定个性化的治疗方案。

问：两次血糖差那么多可能是糖尿病吗空腹测血糖7.1第二天中午吃饭后喝了好好多水下午五点去测血糖就变成了4.9这样正常吗是不是有一次数据测的不准？

答：血糖的波动是正常的，许多因素可以影响血糖水平，包括饮食、饮水、运动等。在

您的情况下，第一次测试是空腹血糖，而第二次测试是饭后血糖，这两个时间点的血糖水平本来就会有差异。此外，喝了大量水可能会稀释血液中的葡萄糖，导致血糖水平下降。因此，从7.1降到4.9是可能的。如果您对测试结果有疑问，可以考虑进行复查。抽血检查更准确一些，可以向医生咨询并进行进一步的检查。医生可以根据您的具体情况和症状来评估您的血糖水平是否正常。

问：我的高血压应该是属于第二期，发现的比较早，就是平时有点头晕，当然生活中情绪也不应该太过激动，不能生气，饮食清淡，这些我都做到了，现在想要寻求一下更好的降低血压的方法。

答：高血压患者应该注意饮食，遵守低盐、低脂、低热量的原则，并注意饮食结构的合理搭配；饮食不宜过饱、过快；最好忌不良嗜好，如烟、酒等。此外，适当控制食盐的摄入量，改变饮食“口重”的习惯也是预防高血压的重要措施。

问：朋友的工作环境是在长期的二手烟中，平时身体很好，最近老是剧烈的咳嗽，而且是那种呛咳，老是说自己胸闷，气短，呼吸困难，声音也哑了，去医院检查说是早期的肺癌。肺癌患者吃些什么会好一些？

答：肺癌患者在饮食方面应该注意均衡营养，增加免疫力。建议多摄入富含维生素和矿物质的食物，如新鲜蔬菜、水果、全谷类食物、豆类、鱼类等。同时，避免摄入过多的油腻食物、烟酒和刺激性食物，以免加重症状。此外，肺癌患者还可以适量摄入一些具有抗癌作用的食物，如绿茶、大蒜、洋葱、姜、蘑菇等。但需要注意的是，饮食调理只是辅助治疗，不能替代正规的医学治疗。一定要在医生的指导下进行饮食调理。

问：吃4种降压药低压还高咋办？不知道是什么原因的，近两年来血压一直高的，吃了很多的药也不起什么作用，只是能暂时缓解一下

答：你的情况可能是阳气引起的病症，解决心脑血管供血不足的问题可能是最好的降压方法。此外，辅助性地调节肠胃也是重要的。左侧支出现的问题可能是血和阳气的问题，即血瘀和阳气不足所致。根本问题是阳气弱，表现为血瘀，同时胃的功能也不足。祝你好运！

问：甲亢的发病原因都有哪些？最近容易焦虑、发抖、肌无力、好动吃的很多可是越来越瘦，去医院检查了说是甲亢，怎么会得上这种病呢？甲亢的发病原因都有哪些？

答：甲亢的发病原因有以下几种： 1. 感染所致，如感冒、肺炎、扁桃腺炎等。
2. 外伤所致，如车祸、摔伤等。 3. 精神刺激因素，如精神紧张、焦虑等。
4. 过度疲劳导致，如重体力劳动、工作劳累等。 5. 妊娠，怀孕早期可诱发或加重甲亢。 6. 碘摄入过多，如海产品食入过多。 7. 某类药物，如乙胺碘呋酮等。 甲亢会影响人体正常的循环，引起代谢过快，摄取的无法供应消耗的，就会出现饭量大，容易饿，消瘦症状，同时增加心脏负担就会引起心慌、胸闷等。甲亢还会导致眼压过高，导致眼睛突出的情况。如果甲亢患者久而不治，其危害是很严重的，可引发肝病、心血管病、糖尿病等。建议患者尽早就医治疗。

问：我有哮喘病二年多了，也有在吃药，可有时感觉好了就忘记吃药了，所以一直病情有反复，近些天老感觉到胸闷，有时跑几步路后就感觉气接不上来，气短，呼吸困难，想问一下医生，我这是哮喘引起的吗？还是别的什么病导致的？

答：这位患者的症状包括胸闷、气短和呼吸困难，这些症状确实与哮喘有关。然而，胸

闷、气短和呼吸困难也可能是其他疾病的症状，如心脏病、肺部疾病或神经心理因素。因此，建议他去医院做进一步的检查，以确定病因，并根据检查结果进行治疗。

问：约10天前，老人久坐起来突然感觉腰有些疼，一直没好，最近不能弯腰，疼得比较厉害。拍了片子并开了药，医生说片子没有什么问题，但就是疼。：

答：你所说的这种情况最常见的是腰部肌肉的不适，可能是因为受凉或劳累引起的。医生检查片子后没有发现明显问题，所以疼痛可能是由于肌肉的紧张或炎症引起的。治疗的同时，建议多休息，避免受凉、熬夜和劳累等，保持饮食和生活的规律，调整好心态，适当进行一些活动，耐心地进行，逐渐改善，促进恢复正常。

问：上个月去医院检查，说我精子成活率低，想问问具体原因有哪些，能不能治好？不孕不育可以怎知呢精子成活率低可以怎么治呢

答：精子成活率低的原因有很多，包括精子数量不足、精子活力不足、精子形态异常、附睾、精囊及前列腺有炎症等。治疗方法包括药物治疗、手术治疗、辅助生殖技术等，具体治疗方法需要根据具体情况而定。

问：你好，请问大夫，我本人身体很瘦，很健康，有时感到头胀，试血压高压170/180,低压110，时间快2年了，吃降压药，效果不是很好，想查明病因，需要去医院做哪些检查，。

答：用户描述了自己的身体状况和血压情况，希望了解需要做哪些检查来查明病因。用户已经在服用降压药，但效果不是很好。建议用户到医院进行详细检查，以确定高血压的病因。医生可能会建议用户进行血常规、尿常规、心电图、超声心动图等检查，以确定高血压的病因。同时，用户需要注意饮食和生活习惯，避免情绪激动，戒烟戒酒，多吃芹菜等降压食物。

问：老年人高血压，经常吃什么都觉得不合适，吃一点油腻的东西都会引起高血压上升的。想知道吃什么对减低高血压比较有帮助，或者如何治疗高血压

答：老年人高血压需要注意饮食清淡易消化，低盐，多吃蔬菜水果，不宜油腻，可以养成喝绿茶的习惯，适当运动。这些措施有助于减低高血压，保持健康。

问：我总是感觉头晕、头痛、有时候站着再蹲下的时候就会有眩晕的感觉、蹲着或者坐着久了再起来就会有眩晕恶心的感觉、后来听同事们说这可能是低血压的症状可是还有的说是高血压也是这个症状。请问高血压和低血压有什么区别呢？

答：低血压和高血压都会引起头晕、头痛等症状，但是两者的原因和表现不同。低血压的症状包括头晕、头痛、食欲不振、疲劳、脸色苍白、消化不良、晕车船等，严重症状包括直立性眩晕、四肢冷、心悸、呼吸困难、共济失调、发音含糊、甚至昏厥、需长期卧床。这些症状主要因血压下降、导致血液循环缓慢、远端毛细血管缺血、以致影响组织细胞氧气和营养的供应、二氧化碳及代谢废物的排泄。而高血压的症状包括头痛、头晕、耳鸣、视力模糊、心悸、胸闷、气短、手脚发麻、失眠等，严重时可引起心脏、脑血管等并发症。高血压的症状主要是由于血压过高，导致心脏和血管负担过重，引起的一系列症状。因此，如果您出现头晕、头痛等症状，建议及时就医，进行相关检查，以明确病因并进行治疗。

问：胸闷气短的状况已经持续很长时间了，有三四个月，时轻时重，越到晚上越明显，平躺比站着舒服点，查过胸透和心电，没有毛病，最近两天头皮发麻，有点头重脚轻的感觉，失眠健忘也很厉害。越失眠越胸闷气短，感觉要憋死了。

答：根据病人的症状描述，建议病人去医院做进一步的检查，如肺功能检查、心脏彩超等，以确定病因。同时，建议病人注意休息，保持良好的心态，避免情绪波动，可以尝试一些放松身心的方法，如瑜伽、冥想等。中药调理也可以作为辅助治疗，但需要在医生的指导下进行。

问：医生，我大哥今年39岁，他有前列腺炎，而且经常语言上洗手间，尿频让他很头疼，去哪都不方便，唉，所以我想帮他问问，前列腺炎尿频食疗方法是什么？

答：前列腺炎患者可以多喝热水，注意腹部保暖，饮食上不要吃辛辣刺激性的食物，最好不要喝酒，心情避免太压抑，也不要紧张，这些可以缓解尿频的症状，但是要想治愈还需要药物治疗。

问：我患有高血压的毛病已经有好几年了，最近一段时间的时候总是感觉有些头晕恶心，特别的难受我，想了解一下高血压头晕恶心怎么办？

答：高血压患者出现头晕恶心的情况可能是由于血压过高导致的，应该就医进行合理的用药，根据实际的反应进行调整，直至达到最佳的效果。同时，饮食上应该注意营养均衡，清淡宜消化，避免生冷油腻辛辣等，生活中劳逸结合，避免烟酒熬夜劳累受凉，保持良好积极的心态，从各方面来保持身体的平衡。如果症状严重，应该及时就医。

问：本人最近总感觉我的身体非常的不舒服，而且最近的精神状态也非常的不好，我能看到我的脸色有点变黄色了，而且我也觉得我的脖子附近都一点肿大，令我非常的难受的感觉。请问甲状腺疾病的症状有哪一些呢？

答：甲状腺疾病的症状主要包括高代谢症候群、高兴奋症状和眼部症状。高代谢症候群表现为心慌、心动过速、怕热、多汗、食欲亢进、消瘦、体重下降、疲乏无力。高兴奋症状包括情绪易激动、性情急躁、失眠、思想不集中。眼部症状则表现为眼球突出。此外，甲状腺疾病还可能导致手舌颤抖、甲状腺肿或肿大、女性月经失调甚至闭经，男性阳痿或乳房发育等症状。如果您有这些症状，建议您尽快就医进行进一步检查和诊断。祝您健康！

问：医生你好，怎么看自己是肾阴虚还是肾阳虚，不能确定自己的情况，望医生能解答，不知是属于肝肾阴虚还是肝肾阳虚。所以不敢用药。请您详细给我解答好吗？谢谢！
肝肾阴虚和阳虚的区别

答：肾阴虚和肾阳虚是中医学中的概念，用来描述肾脏功能失调的不同表现。肾阴虚是指阴液亏损，常表现为脸发红、手足心热、腰膝酸软、头晕耳鸣、口干舌燥、皮肤瘙痒、便秘等症状。而肾阳虚则是指阳气缺损，常表现为怕冷、四肢冰冷、面色苍白、腰膝酸软、腹泻、闭经、不孕等症状。肾阴虚和肾阳虚的治疗方法也不同，肾阴虚的治疗应用滋阴补肾的药物，如石斛、玉竹、山茱萸、枸杞子、西洋参等。而肾阳虚的治疗则应用温阳补肾的药物，如附子、肉桂、鹿茸等。常用的方剂有六味地黄丸、知柏地黄丸、杞菊地黄丸和金匮肾气丸等。希望这些信息对您有帮助，祝您健康！

问：最近不知道怎么回事，发现自己竟然有一些血压高的情况，感到非常的奇怪，想知道日常生活中出现血压高的情况应该怎么办？

答：如果出现血压高的情况，首先需要注意饮食，多吃一些清淡的食物，因为这些食物可以起到降低血压的效果，同时也要避免食用高胆固醇的食物，以免血压升高。此外，平时生活中需要坚持锻炼身体，保持良好的身体素质和免疫力，同时也能够起到一定的降血压的效果。此外，每天要控制好自己的睡眠，保证充足的睡眠时间，同时保持良好的精神状态也很重要。

问：血压原来高压120多低压70--80可是最近一个星期都是高压107--110低压55--69，其中一次高压95低压60而且最近一直头晕到想吐，这是什么问题呢？要怎么处理

答：根据您提供的血压数据和症状，您的血压偏低，可能是由于身体疲劳、营养不足等原因引起的。建议您注意休息，保证充足的睡眠时间，适当增加营养摄入，多吃一些富含维生素和矿物质的食物，如新鲜蔬菜、水果、全谷类食物等。如果症状持续存在或加重，建议您咨询医生进行进一步的检查和诊断。

问：奶奶年龄很大了，最近发现奶奶身上出现了很多白斑，我们都不知道是什么引起的。奶奶平时的饮食很有规律，我们都很担心奶奶的身体，想问如何治疗老年人白斑？

答：白斑可能是白癜风，是一种常见的自身免疫性疾病，治疗起来比较困难。如果不是很严重的话，可以使用适当的外用药物进行控制。平时要注意保持卫生。

问：你好，请问一下，老年性耳鸣吃什么药，如何治疗？效果比较好的，推荐一下

答：老年性耳鸣一般可以考虑使用耳聋左慈丸进行治疗。这种药物适用于肝肾阴虚，耳鸣耳聋，头晕目眩的症状。口服，每次8丸，一天服用3次。除了药物治疗，还应注意饮食宜清淡，忌辛辣、生冷、油腻食物，戒烟忌酒，注意休息，不要熬夜，合理安排生活作息时间。如果服药3天后症状没有缓解，建议去医院就诊。祝您早日康复。

问：我大妈以前的时候身体都还好的，就是最近几年的一次晕倒头部出血，她被送去了医院检查出高血压的，后来他为此在吃饭的时候就吃的少了。她变得瘦了。经常去医院检查，最近查出高血压肾炎。她很痛心。想得到怎样的帮助:高血压肾炎怎么治好？

答：高血压肾病需要控制高血压的同时治疗肾脏，两者缺一不可。药物选择方面，可以减少肾素释放或能抑制血管紧张素转换酶，或能扩张肾动脉，改善肾脏供血供氧的药物，以及减少血容量的药物。现代中药可以恢复相当一部分肾脏功能，如果是早期的病人肾功能损伤不十分严重的话完全可以恢复到正常去。用现代中药以抗炎，抗变态反应，抗肾小球变性纤维化，对抗肾小球的增生和渗出。促进纤维蛋白溶解，减少血小板凝聚，增加肾小球的滤过率，改善肾小球毛细血管的通透性，促使肾功能的恢复，增加自身的抗病能力以达到康复。建议到专业的肾病医院看看，在医生的建议下选择适合的方法进行治疗。

问：我尿频。刚尿完又有尿意。吃药几个月没有明显好转。做过尿常规检查，彩超都没有发现异常。我想知道我到底是什么情况该吃什么药。

答：尿频是一种常见的泌尿系统疾病，常见的原因包括尿道感染、膀胱炎、前列腺炎等。建议患者进一步检查以确定病因。同时，多喝水、勤小便、注意个人卫生也是很重要。

的。对于尿道感染等病因，可以口服三金片、阿莫西林分散片等药物治疗。但是需要注意的是，药物治疗需要在医生的指导下进行。

问：我这几天觉得下腹疼痛、坠胀，而且尿频、尿急，上完厕所后有白色的东西流出。我到医院去体检，查出了患有慢性的前列腺炎，我想咨询一下这种慢性的前列腺炎是可以治疗好的吗？

答：慢性前列腺炎是可以治疗好的，但关键在于持之以恒的治疗。按照医生的建议，每周进行一次前列腺按摩，连续进行4到8次可以作为一次疗程。此外，还有其他的治疗选择，包括药物治疗。目前市场上有多种中西药物可以用于治疗慢性前列腺炎，但是需要跟随医生的指导使用。此外，一些生活方式的改变和自我护理措施也可以帮助缓解症状和改善病情。记得定期复诊，向医生汇报病情的改善情况，以便进行调整和进一步治疗。

问：我小便疼，已经有一年了，有发热的感觉，看过不少大夫，吃了不少药总不见好，也吃过中药，大夫有的说是前列腺炎，也有的说尿道炎，尿常规和前列腺液都是3个加号，比超也没什么事，问问我是什么病啊

答：根据您的描述，您已经有一年的小便疼痛和发热感，已经看过多位医生，吃了不少药也没有好转。尿常规和前列腺液检查结果都是三个加号，但没有说明是白细胞还是红细胞。根据这些信息，可以初步判断您可能患有慢性炎症。建议您进一步进行检查，以确定具体的病因。您可以咨询医生进行详细的检查和诊断，以便制定合适的治疗方案。

问：已经有三天了，小便疼痛，每天喝的水不少，每次一小便就会疼，尿液发黄，还有难闻的味道，吃了几天的消炎药物可没有太大的改善，现在都不敢小便了，在尿道口的位置还红肿，感觉是尿道感染可不太确定没敢盲目治疗。尿道感染的症状是什么呢？

答：尿路感染的症状比较广泛，包括尿频、尿急、尿痛、排尿不适等症状。急性期炎症患者往往有明显的尿路刺激征；但在老年人、小儿及慢性尿路感染患者，则通常尿路刺激症状较轻，如轻度的尿频，或尿急，或排尿不适等。尿液发黄，有难闻的味道，尿道口的位置还红肿，这些都是尿路感染的症状。建议及时就医，避免盲目治疗。

问：痛风有十多年的时间了，虽然病情一直都控制着，但因为时间长，现在行动都不是很方便，而且关节总是时不时疼痛，前几天去医院又检查了一次，尿酸还是过高，我的痛风已十多年尿酸值800多怎么办？

答：痛风是一种由于尿酸代谢异常引起的疾病，主要表现为关节疼痛和炎症。尿酸水平过高可能会导致痛风发作。根据您的描述，您已经有十多年的痛风史，尿酸值一直很高，且行动不便，关节疼痛频繁发作。您已经去医院检查过一次，但尿酸仍然过高。建议您采取以下措施来处理这种情况：

1. 进行系统治疗：您可以咨询医生，了解适合您的痛风治疗方案。可能需要使用药物来降低尿酸水平，减少关节疼痛和炎症的发作。
2. 调整生活方式：除了药物治疗，您还可以通过改变生活方式来控制痛风。避免食用高嘌呤食物，如海鲜、肉类和动物内脏。戒烟戒酒，保持适当的体重，避免过度劳累和情绪激动。
3. 定期复诊：定期复诊可以帮助您监测尿酸水平和病情的变化，及时调整治疗方案。

请您咨询医生，根据您的具体情况制定适合您的治疗方案。同时，注意保持良好的生活习惯和饮食习惯，有助于控制痛风的发作和减轻症状。

问：朋友的父亲不幸患了肺癌，目前已经到了晚期，仍在积极的治疗中，我想咨询一下，肺癌晚期都有什么症状呢？家属应该怎样护理才能较好的照顾好病人呢？需要注意些什么呢？肺癌晚期有什么症状以及怎样护理

答：肺癌晚期的症状包括呼吸急促、咳嗽咳痰、胸痛、疲劳、食欲不振和体重下降等。家属应该提供情感支持，管理疼痛和其他症状，确保适当的营养，保持良好的卫生以预防感染。

问：对于我的身体上面的痛风的治疗的话我要最终以什么为目的的进行治疗呢才能够减轻我的痛风所带来的哪些痛苦的表现呢痛风最终要以什么为目的的治疗呢

答：痛风的治疗目的是减轻痛风所带来的疼痛和炎症等症状，同时降低尿酸水平，预防痛风的复发。目前治疗痛风的原则是以清热利湿、活血通络为法，促进尿酸的排泄。此外，食用东北雌性红萝卜也对治疗痛风有帮助。

问：高血压我今天测了下血压，高压138，低压？我今天测了下血压，高压138，低压78.好像高压有点高了！那我该怎么调整啊？饮食方面要注意什么啊？

答：这位用户的血压属于轻度升高，但仍在正常范围内。建议用户注意休息，避免劳累，低盐低脂饮食，适当运动，控制体重，定期检查血压情况。如果用户平时血压较高或有其他症状，建议及时就医。

问：我患十年高血压，但现在高压正常，低压老在85至100左右，可能有血栓形成，一般在附近的药店应买哪些具经济又有效的药

答：你好，根据你的描述，你的低压最高达100mmHg，属于高血压二级，是中度高血压，比较严重。建议你使用贝那普利或者厄贝沙坦等药物进行降压，将低压控制在90mmHg以下。此外，平时要少吃咸的食物，多吃蔬菜水果。预防血栓的话，可以长期服用阿司匹林。请注意，药物的选择和用量应该在医生的指导下进行。

问：十年前体检时发现二型糖尿病，多年来一直用二甲双胍等口服药控制，并控制饮食和游泳锻炼，空腹血糖一般在7左右，餐后血糖在12左右。前一个月，在医院抽静脉血进行一次血中胰岛素分泌情况的检验，结果是：空腹、餐后半小时、餐后一小时及餐后二小时血中胰岛素含量水平都在正常范围内，血糖为啥降不下来？应如何治疗才好？谢谢。

答：根据您的描述，您已经多年来通过口服药物、饮食控制和锻炼来控制血糖，但最近一次检查发现血糖仍然较高。血糖无法降下来的原因可能有几个方面。首先，您可能需要调整药物的剂量或尝试其他药物来更好地控制血糖。建议您咨询医生，根据您的具体情况进行调整。其次，饮食和锻炼的控制也非常重要。您可以咨询专业的营养师和教练，制定适合您的饮食和锻炼计划。最后，如果血糖仍然无法得到有效控制，可能存在其他的健康问题或并发症。建议您咨询医生，进行全面的检查和评估，以确定是否存在其他问题，并制定相应的治疗计划。祝您早日恢复健康！

问：最近食欲下降了，有什么一点力气都没有，医生说我有肝硬化。但是以前我一点反应也没有啊。一般老年肝硬化的早期症状是什么样的？

答：肝硬化是一种慢性肝病，早期症状可以包括疲劳、乏力、恶心、腹部胀气、上腹不适和食欲减退等。肝不好的人应该注意饮食，选择容易消化的食物，保持规律的饮食和

休息。此外，适当喝粥可以起到暖胃的作用。

问：腹部胀气，吃东西似顶着吞咽困难，时常嗝气。做过胃镜，肝胆胰脾肾及胸透均未见异常，但上述症状依然存在。如何治疗，如何预防。注意哪些方面？

答：根据您的症状描述，可能是消化不良引起的，建议改善饮食习惯，避免辛辣刺激食物，多吃蔬菜水果，避免暴饮暴食，作息规律，可以适当服用健胃消食片等药物缓解症状。

问：我这段时间总感觉身体不适并且常有恶心、呕吐、头晕、胸闷、胸痛等症状发生，主要还是食欲也明显的下降，睡眠也不是很好，去医院检查说是得了结肠癌了，不知道怎样才能彻底治愈呢。结肠癌化疗期间会出现哪些症状？

答：化疗是结肠癌的首选治疗方法，但是化疗会杀伤正常细胞，抑制骨髓造血，导致一些不良反应，如恶心、呕吐、脱发、感染、出血等症状。不过，目前中医治疗结肠癌的效果也很显著。中医中药能够提高机体的免疫力，缓解化疗的毒副作用。因此，在化疗期间，可以考虑结合中医治疗，以提高治疗效果和缓解不良反应。具体的治疗方案需要根据个体情况来确定，建议咨询专业的中医医生。

问：如何区分细菌性前列腺炎和非细菌性前列腺炎？请讲解的详细些包括平时症状的不同到医院做那些检查根据那些检查标准看出是什么类型？对应的病症应该怎么治疗？

答：细菌性前列腺炎和非细菌性前列腺炎的区分主要是通过症状和检查来确定。细菌性前列腺炎通常有复发性尿路感染的病史，而非细菌性前列腺炎和前列腺痛的常见病因是前列腺内尿液返流引起的化学性前列腺炎和盆底肌肉痉挛所致的盆腔疼痛综合征。对于细菌性前列腺炎，可以通过从尿道、膀胱和前列腺取样进行定位细菌性培养来确诊。如果前列腺液细菌计数远远超过尿道和膀胱尿样，即可确诊为细菌性前列腺炎。治疗方面，细菌性前列腺炎可以使用抗生素治疗，而非细菌性前列腺炎可以采用 α 受体阻滞剂治疗，疼痛症状较重者可配合使用消炎镇痛剂。对于盆底肌肉痉挛性疼痛，可以使用镇静剂安定来缓解疼痛症状。前列腺按摩只适用于因性生活减少造成的前列腺液淤积者。热水坐浴也可以缓解疼痛症状。

问：我家里有直肠癌的家族史家里有几个老人都得过直肠癌所以我也中标了去年去医院做肠镜检查到得了直肠癌并做了手术但我担心复发所以过来问问直肠癌手术后还会再长复发吗

答：直肠癌手术后仍有可能复发，因此需要及时采取措施预防复发。中药可以巩固疗效，药力直达病灶，活血化瘀，清热解毒，软坚散结，彻底清除肉眼看不到的残余癌细胞，预防复发扩散，减轻症状和痛苦，提高生存质量。

问：我最近几年因为看A片所以常手淫，我也不知道手淫到底好不好，最近想和女友发生关系的时候，发现因为不硬而进不去，所以我想问下如何减少手淫次数？怎样在不去医院的情况下简单的抑止阳萎，可以通过做运动之类来恢复吗？

答：手淫是一种正常现象，但过度手淫可能会对身体健康产生一些负面影响，如前列腺炎、阳痿、早泄等。因此，减少手淫的次数是有益的。可以通过一些方法来抑制手淫的欲望，例如将注意力转移到工作和学习上，增加体育锻炼等。

问：本人男35岁一年前检查出血压高医生建议我控制营养并检查是原发性还是继发性这一年多基本未吃药这段时间血压最高时高压170低压110吃了珍菊降压片低压110高压130头还是有点晕太阳穴发胀。继续吃药还是检查高血压发病原因都检查什么项目？

答：建议您继续服药，同时进行检查以排除继发性高血压。推荐两种及以上药物联合治疗，建议戒烟限酒、运动减重、平衡心态、合理膳食是治疗的基础，降血压的目标为140/90mmHg以下。在治疗的同时需要排除继发性高血压主要是做肾功能、尿常规、肾脏B超等。

问：尖锐湿疣又复发了，比之前的感觉还严重，但是还是长在之前的位置上面，这到底诱发女性感染尖锐湿疣的原因是什么？诱发女性感染尖锐湿疣的原因是什么？

答：尖锐湿疣的复发可能与免疫系统功能减弱有关。免疫力低下的个体，如肾移植、恶性肿瘤、糖尿病、艾滋病、免疫抑制性化疗和应用糖皮质激素等病人，尖锐湿疣的发病率及复发率均显著增加，且疣体体积也较大。

问：医生叫过个星期在去检查一次我上个月检查都是可以液化的但是到这个月检查就变成不液化了什么原因精子不液化的原因是什么

答：不液化的原因有多种可能性。精液的凝固是由精囊分泌的凝固蛋白所致，而液化是由前列腺分泌的一系列蛋白水解酶即液化因子的作用结果。当前列腺和精囊发生炎症或分泌功能紊乱时，会导致凝固因子增加或液化因子减少，从而造成精液不液化的情况。不液化的精液会导致精子活动能力减弱，进而影响受孕。这可能是导致女性不孕不育的原因之一。希望对你有所帮助，祝你好孕。

问：最近这半年来，我经常会觉得头晕恶心，四肢无力，心跳加快，呼吸急促，有时候眼前会突然看不见，天旋地转的，去医院检查，医生说是心脑血管供血不足。心脑血管供血不足症状有什么

答：心脑血管供血不足症状主要表现在以下方面：1) 头晕，特别是突感到眩晕。2) 肢体麻木，突然感到一侧脸部或手脚麻木，有的为舌麻、唇麻。3) 暂时的吐字不清或讲话不灵。4) 肢无力或活动不灵。5) 与平日不同的头痛。6) 突然原因不明的跌交或晕倒。7) 短暂的意识丧失或个性和智力的突然变化。8) 全身明显乏力，肢体软弱无力。9) 恶心呕吐或血压波动。10) 整天昏昏沉沉的欲睡——嗜睡状态。11) 脑供血不足患者一侧或某一肢体不自主地抽动。12) 患者突然但暂时出现的视物不清。建议先到医院做个心电图及脑血管图检查看，待明确诊断之后再考虑治疗方案。近期不要吃酸辣及刺激性食物、禁烟酒、保持心情舒畅及注意劳逸结合、适当运动等。

问：医生您好，我有一个同事，刚刚被查出患有前列腺结石，请问医生，前列腺结石的症状有哪些，好不好治疗，有什么好的治疗办法。请问前列腺结石的症状及治疗

答：前列腺结石常无症状，只有与其他病变并存时才会出现症状。如果与尿道狭窄及前列腺增生并存，可能会出现排尿困难、尿线无力、尿滴沥或尿频等症状。如果与前列腺炎并存，可能会出现腰骶部、阴囊、会阴、耻骨、腹部和肛门部不适或疼痛，排便时肛门痛增加，尿道口有分泌物，坐于硬物上会使会阴疼痛加剧。如果与后尿道炎及尿路感染并存，可能会出现尿频、尿急和尿痛，有时有血尿，尤其是终末血尿。前列腺结石的治

疗方法包括药物治疗和手术治疗，具体治疗方法需要根据患者的具体情况而定。建议患者及时就医，由专业医生进行诊断和治疗。

问：老年痴呆的前期症状？医生你好，我最近一段时间也不知道是怎么了，经常的会忘记很多的事情，有的时候甚至连很熟悉的人的名字都不记得了，去检查医生说我得老年痴呆症了，我想问问医生老年痴呆症的治疗方法是什么？怎样治疗老年痴呆比较好？。不清楚

答：老年痴呆症的早期症状以遗忘为主，如好忘事、遗失物品、迷路走失等。老年痴呆症的治疗方法包括药物治疗和非药物治疗。药物治疗主要是通过调节脑内神经递质的水平来改善症状，如乙酰胆碱酯酶抑制剂等。非药物治疗包括认知训练、物理治疗、音乐疗法等，这些治疗方法可以帮助患者保持独立生活能力和提高生活质量。

问：，孩子好像没怎么长高，也没怎么长重，吃东西吃的特别的少。有时候还会不停的咳嗽。我给她吃了一些消化药，可是效果不好。上医院看了，医生做了检查，说应该是肺气肿。。肺气肿有哪些分类？

答：肺气肿可以分为以下几种分类：老年性肺气肿、代偿性肺气肿、间质性肺气肿、灶性肺气肿、旁间隔性肺气肿和阻塞性肺气肿。

问：血尿酸增高引起的痛风，需要长期吃降血尿酸的药吗？。想得到治疗方案，以及需要吃多长时间的药，如果血尿酸正常，还需要吃药吗？

答：长期吃降血尿酸的药物会对肝肾功能造成损害，因此不能长期使用。如果血尿酸恢复正常，可以停止药物治疗。然而，关键在于平时的预防措施。保持足够的水分摄入量，避免食用高嘌呤食物，如动物内脏和海产品，保持低脂饮食并控制体重都是重要的预防措施。

问：从前天就感觉到自己小便很多，昨天晚上一直尿痛，尿不尽的，做了检查，说我患有前列腺炎，该怎么治疗？

答：前列腺炎是一种常见的男性疾病，症状包括尿急、尿频、尿痛等。治疗方面，可以采用西药加输液的方式，同时注意多喝水勤排尿，不要久坐，尽量减少手淫，节制性生活，少烟酒等，这些措施可以帮助缓解症状，促进康复。

问：我的糖尿病已经有两年了不过今年的病情很稳定一直都药物控制没有犯过病去医院做检查医生说病情稳定不知道是不是可以减少药量换其他办法控制呢？。糖尿病药物控制好后可以减少药量吗？

答：您好！一旦糖尿病达到血糖控制的目标，您可以开始进行长期有规律的治疗。治疗方式包括心理治疗、饮食治疗、运动治疗、口服降糖药和注射胰岛素治疗。此外，加强糖尿病知识宣教也非常重要。注意，饮食治疗是糖尿病治疗的基础，而运动有助于血糖的利用，改善胰岛素敏感性和提高生活质量。然而，当饮食和运动不能使血糖达到满意的控制时，您应该考虑使用药物治疗。因此，您应该与医生讨论您目前的病情和是否可以减少药量或尝试其他方法来控制糖尿病。只有专业医生才能根据您的具体情况做出正确的决策。