量 子 场 论

第 1 章　预备知识

1.6 节和 1.7 节

余钊焕

中山大学物理学院

https://yzhxxzxy.github.io

更新日期：2025 年 12 月 6 日

1.6 节 作用量原理 1.6.1 小节 经典力学中的作用量原理

- 在经典力学中，质点力学系统可以用拉格朗日量 (Lagrangian) 描述，它是系统的动能与势能之差
- 对于具有 n 个自由度的系统，可以定义 n 个相互独立的广义坐标 (generalized coordinate) q_i，它们对时间的导数是广义速度 (generalized velocity) $\dot{q}_i = \dfrac{\mathrm{d}q_i}{\mathrm{d}t}$
- 将拉格朗日量表达为广义坐标和广义速度的函数 $L(q_i, \dot{q}_i)$
- 系统的作用量定义为 $S = \displaystyle\int_{t_1}^{t_2} \mathrm{d}t\, L[q_i(t), \dot{q}_i(t)]$

Joseph-Louis Lagrange (1736–1813)

1.6 节 作用量原理 1.6.1 小节 经典力学中的作用量原理

在经典力学中，质点力学系统可以用拉格朗日量 (Lagrangian) 描述，它是系统的动能与势能之差

Joseph-Louis Lagrange (1736–1813)

对于具有 n 个自由度的系统，可以定义 n 个相互独立的广义坐标 (generalized coordinate) q_i，它们对时间的导数是广义速度 (generalized velocity) $\dot{q}_i = \dfrac{\mathrm{d}q_i}{\mathrm{d}t}$

将拉格朗日量表达为广义坐标和广义速度的函数 $L(q_i, \dot{q}_i)$

系统的作用量定义为 $S = \displaystyle\int_{t_1}^{t_2} \mathrm{d}t\, L[q_i(t), \dot{q}_i(t)]$

假设系统在 t_1 和 t_2 时刻的广义坐标分别是 $q_i(t_1)$ 和 $q_i(t_2)$，在 t_1 与 t_2 之间存在着无穷多条可能的运动轨迹 $q_i(t)$，那么哪条轨迹才对应于经典力学中的真实运动呢?

作用量原理指出，

系统的经典运动轨迹应使作用量变分为零 ($\delta S = 0$)

变分

对一条运动轨迹 $q_i(t)$ 作微小的改变，得到 $\tilde{q}_i(t)$，则相应的变分 (variation) 是

$$\delta q_i(t) = \tilde{q}_i(t) - q_i(t)$$

类似地，可对这条轨迹的广义速度 $\dot{q}_i(t)$ 作变分 $\delta\dot{q}_i(t)$

由于拉格朗日量 L 是 $q_i(t)$ 和 $\dot{q}_i(t)$ 的函数，$q_i(t)$ 和 $\dot{q}_i(t)$ 的变分会引起 L 的变分 δL，进而导致作用量 S 的变分 δS

对变分的严格处理需要用到泛函理论，在这里我们只需要知道变分的运算法则类似于微分的运算法则，给出

$$\delta L[q_i(t), \dot{q}_i(t)] = \frac{\partial L}{\partial q_i}\,\delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\,\delta\dot{q}_i$$

变分

对一条运动轨迹 $q_i(t)$ 作微小的改变，得到 $\tilde{q}_i(t)$，则相应的变分 (variation) 是

$$\delta q_i(t) = \tilde{q}_i(t) - q_i(t)$$

类似地，可对这条轨迹的广义速度 $\dot{q}_i(t)$ 作变分 $\delta \dot{q}_i(t)$

由于拉格朗日量 L 是 $q_i(t)$ 和 $\dot{q}_i(t)$ 的函数，$q_i(t)$ 和 $\dot{q}_i(t)$ 的变分会引起 L 的变分 δL，进而导致作用量 S 的变分 δS

对变分的严格处理需要用到泛函理论，在这里我们只需要知道变分的运算法则类似于微分的运算法则，给出

$$\delta L[q_i(t), \dot{q}_i(t)] = \frac{\partial L}{\partial q_i}\,\delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\,\delta \dot{q}_i$$

在讨论作用量原理时，我们不作时间坐标的变换，故时间的变分 $\delta t = 0$，于是

$$\delta \dot{q}_i = \delta\,\frac{\mathrm{d}q_i}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\,\delta q_i$$

也就是说，时间导数的变分等于变分的时间导数

Euler-Lagrange 方程

广义坐标和广义速度的变分 δq_i 和 $\delta \dot{q}_i$ 导致的作用量变分为

$$
\begin{aligned}
\delta S &= \int_{t_1}^{t_2} \mathrm{d}t\, \delta L[q_i(t), \dot{q}_i(t)] = \int_{t_1}^{t_2} \mathrm{d}t \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i \right) \\
&= \int_{t_1}^{t_2} \mathrm{d}t \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \delta q_i \right) \\
\text{分部积分} &= \int_{t_1}^{t_2} \mathrm{d}t \left[\frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta q_i \right) - \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \delta q_i \right] \\
&= \int_{t_1}^{t_2} \mathrm{d}t \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta q_i \Big|_{t_1}^{t_2}
\end{aligned}
$$

Euler-Lagrange 方程

- 广义坐标和广义速度的变分 δq_i 和 $\delta \dot{q}_i$ 导致的作用量变分为

$$
\begin{aligned}
\delta S &= \int_{t_1}^{t_2} \mathrm{d}t\, \delta L[q_i(t), \dot{q}_i(t)] = \int_{t_1}^{t_2} \mathrm{d}t \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i \right) \\
&= \int_{t_1}^{t_2} \mathrm{d}t \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \delta q_i \right) \\
\text{分部积分} &= \int_{t_1}^{t_2} \mathrm{d}t \left[\frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta q_i \right) - \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \delta q_i \right] \\
&= \int_{t_1}^{t_2} \mathrm{d}t \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta q_i \Big|_{t_1}^{t_2}
\end{aligned}
$$

Leonhard Euler
(1707–1783)

- t_1 和 t_2 时刻的广义坐标是固定的，其变分为零，即 $\delta q_i(t_1) = \delta q_i(t_2) = 0$
- 则最后一行第二项为零，由于变分 $\delta q_i(t)$ $(t_1 < t < t_2)$ 是任意的，$\delta S = 0$ 等价于

$$
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad i = 1, \cdots, n
$$

- 这是 Euler-Lagrange 方程，它给出质点系统的经典运动方程

广义动量和哈密顿量

引入**广义动量** (generalized momentum)

$$p_i \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}, \quad i = 1, \cdots, n$$

求解上式表示的 n 个方程，将**广义速度**表达成 q_i 和 p_i 的函数 $\dot{q}_i(q_i, p_i)$，通过 **Legendre 变换**定义**哈密顿量** (Hamiltonian)

$$H(q_i, p_i) \equiv p_i \dot{q}_i - L$$

Adrien-Marie Legendre (1752–1833)

William Rowan Hamilton (1805–1865)

广义动量和哈密顿量

- 引入**广义动量** (generalized momentum)

$$p_i \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}, \quad i = 1, \cdots, n$$

- 求解上式表示的 n 个方程，将**广义速度**表达成 q_i 和 p_i 的函数 $\dot{q}_i(q_i, p_i)$，通过 **Legendre 变换**定义**哈密顿量** (Hamiltonian)

$$H(q_i, p_i) \equiv p_i \dot{q}_i - L$$

- 并将 H 表达为 q_i 和 p_i 的函数
- 这样定义的 H 基本上是系统的**总能量**，即**动能与势能之和**
- 用 H 取替 L 来表达作用量 S，则**作用量的变分**为

$$\begin{aligned}\delta S &= \int_{t_1}^{t_2} \mathrm{d}t\, \delta L = \int_{t_1}^{t_2} \mathrm{d}t\, \delta(p_i \dot{q}_i - H) \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \mathrm{d}t \left(\dot{q}_i \delta p_i + p_i \delta \dot{q}_i - \frac{\partial H}{\partial q_i} \delta q_i - \frac{\partial H}{\partial p_i} \delta p_i \right)\end{aligned}$$

Adrien-Marie Legendre (1752–1833)

William Rowan Hamilton (1805–1865)

Hamilton 正则运动方程

由 $p_i\delta\dot{q}_i = p_i\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\delta q_i = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(p_i\delta q_i) - \dot{p}_i\delta q_i$ 得

$$\begin{aligned}\delta S &= \int_{t_1}^{t_2}\mathrm{d}t\left[\dot{q}_i\delta p_i + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(p_i\delta q_i) - \dot{p}_i\delta q_i - \frac{\partial H}{\partial q_i}\delta q_i - \frac{\partial H}{\partial p_i}\delta p_i\right]\\ &= \int_{t_1}^{t_2}\mathrm{d}t\left[\left(\dot{q}_i - \frac{\partial H}{\partial p_i}\right)\delta p_i - \left(\dot{p}_i + \frac{\partial H}{\partial q_i}\right)\delta q_i\right] + p_i\delta q_i\Big|_{t_1}^{t_2}\end{aligned}$$

由于 $\delta q_i(t_1) = \delta q_i(t_2) = 0$，上式第二步最后一项为零

Hamilton 正则运动方程

由 $p_i\delta\dot{q}_i = p_i\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\delta q_i = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(p_i\delta q_i) - \dot{p}_i\delta q_i$ 得

$$\begin{aligned}\delta S &= \int_{t_1}^{t_2}\mathrm{d}t\left[\dot{q}_i\delta p_i + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(p_i\delta q_i) - \dot{p}_i\delta q_i - \frac{\partial H}{\partial q_i}\delta q_i - \frac{\partial H}{\partial p_i}\delta p_i\right]\\ &= \int_{t_1}^{t_2}\mathrm{d}t\left[\left(\dot{q}_i - \frac{\partial H}{\partial p_i}\right)\delta p_i - \left(\dot{p}_i + \frac{\partial H}{\partial q_i}\right)\delta q_i\right] + p_i\delta q_i\Big|_{t_1}^{t_2}\end{aligned}$$

由于 $\delta q_i(t_1) = \delta q_i(t_2) = 0$，上式第二步最后一项为零

于是 $\delta S = 0$ 给出

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}, \quad i = 1, \cdots, n$$

这是 **Hamilton 正则运动方程**

相当于用 **$2n$ 个一阶方程**代替 **n 个二阶 Euler-Lagrange 方程** $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\dfrac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \dfrac{\partial L}{\partial q_i} = 0$

广义坐标 q_i 和**广义动量** p_i 统称为**正则变量**

1.6.2 小节　经典场论中的作用量原理

- 场是时空坐标 x^μ 的函数
- 在经典场论中，场 $\Phi(\mathbf{x}, t)$ 是系统的广义坐标，每一个空间点 $\mathbf{x}$ 都是一个自由度
- 因此场论相当于具有无穷多个连续自由度的质点力学
- 在局域 (local) 场论中，拉格朗日量表达为 $L(t) = \int \mathrm{d}^3x\, \mathcal{L}(x)$
- 其中 $\mathcal{L}(x)$ 是拉格朗日量密度，在下文中将 $\mathcal{L}(x)$ 简称为拉氏量
- 这里的“局域”指 $\mathcal{L}(x)$ 只依赖于一个时空点 x^μ，没有再依赖于其它时空点

1.6.2 小节　经典场论中的作用量原理

- 场是时空坐标 x^μ 的函数
- 在经典场论中，场 $\Phi(\mathbf{x},t)$ 是系统的广义坐标，每一个空间点 $\mathbf{x}$ 都是一个自由度
- 因此场论相当于具有无穷多个连续自由度的质点力学
- 在局域 (local) 场论中，拉格朗日量表达为 $L(t)=\int \mathrm{d}^3x\,\mathcal{L}(x)$
- 其中 $\mathcal{L}(x)$ 是拉格朗日量密度，在下文中将 $\mathcal{L}(x)$ 简称为拉氏量
- 这里的“局域”指 $\mathcal{L}(x)$ 只依赖于一个时空点 x^μ，没有再依赖于其它时空点
- 设 $\mathcal{L}$ 是系统中 n 个场 $\Phi_a(\mathbf{x},t)$ $(a=1,\cdots,n)$ 及其时空导数 $\partial_\mu\Phi_a$ 的函数
- 作用量表达为 $\boxed{S=\int \mathrm{d}t\,L=\int \mathrm{d}^4x\,\mathcal{L}(\Phi_a,\partial_\mu\Phi_a)}$
- 由于 d^4x 是 Lorentz 不变的，如果 $\mathcal{L}$ 也是 Lorentz 不变的，则 S 就是 Lorentz 不变量，从而由作用量原理得到的运动方程满足狭义相对性原理
- 因此，构建相对论性场论的关键在于要求拉氏量 $\mathcal{L}$ 是一个 Lorentz 标量

经典场论的作用量变分

- 类似于前面质点力学的处理方式，假设时空坐标的变分 $\delta x^\mu = 0$
- 即不作时空坐标的变换，那么对场的时空导数的变分等于场变分的时空导数，

$$\delta(\partial_\mu \Phi_a) = \partial_\mu(\delta \Phi_a)$$

- 于是，$\delta\Phi_a$ 和 $\delta(\partial_\mu \Phi_a)$ 导致的**作用量变分**为

$$\begin{aligned}
\delta S &= \int \mathrm{d}^4x\, \delta\mathcal{L} = \int \mathrm{d}^4x \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Phi_a}\delta\Phi_a + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_a)}\delta(\partial_\mu \Phi_a)\right] \\
&= \int \mathrm{d}^4x \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Phi_a}\delta\Phi_a + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_a)}\partial_\mu(\delta \Phi_a)\right] \\
&= \int \mathrm{d}^4x \left\{\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Phi_a}\delta\Phi_a + \partial_\mu\left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_a)}\delta\Phi_a\right] - \left[\partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_a)}\right]\delta\Phi_a\right\} \\
&= \int \mathrm{d}^4x \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Phi_a} - \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_a)}\right]\delta\Phi_a + \int \mathrm{d}^4x\, \partial_\mu\left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_a)}\delta\Phi_a\right]
\end{aligned}$$

- 上式最后一行第二项的被积函数是关于时空坐标的**全散度** (total divergence)

场的 Euler-Lagrange 方程

- 利用广义 Stokes 定理将上述全散度转化为边界面积分：

$$\int \mathrm{d}^4x\,\partial_\mu\left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)}\,\delta\Phi_a\right]=\int_{\mathcal{S}}\mathrm{d}\sigma_\mu\,\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)}\,\delta\Phi_a$$

- $\mathcal{S}$ 是积分区域 R 的边界面，$\mathrm{d}\sigma_\mu$ 是 $\mathcal{S}$ 上的定向面积元
- 进一步假设在边界面 $\mathcal{S}$ 上 $\delta\Phi_a=0$，则上式为零
- 我们通常讨论整个时空区域上的场，这里相当于假设 Φ_a 在无穷远时空边界上的变分为零
- 于是，由

$$\delta S=\int \mathrm{d}^4x\left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\Phi_a}-\partial_\mu\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)}\right]\delta\Phi_a=0$$

推出

$$\boxed{\partial_\mu\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)}-\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\Phi_a}=0,\quad a=1,\cdots,n}$$

- 这就是场的 Euler-Lagrange 方程，它给出场的经典运动方程

George Stokes
(1819–1903)

共轭动量密度

- 引入场的**共轭动量密度** (conjugate momentum density) $\boxed{\pi_a(\mathbf{x},t) \equiv \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\Phi}_a}}$
- π_a 也称为**正则共轭场**，接着用 Legendre 变换将**哈密顿量**定义为

$$H \equiv \int \mathrm{d}^3x\, \pi_a \dot{\Phi}_a - L \equiv \int \mathrm{d}^3x\, \mathcal{H}$$

- 其中 $\boxed{\mathcal{H}(\Phi_a, \pi_a, \nabla\Phi_a) = \pi_a\dot{\Phi}_a - \mathcal{L}}$ 是**哈密顿量密度**，**作用量变分**为

$$\begin{aligned}\delta S &= \int \mathrm{d}^4x\, \delta\mathcal{L} = \int \mathrm{d}^4x\, \delta(\pi_a\dot{\Phi}_a - \mathcal{H}) \\ &= \int \mathrm{d}^4x \left[\dot{\Phi}_a\delta\pi_a + \pi_a\delta\dot{\Phi}_a - \frac{\partial\mathcal{H}}{\partial\Phi_a}\delta\Phi_a - \frac{\partial\mathcal{H}}{\partial\pi_a}\delta\pi_a - \frac{\partial\mathcal{H}}{\partial(\nabla\Phi_a)}\cdot\delta(\nabla\Phi_a)\right]\end{aligned}$$

- 方括号中的第二项和最后一项分别化为

$$\pi_a\delta\dot{\Phi}_a = \pi_a\frac{\partial}{\partial t}\delta\Phi_a = \frac{\partial}{\partial t}(\pi_a\delta\Phi_a) - \dot{\pi}_a\delta\Phi_a,$$

$$-\frac{\partial\mathcal{H}}{\partial(\nabla\Phi_a)}\cdot\nabla(\delta\Phi_a) = -\nabla\cdot\left[\frac{\partial\mathcal{H}}{\partial(\nabla\Phi_a)}\delta\Phi_a\right] + \left[\nabla\cdot\frac{\partial\mathcal{H}}{\partial(\nabla\Phi_a)}\right]\delta\Phi_a$$

场的正则运动方程

- 从而得到

$$\delta S = \int \mathrm{d}^4x \left\{ \left(\dot{\Phi}_a - \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \pi_a} \right) \delta\pi_a - \left[\dot{\pi}_a + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \Phi_a} - \nabla \cdot \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial(\nabla \Phi_a)} \right] \delta\Phi_a \right\}$$
$$+ \int \mathrm{d}^4x \frac{\partial}{\partial t}(\pi_a \delta\Phi_a) - \int \mathrm{d}^4x \, \nabla \cdot \left[\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial(\nabla \Phi_a)} \delta\Phi_a \right]$$

- 与前面一样，假设在**时空区域边界面上** $\delta\Phi_a = 0$
- 则上式最后一行的两个**全导数积分项均为零**
- 于是，$\delta S = 0$ 给出**场的正则运动方程**

$$\dot{\Phi}_a = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \pi_a}, \quad \dot{\pi}_a = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \Phi_a} + \nabla \cdot \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial(\nabla \Phi_a)}$$

- **场** Φ_a 和它的**共轭动量密度** π_a 是系统的**正则变量**

1.7 节 Noether 定理、对称性与守恒定律

- 如前所述，若一种对称变换可用连续变化的参数描述，则它是一种**连续变换**，连续变换对应的对称性称为**连续对称性**
- Lorentz 对称性就是一种连续对称性
- **Noether 定理**指出，

> 如果系统具有**一种连续对称性**，就必然存在**一条**对应的**守恒定律**

- Noether 定理首先是在**经典物理**中给出的，但它基本上适用于任何物理行为由**作用量原理**决定的系统
- 因此，可以将它推广到**量子物理**中

Emmy Noether
(1882–1935)

1.7.1 小节　经典场论中的 Noether 定理

- 下面在经典场论中证明 Noether 定理
- 时空区域 R 中的作用量为 $S = \int_R \mathrm{d}^4x\, \mathcal{L}(\Phi_a, \partial_\mu \Phi_a)$
- 考虑一个连续变换，使得 $\Phi_a(x) \to \Phi'_a(x')$
- 其中已包含了坐标变换 $x^\mu \to x'^\mu$
- 它引起的拉氏量变换为 $\mathcal{L}(x) \to \mathcal{L}'(x')$

1.7.1 小节 经典场论中的 Noether 定理

- 下面在经典场论中证明 Noether 定理
- 时空区域 R 中的作用量为 $S = \int_R \mathrm{d}^4x\, \mathcal{L}(\Phi_a, \partial_\mu \Phi_a)$
- 考虑一个连续变换，使得 $\Phi_a(x) \to \Phi'_a(x')$
- 其中已包含了坐标变换 $x^\mu \to x'^\mu$
- 它引起的拉氏量变换为 $\mathcal{L}(x) \to \mathcal{L}'(x')$
- 我们可以对连续变换取极限，即考虑无穷小变换
- 记上述连续变换的无穷小变换形式为

$$\Phi'_a(x') = \Phi_a(x) + \delta\Phi_a, \quad x'^\mu = x^\mu + \delta x^\mu, \quad \mathcal{L}'(x') = \mathcal{L}(x) + \delta\mathcal{L}$$

- 如果在此变换下，对任意时空区域 R 都有

$$\delta S = \int_{R'} \mathrm{d}^4x'\, \mathcal{L}'(x') - \int_R \mathrm{d}^4x\, \mathcal{L}(x) = 0,$$

则系统具有相应的连续对称性

体积元的变换

- 体积元的变换为 $\mathrm{d}^4x' = |\mathcal{J}|\mathrm{d}^4x$，$\mathcal{J} = \det\left(\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu}\right) = \det\left[\delta^\mu{}_\nu + \frac{\partial(\delta x^\mu)}{\partial x^\nu}\right]$
- 任意方阵 A 满足 $\boxed{\det[\exp(A)] = \exp[\mathrm{tr}(A)]}$，其中 $\exp(A) \equiv \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{n!}$
- 对于无穷小的 A，把**上式**两边展开至**一阶小量**，得 $\det(\mathbf{1} + A) \simeq 1 + \mathrm{tr}(A)$
- 上式中**约等于号**表示只保留到**一阶小量**，下同
- 利用上式将 Jacobi 行列式 $\mathcal{J}$ 化为 $\mathcal{J} \simeq 1 + \mathrm{tr}\left[\frac{\partial(\delta x^\mu)}{\partial x^\nu}\right] = 1 + \partial_\mu(\delta x^\mu)$
- 从而，**体积元**的**无穷小变换**形式为 $\mathrm{d}^4x' \simeq [1 + \partial_\mu(\delta x^\mu)]\mathrm{d}^4x$

体积元的变换

- 体积元的变换为 $\mathrm{d}^4x' = |\mathcal{J}|\mathrm{d}^4x$，$\mathcal{J} = \det\left(\dfrac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu}\right) = \det\left[\delta^\mu{}_\nu + \dfrac{\partial(\delta x^\mu)}{\partial x^\nu}\right]$
- 任意方阵 A 满足 $\boxed{\det[\exp(A)] = \exp[\mathrm{tr}(A)]}$，其中 $\exp(A) \equiv \sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{A^n}{n!}$
- 对于无穷小的 A，把**上式**两边展开至**一阶小量**，得 $\det(\mathbf{1} + A) \simeq 1 + \mathrm{tr}(A)$
- 上式中**约等于号**表示只保留到**一阶小量**，下同
- 利用上式将 Jacobi 行列式 $\mathcal{J}$ 化为 $\mathcal{J} \simeq 1 + \mathrm{tr}\left[\dfrac{\partial(\delta x^\mu)}{\partial x^\nu}\right] = 1 + \partial_\mu(\delta x^\mu)$
- 从而，**体积元**的**无穷小变换**形式为 $\mathrm{d}^4x' \simeq [1 + \partial_\mu(\delta x^\mu)]\mathrm{d}^4x$
- **作用量**在此无穷小变换下的**变分**是

$$
\begin{aligned}
\delta S &= \int_{R'} \mathrm{d}^4x'\, \mathcal{L}'(x') - \int_R \mathrm{d}^4x\, \mathcal{L}(x) \\
&\simeq \int_R \mathrm{d}^4x\, [1 + \partial_\mu(\delta x^\mu)][\mathcal{L}(x) + \delta\mathcal{L}] - \int_R \mathrm{d}^4x\, \mathcal{L}(x) \simeq \int_R \mathrm{d}^4x\, [\delta\mathcal{L} + \mathcal{L}(x)\partial_\mu(\delta x^\mu)] \\
&= \int_R \mathrm{d}^4x \left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\Phi_a}\delta\Phi_a + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)}\delta(\partial_\mu\Phi_a) + \mathcal{L}\partial_\mu(\delta x^\mu)\right]
\end{aligned}
$$

两种变分算符

- 记 x^μ **固定**时的变分算符为 $\bar{\delta}$，满足

$$\bar{\delta}\Phi_a(x) = \Phi'_a(x) - \Phi_a(x)$$

- $\bar{\delta}$ **算符**可以**与时空导数算符交换**，$\bar{\delta}(\partial_\mu\Phi_a) = \partial_\mu(\bar{\delta}\Phi_a)$，$\delta$ **算符**则**不一定**可以
- $\delta\Phi_a$ 与 $\bar{\delta}\Phi_a$ 的关系为

$$\begin{aligned}\delta\Phi_a &= \Phi'_a(x') - \Phi_a(x) = \Phi'_a(x') - \Phi'_a(x) + \Phi'_a(x) - \Phi_a(x)\\ &= \Phi'_a(x') - \Phi'_a(x) + \bar{\delta}\Phi_a \simeq \bar{\delta}\Phi_a + (\partial_\mu\Phi'_a)\delta x^\mu \simeq \bar{\delta}\Phi_a + (\partial_\mu\Phi_a)\delta x^\mu\end{aligned}$$

- 第四步用到 **Taylor 展开式** $\Phi'_a(x') \simeq \Phi'_a(x) + (\partial_\mu\Phi'_a)\delta x^\mu$，第五步**扔掉二阶小量**
- 从而

$$\bar{\delta}\Phi_a = \delta\Phi_a - (\partial_\mu\Phi_a)\delta x^\mu$$

- 将上面的 Φ_a 替换为 $\partial_\mu\Phi_a$，即得

$$\delta(\partial_\mu\Phi_a) = \bar{\delta}(\partial_\mu\Phi_a) + \partial_\nu(\partial_\mu\Phi_a)\delta x^\nu = \partial_\mu(\bar{\delta}\Phi_a) + \partial_\nu(\partial_\mu\Phi_a)\delta x^\nu$$

作用量变分

从而得到

$$
\begin{aligned}
\delta S &= \int_R \mathrm{d}^4x \left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\Phi_a}\delta\Phi_a + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)}\delta(\partial_\mu\Phi_a) + \mathcal{L}\partial_\mu(\delta x^\mu)\right] \\
&= \int_R \mathrm{d}^4x \left\{\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\Phi_a}[\bar{\delta}\Phi_a + (\partial_\mu\Phi_a)\delta x^\mu] + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)}[\partial_\mu(\bar{\delta}\Phi_a) + \partial_\nu(\partial_\mu\Phi_a)\delta x^\nu] + \mathcal{L}\partial_\mu(\delta x^\mu)\right\} \\
&= \int_R \mathrm{d}^4x \left\{\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\Phi_a}\bar{\delta}\Phi_a + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\Phi_a}(\partial_\mu\Phi_a)\delta x^\mu + \partial_\mu\left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)}\bar{\delta}\Phi_a\right] - \left[\partial_\mu\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)}\right]\bar{\delta}\Phi_a \right. \\
&\qquad \left. + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\nu\Phi_a)}\partial_\mu(\partial_\nu\Phi_a)\delta x^\mu + \mathcal{L}\partial_\mu(\delta x^\mu)\right\} \\
&= \int_R \mathrm{d}^4x \left\{\left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\Phi_a} - \partial_\mu\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)}\right]\bar{\delta}\Phi_a + \partial_\mu\left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)}\bar{\delta}\Phi_a\right]\right. \\
&\qquad \left. + \left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\Phi_a}\frac{\partial\Phi_a}{\partial x^\mu}\delta x^\mu + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\nu\Phi_a)}\frac{\partial(\partial_\nu\Phi_a)}{\partial x^\mu}\delta x^\mu + \mathcal{L}\frac{\partial(\delta x^\mu)}{\partial x^\mu}\right]\right\} \\
&= \int_R \mathrm{d}^4x \left\{\left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\Phi_a} - \partial_\mu\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)}\right]\bar{\delta}\Phi_a + \partial_\mu\left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)}\bar{\delta}\Phi_a + \mathcal{L}\delta x^\mu\right]\right\}
\end{aligned}
$$

第二步用到**分部积分**，最后一步涉及**对复合函数 $\mathcal{L}(\Phi_a, \partial_\mu\Phi_a)$ 求导的链式法则**

Noether 守恒流

- **Euler-Lagrange 方程**表明 $\dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Phi_a} - \partial_\mu \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_a)} = 0$
- 对于**任意**的**积分区域** R，

$$0 = \delta S = \int_R \mathrm{d}^4 x \left\{ \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Phi_a} - \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_a)} \right] \bar{\delta} \Phi_a + \partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_a)} \bar{\delta} \Phi_a + \mathcal{L} \delta x^\mu \right] \right\}$$

意味着

$$\partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_a)} \bar{\delta} \Phi_a + \mathcal{L} \delta x^\mu \right] = 0$$

- 定义 **Noether 守恒流** $\boxed{j^\mu \equiv \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_a)} \bar{\delta} \Phi_a + \mathcal{L} \delta x^\mu}$
- 则有**守恒流方程** $\boxed{\partial_\mu j^\mu = 0}$

Noether 守恒流

- **Euler-Lagrange 方程**表明 $\dfrac{\partial\mathcal{L}}{\partial\Phi_a}-\partial_\mu\dfrac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)}=0$

- 对于**任意**的**积分区域** R，

$$0=\delta S=\int_R \mathrm{d}^4x\left\{\left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\Phi_a}-\partial_\mu\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)}\right]\bar{\delta}\Phi_a+\partial_\mu\left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)}\bar{\delta}\Phi_a+\mathcal{L}\delta x^\mu\right]\right\}$$

意味着

$$\partial_\mu\left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)}\bar{\delta}\Phi_a+\mathcal{L}\delta x^\mu\right]=0$$

- 定义 **Noether 守恒流** $\boxed{j^\mu\equiv\dfrac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)}\bar{\delta}\Phi_a+\mathcal{L}\delta x^\mu}$

- 则有**守恒流方程** $\boxed{\partial_\mu j^\mu=0}$，两边对**空间区域** $\tilde{R}$ 积分，运用 **Gauss 定理**，得到

$$0=\int_{\tilde{R}}\mathrm{d}^3x\,\partial_\mu j^\mu=\int_{\tilde{R}}\mathrm{d}^3x\,\partial_0 j^0+\int_{\tilde{R}}\mathrm{d}^3x\,\nabla\cdot\mathbf{j}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\tilde{R}}\mathrm{d}^3x\,j^0+\int_{\tilde{S}}\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{j}$$

- $\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma}$ 是**边界面** $\tilde{S}$ 上的**定向面积元**，以**外法线方向**为**正向**

守恒荷

🔪 引入守恒荷 $Q \equiv \int_{\tilde{R}} \mathrm{d}^3x\, j^0$，则 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\tilde{R}} \mathrm{d}^3x\, j^0 + \int_{\tilde{S}} \mathrm{d}\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{j} = 0$ 化为

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = -\int_{\tilde{S}} \mathrm{d}\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{j}$$

🍜 即空间区域 $\tilde{R}$ 中的守恒荷减少率（增加率）等于从边界面出来（进入）的流

🥣 这表明守恒荷**不能**凭空产生或消失，而 j^0 是守恒荷的空间密度

守恒荷

- 引入守恒荷 $Q \equiv \int_{\tilde{R}} \mathrm{d}^3x\, j^0$，则 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\tilde{R}} \mathrm{d}^3x\, j^0 + \int_{\tilde{\mathcal{S}}} \mathrm{d}\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{j} = 0$ 化为

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = -\int_{\tilde{\mathcal{S}}} \mathrm{d}\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{j}$$

- 即空间区域 $\tilde{R}$ 中的守恒荷减少率（增加率）等于从边界面出来（进入）的流
- 这表明守恒荷**不能**凭空产生或消失，而 j^0 是守恒荷的空间密度
- 对于整个三维空间而言，边界面 $\tilde{\mathcal{S}}$ 位于无穷远处
- 通常假设场 Φ_a 在无穷远处衰减为零，从而在无穷远处 $\mathbf{j} \to \mathbf{0}$
- 故全空间的守恒荷 $\boxed{Q = \int \mathrm{d}^3x\, j^0}$ 满足 $\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = 0$
- 可见，Q 不随时间变化，是一个守恒量

守恒荷

- 引入守恒荷 $Q \equiv \int_{\tilde{R}} \mathrm{d}^3x\, j^0$，则 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\tilde{R}} \mathrm{d}^3x\, j^0 + \int_{\tilde{S}} \mathrm{d}\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{j} = 0$ 化为

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = -\int_{\tilde{S}} \mathrm{d}\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{j}$$

- 即空间区域 $\tilde{R}$ 中的守恒荷减少率（增加率）等于从边界面出来（进入）的流
- 这表明守恒荷**不能**凭空产生或消失，而 j^0 是守恒荷的空间密度
- 对于整个三维空间而言，边界面 $\tilde{S}$ 位于无穷远处
- 通常假设场 Φ_a 在无穷远处衰减为零，从而在无穷远处 $\mathbf{j} \to \mathbf{0}$
- 故全空间的守恒荷 $\boxed{Q = \int \mathrm{d}^3x\, j^0}$ 满足 $\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = 0$
- 可见，Q 不随时间变化，是一个守恒量
- 综上，在经典场论中，如果系统具有某种连续对称性，则存在相应的守恒流 j^μ
- 它满足守恒流方程 $\partial_\mu j^\mu = 0$，而全空间的守恒荷 Q 不随时间变化（守恒定律）

1.7.2 小节　时空平移对称性

- 时空坐标的**平移** (translation) **变换**定义为

$$\boxed{x'^{\mu} = x^{\mu} + a^{\mu}}$$

- 其中 a^{μ} 是**平移变换参数**，**不依赖于** x^{μ}，故 $\mathrm{d}x'^{\mu} = \mathrm{d}x^{\mu}$
- 从而，时空平移变换保持 $\mathrm{d}s^2 = g_{\mu\nu}\mathrm{d}x^{\mu}\mathrm{d}x^{\nu}$ 不变，即

$$g_{\mu\nu}\mathrm{d}x'^{\mu}\mathrm{d}x'^{\nu} = g_{\mu\nu}\mathrm{d}x^{\mu}\mathrm{d}x^{\nu}$$

Henri Poincaré
(1854–1912)

- 因此，时空平移变换**保持 Minkowski 时空**的**线元平方** $\mathrm{d}s^2$ **不变**
- 所有时空平移变换构成**时空平移群**
- **保持线元平方** $\mathrm{d}s^2$ **不变**的变换称为 **Poincaré 变换**，也称为**非齐次** Lorentz 变换

Poincaré 群

- 所有 Poincaré 变换组成的集合称为 **Poincaré 群**
- **线元不变**意味着**距离不变**
- 因而 Poincaré 群是 **Minkowski 时空**的**等距群** (isometry group)，记作 $\mathrm{ISO}(1,3)$
- **Lorentz 群**是 Poincaré 群的**子群**，$\mathrm{O}(1,3) < \mathrm{ISO}(1,3)$

Poincaré 群

- 所有 Poincaré 变换组成的集合称为 **Poincaré 群**
- **线元不变**意味着**距离不变**
- 因而 Poincaré 群是 **Minkowski 时空**的**等距群** (isometry group)，记作 $\mathrm{ISO}(1,3)$
- **Lorentz 群**是 Poincaré 群的**子群**，$\mathrm{O}(1,3) < \mathrm{ISO}(1,3)$
- 任意 Poincaré 变换可表示成 **Lorentz 变换**和**时空平移变换**的组合
- 也就是说，时空坐标的 **Poincaré 变换**表达为

$$\boxed{x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu} x^{\nu} + a^{\mu}}$$

- 利用**保度规条件**，容易验证这样的变换**保持 $\mathrm{d}s^2$ 不变**：

$$\mathrm{d}s'^2 = g_{\mu\nu}\mathrm{d}x'^{\mu}\mathrm{d}x'^{\nu} = g_{\mu\nu}\Lambda^{\mu}{}_{\rho}\Lambda^{\nu}{}_{\sigma}\mathrm{d}x^{\rho}\mathrm{d}x^{\sigma} = g_{\rho\sigma}\mathrm{d}x^{\rho}\mathrm{d}x^{\sigma} = \mathrm{d}s^2$$

- 数学上称 Poincaré 群是 **Lorentz 群**与**时空平移群**的**半直积群**

时空平移对称性

Minkowski 度规 $g_{\mu\nu}$ 是不依赖于时空点的常数，因而 Minkowski 时空是均匀的，处于其中的场具有时空平移对称性

在时空平移变换 $x'^{\mu} = x^{\mu} + a^{\mu}$ 的作用下，场 $\Phi_a(x)$ 的物理分布不会改变，有

$$\Phi'_a(x') = \Phi'_a(x+a) = \Phi_a(x)$$

相应地，由场 $\Phi_a(x)$ 构造的拉氏量在变换下也满足

$$\mathcal{L}'(x') = \mathcal{L}(x)$$

而时空体积元保持不变，$\mathrm{d}^4x' = \mathrm{d}^4x$

于是，狭义相对论性局域场论的作用量 $S = \int \mathrm{d}^4x\, \mathcal{L}(x)$ 在时空平移变换下不变，

$$S' = \int \mathrm{d}^4x'\, \mathcal{L}'(x') = \int \mathrm{d}^4x\, \mathcal{L}(x) = S$$

这是时空平移对称性的体现

时空平移对称性

Minkowski 度规 $g_{\mu\nu}$ 是不依赖于时空点的常数，因而 Minkowski 时空是均匀的，处于其中的场具有时空平移对称性

在时空平移变换 $x'^{\mu} = x^{\mu} + a^{\mu}$ 的作用下，场 $\Phi_a(x)$ 的物理分布不会改变，有

$$\Phi'_a(x') = \Phi'_a(x+a) = \Phi_a(x)$$

对于无穷小变换，将变换参数 a^{μ} 改记为 ε^{μ}，则

$$\delta x^{\mu} = \varepsilon^{\mu}, \quad \delta\Phi_a = \Phi'_a(x') - \Phi_a(x) = 0$$

故 $\bar{\delta}\Phi_a = \delta\Phi_a - (\partial_\mu\Phi_a)\delta x^{\mu} = -\varepsilon^{\rho}\partial_\rho\Phi_a$

代入到 Noether 守恒流表达式，得

$$\begin{aligned} j^{\mu} &= \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)}\bar{\delta}\Phi_a + \mathcal{L}\delta x^{\mu} = -\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)}\varepsilon^{\rho}\partial_\rho\Phi_a + \mathcal{L}\varepsilon^{\mu} \\ &= -\left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)}\partial_\rho\Phi_a - \delta^{\mu}{}_{\rho}\mathcal{L}\right]\varepsilon^{\rho} \end{aligned}$$

能动张量

- 由于**小量** ε^ρ 是**任意**的，$\partial_\mu j^\mu = 0$ 给出

$$\partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_a)} \partial_\rho \Phi_a - \delta^\mu{}_\rho \mathcal{L} \right] = 0$$

- 各项乘以 $g^{\rho\nu}$，缩并，得

$$\partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_a)} \partial^\nu \Phi_a - g^{\mu\nu} \mathcal{L} \right] = 0$$

- 上式方括号部分是场的**能动张量** (energy-momentum tensor)

$$\boxed{T^{\mu\nu} \equiv \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_a)} \partial^\nu \Phi_a - g^{\mu\nu} \mathcal{L}}$$

- 它满足

$$\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$$

- 因此，对 $T^{0\nu}$ $(\nu = 0, 1, 2, 3)$ 作**全空间积分**，就得到 **4 个守恒荷**
- 只要保证 $\mathcal{L}$ 是 **Lorentz 标量**，那么 $T^{\mu\nu}$ 就是 **2 阶 Lorentz 张量**

能量守恒定律和动量守恒定律

- 能动张量 $T^{\mu\nu}$ 的 00 **分量**为 $T^{00} = \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\Phi}_a}\dot{\Phi}_a - \mathcal{L} = \pi_a \dot{\Phi}_a - \mathcal{L} = \mathcal{H}$
- 可见，T^{00} 就是**哈密顿量密度** $\mathcal{H}$，对应于**时间平移变换** $x'^0 = x^0 + \varepsilon^0$
- T^{00} 的全空间积分 $\boxed{H = \int \mathrm{d}^3x\, T^{00} = \int \mathrm{d}^3x\, \mathcal{H}}$ 是场的**哈密顿量**，即**总能量**
- 它是时间平移变换的**守恒荷**，因此 **时间平移对称性**对应于**能量守恒定律**

能量守恒定律和动量守恒定律

- 能动张量 $T^{\mu\nu}$ 的 00 分量为 $T^{00} = \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\Phi}_a}\dot{\Phi}_a - \mathcal{L} = \pi_a \dot{\Phi}_a - \mathcal{L} = \mathcal{H}$
- 可见，T^{00} 就是哈密顿量密度 $\mathcal{H}$，对应于时间平移变换 $x'^0 = x^0 + \varepsilon^0$
- T^{00} 的全空间积分 $\boxed{H = \int \mathrm{d}^3x\, T^{00} = \int \mathrm{d}^3x\, \mathcal{H}}$ 是场的哈密顿量，即总能量
- 它是时间平移变换的守恒荷，因此 **时间平移对称性对应于能量守恒定律**
- 能动张量 $T^{\mu\nu}$ 的 $0i$ 分量 $T^{0i} = \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\Phi}_a}\partial^i \Phi_a = \pi_a \partial^i \Phi_a$ 是场的动量密度
- 它对应于空间平移变换 $x'^i = x^i + \varepsilon^i$
- T^{0i} 的全空间积分 $P^i = \int \mathrm{d}^3x\, T^{0i} = \int \mathrm{d}^3x\, \pi_a \partial^i \Phi_a$ 是场的总动量
- 三维矢量形式为 $\boxed{\mathbf{P} = -\int \mathrm{d}^3x\, \pi_a \nabla \Phi_a}$
- 总动量是空间平移变换的守恒荷，因此 **空间平移对称性对应于动量守恒定律**

1.7.3 小节 Lorentz 对称性

在相对论性场论中，要求拉氏量 $\mathcal{L}$ 是 Lorentz 标量，具体来说，在固有保时向 Lorentz 变换 $x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu} x^{\nu}$ 的作用下，拉氏量满足 $\mathcal{L}'(x') = \mathcal{L}(x)$

前面已经推出 $\mathrm{d}^4 x' = \mathrm{d}^4 x$，于是作用量 S 在变换下满足

$$S' = \int \mathrm{d}^4 x' \, \mathcal{L}'(x') = \int \mathrm{d}^4 x \, \mathcal{L}(x) = S$$

即系统具有 Lorentz 对称性

考虑无穷小固有保时向 Lorentz 变换 $\boxed{\Lambda^{\mu}{}_{\nu} = \delta^{\mu}{}_{\nu} + \omega^{\mu}{}_{\nu}}$

其中 $\omega^{\mu}{}_{\nu}$ 是变换的无穷小参数，由保度规条件有

$$\begin{aligned} g_{\alpha\beta} &= g_{\mu\nu} \Lambda^{\mu}{}_{\alpha} \Lambda^{\nu}{}_{\beta} = g_{\mu\nu} (\delta^{\mu}{}_{\alpha} + \omega^{\mu}{}_{\alpha})(\delta^{\nu}{}_{\beta} + \omega^{\nu}{}_{\beta}) \\ &\simeq g_{\mu\nu} \delta^{\mu}{}_{\alpha} \delta^{\nu}{}_{\beta} + g_{\mu\nu} \delta^{\mu}{}_{\alpha} \omega^{\nu}{}_{\beta} + g_{\mu\nu} \omega^{\mu}{}_{\alpha} \delta^{\nu}{}_{\beta} = g_{\alpha\beta} + \omega_{\alpha\beta} + \omega_{\beta\alpha} \end{aligned}$$

可见，$\omega_{\mu\nu} \equiv g_{\mu\rho} \omega^{\rho}{}_{\nu}$ 关于两个指标反对称，$\boxed{\omega_{\mu\nu} = -\omega_{\nu\mu}}$

因此，$\omega_{\mu\nu}$ 只有 6 个独立分量，可取为 ω_{01}、ω_{02}、ω_{03}、ω_{12}、ω_{23} 和 ω_{31}

它们分别对应于沿 3 个空间轴方向的增速变换和绕 3 个空间轴的旋转变换

无穷小旋转变换

- 下面举两个例子说明 $\omega_{\mu\nu}$ 的具体形式
- 对于**绕 z 轴旋转 θ 角**的变换矩阵

$$\Lambda^{\mu}{}_{\nu} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \cos\theta & \sin\theta & \\ & -\sin\theta & \cos\theta & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$

- 利用三角函数展开式 $\cos\theta = 1 + \mathcal{O}(\theta^2)$ 和 $\sin\theta = \theta + \mathcal{O}(\theta^3)$，得

$$\omega^{\mu}{}_{\nu} = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ & 0 & \theta & \\ & -\theta & 0 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}, \quad \omega_{\mu\nu} = g_{\mu\rho}\omega^{\rho}{}_{\nu} = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ & 0 & -\theta & \\ & \theta & 0 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

无穷小增速变换

🚲 对于沿 x 轴增速变换，引入快度 (rapidity) $\boxed{\xi \equiv \tanh^{-1}\beta}$，则 $\beta = \tanh\xi$

🚴 利用双曲函数公式 $\tanh\xi = \sinh\xi/\cosh\xi$ 和 $\cosh^2\xi - \sinh^2\xi = 1$ 推出

$$\gamma = (1-\beta^2)^{-1/2} = (1-\tanh^2\xi)^{-1/2} = \left(\frac{\cosh^2\xi - \sinh^2\xi}{\cosh^2\xi}\right)^{-1/2} = \cosh\xi$$

$$\beta\gamma = \tanh\xi\cosh\xi = \sinh\xi$$

🚵 增速变换矩阵改写成 $\Lambda^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & & \\ -\gamma\beta & \gamma & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh\xi & -\sinh\xi & & \\ -\sinh\xi & \cosh\xi & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$

🏁 根据双曲函数展开式 $\cosh\xi = 1 + \mathcal{O}(\xi^2)$ 和 $\sinh\xi = \xi + \mathcal{O}(\xi^3)$，有

$$\omega^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} 0 & -\xi & & \\ -\xi & 0 & & \\ & & 0 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}, \quad \omega_{\mu\nu} = g_{\mu\rho}\omega^\rho{}_\nu = \begin{pmatrix} 0 & -\xi & & \\ \xi & 0 & & \\ & & 0 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

Lorentz 群表示的生成元

在无穷小 Lorentz 变换的作用下，

$$x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu} x^{\nu} = (\delta^{\mu}{}_{\nu} + \omega^{\mu}{}_{\nu}) x^{\nu} = x^{\mu} + \omega^{\mu}{}_{\nu} x^{\nu}$$

而变换后的场 $\Phi'_a(x')$ 可以展开为

$$\Phi'_a(x') = \Phi_a(x) - \frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\mu\nu}(I^{\mu\nu})_{ab}\Phi_b(x) = \left[\delta_{ab} - \frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\mu\nu}(I^{\mu\nu})_{ab}\right]\Phi_b(x)$$

$(I^{\mu\nu})_{ab}$ 是 Φ_a 所属 Lorentz 群表示的生成元 (generator)

它们是以 a 和 b 为行列指标的一组常数矩阵，而且关于 μ 和 ν 反对称，

$$(I^{\mu\nu})_{ab} = -(I^{\nu\mu})_{ab}$$

因而这组矩阵里只有 6 个独立矩阵，每个独立矩阵与 $\omega_{\mu\nu}$ 的一个独立分量相匹配

群表示	场 Φ_a	$(I^{\mu\nu})_{ab}$
恒等表示	标量场 ϕ	0
矢量表示	矢量场 A^{μ}	$(\mathcal{J}^{\mu\nu})^{\rho}{}_{\sigma}$
旋量表示	旋量场 ψ_a	$(\mathcal{S}^{\mu\nu})_{ab}$

Lorentz 对称性的 Noether 流

现在 $\delta x^\mu = x'^\mu - x^\mu = \omega^\mu{}_\nu x^\nu$，有

$$\begin{aligned}\bar{\delta}\Phi_a &= \delta\Phi_a - (\partial_\mu\Phi_a)\delta x^\mu = \Phi'_a(x') - \Phi_a(x) - (\partial_\nu\Phi_a)\delta x^\nu \\ &= -\frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\nu\rho}(I^{\nu\rho})_{ab}\Phi_b - (\partial_\nu\Phi_a)\omega^\nu{}_\rho x^\rho\end{aligned}$$

Noether 流 $j^\mu = \dfrac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)}\bar{\delta}\Phi_a + \mathcal{L}\delta x^\mu$

$$\begin{aligned}&= -\frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\nu\rho}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)}(I^{\nu\rho})_{ab}\Phi_b - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)}(\partial_\nu\Phi_a)\omega^\nu{}_\rho x^\rho + \mathcal{L}\omega^\mu{}_\rho x^\rho \\ &= -\frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\nu\rho}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)}(I^{\nu\rho})_{ab}\Phi_b - \left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)}\partial_\nu\Phi_a - \delta^\mu{}_\nu\mathcal{L}\right]\omega^\nu{}_\rho x^\rho \\ &= -\frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\nu\rho}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)}(I^{\nu\rho})_{ab}\Phi_b - T^\mu{}_\nu\omega^\nu{}_\rho x^\rho\end{aligned}$$

其中 $T^\mu{}_\nu \equiv T^{\mu\rho}g_{\rho\nu} = \dfrac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)}\partial_\nu\Phi_a - \delta^\mu{}_\nu\mathcal{L}$ 是**能动张量** $T^{\mu\nu}$ 的另一种写法

注意参与**缩并的 Lorentz 指标一升一降不会改变**表达式的结果：

$$T^\mu{}_\nu\omega^\nu{}_\rho = T^\mu{}_\nu\delta^\nu{}_\sigma\omega^\sigma{}_\rho = T^\mu{}_\nu g^{\nu\alpha}g_{\alpha\sigma}\omega^\sigma{}_\rho = T^{\mu\alpha}\omega_{\alpha\rho} = T^{\mu\nu}\omega_{\nu\rho}$$

Lorentz 对称性的守恒荷

- 再利用 $\omega_{\mu\nu}$ 的**反对称性**推出

$$T^{\mu}{}_{\nu}\omega^{\nu}{}_{\rho}x^{\rho} = T^{\mu\nu}\omega_{\nu\rho}x^{\rho} = \frac{1}{2}(T^{\mu\nu}\omega_{\nu\rho}x^{\rho} - T^{\mu\nu}\omega_{\rho\nu}x^{\rho}) = \frac{1}{2}(T^{\mu\nu}\omega_{\nu\rho}x^{\rho} - T^{\mu\rho}\omega_{\nu\rho}x^{\nu})$$
$$= \frac{1}{2}\omega_{\nu\rho}(T^{\mu\nu}x^{\rho} - T^{\mu\rho}x^{\nu})$$

- 于是，**Noether 流**化为

$$j^{\mu} = -\frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\nu\rho}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_{\mu}\Phi_a)}(I^{\nu\rho})_{ab}\Phi_b - \frac{1}{2}\omega_{\nu\rho}(T^{\mu\nu}x^{\rho} - T^{\mu\rho}x^{\nu}) = \frac{1}{2}\mathbb{J}^{\mu\nu\rho}\omega_{\nu\rho}$$

- 其中 $\mathbb{J}^{\mu\nu\rho} \equiv T^{\mu\rho}x^{\nu} - T^{\mu\nu}x^{\rho} - \mathrm{i}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_{\mu}\Phi_a)}(I^{\nu\rho})_{ab}\Phi_b$

- 由于**小量** $\omega_{\nu\rho}$ 是**任意**的，$\partial_{\mu}j^{\mu} = 0$ 给出 $\partial_{\mu}\mathbb{J}^{\mu\nu\rho} = 0$，Lorentz 对称性的**守恒荷**为

$$J^{\nu\rho} \equiv \int \mathrm{d}^3x\,\mathbb{J}^{0\nu\rho} = \int \mathrm{d}^3x\,[T^{0\rho}x^{\nu} - T^{0\nu}x^{\rho} - \mathrm{i}\pi_a(I^{\nu\rho})_{ab}\Phi_b]$$

- 易见 $J^{\nu\rho} = -J^{\rho\nu}$，因而一共有 **6 个独立的守恒荷**，满足 $\mathrm{d}J^{\nu\rho}/\mathrm{d}t = 0$

守恒荷的分解

为明确物理含义，将守恒荷分解成两项，

$$J^{\nu\rho} = L^{\nu\rho} + S^{\nu\rho}$$

第一项为 $L^{\nu\rho} \equiv \int \mathrm{d}^3x\,(T^{0\rho}x^\nu - T^{0\nu}x^\rho)$

关于指标的反对称性意味着它的纯空间分量 L^{jk} 中只有 3 个是独立的

利用三维 Levi-Civita 符号将 L^{jk} 对偶成三维矢量

$$L^i \equiv \frac{1}{2}\,\varepsilon^{ijk}L^{jk} = (L^{23}, L^{31}, L^{12})$$

由此推出

$$L^i = \frac{1}{2}\,\varepsilon^{ijk}\int \mathrm{d}^3x\,(T^{0k}x^j - T^{0j}x^k) = \int \mathrm{d}^3x\,\varepsilon^{ijk}x^j\overbrace{T^{0k}}^{\text{动量密度}} = \int \mathrm{d}^3x\,\varepsilon^{ijk}x^j\pi_a\partial^k\Phi_a$$

写成矢量形式是 $\mathbf{L} = -\int \mathrm{d}^3x\;\mathbf{x}\times(\pi_a\nabla\Phi_a)$，这是场的轨道角动量

角动量守恒定律

- 第二项为 $S^{\nu\rho} \equiv -\mathrm{i}\int \mathrm{d}^3x\, \pi_a (I^{\nu\rho})_{ab}\Phi_b$
- 类似地，$S^{\nu\rho}$ 纯空间分量的对偶三维矢量为

$$S^i \equiv \frac{1}{2}\,\varepsilon^{ijk}S^{jk} = (S^{23}, S^{31}, S^{12}) = -\frac{\mathrm{i}}{2}\,\varepsilon^{ijk}\int \mathrm{d}^3x\, \pi_a (I^{jk})_{ab}\Phi_b$$

- 这是场的自旋角动量
- $J^{\nu\rho}$ 纯空间分量的对偶三维矢量为

$$J^i \equiv \frac{1}{2}\,\varepsilon^{ijk}J^{jk} = L^i + S^i$$

- 这是场的总角动量
- 固有保时向 Lorentz 群的纯空间部分就是空间旋转群 $\mathrm{SO}(3)$
- 空间旋转对称性对应于角动量守恒定律

质心运动守恒定律

- $L^{\nu\rho}$ 的 $i0$ 分量为

$$L^{i0} = \int \mathrm{d}^3x\,(T^{00}x^i - T^{0i}x^0) = \int \mathrm{d}^3x\,(x^i\mathcal{H} - x^0\pi_a\partial^i\Phi_a) = \int \mathrm{d}^3x\,x^i\mathcal{H} - tP^i$$

- 若 $\dfrac{\mathrm{d}S^{i0}}{\mathrm{d}t} = 0$，则 $\dfrac{\mathrm{d}J^{i0}}{\mathrm{d}t} = 0$ 意味着 $\dfrac{\mathrm{d}L^{i0}}{\mathrm{d}t} = 0$，再结合动量守恒 $\dfrac{\mathrm{d}P^i}{\mathrm{d}t} = 0$，得到

$$\frac{\mathrm{d}L^{i0}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int \mathrm{d}^3x\,x^i\mathcal{H} - P^i = 0$$

- 即

$$P^i = Hv_{\mathrm{C}}^i, \quad v_{\mathrm{C}}^i \equiv \frac{1}{H}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int \mathrm{d}^3x\,x^i\mathcal{H}$$

- 在低速近似下，总能量约等于总质量，$H \simeq M$，故总动量 $\mathbf{P} \simeq M\mathbf{v}_{\mathrm{C}}$
- $\mathbf{v}_{\mathrm{C}}$ 是质心 (即质量中心，center of mass) 的运动速度
- 应用 Newton 第二定律，外力 $\mathbf{F} = \dfrac{\mathrm{d}\mathbf{P}}{\mathrm{d}t} = M\dfrac{\mathrm{d}\mathbf{v}_{\mathrm{C}}}{\mathrm{d}t}$，这就是质心运动定理
- 因此，L^{i0} 的守恒在经典力学中对应于质心运动守恒定律：当没有外力存在时，质心的加速度为零，质心保持静止或作匀速直线运动

1.7.4 小节 U(1) 整体对称性

- 考虑包含**复场** $\phi(x)$ 及其复共轭场 $\phi^*(x)$ 的**拉氏量** $\mathcal{L} = (\partial^\mu \phi^*)\partial_\mu \phi - m^2 \phi^* \phi$
- 对 ϕ 作 **U(1) 整体变换** $\boxed{\phi'(x) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}q\theta}\phi(x)}$
- 其中**有理数** q 是常数，**连续变换参数** θ 是实数
- **整体** (global) 指 θ **不依赖于时空坐标** x^μ

1.7.4 小节 U(1) 整体对称性

- 考虑包含**复场** $\phi(x)$ 及其复共轭场 $\phi^*(x)$ 的**拉氏量** $\mathcal{L} = (\partial^\mu \phi^*)\partial_\mu \phi - m^2 \phi^* \phi$
- 对 ϕ 作 **U(1) 整体变换** $\boxed{\phi'(x) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}q\theta}\phi(x)}$
- 其中**有理数** q 是常数，**连续变换参数** θ 是实数
- **整体** (global) 指 θ **不依赖于时空坐标** x^μ
- $\mathrm{e}^{\mathrm{i}q\theta}$ 是一个**模为** 1 的**相位因子** (phase factor)
- 可看作一个 **1 维幺正矩阵** $U(\theta) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}q\theta}$，满足 $U^\dagger U = 1$
- $\{U(\theta)\}$ 构成 **U(1) 群**，它是与 **SO(2)** 同构的 Abel 群
- 如右图所示，**SO(2) 群空间**是一个**圆周**

$\mathrm{SO}(2)$: $\varphi \in [0, 2\pi]$

$U(\theta) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}q\theta}$: $\theta \in [0, 2\pi/q]$

$U(0) = U(2\pi/q) = 1$

1.7.4 小节 U(1) 整体对称性

- 考虑包含**复场** $\phi(x)$ 及其复共轭场 $\phi^*(x)$ 的**拉氏量** $\mathcal{L} = (\partial^\mu \phi^*)\partial_\mu \phi - m^2 \phi^* \phi$
- 对 ϕ 作 **U(1) 整体变换** $\boxed{\phi'(x) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}q\theta}\phi(x)}$
- 其中**有理数** q 是常数，**连续变换参数** θ 是实数
- **整体** (global) 指 θ **不依赖于时空坐标** x^μ
- $\mathrm{e}^{\mathrm{i}q\theta}$ 是一个**模为 1** 的**相位因子** (phase factor)
- 可看作一个 **1 维幺正矩阵** $U(\theta) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}q\theta}$，满足 $U^\dagger U = 1$
- $\{U(\theta)\}$ 构成 **U(1) 群**，它是与 **SO(2)** 同构的 Abel 群
- 如右图所示，**SO(2) 群空间**是一个**圆周**
- 相应地，ϕ^* 的 U(1) 整体变换为 $[\phi^*(x)]' = [\phi'(x)]^* = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}q\theta}\phi^*(x)$
- **拉氏量** $\mathcal{L}$ 在这种变换下不变，即具有 **U(1) 整体对称性**，q 称为 $\phi(x)$ 的 **U(1) 荷**
- 与前面叙述的时空平移对称性和 Lorentz 对称性不同，这里的对称性出现在由场构成的**抽象空间**中，与时间和空间**相对独立** ($\delta x^\mu = 0$)，因而是一种**内部对称性**

$\mathrm{SO}(2)$: $\varphi \in [0, 2\pi]$

$U(\theta) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}q\theta}$: $\theta \in [0, 2\pi/q]$

$U(0) = U(2\pi/q) = 1$

无穷小 U(1) 整体变换

- U(1) 整体变换的**无穷小**形式为

$$\phi'(x) = \phi(x) + \mathrm{i}q\theta\phi(x), \quad [\phi^*(x)]' = \phi^*(x) - \mathrm{i}q\theta\phi^*(x)$$

- 结合 $\delta x^\mu = 0$，有

$$\bar{\delta}\phi = \delta\phi = \mathrm{i}q\theta\phi, \quad \bar{\delta}\phi^* = \delta\phi^* = -\mathrm{i}q\theta\phi^*$$

- $\phi(x)$ 与 $\phi^*(x)$ 是**线性独立**的，代表两个**相互独立**的**自由度**
- 取 $\Phi_1 = \phi$，$\Phi_2 = \phi^*$，**Noether 流**表达为

$$\begin{aligned} j^\mu &= \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\Phi_a)}\bar{\delta}\Phi_a + \mathcal{L}\delta x^\mu \\ &= \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\bar{\delta}\phi + \bar{\delta}\phi^*\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi^*)} = \partial^\mu\phi^*(\mathrm{i}q\theta\phi) + (-\mathrm{i}q\theta\phi^*)\partial^\mu\phi \\ &= \mathrm{i}q\theta[(\partial^\mu\phi^*)\phi - \phi^*\partial^\mu\phi] = -\mathrm{i}q\theta\phi^*\overleftrightarrow{\partial^\mu}\phi \end{aligned}$$

- 其中，$\overleftrightarrow{\partial^\mu}$ **符号**定义为 $\phi^*\overleftrightarrow{\partial^\mu}\phi \equiv \phi^*\partial^\mu\phi - (\partial^\mu\phi^*)\phi$

U(1) 守恒流和守恒荷

- 扔掉无穷小参数 $-\theta$，定义 U(1) 守恒流

$$\boxed{J^\mu \equiv \mathrm{i}q\phi^* \overleftrightarrow{\partial^\mu} \phi}$$

- 则 Noether 定理给出 $\partial_\mu J^\mu = 0$，相应的守恒荷是

$$Q = \int \mathrm{d}^3x\, J^0 = \mathrm{i}q \int \mathrm{d}^3x\, \phi^* \overleftrightarrow{\partial^0} \phi$$

- 满足 $\mathrm{d}Q/\mathrm{d}t = 0$

U(1) 守恒流和守恒荷

⛲ 扔掉无穷小参数 $-\theta$，定义 U(1) 守恒流

$$\boxed{J^\mu \equiv \mathrm{i}q\phi^* \overleftrightarrow{\partial^\mu} \phi}$$

🏟️ 则 Noether 定理给出 $\partial_\mu J^\mu = 0$，相应的守恒荷是

$$Q = \int \mathrm{d}^3x\, J^0 = \mathrm{i}q \int \mathrm{d}^3x\, \phi^* \overleftrightarrow{\partial^0} \phi$$

🏰 满足 $\mathrm{d}Q/\mathrm{d}t = 0$

🎪 在实际应用中，q 是由场 $\phi(x)$ 描述的粒子所携带的某种荷，如电荷、重子数、轻子数、奇异数、粲数、底数、顶数等

🎡 因此，一种 U(1) 整体对称性对应于一条荷数守恒定律

🎠 比如，电磁 U(1) 整体对称性对应于电荷守恒定律