量 子 场 论

标准模型简介

余钊焕

中山大学物理学院

https://yzhxxzxy.github.io

更新日期：2022 年 6 月 5 日

粒子物理标准模型

粒子物理**标准模型**是一个 $\mathbf{SU(3)_C \times SU(2)_L \times U(1)_Y}$ **规范场论**

模型中有三代费米子，每一代包含一种上型夸克、一种下型夸克、一种带电轻子和一种中微子，规范玻色子传递费米子间相互作用

$\mathrm{SU(3)_C}$ 部分描述**强相互作用**，称为**量子色动力学**，规范玻色子是**胶子**

$\mathrm{SU(2)_L \times U(1)_Y}$ 部分描述夸克和轻子的电磁和弱相互作用，称为**电弱规范理论**，在这个理论中引入一个 **Higgs 标量二重态**，从而引起规范群的**对称性自发破缺**，使得 $\mathrm{SU(2)_L \times U(1)_Y}$ 群破缺为 $\mathbf{U(1)_{EM}}$ 群

基本粒子质量起源

🍔 电弱对称性破缺前，电弱理论中存在 4 个无质量的规范玻色子和 4 个 Higgs 自由度；左手费米子和右手费米子都没有质量，具有不同量子数

🍕 破缺后，3 个规范玻色子与 3 个 Higgs 自由度结合，从而获得质量，成为 $W^{\pm}$ 玻色子和 Z^0 玻色子，传递弱相互作用

🍰 剩下的 1 个无质量规范玻色子是光子，传递电磁相互作用

Higgs 玻色子

基本粒子质量起源

🍔 电弱对称性破缺前，电弱理论中存在 4 个无质量的规范玻色子和 4 个 Higgs 自由度；左手费米子和右手费米子都没有质量，具有不同量子数

🍕 破缺后，3 个规范玻色子与 3 个 Higgs 自由度结合，从而获得质量，成为 $W^{\pm}$ 玻色子和 Z^0 玻色子，传递弱相互作用

🍰 剩下的 1 个无质量规范玻色子是光子，传递电磁相互作用

🥓 与 Higgs 场的 Yukawa 耦合导致左手和右手费米子组合成 Dirac 费米子，并获得质量

Higgs 玻色子

🥨 在标准模型中，中微子没有右手分量，因而没有获得质量

🥐 1998 年实验发现中微子振荡，证明中微子具有质量，因此需要扩充标准模型才能正确描述中微子物理

非 Abel 规范理论

🎶 非 Abel 群的生成元彼此不对易，因而规范变换形式与 U(1) 群（Abel 群）不同

🎷 1954 年，杨振宁和 Robert Mills 提出**非 Abel 规范理论**，也称为 **Yang-Mills 理论**，其规范场称为 **Yang-Mills 场**

🦍 对于非 Abel 的 Lie 群，生成元 t^a 满足 $[t^a, t^b] = \mathrm{i} f^{abc} t^c$，依赖时空坐标的群幺正变换为 $U(x) = \exp[\mathrm{i}\theta^a(x) t^a]$，旋量场多重态 $\psi(x)$ 和规范场 $A^a_\mu(x)$ 的**规范变换**是

$$\psi(x) \to U(x)\psi(x), \quad A^a_\mu(x) t^a \to U(x) A^a_\mu(x) t^a U^\dagger(x) + \frac{\mathrm{i}}{g} U(x) \partial_\mu U^\dagger(x)$$

🍪 定义**协变导数** $D_\mu = \partial_\mu - \mathrm{i} g A^a_\mu t^a$，就可以利用 $UU^\dagger = U^\dagger U = 1$ 推出

$$\begin{aligned} D_\mu \psi(x) &\to \left[\partial_\mu - \mathrm{i} g \left(U A^a_\mu t^a U^\dagger + \frac{\mathrm{i}}{g} U \partial_\mu U^\dagger \right)\right] U\psi \\ &= UU^\dagger (\partial_\mu U)\psi + U\partial_\mu \psi - \mathrm{i} g U A^a_\mu t^a \psi + U(\partial_\mu U^\dagger) U\psi \\ &= U(\partial_\mu - \mathrm{i} g A^a_\mu t^a)\psi + U\partial_\mu (U^\dagger U)\psi = U(x) D_\mu \psi(x) \end{aligned}$$

🍟 具有**非 Abel 规范对称性**的拉氏量是 $\mathcal{L}_{\mathrm{YM}} = \mathrm{i}\bar{\psi}\gamma^\mu D_\mu \psi - m\bar{\psi}\psi - \frac{1}{4} F^a_{\mu\nu} F^{a,\mu\nu}$，其中规范场的**场强张量** $F^a_{\mu\nu} \equiv \partial_\mu A^a_\nu - \partial_\nu A^a_\mu + g f^{abc} A^b_\mu A^c_\nu$

量子色动力学

量子色动力学 (Quantum Chromodynamics) 简称 **QCD**，是 $\mathrm{SU(3)_C}$ 非 Abel 规范理论，规范场 $G^a_\mu(x)$ 对应于 8 种胶子，夸克旋量场 $q(x)$ 是 $\mathrm{SU(3)_C}$ 三重态，拉氏量

$$\mathcal{L}_{\mathrm{QCD}} = \sum_q \bar{q}(\mathrm{i}\gamma^\mu D_\mu - m_q)q - \frac{1}{4}G^a_{\mu\nu}G^{a,\mu\nu}, \quad q = d, u, s, c, b, t, \quad a = 1, \cdots, 8$$

协变导数 $D_\mu = \partial_\mu - \mathrm{i}g_s G^a_\mu t^a$，场强张量 $G^a_{\mu\nu} = \partial_\mu G^a_\nu - \partial_\nu G^a_\mu + g_s f^{abc} G^b_\mu G^c_\nu$

g_s 称为强耦合常数，结构常数 f^{abc} 对 3 个指标全反对称，独立分量为

$$f_{123} = 1, \quad f_{147} = f_{246} = f_{257} = f_{345} = f_{516} = f_{637} = 1/2, \quad f_{458} = f_{678} = \sqrt{3}/2$$

$t^a = \lambda^a/2$ 是 $\mathrm{SU(3)_C}$ 基础表示的生成元，其中 λ^a 是 8 个 Gell-Mann 矩阵

$$\lambda_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_2 = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} & 0 \\ \mathrm{i} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\lambda_5 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -\mathrm{i} \\ 0 & 0 & 0 \\ \mathrm{i} & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_6 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_7 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\mathrm{i} \\ 0 & \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_8 = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

QCD 相互作用顶点

- $\mathcal{L}_{\mathrm{QCD}}$ 中 $g_s G^a_\mu \bar{q}\gamma^\mu t^a q$ 项的相互作用顶点如右图

$$= \mathrm{i} g_s \gamma^\mu t^a$$

- $-\frac{1}{4} G^a_{\mu\nu} G^{a,\mu\nu}$ 项带来非 Abel 规范理论**特有**的以下**规范玻色子自相互作用顶点**——胶子的**三线性**和**四线性**自相互作用顶点

$$= g_s f^{abc}\left[g^{\mu\nu}(k-p)^\rho + g^{\nu\rho}(p-q)^\mu + g^{\rho\mu}(q-k)^\nu\right]$$

$$\begin{aligned} = -\mathrm{i} g_s^2 \big[& f^{abe} f^{cde}(g^{\mu\rho} g^{\nu\sigma} - g^{\mu\sigma} g^{\nu\rho}) \\ & + f^{ace} f^{bde}(g^{\mu\nu} g^{\rho\sigma} - g^{\mu\sigma} g^{\nu\rho}) \\ & + f^{ade} f^{bce}(g^{\mu\nu} g^{\rho\sigma} - g^{\mu\rho} g^{\nu\sigma}) \big] \end{aligned}$$

渐近自由和夸克禁闭

🐒 受高阶量子修正的影响，耦合常数不完全是“常数”，而是会**“跑动”**的，即数值依赖于能标 Q

🍦 在 QED 中，**电磁耦合常数 $\alpha = e^2/(4\pi)$ 随能标升高而增大**

🍨 然而，QCD 的情况相反，**强耦合常数 $\alpha_s = g_s^2/(4\pi)$ 随能标升高而减小**

[PDG 2018]

🍿 由于高能标意味着短距离，这个特性称为 **QCD 的渐近自由**

渐近自由和夸克禁闭

🐒 受高阶量子修正的影响，耦合常数不完全是“常数”，而是会“跑动”的，即数值依赖于能标 Q

🍦 在 QED 中，**电磁耦合常数 $\alpha = e^2/(4\pi)$ 随能标升高而增大**

🍨 然而，QCD 的情况相反，**强耦合常数 $\alpha_s = g_s^2/(4\pi)$ 随能标升高而减小**

[PDG 2018]

🍿 由于高能标意味着短距离，这个特性称为 **QCD 的渐近自由**

🍯 随着能标下降，α_s 越来越大，夸克间相互作用变得越来越强

👉 夸克在低能区被强相互作用紧紧束缚在强子中，这个现象称为**夸克禁闭**

🧁 实验上从来没有发现自由夸克和自由胶子的存在，也没有发现色多重态

🍮 由于质量太大，**顶夸克**会在禁闭之前先衰变，因而不会被束缚在强子中

旋量场手征性与宇称不守恒

- 利用**左手**投影算符 $P_{\mathrm{L}} \equiv \frac{1}{2}(1-\gamma^5)$ 和**右手**投影算符 $P_{\mathrm{R}} \equiv \frac{1}{2}(1+\gamma^5)$
- 将旋量场 $\psi(x)$ 分解为**左手旋量场** $\psi_{\mathrm{L}} \equiv P_{\mathrm{L}}\psi$ 和**右手旋量场** $\psi_{\mathrm{R}} \equiv P_{\mathrm{R}}\psi$
- 对于**无质量**旋量场，或在可忽略质量的**高能极限**下，**手征性等价于螺旋度**
  - **左手场** $\psi_{\mathrm{L}}(x)$ $\begin{cases} \text{左旋正费米子} \\ \text{右旋反费米子} \end{cases}$ **右手场** $\psi_{\mathrm{R}}(x)$ $\begin{cases} \text{右旋正费米子} \\ \text{左旋反费米子} \end{cases}$
- **质量项** $m\bar{\psi}\psi = m(\bar{\psi}_{\mathrm{R}}\psi_{\mathrm{L}} + \bar{\psi}_{\mathrm{L}}\psi_{\mathrm{R}})$ 相当于左右手旋量场的耦合项
- 在**空间反射变换**下，动量方向反转，自旋方向不变，因而螺旋度**符号翻转**

旋量场手征性与宇称不守恒

- 利用**左手**投影算符 $P_{\mathrm{L}} \equiv \frac{1}{2}(1-\gamma^5)$ 和**右手**投影算符 $P_{\mathrm{R}} \equiv \frac{1}{2}(1+\gamma^5)$
- 将旋量场 $\psi(x)$ 分解为**左手旋量场** $\psi_{\mathrm{L}} \equiv P_{\mathrm{L}}\psi$ 和**右手旋量场** $\psi_{\mathrm{R}} \equiv P_{\mathrm{R}}\psi$
- 对于**无质量**旋量场，或在可忽略质量的**高能极限**下，**手征性等价于螺旋度**
  - **左手场** $\psi_{\mathrm{L}}(x)$ $\begin{cases} \text{左旋正费米子} \\ \text{右旋反费米子} \end{cases}$ **右手场** $\psi_{\mathrm{R}}(x)$ $\begin{cases} \text{右旋正费米子} \\ \text{左旋反费米子} \end{cases}$
- **质量项** $m\bar{\psi}\psi = m(\bar{\psi}_{\mathrm{R}}\psi_{\mathrm{L}} + \bar{\psi}_{\mathrm{L}}\psi_{\mathrm{R}})$ 相当于左右手旋量场的耦合项
- 在**空间反射变换**下，动量方向反转，自旋方向不变，因而螺旋度**符号翻转**
- 对于**宇称守恒**的理论，如**量子电动力学**和**量子色动力学**，存在空间反射对称性，左右手旋量场具有**相同**的相互作用
- 在**弱相互作用**中，**宇称不守恒**，不存在空间反射对称性，其根源在于**左右手旋量场参与不同的规范相互作用**

电弱规范理论

- 电弱规范理论的规范群是 $\mathbf{SU(2)_L} \times \mathbf{U(1)_Y}$
- 每一代左手旋量场构成 2 个 $\mathbf{SU(2)_L}$ 二重态

$$L_{i\mathrm{L}} = \begin{pmatrix} P_{\mathrm{L}}\nu_i \\ P_{\mathrm{L}}\ell_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \nu_{i\mathrm{L}} \\ \ell_{i\mathrm{L}} \end{pmatrix}, \quad Q_{i\mathrm{L}} = \begin{pmatrix} P_{\mathrm{L}}u'_i \\ P_{\mathrm{L}}d'_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u'_{i\mathrm{L}} \\ d'_{i\mathrm{L}} \end{pmatrix}, \quad i = 1, 2, 3$$

- 它们的协变导数是 $D_\mu = \partial_\mu - \mathrm{i}gW^a_\mu\tau^a - \mathrm{i}g'B_\mu Y$

电弱规范理论

- 电弱规范理论的规范群是 $\mathbf{SU(2)_L} \times \mathbf{U(1)_Y}$
- 每一代左手旋量场构成 2 个 $\mathbf{SU(2)_L}$ 二重态

$$L_{i\mathrm{L}} = \begin{pmatrix} P_\mathrm{L}\nu_i \\ P_\mathrm{L}\ell_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \nu_{i\mathrm{L}} \\ \ell_{i\mathrm{L}} \end{pmatrix}, \quad Q_{i\mathrm{L}} = \begin{pmatrix} P_\mathrm{L}u'_i \\ P_\mathrm{L}d'_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u'_{i\mathrm{L}} \\ d'_{i\mathrm{L}} \end{pmatrix}, \quad i = 1, 2, 3$$

- 它们的协变导数是 $D_\mu = \partial_\mu - \mathrm{i}gW^a_\mu\tau^a - \mathrm{i}g'B_\mu Y$
- $W^a_\mu(x)$ $(a = 1, 2, 3)$ 是 $\mathrm{SU(2)_L}$ 规范场，$B_\mu(x)$ 是 $\mathbf{U(1)_Y}$ 规范场
- g 和 g' 分别是 $\mathbf{SU(2)_L}$ 和 $\mathbf{U(1)_Y}$ 的规范耦合常数
- $\tau^a = \sigma^a/2$ 是 $\mathrm{SU(2)_L}$ 群基础表示的生成元，对应于弱同位旋
- 生成元 τ^3 的本征值是弱同位旋第 3 分量，记为 T^3；Y 是弱超荷

电弱规范理论

- 电弱规范理论的规范群是 $\mathbf{SU(2)_L} \times \mathbf{U(1)_Y}$
- 每一代左手旋量场构成 2 个 $\mathbf{SU(2)_L}$ 二重态

$$L_{i\mathrm{L}} = \begin{pmatrix} P_\mathrm{L}\nu_i \\ P_\mathrm{L}\ell_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \nu_{i\mathrm{L}} \\ \ell_{i\mathrm{L}} \end{pmatrix}, \quad Q_{i\mathrm{L}} = \begin{pmatrix} P_\mathrm{L}u'_i \\ P_\mathrm{L}d'_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u'_{i\mathrm{L}} \\ d'_{i\mathrm{L}} \end{pmatrix}, \quad i = 1, 2, 3$$

- 它们的协变导数是 $D_\mu = \partial_\mu - \mathrm{i}gW^a_\mu\tau^a - \mathrm{i}g'B_\mu Y$
- $W^a_\mu(x)$ $(a = 1, 2, 3)$ 是 $\mathrm{SU(2)_L}$ 规范场，$B_\mu(x)$ 是 $\mathbf{U(1)_Y}$ 规范场
- g 和 g' 分别是 $\mathbf{SU(2)_L}$ 和 $\mathbf{U(1)_Y}$ 的规范耦合常数
- $\tau^a = \sigma^a/2$ 是 $\mathrm{SU(2)_L}$ 群基础表示的生成元，对应于弱同位旋
- 生成元 τ^3 的本征值是弱同位旋第 3 分量，记为 T^3；Y 是弱超荷
- 各代右手旋量场 $\ell_{i\mathrm{R}} = P_\mathrm{R}\ell_i$、$u'_{i\mathrm{R}} = P_\mathrm{R}u'_i$ 和 $d'_{i\mathrm{R}} = P_\mathrm{R}d'_i$ 是 $\mathbf{SU(2)_L}$ 单态
- 它们的协变导数为 $D_\mu = \partial_\mu - \mathrm{i}g'B_\mu Y$
- 这里 u'_i 和 d'_i 是夸克场的规范本征态

旋量场的电弱量子数

🏛️ **电荷** $Q \equiv T^3 + Y$ 由**弱同位旋第 3 分量**和**弱超荷**定义

🦀 **下表**列出三代旋量场的弱同位旋第 3 分量 T^3、弱超荷 Y 和电荷 Q

统一记号	第 1 代	第 2 代	第 3 代	T^3	Y	Q
$L_{i\mathrm{L}} = \begin{pmatrix} \nu_{i\mathrm{L}} \\ \ell_{i\mathrm{L}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \nu_{e\mathrm{L}} \\ e_{\mathrm{L}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \nu_{\mu\mathrm{L}} \\ \mu_{\mathrm{L}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \nu_{\tau\mathrm{L}} \\ \tau_{\mathrm{L}} \end{pmatrix}$	$1/2$ $-1/2$	$-1/2$ $-1/2$	0 -1
$Q_{i\mathrm{L}} = \begin{pmatrix} u'_{i\mathrm{L}} \\ d'_{i\mathrm{L}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} u'_{\mathrm{L}} \\ d'_{\mathrm{L}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} c'_{\mathrm{L}} \\ s'_{\mathrm{L}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} t'_{\mathrm{L}} \\ b'_{\mathrm{L}} \end{pmatrix}$	$1/2$ $-1/2$	$1/6$ $1/6$	$2/3$ $-1/3$
$\ell_{i\mathrm{R}}$	e_{R}	μ_{R}	τ_{R}	0	-1	-1
$u'_{i\mathrm{R}}$	u'_{R}	c'_{R}	t'_{R}	0	$2/3$	$2/3$
$d'_{i\mathrm{R}}$	d'_{R}	s'_{R}	b'_{R}	0	$-1/3$	$-1/3$

Brout–Englert–Higgs 机制

❗ 夸克、带电轻子、Z^0 和 $W^\pm$ 都具有**质量**，但现在 $\mathrm{SU(2)_L \times U(1)_Y}$ 规范不变的拉氏量**不能具有任何质量项**

😊 规范对称性使规范理论具有非常良好的性质，特别是**可重整性**

😟 在规范理论中直接放入**规范场的质量项**，会**破坏规范对称性**

😨 **左右手旋量场**参与不同的规范相互作用，直接引入**质量项**也会**破坏规范对称性**

Brout–Englert–Higgs 机制

❗ 夸克、带电轻子、Z^0 和 $W^\pm$ 都具有**质量**，但现在 $\mathrm{SU(2)_L \times U(1)_Y}$ 规范不变的拉氏量**不能具有任何质量项**

😊 规范对称性使规范理论具有非常良好的性质，特别是**可重整性**

😟 在规范理论中直接放入**规范场的质量项**，会**破坏规范对称性**

😨 **左右手旋量场**参与不同的规范相互作用，直接引入**质量项**也会**破坏规范对称性**

🤔 为了在保证可重整性的同时提供规范玻色子和费米子的**质量**，需要引入 **Brout–Englert–Higgs (BEH) 机制**，使 $\mathrm{SU(2)_L \times U(1)_Y}$ 对称性自发破缺

🏟️ 引进 **Higgs 标量场** $\Phi = \begin{pmatrix} \phi^+ \\ \phi^0 \end{pmatrix}$，$\phi^+$ 和 ϕ^0 都是复标量场

⚽ Φ 是 **$\mathrm{SU(2)_L}$ 二重态**，具有弱超荷 $Y = 1/2$，电弱规范不变的拉氏量为

$$\mathcal{L}_\mathrm{H} = (D^\mu \Phi)^\dagger (D_\mu \Phi) - V_\mathrm{H}(\Phi), \quad V_\mathrm{H}(\Phi) = -\mu^2 \Phi^\dagger \Phi + \lambda (\Phi^\dagger \Phi)^2$$

🏈 协变导数为 $D_\mu = \partial_\mu - \mathrm{i} g W_\mu^a \tau^a - \mathrm{i} g' Y B_\mu$

🏉 $V_\mathrm{H}(\Phi)$ 是 Higgs 标量场的**势能项**，依赖于 $\Phi^\dagger \Phi = |\phi^+|^2 + |\phi^0|^2$

自发对称性破缺

- Higgs 场**势能**的行为由二次项系数 μ^2 和四次项系数 λ 决定；**假设** $\lambda > 0$
- **如果** $\mu^2 < 0$，势能项 $V_{\mathrm{H}}(\Phi)$ 的最小值对应于 $\Phi^\dagger\Phi = 0$；Higgs 场的真空期待值为 $\langle\Phi\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$，它在电弱规范变换下**不变**，故**规范对称性未受到破坏**

自发对称性破缺

- Higgs 场势能的行为由二次项系数 μ^2 和四次项系数 λ 决定；假设 $\lambda > 0$
- 如果 $\mu^2 < 0$，势能项 $V_{\rm H}(\Phi)$ 的最小值对应于 $\Phi^\dagger\Phi = 0$；Higgs 场的真空期待值为 $\langle\Phi\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$，它在电弱规范变换下不变，故规范对称性未受到破坏
- 如果 $\mu^2 > 0$，$\Phi^\dagger\Phi = 0$ 处变成 $V_{\rm H}(\Phi)$ 的极大值，而最小值位于 $\Phi^\dagger\Phi = v^2/2$ 对应的 3 维球面上，其中 $v = \sqrt{\mu^2/\lambda}$
- 若压缩掉 ϕ^+ 的实部和虚部两个维度，则 $V_{\rm H}(\Phi)$ 在 ϕ^0 的实部和虚部坐标上呈现右图所示墨西哥草帽状的形式

- Higgs 场的真空期待值位于上述 3 维球面上的某一点，可取为 $\langle\Phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix}$
- 电弱规范变换会改变这个期待值，故真空态不满足电弱规范对称性
- 这种拉氏量满足对称性、真空态却不满足的现象称为对称性自发破缺

幺正规范

🏤 不失一般性地将 **Higgs 场真空期待值** 取为 $\langle\Phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\ v\end{pmatrix}$ 之后，其它真空期待值可以通过 $\mathbf{SU(2)_L \times U(1)_Y}$ **整体变换** $\langle\Phi\rangle \to \exp(\mathrm{i}\alpha^a\tau^a)\exp(\mathrm{i}\alpha^Y Y_H)\langle\Phi\rangle$ 得到

🍞 这是因为 $\left\langle\Phi^\dagger\Phi\right\rangle$ 在**这样的变换**下保持**不变**

幺正规范

🏤 不失一般性地将 **Higgs 场真空期待值** 取为 $\langle\Phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\ v\end{pmatrix}$ 之后，其它真空期待值可以通过 $\mathbf{SU(2)_L \times U(1)_Y}$ **整体变换** $\langle\Phi\rangle \to \exp(\mathrm{i}\alpha^a\tau^a)\exp(\mathrm{i}\alpha^Y Y_H)\langle\Phi\rangle$ 得到

🍞 这是因为 $\langle\Phi^\dagger\Phi\rangle$ 在**这样的变换**下保持**不变**

🥖 若 $\alpha^1 = \alpha^2 = 0$ 且 $\alpha^3 = \alpha^Y$，则 $\langle\Phi\rangle$ 在变换下**不变**，因此有 **1 个方向**的规范对称性**没有受到破坏**，只有 **3 个方向**的规范对称性发生**自发破缺**

🧈 根据 **Goldstone 定理**，破缺后生成 **3 个无质量的 Nambu-Goldstone 玻色子**

🧀 有 **3 个规范玻色子**结合 3 个 Nambu-Goldstone 玻色子，通过 **BEH 机制**获得**质量**

幺正规范

🏤 不失一般性地将 **Higgs 场真空期待值** 取为 $\langle\Phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\ v\end{pmatrix}$ 之后，其它真空期待值可以通过 $\mathbf{SU(2)_L \times U(1)_Y}$ **整体变换** $\langle\Phi\rangle \to \exp(\mathrm{i}\alpha^a\tau^a)\exp(\mathrm{i}\alpha^Y Y_H)\langle\Phi\rangle$ 得到

🍞 这是因为 $\langle\Phi^\dagger\Phi\rangle$ 在**这样的变换**下保持**不变**

🥖 若 $\alpha^1 = \alpha^2 = 0$ 且 $\alpha^3 = \alpha^Y$，则 $\langle\Phi\rangle$ 在变换下**不变**，因此有 **1 个方向**的规范对称性**没有受到破坏**，只有 **3 个方向**的规范对称性发生**自发破缺**

🧈 根据 **Goldstone 定理**，破缺后生成 **3 个无质量的 Nambu-Goldstone 玻色子**

🧀 有 **3 个规范玻色子**结合 3 个 Nambu-Goldstone 玻色子，通过 **BEH 机制**获得**质量**

🧇 以 $\langle\Phi\rangle$ 为基础，将 Higgs 场参数化为 $\Phi(x) = \exp\left[-\mathrm{i}\,\frac{\chi^a(x)}{v}\,\tau^a\right]\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\ v+H(x)\end{pmatrix}$

🥞 χ^a 和 H 都是实标量场，而 $\exp[-\mathrm{i}\chi^a\tau^a/v]$ 因子能够通过 $\mathbf{SU(2)_L}$ **规范变换消去**

🍩 因而可以直接取 $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\ v+H(x)\end{pmatrix}$，这种取法称为**幺正规范**

Higgs 玻色子

在**幺正规范**下，$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 \\ v + H(x) \end{pmatrix}$，$\Phi^\dagger\Phi = \frac{1}{2}(v+H)^2$

此时 Higgs 场只剩下一个**物理自由度** $H(x)$，势能项化为

$$-V_{\mathrm{H}}(\Phi) = \frac{1}{2}\mu^2(v+H)^2 - \frac{1}{4}\lambda(v+H)^4 = \frac{1}{4}\mu^2 v^2 - \frac{1}{2}m_H^2 H^2 - \frac{m_H^2}{2v}H^3 - \frac{m_H^2}{8v^2}H^4$$

实标量场 $H(x)$ 对应于一个中性标量粒子 H，称为 **Higgs 玻色子**

Higgs 玻色子的**质量**为 $m_H \equiv \sqrt{2}\mu = \sqrt{2\lambda}v$，具有**三线性**和**四线性**自相互作用

$$= -\frac{3\mathrm{i}m_H^2}{v}$$

$$= -\frac{3\mathrm{i}m_H^2}{v^2}$$

电弱规范玻色子的质量项

由于 $g'B_\mu Y_H + gW_\mu^a\tau^a = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} g'B_\mu + gW_\mu^3 & g(W_\mu^1 - \mathrm{i}W_\mu^2) \\ g(W_\mu^1 + \mathrm{i}W_\mu^2) & g'B_\mu - gW_\mu^3 \end{pmatrix}$

真空期待值 v 对协变导数 $D_\mu\Phi = [\partial_\mu - \mathrm{i}(g'B_\mu Y_H + gW_\mu^a\tau^a)]\Phi$ 的贡献为

$$D_\mu\Phi \supset (g'B_\mu Y_H + gW_\mu^a\tau^a)\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix} \supset \frac{v}{2\sqrt{2}}\begin{pmatrix} g(W_\mu^1 - \mathrm{i}W_\mu^2) \\ g'B_\mu - gW_\mu^3 \end{pmatrix}$$

故 v 对协变动能项的贡献是

$$\begin{aligned}(D^\mu\Phi)^\dagger(D_\mu\Phi) &\supset \frac{v^2}{8}[g^2|W_\mu^1 - \mathrm{i}W_\mu^2|^2 + (g'B_\mu - gW_\mu^3)^2] \\ &= \frac{v^2}{8}\begin{pmatrix} W^{1\mu} & W^{2\mu} & W^{3\mu} & B^\mu \end{pmatrix}\begin{pmatrix} g^2 & & & \\ & g^2 & & \\ & & g^2 & -gg' \\ & & -gg' & g'^2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} W_\mu^1 \\ W_\mu^2 \\ W_\mu^3 \\ B_\mu \end{pmatrix}\end{aligned}$$

这些项是规范玻色子的质量项

Weinberg 转动

- 将上面这些**质量项**重新表达为

$$\mathcal{L}_{\mathrm{GBM}} = \frac{1}{2} m_W^2 (W^{1\mu} W^1_\mu + W^{2\mu} W^2_\mu) + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} W^{3\mu} & B^\mu \end{pmatrix} M^2_{W^3 B} \begin{pmatrix} W^3_\mu \\ B_\mu \end{pmatrix}$$

- W^1_μ 和 W^2_μ 获得的**质量** $m_W \equiv \frac{1}{2} g v$
- $W^{3\mu}$ 和 B^μ 的**质量平方矩阵**为 $M^2_{W^3 B} \equiv \frac{v^2}{4} \begin{pmatrix} g^2 & -gg' \\ -gg' & g'^2 \end{pmatrix}$

Weinberg 转动

- 将上面这些**质量项**重新表达为

$$\mathcal{L}_{\mathrm{GBM}} = \frac{1}{2} m_W^2 (W^{1\mu} W^1_\mu + W^{2\mu} W^2_\mu) + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} W^{3\mu} & B^\mu \end{pmatrix} M^2_{W^3 B} \begin{pmatrix} W^3_\mu \\ B_\mu \end{pmatrix}$$

- W^1_μ 和 W^2_μ 获得的**质量** $m_W \equiv \frac{1}{2} g v$
- $W^{3\mu}$ 和 B^μ 的**质量平方矩阵**为 $M^2_{W^3 B} \equiv \frac{v^2}{4} \begin{pmatrix} g^2 & -gg' \\ -gg' & g'^2 \end{pmatrix}$
- 为了使 $M^2_{W^3 B}$ 矩阵**对角化**，定义 $\begin{pmatrix} Z_\mu \\ A_\mu \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} c_{\mathrm{W}} & -s_{\mathrm{W}} \\ s_{\mathrm{W}} & c_{\mathrm{W}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} W^3_\mu \\ B_\mu \end{pmatrix}$
- 其中 $s_{\mathrm{W}} \equiv \sin\theta_{\mathrm{W}} = \frac{g'}{\sqrt{g^2 + g'^2}}$，$c_{\mathrm{W}} \equiv \cos\theta_{\mathrm{W}} = \frac{g}{\sqrt{g^2 + g'^2}}$
- θ_{W} 称为 **Weinberg 角**，也称为**弱混合角**
- 从后面的讨论可以看出 A_μ 就是**电磁场**，对应于光子；Z_μ 对应于**矢量玻色子** Z

Z 玻色子的质量

反过来，有 $\begin{pmatrix} W^3_\mu \\ B_\mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_\mathrm{W} & s_\mathrm{W} \\ -s_\mathrm{W} & c_\mathrm{W} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Z_\mu \\ A_\mu \end{pmatrix}$

利用 $M^2_{W^3B} = \dfrac{v^2}{4}\begin{pmatrix} g^2 & -gg' \\ -gg' & g'^2 \end{pmatrix} = \dfrac{(g^2+g'^2)v^2}{4}\begin{pmatrix} c_\mathrm{W}^2 & -s_\mathrm{W}c_\mathrm{W} \\ -s_\mathrm{W}c_\mathrm{W} & s_\mathrm{W}^2 \end{pmatrix}$，推出

$$\frac{1}{2}\begin{pmatrix} W^{3\mu} & B^\mu \end{pmatrix} M^2_{W^3B} \begin{pmatrix} W^3_\mu \\ B_\mu \end{pmatrix}$$

$$= \frac{(g^2+g'^2)v^2}{8}\begin{pmatrix} Z^\mu & A^\mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_\mathrm{W} & -s_\mathrm{W} \\ s_\mathrm{W} & c_\mathrm{W} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_\mathrm{W}^2 & -s_\mathrm{W}c_\mathrm{W} \\ -s_\mathrm{W}c_\mathrm{W} & s_\mathrm{W}^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_\mathrm{W} & s_\mathrm{W} \\ -s_\mathrm{W} & c_\mathrm{W} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Z_\mu \\ A_\mu \end{pmatrix}$$

$$= \frac{(g^2+g'^2)v^2}{8}\begin{pmatrix} Z^\mu & A^\mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \\ & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Z_\mu \\ A_\mu \end{pmatrix} = \frac{1}{2} m_Z^2 Z^\mu Z_\mu$$

可见，Z **玻色子的质量**是 $m_Z \equiv \dfrac{1}{2}\sqrt{g^2+g'^2}\,v = \dfrac{gv}{2c_\mathrm{W}} = \dfrac{m_W}{c_\mathrm{W}}$，而**光子没有质量**

实验测得 $m_Z = 91.2$ GeV 和 $m_W = 80.4$ GeV，故 $\theta_\mathrm{W} = \cos^{-1}\dfrac{m_W}{m_Z} = 28.2^\circ$

$W^\pm$ 玻色子的质量

- 另一方面，用质量相同的实矢量场 W_μ^1 和 W_μ^2 线性组合出**复矢量场**

$$W_\mu^+ \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}(W_\mu^1 - \mathrm{i}W_\mu^2)$$

- 它的厄米共轭为 $W_\mu^- \equiv (W_\mu^+)^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}(W_\mu^1 + \mathrm{i}W_\mu^2)$
- 则 $W_\mu^1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(W_\mu^+ + W_\mu^-)$，$W_\mu^2 = \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}}(W_\mu^+ - W_\mu^-)$
- 从而 $\frac{1}{2}(W^{1\mu}W_\mu^1 + W^{2\mu}W_\mu^2) = W^{+\mu}W_\mu^-$，于是

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{\mathrm{GBM}} &= \frac{1}{2}m_W^2(W^{1\mu}W_\mu^1 + W^{2\mu}W_\mu^2) + \frac{1}{2}\begin{pmatrix}W^{3\mu} & B^\mu\end{pmatrix} M_{W^3B}^2 \begin{pmatrix}W_\mu^3 \\ B_\mu\end{pmatrix} \\ &= m_W^2 W^{+\mu}W_\mu^- + \frac{1}{2}m_Z^2 Z^\mu Z_\mu\end{aligned}$$

- 复矢量场 $W_\mu^\pm$ 描述一对**正反矢量玻色子 $W^\pm$**，**质量为 m_W**
- 可见，**BEH 机制**使传递**弱相互作用**的规范玻色子 $W^\pm$ 和 Z 获得了**质量**，有 3 个 Higgs 场自由度变成它们的**纵向极化分量**

用规范玻色子质量态表达

- 接下来用**质量本征态** $W_\mu^\pm$、A^μ 和 Z_μ 表达 $(D^\mu\Phi)^\dagger(D_\mu\Phi)$
- 由 $B_\mu = c_\mathrm{W} A_\mu - s_\mathrm{W} Z_\mu$ 和 $W_\mu^3 = s_\mathrm{W} A_\mu + c_\mathrm{W} Z_\mu$ 得

$$
\begin{aligned}
g' B_\mu + g W_\mu^3 &= g'(c_\mathrm{W} A_\mu - s_\mathrm{W} Z_\mu) + g(s_\mathrm{W} A_\mu + c_\mathrm{W} Z_\mu) \\
&= \frac{2gg'}{\sqrt{g^2+g'^2}} A_\mu + \frac{g^2 - g'^2}{\sqrt{g^2+g'^2}} Z_\mu = 2eA_\mu + \frac{g}{c_\mathrm{W}}(c_\mathrm{W}^2 - s_\mathrm{W}^2) Z_\mu
\end{aligned}
$$

- 其中 $e \equiv \dfrac{gg'}{\sqrt{g^2+g'^2}} = g s_\mathrm{W} = g' c_\mathrm{W}$，后面讨论将表明 e 就是**单位电荷量**
- 协变导数 $D_\mu\Phi = [\partial_\mu - \mathrm{i}(g' B_\mu Y_H + g W_\mu^a \tau^a)]\Phi$ 中的**相关因子**化为

$$
\begin{aligned}
g' B_\mu Y_H + g W_\mu^a \tau^a &= \frac{1}{2}\begin{pmatrix} g' B_\mu + g W_\mu^3 & g(W_\mu^1 - \mathrm{i} W_\mu^2) \\ g(W_\mu^1 + \mathrm{i} W_\mu^2) & g' B_\mu - g W_\mu^3 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} e A_\mu + \dfrac{g}{2c_\mathrm{W}}(c_\mathrm{W}^2 - s_\mathrm{W}^2) Z_\mu & \dfrac{g}{\sqrt{2}} W_\mu^+ \\ \dfrac{g}{\sqrt{2}} W_\mu^- & -\dfrac{g}{2c_\mathrm{W}} Z_\mu \end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

Higgs 场协变动能项

- 于是，幺正规范下的 **Higgs 场协变动能项**化为

$$
\begin{aligned}
(D^\mu\Phi)^\dagger(D_\mu\Phi) = \frac{1}{2}(\partial^\mu H)(\partial_\mu H) \\
+ m_W^2 W_\mu^+ W^{-,\mu} + \frac{1}{2} m_Z^2 Z_\mu Z^\mu \\
+ \frac{2m_W^2}{v} H W_\mu^+ W^{-,\mu} + \frac{m_Z^2}{v} H Z_\mu Z^\mu \\
+ \frac{m_W^2}{v^2} H^2 W_\mu^+ W^{-,\mu} + \frac{m_Z^2}{2v^2} H^2 Z_\mu Z^\mu
\end{aligned}
$$

$$= \frac{2\mathrm{i}m_W^2}{v} g^{\mu\nu}$$

$$= \frac{2\mathrm{i}m_Z^2}{v} g^{\mu\nu}$$

- 除了 $W^\pm$ 和 Z 玻色子的质量项之外
- 还出现了 Higgs 玻色子 H 与 $W^\pm$、Z 的三线性和四线性耦合项

$$= \frac{2\mathrm{i}m_W^2}{v^2} g^{\mu\nu}$$

$$= \frac{2\mathrm{i}m_Z^2}{v^2} g^{\mu\nu}$$

Yukawa 相互作用

- Higgs 场 $\Phi(x)$ 的**弱超荷**为 $+1/2$，记 $\phi^- \equiv (\phi^+)^*$，引入 $\Phi(x)$ 的**共轭态**

$$\tilde{\Phi}(x) = \mathrm{i}\sigma^2\Phi^*(x) = \begin{pmatrix} & 1 \\ -1 & \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \phi^-(x) \\ \phi^{0*}(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \phi^{0*}(x) \\ -\phi^-(x) \end{pmatrix}$$

- 则 $\tilde{\Phi}(x)$ 是**弱超荷**为 $-1/2$ 的 $\mathrm{SU}(2)_\mathrm{L}$ 二重态

- 在**幺正规范**下，$\tilde{\Phi}(x) = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} & 1 \\ -1 & \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ v + H(x) \end{pmatrix} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} v + H(x) \\ 0 \end{pmatrix}$

Yukawa 相互作用

- Higgs 场 $\Phi(x)$ 的弱超荷为 $+1/2$，记 $\phi^- \equiv (\phi^+)^*$，引入 $\Phi(x)$ 的共轭态

$$\tilde{\Phi}(x) = \mathrm{i}\sigma^2\Phi^*(x) = \begin{pmatrix} & 1 \\ -1 & \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \phi^-(x) \\ \phi^{0*}(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \phi^{0*}(x) \\ -\phi^-(x) \end{pmatrix}$$

- 则 $\tilde{\Phi}(x)$ 是弱超荷为 $-1/2$ 的 $\mathrm{SU}(2)_\mathrm{L}$ 二重态

- 在幺正规范下，$\tilde{\Phi}(x) = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} & 1 \\ -1 & \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ v + H(x) \end{pmatrix} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} v + H(x) \\ 0 \end{pmatrix}$

- 与费米子场组成满足 $\mathrm{SU}(2)_\mathrm{L} \times \mathrm{U}(1)_\mathrm{Y}$ 规范对称性的 **Yukawa 相互作用拉氏量**

$$\mathcal{L}_\mathrm{Y} = -\tilde{y}_{d,ij}\bar{Q}_{i\mathrm{L}}d'_{j\mathrm{R}}\Phi - \tilde{y}_{u,ij}\bar{Q}_{i\mathrm{L}}u'_{j\mathrm{R}}\tilde{\Phi} - y_{\ell_i}\bar{L}_{i\mathrm{L}}\ell_{i\mathrm{R}}\Phi + \mathrm{H.c.}$$

- 其中 H.c. 表示厄米共轭
- **Yukawa 耦合常数** $\tilde{y}_{d,ij}$ 和 $\tilde{y}_{u,ij}$ 联系着不同代的夸克场
- **Yukawa 耦合常数** y_{ℓ_i} 只联系同一代的轻子场

幺正规范下的 Yukawa 相互作用

在幺正规范下，利用

$$\bar{Q}_{i\mathrm{L}}\Phi = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}\bar{u}'_{i\mathrm{L}} & \bar{d}'_{i\mathrm{L}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\ v+H\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(v+H)\bar{d}'_{i\mathrm{L}}$$

$$\bar{Q}_{i\mathrm{L}}\tilde{\Phi} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}\bar{u}'_{i\mathrm{L}} & \bar{d}'_{i\mathrm{L}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}v+H\\ 0\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(v+H)\bar{u}'_{i\mathrm{L}}$$

$$\bar{L}_{i\mathrm{L}}\Phi = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}\bar{\nu}_{i\mathrm{L}} & \bar{\ell}_{i\mathrm{L}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\ v+H\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(v+H)\bar{\ell}_{i\mathrm{L}}$$

推出 $\mathcal{L}_{\mathrm{Y}} = -\frac{1}{\sqrt{2}}(v+H)(\tilde{y}_{d,ij}\bar{d}'_{i\mathrm{L}}d'_{j\mathrm{R}} + \tilde{y}_{u,ij}\bar{u}'_{i\mathrm{L}}u'_{j\mathrm{R}} + y_{\ell_i}\bar{\ell}_{i\mathrm{L}}\ell_{i\mathrm{R}} + \mathrm{H.c.})$

$\tilde{y}_{d,ij}$ 和 $\tilde{y}_{u,ij}$ 可看作 **3×3 矩阵** $\tilde{y}_d$ 和 $\tilde{y}_u$ 的元素

$\tilde{y}_d\tilde{y}_d^\dagger$ 和 $\tilde{y}_u\tilde{y}_u^\dagger$ 是**厄米矩阵**，必定可以分别通过**幺正矩阵** U_d 和 U_u 对角化成 y_{D}^2 和 y_{U}^2 两个对角元为实数的**对角矩阵**，满足 $U_d^\dagger\tilde{y}_d\tilde{y}_d^\dagger U_d = y_{\mathrm{D}}^2$ 和 $U_u^\dagger\tilde{y}_u\tilde{y}_u^\dagger U_u = y_{\mathrm{U}}^2$，即

$$\tilde{y}_d\tilde{y}_d^\dagger = U_d y_{\mathrm{D}}^2 U_d^\dagger, \quad \tilde{y}_u\tilde{y}_u^\dagger = U_u y_{\mathrm{U}}^2 U_u^\dagger$$

Yukawa 耦合矩阵的对角化

🏘️ 符合 $\tilde{y}_d\tilde{y}_d^\dagger = U_d y_{\rm D}^2 U_d^\dagger$ 和 $\tilde{y}_u\tilde{y}_u^\dagger = U_u y_{\rm U}^2 U_u^\dagger$ 的 $\tilde{y}_d$ 和 $\tilde{y}_u$ 可以表达为

$$\tilde{y}_d = U_d y_{\rm D} K_d^\dagger, \quad \tilde{y}_u = U_u y_{\rm U} K_u^\dagger$$

🥟 **对角矩阵** $y_{\rm D}$ 和 $y_{\rm U}$ 满足 $y_{\rm D}y_{\rm D} = y_{\rm D}^2$ 和 $y_{\rm U}y_{\rm U} = y_{\rm U}^2$，$K_d^\dagger$ 和 $K_u^\dagger$ 是两个**幺正矩阵**

🥮 将 $y_{\rm D}$ 和 $y_{\rm U}$ 表示成

$$y_{\rm D} = \begin{pmatrix} y_{d_1} & & \\ & y_{d_2} & \\ & & y_{d_3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_d & & \\ & y_s & \\ & & y_b \end{pmatrix}, \quad y_{\rm U} = \begin{pmatrix} y_{u_1} & & \\ & y_{d_2} & \\ & & y_{d_3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_u & & \\ & y_c & \\ & & y_t \end{pmatrix}$$

Yukawa 耦合矩阵的对角化

🏘️ 符合 $\tilde{y}_d\tilde{y}_d^\dagger = U_d y_{\rm D}^2 U_d^\dagger$ 和 $\tilde{y}_u\tilde{y}_u^\dagger = U_u y_{\rm U}^2 U_u^\dagger$ 的 $\tilde{y}_d$ 和 $\tilde{y}_u$ 可以表达为

$$\tilde{y}_d = U_d y_{\rm D} K_d^\dagger, \quad \tilde{y}_u = U_u y_{\rm U} K_u^\dagger$$

🫓 **对角矩阵** $y_{\rm D}$ 和 $y_{\rm U}$ 满足 $y_{\rm D}y_{\rm D} = y_{\rm D}^2$ 和 $y_{\rm U}y_{\rm U} = y_{\rm U}^2$，$K_d^\dagger$ 和 $K_u^\dagger$ 是两个**幺正矩阵**

🥮 将 $y_{\rm D}$ 和 $y_{\rm U}$ 表示成

$$y_{\rm D} = \begin{pmatrix} y_{d_1} & & \\ & y_{d_2} & \\ & & y_{d_3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_d & & \\ & y_s & \\ & & y_b \end{pmatrix}, \quad y_{\rm U} = \begin{pmatrix} y_{u_1} & & \\ & y_{d_2} & \\ & & y_{d_3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_u & & \\ & y_c & \\ & & y_t \end{pmatrix}$$

🥫 定义 $d_{i\rm L} \equiv (U_d^\dagger)_{ij} d'_{j\rm L}$，$d_{i\rm R} \equiv (K_d^\dagger)_{ij} d'_{j\rm R}$，$u_{i\rm L} \equiv (U_u^\dagger)_{ij} u'_{j\rm L}$ 和 $u_{i\rm R} \equiv (K_u^\dagger)_{ij} u'_{j\rm R}$

🍼 从而，$\bar{d}_{i\rm L} = \bar{d}'_{j\rm L} U_{d,ji}$，$\bar{u}_{i\rm L} = \bar{u}'_{j\rm L} U_{u,ji}$，则

$$\tilde{y}_{d,ij}\bar{d}'_{i\rm L} d'_{j\rm R} = \bar{d}'_{i\rm L}(U_d y_d K_d^\dagger)_{ij} d'_{j\rm R} = \bar{d}'_{i\rm L} U_{d,ik} y_{d_k} (K_d^\dagger)_{kj} d'_{j\rm R} = y_{d_k}\bar{d}_{k\rm L} d_{k\rm R} = y_{d_i}\bar{d}_{i\rm L} d_{i\rm R}$$

$$\tilde{y}_{u,ij}\bar{u}'_{i\rm L} u'_{j\rm R} = \bar{u}'_{i\rm L}(U_u y_u K_u^\dagger)_{ij} u'_{j\rm R} = y_{u_i}\bar{u}_{i\rm L} u_{i\rm R}$$

费米子质量和 Yukawa 耦合

- 于是得到

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{\mathrm{Y}} &= -\frac{1}{\sqrt{2}}(v+H)(y_{d_i}\bar{d}_{i\mathrm{L}}d_{i\mathrm{R}} + y_{u_i}\bar{u}_{i\mathrm{L}}u_{i\mathrm{R}} + y_{\ell_i}\bar{\ell}_{i\mathrm{L}}\ell_{i\mathrm{R}} + \mathrm{H.c.}) \\ &= -m_{d_i}\bar{d}_i d_i - m_{u_i}\bar{u}_i u_i - m_{\ell_i}\bar{\ell}_i\ell_i - \frac{m_{d_i}}{v}H\bar{d}_i d_i - \frac{m_{u_i}}{v}H\bar{u}_i u_i - \frac{m_{\ell_i}}{v}H\bar{\ell}_i\ell_i\end{aligned}$$

- 其中前三项是**费米子质量项**，后三项是 Higgs 玻色子与费米子的 **Yukawa 耦合项**
- 于是，三代夸克和带电轻子获得了**质量**

$$m_{d_i} \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}y_{d_i}v, \quad m_{u_i} \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}y_{u_i}v$$

$$m_{\ell_i} \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}y_{\ell_i}v$$

$$= -\frac{\mathrm{i}m_f}{v}$$

- $d'_{i\mathrm{L}}$、$d'_{i\mathrm{R}}$、$u'_{i\mathrm{L}}$ 和 $u'_{i\mathrm{R}}$ 是夸克**规范本征态**
- $d_{i\mathrm{L}}$、$d_{i\mathrm{R}}$、$u_{i\mathrm{L}}$ 和 $u_{i\mathrm{R}}$ 是夸克**质量本征态**

Cabibbo-Kobayashi-Maskawa 矩阵

🏨 $d_{i\mathrm{L}} \equiv (U_d^\dagger)_{ij} d'_{j\mathrm{L}}$ ， $d_{i\mathrm{R}} \equiv (K_d^\dagger)_{ij} d'_{j\mathrm{R}}$ ， $u_{i\mathrm{L}} \equiv (U_u^\dagger)_{ij} u'_{j\mathrm{L}}$ 和 $u_{i\mathrm{R}} \equiv (K_u^\dagger)_{ij} u'_{j\mathrm{R}}$ 表明

$$d'_{i\mathrm{L}} = U_{d,ij} d_{j\mathrm{L}}, \quad d'_{i\mathrm{R}} = K_{d,ij} d_{j\mathrm{R}}, \quad u'_{i\mathrm{L}} = U_{u,ij} u_{j\mathrm{L}}, \quad u'_{i\mathrm{R}} = K_{u,ij} u_{j\mathrm{R}}$$

🥛 从而

$$\bar{d}'_{i\mathrm{L}} \gamma^\mu d'_{i\mathrm{L}} = \bar{d}_{j\mathrm{L}} (U_d^\dagger)_{ji} \gamma^\mu U_{d,ik} d_{k\mathrm{L}} = \bar{d}_{j\mathrm{L}} \delta_{jk} \gamma^\mu d_{k\mathrm{L}} = \bar{d}_{i\mathrm{L}} \gamma^\mu d_{i\mathrm{L}}$$

☕ 同理有

$$\bar{u}'_{i\mathrm{L}} \gamma^\mu u'_{i\mathrm{L}} = \bar{u}_{i\mathrm{L}} \gamma^\mu u_{i\mathrm{L}}, \quad \bar{d}'_{i\mathrm{R}} \gamma^\mu d'_{i\mathrm{R}} = \bar{d}_{i\mathrm{R}} \gamma^\mu d_{i\mathrm{R}}, \quad \bar{u}'_{i\mathrm{R}} \gamma^\mu u'_{i\mathrm{R}} = \bar{u}_{i\mathrm{R}} \gamma^\mu u_{i\mathrm{R}}$$

Cabibbo-Kobayashi-Maskawa 矩阵

- $d_{i\mathrm{L}} \equiv (U_d^\dagger)_{ij} d'_{j\mathrm{L}}$，$d_{i\mathrm{R}} \equiv (K_d^\dagger)_{ij} d'_{j\mathrm{R}}$，$u_{i\mathrm{L}} \equiv (U_u^\dagger)_{ij} u'_{j\mathrm{L}}$ 和 $u_{i\mathrm{R}} \equiv (K_u^\dagger)_{ij} u'_{j\mathrm{R}}$ 表明

$$d'_{i\mathrm{L}} = U_{d,ij} d_{j\mathrm{L}}, \quad d'_{i\mathrm{R}} = K_{d,ij} d_{j\mathrm{R}}, \quad u'_{i\mathrm{L}} = U_{u,ij} u_{j\mathrm{L}}, \quad u'_{i\mathrm{R}} = K_{u,ij} u_{j\mathrm{R}}$$

- 从而

$$\bar{d}'_{i\mathrm{L}} \gamma^\mu d'_{i\mathrm{L}} = \bar{d}_{j\mathrm{L}} (U_d^\dagger)_{ji} \gamma^\mu U_{d,ik} d_{k\mathrm{L}} = \bar{d}_{j\mathrm{L}} \delta_{jk} \gamma^\mu d_{k\mathrm{L}} = \bar{d}_{i\mathrm{L}} \gamma^\mu d_{i\mathrm{L}}$$

- 同理有

$$\bar{u}'_{i\mathrm{L}} \gamma^\mu u'_{i\mathrm{L}} = \bar{u}_{i\mathrm{L}} \gamma^\mu u_{i\mathrm{L}}, \quad \bar{d}'_{i\mathrm{R}} \gamma^\mu d'_{i\mathrm{R}} = \bar{d}_{i\mathrm{R}} \gamma^\mu d_{i\mathrm{R}}, \quad \bar{u}'_{i\mathrm{R}} \gamma^\mu u'_{i\mathrm{R}} = \bar{u}_{i\mathrm{R}} \gamma^\mu u_{i\mathrm{R}}$$

- 另一方面，

$$\begin{aligned} \bar{u}'_{i\mathrm{L}} \gamma^\mu d'_{i\mathrm{L}} &= \bar{u}_{j\mathrm{L}} (U_u^\dagger)_{ji} \gamma^\mu U_{d,ik} d_{k\mathrm{L}} = \bar{u}_{i\mathrm{L}} \gamma^\mu V_{ij} d_{j\mathrm{L}} \\ \bar{d}'_{i\mathrm{L}} \gamma^\mu u'_{i\mathrm{L}} &= \bar{d}_{j\mathrm{L}} (U_d^\dagger)_{ji} \gamma^\mu U_{u,ik} u_{k\mathrm{L}} = \bar{d}_{j\mathrm{L}} V_{ji}^\dagger \gamma^\mu u_{i\mathrm{L}} \end{aligned}$$

- 其中 $V \equiv U_u^\dagger U_d$ 称为 **Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (CKM) 矩阵 V**
- 其厄米共轭矩阵为 $V^\dagger = U_d^\dagger U_u$

费米子协变动能项

🏦 $\mathrm{SU(2)_L \times U(1)_Y}$ 规范不变的**费米子协变动能项**为

$$\mathcal{L}_{\mathrm{EWF}} = \bar{Q}_{i\mathrm{L}} \mathrm{i} \not{D} Q_{i\mathrm{L}} + \bar{u}'_{i\mathrm{R}} \mathrm{i} \not{D} u'_{i\mathrm{R}} + \bar{d}'_{i\mathrm{R}} \mathrm{i} \not{D} d'_{i\mathrm{R}} + \bar{L}_{i\mathrm{L}} \mathrm{i} \not{D} L_{i\mathrm{L}} + \bar{\ell}_{i\mathrm{R}} \mathrm{i} \not{D} \ell_{i\mathrm{R}}$$

🍷 根据 $Q = T^3 + Y$ 和 $e = g s_{\mathrm{W}} = g' c_{\mathrm{W}}$，有

$$g' Y B_\mu + g T^3 W^3_\mu = g' Y (c_{\mathrm{W}} A_\mu - s_{\mathrm{W}} Z_\mu) + g T^3 (s_{\mathrm{W}} A_\mu + c_{\mathrm{W}} Z_\mu)$$

$$= e(Y + T^3) A_\mu + \left(g c_{\mathrm{W}} T^3 - \frac{g s_{\mathrm{W}}}{c_{\mathrm{W}}} s_{\mathrm{W}} Y \right) Z_\mu = Q e A_\mu + \frac{g}{c_{\mathrm{W}}} (T^3 c^2_{\mathrm{W}} - Y s^2_{\mathrm{W}}) Z_\mu$$

$$= Q e A_\mu + \frac{g}{c_{\mathrm{W}}} (T^3 - Q s^2_{\mathrm{W}}) Z_\mu$$

🍹 故 $D_\mu Q_{i\mathrm{L}} = (\partial_\mu - \mathrm{i} g' B_\mu Y - \mathrm{i} g W^a_\mu \tau^a) Q_{i\mathrm{L}}$

$$= \partial_\mu Q_{i\mathrm{L}} - \mathrm{i} \begin{pmatrix} g' Y B_\mu + g T^3 W^3_\mu & \frac{g}{2} (W^1_\mu - \mathrm{i} W^2_\mu) \\ \frac{g}{2} (W^1_\mu + \mathrm{i} W^2_\mu) & g' Y B_\mu + g T^3 W^3_\mu \end{pmatrix} Q_{i\mathrm{L}}$$

$$= \partial_\mu Q_{i\mathrm{L}} - \mathrm{i} \begin{pmatrix} \left[Q e A_\mu + \frac{g}{c_{\mathrm{W}}} (T^3 - Q s^2_{\mathrm{W}}) Z_\mu \right] u'_{i\mathrm{L}} + \frac{g}{\sqrt{2}} W^+_\mu d'_{i\mathrm{L}} \\ \frac{g}{\sqrt{2}} W^-_\mu u'_{i\mathrm{L}} + \left[Q e A_\mu + \frac{g}{c_{\mathrm{W}}} (T^3 - Q s^2_{\mathrm{W}}) \right] d'_{i\mathrm{L}} \end{pmatrix}$$

$\bar{Q}_{i\mathrm{L}}\mathrm{i}\not{D}Q_{i\mathrm{L}}$ 中的电弱规范相互作用项

于是，$\bar{Q}_{i\mathrm{L}}\mathrm{i}\not{D}Q_{i\mathrm{L}}$ 包含的**电弱规范相互作用项**为

$$
\begin{aligned}
\bar{Q}_{i\mathrm{L}}\mathrm{i}\not{D}Q_{i\mathrm{L}} \supset & \left[QeA_\mu + \frac{g}{c_\mathrm{W}}(T^3 - Qs_\mathrm{W}^2)Z_\mu\right]\bar{u}'_{i\mathrm{L}}\gamma^\mu u'_{i\mathrm{L}} \\
& + \left[QeA_\mu + \frac{g}{c_\mathrm{W}}(T^3 - Qs_\mathrm{W}^2)Z_\mu\right]\bar{d}'_{i\mathrm{L}}\gamma^\mu d'_{i\mathrm{L}} \\
& + \frac{g}{\sqrt{2}}W_\mu^+\bar{u}'_{i\mathrm{L}}\gamma^\mu d'_{i\mathrm{L}} + \frac{g}{\sqrt{2}}W_\mu^-\bar{d}'_{i\mathrm{L}}\gamma^\mu u'_{i\mathrm{L}} \\
= & \left(QeA_\mu + \frac{g}{c_\mathrm{W}}g_\mathrm{L}Z_\mu\right)\bar{u}_i\gamma^\mu\frac{1-\gamma^5}{2}u_i \\
& + \left(QeA_\mu + \frac{g}{c_\mathrm{W}}g_\mathrm{L}Z_\mu\right)\bar{d}_i\gamma^\mu\frac{1-\gamma^5}{2}d_i \\
& + \frac{g}{\sqrt{2}}W_\mu^+\bar{u}_i\gamma^\mu P_\mathrm{L}V_{ij}d_j + \frac{g}{\sqrt{2}}W_\mu^-\bar{d}_jV_{ji}^\dagger\gamma^\mu P_\mathrm{L}u_i
\end{aligned}
$$

其中**左手耦合系数**为

$$
g_\mathrm{L} \equiv T^3 - Qs_\mathrm{W}^2
$$

$\bar{u}'_{i\mathrm{R}}\mathrm{i}\not{D}u'_{i\mathrm{R}}+\bar{d}'_{i\mathrm{R}}\mathrm{i}\not{D}d'_{i\mathrm{R}}$ 中的电弱规范相互作用项

另一方面，

$$\begin{aligned}D_\mu d'_{i\mathrm{R}} &= (\partial_\mu - \mathrm{i}g' B_\mu Y)d'_{i\mathrm{R}} = \partial_\mu d'_{i\mathrm{R}} - \mathrm{i}g' Q(c_\mathrm{W} A_\mu - s_\mathrm{W} Z_\mu)d'_{i\mathrm{R}} \\ &= \partial_\mu d'_{i\mathrm{R}} - \mathrm{i}QeA_\mu d'_{i\mathrm{R}} + \frac{\mathrm{i}g}{c_\mathrm{W}} Q s_\mathrm{W}^2 Z_\mu d'_{i\mathrm{R}}\end{aligned}$$

则 $\bar{u}'_{i\mathrm{R}}\mathrm{i}\not{D}u'_{i\mathrm{R}}+\bar{d}'_{i\mathrm{R}}\mathrm{i}\not{D}d'_{i\mathrm{R}}$ 包含的**电弱规范相互作用项**为

$$\begin{aligned}&\bar{u}'_{i\mathrm{R}}\mathrm{i}\not{D}u'_{i\mathrm{R}}+\bar{d}'_{i\mathrm{R}}\mathrm{i}\not{D}d'_{i\mathrm{R}} \\ \supset\ &\left(QeA_\mu - \frac{g}{c_\mathrm{W}} Q s_\mathrm{W}^2 Z_\mu\right)\bar{u}'_{i\mathrm{R}}\gamma^\mu u'_{i\mathrm{R}} + \left(QeA_\mu - \frac{g}{c_\mathrm{W}} Q s_\mathrm{W}^2 Z_\mu\right)\bar{d}'_{i\mathrm{R}}\gamma^\mu d'_{i\mathrm{R}} \\ =\ &\left(QeA_\mu + \frac{g}{c_\mathrm{W}} g_\mathrm{R} Z_\mu\right)\bar{u}_i\gamma^\mu\frac{1+\gamma^5}{2}u_i + \left(QeA_\mu + \frac{g}{c_\mathrm{W}} g_\mathrm{R} Z_\mu\right)\bar{d}_i\gamma^\mu\frac{1+\gamma^5}{2}d_i\end{aligned}$$

其中**右手耦合系数**为

$$g_\mathrm{R} \equiv -Q s_\mathrm{W}^2$$

费米子的电弱规范相互作用

- 引入矢量流和轴矢量流耦合系数

$$g_{\mathrm{V}} \equiv g_{\mathrm{L}} + g_{\mathrm{R}} = T^3 - 2Qs_{\mathrm{W}}^2, \quad g_{\mathrm{A}} \equiv g_{\mathrm{L}} - g_{\mathrm{R}} = T^3$$

- 将以上夸克电弱规范相互作用项改写为

$$\begin{aligned}
&\bar{Q}_{i\mathrm{L}}\mathrm{i}\not{D}Q_{i\mathrm{L}} + \bar{u}'_{i\mathrm{R}}\mathrm{i}\not{D}u'_{i\mathrm{R}} + \bar{d}'_{i\mathrm{R}}\mathrm{i}\not{D}d'_{i\mathrm{R}} \\
\supset\ & Qe\bar{u}_i\gamma^\mu u_i A_\mu + Qe\bar{d}_i\gamma^\mu d_i A_\mu + \frac{g}{2c_{\mathrm{W}}}\bar{u}_i\gamma^\mu(g_{\mathrm{V}} - g_{\mathrm{A}}\gamma^5)u_i Z_\mu \\
&+ \frac{g}{2c_{\mathrm{W}}}\bar{d}_i\gamma^\mu(g_{\mathrm{V}} - g_{\mathrm{A}}\gamma^5)d_i Z_\mu + \frac{g}{\sqrt{2}}W_\mu^+\bar{u}_i\gamma^\mu P_{\mathrm{L}}V_{ij}d_j + \frac{g}{\sqrt{2}}W_\mu^-\bar{d}_j V_{ji}^\dagger\gamma^\mu P_{\mathrm{L}}u_i
\end{aligned}$$

- 同理，$\bar{L}_{i\mathrm{L}}\mathrm{i}\not{D}L_{i\mathrm{L}} + \bar{\ell}_{i\mathrm{R}}\mathrm{i}\not{D}\ell_{i\mathrm{R}}$ 包含的轻子电弱规范相互作用项为

$$\begin{aligned}
&\bar{L}_{i\mathrm{L}}\mathrm{i}\not{D}L_{i\mathrm{L}} + \bar{\ell}_{i\mathrm{R}}\mathrm{i}\not{D}\ell_{i\mathrm{R}} \\
\supset\ & Qe\bar{\ell}_i\gamma^\mu\ell_i A_\mu + \frac{g}{2c_{\mathrm{W}}}\bar{\ell}_i\gamma^\mu(g_{\mathrm{V}} - g_{\mathrm{A}}\gamma^5)\ell_i Z_\mu + \frac{g}{2c_{\mathrm{W}}}\bar{\nu}_i\gamma^\mu(g_{\mathrm{V}} - g_{\mathrm{A}}\gamma^5)\nu_i Z_\mu \\
&+ \frac{g}{\sqrt{2}}W_\mu^+\bar{\nu}_i\gamma^\mu P_{\mathrm{L}}\ell_i + \frac{g}{\sqrt{2}}W_\mu^-\bar{\ell}_i\gamma^\mu P_{\mathrm{L}}\nu_i
\end{aligned}$$

费米子的电弱流耦合

- 将这些电弱规范相互作用项写成流耦合的形式，得

$$\mathcal{L}_{\mathrm{EWF}} \supset eA_\mu J^\mu_{\mathrm{EM}} + gZ_\mu J^\mu_Z + g(W^+_\mu J^{+,\mu}_W + W^-_\mu J^{-,\mu}_W)$$

- **电磁流** $J^\mu_{\mathrm{EM}} \equiv \sum_f Q_f \bar{f}\gamma^\mu f$，其中 f 代表任意费米子场
- **弱中性流** $J^\mu_Z \equiv \frac{1}{2c_{\mathrm{W}}} \sum_f \bar{f}\gamma^\mu (g^f_{\mathrm{V}} - g^f_{\mathrm{A}}\gamma^5) f, \quad g^f_{\mathrm{V}} = T^3_f - 2Q_f s^2_{\mathrm{W}}, \quad g^f_A = T^3_f$
- **弱带电流** $J^{+,\mu}_W \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}(\bar{u}_{i\mathrm{L}}\gamma^\mu V_{ij} d_{j\mathrm{L}} + \bar{\nu}_{i\mathrm{L}}\gamma^\mu \ell_{i\mathrm{L}})$
- **弱带电流** $J^{-,\mu}_W \equiv (J^{+,\mu}_W)^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}(\bar{d}_{j\mathrm{L}} V^\dagger_{ji}\gamma^\mu u_{i\mathrm{L}} + \bar{\ell}_{i\mathrm{L}}\gamma^\mu \nu_{i\mathrm{L}})$
- 可以看到，**电磁流耦合**与 **QED 耦合**完全相同
- 由此辩认出 A_μ 是**电磁场**，e 是单位电荷量，$Q \equiv T^3 + Y$ 确实是电荷
- **不同代夸克间**相互作用只发生在**弱带电流耦合**中，源自 **CKM 矩阵** V 的非对角元

费米子电弱规范相互作用的顶点规则

$$= \mathrm{i}Q_f e\gamma^\mu$$

$$= \frac{\mathrm{i}g}{2c_\mathrm{W}}\gamma^\mu(g_\mathrm{V}^f - g_\mathrm{A}^f\gamma^5)$$

$$= \frac{\mathrm{i}g}{\sqrt{2}}V_{ij}\gamma^\mu P_\mathrm{L}$$

$$= \frac{\mathrm{i}g}{\sqrt{2}}V_{ji}^\dagger\gamma^\mu P_\mathrm{L}$$

$$= \frac{\mathrm{i}g}{\sqrt{2}}\gamma^\mu P_\mathrm{L}$$

$$= \frac{\mathrm{i}g}{\sqrt{2}}\gamma^\mu P_\mathrm{L}$$

电弱规范玻色子的自相互作用

电弱规范场自身的 $\mathrm{SU(2)_L \times U(1)_Y}$ 规范不变拉氏量为

$$\mathcal{L}_{\mathrm{EWG}} = -\frac{1}{4} W^a_{\mu\nu} W^{a,\mu\nu} - \frac{1}{4} B_{\mu\nu} B^{\mu\nu}$$

场强张量 $W^a_{\mu\nu} \equiv \partial_\mu W^a_\nu - \partial_\nu W^a_\mu + g\varepsilon^{abc} W^b_\mu W^c_\nu$， $B_{\mu\nu} \equiv \partial_\mu B_\nu - \partial_\nu B_\mu$

$= -\mathrm{i}eS^{\mu\nu\rho}_{p,q,k}$

$= -\mathrm{i}gc_{\mathrm{W}}S^{\mu\nu\rho}_{p,q,k}$

$= \mathrm{i}e^2 T^{\mu\nu\rho\sigma}$

$= \mathrm{i}egc_{\mathrm{W}}T^{\mu\nu\rho\sigma}$

$= \mathrm{i}g^2 c_{\mathrm{W}}^2 T^{\mu\nu\rho\sigma}$

$= -\mathrm{i}g^2 T^{\mu\nu\rho\sigma}$

图中 $S^{\mu\nu\rho}_{p,q,k} \equiv g^{\mu\nu}(p-q)^\rho + g^{\nu\rho}(q-k)^\mu + g^{\rho\mu}(k-p)^\nu$

$T^{\mu\nu\rho\sigma} \equiv g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma} + g^{\mu\sigma}g^{\nu\rho} - 2g^{\mu\nu}g^{\rho\sigma}$

CKM 矩阵

🚗 **概率守恒**要求 **CKM 矩阵 V** 是**幺正**矩阵，标准参数化形式为

$$V = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & c_{23} & s_{23} \\ & -s_{23} & c_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{13} & & s_{13}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\delta} \\ & 1 & \\ -s_{13}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta} & & c_{13} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{12} & s_{12} & \\ -s_{12} & c_{12} & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} c_{12}c_{13} & s_{12}c_{13} & s_{13}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\delta} \\ -s_{12}c_{23} - c_{12}s_{23}s_{13}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta} & c_{12}c_{23} - s_{12}s_{23}s_{13}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta} & s_{23}c_{13} \\ s_{12}s_{23} - c_{12}c_{23}s_{13}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta} & -c_{12}s_{23} - s_{12}c_{23}s_{13}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta} & c_{23}c_{13} \end{pmatrix}$$

⚓ 其中 $s_{ij} \equiv \sin\theta_{ij}$ ， $c_{ij} \equiv \cos\theta_{ij}$

🔑 V 包含 3 个转动角 $\theta_{12} \simeq 13^\circ$，$\theta_{23} \simeq 2.4^\circ$，$\theta_{13} \simeq 0.20^\circ$，

1 个引起 ***CP* 破坏**的复相角 $\delta \simeq 71^\circ$

夸克味混合

🚙 拟合实验数据得到 **CKM 矩阵元的模**为

$$|V_{ij}| = \begin{pmatrix} 0.97446 \pm 0.00010 & 0.22452 \pm 0.00044 & 0.00365 \pm 0.00012 \\ 0.22438 \pm 0.00044 & 0.97359^{+0.00010}_{-0.00011} & 0.04214 \pm 0.00076 \\ 0.00896^{+0.00024}_{-0.00023} & 0.04133 \pm 0.00074 & 0.999105 \pm 0.000032 \end{pmatrix}$$

🎛️ 如果忽略第三代夸克的混合，CKM 矩阵可近似为

$$V_{ij} \simeq \begin{pmatrix} \cos\theta_{\rm C} & \sin\theta_{\rm C} & \\ -\sin\theta_{\rm C} & \cos\theta_{\rm C} & \\ & & 1 \end{pmatrix},$$

$\theta_{\rm C}$ 称为 **Cabibbo 角**，满足 $\sin\theta_{\rm C} = |V_{12}|$

🎚️ CKM 矩阵的**非对角元**非零 👉 **弱带电流**可以耦合**不同代的夸克**

🎹 $W^+ \to u\bar{d}'$ 过程在质量态上表现为

$W^+ \to u\bar{d}$ (V_{11} 引起)

$W^+ \to u\bar{s}$ (V_{12} 引起)

$W^+ \to u\bar{b}$ (V_{13} 引起)

$$= \frac{ig}{\sqrt{2}} V_{ij} \gamma^\mu P_{\rm L}$$

超出标准模型：中微子味混合

🚕 **中微子振荡**实验表明，中微子具有**微小质量**，而且存在**味混合**

🔧 Dirac 中微子的味道本征态（即规范本征态）与质量本征态通过 **Pontecorvo–Maki–Nakagawa–Sakata (PMNS) 矩阵 U** 联系：

$$\begin{pmatrix}\nu_e\\ \nu_\mu\\ \nu_\tau\end{pmatrix} = U\begin{pmatrix}\nu_1\\ \nu_2\\ \nu_3\end{pmatrix},\quad U=\begin{pmatrix}\bar{c}_{12}\bar{c}_{13} & \bar{s}_{12}\bar{c}_{13} & \bar{s}_{13}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\bar{\delta}}\\ -\bar{s}_{12}\bar{c}_{23}-\bar{c}_{12}\bar{s}_{23}\bar{s}_{13}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\bar{\delta}} & \bar{c}_{12}\bar{c}_{23}-\bar{s}_{12}\bar{s}_{23}\bar{s}_{13}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\bar{\delta}} & \bar{s}_{23}\bar{c}_{13}\\ \bar{s}_{12}\bar{s}_{23}-\bar{c}_{12}\bar{c}_{23}\bar{s}_{13}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\bar{\delta}} & -\bar{c}_{12}\bar{s}_{23}-\bar{s}_{12}\bar{c}_{23}\bar{s}_{13}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\bar{\delta}} & \bar{c}_{23}\bar{c}_{13}\end{pmatrix}$$

🔦 $\bar{\theta}_{12}\sim 33^\circ$，$\bar{\theta}_{23}\sim 41^\circ$（质量正序）或 $\bar{\theta}_{23}\sim 50^\circ$（质量逆序），$\bar{\theta}_{13}\sim 8.4^\circ$

🔨 如果中微子是 Majorana 费米子，则额外存在 2 个 CP 破坏相角 ρ 和 σ，PMNS 矩阵应该再右乘 $\mathrm{diag}(1,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\rho},\mathrm{e}^{\mathrm{i}\sigma})$

- ☀️ 太阳中微子振荡 👉 $\bar{\theta}_{12}$
- ☁️ 大气中微子振荡 👉 $\bar{\theta}_{23}$
- 💥 反应堆中微子振荡 👉 $\bar{\theta}_{13}$

$$= \frac{\mathrm{i}g}{\sqrt{2}}U_{ij}\gamma^\mu P_\mathrm{L}$$

e^+e^- 湮灭

🚓 通过**电磁流**和**弱中性流**相互作用，

e^+e^- 可湮灭成一对正反费米子 $f\bar{f}$

🚀 $\sqrt{s} \sim m_Z$ 处出现 Z 的**共振峰**

e^+e^- 湮灭

🚑 通过**电磁流**和**弱中性流**相互作用，

e^+e^- 可湮灭成一对正反费米子 $f\bar{f}$

🚀 $\sqrt{s} \sim m_Z$ 处出现 Z 的**共振峰**

🛩️ 受共振态和弱中性流影响较小时，

截面比 $R = \dfrac{\sigma(e^+e^- \to q_i\bar{q}_i)}{\sigma(e^+e^- \to \mu^+\mu^-)}$ 体现

夸克味数、电荷跟 μ 子的相对差异

✈️ $1\ \text{GeV} \le \sqrt{s} \le 3.6\ \text{GeV}$ 处，

$$R \simeq 3\left[2\left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2\right] = 2$$

✈️ $3.7\ \text{GeV} \le \sqrt{s} \le 10\ \text{GeV}$ 处，

$$R \simeq 3\left[2\left(-\frac{1}{3}\right)^2 + 2\left(\frac{2}{3}\right)^2\right] = \frac{10}{3}$$

[PDG 2018]

β 衰变

🚒 弱相互作用引起**原子核 β 衰变**

🦁 质量数为 $A = Z + N$ 的原子核具有 Z 个质子和 N 个中子，通过 β 衰变会变成具有 $Z+1$ 个质子和 $N-1$ 个中子的原子核 A'，即

$$A(Z,N) \to A'(Z+1, N-1) + e^- + \bar{\nu}_e$$

🐯 在**核子**层次，以上过程体现为**中子 β 衰变**，

$$n \to p + e^- + \bar{\nu}_e$$

🐱 在**夸克**层次，以上过程体现为 **d 夸克 β 衰变**

$$d \to u + e^- + \bar{\nu}_e$$

🦋 此过程来自 W^- 玻色子传递的**弱带电流**相互作用

🐶 在**轻子**方面，类似的过程有 **μ 子衰变**

$$\mu^- \to \nu_\mu + e^- + \bar{\nu}_e$$

介子弱衰变

- 🚑 **弱带电流**相互作用也会引起介子衰变
- 🐻 $D^+(c\bar{d})$ 衰变到 $\bar{K}^0$ 和轻子或夸克（👉 介子）

$$D^+ \to \bar{K}^0 + \nu_e/\nu_\mu/u + e^+/\mu^+/\bar{d}$$

- 🧊 D^+ 中 $\bar{d}$ 夸克实际没参与衰变，称为**旁观者**

介子弱衰变

🚑 弱带电流相互作用也会引起介子衰变

🐻 $D^+(c\bar{d})$ 衰变到 $\bar{K}^0$ 和轻子或夸克（👉 介子）

$$D^+ \to \bar{K}^0 + \nu_e/\nu_\mu/u + e^+/\mu^+/\bar{d}$$

🧊 D^+ 中 $\bar{d}$ 夸克实际没参与衰变，称为旁观者

🐼 $\pi^-(\bar{u}d)$ 衰变到带电轻子和反中微子

$$\pi^- \to e^-/\mu^- + \bar{\nu}_e/\bar{\nu}_\mu$$

🌪️ π^- 静止系中，角动量守恒要求末态轻子和反轻子的螺旋度相同，但弱带电流只耦合左旋费米子和右旋反费米子，需要由质量翻转螺旋度 👉 螺旋度压低效应

🌩️ $$\frac{\Gamma(\pi^- \to e^-\bar{\nu}_e)}{\Gamma(\pi^- \to \mu^-\bar{\nu}_\mu)} \sim \frac{m_e^2}{m_\mu^2} \simeq 2\times 10^{-5}$$

🌦️ $\pi^- \to \mu^-\bar{\nu}_\mu$ 分支比为 99.9877%，$\pi^- \to e^-\bar{\nu}_e$ 分支比为 0.0123%