

量子场论

第 8 章 分立对称性和 Majorana 旋量场

8.1 节至 8.3 节

余钊煥

中山大学物理学院

<https://yzhxxzxy.github.io>



更新日期：2022 年 6 月 19 日

第 8 章 分立对称性和 Majorana 旋量场

 相对于**连续变换**，不能用连续变化的参数描述的对称变换称为**分立** (discrete) 变换，也称为**离散变换**

 如果系统作用量在一种分立变换下不变，则系统具有相应的**分立对称性** (discrete symmetry)

 1.3 节末提到的**宇称变换**和**时间反演变换**是两种重要的分立变换

本章讨论量子场的分立变换和分立对称性，顺便介绍 Majorana 旋量

8.1 节 标量场的分立变换

8.1.1 小节 标量场的 P 变换



1.3 节提到，时空坐标 $x^\mu = (t, \mathbf{x})$ 的宇称变换为

$$\mathcal{P}^\mu{}_\nu = (\mathcal{P}^{-1})^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} +1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix}$$



这是一种**非固有保时向** Lorentz 变换



将 x^μ 变换为 $x'^\mu = \mathcal{P}^\mu{}_\nu x^\nu = (\mathcal{P}x)^\mu = (t, -\mathbf{x})$, 将 ∂_μ 变换为 $\partial'_\mu = (\mathcal{P}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu$



将四维动量 $p^\mu = (E, \mathbf{p})$ 变换为 $p'^\mu = (\mathcal{P}p)^\mu = (E, -\mathbf{p})$



但同时保持时空体积元不变, $d^4x' = |\det(\mathcal{P})| d^4x = d^4x$

8.1 节 标量场的分立变换

8.1.1 小节 标量场的 P 变换



1.3 节提到，时空坐标 $x^\mu = (t, \mathbf{x})$ 的宇称变换为

$$\mathcal{P}^\mu{}_\nu = (\mathcal{P}^{-1})^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} +1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix}$$



这是一种**非固有保时向** Lorentz 变换



将 x^μ 变换为 $x'^\mu = \mathcal{P}^\mu{}_\nu x^\nu = (\mathcal{P}x)^\mu = (t, -\mathbf{x})$, 将 ∂_μ 变换为 $\partial'_\mu = (\mathcal{P}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu$



将四维动量 $p^\mu = (E, \mathbf{p})$ 变换为 $p'^\mu = (\mathcal{P}p)^\mu = (E, -\mathbf{p})$



但同时保持时空体积元不变， $d^4x' = |\det(\mathcal{P})| d^4x = d^4x$



如果系统的[作用量](#) $S = \int d^4x \mathcal{L}(x)$ 在宇称变换下[不变](#)，则[运动方程](#)的形式也在宇称变换下[不变](#)，此时称系统是[宇称守恒](#)的，即具有[空间反射对称性](#)



在宇称守恒的理论中，拉氏量 $\mathcal{L}(x)$ 的宇称变换应当满足 $\mathcal{L}'(x') = \mathcal{L}(x)$ ，从而使 $S' = \int d^4x' \mathcal{L}'(x') = \int d^4x \mathcal{L}(x) = S$

P 变换

类似于 3.1.1 小节的讨论，在宇称守恒的量子理论中，宇称变换在 Hilbert 空间中诱导出态矢 $|\Psi\rangle$ 的线性幺正变换 $|\Psi'\rangle = U(\mathcal{P})|\Psi\rangle = \mathcal{P}|\Psi\rangle$ ，称为 \mathcal{P} 变换

 $P \equiv U(\mathcal{P})$ 是一个线性么正算符，根据同态关系和 $\mathcal{P}^{-1} = \mathcal{P}$ ，有

$$P^{-1} = U^{-1}(\mathcal{P}) = U(\mathcal{P}^{-1}) = U(\mathcal{P}) = P$$

即 P 是自身的逆变换算符

 从而 $P^2 = P^{-1}P = 1$ ，故相继两次 P 变换的作用等同于恒等变换

由 P 的幺正性得 $P^\dagger = P^{-1} = P$ ，因而 P 是厄米算符

P 变换

类似于 3.1.1 小节的讨论，在宇称守恒的量子理论中，宇称变换在 Hilbert 空间中诱导出态矢 $|\Psi\rangle$ 的线性幺正变换 $|\Psi'\rangle = U(\mathcal{P})|\Psi\rangle = P|\Psi\rangle$ ，称为 **P 变换**

 $P \equiv U(\mathcal{P})$ 是一个线性么正算符，根据同态关系和 $\mathcal{P}^{-1} = \mathcal{P}$ ，有

$$P^{-1} = U^{-1}(\mathcal{P}) = U(\mathcal{P}^{-1}) = U(\mathcal{P}) = P$$

即 P 是自身的逆变换算符

 从而 $P^2 = P^{-1}P = 1$ ，故相继两次 P 变换的作用等同于恒等变换

由 P 的幺正性得 $P^\dagger = P^{-1} = P$ ，因而 P 是厄米算符

由量子场构成的拉氏量在宇称变换下不变意味着 $\mathcal{L}'(x') = P^{-1}\mathcal{L}(x')P = \mathcal{L}(x)$

 作替换 $x' \rightarrow x$, $x \rightarrow \mathcal{P}^{-1}x = \mathcal{P}x$, 将这个式子等价地写成

$$P^{-1}\mathcal{L}(\textcolor{blue}{x})P = \textcolor{purple}{+}\mathcal{L}(\textcolor{brown}{P}x)$$

 使拉氏量满足上式，也就是说，让拉氏量具有**偶宇称**（指上式右边的 + 号），就能得到**宇称守恒的量子场论**



 现在讨论量子 Poincaré 变换 $U(\Lambda, a)$ 的生成元算符 $J^{\mu\nu}$ 和 P^μ 在宇称守恒理论中的 P 变换



将**同态关系** $U(\Lambda_2, a_2)U(\Lambda_1, a_1) = U(\Lambda_2\Lambda_1, \Lambda_2a_1 + a_2)$ 用于宇称变换 \mathcal{P} ，得

$$P^{-1}U(\Lambda, a)P = U^{-1}(\mathcal{P})U(\Lambda, a)U(\mathcal{P}) = U^{-1}(\mathcal{P})U(\Lambda\mathcal{P}, a) = U(\mathcal{P}^{-1}\Lambda\mathcal{P}, \mathcal{P}^{-1}a)$$



相应的无穷小变换为 $P^{-1}U(\mathbf{1} + \omega, \varepsilon)P = U(\mathbf{1} + \mathcal{P}^{-1}\omega\mathcal{P}, \mathcal{P}^{-1}\varepsilon)$, 类似于 3.1.1 小节得到的 $U^{-1}(\Lambda, a)U(\mathbf{1} + \omega, \varepsilon)U(\Lambda, a) = U(\mathbf{1} + \Lambda^{-1}\omega\Lambda, \Lambda^{-1}\omega a + \Lambda^{-1}\varepsilon)$

Poincaré 生成元算符的 P 变换

 现在讨论量子 Poincaré 变换 $U(\Lambda, a)$ 的生成元算符 $J^{\mu\nu}$ 和 P^μ 在宇称守恒理论中的 P 变换

 将同态关系 $U(\Lambda_2, a_2)U(\Lambda_1, a_1) = U(\Lambda_2\Lambda_1, \Lambda_2 a_1 + a_2)$ 用于宇称变换 \mathcal{P} ，得

$$P^{-1}U(\Lambda, a)P = U^{-1}(\mathcal{P})U(\Lambda, a)U(\mathcal{P}) = U^{-1}(\mathcal{P})U(\Lambda\mathcal{P}, a) = U(\mathcal{P}^{-1}\Lambda\mathcal{P}, \mathcal{P}^{-1}a)$$

相应的无穷小变换为 $P^{-1}U(1 + \omega, \varepsilon)P = U(1 + \mathcal{P}^{-1}\omega\mathcal{P}, \mathcal{P}^{-1}\varepsilon)$ ，类似于 3.1.1 小节得到的 $U^{-1}(\Lambda, a)U(1 + \omega, \varepsilon)U(\Lambda, a) = U(1 + \Lambda^{-1}\omega\Lambda, \Lambda^{-1}\omega a + \Lambda^{-1}\varepsilon)$

由此推出类似于 $U^{-1}(\Lambda)J^{\mu\nu}U(\Lambda) = \Lambda^\mu{}_\rho\Lambda^\nu{}_\sigma J^{\rho\sigma}$ 和 $U^{-1}(\Lambda)P^\mu U(\Lambda) = \Lambda^\mu{}_\nu P^\nu$ 的 **P 变换规则**

$$P^{-1} J^{\mu\nu} P = \mathcal{P}^\mu{}_\rho \mathcal{P}^\nu{}_\sigma J^{\rho\sigma}, \quad P^{-1} P^\mu P = \mathcal{P}^\mu{}_\nu P^\nu$$

 从而, $J^i \equiv \varepsilon^{ijk} J^{jk}/2$ 和 $K^i \equiv J^{0i}$ 在 P 变换下变成

$$P^{-1} J^i P = \frac{1}{2} \varepsilon^{ijk} P^{-1} J^{jk} P = \frac{1}{2} \varepsilon^{ijk} \mathcal{P}^j{}_l \mathcal{P}^k{}_m J^{lm} = \frac{1}{2} \varepsilon^{ijk} (-\delta^j{}_l) (-\delta^k{}_m) J^{lm} = +J^i$$

$$P^{-1}K^i P = P^{-1}J^{0i}P = \mathcal{P}^0{}_0 \mathcal{P}^i{}_j J^{0j} = -\delta^i{}_j J^{0j} = -K^i$$

总角动量、动量和哈密顿量的 P 变换



写成三维矢量的形式，得

$$P^{-1}\mathbf{J}P = +\mathbf{J}, \quad P^{-1}\mathbf{K}P = -\mathbf{K}$$



总角动量算符 \mathbf{J} 具有偶宇称，体现了它作为三维轴矢量的变换性质



因此角动量在宇称变换下不变

宇称守恒和宇称破坏

通常希望一个物理理论包含比较多的对称性，从而具有比较优良的性质

为了得到一个**宇称守恒**的量子场论，首先，需要让拉氏量中的**自由部分**在宇称变换下不变，这是容易做到的

其次，还得要求拉氏量中的**相互作用部分**也在宇称变换下不变，这一点**并不平庸**

尽管宇称在**电磁相互作用**和**强相互作用**中**守恒**，在**弱相互作用**中却遭到**极大破坏**

宇称守恒和宇称破坏

通常希望一个物理理论包含比较多的对称性，从而具有比较优良的性质

为了得到一个宇称守恒的量子场论，首先，需要让拉氏量中的自由部分在宇称变换下不变，这是容易做到的

其次，还得要求拉氏量中的相互作用部分也在宇称变换下不变，这一点并不平庸

尽管宇称在电磁相互作用和强相互作用中守恒，在弱相互作用中却遭到极大破坏

这个出乎意料的**现象**是 1956 年李政道和杨振宁对实验结果作理论分析时发现的

随后由吴健雄在实验中确证

 李政道和杨振宁因此获得

1957 年诺贝尔物理学奖

为了分析量子场论中的宇称守恒情况，我们需要知道各种量子场在 P 变换下的性质



李政道 (1926-)



杨振宁 (1922-)



吴健雄 (1912–1997)

复标量场产生湮灭算符的 P 变换

 下面先讨论自由的复标量场 $\phi(x)$ ，拉氏量为 $\mathcal{L} = (\partial^\mu \phi^\dagger) \partial_\mu \phi - m^2 \phi^\dagger \phi$

 $\phi(x)$ 的运动方程是 Klein-Gordon 方程 $(\partial^2 + m^2) \phi(x) = 0$

 宇称变换翻转动量方向， P 变换对正标量玻色子 ϕ 单粒子态 $|\mathbf{p}^+\rangle = \sqrt{2E_p} a_p^\dagger |0\rangle$ 的作用为 $P |\mathbf{p}^+\rangle = \eta_P |-\mathbf{p}^+\rangle$

 η_P 是一个复的相位因子，满足 $|\eta_P| = 1$

 出现 η_P 的原因是相差一个相位因子的态矢描述相同的物理

复标量场产生湮灭算符的 P 变换

下面先讨论自由的复标量场 $\phi(x)$ ，拉氏量为 $\mathcal{L} = (\partial^\mu \phi^\dagger) \partial_\mu \phi - m^2 \phi^\dagger \phi$

$\phi(x)$ 的运动方程是 Klein-Gordon 方程 $(\partial^2 + m^2) \phi(x) = 0$

宇称变换翻转动量方向， P 变换对正标量玻色子 ϕ 单粒子态 $|\mathbf{p}^+\rangle = \sqrt{2E_p} a_p^\dagger |0\rangle$ 的作用为 $P |\mathbf{p}^+\rangle = \eta_P |\mathbf{-p}^+\rangle$

η_P 是一个复的相位因子，满足 $|\eta_P| = 1$

出现 η_P 的原因是相差一个相位因子的态矢描述相同的物理

真空态在 P 变换下不变，故 $P |0\rangle = |0\rangle$ ，从而

$$P |\mathbf{p}^+\rangle = P^{-1} |\mathbf{p}^+\rangle = \sqrt{2E_p} P^{-1} a_p^\dagger P |0\rangle$$

与 $P |\mathbf{p}^+\rangle = \eta_P |\mathbf{-p}^+\rangle = \sqrt{2E_p} \eta_P a_{-\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle$ 比较，推出产生湮灭算符的 P 变换

$$P^{-1} a_p^\dagger P = \eta_P a_{-\mathbf{p}}^\dagger, \quad P^{-1} a_p P = \eta_P^* a_{-\mathbf{p}}$$

第二式由第一式取厄米共轭得到： $(P^{-1} a_p^\dagger P)^\dagger = (P^\dagger a_p^\dagger P)^\dagger = P^\dagger a_p P = P^{-1} a_p P$

复标量场平面波展开式的 P 变换

另一方面， P 变换对反标量玻色子 $\bar{\phi}$ 的单粒子态 $|\mathbf{p}^-\rangle = \sqrt{2E_{\mathbf{p}}} b_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle$ 的作用为 $P|\mathbf{p}^-\rangle = \tilde{\eta}_P |-\mathbf{p}^-\rangle$ ，出现另一个相位因子 $\tilde{\eta}_P$ ，同理推出

$$P^{-1}b_p^\dagger P = \tilde{\eta}_P b_{-p}^\dagger, \quad P^{-1}b_p P = \tilde{\eta}_P^* b_{-p}$$

复标量场 $\phi(x)$ 的平面波展开式在 P 变换下化为

$$\begin{aligned} P^{-1}\phi(x)P &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \left(\color{red}{P^{-1}a_p} P e^{-ip \cdot x} + \color{blue}{P^{-1}b_p^\dagger} P e^{ip \cdot x} \right) \\ &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \left(\eta_P^* \color{red}{a_{-p}} e^{-ip \cdot x} + \tilde{\eta}_P \color{blue}{b_{-p}^\dagger} e^{ip \cdot x} \right) \\ &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \left[\eta_P^* a_{\textcolor{brown}{p}} e^{-ip \cdot (\textcolor{violet}{p}x)} + \tilde{\eta}_P b_{\textcolor{brown}{p}}^\dagger e^{ip \cdot (\textcolor{violet}{p}x)} \right] \end{aligned}$$

最后一步作了变量替换 $p \rightarrow -p$ ，并利用 $(\mathcal{P}p) \cdot x = p \cdot (\mathcal{P}x)$

复标量场的 P 变换

为了保持 $\phi(x)$ 的运动方程形式不变，必须要求 η_P 和 $\tilde{\eta}_P$ 满足关系式

$$\eta_P^* = \tilde{\eta}_P$$

使得 $P^{-1}\phi(x)P = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \left[\eta_P^* a_p e^{-ip \cdot (\textcolor{red}{P}x)} + \tilde{\eta}_P b_p^\dagger e^{ip \cdot (\textcolor{red}{P}x)} \right] = \eta_P^* \phi(\textcolor{red}{P}x)$

故 $\phi(x)$ 和 $\phi^\dagger(x)$ 的 P 变换为

$$P^{-1}\phi(x)P = \eta_P^*\phi(\mathcal{P}x), \quad P^{-1}\phi^\dagger(x)P = \eta_P\phi^\dagger(\mathcal{P}x)$$

即 $P^{-1}\phi(x)P$ 与 $\phi(\mathcal{P}x)$ 只相差一个常数因子 η_P^*

复标量场的 P 变换



为了保持 $\phi(x)$ 的运动方程形式不变，必须要求 η_P 和 $\tilde{\eta}_P$ 满足关系式

$$\eta_P^* = \tilde{\eta}_P$$



$$\text{使得 } P^{-1}\phi(x)P = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \left[\eta_P^* a_p e^{-ip \cdot (\mathcal{P}x)} + \tilde{\eta}_P b_p^\dagger e^{ip \cdot (\mathcal{P}x)} \right] = \eta_P^* \phi(\mathcal{P}x)$$



故 $\phi(x)$ 和 $\phi^\dagger(x)$ 的 P 变换为

$$P^{-1}\phi(x)P = \eta_P^*\phi(\mathcal{P}x), \quad P^{-1}\phi^\dagger(x)P = \eta_P\phi^\dagger(\mathcal{P}x)$$



即 $P^{-1}\phi(x)P$ 与 $\phi(\mathcal{P}x)$ 只相差一个常数因子 η_P^*



从而，作宇称变换之后的场 $\phi'(x') = P^{-1}\phi(x')P = \eta_P^*\phi(\mathcal{P}x') = \eta_P^*\phi(x)$ 也满足
ein-Gordon 方程: $(\partial'^2 + m^2)\phi'(x') = \eta_P^*(\partial^2 + m^2)\phi(x) = 0$



这样的话, b_p^\dagger 和 b_p 的 P 变换 $P^{-1}b_p^\dagger P = \tilde{\eta}_P b_{-p}^\dagger$ 和 $P^{-1}b_p P = \tilde{\eta}_P^* b_{-p}$ 变成

$$P^{-1}b_p^\dagger P = \eta_P^* b_{-p}^\dagger, \quad P^{-1}b_p P = \eta_P b_{-p}$$

拉氏量的 P 变换

⚡ 现在讨论自由复标量场的拉氏量 $\mathcal{L} = (\partial^\mu \phi^\dagger) \partial_\mu \phi - m^2 \phi^\dagger \phi$ 的宇称变换性质

 这会涉及时空导数的宇称变换 $\partial'_\mu = (\mathcal{P}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu$

 为便于表述，我们在形式上以时空导数的宇称变换定义 P 变换，

$$P^{-1} \partial_\mu P \equiv \partial'_\mu = (\mathcal{P}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu, \quad P^{-1} \partial^\mu P = \partial'^\mu = \mathcal{P}^\mu{}_\nu \partial^\nu$$

于是，拉氏量中动能项算符 $(\partial^\mu \phi^\dagger) \partial_\mu \phi$ 的 P 变换为

$$\begin{aligned} P^{-1}\partial^\mu\phi^\dagger(x)\partial_\mu\phi(x)P &= P^{-1}\partial^\mu PP^{-1}\phi^\dagger(x)PP^{-1}\partial_\mu PP^{-1}\phi(x)P \\ &= |\eta_P|^2 \mathcal{P}^\mu{}_\nu (\mathcal{P}^{-1})^\rho{}_\mu \partial^\nu\phi^\dagger(\mathcal{P}x)\partial_\rho\phi(\mathcal{P}x) = +\partial^\mu\phi^\dagger(\mathcal{P}x)\partial_\mu\phi(\mathcal{P}x) \end{aligned}$$

拉氏量的 P 变换

 现在讨论自由复标量场的拉氏量 $\mathcal{L} = (\partial^\mu \phi^\dagger) \partial_\mu \phi - m^2 \phi^\dagger \phi$ 的宇称变换性质

 这会涉及时空导数的宇称变换 $\partial'_\mu = (\mathcal{P}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu$

为了便于表述，我们在形式上以时空导数的宇称变换定义 P 变换，

$$P^{-1} \partial_\mu P \equiv \partial'_\mu = (\mathcal{P}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu, \quad P^{-1} \partial^\mu P = \partial'^\mu = \mathcal{P}^\mu{}_\nu \partial^\nu$$

于是，拉氏量中动能项算符 $(\partial^\mu \phi^\dagger) \partial_\mu \phi$ 的 P 变换为

$$\begin{aligned} P^{-1}\partial^\mu\phi^\dagger(x)\partial_\mu\phi(x)P &= P^{-1}\partial^\mu PP^{-1}\phi^\dagger(x)PP^{-1}\partial_\mu PP^{-1}\phi(x)P \\ &= |\eta_P|^2 \mathcal{P}^\mu{}_\nu (\mathcal{P}^{-1})^\rho{}_\mu \partial^\nu\phi^\dagger(\mathcal{P}x)\partial_\rho\phi(\mathcal{P}x) = +\partial^\mu\phi^\dagger(\mathcal{P}x)\partial_\mu\phi(\mathcal{P}x) \end{aligned}$$

质量项算符 $\phi^\dagger \phi$ 的 P 变换为

$$P^{-1}\phi^\dagger(x)\phi(x)P = P^{-1}\phi^\dagger(x)PP^{-1}\phi(x)P = |\eta_P|^2\phi^\dagger(\mathcal{P}x)\phi(\mathcal{P}x) = +\phi^\dagger(\mathcal{P}x)\phi(\mathcal{P}x)$$

以上两式最右边表达式中的 + 号表明算符 $(\partial^\mu \phi^\dagger) \partial_\mu \phi$ 和 $\phi^\dagger \phi$ 都具有偶宇称

因此，拉氏量满足 $P^{-1}\mathcal{L}(x)P = +\mathcal{L}(\mathcal{P}x)$ ，即在宇称变换下不变

守恒流算符的 P 变换

 在 P 变换下， $U(1)$ 守恒流算符 $\phi^\dagger i \overleftrightarrow{\partial}^\mu \phi$ 变成

$$P^{-1}\phi^\dagger(x)\mathrm{i}\overleftrightarrow{\partial}^\mu\phi(x)P = P^{-1}\phi^\dagger(x)PP^{-1}\mathrm{i}\overleftrightarrow{\partial}^\mu PP^{-1}\phi(x)P = \mathcal{P}^\mu{}_\nu\phi^\dagger(\mathcal{P}x)\mathrm{i}\overleftrightarrow{\partial}^\nu\phi(\mathcal{P}x)$$

 符合 $\phi^\dagger i\overleftrightarrow{\partial}^\mu \phi$ 作为**极矢量**的变换规则

守恒流算符的 P 变换

在 P 变换下, $U(1)$ 守恒流算符 $\phi^\dagger i\overleftrightarrow{\partial}^\mu \phi$ 变成

$$P^{-1} \phi^\dagger(x) i\overleftrightarrow{\partial}^\mu \phi(x) P = P^{-1} \phi^\dagger(x) P P^{-1} i\overleftrightarrow{\partial}^\mu P P^{-1} \phi(x) P = \mathcal{P}^\mu \phi^\dagger(\mathcal{P}x) i\overleftrightarrow{\partial}^\nu \phi(\mathcal{P}x)$$

符合 $\phi^\dagger i\overleftrightarrow{\partial}^\mu \phi$ 作为**极矢量**的变换规则

在**质心系**中考虑一对正反标量玻色子 $\phi\bar{\phi}$ 组成的态

$$|\phi\bar{\phi}\rangle = \int d^3p \Phi(\mathbf{p}) a_{\mathbf{p}}^\dagger b_{-\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle$$

$\Phi(\mathbf{p})$ 是**动量空间中的波函数**

当**轨道角动量**的量子数为 L 时, $\Phi(\mathbf{p})$ 正比于**球谐函数** $Y_{LM}(\theta, \phi)$, 其中 θ 和 ϕ 分别是球坐标系中动量 \mathbf{p} 的**极角**和**方位角**

$-\mathbf{p}$ 的极角为 $\pi - \theta$, 方位角为 $\pi + \phi$

由 $Y_{LM}(\pi - \theta, \pi + \phi) = (-)^L Y_{LM}(\theta, \phi)$ 得 $\Phi(-\mathbf{p}) = (-)^L \Phi(\mathbf{p})$

轨道宇称和内禀宇称

于是, $|\phi\bar{\phi}\rangle$ 的 P 变换为

$$\begin{aligned} P|\phi\bar{\phi}\rangle &= \int d^3p \Phi(\mathbf{p}) P^{-1} a_{\mathbf{p}}^\dagger P P^{-1} b_{-\mathbf{p}}^\dagger P |0\rangle = |\eta_P|^2 \int d^3p \Phi(\mathbf{p}) a_{-\mathbf{p}}^\dagger b_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle \\ &= \int d^3p \Phi(-\mathbf{p}) a_{\mathbf{p}}^\dagger b_{-\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle = (-)^L \int d^3p \Phi(\mathbf{p}) a_{\mathbf{p}}^\dagger b_{-\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle = (-)^L |\phi\bar{\phi}\rangle \end{aligned}$$

 第三步作了变量替换 $p \rightarrow -p$

 这表明 $|\phi\bar{\phi}\rangle$ 是 P 算符的本征态，本征值 $(-)^L$ 是可观测量，称作 $|\phi\bar{\phi}\rangle$ 的宇称

○○○○○○○○○○●○○○

○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○

00000

○○○○○○○○○○○○○○○○

oooooooooooo

轨道宇称和内禀宇称



于是, $|\phi\bar{\phi}\rangle$ 的 P 变换为

$$\begin{aligned} P |\phi\bar{\phi}\rangle &= \int d^3p \Phi(\mathbf{p}) P^{-1} a_{\mathbf{p}}^\dagger P P^{-1} b_{-\mathbf{p}}^\dagger P |0\rangle = |\eta_P|^2 \int d^3p \Phi(\mathbf{p}) a_{-\mathbf{p}}^\dagger b_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle \\ &= \int d^3p \Phi(-\mathbf{p}) a_{\mathbf{p}}^\dagger b_{-\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle = (-)^L \int d^3p \Phi(\mathbf{p}) a_{\mathbf{p}}^\dagger b_{-\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle = (-)^L |\phi\bar{\phi}\rangle \end{aligned}$$



第三步作了变量替换 $p \rightarrow -p$



这表明 $|\phi\bar{\phi}\rangle$ 是 P 算符的本征态，本征值 $(-)^L$ 是可观测量，称作 $|\phi\bar{\phi}\rangle$ 的宇称



宇称是一种相乘性量子数 (multiplicative quantum number)



杰矢的总宝称是各部分贡献的宝称之积



波函数 $\Phi(p)$ 对 $|\phi\bar{\phi}\rangle$ 宇称的贡献为 $(-)^L$ ，这部分称为**轨道宇称** (orbital parity)



扣除轨道宇称之后，剩下的部分称为**内禀宇称** (intrinsic parity)



$|\phi\bar{\phi}\rangle$ 的内禀宇称为 **±**，即一对正反标量玻色子的内禀宇称为**偶**

实标量场的 P 变换

 接下来讨论自由的实标量场 $\phi(x)$ ，拉氏量为 $\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial^\mu \phi)\partial_\mu \phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2$

 比较实标量场与复标量场的平面波展开式，可以看出，实标量场的情况相当于要求数学上讨论在 $b_p = a_p$ 的条件下进行，由此推出 $\eta_P = \tilde{\eta}_P = \eta_P^*$

 于是，相位因子 η_P 是实数，满足 $\eta_P^2 = |\eta_P|^2 = 1$ ，故 $\eta_P = \pm 1$

实标量场的 P 变换

接下来讨论自由的实标量场 $\phi(x)$ ，拉氏量为 $\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial^\mu \phi)\partial_\mu \phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2$

比较实标量场与复标量场的平面波展开式，可以看出，实标量场的情况相当于要求以上讨论在 $b_p = a_p$ 的条件下进行，由此推出 $\eta_P = \tilde{\eta}_P = \eta_P^*$

于是，相位因子 η_P 是实数，满足 $\eta_P^2 = |\eta_P|^2 = 1$ ，故 $\eta_P = \pm 1$

若 $\eta_P = +1$ ，则实标量场 $\phi(x)$ 是狭义的标量场，宇称为偶， P 变换为

$$P^{-1}\phi(x)P = +\phi(\mathcal{P}x),$$

若 $\eta_P = -1$ ，则称它是赝标量场，宇称为奇， P 变换为

$$P^{-1}\phi(x)P = -\phi(\mathcal{P}x)$$

无论实标量场 $\phi(x)$ 具有哪种宇称，拉氏量 $\mathcal{L}(x)$ 都在宇称变换下不变

不过，与旋量场发生宇称守恒的相互作用时，宇称不同的实标量场 $\phi(x)$ 具有不同的性质，可以通过实验来分辨

U(1) 整体对称性与宇称变换

 对于复标量场 $\phi(x)$ ，宇称变换相位因子的取值实际上是任意的

如 2.4.3 小节所述, 自由的复标量场具有 $U(1)$ 整体对称性 $\phi'(x) = e^{iq\theta} \phi(x)$

相应的守恒荷算符 Q 满足 $[Q, \phi] = -q\phi$ (习题 2.4)，由此得到多重对易子表达式

$$[\phi, Q^{(1)}] = q\phi, \quad [\phi, Q^{(2)}] = [[\phi, Q^{(1)}], Q] = q[\phi, Q] = q^2\phi, \quad \dots, \quad [\phi, Q^{(n)}] = q^n\phi$$

再利用 $e^{-A}Be^A = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}[B, A^{(n)}]$, 推出

$$e^{i\theta Q} \phi e^{-i\theta Q} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} [\phi, (-i\theta Q)^{(n)}] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-i\theta)^n}{n!} [\phi, Q^{(n)}] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-iq\theta)^n}{n!} \phi = e^{-iq\theta} \phi$$

U(1) 整体对称性与宇称变换

 对于复标量场 $\phi(x)$ ，宇称变换相位因子的取值实际上是任意的

如 2.4.3 小节所述, 自由的复标量场具有 $U(1)$ 整体对称性 $\phi'(x) = e^{iq\theta} \phi(x)$

相应的守恒荷算符 Q 满足 $[Q, \phi] = -q\phi$ (习题 2.4)，由此得到多重对易子表达式

$$[\phi, Q^{(1)}] = q\phi, \quad [\phi, Q^{(2)}] = [[\phi, Q^{(1)}], Q] = q[\phi, Q] = q^2\phi, \quad \dots, \quad [\phi, Q^{(n)}] = q^n\phi$$

再利用 $e^{-A}Be^A = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} [B, A^{(n)}]$, 推出

$$e^{i\theta Q} \phi e^{-i\theta Q} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} [\phi, (-i\theta Q)^{(n)}] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-i\theta)^n}{n!} [\phi, Q^{(n)}] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-iq\theta)^n}{n!} \phi = e^{-iq\theta} \phi$$

 用 Q 和 P 定义一个新的么正算符 $P' \equiv e^{-i\theta Q} P$

 它满足 $P'^{-1} = P'^{\dagger} = P^{\dagger} e^{i\theta Q} = P^{-1} e^{i\theta Q}$ ，则复标量场 $\phi(x)$ 的 P' 变换为

$$P'^{-1}\phi(x)P' = P^{-1}e^{i\theta Q}\phi(x)e^{-i\theta Q}P = e^{-iq\theta}P^{-1}\phi(x)P = e^{-iq\theta}\eta_P^*\phi(\mathcal{P}x) = \eta_P'^*\phi(\mathcal{P}x)$$

其中 $\eta'_{P'} \equiv e^{iq\theta} \eta_P$ 是 P' 算符的相位因子

分立变换相位因子的任意性

 尽管 P' 算符不是厄米的，它的作用与 P 算符的作用在实质上是相同的，能够将 $\phi(x)$ 变换成 $\phi(\mathcal{P}x)$ ，只相差一个相位因子 η'_P

 因此可以用 P' 取代 P 作为宇称变换算符，而相位因子 η'_P 将取代原来的 η_P

 由于 $U(1)$ 变换参数 θ 是任意的， $\eta'_P = e^{iq\theta}\eta_P$ 的取值也是任意的

分立变换相位因子的任意性

 尽管 P' 算符不是厄米的，它的作用与 P 算符的作用在实质上是相同的，能够将 $\phi(x)$ 变换成 $\phi(\mathcal{P}x)$ ，只相差一个相位因子 η'_P

 因此可以用 P' 取代 P 作为宇称变换算符，而相位因子 η'_P 将取代原来的 η_P

 由于 $U(1)$ 变换参数 θ 是任意的， $\eta'_P = e^{iq\theta}\eta_P$ 的取值也是任意的

 另一方面，实标量场 $\phi(x)$ 不具备 $U(1)$ 整体对称性，因而相应宇称变换相位因子不具有这样的任意性

 实标量场的 $U(1)$ 荷 $q = 0$ ，守恒荷算符 $Q = 0$ ，因而 $P' \equiv e^{-i\theta Q}P$ 与 P 相同

分立变换相位因子的任意性

尽管 P' 算符不是厄米的，它的作用与 P 算符的作用在实质上是相同的，能够将 $\phi(x)$ 变换成 $\phi(\mathcal{P}x)$ ，只相差一个相位因子 η'_P

因此可以用 P' 取代 P 作为宇称变换算符，而相位因子 η'_P 将取代原来的 η_P

由于 $U(1)$ 变换参数 θ 是任意的， $\eta'_P = e^{iq\theta}\eta_P$ 的取值也是任意的

另一方面，实标量场 $\phi(x)$ 不具备 $U(1)$ 整体对称性，因而相应宇称变换相位因子不具有这样的任意性

实标量场的 $U(1)$ 荷 $q = 0$ ，守恒荷算符 $Q = 0$ ，因而 $P' \equiv e^{-i\theta Q}P$ 与 P 相同

这个结论可以推广到其它分立对称性和其它量子场：

分立变换的相位因子对于像复标量场这样的复场是任意的，
对于像实标量场这样的自共轭场则是确定的

8.1.2 小节 标量场的 T 变换

时空坐标的 x^μ 的时间反演变换为

$$\mathcal{T}^\mu{}_\nu = (\mathcal{T}^{-1})^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} -1 & & & \\ & +1 & & \\ & & +1 & \\ & & & +1 \end{pmatrix}$$

这是一种**非固有反时向** Lorentz 变换

 将 $x^\mu = (t, \mathbf{x})$ 变换为 $x'^\mu = (\mathcal{T}x)^\mu = (-t, \mathbf{x})$

将 ∂_μ 变换为 $\partial'_\mu \equiv (\mathcal{T}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu$

 将 $p^\mu = (E, \mathbf{p})$ 变换为 $p'^\mu = (\mathcal{T}p)^\mu = (-E, \mathbf{p})$

 同时保持时空体积元不变， $d^4x' = |\det(\mathcal{T})| d^4x = d^4x$

 于是，只要拉氏量在时间反演下不变，满足 $\mathcal{L}'(x') = \mathcal{L}(x)$ ，系统就具有**时间反演对称性**

T 变换

在具有时间反演对称性的量子理论中，时间反演变换在 Hilbert 空间中诱导出态矢 $|\Psi\rangle$ 的 T 变换 $|\Psi'\rangle = U(T)|\Psi\rangle = T|\Psi\rangle$ ，其中 $T \equiv U(T)$



 T 是自身的逆变换算符, $T^{-1} \equiv T$



仿照上面关于 P 变换的讨论，根据同态关系，量子 Poincaré 变换 $U(\Lambda, a)$ 满足

$$T^{-1}U(\Lambda, a)T = U^{-1}(\mathcal{T})U(\Lambda, a)U(\mathcal{T}) = U(\mathcal{T}^{-1}\Lambda\mathcal{T}, \mathcal{T}^{-1}a)$$



由此推出 T 变换规则 $T^{-1}iJ^{\mu\nu}T = i\mathcal{T}^\mu{}_\rho \mathcal{T}^\nu{}_\sigma J^{\rho\sigma}$ 和 $T^{-1}iP^\mu T = i\mathcal{T}^\mu{}_\nu P^\nu$



 这里保留了推导过程中的虚数 i

T 变换

在具有时间反演对称性的量子理论中，时间反演变换在 Hilbert 空间中诱导出态矢 $|\Psi\rangle$ 的 T 变换 $|\Psi'\rangle = U(T)|\Psi\rangle = T|\Psi\rangle$ ，其中 $T \equiv U(T)$



 T 是自身的逆变换算符, $T^{-1} \equiv T$



仿照上面关于 P 变换的讨论，根据同态关系，量子 Poincaré 变换 $U(\Lambda, a)$ 满足

$$T^{-1}U(\Lambda, a)T = U^{-1}(\mathcal{T})U(\Lambda, a)U(\mathcal{T}) = U(\mathcal{T}^{-1}\Lambda\mathcal{T}, \mathcal{T}^{-1}a)$$



由此推出 T 变换规则 $T^{-1}iJ^{\mu\nu}T = i\mathcal{T}^\mu{}_\rho \mathcal{T}^\nu{}_\sigma J^{\rho\sigma}$ 和 $T^{-1}iP^\mu T = i\mathcal{T}^\mu{}_\nu P^\nu$



 这里保留了推导过程中的虚数 i



！如果时间反演算符 T 与宇称算符 P 一样是线性幺正的，那么，

$$T^{-1}HT \equiv T^{-1}P^0T \equiv \mathcal{T}^0{}_0P^0 \equiv -H$$



这意味着哈密顿量算符 H 在 T 变换下发生改变，导致理论不具有时间反演对称性，与我们的假设矛盾



因此, T 不可能是线性么正算符

反线性反幺正算符

 不过，对称变换在量子力学中不一定要用线性幺正算符表述，也可以用反线性 (antilinear) 反幺正 (antiunitary) 算符描述

一般地，在反线性反么正算符 U 的作用下，态矢 $|\Psi_1\rangle$ 和 $|\Psi_2\rangle$ 满足

$$U(\textcolor{brown}{a}|\Psi_1\rangle + \textcolor{blue}{b}|\Psi_2\rangle) = \textcolor{brown}{a}^*U|\Psi_1\rangle + \textcolor{blue}{b}^*U|\Psi_2\rangle, \quad \langle \textcolor{red}{U}\Psi_1|\textcolor{red}{U}\Psi_2\rangle = \langle\Psi_1|\Psi_2\rangle^*$$

其中 a 和 b 是任意复数，第一个等式代表反线性，第二个等式代表反么正

反线性意味着 $-i|\Psi_1\rangle = U^{-1}U(-i|\Psi_1\rangle) = U^{-1}iU|\Psi_1\rangle$, 即

$$U^{-1} \mathbf{i} U = -\mathbf{i}$$

 对任意复数 a ，则有 $U^{-1}aU = a^*$

反线性反幺正算符

不过，对称变换在量子力学中不一定要用线性幺正算符表述，也可以用反线性(antilinear)反幺正(antiunitary)算符描述

一般地，在反线性反幺正算符 U 的作用下，态矢 $|\Psi_1\rangle$ 和 $|\Psi_2\rangle$ 满足

$$U(\textcolor{brown}{a}|\Psi_1\rangle + \textcolor{blue}{b}|\Psi_2\rangle) = \textcolor{brown}{a}^*U|\Psi_1\rangle + \textcolor{blue}{b}^*U|\Psi_2\rangle, \quad \langle \textcolor{red}{U}\Psi_1 | \textcolor{red}{U}\Psi_2 \rangle = \langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle^*$$

其中 a 和 b 是任意复数，第一个等式代表反线性，第二个等式代表反么正

 反线性意味着 $-i|\Psi_1\rangle = U^{-1}U(-i|\Psi_1\rangle) = U^{-1}iU|\Psi_1\rangle$, 即

$$U^{-1} \mathbf{i} U = -\mathbf{i}$$

对任意复数 a ，则有 $U^{-1}aU = a^*$

反线性反么正算符 U 的厄米共轭算符 U^\dagger 通过下式定义,

$$\langle \Psi_1 | U^\dagger \Psi_2 \rangle \equiv \langle U \Psi_1 | \Psi_2 \rangle^* = \langle \Psi_2 | U \Psi_1 \rangle$$

因而反幺正意味着 $\langle \Psi_1 | U^{-1} U \Psi_2 \rangle = \langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle = \langle U \Psi_1 | U \Psi_2 \rangle^* = \langle \Psi_1 | U^\dagger U \Psi_2 \rangle$

故 $U^{-1} = U^\dagger$ ，这个等式与线性么正算符满足的等式相同

T 变换的反线性反幺正性



现在将 T 算符定义为反线性反幺正算符，满足

$$T^{-1}\mathbf{i}T = -\mathbf{i}, \quad T^{-1} = T^\dagger$$



那么, $T^{-1}iJ^{\mu\nu}T = iT^\mu_{\rho}T^\nu_{\sigma}J^{\rho\sigma}$ 和 $T^{-1}iP^\mu T = iT^\mu_{\nu}P^\nu$ 表明生成元算符 $J^{\mu\nu}$ 和 P^μ 的 T 变换为

$$T^{-1} J^{\mu\nu} T = -\mathcal{T}^\mu{}_\rho \mathcal{T}^\nu{}_\sigma J^{\rho\sigma}, \quad T^{-1} P^\mu T = -\mathcal{T}^\mu{}_\nu P^\nu$$



即

$$T^{-1}\mathbf{J}T = -\mathbf{J}, \quad T^{-1}\mathbf{K}T = +\mathbf{K}, \quad T^{-1}\mathbf{H}T = +\mathbf{H}, \quad T^{-1}\mathbf{P}T = -\mathbf{P}$$

T 变换的反线性反幺正性



现在将 T 算符定义为反线性反幺正算符，满足

$$T^{-1} \mathbf{i} T = -\mathbf{i}, \quad T^{-1} = T^\dagger$$



那么, $T^{-1} i J^{\mu\nu} T = i \mathcal{T}^\mu{}_\rho \mathcal{T}^\nu{}_\sigma J^{\rho\sigma}$ 和 $T^{-1} i P^\mu T = i \mathcal{T}^\mu{}_\nu P^\nu$ 表明生成元算符 $J^{\mu\nu}$ 和 P^μ 的 T 变换为

$$T^{-1} J^{\mu\nu} T = -\mathcal{T}^\mu{}_\rho \mathcal{T}^\nu{}_\sigma J^{\rho\sigma}, \quad T^{-1} P^\mu T = -\mathcal{T}^\mu{}_\nu P^\nu$$



即

$$T^{-1}\mathbf{J}T = -\mathbf{J}, \quad T^{-1}\mathbf{K}T = +\mathbf{K}, \quad T^{-1}\mathbf{H}T = +\mathbf{H}, \quad T^{-1}\mathbf{P}T = -\mathbf{P}$$



从而，哈密顿量算符 H 在时间反演变换下不变，满足 $[H, T] = 0$ ，符合理论具有时间反演对称性的假设



动量算符 \mathbf{P} 和总角动量算符 \mathbf{J} 在 T 变换下分别反转成 $-\mathbf{P}$ 和 $-\mathbf{J}$



时间反演变换相当于逆着时间方向进行观察，因而动量和角动量的方向都会反转。

复标量场平面波展开式的 T 变换

 下面讨论**自由复标量场** $\phi(x)$

 T 变换会翻转粒子态对应的动量方向，因而产生湮灭算符的 T 变换为

$$T^{-1}a_{\mathbf{p}}^\dagger T = \eta_T a_{-\mathbf{p}}^\dagger, \quad T^{-1}a_{\mathbf{p}} T = \eta_T^* a_{-\mathbf{p}}, \quad T^{-1}b_{\mathbf{p}}^\dagger T = \tilde{\eta}_T b_{-\mathbf{p}}^\dagger, \quad T^{-1}b_{\mathbf{p}} T = \tilde{\eta}_T^* b_{-\mathbf{p}}$$

η_T 和 $\tilde{\eta}_T$ 是两个模为 1 的相位因子

复标量场平面波展开式的 T 变换



下面讨论**自由复标量场** $\phi(x)$



T 变换会翻转粒子态对应的动量方向，因而产生湮灭算符的 T 变换为

$$T^{-1}a_{\mathbf{p}}^\dagger T = \eta_T a_{-\mathbf{p}}^\dagger, \quad T^{-1}a_{\mathbf{p}} T = \eta_T^* a_{-\mathbf{p}}, \quad T^{-1}b_{\mathbf{p}}^\dagger T = \tilde{\eta}_T b_{-\mathbf{p}}^\dagger, \quad T^{-1}b_{\mathbf{p}} T = \tilde{\eta}_T^* b_{-\mathbf{p}}$$



η_T 和 $\tilde{\eta}_T$ 是两个模为 1 的相位因子



复标量场平面波展开式的 T 变换为

$$\begin{aligned} T^{-1}\phi(x)T &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \left(\textcolor{brown}{T}^{-1} a_{\mathbf{p}} \textcolor{blue}{T} T^{-1} e^{-ip \cdot x} T + \textcolor{teal}{T}^{-1} b_{\mathbf{p}}^\dagger \textcolor{red}{T} T^{-1} e^{ip \cdot x} T \right) \\ &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \left(\eta_T^* \textcolor{brown}{a}_{-\mathbf{p}} e^{ip \cdot x} + \tilde{\eta}_T b_{-\mathbf{p}}^\dagger e^{-ip \cdot x} \right) \\ &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \left[\eta_T^* a_{\mathbf{p}} e^{-ip \cdot (\textcolor{brown}{T}x)} + \tilde{\eta}_T b_{\mathbf{p}}^\dagger e^{ip \cdot (\textcolor{brown}{T}x)} \right] \end{aligned}$$



最后一步作了变量替换 $p \rightarrow -p$ ，并利用 $(\mathcal{P}p) \cdot x = p \cdot (\mathcal{P}x) = -p \cdot (\mathcal{T}x)$

复标量场的 T 变换

为了保持 $\phi(x)$ 的运动方程形式不变, $T^{-1}\phi(x)T$ 与 $\phi(Tx)$ 最多只能相差一个常数因子, 因此必须要求

$$\eta_T^* = \tilde{\eta}_T$$

使得 $\phi(x)$ 和 $\phi^\dagger(x)$ 的 T 变换为

$$T^{-1}\phi(x)T = \eta_T^*\phi(\mathcal{T}x), \quad T^{-1}\phi^\dagger(x)T = \eta_T\phi^\dagger(\mathcal{T}x)$$

复标量场的 T 变换

为了保持 $\phi(x)$ 的运动方程形式不变， $T^{-1}\phi(x)T$ 与 $\phi(Tx)$ 最多只能相差一个常数因子，因此必须要求

$$\eta_T^* = \tilde{\eta}_T$$

使得 $\phi(x)$ 和 $\phi^\dagger(x)$ 的 T 变换为

$$T^{-1}\phi(x)T = \eta_T^*\phi(\mathcal{T}x), \quad T^{-1}\phi^\dagger(x)T = \eta_T\phi^\dagger(\mathcal{T}x)$$

 为方便表述，在形式上以时空导数的时间反演变换定义 T 变换，

$$T^{-1}\partial_\mu T \equiv \partial'_\mu = (\mathcal{T}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu, \quad T^{-1}\partial^\mu T = \partial'^\mu = \mathcal{T}^\mu{}_\nu \partial^\nu$$

那么算符 $(\partial^\mu \phi^\dagger) \partial_\mu \phi$ 、 $\phi^\dagger \phi$ 和 $\phi^\dagger i \overleftrightarrow{\partial}^\mu \phi$ 的 T 变换是

$$T^{-1} \partial^\mu \phi^\dagger(x) \partial_\mu \phi(x) T = |\eta_T|^2 \mathcal{T}^\mu{}_\nu (\mathcal{T}^{-1})^\rho{}_\mu \partial^\nu \phi^\dagger(\mathcal{T}x) \partial_\rho \phi(\mathcal{T}x) = +\partial^\mu \phi^\dagger(\mathcal{T}x) \partial_\mu \phi(\mathcal{T}x)$$

$$T^{-1}\phi^\dagger(x)\phi(x)T = |\eta_T|^2\phi^\dagger(\mathcal{T}x)\phi(\mathcal{T}x) = +\phi^\dagger(\mathcal{T}x)\phi(\mathcal{T}x)$$

$$T^{-1}\phi^\dagger(x)i\overleftrightarrow{\partial}^\mu\phi(x)T = -|\eta_T|^2 \mathcal{T}^\mu{}_\nu \phi^\dagger(\mathcal{T}x)i\overleftrightarrow{\partial}^\nu\phi(\mathcal{T}x) = -\mathcal{T}^\mu{}_\nu \phi^\dagger(\mathcal{T}x)i\overleftrightarrow{\partial}^\nu\phi(\mathcal{T}x)$$

★ 自由复标量场的拉氏量在时间反演变换下不变，满足 $T^{-1}\mathcal{L}(x)T = +\mathcal{L}(\mathcal{T}x)$

实标量场的 T 变换

令 $b_p = a_p$ ，就得到**自由实标量场** $\phi(x)$ 的情况，此时 $\eta_T = \tilde{\eta}_T = \eta_T^*$

故 $\eta_T^2 = |\eta_T|^2 = 1$, 有

$$\eta_T = \pm 1$$

因此，存在两类实标量场

一类实标量场具有 $\eta_T = +1$ ，相应的 T 变换为

$$T^{-1}\phi(x)T = +\phi(\mathcal{T}x)$$

另一类实标量场具有 $\eta_T = -1$ ，相应的 T 变换为

$$T^{-1}\phi(x)T = -\phi(\mathcal{T}x)$$

无论哪一类实标量场 $\phi(x)$, 自由拉氏量都具有时间反演不变性



除了宇称和时间反演，另一种重要的分立变换是**电荷共轭** (charge conjugation)



电荷共轭变换将正反粒子互相转换，不只转换正反电荷，也转换所有其它正反U(1)守恒荷，但对时空坐标、四维动量、角动量和螺旋度没有影响

8.1.3 小节 标量场的 C 变换

除了宇称和时间反演，另一种重要的分立变换是**电荷共轭** (charge conjugation)

电荷共轭变换将正反粒子互相转换，不只转换正反电荷，也转换所有其它正反U(1)守恒荷，但对时空坐标、四维动量、角动量和螺旋度没有影响

4 在具有电荷共轭对称性的量子理论中，电荷共轭变换在 Hilbert 空间中诱导出态矢 $|\Psi\rangle$ 的线性幺正变换

$$|\Psi'\rangle = \textcolor{red}{C} |\Psi\rangle$$

 称为 C 变换

③ C 是自身的逆变换算符，满足

$$C^\dagger = C^{-1} = C$$

 因而 C 算符是厄米的

复标量场的 C 变换

对于自由复标量场 $\phi(x)$, C 变换将正粒子态转化成反粒子态, $C |\mathbf{p}^+\rangle = \eta_C |\mathbf{p}^-\rangle$

■ η_C 是相位因子，真空态在 C 变换下不变，满足 $C |0\rangle = |0\rangle$ ，从而

$$\sqrt{2E_p} C^{-1} a_p^\dagger C |0\rangle = C \sqrt{2E_p} a_p^\dagger |0\rangle = C |\mathbf{p}^+\rangle = \eta_C |\mathbf{p}^-\rangle = \sqrt{2E_p} \eta_C b_p^\dagger |0\rangle$$

$$C^{-1}a_p^\dagger C = \eta_C b_p^\dagger, \quad C^{-1}a_p C = \eta_C^* b_p$$

第一个等式等价于 $a_p^\dagger = \eta_C C b_p^\dagger C^{-1}$ ，因而 $\eta_C^* a_p^\dagger = |\eta_C|^2 C b_p^\dagger C^{-1} = C b_p^\dagger C^{-1}$ ，即

$$C^{-1}b_p^\dagger C = \eta_C^* a_p^\dagger, \quad C^{-1}b_p C = \eta_C a_p$$

复标量场的 C 变换

对于自由复标量场 $\phi(x)$, C 变换将正粒子态转化成反粒子态, $C |\mathbf{p}^+\rangle = \eta_C |\mathbf{p}^-\rangle$

■ η_C 是相位因子, 真空态在 C 变换下不变, 满足 $C |0\rangle = |0\rangle$, 从而

$$\sqrt{2E_p} \textcolor{brown}{C}^{-1} a_p^\dagger \textcolor{brown}{C} |0\rangle = C \sqrt{2E_p} a_p^\dagger |0\rangle = C |\mathbf{p}^+\rangle = \eta_C |\mathbf{p}^-\rangle = \sqrt{2E_p} \eta_C b_p^\dagger |0\rangle$$

$$\textcolor{brown}{C}^{-1} a_p^\dagger C = \eta_C b_p^\dagger, \quad \textcolor{teal}{C}^{-1} a_p C = \eta_C^* b_p$$

■ 第一个等式等价于 $a_p^\dagger = \eta_C C b_p^\dagger C^{-1}$, 因而 $\eta_C^* a_p^\dagger = |\eta_C|^2 C b_p^\dagger C^{-1} = C b_p^\dagger C^{-1}$, 即

$$\textcolor{brown}{C}^{-1} b_p^\dagger C = \eta_C^* a_p^\dagger, \quad \textcolor{teal}{C}^{-1} b_p C = \eta_C a_p$$

■ 于是, 复标量场 $\phi(x)$ 的 C 变换为

$$\begin{aligned} C^{-1} \phi(x) C &= \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (\textcolor{teal}{C}^{-1} a_p C e^{-ip \cdot x} + \textcolor{brown}{C}^{-1} b_p^\dagger C e^{ip \cdot x}) \\ &= \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (\eta_C^* b_p e^{-ip \cdot x} + \eta_C^* a_p^\dagger e^{ip \cdot x}) = \eta_C^* \phi^\dagger(x) \end{aligned}$$

■ 可见, C 变换使 $\phi(x)$ 与其厄米共轭场 $\phi^\dagger(x)$ 相互转换:

$$C^{-1} \phi(x) C = \eta_C^* \phi^\dagger(x), \quad C^{-1} \phi^\dagger(x) C = \eta_C \phi(x)$$

oooooooooooo

内禀 C 宇称

那么，算符 $(\partial^\mu \phi^\dagger) \partial_\mu \phi$ 、 $\phi^\dagger \phi$ 和 $\phi^\dagger i \overleftrightarrow{\partial}^\mu \phi$ 的 C 变换是

$$C^{-1} \partial^\mu \phi^\dagger(x) \partial_\mu \phi(x) C = |\eta_C|^2 \partial^\mu \phi(x) \partial_\mu \phi^\dagger(x) = +\partial^\mu \phi^\dagger(x) \partial_\mu \phi(x),$$

$$C^{-1}\phi^\dagger(x)\phi(x)C = |\eta_C|^2\phi(x)\phi^\dagger(x) = +\phi^\dagger(x)\phi(x)$$

$$C^{-1}\phi^\dagger(x)i\overleftrightarrow{\partial}^\mu\phi(x)C = |\eta_C|^2\phi(x)i\overleftrightarrow{\partial}^\mu\phi^\dagger(x) = -\phi^\dagger(x)i\overleftrightarrow{\partial}^\mu\phi(x)$$

oooooooooooo

○○○○○○○○●○

○○○○○○○○○○○○

00000

○○○○○○○○○○○○

内禀 C 宇称

那么，算符 $(\partial^\mu \phi^\dagger) \partial_\mu \phi$ 、 $\phi^\dagger \phi$ 和 $\phi^\dagger i \overleftrightarrow{\partial}^\mu \phi$ 的 C 变换是

$$C^{-1} \partial^\mu \phi^\dagger(x) \partial_\mu \phi(x) C = |\eta_C|^2 \partial^\mu \phi(x) \partial_\mu \phi^\dagger(x) = +\partial^\mu \phi^\dagger(x) \partial_\mu \phi(x),$$

$$C^{-1}\phi^\dagger(x)\phi(x)C = |\eta_C|^2\phi(x)\phi^\dagger(x) = +\phi^\dagger(x)\phi(x)$$

$$C^{-1}\phi^\dagger(x)i\overleftrightarrow{\partial}^\mu\phi(x)C = |\eta_C|^2\phi(x)i\overleftrightarrow{\partial}^\mu\phi^\dagger(x) = -\phi^\dagger(x)i\overleftrightarrow{\partial}^\mu\phi(x)$$

因此，自由复标量场的拉氏量在电荷共轭变换下不变，满足 $C^{-1}\mathcal{L}(x)C = +\mathcal{L}(x)$

对正反标量玻色子态 $|\phi\bar{\phi}\rangle = \int d^3p \Phi(p) a_p^\dagger b_{-p}^\dagger |0\rangle$ 作 C 变换，得

$$C |\phi\bar{\phi}\rangle = \int d^3p \Phi(\mathbf{p}) C^{-1} a_{\mathbf{p}}^\dagger C C^{-1} b_{-\mathbf{p}}^\dagger C |0\rangle = |\eta_C|^2 \int d^3p \Phi(\mathbf{p}) b_{\mathbf{p}}^\dagger a_{-\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle$$

$$[a_{\mathbf{p}}^\dagger, b_{\mathbf{q}}^\dagger] = 0 \rightarrow = \int d^3p \Phi(\mathbf{p}) a_{-\mathbf{p}}^\dagger b_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle = \int d^3p \Phi(-\mathbf{p}) a_{\mathbf{p}}^\dagger b_{-\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle \leftarrow \text{变量替换 } \mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p}$$

$$\Phi(-\mathbf{p}) = (-)^L \Phi(\mathbf{p}) \rightarrow = (-)^L \int d^3 p \Phi(\mathbf{p}) a_{\mathbf{p}}^\dagger b_{-\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle = (-)^L |\phi\bar{\phi}\rangle$$

oooooooooooo

○○○○○○○○●○

○○○○○○○○○○○○

00000

oooooooooooooooooooo

oooooooooooo

内禀 C 宇称

那么，算符 $(\partial^\mu \phi^\dagger) \partial_\mu \phi$ 、 $\phi^\dagger \phi$ 和 $\phi^\dagger i \overleftrightarrow{\partial}^\mu \phi$ 的 C 变换是

$$C^{-1} \partial^\mu \phi^\dagger(x) \partial_\mu \phi(x) C = |\eta_C|^2 \partial^\mu \phi(x) \partial_\mu \phi^\dagger(x) = +\partial^\mu \phi^\dagger(x) \partial_\mu \phi(x),$$

$$C^{-1}\phi^\dagger(x)\phi(x)C = |\eta_C|^2\phi(x)\phi^\dagger(x) = +\phi^\dagger(x)\phi(x).$$

$$C^{-1}\phi^\dagger(x)i\overleftrightarrow{\partial}^\mu\phi(x)C = |\eta_C|^2\phi(x)i\overleftrightarrow{\partial}^\mu\phi^\dagger(x) = -\phi^\dagger(x)i\overleftrightarrow{\partial}^\mu\phi(x)$$

因此，自由复标量场的拉氏量在电荷共轭变换下不变，满足 $C^{-1}\mathcal{L}(x)C = +\mathcal{L}(x)$

对正反标量玻色子态 $|\phi\bar{\phi}\rangle = \int d^3p \Phi(p) a_p^\dagger b_{-p}^\dagger |0\rangle$ 作 C 变换，得

$$\begin{aligned}
C|\phi\bar{\phi}\rangle &= \int d^3p \Phi(\mathbf{p}) C^{-1} a_{\mathbf{p}}^\dagger \textcolor{brown}{C} C^{-1} b_{-\mathbf{p}}^\dagger \textcolor{teal}{C} |0\rangle = |\eta_C|^2 \int d^3p \Phi(\mathbf{p}) \textcolor{brown}{b}_{\mathbf{p}}^\dagger \textcolor{teal}{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle \\
&= \int d^3p \Phi(\mathbf{p}) \textcolor{teal}{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \textcolor{brown}{b}_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle = \int d^3p \Phi(-\mathbf{p}) a_{\mathbf{p}}^\dagger b_{-\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle \\
&= (-)^L \int d^3p \Phi(\mathbf{p}) a_{\mathbf{p}}^\dagger b_{-\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle = (-)^L |\phi\bar{\phi}\rangle
\end{aligned}$$

 $|\phi\bar{\phi}\rangle$ 是 C 算符的本征态，**本征值** $(-)^L$ 是可观测量，称为 **C 宇称** (C -parity)

■ 扣除波函数 $\Phi(p)$ 贡献的 $(-)^L$ 因子之后, 剩下的 C 称为 $+$

即一对正反标量玻色子的内禀 C 宇称为偶

实标量场的 C 变换

对于自由实标量场， $\phi^\dagger(x) = \phi(x)$

💡 $C^{-1}\phi(x)C = \eta_C^*\phi^\dagger(x)$ 和 $C^{-1}\phi^\dagger(x)C = \eta_C\phi(x)$ 表明 $\eta_C = \eta_C^*$

故 $\eta_C^2 = |\eta_C|^2 = 1$, 有 $\eta_C = \pm 1$

这是 C 宇称的两种取值，也就是说，存在两类实标量场

一类实标量场具有偶的 C 宇称, $\eta_C = +1$, 相应的 C 变换为

$$C^{-1}\phi(x)C = +\phi(x)$$

另一类实标量场具有奇的 C 宇称, $\eta_C = -1$, 相应的 C 变换为

$$C^{-1}\phi(x)C = -\phi(x)$$

无论实标量场 $\phi(x)$ 具有哪种 C 宇称，自由拉氏量都具有电荷共轭不变性

8.2 节 旋量场的分立变换

8.2.1 小节 旋量场的 C 变换



现在讨论自由 Dirac 旋量场 $\psi(x)$ 的 C 变换

C 变换在互换正反粒子的同时，不改变动量 p 和螺旋度 $\lambda = \pm$ ，因此将正费米子态 $|p^+, \lambda\rangle = \sqrt{2E_p} a_{p,\lambda}^\dagger |0\rangle$ 转化成反费米子态 $|p^-, \lambda\rangle = \sqrt{2E_p} b_{p,\lambda}^\dagger |0\rangle$ ，

$$C |\mathbf{p}^+, \lambda\rangle = \zeta_C |\mathbf{p}^-, \lambda\rangle$$

ζ_C 是相位因子

8.2 节 旋量场的分立变换

8.2.1 小节 旋量场的 C 变换



现在讨论自由 Dirac 旋量场 $\psi(x)$ 的 C 变换

C 变换在互换正反粒子的同时，不改变动量 p 和螺旋度 $\lambda = \pm$ ，因此将正费米子态 $|p^+, \lambda\rangle = \sqrt{2E_p} a_{p,\lambda}^\dagger |0\rangle$ 转化成反费米子态 $|p^-, \lambda\rangle = \sqrt{2E_p} b_{p,\lambda}^\dagger |0\rangle$ ，

$$C |\mathbf{p}^+, \lambda\rangle = \zeta_C |\mathbf{p}^-, \lambda\rangle$$

ζ_C 是相位因子，由此推出

$$C^{-1}a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger C = \zeta_C b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger, \quad C^{-1}a_{\mathbf{p},\lambda} C = \zeta_C^* b_{\mathbf{p},\lambda}, \quad C^{-1}b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger C = \zeta_C^* a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger, \quad C^{-1}b_{\mathbf{p},\lambda} C = \zeta_C a_{\mathbf{p},\lambda}$$

$\psi(x)$ 平面波展开式的 C 变换为

$$\begin{aligned} C^{-1}\psi(x)C &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} \left[u(\mathbf{p}, \lambda) \textcolor{teal}{C}^{-1} a_{\mathbf{p}, \lambda} C e^{-ip \cdot x} + v(\mathbf{p}, \lambda) \textcolor{brown}{C}^{-1} b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger \textcolor{brown}{C} e^{ip \cdot x} \right] \\ &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} \left[\zeta_{\textcolor{teal}{C}}^* u(\mathbf{p}, \lambda) \textcolor{teal}{b}_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot x} + \zeta_{\textcolor{brown}{C}}^* v(\mathbf{p}, \lambda) \textcolor{brown}{a}_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{ip \cdot x} \right] \end{aligned}$$

螺旋态关系式

为了得到 $\psi(x)$ 的电荷共轭场，需要探讨旋量系数 $u(p, \lambda)$ 和 $v(p, \lambda)$ 之间的关系

在 Weyl 表象中，对 $\bar{u}(p, \lambda)$ 和 $\bar{v}(p, \lambda)$ 进行转置，得

$$\bar{u}^T(\mathbf{p}, \lambda) = \begin{pmatrix} \omega_\lambda(\mathbf{p})\xi_\lambda^*(\mathbf{p}) \\ \omega_{-\lambda}(\mathbf{p})\xi_{\lambda}^*(\mathbf{p}) \end{pmatrix}, \quad \bar{v}^T(\mathbf{p}, \lambda) = \begin{pmatrix} -\lambda\omega_{-\lambda}(\mathbf{p})\xi_{-\lambda}^*(\mathbf{p}) \\ \lambda\omega_\lambda(\mathbf{p})\xi_{-\lambda}^*(\mathbf{p}) \end{pmatrix}$$

 另一方面，按照螺旋态的具体形式， $i\sigma^2$ 对 $\xi_\lambda^*(p)$ 的作用为

$$i\sigma^2 \xi_+^*(\mathbf{p}) = N \begin{pmatrix} & 1 \\ -1 & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} |\mathbf{p}| + p^3 \\ p^1 - ip^2 \end{pmatrix} = N \begin{pmatrix} p^1 - ip^2 \\ -(|\mathbf{p}| + p^3) \end{pmatrix} = -\xi_-(\mathbf{p}) \quad (1)$$

$$i\sigma^2 \xi_-^*(\mathbf{p}) = N \begin{pmatrix} & 1 \\ -1 & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -p^1 - ip^2 \\ |\mathbf{p}| + p^3 \end{pmatrix} = N \begin{pmatrix} |\mathbf{p}| + p^3 \\ p^1 + ip^2 \end{pmatrix} = +\xi_+(\mathbf{p}) \quad (2)$$

其中归一化因子 $N \equiv [2|p|(|p| + p^3)]^{-1/2}$ ，归纳起来，得

$$i\sigma^2 \xi_\lambda^*(\mathbf{p}) = -\lambda \xi_{-\lambda}(\mathbf{p}), \quad i\sigma^2 \xi_{-\lambda}^*(\mathbf{p}) = \lambda \xi_\lambda(\mathbf{p})$$



电荷共轭场



引入旋量空间中的**电荷共轭矩阵**

$$\mathcal{C} \equiv i\gamma^0\gamma^2 = i \begin{pmatrix} & 1 \\ 1 & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & \sigma^2 \\ -\sigma^2 & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i\sigma^2 & \\ & i\sigma^2 \end{pmatrix}$$



就可以导出平面波旋量系数的关系式

$$\mathcal{C}\bar{u}^T(\mathbf{p}, \lambda) = \begin{pmatrix} -\omega_\lambda(\mathbf{p})i\sigma^2\xi_\lambda^*(\mathbf{p}) \\ \omega_{-\lambda}(\mathbf{p})i\sigma^2\xi_\lambda^*(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda\omega_\lambda(\mathbf{p})\xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) \\ -\lambda\omega_{-\lambda}(\mathbf{p})\xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = \mathcal{V}(\mathbf{p}, \lambda)$$

$$\mathcal{C}\bar{v}^T(\mathbf{p}, \lambda) = \begin{pmatrix} \lambda\omega_{-\lambda}(\mathbf{p})i\sigma^2\xi_{-\lambda}^*(\mathbf{p}) \\ \lambda\omega_\lambda(\mathbf{p})i\sigma^2\xi_{-\lambda}^*(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \omega_{-\lambda}(\mathbf{p})\xi_\lambda(\mathbf{p}) \\ \omega_\lambda(\mathbf{p})\xi_\lambda(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = u(\mathbf{p}, \lambda)$$

第十一章

○○○○○○○○○○

ANSWER

00000

第10章

000000000000

电荷共轭场



引入旋量空间中的电荷共轭矩阵

$$\mathcal{C} \equiv i\gamma^0\gamma^2 = i \begin{pmatrix} & 1 \\ 1 & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & \sigma^2 \\ -\sigma^2 & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i\sigma^2 & \\ & i\sigma^2 \end{pmatrix}$$



就可以导出平面波旋量系数的关系式

$$\mathcal{C}\bar{u}^T(\mathbf{p}, \lambda) = \begin{pmatrix} -\omega_\lambda(\mathbf{p})i\sigma^2\xi_\lambda^*(\mathbf{p}) \\ \omega_{-\lambda}(\mathbf{p})i\sigma^2\xi_\lambda^*(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda\omega_\lambda(\mathbf{p})\xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) \\ -\lambda\omega_{-\lambda}(\mathbf{p})\xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = \textcolor{brown}{v}(\mathbf{p}, \lambda)$$

$$\mathcal{C}\bar{v}^T(\mathbf{p}, \lambda) = \begin{pmatrix} \textcolor{teal}{\lambda} \omega_{-\lambda}(\mathbf{p}) i \sigma^2 \xi_{-\lambda}^*(\mathbf{p}) \\ \textcolor{teal}{\lambda} \omega_\lambda(\mathbf{p}) i \sigma^2 \xi_{-\lambda}^*(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \omega_{-\lambda}(\mathbf{p}) \xi_\lambda(\mathbf{p}) \\ \omega_\lambda(\mathbf{p}) \xi_\lambda(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = u(\mathbf{p}, \lambda)$$



于是, $\psi(x)$ 的 C 变换化为

$$C^{-1}\psi(x)C = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} \left[\zeta_C^* u(\mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot x} + \zeta_C^* v(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{ip \cdot x} \right]$$

$$= \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} \left[\zeta_C^* \mathcal{C} \bar{v}^T(\mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot x} + \zeta_C^* \mathcal{C} \bar{u}^T(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{ip \cdot x} \right] = \zeta_C^* \psi^C(x)$$



这里 $\psi^C(x) \equiv \mathcal{C}\bar{\psi}^T(x)$ 便是 $\psi(x)$ 的电荷共轭场



现在研究电荷共轭矩阵 C 的性质



利用 $(\sigma^2)^T = -\sigma^2$ 、 γ^0 的厄米性、 γ^2 的反厄米性和 $\gamma^2 \gamma^0 = -\gamma^0 \gamma^2$ ，有

$$\mathcal{C}^T = \begin{pmatrix} -i(\sigma^2)^T & \\ & i(\sigma^2)^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i\sigma^2 & \\ & -i\sigma^2 \end{pmatrix} = -\mathcal{C}$$

$$\mathcal{C}^\dagger = -i(\gamma^2)^\dagger(\gamma^0)^\dagger = i\gamma^2\gamma^0 = -i\gamma^0\gamma^2 = -\mathcal{C},$$

$$c^\dagger c = \gamma^0 \gamma^2 \gamma^0 \gamma^2 = -(\gamma^0)^2 (\gamma^2)^2 = 1$$



可见， C 是正矩阵，满足

$$\mathcal{C}^T = \mathcal{C}^\dagger = \mathcal{C}^{-1} = -\mathcal{C}$$

电荷共轭矩阵的性质



现在研究电荷共轭矩阵 C 的性质



利用 $(\sigma^2)^T = -\sigma^2$ 、 γ^0 的厄米性、 γ^2 的反厄米性和 $\gamma^2 \gamma^0 = -\gamma^0 \gamma^2$ ，有

$$\mathcal{C}^T = \begin{pmatrix} -i(\sigma^2)^T & \\ & i(\sigma^2)^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i\sigma^2 & \\ & -i\sigma^2 \end{pmatrix} = -\mathcal{C}$$

$$\mathcal{C}^\dagger = -i(\gamma^2)^\dagger(\gamma^0)^\dagger = i\gamma^2\gamma^0 = -i\gamma^0\gamma^2 = -\mathcal{C},$$

$$c^\dagger c = \gamma^0 \gamma^2 \gamma^0 \gamma^2 = -(\gamma^0)^2 (\gamma^2)^2 = 1$$



可见， C 是么正矩阵，满足

$$\mathcal{C}^T = \mathcal{C}^\dagger = \mathcal{C}^{-1} = -\mathcal{C}$$



 Pauli 矩阵满足 $\sigma^2\sigma^1\sigma^2 = i\sigma^2\sigma^3 = -\sigma^1 = -(\sigma^1)^T$ 、 $\sigma^2\sigma^2\sigma^2 = \sigma^2 = -(\sigma^2)^T$ 和 $\sigma^2\sigma^3\sigma^2 = i\sigma^1\sigma^2 = -\sigma^3 = -(\sigma^3)^T$ ，归纳得到 $\sigma^2\mathbf{1}\sigma^2 = \mathbf{1}^T$ 和 $\sigma^2\sigma\sigma^2 = -\sigma^T$ ，因此

$$\sigma^2 \sigma^\mu \sigma^2 = (\bar{\sigma}^\mu)^T, \quad \sigma^2 \bar{\sigma}^\mu \sigma^2 = (\sigma^\mu)^T$$

Dirac 矩阵的电荷共轭变换

利用 $\sigma^2 \sigma^\mu \sigma^2 = (\bar{\sigma}^\mu)^T$ 和 $\sigma^2 \bar{\sigma}^\mu \sigma^2 = (\sigma^\mu)^T$ 推出

$$\begin{aligned}\mathcal{C}^{-1}\gamma^\mu\mathcal{C} &= \begin{pmatrix} i\sigma^2 & \\ & -i\sigma^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & \sigma^\mu \\ \bar{\sigma}^\mu & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i\sigma^2 & \\ & i\sigma^2 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} & \sigma^2\sigma^\mu\sigma^2 \\ \sigma^2\bar{\sigma}^\mu\sigma^2 & \end{pmatrix} \\ &= - \begin{pmatrix} & (\bar{\sigma}^\mu)^T \\ (\sigma^\mu)^T & \end{pmatrix} \\ \mathcal{C}^{-1}\gamma^5\mathcal{C} &= \begin{pmatrix} i\sigma^2 & \\ & -i\sigma^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & \\ & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i\sigma^2 & \\ & i\sigma^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -(\sigma^2)^2 & \\ & (\sigma^2)^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & \\ & 1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

即得 γ^μ 和 γ^5 关于 C 的相似变换性质

$$\mathcal{C}^{-1}\gamma^\mu\mathcal{C} = -(\gamma^\mu)^T, \quad \mathcal{C}^{-1}\gamma^5\mathcal{C} = \gamma^5$$

 由于 $c^{-1} = -c$ ，这两个式子等价于

$$\mathcal{C}^{-1}(\gamma^\mu)^T \mathcal{C} = -\gamma^\mu, \quad \mathcal{C}^{-1}(\gamma^5)^T \mathcal{C} = \gamma^5$$

$\psi^c(x)$ 的运动方程

如果 Dirac 旋量场 $\psi(x)$ 携带电荷 Q ，相应的运动方程是

$$[\gamma^\mu(i\partial_\mu + QeA_\mu) - m]\psi = 0$$

对上式取厄米共轭，再右乘 γ^0 ，得

$$0 = \psi^\dagger [(\gamma^\mu)^\dagger (-i\partial_\mu + QeA_\mu) - m] \gamma^0 = \bar{\psi} [-\gamma^\mu (i\partial_\mu - QeA_\mu) - m]$$

 转置，推出 $[-(\gamma^\mu)^T(i\partial_\mu - QeA_\mu) - m]\bar{\psi}^T = 0$

$\psi^c(x)$ 的运动方程



如果 Dirac 旋量场 $\psi(x)$ 携带电荷 Q ，相应的运动方程是

$$[\gamma^\mu(i\partial_\mu + QeA_\mu) - m]\psi = 0$$



对上式取厄米共轭，再右乘 γ^0 ，得

$$0 = \psi^\dagger [(\gamma^\mu)^\dagger (-i\partial_\mu + QeA_\mu) - m] \gamma^0 = \bar{\psi} [-\gamma^\mu (i\partial_\mu - QeA_\mu) - m]$$



转置，推出 $[-(\gamma^\mu)^T(i\partial_\mu - QeA_\mu) - m]\bar{\psi}^T \equiv 0$



利用 $\mathcal{C}^{-1}\gamma^\mu\mathcal{C} = -(\gamma^\mu)^T$ ，将上式化为

$$0 = [\mathcal{C}^{-1} \gamma^\mu \mathcal{C} (\mathrm{i}\partial_\mu - QeA_\mu) - m \mathcal{C}^{-1} \mathcal{C}] \bar{\psi}^T = \mathcal{C}^{-1} [\gamma^\mu (\mathrm{i}\partial_\mu - QeA_\mu) - m] \mathcal{C} \bar{\psi}^T$$



从而得到电荷共轭场 $\psi^C(x)$ 的运动方程

$$[\gamma^\mu(i\partial_\mu - QeA_\mu) - m]\psi^C = 0$$



对比 $\psi(x)$ 的运动方程，可以看出 $\psi^C(x)$ 确实携带相反的电荷 $-Q$



同理， $\psi^C(x)$ 携带的任何 U(1) 守恒荷都与 $\psi(x)$ 相反

$\psi(x)$ 和 $\bar{\psi}(x)$ 的 C 变换



根据 $\mathcal{C}^T = \mathcal{C}^\dagger = \mathcal{C}^{-1} = -\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{C}^{-1}(\gamma^\mu)^T \mathcal{C} = -\gamma^\mu$



电荷共轭场 $\psi^C(x) = \mathcal{C}\bar{\psi}^\text{T}(x)$ 的 Dirac 共轭为

$$\begin{aligned}\bar{\psi}^C &= (\psi^C)^\dagger \gamma^0 = (\mathcal{C} \bar{\psi}^T)^\dagger \gamma^0 = [(\gamma^0)^T (\bar{\psi} \mathcal{C}^T)^\dagger]^T = [(\gamma^0)^T (\psi^\dagger \gamma^0 \mathcal{C}^\dagger)^\dagger]^T = [(\gamma^0)^T \mathcal{C} \gamma^0 \psi]^T \\ &= [\mathcal{C} \mathcal{C}^{-1} (\gamma^0)^T \mathcal{C} \gamma^0 \psi]^T = -(\mathcal{C} \gamma^0 \gamma^0 \psi)^T = (\mathcal{C}^T \psi)^T\end{aligned}$$



即

$$\bar{\psi}^C(x) = \psi^T(x) C$$

$\psi(x)$ 和 $\bar{\psi}(x)$ 的 C 变换

根据 $\mathcal{C}^T = \mathcal{C}^\dagger = \mathcal{C}^{-1} = -\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{C}^{-1}(\gamma^\mu)^T \mathcal{C} = -\gamma^\mu$

电荷共轭场 $\psi^C(x) = C\bar{\psi}^T(x)$ 的 Dirac 共轭为

$$\begin{aligned}\bar{\psi}^C &= (\psi^C)^\dagger \gamma^0 = (\mathcal{C} \bar{\psi}^T)^\dagger \gamma^0 = [(\gamma^0)^T (\bar{\psi} C^T)^\dagger]^T = [(\gamma^0)^T (\psi^\dagger \gamma^0 C^\dagger)^\dagger]^T = [(\gamma^0)^T C \gamma^0 \psi]^T \\ &= [C C^{-1} (\gamma^0)^T C \gamma^0 \psi]^T = - (C \gamma^0 \gamma^0 \psi)^T = (C^T \psi)^T\end{aligned}$$

A small icon of a movie camera, indicating a video recording or film-related context.

$$\bar{\psi}^C(x) = \psi^T(x) C$$

于是 $C^{-1}\bar{\psi}C = C^\dagger \psi^\dagger C \gamma^0 = (\textcolor{violet}{C^{-1}\psi C})^\dagger \gamma^0 = (\zeta_C^* \psi^C)^\dagger \gamma^0 = \zeta_C \bar{\psi}^C = \zeta_C \psi^T C$

也就是说, Dirac 旋量场 $\psi(x)$ 及其 Dirac 共轭场 $\bar{\psi}(x)$ 的 C 变换是

$$C^{-1}\psi(x)C = \zeta_C^*\psi^C(x) = \zeta_C^*\mathcal{C}\bar{\psi}^T(x), \quad C^{-1}\bar{\psi}(x)C = \zeta_C\bar{\psi}^C(x) = \zeta_C\psi^T(x)\mathcal{C}$$

仿照 $\bar{\psi}^C(x) = \psi^T(x) C$ 的推导, 由 $C\bar{u}^T(p, \lambda) = v(p, \lambda)$ 和 $C\bar{v}^T(p, \lambda) = u(p, \lambda)$ 得

$$\bar{v}(\mathbf{p}, \lambda) = u^T(\mathbf{p}, \lambda) \mathcal{C}, \quad \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) = v^T(\mathbf{p}, \lambda) \mathcal{C}$$

一般旋量双线性型的 C 变换

 考虑一般旋量双线性型 $\bar{\psi}(x)\Gamma\psi(x)$ ，其中 Γ 是旋量空间中的任意 4×4 矩阵，则

$$C^{-1}\bar{\psi}\Gamma\psi C = \textcolor{red}{C}^{-1}\bar{\psi}C\Gamma\textcolor{violet}{C}^{-1}\psi\textcolor{violet}{C} = |\zeta_C|^2\psi^T\textcolor{red}{C}\Gamma\textcolor{violet}{C}\bar{\psi}^T = \psi^T\textcolor{brown}{C}\Gamma\textcolor{brown}{C}\bar{\psi}^T = -\bar{\psi}\textcolor{teal}{C}^T\Gamma^T\textcolor{teal}{C}^T\psi$$

 最后一步进行了转置，需要注意的是，转置两个旋量场会交换两者的位置，为了与反对易关系相匹配，必须引进一个额外的负号

一般旋量双线性型的 C 变换

 考虑一般旋量双线性型 $\bar{\psi}(x)\Gamma\psi(x)$ ，其中 Γ 是旋量空间中的任意 4×4 矩阵，则

$$C^{-1}\bar{\psi}\Gamma\psi C = \textcolor{red}{C}^{-1}\bar{\psi}C\Gamma\textcolor{violet}{C}^{-1}\psi\textcolor{violet}{C} = |\zeta_C|^2\psi^T\textcolor{red}{C}\Gamma\textcolor{violet}{C}\bar{\psi}^T = \psi^T\textcolor{red}{C}\Gamma\textcolor{violet}{C}\bar{\psi}^T = -\bar{\psi}\textcolor{teal}{C}^T\Gamma^T\textcolor{teal}{C}^T\psi$$

 最后一步进行了转置，需要注意的是，转置两个旋量场会交换两者的位置，为了与反对易关系相匹配，必须引进一个额外的负号

从而, 由 $\mathcal{C}^T = \mathcal{C}^{-1} = -\mathcal{C}$ 得到 $\bar{\psi}\Gamma\psi$ 的 C 变换

$$C^{-1}\bar{\psi}(x)\Gamma\psi(x)C = \bar{\psi}(x)\mathcal{C}^{-1}\Gamma^T\mathcal{C}\psi(x) = \bar{\psi}(x)\Gamma^{\mathcal{C}}\psi(x)$$

其中 $\Gamma^C \equiv C^{-1}\Gamma^TC$ 可视为矩阵 Γ 的电荷共轭变换

一般旋量双线性型的 C 变换

考虑一般旋量双线性型 $\bar{\psi}(x)\Gamma\psi(x)$, 其中 Γ 是旋量空间中的任意 4×4 矩阵, 则

$$C^{-1}\bar{\psi}\Gamma\psi C = \textcolor{red}{C}^{-1}\bar{\psi}C\Gamma\textcolor{violet}{C}^{-1}\psi C = |\zeta_C|^2 \psi^T \textcolor{red}{C}\Gamma\textcolor{violet}{C}\bar{\psi}^T = \psi^T C\Gamma C \bar{\psi}^T = -\bar{\psi} \textcolor{teal}{C}^T \Gamma^T \textcolor{teal}{C}^T \psi$$

最后一步进行了转置, 需要注意的是, 转置两个旋量场会交换两者的位置, 为了与反对易关系相匹配, 必须引进一个额外的负号

从而, 由 $\textcolor{teal}{C}^T = C^{-1} = -C$ 得到 $\bar{\psi}\Gamma\psi$ 的 C 变换

$$C^{-1}\bar{\psi}(x)\Gamma\psi(x)C = \bar{\psi}(x)\textcolor{blue}{C}^{-1}\Gamma^T\textcolor{violet}{C}\psi(x) = \bar{\psi}(x)\Gamma^{\textcolor{blue}{C}}\psi(x)$$

其中 $\Gamma^{\textcolor{blue}{C}} \equiv \textcolor{violet}{C}^{-1}\Gamma^T\textcolor{violet}{C}$ 可视为矩阵 Γ 的电荷共轭变换

根据 $\mathcal{C}^{-1}(\gamma^\mu)^T\mathcal{C} = -\gamma^\mu$ 和 $\mathcal{C}^{-1}(\gamma^5)^T\mathcal{C} = \gamma^5$, 有

$$\mathbf{1}^{\textcolor{blue}{C}} = \mathcal{C}^{-1}\mathbf{1}^T\mathcal{C} = +1, \quad (\text{i}\gamma^5)^{\textcolor{blue}{C}} = \mathcal{C}^{-1}(\text{i}\gamma^5)^T\mathcal{C} = +\text{i}\gamma^5$$

$$(\gamma^\mu)^{\textcolor{blue}{C}} = \mathcal{C}^{-1}(\gamma^\mu)^T\mathcal{C} = -\gamma^\mu, \quad (\gamma^\mu\gamma^5)^{\textcolor{blue}{C}} = \mathcal{C}^{-1}(\gamma^\mu\gamma^5)^T\mathcal{C} = +\gamma^\mu\gamma^5$$

$$(\gamma^\mu\gamma^\nu)^{\textcolor{blue}{C}} = \mathcal{C}^{-1}(\gamma^\mu\gamma^\nu)^T\mathcal{C} = +\gamma^\nu\gamma^\mu, \quad (\sigma^{\mu\nu})^{\textcolor{blue}{C}} = \mathcal{C}^{-1}(\sigma^{\mu\nu})^T\mathcal{C} = -\sigma^{\mu\nu}$$

旋量双线性型的 C 变换



于是，各种旋量双线性型的 C 变换为

$$C^{-1}\bar{\psi}(x)\psi(x)C = +\bar{\psi}(x)\psi(x)$$

$$C^{-1}\bar{\psi}(x)i\gamma^5\psi(x)C = +\bar{\psi}(x)i\gamma^5\psi(x),$$

$$C^{-1}\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x)C = -\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x)$$

$$C^{-1}\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\gamma^5\psi(x)C = +\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\gamma^5\psi(x)$$

$$C^{-1}\bar{\psi}(x)\sigma^{\mu\nu}\psi(x)C = -\bar{\psi}(x)\sigma^{\mu\nu}\psi(x)$$



旋量双线性型的 C 变换



于是，各种旋量双线性型的 C 变换为

$$C^{-1}\bar{\psi}(x)\psi(x)C = +\bar{\psi}(x)\psi(x)$$

$$C^{-1}\bar{\psi}(x)i\gamma^5\psi(x)C = +\bar{\psi}(x)i\gamma^5\psi(x),$$

$$C^{-1}\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x)C = -\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x)$$

$$C^{-1}\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\gamma^5\psi(x)C = +\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\gamma^5\psi(x)$$

$$C^{-1}\bar{\psi}(x)\sigma^{\mu\nu}\psi(x)C = -\bar{\psi}(x)\sigma^{\mu\nu}\psi(x)$$



拉氏量中的动能项算符 $i\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi$ 在 C 变换下化为

$$\begin{aligned} C^{-1}i\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi C &= i\psi^T C \gamma^\mu C \partial_\mu \bar{\psi}^T = -i\psi^T C^{-1} \gamma^\mu C \partial_\mu \bar{\psi}^T = i\psi^T (\gamma^\mu)^T \partial_\mu \bar{\psi}^T \\ &= -i(\partial_\mu \bar{\psi})\gamma^\mu \psi = -i\partial_\mu(\bar{\psi}\gamma^\mu\psi) + i\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi \end{aligned}$$



最后的表达式中第一项是全散度，全时空积分后对作用量没有贡献，可以丢弃



因而上式表明动能项算符在 C 变换下不变



自由 Dirac 旋量场的拉氏量 $\mathcal{L} = i\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi - m\bar{\psi}\psi$ 具有电荷共轭不变性



手征旋量场算符的 C 变换

对于 7.3 节的手征旋量场 $\psi_L(x)$ 和 $\psi_R(x)$ ，算符 $\bar{\psi}_R \psi_L = \bar{\psi} P_L \psi = \bar{\psi}(1 - \gamma^5)\psi/2$ 和 $\bar{\psi}_L \psi_R = \bar{\psi} P_R \psi = \bar{\psi}(1 + \gamma^5)\psi/2$ 在 C 变换下不变，满足

$$C^{-1}\bar{\psi}_R(x)\psi_L(x)C = +\bar{\psi}_R(x)\psi_L(x),$$

$$C^{-1}\bar{\psi}_{\text{L}}(x)\psi_{\text{R}}(x)C = +\bar{\psi}_{\text{L}}(x)\psi_{\text{R}}(x)$$

100

000000000●00

5

○○○○○○○○○○○○○○○○

000000000000

手征旋量场算符的 C 变换

 对于 7.3 节的手征旋量场 $\psi_L(x)$ 和 $\psi_R(x)$ ，算符 $\bar{\psi}_R \psi_L = \bar{\psi} P_L \psi = \bar{\psi}(1 - \gamma^5)\psi/2$ 和 $\bar{\psi}_L \psi_R = \bar{\psi} P_R \psi = \bar{\psi}(1 + \gamma^5)\psi/2$ 在 C 变换下不变，满足

$$C^{-1}\bar{\psi}_R(x)\psi_L(x)C = +\bar{\psi}_R(x)\psi_L(x),$$

$$C^{-1}\bar{\psi}_{\text{L}}(x)\psi_{\text{R}}(x)C = +\bar{\psi}_{\text{L}}(x)\psi_{\text{R}}(x)$$

另一方面，左手流算符 $\bar{\psi}_L \gamma^\mu \psi_L = \bar{\psi} \gamma^\mu P_L \psi = \frac{1}{2} \bar{\psi} \gamma^\mu (1 - \gamma^5) \psi$ 和

右手流算符 $\bar{\psi}_R \gamma^\mu \psi_R = \bar{\psi} \gamma^\mu P_R \psi = \frac{1}{2} \bar{\psi} \gamma^\mu (1 + \gamma^5) \psi$ 的 C 变换为

$$C^{-1} \bar{\psi}_{\text{L}}(x) \gamma^\mu \psi_{\text{L}}(x) C = -\bar{\psi}_{\text{R}}(x) \gamma^\mu \psi_{\text{R}}(x)$$

$$C^{-1}\bar{\psi}_B(x)\gamma^\mu\psi_B(x)C = -\bar{\psi}_L(x)\gamma^\mu\psi_L(x)$$

两者在 C 变换下相互转化，并出现一个负号

 在弱相互作用中，左手流算符和右手流算符参与不同的规范相互作用，因而电荷共轭对称性遭到破坏

正反费米子系统的 C 变换

在质心系中考虑一对正反费米子 $\psi\bar{\psi}$ 组成的系统，当轨道角动量和总自旋角动量的量子数分别为 L 和 S 时，态矢表达为

$$|\psi\bar{\psi}\rangle_{L,S} = \sum_{\lambda\lambda'} \int d^3p \Phi(\mathbf{p}, \lambda, \lambda') a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger b_{-\mathbf{p}, \lambda'}^\dagger |0\rangle$$

波函数 $\Phi(\mathbf{p}, \lambda, \lambda')$ 满足 $\Phi(-\mathbf{p}, \lambda', \lambda) = (-)^L (-)^{S+1} \Phi(\mathbf{p}, \lambda, \lambda')$

$(-)^{S+1}$ 因子来自交换 λ 和 λ' 时 **Clebsch-Gordan 系数**的性质

标量场 P 变换标量场 T 、 C 变换旋量场 C 变换

Majorana 旋量场

旋量场 P 、 T 变换

矢量场分立变换

正反费米子系统的 C 变换

在质心系中考虑一对正反费米子 $\psi\bar{\psi}$ 组成的系统，当轨道角动量和总自旋角动量的量子数分别为 L 和 S 时，态矢表达为

$$|\psi\bar{\psi}\rangle_{L,S} = \sum_{\lambda\lambda'} \int d^3p \Phi(\mathbf{p}, \lambda, \lambda') a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger b_{-\mathbf{p}, \lambda'}^\dagger |0\rangle$$

波函数 $\Phi(\mathbf{p}, \lambda, \lambda')$ 满足 $\Phi(-\mathbf{p}, \lambda', \lambda) = (-)^L (-)^{S+1} \Phi(\mathbf{p}, \lambda, \lambda')$

$(-)^{S+1}$ 因子来自交换 λ 和 λ' 时 Clebsch-Gordan 系数的性质

$|\psi\bar{\psi}\rangle_{L,S}$ 的 C 变换为

$$\begin{aligned} C |\psi\bar{\psi}\rangle_{L,S} &= \sum_{\lambda\lambda'} \int d^3p \Phi(\mathbf{p}, \lambda, \lambda') C^{-1} a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger C C^{-1} b_{-\mathbf{p}, \lambda'}^\dagger C |0\rangle \\ &= |\zeta_C|^2 \sum_{\lambda\lambda'} \int d^3p \Phi(\mathbf{p}, \lambda, \lambda') b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger a_{-\mathbf{p}, \lambda'}^\dagger |0\rangle \\ &= - \sum_{\lambda\lambda'} \int d^3p \Phi(\mathbf{p}, \lambda, \lambda') a_{-\mathbf{p}, \lambda'}^\dagger b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger |0\rangle \end{aligned}$$

最后一步利用反对易关系 $\{a_{\mathbf{p}, \lambda}, b_{\mathbf{q}, \lambda'}^\dagger\} = 0$ 交换了两个产生算符

正反费米子系统的内禀 C 宇称

作变量替换 $p \rightarrow -p$ 和 $\lambda \leftrightarrow \lambda'$ ，利用 $\Phi(-p, \lambda', \lambda) = (-)^{L+S+1} \Phi(p, \lambda, \lambda')$ ，得

$$\begin{aligned}
C |\psi\bar{\psi}\rangle_{L,S} &= - \sum_{\lambda\lambda'} \int d^3p \Phi(\mathbf{p}, \lambda, \lambda') a_{-\mathbf{p}, \lambda'}^\dagger b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger |0\rangle \\
&= - \sum_{\lambda\lambda'} \int d^3p \Phi(-\mathbf{p}, \lambda', \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger b_{-\mathbf{p}, \lambda'}^\dagger |0\rangle \\
&= (-)^{L+S} \sum_{\lambda\lambda'} \int d^3p \Phi(\mathbf{p}, \lambda, \lambda') a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger b_{-\mathbf{p}, \lambda'}^\dagger |0\rangle \\
&= (-)^{L+S} |\psi\bar{\psi}\rangle_{L,S}
\end{aligned}$$



正反费米子系统的内禀 C 宇称

作变量替换 $\mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p}$ 和 $\lambda \leftrightarrow \lambda'$, 利用 $\Phi(-\mathbf{p}, \lambda', \lambda) = (-)^{L+S+1} \Phi(\mathbf{p}, \lambda, \lambda')$, 得

$$\begin{aligned}
 C |\psi\bar{\psi}\rangle_{L,S} &= - \sum_{\lambda\lambda'} \int d^3p \Phi(\mathbf{p}, \lambda, \lambda') a_{-\mathbf{p}, \lambda'}^\dagger b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger |0\rangle \\
 &= - \sum_{\lambda\lambda'} \int d^3p \Phi(-\mathbf{p}, \lambda', \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger b_{-\mathbf{p}, \lambda'}^\dagger |0\rangle \\
 &= (-)^{L+S} \sum_{\lambda\lambda'} \int d^3p \Phi(\mathbf{p}, \lambda, \lambda') a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger b_{-\mathbf{p}, \lambda'}^\dagger |0\rangle \\
 &= (-)^{L+S} |\psi\bar{\psi}\rangle_{L,S}
 \end{aligned}$$

可见, $|\psi\bar{\psi}\rangle_{L,S}$ 的 C 宇称为 $(-)^{L+S}$

扣除波函数 $\Phi(\mathbf{p}, \lambda, \lambda')$ 对 C 宇称的贡献 $(-)^{L+S+1}$ 之后

发现一对正反费米子的内禀 C 宇称为奇

8.2.2 小节 Majorana 旋量场

如果 $\psi(x)$ 与它的电荷共轭场相同, $\psi(x) = \psi^C(x)$, 即满足
自共轭条件

$$\psi(x) = C\bar{\psi}^T(x)$$

那么, $\psi(x)$ 就是一种纯中性的场, 不携带任何 $U(1)$ 守恒荷,
称为 Majorana 旋量场, 上式称为 Majorana 条件

于是, Majorana 旋量场满足 $\bar{\psi}(x) = \bar{\psi}^C(x)$



Ettore Majorana
(1906–?)

8.2.2 小节 Majorana 旋量场

 如果 $\psi(x)$ 与它的电荷共轭场相同, $\psi(x) = \psi^C(x)$, 即满足
自共轭条件

$$\psi(x) = \mathcal{C}\bar{\psi}^T(x)$$

那么, $\psi(x)$ 就是一种纯中性的场, 不携带任何 $U(1)$ 守恒荷, 称为 Majorana 旋量场, 上式称为 Majorana 条件

于是, Majorana 旋量场满足 $\bar{\psi}(x) = \bar{\psi}^C(x)$

根据 $\bar{\psi}^C(x) = \psi^T(x) \mathcal{C}$, Majorana 条件等价于 $\bar{\psi}(x) = \psi^T(x) \mathcal{C}$ (1906-?)

 这个等式右边没有出现 $\psi^\dagger(x)$ ，而出现 $\psi^T(x)$ ，表明 $\bar{\psi}(x)$ 与 $\psi(x)$ 线性相关

因此， $\bar{\psi}(x)$ 并不是独立于 $\psi(x)$ 的场变量，这一点与 Dirac 旋量场不同

根据前面的讨论, $\psi^C(x)$ 的平面波展开式为



Ettore Majorana

$$\psi^C(x) = \zeta_C C^{-1} \psi(x) C = \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} \left[u(\mathbf{p}, \lambda) \mathbf{b}_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot x} + v(\mathbf{p}, \lambda) \mathbf{a}_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{ip \cdot x} \right]$$

Majorana 费米子

将上式与 $\psi(x) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} [u(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot x} + v(\mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{ip \cdot x}]$ 比较

可知 Majorana 条件 $\psi(x) = \psi^C(x)$ 意味着 $b_{p,\lambda} = a_{p,\lambda}$

因此，Majorana 旋量场 $\psi(x)$ 的平面波展开式是

$$\psi(x) = \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda=\pm} \left[u(\mathbf{p}, \lambda) \color{red} a_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot x} + v(\mathbf{p}, \lambda) \color{red} a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{ip \cdot x} \right]$$

产生湮灭算符满足反对易关系

$$\{a_{\mathbf{p},\lambda},a_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger\}=(2\pi)^3\delta_{\lambda\lambda'}\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q}), \quad \{a_{\mathbf{p},\lambda},a_{\mathbf{q},\lambda'}\}=\{a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger,a_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger\}=0$$

Majorana 费米子

将上式与 $\psi(x) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} [u(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot x} + v(\mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{ip \cdot x}]$ 比较

可知 Majorana 条件 $\psi(x) = \psi^C(x)$ 意味着 $b_{p,\lambda} = a_{p,\lambda}$

因此，Majorana 旋量场 $\psi(x)$ 的平面波展开式是

$$\psi(x) = \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda=\pm} \left[u(\mathbf{p}, \lambda) \color{red} a_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot x} + v(\mathbf{p}, \lambda) \color{red} a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{ip \cdot x} \right]$$

产生湮灭算符满足反对易关系

$$\{a_{\mathbf{p},\lambda},a_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger\}=(2\pi)^3\delta_{\lambda\lambda'}\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q}), \quad \{a_{\mathbf{p},\lambda},a_{\mathbf{q},\lambda'}\}=\{a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger,a_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger\}=0$$

类似于实标量场，Majorana 旋量场描述一种纯中性费米子

因而正费米子与反费米子相同，称为 Majorana 费米子

 $C^{-1}a_{p,\lambda}C = \zeta_C^*b_{p,\lambda}$ 、 $C^{-1}b_{p,\lambda}C = \zeta_C a_{p,\lambda}$ 和 $b_{p,\lambda} = a_{p,\lambda}$ 表明 $\zeta_C = \zeta_C^*$

故 $\zeta_C = \pm 1$ ，也就是说，Majorana 旋量场的 C 宇称要么为偶，要么为奇。

Majorana 旋量场双线性型的 C 变换

对于 Majorana 旋量场, $C^{-1}\psi(x)C = \zeta_C^*\psi^C(x)$ 和 $C^{-1}\bar{\psi}(x)C = \zeta_C\bar{\psi}^C(x)$ 化为

$$C^{-1}\psi(x)C = \zeta_C\psi(x), \quad C^{-1}\bar{\psi}(x)C = \zeta_C\bar{\psi}(x)$$

在 C 变换下, 由 Majorana 旋量场组成的一般旋量双线性型 $\bar{\psi}(x)\Gamma\psi(x)$ 变成

$$C^{-1}\bar{\psi}(x)\Gamma\psi(x)C = C^{-1}\bar{\psi}(x)C\Gamma C^{-1}\psi(x)C = \zeta_C^2 \bar{\psi}(x)\Gamma\psi(x) = +\bar{\psi}(x)\Gamma\psi(x)$$

除非平庸的 $\bar{\psi}\Gamma\psi$ 算符的 C 守恒必须为偶

Majorana 旋量场双线性型的 C 变换

对于 Majorana 旋量场, $C^{-1}\psi(x)C = \zeta_C^*\psi^C(x)$ 和 $C^{-1}\bar{\psi}(x)C = \zeta_C\bar{\psi}^C(x)$ 化为

$$C^{-1}\psi(x)C = \zeta_C\psi(x), \quad C^{-1}\bar{\psi}(x)C = \zeta_C\bar{\psi}(x)$$

在 C 变换下，由 Majorana 旋量场组成的一般旋量双线性型 $\bar{\psi}(x)\Gamma\psi(x)$ 变成

$$C^{-1}\bar{\psi}(x)\Gamma\psi(x)C = C^{-1}\bar{\psi}(x)C\Gamma C^{-1}\psi(x)C = \zeta_C^2 \bar{\psi}(x)\Gamma\psi(x) = +\bar{\psi}(x)\Gamma\psi(x)$$

除非平庸的 $\bar{\psi}\Gamma\psi$ 算符的 C 宇称必须为偶

这表明 Majorana 旋量场不能构成 C 宇称为奇的算符 $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ 和 $\bar{\psi}\sigma^{\mu\nu}\psi$ ，即

$$\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x) = 0, \quad \bar{\psi}(x)\sigma^{\mu\nu}\psi(x) = 0$$

由 Majorana 旋量场构成的**非平庸**双线性型则具有与 Dirac 旋量场**相同的** C 变换规则

自由 Majorana 旋量场拉氏量

自由 Majorana 旋量场 $\psi(x)$ 的 Lorentz 不变拉氏量为

$$\mathcal{L} = \frac{i}{2} \bar{\psi} \gamma^\mu \partial_\mu \psi - \frac{1}{2} m \bar{\psi} \psi = \frac{i}{2} \psi^T \mathcal{C} \gamma^\mu \partial_\mu \psi - \frac{1}{2} m \psi^T \mathcal{C} \psi$$

应用 Euler-Lagrange 方程求经典运动方程时，拉氏量中 ψ^T 扮演的角色跟 ψ 相同

如果将前后两个旋量场分别标记为 ψ_1 和 ψ_2 ，动量项算符可化为

$$\begin{aligned}\psi_1^T \mathcal{C} \gamma^\mu \partial_\mu \psi_2 &= (\psi_1^T \mathcal{C} \gamma^\mu \partial_\mu \psi_2)^T = -(\partial_\mu \psi_2^T)(\gamma^\mu)^T \mathcal{C}^T \psi_1 \\ &= (\partial_\mu \psi_2^T) \mathcal{C} \mathcal{C}^{-1} (\gamma^\mu)^T \mathcal{C} \psi_1 = -(\partial_\mu \psi_2^T) \mathcal{C} \gamma^\mu \psi_1\end{aligned}$$

自由 Majorana 旋量场拉氏量

自由 Majorana 旋量场 $\psi(x)$ 的 Lorentz 不变拉氏量为

$$\mathcal{L} = \frac{i}{2} \bar{\psi} \gamma^\mu \partial_\mu \psi - \frac{1}{2} m \bar{\psi} \psi = \frac{i}{2} \psi^T \mathcal{C} \gamma^\mu \partial_\mu \psi - \frac{1}{2} m \psi^T \mathcal{C} \psi$$

应用 Euler-Lagrange 方程求经典运动方程时，拉氏量中 ψ^T 扮演的角色跟 ψ 相同

如果将前后两个旋量场分别标记为 ψ_1 和 ψ_2 ，动量项算符可化为

$$\begin{aligned}\psi_1^T \mathcal{C} \gamma^\mu \partial_\mu \psi_2 &= (\psi_1^T \mathcal{C} \gamma^\mu \partial_\mu \psi_2)^T = -(\partial_\mu \psi_2^T)(\gamma^\mu)^T \mathcal{C}^T \psi_1 \\ &= (\partial_\mu \psi_2^T) \mathcal{C} \mathcal{C}^{-1} (\gamma^\mu)^T \mathcal{C} \psi_1 = -(\partial_\mu \psi_2^T) \mathcal{C} \gamma^\mu \psi_1\end{aligned}$$

质量项算符可化为 $\psi_1^T \mathcal{C} \psi_2 = (\psi_1^T \mathcal{C} \psi_2)^T = -\psi_2^T \mathcal{C}^T \psi_1 = \psi_2^T \mathcal{C} \psi_1$ ，则

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \psi_1} = -\frac{i}{2}(\partial_\mu \psi_2^\top) \mathcal{C} \gamma^\mu - \frac{1}{2} m \psi_2^\top \mathcal{C}, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \psi_2} = -\frac{1}{2} m \psi_1^\top \mathcal{C}$$

 ψ_1 和 ψ_2 都是 ψ ，因而

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \psi)} = \frac{i}{2} \psi^T \mathcal{C} \gamma^\mu, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \psi} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \psi_1} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \psi_2} = -\frac{i}{2} (\partial_\mu \psi^T) \mathcal{C} \gamma^\mu - m \psi^T \mathcal{C}$$

自由 Majorana 旋量场运动方程

根据 $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \psi)} = \frac{i}{2} \psi^T \mathcal{C} \gamma^\mu$ 和 $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \psi} = -\frac{i}{2} (\partial_\mu \psi^T) \mathcal{C} \gamma^\mu - m \psi^T \mathcal{C}$

💡 Euler-Lagrange 方程给出 $0 = \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \psi)} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \psi} = i(\partial_\mu \psi^T) \mathcal{C} \gamma^\mu + m \psi^T \mathcal{C}$

对上式转置，并利用 $(\gamma^\mu)^T C^T = -C C^{-1} (\gamma^\mu)^T C = C \gamma^\mu = -C^T \gamma^\mu$ ，推出

$$0 = i(\gamma^\mu)^T \mathcal{C}^T \partial_\mu \psi + m \mathcal{C}^T \psi = \mathcal{C}^T (-i\gamma^\mu \partial_\mu \psi + m\psi)$$

○○○○○○○○○○○○○○○○

oooooooooooo

oooooooooooo

1

oooooooooooo

自由 Majorana 旋量场运动方程

 根据 $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \psi)} = \frac{i}{2} \psi^T \mathcal{C} \gamma^\mu$ 和 $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \psi} = -\frac{i}{2} (\partial_\mu \psi^T) \mathcal{C} \gamma^\mu - m \psi^T \mathcal{C}$

 Euler-Lagrange 方程给出 $0 = \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \psi)} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \psi} = i(\partial_\mu \psi^T) \mathcal{C} \gamma^\mu + m \psi^T \mathcal{C}$

 对上式转置，并利用 $(\gamma^\mu)^T \mathcal{C}^T = -\mathcal{C}\mathcal{C}^{-1}(\gamma^\mu)^T \mathcal{C} = \mathcal{C}\gamma^\mu = -\mathcal{C}^T\gamma^\mu$ ，推出

$$0 = i(\gamma^\mu)^T \mathcal{C}^T \partial_\mu \psi + m \mathcal{C}^T \psi = \mathcal{C}^T (-i\gamma^\mu \partial_\mu \psi + m\psi)$$

可见，自由的 Majorana 旋量场 $\psi(x)$ 也满足 Dirac 方程

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi(x) = 0$$

 这与上述平面波展开式

$$\psi(x) = \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda=\pm} \left[u(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot x} + v(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{ip \cdot x} \right]$$

相容

8.2.3 小节 旋量场的 P 变换

下面讨论自由 Dirac 旋量场 $\psi(x)$ 的 P 变换

宇称变换反转动量方向，但保持角动量不变，因而会翻转螺旋度 λ 的符号

平面波旋量系数 $u(p, \lambda)$ 和 $v(p, \lambda)$ 都是用螺旋态 $\xi_\lambda(p)$ 表达出来的

而宇称变换联系着螺旋态 $\xi_\lambda(\mathbf{p})$ 和 $\xi_{-\lambda}(-\mathbf{p})$

8.2.3 小节 旋量场的 P 变换

下面讨论自由 Dirac 旋量场 $\psi(x)$ 的 P 变换

宇称变换反转动量方向，但保持角动量不变，因而会翻转螺旋度 λ 的符号

平面波旋量系数 $u(p, \lambda)$ 和 $v(p, \lambda)$ 都是用螺旋态 $\xi_\lambda(p)$ 表达出来的

而宇称变换联系着螺旋态 $\xi_\lambda(\mathbf{p})$ 和 $\xi_{-\lambda}(-\mathbf{p})$

4.4.2 小节推出的 $(\hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma})\xi_{-\lambda}(-\mathbf{p}) = \lambda \xi_{-\lambda}(-\mathbf{p})$ 表明, $\xi_{-\lambda}(-\mathbf{p})$ 和 $\xi_\lambda(\mathbf{p})$ 都是本征值方程 $(\hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma})\xi_\lambda(\mathbf{p}) = \lambda \xi_\lambda(\mathbf{p})$ 的归一化解, 因而两者至多相差一个相位因子

这个相位因子的具体形式与螺旋态 $\xi_\lambda(p)$ 的约定有关

 将螺旋态 $\xi_+(p)$ 化为

$$\begin{aligned}\xi_+(\mathbf{p}) &= \frac{1}{\sqrt{2|\mathbf{p}|(|\mathbf{p}| + p^3)}} \begin{pmatrix} |\mathbf{p}| + p^3 \\ p^1 + ip^2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2|\mathbf{p}|(|\mathbf{p}| + p^3)}} \begin{pmatrix} \frac{|\mathbf{p}| + p^3}{\cancel{p^1 - ip^2}} (p^1 - ip^2) \\ \frac{p^1 + ip^2}{|\mathbf{p}| - p^3} (|\mathbf{p}| - p^3) \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2|\mathbf{p}|(|\mathbf{p}| + p^3)}} \begin{pmatrix} \frac{(|\mathbf{p}| + p^3)(\cancel{p^1} + ip^2)}{(\cancel{p^1})^2 + (\cancel{p^2})^2} (p^1 - ip^2) \\ \frac{p^1 + ip^2}{|\mathbf{p}| - p^3} (|\mathbf{p}| - p^3) \end{pmatrix}\end{aligned}$$

oooooooooooo

○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○

00000

○○○○○○○○○○○○○○

螺旋态的宇称变换相位因子

利用 $(|\mathbf{p}| + p^3)(|\mathbf{p}| - p^3) = |\mathbf{p}|^2 - (p^3)^2 = (p^1)^2 + (p^2)^2$ ，推出

$$\begin{aligned}\xi_+(\mathbf{p}) &= \frac{1}{\sqrt{2|\mathbf{p}|(|\mathbf{p}| + p^3)}} \begin{pmatrix} \frac{(|\mathbf{p}|+p^3)(p^1+ip^2)}{(p^1)^2+(p^2)^2} (p^1-ip^2) \\ \frac{p^1+ip^2}{|\mathbf{p}|-p^3} (|\mathbf{p}|-p^3) \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2|\mathbf{p}|(|\mathbf{p}| + p^3)}} \frac{p^1+ip^2}{|\mathbf{p}|-p^3} \begin{pmatrix} p^1-ip^2 \\ |\mathbf{p}|-p^3 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2|\mathbf{p}|(|\mathbf{p}|-p^3)}} \frac{p^1+ip^2}{\sqrt{(p^1)^2+(p^2)^2}} \begin{pmatrix} p^1-ip^2 \\ |\mathbf{p}|-p^3 \end{pmatrix} = \kappa_{\mathbf{p},+} \xi_-(-\mathbf{p})\end{aligned}$$

螺旋态的宇称变换相位因子

 利用 $(|\mathbf{p}| + p^3)(|\mathbf{p}| - p^3) = |\mathbf{p}|^2 - (p^3)^2 = (p^1)^2 + (p^2)^2$ ，推出

$$\begin{aligned}\xi_+(\mathbf{p}) &= \frac{1}{\sqrt{2|\mathbf{p}|(|\mathbf{p}| + p^3)}} \begin{pmatrix} \frac{(|\mathbf{p}| + p^3)(p^1 + ip^2)}{(p^1)^2 + (p^2)^2} (p^1 - ip^2) \\ \frac{p^1 + ip^2}{|\mathbf{p}| - p^3} (|\mathbf{p}| - p^3) \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2|\mathbf{p}|(|\mathbf{p}| + p^3)}} \frac{p^1 + ip^2}{|\mathbf{p}| - p^3} \begin{pmatrix} p^1 - ip^2 \\ |\mathbf{p}| - p^3 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2|\mathbf{p}|(|\mathbf{p}| - p^3)}} \frac{p^1 + ip^2}{\sqrt{(p^1)^2 + (p^2)^2}} \begin{pmatrix} p^1 - ip^2 \\ |\mathbf{p}| - p^3 \end{pmatrix} = \kappa_{\mathbf{p},+} \xi_-(-\mathbf{p})\end{aligned}$$

 其中 $\kappa_{\mathbf{p},+}$ 是相位因子 $\kappa_{\mathbf{p},\lambda} \equiv \frac{\lambda p^1 + ip^2}{\sqrt{(p^1)^2 + (p^2)^2}}$ 在 $\lambda = +$ 时的特例

 再由 $|\kappa_{\mathbf{p},\lambda}|^2 = \kappa_{\mathbf{p},+}^* \kappa_{\mathbf{p},+} = 1$ 推出 $\xi_-(-\mathbf{p}) = \kappa_{\mathbf{p},+}^* \xi_+(\mathbf{p})$ ，故

$$\xi_-(-\mathbf{p}) = \kappa_{-\mathbf{p},+}^* \xi_+(-\mathbf{p}) = \frac{-p^1 + ip^2}{\sqrt{(p^1)^2 + (p^2)^2}} \xi_+(-\mathbf{p}) = \kappa_{\mathbf{p},-} \xi_+(-\mathbf{p})$$

 归纳起来，有 $\xi_\lambda(\mathbf{p}) = \kappa_{\mathbf{p},\lambda} \xi_{-\lambda}(-\mathbf{p})$ ，可见 $\kappa_{\mathbf{p},\lambda}$ 就是想要得到的相位因子

$\gamma^0 u(p, \lambda)$ 和 $\gamma^0 v(p, \lambda)$



于 $\xi_\lambda(\mathbf{p}) = \kappa_{\mathbf{p}, \lambda} \xi_{-\lambda}(-\mathbf{p})$ ，Weyl 表象中的 $u(\mathbf{p}, \lambda)$ 和 $v(\mathbf{p}, \lambda)$ 满足

$$\gamma^0 u(\mathbf{p}, \lambda) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_{-\lambda}(\mathbf{p}) \xi_\lambda(\mathbf{p}) \\ \omega_\lambda(\mathbf{p}) \xi_\lambda(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \omega_\lambda(\mathbf{p}) \color{red}{\xi_\lambda(\mathbf{p})} \\ \omega_{-\lambda}(\mathbf{p}) \color{red}{\xi_\lambda(\mathbf{p})} \end{pmatrix} = \kappa_{\mathbf{p}, \lambda} \begin{pmatrix} \omega_\lambda(-\mathbf{p}) \color{red}{\xi_{-\lambda}(-\mathbf{p})} \\ \omega_{-\lambda}(-\mathbf{p}) \color{red}{\xi_{-\lambda}(-\mathbf{p})} \end{pmatrix}$$

$$\gamma^0 v(\mathbf{p}, \lambda) = \begin{pmatrix} & 1 \\ 1 & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\lambda \omega_\lambda(\mathbf{p}) \xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) \\ \lambda \omega_{-\lambda}(\mathbf{p}) \xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \omega_{-\lambda}(\mathbf{p}) \color{purple}{\xi_{-\lambda}(\mathbf{p})} \\ -\lambda \omega_\lambda(\mathbf{p}) \color{purple}{\xi_{-\lambda}(\mathbf{p})} \end{pmatrix}$$

$$= \kappa_{\mathbf{p}, -\lambda} \begin{pmatrix} \lambda \omega_{-\lambda}(-\mathbf{p}) \xi_\lambda(-\mathbf{p}) \\ -\lambda \omega_\lambda(-\mathbf{p}) \xi_\lambda(-\mathbf{p}) \end{pmatrix}$$



注意到

$$\kappa_{\mathbf{p}, -\lambda} = \frac{-\lambda p^1 + ip^2}{\sqrt{(p^1)^2 + (p^2)^2}} = -\frac{\lambda p^1 - ip^2}{\sqrt{(p^1)^2 + (p^2)^2}} = -\kappa_{\mathbf{p}, \lambda}^*$$



有

$$\gamma^0 u(\mathbf{p}, \lambda) = \kappa_{\mathbf{p}, \lambda} u(-\mathbf{p}, -\lambda), \quad \gamma^0 v(\mathbf{p}, \lambda) = -\kappa_{\mathbf{p}, \lambda}^* v(-\mathbf{p}, -\lambda)$$



产生湮灭算符的 P 变换

为得到**自洽的宇称变换结果**, 将正反费米子态 $|p^+, \lambda\rangle$ 和 $|p^-, \lambda\rangle$ 的 P 变换设为

$$P|p^+, \lambda\rangle = \zeta_P \kappa_{-p, -\lambda}^* | -p^+, -\lambda \rangle, \quad P|p^-, \lambda\rangle = \tilde{\zeta}_P \kappa_{-p, -\lambda}^* | -p^-, -\lambda \rangle$$

其中 ζ_P 和 $\tilde{\zeta}_P$ 是两个**相位因子**, 从而推出 $a_{p, \lambda}^\dagger$ 和 $a_{p, \lambda}$ 的 P 变换

$$P^{-1} a_{p, \lambda}^\dagger P = \zeta_P \kappa_{-p, -\lambda}^* a_{-p, -\lambda}^\dagger, \quad P^{-1} a_{p, \lambda} P = \zeta_P^* \kappa_{-p, -\lambda} a_{-p, -\lambda}$$

以及 $b_{p, \lambda}^\dagger$ 和 $b_{p, \lambda}$ 的 P 变换

$$P^{-1} b_{p, \lambda}^\dagger P = \tilde{\zeta}_P \kappa_{-p, -\lambda}^* b_{-p, -\lambda}^\dagger, \quad P^{-1} b_{p, \lambda} P = \tilde{\zeta}_P^* \kappa_{-p, -\lambda} b_{-p, -\lambda}$$

产生湮灭算符的 P 变换



为得到自洽的宇称变换结果，将正反费米子态 $|p^+, \lambda\rangle$ 和 $|p^-, \lambda\rangle$ 的 P 变换设为

$$P|\mathbf{p}^+, \lambda\rangle = \zeta_P \kappa_{-\mathbf{p}, -\lambda}^* |-\mathbf{p}^+, -\lambda\rangle, \quad P|\mathbf{p}^-, \lambda\rangle = \tilde{\zeta}_P \kappa_{-\mathbf{p}, -\lambda}^* |-\mathbf{p}^-, -\lambda\rangle$$



其中 ζ_P 和 $\tilde{\zeta}_P$ 是两个相位因子，从而推出 $a_{p,\lambda}^\dagger$ 和 $a_{p,\lambda}$ 的 P 变换

$$P^{-1}a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger P = \zeta_P \kappa_{-\mathbf{p},-\lambda}^* a_{-\mathbf{p},-\lambda}^\dagger, \quad P^{-1}a_{\mathbf{p},\lambda} P = \zeta_P^* \kappa_{-\mathbf{p},-\lambda} a_{-\mathbf{p},-\lambda}$$



以及 $b_{p,\lambda}^\dagger$ 和 $b_{p,\lambda}$ 的 P 变换

$$P^{-1}b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger P = \tilde{\zeta}_P \kappa_{-\mathbf{p},-\lambda}^* b_{-\mathbf{p},-\lambda}^\dagger, \quad P^{-1}b_{\mathbf{p},\lambda} P = \tilde{\zeta}_P^* \kappa_{-\mathbf{p},-\lambda} b_{-\mathbf{p},-\lambda}$$



Dirac 旋量场平面波展开式的 P 变换为

$$\begin{aligned} P^{-1}\psi(x)P &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} \left[u(\mathbf{p}, \lambda) \textcolor{brown}{P}^{-1} a_{\mathbf{p}, \lambda} P e^{-ip \cdot x} + v(\mathbf{p}, \lambda) P^{-1} b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger P e^{ip \cdot x} \right] \\ &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} \left[\zeta_{\textcolor{brown}{P}}^* \kappa_{-\mathbf{p}, -\lambda} u(\mathbf{p}, \lambda) \textcolor{brown}{a}_{-\mathbf{p}, -\lambda} e^{-ip \cdot x} + \tilde{\zeta}_P \kappa_{-\mathbf{p}, -\lambda}^* v(\mathbf{p}, \lambda) \textcolor{teal}{b}_{-\mathbf{p}, -\lambda}^\dagger e^{ip \cdot x} \right] \end{aligned}$$



$\psi(x)$ 的 P 变换

duck 作变量替换 $p \rightarrow -p$ 和 $\lambda \rightarrow -\lambda$, 得

$$\begin{aligned} & P^{-1}\psi(x)P \\ &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} \left[\zeta_P^* \kappa_{-\mathbf{p}, -\lambda} u(\mathbf{p}, \lambda) a_{-\mathbf{p}, -\lambda} e^{-ip \cdot x} + \tilde{\zeta}_P \kappa_{-\mathbf{p}, -\lambda}^* v(\mathbf{p}, \lambda) b_{-\mathbf{p}, -\lambda}^\dagger e^{ip \cdot x} \right] \\ &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} \left[\zeta_P^* \kappa_{\mathbf{p}, \lambda} u(-\mathbf{p}, -\lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot (\mathcal{P}x)} + \tilde{\zeta}_P \kappa_{\mathbf{p}, \lambda}^* v(-\mathbf{p}, -\lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{ip \cdot (\mathcal{P}x)} \right] \\ &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} \left[\zeta_P^* \gamma^0 u(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot (\mathcal{P}x)} - \tilde{\zeta}_P \gamma^0 v(\mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{ip \cdot (\mathcal{P}x)} \right] \end{aligned}$$

最后一步用到 $\gamma^0 u(\mathbf{p}, \lambda) = \kappa_{\mathbf{p}, \lambda} u(-\mathbf{p}, -\lambda)$ 和 $\gamma^0 v(\mathbf{p}, \lambda) = -\kappa_{\mathbf{p}, \lambda}^* v(-\mathbf{p}, -\lambda)$

$\psi(x)$ 的 P 变换

 作变量替换 $p \rightarrow -p$ 和 $\lambda \rightarrow -\lambda$ ，得

$$\begin{aligned}
& P^{-1} \psi(x) P \\
&= \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} \left[\zeta_P^* \kappa_{-\mathbf{p}, -\lambda} u(\mathbf{p}, \lambda) a_{-\mathbf{p}, -\lambda} e^{-ip \cdot x} + \tilde{\zeta}_P \kappa_{-\mathbf{p}, -\lambda}^* v(\mathbf{p}, \lambda) b_{-\mathbf{p}, -\lambda}^\dagger e^{ip \cdot x} \right] \\
&= \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} \left[\zeta_P^* \kappa_{\mathbf{p}, \lambda} u(-\mathbf{p}, -\lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot (\mathcal{P}x)} + \tilde{\zeta}_P \kappa_{\mathbf{p}, \lambda}^* v(-\mathbf{p}, -\lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{ip \cdot (\mathcal{P}x)} \right] \\
&= \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} \left[\zeta_P^* \gamma^0 u(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot (\mathcal{P}x)} - \tilde{\zeta}_P \gamma^0 v(\mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{ip \cdot (\mathcal{P}x)} \right]
\end{aligned}$$

最后一步用到 $\gamma^0 u(\mathbf{p}, \lambda) = \kappa_{\mathbf{p}, \lambda} u(-\mathbf{p}, -\lambda)$ 和 $\gamma^0 v(\mathbf{p}, \lambda) = -\kappa_{\mathbf{p}, \lambda}^* v(-\mathbf{p}, -\lambda)$

 为了保持 $\psi(x)$ 的运动方程形式不变，必须要求 $\zeta_P^* = -\tilde{\zeta}_P$ ，使 $b_{p,\lambda}^\dagger$ 和 $b_{p,\lambda}$ 的 P 变换化为 $P^{-1}b_{p,\lambda}^\dagger P = -\zeta_P^* \kappa_{-p,-\lambda}^* b_{-p,-\lambda}^\dagger$ 和 $P^{-1}b_{p,\lambda} P = -\zeta_P \kappa_{-p,-\lambda} b_{-p,-\lambda}$

从而 $\psi(x)$ 的 P 变换为 $P^{-1}\psi(x)P = D(\mathcal{P})\psi(\mathcal{P}x)$

其中 $D(\mathcal{P}) \equiv \zeta_P^* \gamma^0$ 是旋量空间中的宇称变换矩阵

$\bar{\psi}(x)$ 的 P 变换



宇称变换矩阵 $D(\mathcal{P}) = \zeta_P^* \gamma^0$ 在 4.1 节中写作 $D(\mathcal{P}) = \zeta \gamma^0$, 比较得 $\zeta_P^* = \zeta$



现在，作宇称变换后， $\psi'(x') = P^{-1}\psi(x')P = D(\mathcal{P})\psi(\mathcal{P}x') = D(\mathcal{P})\psi(x)$ 也满足 Dirac 方程。

$$\begin{aligned}
& (\mathrm{i}\gamma^\mu \partial'_\mu - m)\psi'(x') = [\mathrm{i}\gamma^\mu (\mathcal{P}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu - m]D(\mathcal{P})\psi(x) \\
&= D(\mathcal{P})[\mathrm{i}\mathcal{D}^{-1}(\mathcal{P})\gamma^\mu D(\mathcal{P})(\mathcal{P}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu - m]\psi(x) \\
&= D(\mathcal{P})[\mathrm{i}\mathcal{P}^\mu{}_\rho \gamma^\rho (\mathcal{P}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu - m]\psi(x) = D(\mathcal{P})(\mathrm{i}\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi(x) = \mathbf{0}
\end{aligned}$$



第三步用到 $D^{-1}(\mathcal{P})\gamma^\mu D(\mathcal{P}) = \mathcal{P}^\mu{}_\nu \gamma^\nu$

0000000000000000

卷之三

000000000000

0000

www.english-test.net

○○○○○○○○○○○○○○

$\bar{\psi}(x)$ 的 P 变换

 宇称变换矩阵 $D(\mathcal{P}) = \zeta_P^* \gamma^0$ 在 4.1 节中写作 $D(\mathcal{P}) = \zeta \gamma^0$ ，比较得 $\zeta_P^* = \zeta$

现在，作宇称变换后， $\psi'(x') = P^{-1}\psi(x')P = D(\mathcal{P})\psi(\mathcal{P}x') = D(\mathcal{P})\psi(x)$ 也满足 Dirac 方程。

$$\begin{aligned}
& (\mathrm{i}\gamma^\mu \partial'_\mu - m)\psi'(x') = [\mathrm{i}\gamma^\mu (\mathcal{P}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu - m]D(\mathcal{P})\psi(x) \\
&= D(\mathcal{P})[\mathrm{i}\mathcal{D}^{-1}(\mathcal{P})\gamma^\mu D(\mathcal{P})(\mathcal{P}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu - m]\psi(x) \\
&= D(\mathcal{P})[\mathrm{i}\mathcal{P}^\mu{}_\rho \gamma^\rho (\mathcal{P}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu - m]\psi(x) = D(\mathcal{P})(\mathrm{i}\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi(x) = \mathbf{0}
\end{aligned}$$

第三步用到 $D^{-1}(\mathcal{P})\gamma^\mu D(\mathcal{P}) = \mathcal{P}^\mu{}_\nu \gamma^\nu$

 宇称变换矩阵 $D(\mathcal{P})$ 是幺正的，满足 $D^{-1}(\mathcal{P}) = D^\dagger(\mathcal{P}) = \zeta_P \gamma^0$

由 $P^{-1}\psi^\dagger(x)P = [P^{-1}\psi(x)P]^\dagger = [\zeta_P^*\gamma^0\psi(\mathcal{P}x)]^\dagger = \zeta_P\psi^\dagger(\mathcal{P}x)\gamma^0$ 得

$$P^{-1}\bar{\psi}(x)P = P^{-1}\psi^\dagger(x)P \gamma^0 = \zeta_P \psi^\dagger(\mathcal{P}x) \gamma^0 \gamma^0 = \bar{\psi}(\mathcal{P}x) \zeta_P \gamma^0$$

即 $\bar{\psi}(x)$ 的 P 变换为

$$P^{-1}\bar{\psi}(x)P = \bar{\psi}(\mathcal{P}x)D^{-1}(\mathcal{P})$$

旋量双线性型的 P 变换

从而，一般旋量双线性型 $\bar{\psi}(x)\Gamma\psi(x)$ 的 P 变换为

$$P^{-1}\bar{\psi}(x)\Gamma\psi(x)P = P^{-1}\bar{\psi}(x)P\Gamma P^{-1}\psi(x)P = \bar{\psi}(\mathcal{P}x)\textcolor{blue}{D}^{-1}(\mathcal{P})\Gamma D(\mathcal{P})\psi(\mathcal{P}x)$$

利用在 4.1 节推导出来的结果， $D^{-1}(\mathcal{P})\mathbf{1}D(\mathcal{P}) = +1$

$$D^{-1}(\mathcal{P})i\gamma^5 D(\mathcal{P}) = -i\gamma^5, \quad D^{-1}(\mathcal{P})\gamma^\mu D(\mathcal{P}) = \mathcal{P}^\mu{}_\nu \gamma^\nu$$

$$D^{-1}(\mathcal{P})\gamma^\mu\gamma^5 D(\mathcal{P}) = -\mathcal{P}^\mu{}_\nu \gamma^\nu\gamma^5, \quad D^{-1}(\mathcal{P})\sigma^{\mu\nu} D(\mathcal{P}) = \mathcal{P}^\mu{}_\rho \mathcal{P}^\nu{}_\sigma \sigma^{\rho\sigma}$$

得到

$$P^{-1}\bar{\psi}(x)\psi(x)P = +\bar{\psi}(\mathcal{P}x)\psi(\mathcal{P}x)$$

$$P^{-1}\bar{\psi}(x)i\gamma^5\psi(x)P = -\bar{\psi}(\mathcal{P}x)i\gamma^5\psi(\mathcal{P}x)$$

$$P^{-1}\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x)P = \mathcal{P}^\mu{}_\nu \bar{\psi}(\mathcal{P}x)\gamma^\nu\psi(\mathcal{P}x)$$

$$P^{-1}\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\gamma^5\psi(x)P = -\mathcal{P}^\mu{}_\nu \bar{\psi}(\mathcal{P}x)\gamma^\nu\gamma^5\psi(\mathcal{P}x)$$

$$P^{-1}\bar{\psi}(x)\sigma^{\mu\nu}\psi(x)P = \mathcal{P}^\mu{}_\rho \mathcal{P}^\nu{}_\sigma \bar{\psi}(\mathcal{P}x)\sigma^{\rho\sigma}\psi(\mathcal{P}x)$$

因此， $\bar{\psi}\psi$ 是狭义的标量算符， $\bar{\psi}i\gamma^5\psi$ 是赝标量算符

$\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ 是极矢量算符， $\bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi$ 是轴矢量算符

手征旋量双线性型的 P 变换



进一步推出

$$P^{-1}\bar{\psi}_{\text{R}}(x)\psi_{\text{L}}(x)P = \bar{\psi}_{\text{L}}(\mathcal{P}x)\psi_{\text{R}}(\mathcal{P}x)$$

$$P^{-1}\bar{\psi}_{\text{L}}(x)\psi_{\text{R}}(x)P = \bar{\psi}_{\text{R}}(\mathcal{P}x)\psi_{\text{L}}(\mathcal{P}x)$$

$$P^{-1} \bar{\psi}_L(x) \gamma^\mu \psi_L(x) P = \mathcal{P}^\mu{}_\nu \bar{\psi}_R(\mathcal{P}x) \gamma^\nu \psi_R(\mathcal{P}x)$$

$$P^{-1} \bar{\psi}_R(x) \gamma^\mu \psi_R(x) P = \mathcal{P}^\mu{}_\nu \bar{\psi}_L(\mathcal{P}x) \gamma^\nu \psi_L(\mathcal{P}x)$$



左手流算符 $\bar{\psi}_L \gamma^\mu \psi_L$ 和右手流算符 $\bar{\psi}_R \gamma^\mu \psi_R$ 在 P 变换下相互转化



在弱相互作用中，左手流算符和右手流算符参与不同的规范相互作用，因而空间反射对称性遭到破坏

手征旋量双线性型的 P 变换

进一步推出

$$P^{-1} \bar{\psi}_R(x) \psi_L(x) P = \bar{\psi}_L(\mathcal{P}x) \psi_R(\mathcal{P}x)$$

$$P^{-1} \bar{\psi}_L(x) \psi_R(x) P = \bar{\psi}_R(\mathcal{P}x) \psi_L(\mathcal{P}x)$$

$$P^{-1} \bar{\psi}_L(x) \gamma^\mu \psi_L(x) P = \mathcal{P}^\mu{}_\nu \bar{\psi}_R(\mathcal{P}x) \gamma^\nu \psi_R(\mathcal{P}x)$$

$$P^{-1} \bar{\psi}_R(x) \gamma^\mu \psi_R(x) P = \mathcal{P}^\mu{}_\nu \bar{\psi}_L(\mathcal{P}x) \gamma^\nu \psi_L(\mathcal{P}x)$$

左手流算符 $\bar{\psi}_L \gamma^\mu \psi_L$ 和右手流算符 $\bar{\psi}_R \gamma^\mu \psi_R$ 在 P 变换下相互转化

在弱相互作用中，左手流算符和右手流算符参与不同的规范相互作用，因而空间反射对称性遭到破坏

动能项算符 $i\bar{\psi} \gamma^\mu \partial_\mu \psi$ 的 P 变换为

$$\begin{aligned} P^{-1} i\bar{\psi}(x) \gamma^\mu \partial_\mu \psi(x) P &= i\bar{\psi}(\mathcal{P}x) D^{-1}(\mathcal{P}) \gamma^\mu D(\mathcal{P}) (\mathcal{P}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu \psi(\mathcal{P}x) \\ &= i\bar{\psi}(\mathcal{P}x) \mathcal{P}^\mu{}_\rho \gamma^\rho (\mathcal{P}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu \psi(\mathcal{P}x) = +i\bar{\psi}(\mathcal{P}x) \gamma^\mu \partial_\mu \psi(\mathcal{P}x) \end{aligned}$$

因此，自由 Dirac 旋量场的拉氏量在宇称变换下不变



在质心系中考虑一对正反费米子 $\psi\bar{\psi}$ 组成的系统



设两个粒子的螺旋度相反，轨道角动量量子数为 L 的态矢为

$$|\psi\bar{\psi}\rangle = \sum_{\lambda} \int d^3p \Phi(\mathbf{p}) a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger b_{-\mathbf{p},-\lambda}^\dagger |0\rangle, \quad \Phi(-\mathbf{p}) = (-)^L \Phi(\mathbf{p})$$



相应的 P 变换是

$$\begin{aligned}
P |\psi \bar{\psi}\rangle &= \sum_{\lambda} \int d^3 p \Phi(\mathbf{p}) \textcolor{brown}{P^{-1}} a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger P P^{-1} b_{-\mathbf{p}, -\lambda}^\dagger P |0\rangle \\
&= -|\zeta_P|^2 \sum_{\lambda} \int d^3 p \Phi(\mathbf{p}) \kappa_{-\mathbf{p}, -\lambda}^* \kappa_{\mathbf{p}, \lambda}^* a_{-\mathbf{p}, -\lambda}^\dagger b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger |0\rangle \\
&= -\sum_{\lambda} \int d^3 p \Phi(-\mathbf{p}) \kappa_{\mathbf{p}, \lambda}^* \kappa_{-\mathbf{p}, -\lambda}^* a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger b_{-\mathbf{p}, -\lambda}^\dagger |0\rangle
\end{aligned}$$



最后一步作了变量替换 $p \rightarrow -p$ 和 $\lambda \rightarrow -\lambda$

内宣字样

 利用 $\kappa_{\mathbf{p}, \lambda}^* \kappa_{-\mathbf{p}, -\lambda}^* = \frac{\lambda p^1 - ip^2}{\sqrt{(p^1)^2 + (p^2)^2}} \frac{\lambda p^1 + ip^2}{\sqrt{(p^1)^2 + (p^2)^2}} = 1$, 推出

$$\begin{aligned} P |\psi\bar{\psi}\rangle &= - \sum_{\lambda} \int d^3 p \Phi(-\mathbf{p}) \kappa_{\mathbf{p},\lambda}^* \kappa_{-\mathbf{p},-\lambda}^* a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger b_{-\mathbf{p},-\lambda}^\dagger |0\rangle \\ &= -(-)^L \sum_{\lambda} \int d^3 p \Phi(\mathbf{p}) a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger b_{-\mathbf{p},-\lambda}^\dagger |0\rangle = (-)^{L+1} |\psi\bar{\psi}\rangle \end{aligned}$$

可见， $|\psi\bar{\psi}\rangle$ 的总宇称为 $(-)^{L+1}$ ，包含轨道宇称 $(-)^L$ 和内禀宇称 —
也就是说，一对正反费米子的内禀宇称为奇

第十一章

○○○○○○○○○○

000000000000

00000

www.english-test.net

○○○○○○○○○○○○

内禀宇称

 利用 $\kappa_{\mathbf{p}, \lambda}^* \kappa_{-\mathbf{p}, -\lambda}^* = \frac{\lambda p^1 - ip^2}{\sqrt{(p^1)^2 + (p^2)^2}} \frac{\lambda p^1 + ip^2}{\sqrt{(p^1)^2 + (p^2)^2}} = 1$, 推出

$$\begin{aligned} P |\psi\bar{\psi}\rangle &= - \sum_{\lambda} \int d^3 p \Phi(-\mathbf{p}) \kappa_{\mathbf{p},\lambda}^* \kappa_{-\mathbf{p},-\lambda}^* a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger b_{-\mathbf{p},-\lambda}^\dagger |0\rangle \\ &= -(-)^L \sum_{\lambda} \int d^3 p \Phi(\mathbf{p}) a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger b_{-\mathbf{p},-\lambda}^\dagger |0\rangle = (-)^{L+1} |\psi\bar{\psi}\rangle \end{aligned}$$

可见, $|\psi\bar{\psi}\rangle$ 的总宇称为 $(-)^{L+1}$, 包含轨道宇称 $(-)^L$ 和内禀宇称 $-$

也就是说，一对正反费米子的内禀宇称为奇

对于自由的 Majorana 旋量场 $\psi(x)$, $b_{p,\lambda} = a_{p,\lambda}$, 则 $\tilde{\zeta}_P = \zeta_P$

从而 $\zeta_P^* = -\tilde{\zeta}_P \equiv -\zeta_P$ ，因此

$$\zeta_P = \pm i$$

故 Majorana 旋量场的宇称是虚数

8.2.4 小节 旋量场的 T 变换

 下面讨论自由 Dirac 旋量场 $\psi(x)$ 的 T 变换

 时间反演变换同时反转动量和角动量的方向，因而会保持螺旋度 λ 不变

 另一方面， T 变换是反幺正的，将一个复数变换成它的复共轭

因此 T 变换联系着螺旋态 $\xi_\lambda(\mathbf{p})$ 和 $\xi_\lambda^*(-\mathbf{p})$ ，它们存在 8.2.1 小节推出的关系

$$i\sigma^2 \xi_\lambda^*(\mathbf{p}) = -\lambda \xi_{-\lambda}(\mathbf{p}), \quad i\sigma^2 \xi_{-\lambda}^*(\mathbf{p}) = \lambda \xi_\lambda(\mathbf{p})$$

8.2.4 小节 旋量场的 T 变换

 下面讨论自由 Dirac 旋量场 $\psi(x)$ 的 T 变换

 时间反演变换同时反转动量和角动量的方向，因而会保持螺旋度 λ 不变

 另一方面， T 变换是反幺正的，将一个复数变换成它的复共轭

因此 T 变换联系着螺旋态 $\xi_\lambda(\mathbf{p})$ 和 $\xi_\lambda^*(-\mathbf{p})$ ，它们存在 8.2.1 小节推出的关系

$$i\sigma^2 \xi_\lambda^*(\mathbf{p}) = -\lambda \xi_{-\lambda}(\mathbf{p}), \quad i\sigma^2 \xi_{-\lambda}^*(\mathbf{p}) = \lambda \xi_\lambda(\mathbf{p})$$

对第一式取复共轭，利用 $\xi_\lambda(\mathbf{p}) = \kappa_{\mathbf{p}, \lambda} \xi_{-\lambda}(-\mathbf{p})$ ，得

$$i\sigma^2 \xi_\lambda(\mathbf{p}) = -\lambda \xi_{-\lambda}^*(\mathbf{p}) = -\lambda \kappa_{\mathbf{p}, -\lambda}^* \xi_\lambda^*(-\mathbf{p})$$

故

$$i\sigma^2 \xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) = \lambda \kappa_{\mathbf{p}, \lambda}^* \xi_{-\lambda}^*(-\mathbf{p})$$

🍺 $i\sigma^2$ 出现在矩阵 $C\gamma^5 = \begin{pmatrix} -i\sigma^2 & \\ & i\sigma^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & \\ & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i\sigma^2 & \\ & i\sigma^2 \end{pmatrix}$ 中

产生湮灭算符的 T 变换

 $c\gamma^5$ 对平面波旋量系数的作用是

$$\mathcal{C}\gamma^5 u(\mathbf{p}, \lambda) = \begin{pmatrix} i\sigma^2 & \\ & i\sigma^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_{-\lambda}(\mathbf{p}) \xi_\lambda(\mathbf{p}) \\ \omega_\lambda(\mathbf{p}) \xi_\lambda(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = -\lambda \kappa_{\mathbf{p}, -\lambda}^* \begin{pmatrix} \omega_{-\lambda}(-\mathbf{p}) \xi_\lambda^*(-\mathbf{p}) \\ \omega_\lambda(-\mathbf{p}) \xi_\lambda^*(-\mathbf{p}) \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{C}\gamma^5 v(\mathbf{p}, \lambda) = \begin{pmatrix} i\sigma^2 & \\ & i\sigma^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda\omega_\lambda(\mathbf{p})\xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) \\ -\lambda\omega_{-\lambda}(\mathbf{p})\xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = \lambda\kappa_{\mathbf{p}, \lambda}^* \begin{pmatrix} \lambda\omega_\lambda(-\mathbf{p})\xi_{-\lambda}^*(-\mathbf{p}) \\ -\lambda\omega_{-\lambda}(-\mathbf{p})\xi_{-\lambda}^*(-\mathbf{p}) \end{pmatrix}$$

由 $\kappa_{p,-\lambda} = -\kappa_{p,\lambda}^*$ 得 $\kappa_{p,-\lambda}^* = -\kappa_{p,\lambda}$ ，从而推出

$$\mathcal{C}\gamma^5 u(\mathbf{p}, \lambda) = \lambda \kappa_{\mathbf{p}, \lambda} u^*(-\mathbf{p}, \lambda), \quad \mathcal{C}\gamma^5 v(\mathbf{p}, \lambda) = \lambda \kappa_{\mathbf{p}, \lambda}^* v^*(-\mathbf{p}, \lambda)$$

产生湮灭算符的 T 变换

 $C\gamma^5$ 对平面波旋量系数的作用是

$$\mathcal{C}\gamma^5 u(\mathbf{p}, \lambda) = \begin{pmatrix} i\sigma^2 & \\ & i\sigma^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_{-\lambda}(\mathbf{p}) \xi_\lambda(\mathbf{p}) \\ \omega_\lambda(\mathbf{p}) \xi_\lambda(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = -\lambda \kappa_{\mathbf{p}, -\lambda}^* \begin{pmatrix} \omega_{-\lambda}(-\mathbf{p}) \xi_\lambda^*(-\mathbf{p}) \\ \omega_\lambda(-\mathbf{p}) \xi_\lambda^*(-\mathbf{p}) \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{C}\gamma^5 v(\mathbf{p}, \lambda) = \begin{pmatrix} i\sigma^2 & \\ & i\sigma^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda\omega_\lambda(\mathbf{p})\xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) \\ -\lambda\omega_{-\lambda}(\mathbf{p})\xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = \lambda\kappa_{\mathbf{p}, \lambda}^* \begin{pmatrix} \lambda\omega_\lambda(-\mathbf{p})\xi_{-\lambda}^*(-\mathbf{p}) \\ -\lambda\omega_{-\lambda}(-\mathbf{p})\xi_{-\lambda}^*(-\mathbf{p}) \end{pmatrix}$$

由 $\kappa_{p,-\lambda} = -\kappa_{p,\lambda}^*$ 得 $\kappa_{p,-\lambda}^* = -\kappa_{p,\lambda}$ ，从而推出

$$\mathcal{C}\gamma^5 u(\mathbf{p}, \lambda) = \lambda \kappa_{\mathbf{p}, \lambda} u^*(-\mathbf{p}, \lambda), \quad \mathcal{C}\gamma^5 v(\mathbf{p}, \lambda) = \lambda \kappa_{\mathbf{p}, \lambda}^* v^*(-\mathbf{p}, \lambda)$$

为得到**自治时间反演变换**结果，设正反费米子态 $|p^+, \lambda\rangle$ 和 $|p^-, \lambda\rangle$ 的 **T** 变换为

$$T|\mathbf{p}^+, \lambda\rangle = \zeta_T \lambda \kappa_{-\mathbf{p}, \lambda}^* |-\mathbf{p}^+, -\lambda\rangle, \quad T|\mathbf{p}^-, \lambda\rangle = \tilde{\zeta}_T \alpha \kappa_{-\mathbf{p}, \lambda}^* |-\mathbf{p}^-, -\lambda\rangle$$

其中 ζ_T 和 $\tilde{\zeta}_T$ 是两个相位因子，由此得到 $a_{p,\lambda}^\dagger$ 、 $a_{p,\lambda}$ 、 $b_{p,\lambda}^\dagger$ 和 $b_{p,\lambda}$ 的 T 变换

$$T^{-1}a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger T = \zeta_T \lambda \kappa_{-\mathbf{p},\lambda}^* a_{-\mathbf{p},\lambda}^\dagger, \quad T^{-1}a_{\mathbf{p},\lambda} T = \zeta_T^* \lambda \kappa_{-\mathbf{p},\lambda} a_{-\mathbf{p},\lambda}$$

$$T^{-1}b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger T = \tilde{\zeta}_T \lambda \kappa_{-\mathbf{p},\lambda}^* b_{-\mathbf{p},\lambda}^\dagger, \quad T^{-1}b_{\mathbf{p},\lambda} T = \tilde{\zeta}_T^* \lambda \kappa_{-\mathbf{p},\lambda} b_{-\mathbf{p},\lambda}$$

平面波展开式的 T 变换



注意到 $T^{-1}iT = -i$ ，Dirac 旋量场平面波展开式的 T 变换是

$$\begin{aligned}
& T^{-1} \psi(x) T \\
&= \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} T^{-1} \left[u(\mathbf{p}, \lambda) \textcolor{brown}{a}_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot x} + v(\mathbf{p}, \lambda) \textcolor{teal}{b}_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{ip \cdot x} \right] T \\
&= \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} \left[\zeta_T^* \lambda \kappa_{-\mathbf{p}, \lambda} u^*(\mathbf{p}, \lambda) \textcolor{brown}{a}_{-\mathbf{p}, \lambda} e^{ip \cdot x} + \tilde{\zeta}_T \lambda \kappa_{-\mathbf{p}, \lambda}^* v^*(\mathbf{p}, \lambda) \textcolor{teal}{b}_{-\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{-ip \cdot x} \right] \\
&= \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} \left[\zeta_T^* \lambda \kappa_{\mathbf{p}, \lambda} u^*(-\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot (\mathcal{T}x)} + \tilde{\zeta}_T \lambda \kappa_{\mathbf{p}, \lambda}^* v^*(-\mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{ip \cdot (\mathcal{T}x)} \right] \\
&= \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} \left[\zeta_T^* \mathcal{C} \gamma^5 u(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot (\mathcal{T}x)} + \tilde{\zeta}_T \mathcal{C} \gamma^5 v(\mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{ip \cdot (\mathcal{T}x)} \right]
\end{aligned}$$



第三步作了变量替换 $p \rightarrow -p$



第四步用到 $\mathcal{C}\gamma^5 u(\mathbf{p}, \lambda) = \lambda \kappa_{\mathbf{p}, \lambda} u^*(-\mathbf{p}, \lambda)$ 和 $\mathcal{C}\gamma^5 v(\mathbf{p}, \lambda) = \lambda \kappa_{\mathbf{p}, \lambda}^* v^*(-\mathbf{p}, \lambda)$

ψ(x) 的 T 变换



为了让 $\psi(x)$ 的运动方程具有时间反演对称性，

$$T^{-1}\psi(x)T = \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} \left[\zeta_T^* \mathcal{C} \gamma^5 u(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot (\mathcal{T}x)} + \tilde{\zeta}_T \mathcal{C} \gamma^5 v(\mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{ip \cdot (\mathcal{T}x)} \right]$$



与 $\psi(\mathcal{T}x)$ 最多只能相差一个常数矩阵，因而必须要求

$$\zeta_T^* = \tilde{\zeta}_T$$



使得 $T^{-1}b_{p,\lambda}^\dagger T = \tilde{\zeta}_T \lambda \kappa_{-p,\lambda}^* b_{-p,\lambda}^\dagger$ 和 $T^{-1}b_{p,\lambda} T = \tilde{\zeta}_T^* \lambda \kappa_{-p,\lambda} b_{-p,\lambda}$ 化为

$$T^{-1}b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger T = \zeta_T^* \lambda \kappa_{-\mathbf{p},\lambda}^* b_{-\mathbf{p},\lambda}^\dagger, \quad T^{-1}b_{\mathbf{p},\lambda} T = \zeta_T \lambda \kappa_{-\mathbf{p},\lambda} b_{-\mathbf{p},\lambda}$$



从而 $\psi(x)$ 的 T 变换为

$$T^{-1}\psi(x)T = D(\mathcal{T})\psi(\mathcal{T}x)$$



其中 $D(\mathcal{T}) \equiv \zeta_{\mathcal{T}}^* \mathcal{C} \gamma^5$ 是旋量空间中的**时间反演矩阵**

$\bar{\psi}(x)$ 的 T 变换

由 $D^\dagger(\mathcal{T})D(\mathcal{T}) = \zeta_T \gamma^5 \mathcal{C}^\dagger \zeta_T^* \mathcal{C} \gamma^5 = |\zeta_T|^2 \gamma^5 \mathcal{C}^{-1} \mathcal{C} \gamma^5 = 1$ 可知

时间反演矩阵 $D(\mathcal{T})$ 是么正的，满足 $D^{-1}(\mathcal{T}) = D^\dagger(\mathcal{T}) = \zeta_T \gamma^5 \mathcal{C}^{-1}$

对 $T^{-1}\psi(x)T = D(\mathcal{T})\psi(\mathcal{T}x)$ 取厄米共轭，得

$$T^{-1}\psi^\dagger(x)T = \psi^\dagger(\mathcal{T}x)\textcolor{blue}{D}^\dagger(\mathcal{T}) = \psi^\dagger(\mathcal{T}x)\textcolor{blue}{\zeta}_{\mathcal{T}}\gamma^5\mathcal{C}^{-1}$$

$\bar{\psi}(x)$ 的 T 变换

由 $D^\dagger(\mathcal{T})D(\mathcal{T}) = \zeta_T \gamma^5 \mathcal{C}^\dagger \zeta_T^* \mathcal{C} \gamma^5 = |\zeta_T|^2 \gamma^5 \mathcal{C}^{-1} \mathcal{C} \gamma^5 = 1$ 可知

时间反演矩阵 $D(\mathcal{T})$ 是么正的，满足 $D^{-1}(\mathcal{T}) = D^\dagger(\mathcal{T}) = \zeta_T \gamma^5 C^{-1}$

对 $T^{-1}\psi(x)T = D(\mathcal{T})\psi(\mathcal{T}x)$ 取厄米共轭，得

$$T^{-1}\psi^\dagger(x)T = \psi^\dagger(\mathcal{T}x)\textcolor{blue}{D}^\dagger(\mathcal{T}) = \psi^\dagger(\mathcal{T}x)\textcolor{teal}{C}\textcolor{violet}{T}\gamma^5\mathcal{C}^{-1}$$

由 γ^0 的厄米性有 $(\gamma^0)^* = (\gamma^0)^T$ ，由 $\mathcal{C}^{-1}(\gamma^\mu)^T \mathcal{C} = -\gamma^\mu$ 得 $\mathcal{C}^{-1}(\gamma^0)^T = -\gamma^0 \mathcal{C}^{-1}$

 再利用 $\gamma^5 \gamma^0 = -\gamma^0 \gamma^5$ 推出

$$T^{-1}\bar{\psi}(x)T = T^{-1}\psi^\dagger(x)T(\gamma^0)^* = \psi^\dagger(\mathcal{T}x)\zeta_T\gamma^5\mathcal{C}^{-1}(\gamma^0)^{\text{T}} = \psi^\dagger(\mathcal{T}x)\gamma^0\zeta_T\gamma^5\mathcal{C}^{-1}$$

即 $\bar{\psi}(x)$ 的 T 变换为 $T^{-1}\bar{\psi}(x)T = \bar{\psi}(\mathcal{T}x)D^{-1}(\mathcal{T})$

$\bar{\psi}(x)$ 的 T 变换

由 $D^\dagger(\mathcal{T})D(\mathcal{T}) = \zeta_T \gamma^5 \mathcal{C}^\dagger \zeta_T^* \mathcal{C} \gamma^5 = |\zeta_T|^2 \gamma^5 \mathcal{C}^{-1} \mathcal{C} \gamma^5 = 1$ 可知

时间反演矩阵 $D(\mathcal{T})$ 是么正的，满足 $D^{-1}(\mathcal{T}) = D^\dagger(\mathcal{T}) = \zeta_T \gamma^5 C^{-1}$

对 $T^{-1}\psi(x)T = D(\mathcal{T})\psi(\mathcal{T}x)$ 取厄米共轭，得

$$T^{-1}\psi^\dagger(x)T = \psi^\dagger(\mathcal{T}x)\textcolor{blue}{D}^\dagger(\mathcal{T}) = \psi^\dagger(\mathcal{T}x)\zeta_{\mathcal{T}}\gamma^5\mathcal{C}^{-1}$$

由 γ^0 的厄米性有 $(\gamma^0)^* = (\gamma^0)^T$ ，由 $\mathcal{C}^{-1}(\gamma^\mu)^T \mathcal{C} = -\gamma^\mu$ 得 $\mathcal{C}^{-1}(\gamma^0)^T = -\gamma^0 \mathcal{C}^{-1}$

 再利用 $\gamma^5 \gamma^0 = -\gamma^0 \gamma^5$ 推出

$$T^{-1}\bar{\psi}(x)T = T^{-1}\psi^\dagger(x)T(\gamma^0)^* = \psi^\dagger(\mathcal{T}x)\zeta_T\gamma^5\mathcal{C}^{-1}(\gamma^0)^{\text{T}} = \psi^\dagger(\mathcal{T}x)\gamma^0\zeta_T\gamma^5\mathcal{C}^{-1}$$

即 $\bar{\psi}(x)$ 的 T 变换为 $T^{-1}\bar{\psi}(x)T = \bar{\psi}(\mathcal{T}x)D^{-1}(\mathcal{T})$

据此，一般旋量双线性型 $\bar{\psi}(x)\Gamma\psi(x)$ 的 T 变换是

$$T^{-1}\bar{\psi}(x)\Gamma\psi(x)T = T^{-1}\bar{\psi}(x)TT^{-1}\Gamma TT^{-1}\psi(x)T = \bar{\psi}(\mathcal{T}x)\textcolor{blue}{D}^{-1}(\mathcal{T})\Gamma^*\textcolor{blue}{D}(\mathcal{T})\psi(\mathcal{T}x)$$

 即问题归结为计算 $D^{-1}(\mathcal{T})\Gamma^* D(\mathcal{T})$

旋量空间中矩阵的 T 变换

根据 γ^5 的厄米性、 γ^i 的反厄米性、 $\mathcal{C}^{-1}(\gamma^\mu)^T \mathcal{C} = -\gamma^\mu$ 和 $\mathcal{C}^{-1}(\gamma^5)^T \mathcal{C} = \gamma^5$ ，有

$$D^{-1}(\mathcal{T})(\gamma^5)^* D(\mathcal{T}) = \gamma^5 \mathcal{C}^{-1} (\gamma^5)^{\text{T}} \mathcal{C} \gamma^5 = (\gamma^5)^3 = \gamma^5$$

$$D^{-1}(\mathcal{T})(\gamma^0)^* D(\mathcal{T}) = \gamma^5 \mathcal{C}^{-1} (\gamma^0)^T \mathcal{C} \gamma^5 = -\gamma^5 \gamma^0 \gamma^5 = \gamma^0$$

$$D^{-1}(\mathcal{T})(\gamma^i)^* D(\mathcal{T}) = -\gamma^5 \mathcal{C}^{-1} (\gamma^i)^{\text{T}} \mathcal{C} \gamma^5 = \gamma^5 \gamma^i \gamma^5 = -\gamma^i$$

旋量空间中矩阵的 T 变换



根据 γ^5 的厄米性、 γ^i 的反厄米性、 $\mathcal{C}^{-1}(\gamma^\mu)^T \mathcal{C} = -\gamma^\mu$ 和 $\mathcal{C}^{-1}(\gamma^5)^T \mathcal{C} = \gamma^5$ ，有

$$D^{-1}(\mathcal{T})(\gamma^5)^* D(\mathcal{T}) = \gamma^5 \mathcal{C}^{-1} (\gamma^5)^{\text{T}} \mathcal{C} \gamma^5 = (\gamma^5)^3 = \gamma^5$$

$$D^{-1}(\mathcal{T})(\gamma^0)^* D(\mathcal{T}) = \gamma^5 \mathcal{C}^{-1} (\gamma^0)^{\text{T}} \mathcal{C} \gamma^5 = -\gamma^5 \gamma^0 \gamma^5 = \gamma^0$$

$$D^{-1}(\mathcal{T})(\gamma^i)^* D(\mathcal{T}) = -\gamma^5 \mathcal{C}^{-1} (\gamma^i)^{\textcolor{teal}{T}} \mathcal{C} \gamma^5 = \gamma^5 \gamma^i \gamma^5 = -\gamma^i$$



进而得到

$$D^{-1}(\mathcal{T})\mathbf{1}^*D(\mathcal{T}) = +\mathbf{1}$$

$$D^{-1}(\mathcal{T})(i\gamma^5)^* D(\mathcal{T}) = -i\gamma^5$$

$$D^{-1}(\mathcal{T})(\gamma^\mu)^* D(\mathcal{T}) = -\mathcal{T}^\mu{}_\nu \gamma^\nu$$

$$D^{-1}(\mathcal{T})(\gamma^\mu \gamma^5)^* D(\mathcal{T}) = D^{-1}(\mathcal{T})(\gamma^\mu)^* D(\mathcal{T}) D^{-1}(\mathcal{T})(\gamma^5)^* D(\mathcal{T}) = -\mathcal{T}^\mu_{\nu} \gamma^\nu \gamma^5$$

$$D^{-1}(\mathcal{T})(\sigma^{\mu\nu})^* D(\mathcal{T}) = -\frac{i}{2} D^{-1}(\mathcal{T})[(\gamma^\mu)^*(\gamma^\nu)^* - (\gamma^\nu)^*(\gamma^\mu)^*] D(\mathcal{T})$$

$$= -\frac{i}{2} \mathcal{T}^\mu{}_\rho \mathcal{T}^\nu{}_\sigma (\gamma^\rho \gamma^\sigma - \gamma^\sigma \gamma^\mu) = -\mathcal{T}^\mu{}_\rho \mathcal{T}^\nu{}_\sigma \sigma^{\rho\sigma}$$

旋量双线性型的 T 变换



于是，各种旋量双线性型的 T 变换为

$$T^{-1}\bar{\psi}(x)\psi(x)T = +\bar{\psi}(\mathcal{T}x)\psi(\mathcal{T}x)$$

$$T^{-1}\bar{\psi}(x)i\gamma^5\psi(x)T = -\bar{\psi}(\mathcal{T}x)i\gamma^5\psi(\mathcal{T}x)$$

$$T^{-1}\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x)T = -\mathcal{T}^\mu{}_\nu\bar{\psi}(\mathcal{T}x)\gamma^\nu\psi(\mathcal{T}x)$$

$$T^{-1}\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\gamma^5\psi(x)T = -\mathcal{T}^\mu{}_\nu\bar{\psi}(\mathcal{T}x)\gamma^\nu\gamma^5\psi(\mathcal{T}x)$$

$$T^{-1}\bar{\psi}(x)\sigma^{\mu\nu}\psi(x)T = -\mathcal{T}^\mu{}_\rho \mathcal{T}^\nu{}_\sigma \bar{\psi}(\mathcal{T}x)\sigma^{\rho\sigma}\psi(\mathcal{T}x)$$

$$T^{-1}\bar{\psi}_{\text{R}}(x)\psi_{\text{L}}(x)T = +\bar{\psi}_{\text{R}}(\mathcal{T}x)\psi_{\text{L}}(\mathcal{T}x)$$

$$T^{-1}\bar{\psi}_{\text{L}}(x)\psi_{\text{R}}(x)T = +\bar{\psi}_{\text{L}}(\mathcal{T}x)\psi_{\text{R}}(\mathcal{T}x)$$

$$T^{-1} \bar{\psi}_L(x) \gamma^\mu \psi_L(x) T = -\mathcal{T}^\mu{}_\nu \bar{\psi}_L(\mathcal{T}x) \gamma^\nu \psi_L(\mathcal{T}x)$$

$$T^{-1} \bar{\psi}_{\text{R}}(x) \gamma^\mu \psi_{\text{R}}(x) T = -\mathcal{T}^\mu{}_\nu \bar{\psi}_{\text{R}}(\mathcal{T}x) \gamma^\nu \psi_{\text{R}}(\mathcal{T}x)$$

拉氏量和运动方程的时间反演对称性

 动能项算符 $i\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi$ 的 T 变换为

$$\begin{aligned} T^{-1} i\bar{\psi}(x) \gamma^\mu \partial_\mu \psi(x) T &= -i\bar{\psi}(\mathcal{T}x) \mathcal{D}^{-1}(\mathcal{T})(\gamma^\mu)^* D(\mathcal{T})(\mathcal{T}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu \psi(\mathcal{T}x) \\ &= i\bar{\psi}(\mathcal{T}x) \mathcal{T}^\mu{}_\rho \gamma^\rho (\mathcal{T}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu \psi(\mathcal{T}x) = +i\bar{\psi}(\mathcal{T}x) \gamma^\mu \partial_\mu \psi(\mathcal{T}x) \end{aligned}$$

因此，自由 Dirac 旋量场的拉氏量在时间反演下不变

0000000000

000000000000

80000

00000000000000

拉氏量和运动方程的时间反演对称性



动能项算符 $i\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi$ 的 T 变换为

$$\begin{aligned} T^{-1} i\bar{\psi}(x) \gamma^\mu \partial_\mu \psi(x) T &= -i\bar{\psi}(\mathcal{T}x) \mathcal{D}^{-1}(\mathcal{T})(\gamma^\mu)^* D(\mathcal{T})(\mathcal{T}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu \psi(\mathcal{T}x) \\ &= i\bar{\psi}(\mathcal{T}x) \mathcal{T}^\mu{}_\rho \gamma^\rho (\mathcal{T}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu \psi(\mathcal{T}x) = +i\bar{\psi}(\mathcal{T}x) \gamma^\mu \partial_\mu \psi(\mathcal{T}x) \end{aligned}$$



因此，自由 Dirac 旋量场的拉氏量在时间反演变换下不变



由于 T 变换是反线性的，Dirac 方程 $(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi(x) = 0$ 的时间反演对称性意味着运动方程 $[-i(\gamma^\mu)^* \partial'_\mu - m]\psi'(x') = 0$ 成立，这一点在下面的推导中得到验证：

$$\begin{aligned}
[-i(\gamma^\mu)^*\partial'_\mu - m]\psi'(x') &= [-i(\gamma^\mu)^*(\mathcal{T}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu - m]T^{-1}\psi(x')T \\
&= D(\mathcal{T})[-iD^{-1}(\mathcal{T})(\gamma^\mu)^*D(\mathcal{T})(\mathcal{T}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu - m]\psi(\mathcal{T}x') \\
&= D(\mathcal{T})[i\mathcal{T}^\mu{}_\rho \gamma^\rho (\mathcal{T}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu - m]\psi(x) \\
&= D(\mathcal{T})(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi(x) = 0
\end{aligned}$$

000000000000000000000000

200000000

000000000000

80000

00000000000000

拉氏量和运动方程的时间反演对称性



动能项算符 $i\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi$ 的 T 变换为

$$\begin{aligned} T^{-1} i\bar{\psi}(x) \gamma^\mu \partial_\mu \psi(x) T &= -i\bar{\psi}(\mathcal{T}x) \mathcal{D}^{-1}(\mathcal{T})(\gamma^\mu)^* D(\mathcal{T})(\mathcal{T}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu \psi(\mathcal{T}x) \\ &= i\bar{\psi}(\mathcal{T}x) \mathcal{T}^\mu{}_\rho \gamma^\rho (\mathcal{T}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu \psi(\mathcal{T}x) = +i\bar{\psi}(\mathcal{T}x) \gamma^\mu \partial_\mu \psi(\mathcal{T}x) \end{aligned}$$



因此，自由 Dirac 旋量场的拉氏量在时间反演变换下不变



由于 T 变换是反线性的，Dirac 方程 $(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi(x) = 0$ 的时间反演对称性意味着运动方程 $[-i(\gamma^\mu)^* \partial'_\mu - m]\psi'(x') = 0$ 成立，这一点在下面的推导中得到验证：

$$\begin{aligned}
[-i(\gamma^\mu)^*\partial_\mu' - m]\psi'(x') &= [-i(\gamma^\mu)^*(\mathcal{T}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu - m]T^{-1}\psi(x')T \\
&= D(\mathcal{T})[-iD^{-1}(\mathcal{T})(\gamma^\mu)^*D(\mathcal{T})(\mathcal{T}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu - m]\psi(\mathcal{T}x') \\
&= D(\mathcal{T})[i\mathcal{T}^\mu{}_\rho \gamma^\rho (\mathcal{T}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu - m]\psi(x) \\
&= D(\mathcal{T})(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi(x) = 0
\end{aligned}$$



对于自由的 Majorana 旋量场 $\psi(x)$, $b_{p,\lambda} = a_{p,\lambda}$, 则 $\zeta_T = \tilde{\zeta}_T = \zeta_T^*$, 故

$$\zeta_T = \pm 1$$

8.3 节 矢量场的分立变换

8.3.1 节 有质量矢量场的 C 、 P 、 T 变换

接下来讨论自由有质量复矢量场 $A^\mu(x)$ 的 C 、 P 、 T 变换

拉氏量为 $\mathcal{L} = -\frac{1}{2} F_{\mu\nu}^\dagger F^{\mu\nu} + m^2 A_\mu^\dagger A^\mu$

用极化矢量 $\varepsilon^\mu(p, \lambda)$ ($\lambda = \pm, 0$) 表达的平面波展开式为

$$A^\mu(x) = \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda=\pm,0} \left[\varepsilon^\mu(\mathbf{p},\lambda) a_{\mathbf{p},\lambda} e^{-ip \cdot x} + \varepsilon^{\mu*}(\mathbf{p},\lambda) b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger e^{ip \cdot x} \right]$$

8.3 节 矢量场的分立变换

8.3.1 节 有质量矢量场的 C 、 P 、 T 变换



接下来讨论自由有质量复矢量场 $A^\mu(x)$ 的 C 、 P 、 T 变换



$$\text{拉氏量为 } \mathcal{L} = -\frac{1}{2} F_{\mu\nu}^\dagger F^{\mu\nu} + m^2 A_\mu^\dagger A^\mu$$



用**极化矢量** $\varepsilon^\mu(p, \lambda)$ ($\lambda = \pm, 0$) 表达的平面波展开式为

$$A^\mu(x) = \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda=\pm,0} \left[\varepsilon^\mu(\mathbf{p},\lambda) a_{\mathbf{p},\lambda} e^{-ip \cdot x} + \varepsilon^{\mu*}(\mathbf{p},\lambda) b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger e^{ip \cdot x} \right]$$



宇称变换联系着 $\varepsilon^\mu(p, \lambda)$ 和 $\varepsilon^\mu(-p, -\lambda)$ ，根据极化矢量的具体形式，有

$$\varepsilon^\mu(-\mathbf{p}, +) = \frac{1}{\sqrt{2}|\mathbf{p}||\mathbf{p}_T|} \begin{pmatrix} 0 \\ -p^1 p^3 - i p^2 |\mathbf{p}| \\ -p^2 p^3 + i p^1 |\mathbf{p}| \\ |\mathbf{p}_T|^2 \end{pmatrix} = -\frac{1}{\sqrt{2}|\mathbf{p}||\mathbf{p}_T|} \begin{pmatrix} 0 \\ p^1 p^3 + i p^2 |\mathbf{p}| \\ p^2 p^3 - i p^1 |\mathbf{p}| \\ -|\mathbf{p}_T|^2 \end{pmatrix}$$

$$\varepsilon^\mu(-\mathbf{p},-) = -\varepsilon^\mu(\mathbf{p},+) = \mathcal{P}^\mu{}_\nu \varepsilon^\nu(\mathbf{p},+)$$



此外还有

$$\varepsilon^\mu(-\mathbf{p}, \mathbf{0}) = \frac{1}{m|\mathbf{p}|} \begin{pmatrix} |\mathbf{p}|^2 \\ -p^0 p^1 \\ -p^0 p^2 \\ -p^0 p^3 \end{pmatrix} = \frac{1}{m|\mathbf{p}|} \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} |\mathbf{p}|^2 \\ p^0 p^1 \\ p^0 p^2 \\ p^0 p^3 \end{pmatrix} = \mathcal{P}^\mu_\nu \varepsilon^\nu(\mathbf{p}, \mathbf{0})$$



因此宇称变换与极化矢量的关系为

$$\varepsilon^\mu(-\mathbf{p}, -\lambda) = \mathcal{P}^\mu{}_\nu \varepsilon^\nu(\mathbf{p}, \lambda)$$

第十一章

○○○○○○○○○○

0000000000

○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○

FILE NUMBER
000000000000

宇称变换与极化矢量



此外还有

$$\varepsilon^\mu(-\mathbf{p}, \mathbf{0}) = \frac{1}{m|\mathbf{p}|} \begin{pmatrix} |\mathbf{p}|^2 \\ -p^0 p^1 \\ -p^0 p^2 \\ -p^0 p^3 \end{pmatrix} = \frac{1}{m|\mathbf{p}|} \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} |\mathbf{p}|^2 \\ p^0 p^1 \\ p^0 p^2 \\ p^0 p^3 \end{pmatrix} = \mathcal{P}^\mu{}_\nu \varepsilon^\nu(\mathbf{p}, \mathbf{0})$$



因此宇称变换与极化矢量的关系为

$$\varepsilon^\mu(-\mathbf{p}, -\lambda) = \mathcal{P}^\mu{}_\nu \varepsilon^\nu(\mathbf{p}, \lambda)$$



时间反演变换联系着 $\varepsilon^\mu(p, \lambda)$ 和 $\varepsilon^{\mu*}(-p, \lambda)$ ，有

$$\varepsilon^{\mu*}(-\mathbf{p}, +) = \frac{1}{\sqrt{2}|\mathbf{p}| |\mathbf{p}_T|} \begin{pmatrix} 0 \\ -p^1 p^3 + i p^2 |\mathbf{p}| \\ -p^2 p^3 - i p^1 |\mathbf{p}| \\ |\mathbf{p}_T|^2 \end{pmatrix} = \mathcal{T}^\mu_\nu \varepsilon^\nu(\mathbf{p}, +)$$

时间反演变换与极化矢量



还有

$$\varepsilon^{\mu*}(-\mathbf{p}, -) = \frac{1}{\sqrt{2}|\mathbf{p}||\mathbf{p}_T|} \begin{pmatrix} 0 \\ p^1 p^3 + i p^2 |\mathbf{p}| \\ p^2 p^3 - i p^1 |\mathbf{p}| \\ -|\mathbf{p}_T|^2 \end{pmatrix} = \mathcal{T}^\mu_\nu \varepsilon^\nu(\mathbf{p}, -)$$

$$\varepsilon^{\mu*}(-\mathbf{p}, 0) = \frac{1}{m|\mathbf{p}|} \begin{pmatrix} |\mathbf{p}|^2 \\ -p^0 p^1 \\ -p^0 p^2 \\ -p^0 p^3 \end{pmatrix} = \frac{1}{m|\mathbf{p}|} \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} |\mathbf{p}|^2 \\ p^0 p^1 \\ p^0 p^2 \\ p^0 p^3 \end{pmatrix} = -\mathcal{T}^\mu_\nu \varepsilon^\nu(\mathbf{p}, 0)$$



以此推出时间反演变换与极化矢量的关系

$$(-)^{1+\lambda} \varepsilon^{\mu*}(-\mathbf{p}, \lambda) = \mathcal{T}^\mu{}_\nu \varepsilon^\nu(\mathbf{p}, \lambda)$$

产生湮灭算符的分立变换

类似于标量场和旋量场的 C 、 P 、 T 变换规律, $C^{-1}A^\mu(x)C$ 、 $P^{-1}A^\mu(x)P$ 和 $T^{-1}A^\mu(x)T$ 应当分别正比于 $A^{\mu\dagger}(x)$ 、 $\mathcal{P}^\mu{}_\nu A^\nu(\mathcal{P}x)$ 和 $\mathcal{T}^\mu{}_\nu A^\nu(\mathcal{T}x)$

为此，将产生湮灭算符的 C 、 P 、 T 变换表达成

$$C^{-1}a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger C = \xi_C b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger,$$

$$C^{-1}a_{\mathbf{p},\lambda}C = \xi_C^* b_{\mathbf{p},\lambda}$$

$$C^{-1}b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger C = \xi_C^* a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger,$$

$$C^{-1}b_{\mathbf{p},\lambda}C = \xi_C a_{\mathbf{p},\lambda}$$

$$P^{-1}a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger P = \xi_P a_{-\mathbf{p},-\lambda}^\dagger,$$

$$P^{-1}a_{\mathbf{p},\lambda}P = \xi_P^*a_{-\mathbf{p},-\lambda}$$

$$P^{-1}b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger P = \xi_P^* b_{-\mathbf{p},-\lambda}^\dagger,$$

$$P^{-1}b_{\mathbf{p},\lambda}P = \xi_P b_{-\mathbf{p},-\lambda}$$

$$T^{-1}a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger T = \xi_T(-)^{1+\lambda} a_{-\mathbf{p},\lambda}^\dagger, \quad T^{-1}a_{\mathbf{p},\lambda} T = \xi_T^*(-)^{1+\lambda} a_{-\mathbf{p},\lambda}$$

$$T^{-1}b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger T = \xi_T^*(-)^{1+\lambda} b_{-\mathbf{p},\lambda}^\dagger, \quad T^{-1}b_{\mathbf{p},\lambda} T = \xi_T(-)^{1+\lambda} b_{-\mathbf{p},\lambda}$$

其中 ξ_C 、 ξ_P 和 ξ_T 是相位因子



从而推出平面波展开式的分立变换

$$\begin{aligned}
& C^{-1} A^\mu(x) C \\
&= \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_\lambda [\varepsilon^\mu(\mathbf{p}, \lambda) C^{-1} a_{\mathbf{p}, \lambda} C e^{-ip \cdot x} + \varepsilon^{\mu*}(\mathbf{p}, \lambda) C^{-1} b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger C e^{ip \cdot x}] \\
&= \xi_C^* \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_\lambda [\varepsilon^\mu(\mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot x} + \varepsilon^{\mu*}(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{ip \cdot x}] \\
& P^{-1} A^\mu(x) P \\
&= \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_\lambda [\varepsilon^\mu(\mathbf{p}, \lambda) P^{-1} a_{\mathbf{p}, \lambda} P e^{-ip \cdot x} + \varepsilon^{\mu*}(\mathbf{p}, \lambda) P^{-1} b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger P e^{ip \cdot x}] \\
&= \xi_P^* \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_\lambda [\varepsilon^\mu(\mathbf{p}, \lambda) a_{-\mathbf{p}, -\lambda} e^{-ip \cdot x} + \varepsilon^{\mu*}(\mathbf{p}, \lambda) b_{-\mathbf{p}, -\lambda}^\dagger e^{ip \cdot x}] \\
&= \xi_P^* \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_\lambda [\varepsilon^\mu(-\mathbf{p}, -\lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot (\mathcal{P}x)} + \varepsilon^{\mu*}(-\mathbf{p}, -\lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{ip \cdot (\mathcal{P}x)}] \\
&= \xi_P^* \mathcal{P}^\mu{}_\nu \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_\lambda [\varepsilon^\nu(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot (\mathcal{P}x)} + \varepsilon^{\nu*}(\mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{ip \cdot (\mathcal{P}x)}]
\end{aligned}$$

$A^\mu(x)$ 的分立变换



以及

$$\begin{aligned}
& T^{-1} A^\mu(x) T \\
&= \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} T^{-1} [\varepsilon^\mu(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot x} + \varepsilon^{\mu*}(\mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{ip \cdot x}] T \\
&= \xi_T^* \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} [(-)^{1+\lambda} \varepsilon^{\mu*}(\mathbf{p}, \lambda) a_{-\mathbf{p}, \lambda} e^{ip \cdot x} + (-)^{1+\lambda} \varepsilon^\mu(\mathbf{p}, \lambda) b_{-\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{-ip \cdot x}] \\
&= \xi_T^* \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} [(-)^{1+\lambda} \varepsilon^{\mu*}(-\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot (\mathcal{T}x)} + (-)^{1+\lambda} \varepsilon^\mu(-\mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{ip \cdot (\mathcal{T}x)}] \\
&= \xi_T^* \mathcal{T}^\mu_\nu \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} [\varepsilon^\nu(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot (\mathcal{T}x)} + \varepsilon^{\nu*}(\mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{ip \cdot (\mathcal{T}x)}]
\end{aligned}$$



$$C^{-1}A^\mu(x)C = \xi_C^* A^{\mu\dagger}(x), \quad C^{-1}A^{\mu\dagger}(x)C = \xi_C A^\mu(x)$$

$$P^{-1}A^\mu(x)P = \xi_P^* \mathcal{P}^\mu{}_\nu A^\nu(\mathcal{P}x), \quad P^{-1}A^{\mu\dagger}(x)P = \xi_P \mathcal{P}^\mu{}_\nu A^{\nu\dagger}(\mathcal{P}x)$$

$$T^{-1}A^\mu(x)T = \xi_T^* \mathcal{T}^\mu{}_\nu A^\nu(\mathcal{T}x), \quad T^{-1}A^{\mu\dagger}(x)T = \xi_T \mathcal{T}^\mu{}_\nu A^{\nu\dagger}(\mathcal{T}x)$$

场强张量的分立变换

根据形式上的表达式 $P^{-1}\partial^\mu P = \partial'^\mu = \mathcal{P}^\mu{}_\nu \partial^\nu$ 和 $T^{-1}\partial^\mu T = \partial'^\mu = \mathcal{T}^\mu{}_\nu \partial^\nu$

场强张量 $F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu$ 的 C 、 P 、 T 变换为

$$C^{-1}F^{\mu\nu}(x)C = \xi_C^*[\partial^\mu A^{\nu\dagger}(x) - \partial^\nu A^{\mu\dagger}(x)] = \xi_C^* F^{\mu\nu\dagger}(x)$$

$$P^{-1}F^{\mu\nu}(x)P = \xi_P^* \mathcal{P}^\mu{}_\rho \mathcal{P}^\nu{}_\sigma [\partial^\rho A^\sigma(\mathcal{P}x) - \partial^\sigma A^\rho(\mathcal{P}x)] = \xi_P^* \mathcal{P}^\mu{}_\rho \mathcal{P}^\nu{}_\sigma F^{\rho\sigma}(\mathcal{P}x)$$

$$T^{-1}F^{\mu\nu}(x)T = \xi_T^* \mathcal{T}^\mu{}_\rho \mathcal{T}^\nu{}_\sigma [\partial^\rho A^\sigma(\mathcal{T}x) - \partial^\sigma A^\rho(\mathcal{T}x)] = \xi_T^* \mathcal{T}^\mu{}_\rho \mathcal{T}^\nu{}_\sigma F^{\rho\sigma}(\mathcal{T}x)$$

○○○○○○○○○○○○○○○○

三九

000000000000

5

○○○○○○○○○○○○○○○○

0000000●000000

场强张量的分立变换

根据形式上的表达式 $P^{-1}\partial^\mu P = \partial'^\mu = \mathcal{P}^\mu{}_\nu \partial^\nu$ 和 $T^{-1}\partial^\mu T = \partial'^\mu = \mathcal{T}^\mu{}_\nu \partial^\nu$

场强张量 $F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu$ 的 C 、 P 、 T 变换为

$$C^{-1}F^{\mu\nu}(x)C = \xi_C^*[\partial^\mu A^{\nu\dagger}(x) - \partial^\nu A^{\mu\dagger}(x)] = \xi_C^* F^{\mu\nu\dagger}(x)$$

$$P^{-1}F^{\mu\nu}(x)P = \xi_P^* \mathcal{P}^\mu{}_\rho \mathcal{P}^\nu{}_\sigma [\partial^\rho A^\sigma(\mathcal{P}x) - \partial^\sigma A^\rho(\mathcal{P}x)] = \xi_P^* \mathcal{P}^\mu{}_\rho \mathcal{P}^\nu{}_\sigma F^{\rho\sigma}(\mathcal{P}x)$$

$$T^{-1}F^{\mu\nu}(x)T = \xi_T^* \mathcal{T}^\mu{}_\rho \mathcal{T}^\nu{}_\sigma [\partial^\rho A^\sigma(\mathcal{T}x) - \partial^\sigma A^\rho(\mathcal{T}x)] = \xi_T^* \mathcal{T}^\mu{}_\rho \mathcal{T}^\nu{}_\sigma F^{\rho\sigma}(\mathcal{T}x)$$

动能项算符 $F_{\mu\nu}^\dagger F^{\mu\nu}$ 的 C 、 P 、 T 变换为

$$C^{-1}F_{\mu\nu}^\dagger(x)F^{\mu\nu}(x)C = |\xi_C|^2 F_{\mu\nu}(x)F^{\mu\nu\dagger}(x) = +F_{\mu\nu}^\dagger(x)F^{\mu\nu}(x)$$

$$\begin{aligned} P^{-1} F_{\mu\nu}^\dagger(x) F^{\mu\nu}(x) P &= |\xi_P|^2 F_{\alpha\beta}^\dagger(\mathcal{P}x) (\mathcal{P}^{-1})^\alpha{}_\mu (\mathcal{P}^{-1})^\beta{}_\nu \mathcal{P}^\mu{}_\rho \mathcal{P}^\nu{}_\sigma F^{\rho\sigma}(\mathcal{P}x) \\ &= +F_{\mu\nu}^\dagger(\mathcal{P}x) F^{\mu\nu}(\mathcal{P}x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T^{-1} F_{\mu\nu}^\dagger(x) F^{\mu\nu}(x) T &= |\xi_T|^2 F_{\alpha\beta}^\dagger(\mathcal{T}x) (\mathcal{T}^{-1})^\alpha{}_\mu (\mathcal{T}^{-1})^\beta{}_\nu \mathcal{T}^\mu{}_\rho \mathcal{T}^\nu{}_\sigma F^{\rho\sigma}(\mathcal{T}x) \\ &= +F_{\mu\nu}^\dagger(\mathcal{T}x) F^{\mu\nu}(\mathcal{T}x) \end{aligned}$$

对偶场强张量的分立变换

由 $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} = -\mathcal{P}^\mu{}_\alpha \mathcal{P}^\nu{}_\beta \mathcal{P}^\rho{}_\gamma \mathcal{P}^\sigma{}_\delta \varepsilon^{\alpha\beta\gamma\delta}$ 得

$$\begin{aligned} \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} (\mathcal{P}^{-1})^\alpha{}_\rho (\mathcal{P}^{-1})^\beta{}_\sigma &= -\mathcal{P}^\mu{}_\gamma \mathcal{P}^\nu{}_\delta \mathcal{P}^\rho{}_\tau \mathcal{P}^\sigma{}_\phi \varepsilon^{\gamma\delta\tau\phi} (\mathcal{P}^{-1})^\alpha{}_\rho (\mathcal{P}^{-1})^\beta{}_\sigma \\ &= -\mathcal{P}^\mu{}_\gamma \mathcal{P}^\nu{}_\delta \delta^\alpha{}_\tau \delta^\beta{}_\phi \varepsilon^{\gamma\delta\tau\phi} = -\mathcal{P}^\mu{}_\rho \mathcal{P}^\nu{}_\sigma \varepsilon^{\rho\sigma\alpha\beta} \end{aligned}$$

同理有 $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}(\mathcal{T}^{-1})^\alpha{}_\rho(\mathcal{T}^{-1})^\beta{}_\sigma = -\mathcal{T}^\mu{}_\rho\mathcal{T}^\nu{}_\sigma\varepsilon^{\rho\sigma\alpha\beta}$

对偶场强张量的分立变换

由 $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} = -P^\mu{}_\alpha P^\nu{}_\beta P^\rho{}_\gamma P^\sigma{}_\delta \varepsilon^{\alpha\beta\gamma\delta}$ 得

$$\begin{aligned} \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} (\mathcal{P}^{-1})^\alpha{}_\rho (\mathcal{P}^{-1})^\beta{}_\sigma &= -\mathcal{P}^\mu{}_\gamma \mathcal{P}^\nu{}_\delta \mathcal{P}^\rho{}_\tau \mathcal{P}^\sigma{}_\phi \varepsilon^{\gamma\delta\tau\phi} (\mathcal{P}^{-1})^\alpha{}_\rho (\mathcal{P}^{-1})^\beta{}_\sigma \\ &= -\mathcal{P}^\mu{}_\gamma \mathcal{P}^\nu{}_\delta \delta^\alpha{}_\tau \delta^\beta{}_\phi \varepsilon^{\gamma\delta\tau\phi} = -\mathcal{P}^\mu{}_\rho \mathcal{P}^\nu{}_\sigma \varepsilon^{\rho\sigma\alpha\beta} \end{aligned}$$

同理有 $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}(\mathcal{T}^{-1})^\alpha{}_\rho(\mathcal{T}^{-1})^\beta{}_\sigma = -\mathcal{T}^\mu{}_\rho\mathcal{T}^\nu{}_\sigma\varepsilon^{\rho\sigma\alpha\beta}$

从而, 对偶场强张量 $\tilde{F}^{\mu\nu} = \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma}/2$ 的 C 、 P 、 T 变换是

$$C^{-1} \tilde{F}^{\mu\nu}(x) C = \frac{1}{2} \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} C^{-1} F_{\rho\sigma}(x) C = \xi_C^* \tilde{F}^{\mu\nu\dagger}(x)$$

$$\begin{aligned} P^{-1} \tilde{F}^{\mu\nu}(x) P &= \frac{1}{2} \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} P^{-1} F_{\rho\sigma}(x) P = \frac{1}{2} \xi_P^* \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\alpha\beta}(\mathcal{P}x) (\mathcal{P}^{-1})^\alpha{}_\rho (\mathcal{P}^{-1})^\beta{}_\sigma \\ &= -\frac{1}{2} \xi_P^* \mathcal{P}^\mu{}_\rho \mathcal{P}^\nu{}_\sigma \varepsilon^{\rho\sigma\alpha\beta} F_{\alpha\beta}(\mathcal{P}x) = -\xi_P^* \mathcal{P}^\mu{}_\rho \mathcal{P}^\nu{}_\sigma \tilde{F}^{\rho\sigma}(\mathcal{P}x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T^{-1} \tilde{F}^{\mu\nu}(x)T &= \frac{1}{2} \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} T^{-1} F_{\rho\sigma}(x)T = \frac{1}{2} \xi_T^* \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\alpha\beta}(\mathcal{T}x) (\mathcal{T}^{-1})^\alpha{}_\rho (\mathcal{T}^{-1})^\beta{}_\sigma \\ &= -\frac{1}{2} \xi_T^* \mathcal{T}^\mu{}_\rho \mathcal{T}^\nu{}_\sigma \varepsilon^{\rho\sigma\alpha\beta} F_{\alpha\beta}(\mathcal{T}x) = -\xi_T^* \mathcal{T}^\mu{}_\rho \mathcal{T}^\nu{}_\sigma \tilde{F}^{\rho\sigma}(\mathcal{T}x) \end{aligned}$$

可见, $\tilde{F}^{\mu\nu}$ 的 P 、 T 变换性质与 $F^{\mu\nu}$ 不同, 相差一个负号



有质量实矢量场的分立变换



质量项算符 $A_\mu^\dagger A^\mu$ 的 C 、 P 、 T 变换是

$$C^{-1} A_\mu^\dagger(x) A^\mu(x) C = |\xi_C|^2 A_\mu(x) A^{\mu\dagger}(x) = + A_\mu^\dagger(x) A^\mu(x)$$

$$P^{-1}A_\mu^\dagger(x)A^\mu(x)P = |\xi_P|^2 A_\rho^\dagger(\mathcal{P}x)(\mathcal{P}^{-1})^\rho{}_\mu \mathcal{P}^\mu{}_\nu A^\nu(\mathcal{P}x) = + A_\mu^\dagger(\mathcal{P}x)A^\mu(\mathcal{P}x)$$

$$T^{-1}A_\mu^\dagger(x)A^\mu(x)T = |\xi_T|^2 A_o^\dagger(\mathcal{T}x)(\mathcal{T}^{-1})^\rho{}_\mu \mathcal{T}^\mu{}_\nu A^\nu(\mathcal{P}x) = +A_u^\dagger(\mathcal{T}x)A^\mu(\mathcal{T}x)$$



因此，由动能项和质量项组成的自由有质量复矢量场拉氏量在 C 、 P 、 T 变换下都是不变的

www.ijerpi.org

0000000000

000000000000

9

0000000000000000

200000000•0000

有质量实矢量场的分立变换



质量项算符 $A_\mu^\dagger A^\mu$ 的 C 、 P 、 T 变换是

$$C^{-1} A_\mu^\dagger(x) A^\mu(x) C = |\xi_C|^2 A_\mu(x) A^{\mu\dagger}(x) = + A_\mu^\dagger(x) A^\mu(x)$$

$$P^{-1} A^\dagger_\mu(x) A^\mu(x) P = |\xi_P|^2 A^\dagger_\rho(\mathcal{P}x) (\mathcal{P}^{-1})^\rho{}_\mu \mathcal{P}^\mu{}_\nu A^\nu(\mathcal{P}x) = + A^\dagger_\mu(\mathcal{P}x) A^\mu(\mathcal{P}x)$$

$$T^{-1} A_\mu^\dagger(x) A^\mu(x) T = |\xi_T|^2 A_o^\dagger(\mathcal{T}x) (\mathcal{T}^{-1})^\rho_\mu \mathcal{T}^\mu{}_\nu A^\nu(\mathcal{P}x) = + A_u^\dagger(\mathcal{T}x) A^\mu(\mathcal{T}x)$$



因此，由动能项和质量项组成的自由有质量复矢量场拉氏量在 C 、 P 、 T 变换下都是不变的



对于自由有质量实矢量场, $A^{\mu\dagger}(x) \equiv A^\mu(x)$, 故 $\xi_C \equiv \xi_C^*$ 、 $\xi_P \equiv \xi_P^*$ 、 $\xi_T \equiv \xi_T^*$,

$$\xi_C \equiv \pm 1, \quad \xi_P \equiv \pm 1, \quad \xi_T \equiv \pm 1$$



当 $\xi_P = +1$ 时, $A^\mu(x)$ 是极矢量场, 满足 $P^{-1}A^\mu(x)P = \mathcal{P}^\mu_\nu A^\nu(\mathcal{P}x)$



当 $\xi_P = -1$ 时, $A^\mu(x)$ 是轴矢量场, 满足 $P^{-1}A^\mu(x)P = -\mathcal{P}^\mu{}_\nu A^\nu(\mathcal{P}x)$



无论 ξ_C 、 ξ_P 和 ξ_T 取 ± 1 中的哪些值，自由有质量实矢量场的拉氏量在 C 、 P 、 T 变换下也都是不变的

8.3.2 节 电磁场的 C 、 P 、 T 变换

 相比于有质量矢量场，无质量矢量场的物理极化矢量只有 $\varepsilon^\mu(p, +)$ 和 $\varepsilon^\mu(p, -)$ 两个，但 C 、 P 、 T 变换性质是类似的

自由无质量复矢量场 $A^\mu(x)$ 的 C 、 P 、 T 变换为 (习题 8.3)

$$C^{-1}A^\mu(x)C = \xi_C^* A^{\mu\dagger}(x), \quad C^{-1}A^{\mu\dagger}(x)C = \xi_C A^\mu(x)$$

$$P^{-1}A^\mu(x)P = \xi_P^* \mathcal{P}^\mu{}_\nu A^\nu(\mathcal{P}x), \quad P^{-1}A^{\mu\dagger}(x)P = \xi_P \mathcal{P}^\mu{}_\nu A^{\nu\dagger}(\mathcal{P}x)$$

$$T^{-1}A^\mu(x)T = \xi_T^* \mathcal{T}^\mu{}_\nu A^\nu(\mathcal{T}x), \quad T^{-1}A^{\mu\dagger}(x)T = \xi_T \mathcal{T}^\mu{}_\nu A^{\nu\dagger}(\mathcal{T}x)$$

 对于自由无质量实矢量场, ξ_C 、 ξ_P 和 ξ_T 的取值只能是 ± 1

8.3.2 节 电磁场的 C 、 P 、 T 变换

 相比于有质量矢量场，无质量矢量场的物理极化矢量只有 $\varepsilon^\mu(p, +)$ 和 $\varepsilon^\mu(p, -)$ 两个，但 C 、 P 、 T 变换性质是类似的

自由无质量复矢量场 $A^\mu(x)$ 的 C 、 P 、 T 变换为 (习题 8.3)

$$C^{-1}A^\mu(x)C = \xi_C^* A^{\mu\dagger}(x), \quad C^{-1}A^{\mu\dagger}(x)C = \xi_C A^\mu(x)$$

$$P^{-1}A^\mu(x)P = \xi_P^* \mathcal{P}^\mu{}_\nu A^\nu(\mathcal{P}x), \quad P^{-1}A^{\mu\dagger}(x)P = \xi_P \mathcal{P}^\mu{}_\nu A^{\nu\dagger}(\mathcal{P}x)$$

$$T^{-1}A^\mu(x)T = \xi_T^* \mathcal{T}^\mu{}_\nu A^\nu(\mathcal{T}x), \quad T^{-1}A^{\mu\dagger}(x)T = \xi_T \mathcal{T}^\mu{}_\nu A^{\nu\dagger}(\mathcal{T}x)$$

对于自由无质量实矢量场, ξ_C 、 ξ_P 和 ξ_T 的取值只能是 ± 1

电磁场是一种无质量实矢量场，可通过 QED 相互作用确定 ξ_C 、 ξ_P 和 ξ_T 的取值

 在相互作用绘景中，参与相互作用的量子场与自由场具有形式相同的平面波展开式，因此前面推导出来的量子场 C 、 P 、 T 变换性质照样成立

于是, 理论的 C 、 P 、 T 对称性由拉氏量中相互作用项的 C 、 P 、 T 变换性质决定

电磁场的分立变换



在 QED 理论中，相互作用项的算符形式为 $A_\mu \bar{\psi} \gamma^\mu \psi$



根据 $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ 算符的 C 变换 $C^{-1}\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x)C = -\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x)$

$$P \text{ 变换 } P^{-1} \bar{\psi}(x) \gamma^\mu \psi(x) P = \mathcal{P}^\mu{}_\nu \bar{\psi}(\mathcal{P}x) \gamma^\nu \psi(\mathcal{P}x)$$

$$T \text{ 变换 } T^{-1} \bar{\psi}(x) \gamma^\mu \psi(x) T = -\mathcal{T}^\mu{}_\nu \bar{\psi}(\mathcal{T}x) \gamma^\nu \psi(\mathcal{T}x)$$



电磁场 $A^\mu(x)$ 的 C 、 P 、 T 变换必须是

$$C^{-1}A^\mu(x)C = -A^\mu(x)$$

$$P^{-1} A^\mu(x) P = \mathcal{P}^\mu{}_\nu A^\nu(\mathcal{P}x)$$

$$T^{-1} A^\mu(x) T = -\mathcal{T}^\mu{}_\nu A^\nu(\mathcal{T}x)$$



才能使 QED 相互作用项分别在 C 、 P 、 T 变换下不变

www.english-test.net

0000000000

000000000000

00000

888888888888888888

FILE NUMBER:
0000000000000000

电磁场的分立变换

在 QED 理论中，相互作用项的算符形式为 $A_\mu \bar{\psi} \gamma^\mu \psi$

根据 $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ 算符的 C 变换 $C^{-1}\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x)C = -\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x)$

$$P \text{ 变换 } P^{-1} \bar{\psi}(x) \gamma^\mu \psi(x) P = \mathcal{P}^\mu{}_\nu \bar{\psi}(\mathcal{P}x) \gamma^\nu \psi(\mathcal{P}x)$$

$$T \text{ 变换 } T^{-1} \bar{\psi}(x) \gamma^\mu \psi(x) T = -\mathcal{T}^\mu{}_\nu \bar{\psi}(\mathcal{T}x) \gamma^\nu \psi(\mathcal{T}x)$$

电磁场 $A^\mu(x)$ 的 C 、 P 、 T 变换必须是

$$C^{-1}A^\mu(x)C = -A^\mu(x)$$

$$P^{-1} A^\mu(x) P = \mathcal{P}^\mu{}_\nu A^\nu(\mathcal{P}x)$$

$$T^{-1} A^\mu(x) T = -\mathcal{T}^\mu{}_\nu A^\nu(\mathcal{T}x)$$

才能使 QED 相互作用项分别在 C 、 P 、 T 变换下不变

也就是说，必须取 $\xi_C = -1$, $\xi_P = +1$, $\xi_T = -1$

 这样的取法是做得到的，因此说 QED 理论同时具有 C 、 P 、 T 对称性，即具有**电荷共轭对称性、空间反射对称性和时间反演对称性**

从而，电磁场是 C 宇称为奇的极矢量场

电磁场强张量的分立变换

 电磁场的场强张量 $F^{\mu\nu}$ 和对偶场强张量 $\tilde{F}^{\mu\nu}$ 的 C 、 P 、 T 变换是

$$C^{-1}F^{\mu\nu}(x)C = -F^{\mu\nu}(x)$$

$$P^{-1}F^{\mu\nu}(x)P = \mathcal{P}^\mu{}_\rho \mathcal{P}^\nu{}_\sigma F^{\rho\sigma}(\mathcal{P}x)$$

$$T^{-1}F^{\mu\nu}(x)T = -\mathcal{T}^\mu{}_\rho \mathcal{T}^\nu{}_\sigma F^{\rho\sigma}(\mathcal{T}x)$$

$$C^{-1} \tilde{F}^{\mu\nu}(x) C = -\tilde{F}^{\mu\nu}(x)$$

$$P^{-1} \tilde{F}^{\mu\nu}(x) P = -\cancel{\mathcal{P}}^\mu{}_\rho \cancel{\mathcal{P}}^\nu{}_\sigma \tilde{F}^{\rho\sigma}(\cancel{\mathcal{P}} x)$$

$$T^{-1} \tilde{F}^{\mu\nu}(x) T = \mathcal{T}^\mu{}_\rho \mathcal{T}^\nu{}_\sigma \tilde{F}^{\rho\sigma}(\mathcal{T}x)$$

 $F^{\mu\nu}$ 和 $\tilde{F}^{\mu\nu}$ 的 C 宇称均为奇

 $F^{\mu\nu}$ 与 $\tilde{F}^{\mu\nu}$ 的 P 、 T 变换都相差一个**负号**

$F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}$ 和 $\tilde{F}^{\mu\nu}F_{\mu\nu}$ 的分立变换

于是，算符 $F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}$ 和 $\tilde{F}^{\mu\nu}F_{\mu\nu}$ 的 C 、 P 、 T 变换为

$$C^{-1} F^{\mu\nu}(x) F_{\mu\nu}(x) C = + F^{\mu\nu}(x) F_{\mu\nu}(x)$$

$$P^{-1}F^{\mu\nu}(x)F_{\mu\nu}(x)P = +F^{\mu\nu}(\mathcal{P}x)F_{\mu\nu}(\mathcal{P}x)$$

$$T^{-1}F^{\mu\nu}(x)F_{\mu\nu}(x)T = +F^{\mu\nu}(\mathcal{T}x)F_{\mu\nu}(\mathcal{T}x)$$

$$C^{-1} \tilde{F}^{\mu\nu}(x) F_{\mu\nu}(x) C = + \tilde{F}^{\mu\nu}(x) F_{\mu\nu}(x)$$

$$P^{-1} \tilde{F}^{\mu\nu}(x) F_{\mu\nu}(x) P = -\tilde{F}^{\mu\nu}(\mathcal{P}x) F_{\mu\nu}(\mathcal{P}x)$$

$$T^{-1} \tilde{F}^{\mu\nu}(x) F_{\mu\nu}(x) T = -\tilde{F}^{\mu\nu}(\mathcal{T}x) F_{\mu\nu}(\mathcal{T}x)$$



$F^{\mu\nu} F_{\mu\nu}$ 的 C 守恒和宇称均为偶



$\tilde{F}^{\mu\nu} F_{\mu\nu}$ 的 C 宇称为偶，宇称为奇