

数 学 物 理 方 法

第三章 解析函数的幂级数展开

余钊焕

中山大学物理学院

<https://yzhxxzxy.github.io>



更新日期：2026 年 9 月 29 日

第三章 解析函数的幂级数展开



本章先介绍复数级数、尤其是幂级数的性质



然后利用 Cauchy 积分公式导出解析函数的 Taylor 展开式

§1 复常数项级数

§1.1 基本概念与基本判敛法

 复常数项级数具有

$$\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_k + \cdots$$

的形式，其中每一项都是复数

 $s_n = \sum_{k=1}^n \alpha_k$ 称为其部分和

 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$ 是有限复数，则称级数收敛于 s

 s 称为级数的和，记作 $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k = s$

§1 复常数项级数

§1.1 基本概念与基本判敛法

 复常数项级数具有

$$\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_k + \cdots$$

的形式，其中每一项都是复数

 $s_n = \sum_{k=1}^n \alpha_k$ 称为其部分和

 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$ 是有限复数，则称级数收敛于 s

 s 称为级数的和，记作 $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k = s$

 若级数不收敛于有限复数，则称它发散

 注 发散包括两种情况：1 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \infty$ ；2 数列 $\{s_n\}_{n=1}^{\infty}$ 没有极限

数列的 Cauchy 收敛原理

 对于数列 $\{s_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是否收敛、即其极限是否存在的问题，类似于实数列，有下述

Cauchy 收敛原理

 数列 $\{s_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛的充要条件是

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists n \in \mathbb{N}^+, \quad \forall p \in \mathbb{N}^+, \quad \text{均有 } |s_{n+p} - s_n| < \varepsilon$$

 其中 $\mathbb{N}^+$ 表示正整数的集合

 这一精确描述的大意是，从某一项 s_n 开始，数列的各项 $s_{n+1}, s_{n+2}, \dots$ 均聚集在它附近，这样就容易理解极限的存在了

$$s_1, \quad s_2, \quad \dots, \quad s_n, \quad s_{n+1}, \quad \dots, \quad s_{n+p}, \quad \dots$$

数列 Cauchy 收敛原理的第二种表述



Cauchy 收敛原理也称为 **Cauchy 判敛准则**，它的**另一种**更常见的**表述**如下



数列 $\{s_n\}_{n=1}^{\infty}$ **收敛**的**充要条件**是

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists n_0 \in \mathbb{N}^+, \quad \text{当 } n > n_0 \text{ 时, } \quad \forall p \in \mathbb{N}^+, \quad \text{均有 } |s_{n+p} - s_n| < \varepsilon$$



这一精确描述的大意是，当数列**下标足够大**以后，**任何两项**的**距离**都可以**任意小**



更形象地说，**越往后**，数列的**各项就越是挤在一起**，这样也容易理解极限的存在

$$s_1, \quad s_2, \quad \cdots, \quad s_{n_0}, \quad \cdots, \quad s_n, \quad s_{n+1}, \quad \cdots, \quad s_{n+p}, \quad \cdots$$

两种表述的区别

 **Cauchy 收敛原理**两种表述的区别如下

 在**第一种表述**中, n **足够大**但**固定**

 在**第二种表述**中, n **足够大**但也是**任意**的

 容易证明两种表述是**等价**的

 **第一种表述**显得更简洁, 对于多数具体应用情景也更便于操作

两种表述的区别

 **Cauchy 收敛原理**两种表述的区别如下

 在**第一种表述**中, n 足够大但**固定**

 在**第二种表述**中, n 足够大但也是**任意**的

 容易证明两种表述是**等价**的

 **第一种表述**显得更简洁, 对于多数具体应用情景也更便于操作

 举例来说, 考虑**数列** $\{s_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的通项对于 s_{3n} 、 s_{3n+1} 和 s_{3n+2} 具有不同的形式, 用 Cauchy 收敛原理研究其敛散性

 如果按照**第一种表述**, 只需要考察 **3 种情况**

 而按照**第二种表述**, 则需要考察 **9 种情况**

 今后较多地采用**第一种表述**, 但视具体情况有时候也采用**第二种表述**

级数的 Cauchy 收敛原理



根据数列的 Cauchy 收敛原理，立得关于级数的 Cauchy 收敛原理

定理 (Cauchy 收敛原理) 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k$ 收敛的充要条件是

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists n \in \mathbb{N}^+, \quad \forall p \in \mathbb{N}^+, \quad \text{均有} \quad \left| \sum_{k=1}^p \alpha_{n+k} \right| < \varepsilon$$

✉ 对于 $s_n = \sum_{k=1}^n \alpha_k$ ，有

$$s_{n+p} - s_n = \sum_{k=1}^{n+p} \alpha_k - \sum_{k=1}^n \alpha_k = \sum_{k=n+1}^{n+p} \alpha_k = \sum_{k=1}^p \alpha_{n+k}$$

✉ 故 $|s_{n+p} - s_n| < \varepsilon$ 意味着 $\left| \sum_{k=1}^p \alpha_{n+k} \right| < \varepsilon$

级数的 Cauchy 收敛原理



根据数列的 **Cauchy 收敛原理**，立得关于级数的 **Cauchy 收敛原理**

定理 (Cauchy 收敛原理) 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k$ 收敛的充要条件是

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists n \in \mathbb{N}^+, \quad \forall p \in \mathbb{N}^+, \quad \text{均有} \quad \left| \sum_{k=1}^p \alpha_{n+k} \right| < \varepsilon$$



再利用**三角不等式**，易得

$$|\alpha_{n+p}| = \left| \sum_{k=1}^p \alpha_{n+k} - \sum_{k=1}^{p-1} \alpha_{n+k} \right| \leq \left| \sum_{k=1}^p \alpha_{n+k} \right| + \left| \sum_{k=1}^{p-1} \alpha_{n+k} \right| < 2\varepsilon$$



上式在 $p \rightarrow \infty$ 时成立，所以级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k$ 收敛的必要条件是 $\lim_{k \rightarrow \infty} \alpha_k = 0$



如果这一条件得不到满足，马上可以断定级数是发散的

级数的 Cauchy 收敛原理

 根据数列的 **Cauchy 收敛原理**，立得关于级数的 **Cauchy 收敛原理**

 **定理 (Cauchy 收敛原理)** 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k$ 收敛的充要条件是

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists n \in \mathbb{N}^+, \quad \forall p \in \mathbb{N}^+, \quad \text{均有} \quad \left| \sum_{k=1}^p \alpha_{n+k} \right| < \varepsilon$$

 再利用**三角不等式**，易得

$$|\alpha_{n+p}| = \left| \sum_{k=1}^p \alpha_{n+k} - \sum_{k=1}^{p-1} \alpha_{n+k} \right| \leq \left| \sum_{k=1}^p \alpha_{n+k} \right| + \left| \sum_{k=1}^{p-1} \alpha_{n+k} \right| < 2\varepsilon$$

 上式在 $p \rightarrow \infty$ 时成立，所以级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k$ 收敛的必要条件是 $\lim_{k \rightarrow \infty} \alpha_k = 0$

 如果这一条件得不到满足，马上可以断定级数是发散的

 **注** 若采用 Cauchy 收敛原理的**第二种表述**，则 $\left| \sum_{k=1}^p \alpha_{n+k} \right| < \varepsilon$ 中的 n 在**足够大**

的前提下是**任意**的，此时只需取 $p = 1$ ，则 $|\alpha_{n+1}| < \varepsilon$ 即是**收敛的必要条件**（较方便）

绝对收敛和条件收敛



Cauchy 收敛原理无疑是一个最基本的判别法，但是使用它需要计算**求和式**

$\sum_{k=1}^p \alpha_{n+k}$ ，或至少要估计**其模的上限**



这只有在**少数简单情况**下可以做到，比如**几何级数**（即**等比级数**） $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha^k$



在**级数** $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k$ 中**添加或去掉有限项**，并不改变级数的**收敛或发散**性质

绝对收敛和条件收敛



Cauchy 收敛原理无疑是一个最基本的判别法，但是使用它需要计算**求和式**

$\sum_{k=1}^p \alpha_{n+k}$ ，或至少要估计**其模的上限**



这只有在**少数简单情况**下可以做到，比如**几何级数**（即**等比级数**） $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha^k$



在级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k$ 中**添加或去掉有限项**，并不改变级数的**收敛或发散**性质



如果级数 $\sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_k|$ **收敛**，则称级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k$ **绝对收敛**



收敛但不绝对收敛的级数称为**条件收敛**

绝对收敛和条件收敛



Cauchy 收敛原理无疑是一个最基本的判别法，但是使用它需要计算**求和式**

$\sum_{k=1}^p \alpha_{n+k}$ ，或至少要估计**其模的上限**



这只有在**少数简单情况**下可以做到，比如**几何级数**（即**等比级数**） $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha^k$



在级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k$ 中**添加**或**去掉有限项**，并不改变级数的**收敛**或**发散**性质



如果级数 $\sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_k|$ **收敛**，则称级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k$ **绝对收敛**



收敛但不绝对收敛的级数称为**条件收敛**



定理 **绝对收敛**的级数必定**收敛**



这是因为**三角不等式**表明 $\left| \sum_{k=1}^p \alpha_{n+k} \right| \leq \sum_{k=1}^p |\alpha_{n+k}| = \left| \sum_{k=1}^p |\alpha_{n+k}| \right|$



从而由 $\left| \sum_{k=1}^p |\alpha_{n+k}| \right| < \varepsilon$ 可以推出 $\left| \sum_{k=1}^p \alpha_{n+k} \right| < \varepsilon$ ，**反之则不然**

判敛操作

🔧 在实际操作上，给定一个级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k$ ，先看看 $\lim_{k \rightarrow \infty} \alpha_k = 0$ 是否满足

🔨 若不满足，马上可以断定级数发散

🔨 若满足，再看看相应的级数 $\sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_k|$ 是否收敛

🔧 若收敛，则原级数绝对收敛

判敛操作

🔧 在实际操作上，给定一个级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k$ ，先看看 $\lim_{k \rightarrow \infty} \alpha_k = 0$ 是否满足

🔨 若**不满足**，马上可以断定级数**发散**

🔨 若**满足**，再看看相应的级数 $\sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_k|$ 是否收敛

🔧 若**收敛**，则**原级数绝对收敛**

✂️ 由于级数 $\sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_k|$ 是**正项级数** ($|\alpha_k| \geq 0$)，可用**高等数学**中的**正项级数判别法**来

判敛，如**比较判别法**、**Cauchy 判别法**、**d'Alembert 判别法**、**Cauchy 积分判别法**等

🔪 如果 $\lim_{k \rightarrow \infty} \alpha_k = 0$ **满足**，而级数 $\sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_k|$ 又**不收敛**，则需要进一步判断**原级数**是

发散还是**条件收敛**

🔪 不过，如果是由 **Cauchy 判别法**或 **d'Alembert 判别法**得到级数 $\sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_k|$ **发散**，

则**原级数**必定也**发散**，因为这时 $\lim_{k \rightarrow \infty} \alpha_k = 0$ **必不满足**

回顾：实数域上正项级数的判别法

 **比较判别法**：两正项级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 和 $\sum_{k=1}^{\infty} v_k$ 满足 $u_k \leq v_k$ ($k \in \mathbb{N}^+$)，则由 $\sum_{k=1}^{\infty} v_k$

收敛可断定 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 也收敛，由 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 发散可断定 $\sum_{k=1}^{\infty} v_k$ 也发散

 **Cauchy 判别法**：若正项级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 满足 $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{u_k} = l$ ，则 $l < 1$ 时级数收敛，

$l > 1$ 时级数发散， $l = 1$ 时级数可能收敛也可能发散

 **d'Alembert 判别法**：若正项级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ ($u_k > 0$) 满足 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{u_{k+1}}{u_k} = l$ ，则 $l < 1$

时级数收敛， $l > 1$ 时级数发散， $l = 1$ 时级数可能收敛也可能发散

 **Cauchy 积分判别法**：若存在单调下降的非负函数 $f(x)$ ($x \geq 1$)，使得

$$u_n = f(n), \quad n \in \mathbb{N}^+,$$

则正项级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 收敛的充要条件为无穷积分 $\int_1^{\infty} f(x) dx$ 收敛



回到刚才的讨论，其它情况下要进一步判断原级数是否**条件收敛**就比较困难



这时可以尝试计算**求和式** $\sum_{k=1}^p \alpha_{n+k}$ ，或估计**其模的上限**



如果成功，就可以用 **Cauchy 收敛原理**来判断；如果**求和式** $\sum_{k=1}^p \alpha_{n+k}$ **无法计算**

或**估计上限**，则可以尝试**选读 §1.2** 介绍的 **Abel 判别法**和 **Dirichlet 判别法**



就我们所知，并没有什么方法能够百分之百地解决任何级数的判敛问题



即使是**正项级数**，虽然有一些更敏锐的判别法可资利用，比如**选读 §1.5** 介绍的 **Gauss 判别法**，但也并不存在一劳永逸的解决方案

例

回到刚才的讨论，其它情况下要进一步判断原级数是否**条件收敛**就比较困难

这时可以尝试计算**求和式** $\sum_{k=1}^p \alpha_{n+k}$ ，或估计**其模的上限**

如果成功，就可以用 **Cauchy 收敛原理**来判断；如果**求和式** $\sum_{k=1}^p \alpha_{n+k}$ **无法计算**

或**估计上限**，则可以尝试**选读 §1.2** 介绍的 **Abel 判别法**和 **Dirichlet 判别法**

就我们所知，并没有什么方法能够百分之百地解决任何级数的判敛问题

即使是**正项级数**，虽然有一些更敏锐的判别法可资利用，比如**选读 §1.5** 介绍的 **Gauss 判别法**，但也并不存在一劳永逸的解决方案

例 几何级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha^k$

当 $|\alpha| < 1$ 时，由于**正项级数** $\sum_{k=1}^{\infty} |\alpha|^k = \frac{|\alpha|}{1-|\alpha|}$ **收敛**，故**原级数绝对收敛**

当 $|\alpha| \geq 1$ 时， $\lim_{k \rightarrow \infty} \alpha^k = \lim_{k \rightarrow \infty} |\alpha|^k \exp(ik \operatorname{Arg} \alpha) \neq 0$ ，故**原级数发散**

§2 复函数项级数

§2.1 普通函数项级数

 设级数 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(z)$ 的每一项都是定义在点集 E 上的复变函数，则该级数称为复函数项级数

 $s_n(z) = \sum_{k=1}^n f_k(z)$ 称为其部分和

 如果对 E 中的一点 z_0 ，常数项级数 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(z_0)$ 收敛，则称级数在 z_0 处收敛

§2 复函数项级数

§2.1 普通函数项级数

 设级数 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(z)$ 的每一项都是定义在点集 E 上的复变函数，则该级数称为复函数项级数

 $s_n(z) = \sum_{k=1}^n f_k(z)$ 称为其部分和

 如果对 E 中的一点 z_0 ，常数项级数 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(z_0)$ 收敛，则称级数在 z_0 处收敛

 如果 $\forall z \in E$ ，级数都收敛，则称它在点集 E 上收敛

 这时级数在 E 上每点有和，记作 $f(z)$ ，称为其和函数，即

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k(z) = f(z)$$

 从上述定义可以看出，这是一个逐点收敛的概念

 取定一点，则级数成为一个常数项级数，其判敛方法与上节所述无异

§2.2 一致收敛的函数项级数

🚗 对于函数项级数的研究，不能只是满足于逐点收敛的概念

🚗 因为即使级数 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(z)$ 在 E 上处处收敛，也看不出它在 E 上各点行为有何共性

🚗 既然是函数项级数，我们自然更关心这种共性

🚗 更重要的是，即使级数在 E 上处处收敛，也无法由级数中各项均具有的某种性质（比如连续、可导）而推断其和函数 $f(z)$ 具有同种性质

§2.2 一致收敛的函数项级数

🚂 对于函数项级数的研究，不能只是满足于逐点收敛的概念

🚂 因为即使级数 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(z)$ 在 E 上处处收敛，也看不出它在 E 上各点行为有何共性

🚌 既然是函数项级数，我们自然更关心这种共性

🚂 更重要的是，即使级数在 E 上处处收敛，也无法由级数中各项均具有的某种性质（比如连续、可导）而推断其和函数 $f(z)$ 具有同种性质

🚂 为了研究和函数 $f(z)$ 的性质，一个关键的概念是一致收敛，即级数在各点的收敛速度大致相同

💖 **一致收敛定义** 设在点集 E 上存在函数 $f(z)$ ，如果 $\forall \varepsilon > 0$ ， $\exists n_0 \in \mathbb{N}^+$ ，当 $n > n_0$ 时，

$$|s_n(z) - f(z)| < \varepsilon$$

在 E 上处处成立，则称级数 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(z)$ 在 E 上一致收敛于 $f(z)$

收敛与一致收敛的区别



按这一定义，一致收敛当然就收敛，但反之则不然



让我们看看收敛与一致收敛的区别在于何处



如果级数 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(z)$ 在 E 上收敛于 $f(z)$ ，则 $\forall \varepsilon > 0$ ，对于每一点 $z \in E$ ，

$\exists n_0 \in \mathbb{N}^+$ ，当 $n > n_0$ 时， $|s_n(z) - f(z)| < \varepsilon$ 在该点 z 成立



由此可以看出，对于同样的 ε ，不同的点 z 可能需要不同的 n_0 ，即 $n_0 = n_0(\varepsilon, z)$

收敛与一致收敛的区别

 按这一定义，**一致收敛**当然就**收敛**，但**反之则不然**

 让我们看看**收敛**与**一致收敛**的区别在于何处

 如果级数 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(z)$ 在 E 上**收敛**于 $f(z)$ ，则 $\forall \varepsilon > 0$ ，对于每一点 $z \in E$ ，

$\exists n_0 \in \mathbb{N}^+$ ，当 $n > n_0$ 时， $|s_n(z) - f(z)| < \varepsilon$ 在该点 z 成立

 由此可以看出，对于**同样的** ε ，**不同的点** z 可能需要**不同的** n_0 ，即 $n_0 = n_0(\varepsilon, z)$

 这样就存在一种可能性，当 z 沿某一趋势变化时，比如 $z \rightarrow z_0$ ($z, z_0 \in E$) 时，所需的 $n_0 = n_0(\varepsilon, z)$ **越来越大**，以至于**无法找到其有限的上界**

 亦即**无法找到**一个**共同的** n_0 ，使得当 $n > n_0$ 时， $|s_n(z) - f(z)| < \varepsilon$ 在 E 上**一致成立**

 另一方面，**一致收敛**的定义正是要求**存在**这样一个**共同的** $n_0 = n_0(\varepsilon)$ ，它**不依赖于** z ，而**只与** ε **有关**

Weierstrass M-判别法

下面给出一个一致收敛的充分条件，它是一个常用的判别法

定理 (Weierstrass M-判别法) 如果存在正数列 $\{M_k\}_{k=1}^{\infty}$ ，使得

$$|f_k(z)| \leq M_k, \quad \forall z \in E, \quad k \in \mathbb{N}^+,$$

且正项级数 $\sum_{k=1}^{\infty} M_k$ 收敛，则级数 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(z)$ 在点集 E 上绝对

收敛且一致收敛

 证明见选读内容



Karl Weierstrass
(1815–1897)

Weierstrass M-判别法

下面给出一个**一致收敛**的**充分条件**，它是一个常用的判别法

定理 (Weierstrass M-判别法) 如果存在**正数列** $\{M_k\}_{k=1}^{\infty}$ ，使得

$$|f_k(z)| \leq M_k, \quad \forall z \in E, \quad k \in \mathbb{N}^+,$$

且**正项级数** $\sum_{k=1}^{\infty} M_k$ **收敛**，则级数 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(z)$ 在**点集** E 上**绝对**

收敛且一致收敛

证明见选读内容


例 3 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} z^k$ 在 $r < 1$ 的闭圆 $|z| \leq r$ 上**绝对收敛且一致收敛**

事实上，存在**正项级数** $\sum_{k=1}^{\infty} r^k$ 满足**上述定理**的要求

该级数在**单位圆** $|z| < 1$ 上**绝对收敛**但不能一致收敛，见选读例 2



Karl Weierstrass
(1815–1897)



例 4

 **例 4** 当 $s > 1$ 时, 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{e^{ik\theta}}{k^s}$ 在 $0 \leq \theta < 2\pi$ 上绝对收敛且一致收敛


 事实上, 由于 $\left| \frac{e^{ik\theta}}{k^s} \right| = \frac{1}{k^s}$ ($0 \leq \theta < 2\pi$), 存在正项级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^s}$ (其收敛性见高

等数学教材) 满足上述定理的要求

 等价地说, 当 $s > 1$ 时, 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k^s}$ 在单位圆周 $|z| = 1$ 上绝对且一致收敛

 实际上, 由于 $\left| \frac{z^k}{k^s} \right| \leq \frac{1}{k^s}$ ($|z| \leq 1$), 此时它在闭圆

$|z| \leq 1$ 上绝对且一致收敛



和函数连续定理



一致收敛的重要性体现在下面两个定理上



和函数连续定理 若级数 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(z)$ 的各项均在点集 E 上连续, 且级数在 E 上一

致收敛于函数 $f(z)$, 则 $f(z)$ 也在 E 上连续



证明见选读内容



和函数在点 $z_0 \in E$ 连续就是 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$, 也就是

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \sum_{k=1}^{\infty} f_k(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(z_0) = \sum_{k=1}^{\infty} \lim_{z \rightarrow z_0} f_k(z)$$



所以, 可以等价地说, 取极限与求和可以交换次序, 其前提是级数要一致收敛

逐项积分定理

 **逐项积分定理** 若级数 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(z)$ 的各项均在曲线 C 上连续, 且级数在 C 上一致

收敛于函数 $f(z)$, 则可以沿 C 逐项积分, 即

$$\int_C f(z) dz = \sum_{k=1}^{\infty} \int_C f_k(z) dz$$

 **证明见选读内容**

 上式意味着

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_C f_k(z) dz = \int_C f(z) dz = \int_C \sum_{k=1}^{\infty} f_k(z) dz$$

 亦即积分与求和可以交换次序, 其前提是级数要一致收敛

逐项积分定理

● **逐项积分定理** 若级数 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(z)$ 的各项均在曲线 C 上连续, 且级数在 C 上一致

收敛于函数 $f(z)$, 则可以沿 C 逐项积分, 即

$$\int_C f(z) dz = \sum_{k=1}^{\infty} \int_C f_k(z) dz$$

🚁 证明见选读内容

✈️ 上式意味着

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_C f_k(z) dz = \int_C f(z) dz = \int_C \sum_{k=1}^{\infty} f_k(z) dz$$

🚁 亦即积分与求和可以交换次序, 其前提是级数要一致收敛

🚀 很容易想到的一个问题是, 什么情况下求导与求和可以交换次序?

🚀 当然, 只有在级数各项均可导、或者说各项均解析的条件下, 这一问题才有意义

🚀 所以这是一个关于解析函数项级数的问题, 下一小节就会给出答案

§2.3 解析函数项级数

🚗 若级数 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(z)$ 中各项均为解析函数，就称为解析函数项级数，有以下重要定理

🔴 **Weierstrass 定理** 若级数 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(z)$ 的各项均在区域 D 内解析，且级数在 D 内的任一有界闭集上一致收敛（称为在 D 上内闭一致收敛）于函数 $f(z)$ ，则

① 和函数 $f(z)$ 在 D 内解析


② 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k^{(p)}(z)$ 在 D 上内闭一致收敛到 $f^{(p)}(z)$ ，其中 $p \in \mathbb{N}^+$

➡ 注 这是一个非常重要的定理，它是级数理论的基石

💡 复变函数论中的级数理论也称为 **Weierstrass 级数理论**

🚗 定理的证明见[选读内容](#)

🚗 这个定理是微积分中所没有的



关于 Weierstrass 定理的讨论

 微积分中，要求级数 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上收敛，各项都有导数，且 $\sum_{k=1}^{\infty} f'_k(x)$

在 $[a, b]$ 上一致收敛，才能逐项求导一次，并且不能保证可以进一步逐项求导

 而这里只要求原级数一致收敛，且各项解析，那么就可以不断地逐项求导，且求导后的级数也一致收敛到和函数的同阶导数

 这里要求级数在 D 上内闭一致收敛，这比要求级数在 D 内一致收敛要弱

关于 Weierstrass 定理的讨论

🚗 微积分中, 要求级数 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上收敛, 各项都有导数, 且 $\sum_{k=1}^{\infty} f'_k(x)$

在 $[a, b]$ 上一致收敛, 才能逐项求导一次, 并且不能保证可以进一步逐项求导

🚦 而这里只要求原级数一致收敛, 且各项解析, 那么就可以不断地逐项求导, 且求导后的级数也一致收敛到和函数的同阶导数


🚦 这里要求级数在 D 上内闭一致收敛, 这比要求级数在 D 内一致收敛要弱

🚰 比如, 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} z^k$ 虽然在单位圆 $|z| < 1$ 上不能一致收敛, 但内闭一致收敛

🚰 这是因为例 3 表明它在闭圆 $|z| \leq r < 1$ 上一致收敛

🚦 从而, 它的和函数 $f(z) = \frac{z}{1-z}$ 在单位圆 $|z| < 1$ 内

解析, 且可以逐项求导



§3 幂级数

§3.1 幂级数的敛散性

 形如

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - a)^n \quad (a \in \mathbb{C}, c_n \in \mathbb{C})$$

的级数称为**幂级数**

 **注** 从本节开始, 改用 n 来表示**求和指标**

 并注意现在求和**多了** $n = 0$ **一项**, 不过这对于级数的性质**没有什么影响**

 显然, **幂级数**的**每一项** $c_n (z - a)^n$ 都是**解析函数**

 事实上, **幂级数**是最简单的**解析函数项级数**

 根据 **Weierstrass 定理**, 只要把级数的**收敛区域**研究清楚, 那么**和函数**的**解析性质**也就清楚了

Abel 定理


关于幂级数的敛散性，Abel 给出了下述重要定理

Abel 定理 如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ 在某点 $z_0 \neq a$ 收敛，则

- 1 它在圆 $K : |z-a| < |z_0-a|$ 内绝对收敛
- 2 它在闭圆 $K_\rho : |z-a| \leq \rho < |z_0-a|$ 内一致收敛 (即在圆 K 上内闭一致收敛)



Niels Henrik Abel
(1802–1829)



Abel 定理

🌳 关于幂级数的敛散性，Abel 给出了下述重要定理

🔵 **Abel 定理** 如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ 在某点 $z_0 \neq a$ 收敛，则

- 1 它在圆 $K: |z-a| < |z_0-a|$ 内绝对收敛
- 2 它在闭圆 $K_\rho: |z-a| \leq \rho < |z_0-a|$ 内一致收敛 (即在圆 K 上内闭一致收敛)

📘 **证明** 1 由已知条件，级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z_0-a)^n$ 收敛


🐼 故 $\exists M > 0$ ，使得 $|c_n(z_0-a)^n| < M$ ， $n \in \mathbb{N}$

🐼 于是 $|c_n(z-a)^n| = |c_n(z_0-a)^n| \left| \frac{z-a}{z_0-a} \right|^n < M \left| \frac{z-a}{z_0-a} \right|^n$

🐼 当 $|z-a| < |z_0-a|$ 时，以右边为通项的级数 (它正比于几何级数) 收敛，由比较判别法，以左边为通项的级数亦收敛，即原级数在圆 K 上绝对收敛



Niels Henrik Abel
(1802–1829)




2 当 $|z - a| \leq \rho < |z_0 - a|$ 时, 有

$$|c_n(z - a)^n| < M \left| \frac{z - a}{z_0 - a} \right|^n \leq M \left(\frac{\rho}{|z_0 - a|} \right)^n$$

右边是与 z 无关的正数, 且以此为通项的级数显然收敛

由 Weierstrass M-判别法, 原级数在闭圆 K_ρ 上一致收敛



证毕



Abel 定理的推论 1

2 当 $|z - a| \leq \rho < |z_0 - a|$ 时, 有

$$|c_n(z - a)^n| < M \left| \frac{z - a}{z_0 - a} \right|^n \leq M \left(\frac{\rho}{|z_0 - a|} \right)^n$$

右边是与 z 无关的正数, 且以此为通项的级数显然收敛

由 Weierstrass M-判别法, 原级数在闭圆 K_ρ 上一致收敛



证毕

由 Abel 定理, 立得以下推论

推论 1 如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - a)^n$ 在某点 $z_0 \neq a$

发散, 则它必在圆周 $|z - a| = |z_0 - a|$ 外发散

这是因为如果它在圆周 $|z - a| = |z_0 - a|$ 外某点收敛, 则 Abel 定理表明它必定在 z_0 收敛, 这与已知条件矛盾



Abel 定理的推论 2



由 Abel 定理和推论 1 可知，幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ 在某点 z 收敛或发散只与该

点与 a 的距离 $|z-a|$ 有关，而与该点相对于 a 点的方向无关



即只与 $z-a$ 的模有关，而与其辐角无关



因此收敛点集与发散点集的分界必定是一个圆周，这就是下面的推论

Abel 定理的推论 2



由 **Abel 定理**和**推论 1** 可知，幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ 在**某点** z **收敛**或**发散**只与该

点与 a 的**距离** $|z-a|$ 有关，而**与**该点相对于 a 点的**方向****无关**



即只与 $z-a$ 的**模**有关，而**与其辐角****无关**



因此**收敛点集**与**发散点集**的**分界**必定是一个**圆周**，这就是下面的推论



推论 2 对于幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ ， $\exists R \geq 0$ ，使它在**圆** $|z-a| < R$ 上**绝对收**

敛且**内闭一致收敛**，而在**圆外**处处**发散**



R 称为**收敛半径**， $|z-a| < R$ 称为**收敛圆**




而 $|z-a| = R$ 称为**收敛圆周**



应当指出，对于幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ 在

收敛圆周 $|z-a| = R$ 上的敛散性，**Abel 定理**
及其推论没有给出结论



§3.2 收敛半径的求法

🌸 **Abel 定理**的**推论 2**可**等价**表达为：令 $r = |z - a|$ ，则**正项**

级数 $\sum_{n=0}^{\infty} |c_n| r^n$ 当 $0 \leq r < R$ 时**收敛**，当 $r > R$ 时**发散**

🐝 也就是说， R 是**该正项级数**的**收敛区间**与**发散区间**的**分界点**

§3.2 收敛半径的求法

🌺 **Abel 定理的推论 2** 可等价表达为：令 $r = |z - a|$ ，则**正项**

级数 $\sum_{n=0}^{\infty} |c_n| r^n$ 当 $0 \leq r < R$ 时**收敛**，当 $r > R$ 时**发散**

🐝 也就是说， R 是**该正项级数的收敛区间与发散区间的分界点**

🦋 根据判断**正项级数敛散性的 Cauchy 判别法**，不难推出下面**收敛半径**的计算公式

💙 **定理 (收敛半径的 Cauchy 计算公式)** 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = l$ ，

Augustin-Louis Cauchy

(1789–1857)

则**幂级数** $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - a)^n$ 的**收敛半径**为

$$R = \begin{cases} \frac{1}{l}, & 0 < l < \infty \\ 0, & l = \infty \\ \infty, & l = 0 \end{cases}$$

🐜 实际上，注意到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n| r^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} r = lr$

🐌 则**正项级数** $\sum_{n=0}^{\infty} |c_n| r^n$ 的**收敛条件** $lr < 1$ 等价于 $r < \frac{1}{l} = R$



收敛半径的 d'Alembert 计算公式



由判断正项级数敛散性的 **d'Alembert 判别法** 可推出另一个计算收敛半径的公式



定理 (收敛半径的 d'Alembert 计算公式) 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = l$, 则幂级数

$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - a)^n$ 的收敛半径为

$$R = \begin{cases} \frac{1}{l}, & 0 < l < \infty \\ 0, & l = \infty \\ \infty, & l = 0 \end{cases}$$



Jean d'Alembert
(1717–1783)



实际上, 注意到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|c_{n+1}| r^{n+1}}{|c_n| r^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| r = lr$



则正项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} |c_n| r^n$ 的收敛条件 $lr < 1$ 等价于 $r < \frac{1}{l} = R$

§3.3 和函数的解析性



知道了**幂级数**的**收敛范围**，由前面有关定理，就可以得到以下结论，证明见**选读**



定理 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ 在**收敛圆** $K: |z-a| < R$ 上有如下性质



① 和函数 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ **解析**



② 可以**逐项求导**，而**收敛半径不变**



比如， $f'(z) = \sum_{n=0}^{\infty} [c_n(z-a)^n]' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)c_{n+1}(z-a)^n$ 在 $|z-a| < R$ 上

绝对收敛且**内闭一致收敛**



③ 可以**逐项积分**，而**收敛半径不变**



比如， $\int_a^z f(\zeta) d\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} \int_a^z c_n(\zeta-a)^n d\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n+1} (z-a)^{n+1}$ 在

$|z-a| < R$ 上**绝对收敛**且**内闭一致收敛**

§4 解析函数的 Taylor 展开

§4.1 Taylor 定理

🍷 上节看到，一个幂级数在其收敛圆内具有解析的和函数

🍪 换句话说，它在收敛圆内代表一个解析函数

🍰 反过来，在圆内解析的函数是否可以展开成幂级数呢？

🍌 下面的定理给出了肯定的答案

§4 解析函数的 Taylor 展开

§4.1 Taylor 定理

🌀 上节看到, 一个**幂级数**在其**收敛圆**内具有**解析的函数**

🌀 换句话说, 它在**收敛圆**内代表一个**解析函数**

🌀 反过来, 在**圆**内**解析的函数**是否可以展开成**幂级数**呢?

🍌 下面的定理给出了肯定的答案

💛 **Taylor 定理** 设**函数** $f(z)$ 在**圆** $K: |z - a| < R$ 内**解析**, 则在 K 内可以展开为**幂级数**

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - a)^n,$$

其中


$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} d\zeta = \frac{f^{(n)}(a)}{n!},$$

$$\Gamma_\rho: |\zeta - a| = \rho < R, \quad n \in \mathbb{N},$$

且展开式是**唯一**的



Brook Taylor
(1685–1731)



几何级数的和函数

🍌 为了证明 **Taylor 定理**，需要先推出**几何级数**在其**收敛圆**上的**和函数**

🍌 **几何级数**的**部分和**为 $\sum_{n=0}^m z^n = 1 + z + z^2 + \cdots + z^{m-1} + z^m$

🍌 两边同时**乘以** z ，有 $z \sum_{n=0}^m z^n = z + z^2 + z^3 + \cdots + z^m + z^{m+1}$

🍌 两式**相减**，得 $(1 - z) \sum_{n=0}^m z^n = 1 - z^{m+1}$ ，即 $\sum_{n=0}^m z^n = \frac{1 - z^{m+1}}{1 - z} \quad (z \neq 1)$

几何级数的和函数

🍳 为了证明 **Taylor 定理**，需要先推出**几何级数**在其**收敛圆**上的**和函数**

🍌 **几何级数**的**部分和**为 $\sum_{n=0}^m z^n = 1 + z + z^2 + \cdots + z^{m-1} + z^m$

🍖 两边同时**乘以** z ，有 $z \sum_{n=0}^m z^n = z + z^2 + z^3 + \cdots + z^m + z^{m+1}$

🍌 两式**相减**，得 $(1 - z) \sum_{n=0}^m z^n = 1 - z^{m+1}$ ，即 $\sum_{n=0}^m z^n = \frac{1 - z^{m+1}}{1 - z} \quad (z \neq 1)$

🍌 当 $|z| < 1$ 时， $\lim_{m \rightarrow \infty} z^{m+1} = \lim_{m \rightarrow \infty} |z|^{m+1} \exp[i(m+1) \operatorname{Arg} z] = 0$ ，故

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^m z^n = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1 - z^{m+1}}{1 - z} = \frac{1}{1 - z}$$

🍌 也就是说，**几何级数**在 $|z| < 1$ 上的**和函数**为

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1 - z}, \quad |z| < 1$$


Taylor 定理的证明

证明 $\forall z \in K$, 总可以找到正数 ρ 使得 $|z - a| < \rho < R$

作圆周 $\Gamma_\rho: |\zeta - a| = \rho$, 则 z 在其内部

显然, $f(\zeta)$ 在闭圆 $\bar{K}_\rho: |\zeta - a| \leq \rho$ 上解析

根据 Cauchy 积分公式, 有
$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$



Taylor 定理的证明

证明 $\forall z \in K$, 总可以找到正数 ρ 使得 $|z - a| < \rho < R$


作圆周 $\Gamma_\rho: |\zeta - a| = \rho$, 则 z 在其内部

显然, $f(\zeta)$ 在闭圆 $\bar{K}_\rho: |\zeta - a| \leq \rho$ 上解析

根据 Cauchy 积分公式, 有 $f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$

在 Γ_ρ **上有** $\left| \frac{z - a}{\zeta - a} \right| < \frac{\rho}{\rho} = 1$, 利用 $\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1 - z} \ (|z| < 1)$ 推出

$$\frac{f(\zeta)}{\zeta - z} = \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a) - (z - a)} = \frac{f(\zeta)}{\zeta - a} \frac{1}{1 - (z - a)/(\zeta - a)} = \frac{f(\zeta)}{\zeta - a} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - a}{\zeta - a} \right)^n$$



Taylor 定理的证明

证明 $\forall z \in K$, 总可以找到**正数** ρ 使得 $|z - a| < \rho < R$

作圆周 $\Gamma_\rho: |\zeta - a| = \rho$, 则 z 在**其内部**

显然, $f(\zeta)$ 在**闭圆** $\bar{K}_\rho: |\zeta - a| \leq \rho$ 上**解析**


根据 **Cauchy 积分公式**, 有 $f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$

在 Γ_ρ 上有 $\left| \frac{z - a}{\zeta - a} \right| < \frac{\rho}{\rho} = 1$, 利用 $\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1 - z} \ (|z| < 1)$ 推出

$$\frac{f(\zeta)}{\zeta - z} = \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a) - (z - a)} = \frac{f(\zeta)}{\zeta - a} \frac{1}{1 - (z - a)/(\zeta - a)} = \frac{f(\zeta)}{\zeta - a} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - a}{\zeta - a} \right)^n$$

$\zeta \in \Gamma_\rho$ 时, $\left| \left(\frac{z - a}{\zeta - a} \right)^n \right| = \left(\frac{|z - a|}{\rho} \right)^n$ 与 ζ 无关, 以此为**通项**的**正项级数收敛**

故由 **Weierstrass M-判别法**, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - a}{\zeta - a} \right)^n$ 在 Γ_ρ 上**一致收敛**



继续证明

🔍 又函数 $\frac{f(\zeta)}{\zeta - a}$ 在 Γ_ρ 上有界


🕒 故 $\frac{f(\zeta)}{\zeta - z} = \frac{f(\zeta)}{\zeta - a} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - a}{\zeta - a} \right)^n$ 在 Γ_ρ 上一致收敛

📦 因而可以逐项积分，得

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta - a} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - a}{\zeta - a} \right)^n d\zeta \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} d\zeta \right] (z - a)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z - a)^n \end{aligned}$$

🍲 最后一步用到 **Cauchy 高阶导数公式**，上式即所求证

🍕 虽然开始时取 ρ 满足 $|z - a| < \rho < R$ ，但最后出现在系数中的积分显然与 ρ 的大小无关，只要 $\rho < R$ 即可算出正确结果



完成证明

为了证明展开式的唯一性，假设用某种方法找到在 K 内成立的另一个展开式

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} d_n (z - a)^n$$

令 $z = a$ ，即得 $d_0 = f(a) = c_0$

又因为幂级数逐项求导后在 K 内仍收敛，故可逐项求导 n 次后令 $z = a$ ，得到


$$d_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} = c_n, \quad n \in \mathbb{N}^+$$

可见，展开式是唯一的

证毕 ■

$$f^{(k)}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1)d_n(z-a)^{n-k}$$

$$f^{(k)}(a) = k!d_k$$




Taylor 展开式

 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n$ 称为 $f(z)$ 在 a 点处的 Taylor 展开式

 其右边称为 Taylor 级数, a 称为展开中心

 $c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ 称为 Taylor 系数

 只要 $|z-a| < R$, Taylor 展开式就成立, 故 Taylor 级数的收敛半径大于或等于 R



§4.2 展开式的收敛半径

- 🍪 如果求得了 Taylor 展开式的通项系数，就可以用 §3.2 的方法来计算收敛半径
- 🍪 然而，在 $f(z)$ 比较复杂的情况下，要求出展开式的通项系数是很困难的
- 🍪 因此，希望可通过被展开函数本身的性质来计算收敛半径
- 🍪 即使可以求出通项系数，另一种方法也可用于互相印证

§4.2 展开式的收敛半径

🍪 如果求得了 Taylor 展开式的通项系数，就可以用 §3.2 的方法来计算收敛半径


🍪 然而，在 $f(z)$ 比较复杂的情况下，要求出展开式的通项系数是很困难的

🍪 因此，希望可通过被展开函数本身的性质来计算收敛半径

🍪 即使可以求出通项系数，另一种方法也可用于互相印证

🍪 关于这一问题，有以下简单的结论

🍪 以 a 点为中心将解析函数 $f(z)$ 展开为 Taylor 级数，若 $f(z)$ 距离 a 点最近的奇点为 z_0 ，则收敛半径为 $R = |z_0 - a|$



§4.2 展开式的收敛半径

🍪 如果求得了 **Taylor 展开式**的**通项系数**，就可以用 §3.2 的方法来计算**收敛半径**


🍪 然而，在 $f(z)$ 比较复杂的情况下，要求出展开式的**通项系数**是很困难的

🍪 因此，希望可通过**被展开函数**本身的性质来计算**收敛半径**

🍪 即使可以求出**通项系数**，另一种方法也可用于互相印证

🍪 关于这一问题，有以下简单的结论

🍪 以 a 点为**中心**将**解析函数** $f(z)$ 展开为 **Taylor 级数**，若 $f(z)$ 距离 a 点最近的奇点为 z_0 ，则**收敛半径**为 $R = |z_0 - a|$



🍪 以 a 点为中心作**圆** K ，只要 $f(z)$ 在其中**解析**，则 **Taylor 展开式**就在 K 内成立

🍪 因此，**展开圆**的圆周至少可以推至 z_0 处，从而**收敛半径** $R \geq |z_0 - a|$

🍪 另一方面，**假设** **Taylor 级数**的**收敛半径** $R > |z_0 - a|$ ，由于**幂级数**的**和函数**在**收敛圆**内**解析**，故 $f(z)$ 在 z_0 **解析**，这与 z_0 是**奇点**的条件**矛盾**，故 $R \leq |z_0 - a|$

🍪 综上所述，即得 $R = |z_0 - a|$

§4.3 初等单值函数的 Taylor 展开式

 本小节给出若干常用的初等单值函数的 Taylor 展开式

 **例 1** 求 $f(z) = e^z$ 在 $a = 0$ 处的 Taylor 展开式

 **解** 由 $(e^z)' = e^z$ 得 $f^{(n)}(z) = e^z$ ($n \in \mathbb{N}^+$), 故 $f(0) = f^{(n)}(0) = 1$ ($n \in \mathbb{N}^+$)

 于是所求 Taylor 展开式为

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \cdots + \frac{z^n}{n!} + \cdots$$

 $f(z) = e^z$ 在 z 平面上解析, 即在有限远处无奇点

 故展开式的收敛半径应为 $R = \infty$

§4.3 初等单值函数的 Taylor 展开式

 本小节给出若干常用的初等单值函数的 Taylor 展开式

 **例 1** 求 $f(z) = e^z$ 在 $a = 0$ 处的 Taylor 展开式

 **解** 由 $(e^z)' = e^z$ 得 $f^{(n)}(z) = e^z$ ($n \in \mathbb{N}^+$), 故 $f(0) = f^{(n)}(0) = 1$ ($n \in \mathbb{N}^+$)

 于是所求 Taylor 展开式为

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \cdots + \frac{z^n}{n!} + \cdots$$

 $f(z) = e^z$ 在 z 平面上解析, 即在有限远处无奇点

 故展开式的收敛半径应为 $R = \infty$

 也可以通过 Taylor 系数 $c_n = \frac{1}{n!}$ 计算收敛半径, 根据 d'Alembert 计算公式, 有

$$l = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n!}{(n+1)!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0$$

 同样得到收敛半径 $R = \infty$

例 2



例 2 求 $f(z) = \frac{1}{1-z}$ 在 $a=0$ 处的 **Taylor 展开式**



解 $c_0 = f(0) = 1$, 而

$$f^{(n)}(z) = \frac{d}{dz^{n-1}} \left(\frac{1}{1-z} \right)' = \frac{d}{dz^{n-1}} \frac{1!}{(1-z)^2} = \frac{d}{dz^{n-2}} \frac{2!}{(1-z)^3} = \cdots = \frac{n!}{(1-z)^{n+1}}$$

$$f^{(n)}(0) = n!, \quad c_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!} = 1, \quad n \in \mathbb{N}^+$$



所求 **Taylor 展开式**为 $\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n = 1 + z + \cdots + z^n + \cdots$, 即**几何级数**

例 2

 **例 2** 求 $f(z) = \frac{1}{1-z}$ 在 $a=0$ 处的 Taylor 展开式

 **解** $c_0 = f(0) = 1$, 而

$$f^{(n)}(z) = \frac{d}{dz^{n-1}} \left(\frac{1}{1-z} \right)' = \frac{d}{dz^{n-1}} \frac{1!}{(1-z)^2} = \frac{d}{dz^{n-2}} \frac{2!}{(1-z)^3} = \cdots = \frac{n!}{(1-z)^{n+1}}$$

$$f^{(n)}(0) = n!, \quad c_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!} = 1, \quad n \in \mathbb{N}^+$$

 所求 Taylor 展开式为 $\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n = 1 + z + \cdots + z^n + \cdots$, 即几何级数

 由于 $f(z) = \frac{1}{1-z}$ 在 z 平面上有奇点 $z_0 = 1$, 而展开中心 $a = 0$, 故收敛半径应为 $R = |z_0 - a| = 1$

 此外, 由 Cauchy 计算公式得 $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1} = 1$, 故 $R = \frac{1}{l} = 1$

 以上两个结果经常被用来计算更复杂的函数的 Taylor 展开式, 应熟悉掌握

例 3



例 3 求 $\cos z$ 和 $\sin z$ 在 $a = 0$ 处的 Taylor 展开式



解 由例 1 的结果, 注意到 $i^{2k} = (-1)^k$ ($k \in \mathbb{N}$), 有

$$e^{iz} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(iz)^n}{n!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k}}{(2k)!} + i \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

$$e^{-iz} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-iz)^n}{n!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k}}{(2k)!} - i \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k+1}}{(2k+1)!}$$



故所求 Taylor 展开式为

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k}}{(2k)!}$$

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k+1}}{(2k+1)!}$$



由于 $\cos z$ 和 $\sin z$ 在 z 平面上解析, 即在有限远处无奇点, 故两展开式的收敛半径都是 $R = \infty$, 由 Taylor 系数计算收敛半径可得同样的结果

§4.4 初等多值函数的 Taylor 展开式

对于多值函数，首先要分出单值分支，然后才能作 Taylor 展开

例 4 求 $f(z) = \ln(1+z)$ 在 $a=0$ 处的 Taylor 展开式，规定 $f(0) = 0$

解 $f(z) = \ln(1+z)$ 的支点为 -1 和 ∞


将 z 平面沿负实轴从 -1 到 ∞ 割破，可以分出单值分支

由于 $\ln(1+z) = \ln|1+z| + i \arg(1+z)$ ，规定 $f(0) = 0$

即规定 $\arg(1+z)|_{z=0} = \arg[z - (-1)]|_{z=0} = 0$ ，

这就确定了单值分支

为了使 Taylor 级数收敛圆尽量大，割线不应该穿过单位圆 $|z| < 1$



§4.4 初等多值函数的 Taylor 展开式

对于多值函数，首先要分出单值分支，然后才能作 Taylor 展开

例 4 求 $f(z) = \ln(1+z)$ 在 $a=0$ 处的 Taylor 展开式，规定 $f(0) = 0$

解 $f(z) = \ln(1+z)$ 的支点为 -1 和 ∞

将 z 平面沿负实轴从 -1 到 ∞ 割破，可以分出单值分支

由于 $\ln(1+z) = \ln|1+z| + i \arg(1+z)$ ，规定 $f(0) = 0$


即规定 $\arg(1+z)|_{z=0} = \arg[z - (-1)]|_{z=0} = 0$ ，

这就确定了单值分支

为了使 Taylor 级数收敛圆尽量大，割线不应该穿过单位圆 $|z| < 1$

按规定， $f(0) = 0$ ，故 $c_0 = 0$ ，又

$$\begin{aligned} f^{(n)}(z) &= \frac{d}{dz^{n-1}} [\ln(1+z)]' = \frac{d}{dz^{n-1}} \frac{1}{1+z} = \frac{d}{dz^{n-2}} \frac{-1!}{(1+z)^2} \\ &= \frac{d}{dz^{n-3}} \frac{(-1)^2 2!}{(1+z)^3} = \cdots = \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{(1+z)^n} \end{aligned}$$



$\ln(1+z)$ 的 Taylor 展开式

🍷 从而 $f^{(n)}(0) = (-)^{n-1}(n-1)!$, $c_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{(-)^{n-1}}{n}$ ($n \in \mathbb{N}^+$)


🍷 于是, 所求 Taylor 展开式为

$$\ln(1+z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-)^{n-1}}{n} z^n$$

🍵 $f(z) = \ln(1+z)$ 距离展开中心 $a=0$ 最近的奇点为 $z_0 = -1$

☕ 故展开式的收敛半径应为 $R=1$

🍲 由 Taylor 系数计算收敛半径可得同样的结果



$\ln(1+z)$ 的 Taylor 展开式

🍷 从而 $f^{(n)}(0) = (-)^{n-1}(n-1)!$, $c_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{(-)^{n-1}}{n}$ ($n \in \mathbb{N}^+$)

🍷 于是, 所求 Taylor 展开式为

$$\ln(1+z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-)^{n-1}}{n} z^n$$

🍵 $f(z) = \ln(1+z)$ 距离展开中心 $a=0$ 最近的奇点为 $z_0 = -1$

☕ 故展开式的收敛半径应为 $R=1$


🍲 由 Taylor 系数计算收敛半径可得同样的结果

🍶 如果规定 $\arg(1+z)|_{z=0} = \arg[z - (-1)]|_{z=0} = 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)

🍷 则 $c_0 = f(0) = 2k\pi i$, 而其余系数不变 ($\text{Ln } z$ 的多值性只体现在给虚部加上 $2k\pi$)

🍷 从而所求 Taylor 展开式为

$$\ln(1+z) = 2k\pi i + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-)^{n-1}}{n} z^n$$




§5 解析开拓的基本概念

❤ **定义** 设函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 考虑一个包含 D 的更大的区域 G , 如果存在函数 $F(z)$ 在 G 内解析, 且在 D 内 $F(z) = f(z)$, 则称函数 $f(z)$ 可解析开拓到 G 内, 并称函数 $F(z)$ 为函数 $f(z)$ 在 G 内的解析开拓

↓ **注** 解析开拓也称为解析延拓

🧠 如果这样定义的解析开拓存在的话, 可以证明它一定是唯一的



§5 解析开拓的基本概念

❤ **定义** 设函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 考虑一个包含 D 的更大的区域 G , 如果存在函数 $F(z)$ 在 G 内解析, 且在 D 内 $F(z) = f(z)$, 则称函数 $f(z)$ 可解析开拓到 G 内, 并称函数 $F(z)$ 为函数 $f(z)$ 在 G 内的解析开拓

↓ **注** 解析开拓也称为解析延拓


🧠 如果这样定义的解析开拓存在的话, 可以证明它一定是唯一的

💡 **例** $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$ 在区域 $D: |z| < 1$ 内解析

🦀 而 $F(z) = \frac{1}{1-z}$ 在区域 $G = \mathbb{C} \setminus \{1\}$ (表示复平面去掉点 $z = 1$) 内解析

👩 在 D 内 $F(z) = f(z)$

🦀 故 $F(z)$ 是 $f(z)$ 在 G 内的解析开拓



本章知识点小结

1 复常数项级数

- 复常数项级数, Cauchy 收敛原理, 绝对收敛和条件收敛, 基本判别法

2 复函数项级数

- 普通函数项级数, 一致收敛的函数项级数
- Weierstrass M-判别法, 和函数连续定理, 逐项积分定理

3 幂级数

- 幂级数的敛散性, Abel 定理及其推论
- 收敛半径的 Cauchy 和 d'Alembert 计算公式
- 和函数的解析性

4 解析函数的 Taylor 展开

- Taylor 定理, 展开式的收敛半径, 初等单值和多值函数的 Taylor 展开式
- 解析开拓