

4. Verifica si los siguientes argumentos son correctos. Si el argumento no es correcto, de una interpretación que satisfaga las premisas, pero no la conclusión.

$$(a) p \rightarrow q, q \rightarrow p \wedge r, r \therefore p$$

Sea...

- 1)  $p \rightarrow q$
- 2)  $q \rightarrow p \wedge r$
- 3)  $r$

Por lo tanto,  $p$

RESPUESTA.-

Por favor exhibe explícitamente la interpretación que satisface las premisas pero no la conclusión. Es fácil donde cuenta con una tablita de verdad ya que sólo tienes 8 posibles interpretaciones

por (3)  $I(r) = 1$ ; por (2)  $I(q \rightarrow p \wedge r) = 1$  pero si  $I(q) = 0$  entonces  $I(p \wedge r) = 1/0$ . Y por (1) y (2) si  $I(q) = 0$  entonces  $I(p) = 0$  y de este modo  $I(p \rightarrow q) = 1$ . Por lo tanto el argumento no es correcto.

$$(b) \star m \wedge \neg b \rightarrow j, f \vee s \rightarrow m, b \rightarrow t, f \rightarrow \neg t, \neg j \therefore \neg f$$

Sea...

- 1)  $m \wedge \neg b \rightarrow j$
- 2)  $f \vee s \rightarrow m$
- 3)  $b \rightarrow t$
- 4)  $f \rightarrow \neg t$
- 5)  $\neg j$

Por lo tanto,  $\neg f$

RESPUESTA.-

por (5)  $I(\neg j) = 1$ . Así  $I(j) = 0$ ; por (1)  $I(m \wedge \neg b \rightarrow j) = 1$  pero como  $I(j) = 0$  entonces  $I(m \wedge \neg b) = 0$ . ✓

No puedes suponer esto. Lo que puedes suponer es que  $\Gamma \neq A$ . i.e.  $\Gamma \cup \{A\}$  es satisfiable y así tendrías por hipótesis que

Ahora, supongamos  $I(f) = 1$ , así por (4)  $I(\neg t) = 1$  y  $I(t) = 0$ ; como  $I(t) = 0$  entonces por (3),  $I(b) = 0$ , por lo que  $I(\neg b) = 1$ . De este modo por (1)  $I(m) = 0$  entonces  $I(f \vee s) = 0$  pero yo supuse que  $I(f) = 1$ . CONTRADICCIÓN, por lo tanto  $I(\neg f) = 1$

¿Que estás contradiciendo?

$$(c) p \wedge r \rightarrow s, q \rightarrow p, \neg r \rightarrow \neg t, q, \neg s \therefore \neg t \vee w$$

Sea...

- 1)  $p \wedge r \rightarrow s$
- 2)  $q \rightarrow p$
- 3)  $\neg r \rightarrow \neg t$
- 4)  $q$
- 5)  $\neg s$

Por lo tanto,  $\neg t \vee w$

RESPUESTA .-

Por (3)  $I(\neg t) = 1$ , como  $I(t) = 0$  entonces  $I(p) = 0$  por (1). Sup  $I(q) = 1$ . Así  $I(s) = 1$  por (2). Por (5) y por (2)  $I(\neg s) = 0$  entonces  $I(\neg p \wedge r) = 0$ , como  $I(\neg p) = 1$  entonces  $I(r) = 0$ . Como  $I(\neg p) = 1$  entonces  $I(\neg p \vee q) = 1$  y  $I(r) = 0$ , entonces  $I(\neg p \vee q \rightarrow r) = 0$ . CONTRADICCIÓN, por tanto, el argumento es correcto.

$$(j) \neg(l \rightarrow d), d \rightarrow \neg h \wedge \neg b \therefore d \rightarrow \neg l$$

Sea...

1)  $\neg(l \rightarrow d)$

2)  $d \rightarrow \neg h \wedge \neg b$

Por lo tanto,  $d \rightarrow \neg l$

RESPUESTA.-

Por (1)  $I(l \rightarrow d) = 0$ , es decir que  $I(l) = 1$  y  $I(d) = 0$  y como  $I(d) = 0$  entonces la premisa (2) se satisface, de este modo, el argumento es válido.

5. Traduce los siguientes argumentos lógicos indicando el significado de las variables proposicionales usadas. Además, decide usando interpretaciones si los argumentos son lógicamente correctos o no (puedes usar el método directo o el método refutacional):

(a) ★ Raúl está comiendo pastel. Si Raúl está comiendo pastel, no está jugando con su PS4. Si no está jugando con su PS4 entonces su padre no pagará el seguro de la casa. Por tanto el padre de Raúl no pagará el seguro de la casa.

ENUNCIADOS

$p$  = Raúl está comiendo pastel ✓

$q$  = Está jugando con su PS4 ✓

$r$  = Su papá pagará el seguro de la casa ✓

ARGUMENTOS

1)  $p$  ✓

2)  $p \rightarrow \neg q$  ✓

3)  $\neg q \rightarrow \neg r$  ✓

Por lo tanto,  $\neg r$  ✓

RESPUESTA .- por (1)  $I(p) = 1$ , por (2)  $I(p \rightarrow \neg q) = 1$  y por (1)  $I(p) = 1$  entonces  $I(\neg q) = 1$ , ✓  
por (3)  $I(\neg q \rightarrow \neg r) = 1$  pero  $I(\neg q) = 1$  entonces  $I(\neg r) = 1$ . Los argumentos eran correctos. ✓

¿Quién es  $\nu$ ?

$\neg p \rightarrow \neg(r \wedge s \wedge \neg t)$       ó

$(r \wedge s \wedge \neg t) \rightarrow p$

RESPUESTA.- Por (4)  $I(\neg u) = 1$  y  $I(u) = 0$ , por (3)  $I(\neg s) = 1$  y  $I(s) = 0$ ; por (2) como  $I(s) = 0$  entonces  $I(r \wedge s \wedge \neg t) = 0$  y  $I(\neg(r \wedge s \wedge \neg t)) = 1$ , así  $I(\neg q) = 1$  y  $I(q) = 0$ . Y por (1) como  $I(q) = 0$  entonces  $I(\neg p) = 0$ , por lo tanto  $p$ . El argumento es correcto.

- (d) Cuando el perro no ladra y el gallo canta, siempre bala la oveja. Sólo si canta la calandria, sucede que o ladra el perro o maúlla el gato. He visto que, o canta el gallo o canta la calandria, así que o bala la oveja o canta la calandria.

## ENUNCIADOS

$p$  = El perro ladra

$q$  = El gallo canta

$r$  = Bala la oveja

$s$  = Canta la calandria

$t$  = Maúlla el gato

## ARGUMENTOS

1)  $\neg p \wedge q \rightarrow r$  ✓

2)  $s \rightarrow p \vee t$  ✓

3)  $q \vee s$  ✓

Por lo tanto,  $r \vee s$  ✓

RESPUESTA.- Por contradicción

Sup que  $I(r \vee s) = 0$ , entonces  $I(r) = 0$  y  $I(s) = 0$ , por (3)  $I(q) = 1$ . Por (2) tenemos  $s \rightarrow p \vee t$ , por contrapositiva  $\neg(p \vee t) \rightarrow \neg s$ , y  $I(\neg s) = 1$ , entonces  $I(p \vee t) = 0$ , por (1) como  $I(\neg p) = 1$  y  $I(q) = 1$  entonces  $I(r) = 1$ . CONTRADICCIÓN. Los argumentos son correctos.

No puedes concluir así

Has aquí vas bien -

¿Por qué?