




USP

3



CONGRESSO
PAULISTA
DE CLÍNICOS
VETERINÁRIOS
DE PEQUENOS
ANIMAIS



BRAZILIAN JOURNAL OF
VETERINARY RESEARCH
AND ANIMAL SCIENCE

ISSN Impresso: 1413 - 9596
ISSN on-line: 1678-4456
V. 40, suplemento 2003

11%) e um condrossarcoma em articulação têmporo-mandibular (5,5%). A idade média dos animais acometidos foi de 11,8 anos, com idade máxima de 18 anos em um caso de adenocarcinoma e idade mínima de 7 anos em outro caso de adenocarcinoma. Os SRD foram os animais mais acometidos (13 casos, 72,22%), seguidos pelo Siamês (3 casos, 16,66%), o Persa e o Angorá (cada um responsável por 5,5% dos casos). Em todos os casos, os SRD foram os mais acometidos. 66,66% dos gatos eram machos e 33,3% eram fêmeas e, em cada tipo de neoplasia, individualmente, notou-se significativa ocorrência em machos. Neste estudo pudemos observar uma alta prevalência de neoformações na cavidade oral de animais sem raça definida, o que pode ser explicado pela maior quantidade destes animais em nosso país. A ocorrência elevada de CCE já era esperada, ainda que neste trabalho tenhamos observado uma taxa menor do que as relatadas em literatura estrangeira. O fibrossarcoma, segundo tumor maligno mais frequente entre os gatos, não foi detectado neste trabalho, sendo que sua posição foi ocupada pelo adenocarcinoma. Outra observação importante deve ser feita em relação à predisposição sexual. Neste estudo pudemos perceber uma ocorrência de tumores, benignos ou malignos, bastante alta em machos, o que pode sugerir uma predisposição sexual. A faixa de idade destes animais acometidos é bastante alta, não sendo encontrado nenhum caso em animais com menos de 7 anos de idade. Os animais brasileiros têm apresentado expectativa de vida cada vez mais alta o que, em última análise, pode estar predispondo-os a maior ocorrência de neoplasias, sejam elas benignas ou de caráter maligno.

77 - Mixossarcoma em cavidade abdominal em Boxer. Relato de caso

Maria, P.P.¹, Manzan, M. R.²

1- Docente da Pontifícia Universidade Católica, Campus de Poços de Caldas, Poços de Caldas-MG e Docente do Centro Regional de Ensino Veterinário de Espírito Santo do Pinhal, Espírito Santo do Pinhal-SP. Aluna do curso de pós graduação (nível doutorado) em Cirurgia Veterinária da Universidade Estadual Paulista, Campus de Jaboticabal, Jaboticabal-SP

2- Docente do Centro Regional de Ensino Veterinário de Espírito Santo do Pinhal, Espírito Santo do Pinhal -SP

O mixossarcoma é uma neoplasia rara observada em cães e gatos, originada de fibroblastos alterados que produzem quantidade excessiva de mucina. Os animais acometidos são geralmente adultos ou idosos e não há predisposição racial ou sexual. Microscopicamente o mixossarcoma é diferenciado do fibrossarcoma por apresentar uma abundante matriz mucinosa intercelular. O tumor apresenta característica infiltrativa com bordas pouco definidas. Os mixossarcomas variam desde massas sésseis ou pedunculadas pequenas a grandes, que incluem desde massas globulares duras, mosqueadas com hemorragias, até lesões papilares moles e translúcidas, de aspecto gelatinoso. Apesar de ser uma neoplasia maligna, o mixossarcoma apresenta um baixo grau de malignidade com raras ocorrências de metástase, no entanto, exhibe frequentemente recorrência após excisão cirúrgica. O tratamento de escolha é a exérese cirúrgica e não existem relatos de sucesso com radioterapia ou quimioterapia. Foi atendida uma cadela da raça boxer, intacta, com 3 anos de idade no Hospital Veterinário do Curso de Medicina Veterinária do Centro Regional de Ensino Universitário de Espírito Santo do Pinhal (CREUPI). A queixa principal da proprietária era um aumento de volume abdominal progressivo com evolução de 8 meses. Foram realizados exames radiográfico e ultrassonográfico com laudos de presença de massa de aproximadamente 25 cm de diâmetro em cavidade abdominal aparentemente sem relação a outros órgãos cavitários. Os valores do hemograma, uréia e alamina amino transferase encontravam-se dentro dos parâmetros normais. Optou-se pela laparotomia exploratória e durante a cirurgia foi encontrada a massa tumoral aderida ao mesentério. A massa foi retirada juntamente com 25 cm de alça intestinal devido a hipóxia tecidual, pois a vascularização da neoplasia era a mesma do intestino delgado. Foi realizada a entero-anastomose e omentopexia. O aspecto macroscópico era de uma estrutura com 25 cm de diâmetro localizada no mesentério de aspecto multilobulado,

coloração avermelhada com áreas claras alternando com áreas hemorrágicas. A consistência era macia e o tumor pesava 2,3 kg, ao corte houve exsudação de líquido vermelho claro e a massa apresentava um aspecto gelatinoso. O laudo histopatológico com coloração hematoxilina-eosina revelou células com formato predominantemente estrelado distribuídas em um abundante estroma mucinoso fracamente basofílico com pequena quantidade de fibras colágenas, diagnosticando o mixossarcoma. A cadela recuperou-se bem não apresentando nenhuma alteração durante o período pós operatório imediato e após 15 meses não havia ocorrido recidiva. O relato deste caso ocorreu devido a natureza rara da neoplasia, além de seu tamanho, o qual não causava nenhuma alteração no trânsito intestinal.

78 - Hemangiossarcoma cardíaco em cão. Relato de dois casos

Carvalho Filho, A.S.¹;
Aptekmann, K.P.²; Schwartz,
D.S.³; Calderón, C.¹; Amorim,
R.L.²; Rodrigues, M.M.P.²

1- Pós-graduando do Departamento de Clínica Veterinária da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Estadual Paulista, Campus de Botucatu, Botucatu-SP

2 - Residente do Departamento de Clínica Veterinária da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Estadual Paulista, Campus de Botucatu, Botucatu-SP

3 - Professora Assessora Doutora do Departamento de Clínica Veterinária da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Estadual Paulista, Campus de Botucatu, Botucatu-SP

O hemangiossarcoma é uma neoplasia maligna composta por células endoteliais que desenvolve-se mais frequentemente em cães do que em outras espécies. Estudos demonstram que é a neoplasia cardíaca mais comum e pode se desenvolver, mais comumente, em coração, baço, fígado, músculo, tecido subcutâneo, pele e ossos. Geralmente, os tumores cardíacos primários em cães envolvem o lado direito do coração, especialmente o átrio direito. Em 01/08/02 foi atendido um canino, Boxer, macho, com 10 anos de idade e queixa de três episódios de síncope no dia anterior a consulta. Ao exame clínico o animal apresentava apatia, prostração, anorexia, emagrecimento progressivo, emese, aumento de linfonodos submandibulares e poplíteos, hipotermia, bradicardia (30 bpm), sopro sistólico com grau III/VI em foco de válvula mitral. O eletrocardiograma indicou a presença de bradicardia, bloqueio-átrio ventricular completo com complexos de escape ventricular e períodos intermitentes de ritmo idioventricular acelerado. A radiografia torácica indicou a presença de massa em região de átrio direito com desvio dorsal de traquéia na posição látero-lateral. O hemograma apresentava anemia normocítica normocrômica, leucocitose com neutrofilia e desvio à esquerda, monocitose, trombocitopenia e o perfil bioquímico revelava discreto aumento da fosfatase alcalina. A hemogasometria indicou a presença de acidose metabólica compensada e hipercaliemia. Foi realizada fluidoterapia com glicose 5 % com correção do distúrbio ácido-básico e eletrolítico. A aplicação de atropina e aminofilina foram ineficazes na tentativa de aumentar da frequência cardíaca. O animal foi a óbito durante a introdução do marcapasso cardíaco externo. Na necrópsia o animal apresentava um tumor em base de coração direito que foi diagnosticado, posteriormente, como hemangiossarcoma por técnicas citológicas e de imunoistoquímicas para vimentina e fator VIII. A técnica imunoistoquímica também mostrou a presença de células neoplásicas infiltradas em miocárdio e tecido de condução que, provavelmente, estavam levando ao bloqueio átrio-ventricular completo. O segundo caso, atendido em 08/05/03, tratava-se de um canino, Pastor Alemão, macho, com 10 anos de idade. O animal apresentava histórico de cansaço, anorexia e dificuldade em se locomover por alteração na coluna. Ao exame clínico observou-se dispnéia moderada e abafamento dos sons cardíacos à auscultação. O hemograma revelou anemia normocítica normocrômica. A radiografia torácica evidenciou um aumento generalizado da silhueta cardíaca, com desvio dorsal da traquéia e padrão pulmonar alveolar em lobo diafragmático. O eletrocardiograma não evidenciou alterações. Foi realizado o exame ecocardiográfico que revelou efusão pericárdica com massa intrapericárdica e tamponamento cardíaco. Foi realizada pericardiocentese com retirada de 1,2 litros de líquido,

interferem na evolução do calo ósseo. Seis animais da espécie canina, de raças, idades e sexo variados, portadores de fraturas antigas foram selecionados do atendimento do HOVET UnifMU. As fraturas foram reduzidas cirurgicamente com fixadores trans-cutâneos e após primeiro controle radiográfico, às três semanas de evolução, em não havendo indícios satisfatórios de formação de calo ósseo os animais foram submetidos a tratamento com decanoato de nandrolona, na dose de 2 mg/kg pela via intramuscular num total de duas ou três aplicações intervaladas por 15 dias. Foram realizados exames radiográficos controle a cada 15 dias após as aplicações. Os exames evidenciaram intensa proliferação do calo ósseo, os implantes ósseos puderam ser removidos em média aos 15 dias após a segunda administração de decanoato de nandrolona. Não foram observados clinicamente quaisquer efeitos colaterais relacionados ao uso do decanoato de nandrolona nas doses e frequência relacionadas anteriormente. Há necessidade de maiores avaliações sobre a utilização e efeitos sistêmicos do decanoato de nandrolona na posologia sugerida, porém, pode-se concluir que seus efeitos estimuladores na consolidação óssea são muito benéficos nas fraturas de consolidação lenta ou que tendem à não união.

99 - Utilização de agulha hipodérmica 25x07 trans-articular para correção da luxação congênita do cotovelo em cães da raça Pinscher. Relato de 6 casos

Mana, P.P.¹; Comunian, C.C.²; Valim, A.L.O.²

1 - Docente da Pontifícia Universidade Católica, Campus Poços de Caldas, Poços de Caldas-MG e do Centro Regional de Ensino Veterinário de Espírito Santo do Pinhal, Espírito Santo do Pinhal-SP; Aluna do curso de pós graduação (nível doutorado) em cirurgia veterinária da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus de Jaboticabal, Jaboticabal-SP

2 - Clínica e Diagnóstico Veterinário CENTRE, São João da Boa Vista-SP

A luxação congênita do cotovelo é ocasionalmente observada em raças de pequeno porte (Terrier, Lhasa Apso, Pug, Pinscher, etc.), manifestando-se ao nascimento ou até os 3 a 4 meses de idade, com a porção proximal da ulna tipicamente rotacionada lateralmente de 45 a 90 graus. Os sintomas incluem variados graus de claudicação e deformidade óssea. Associado com a rotação lateral da ulna, existe um deslocamento em relação ao sulco troclear, processo ancôneo e úmero. Este processo acarreta desvio lateral do antebraço, rotação lateral dos dígitos e redução no movimento de extensão do cotovelo. A patogênese desta condição é desconhecida, uma das teorias relatam a fracasso do desenvolvimento (aplasia) dos ligamentos colateral medial e anular e a hipertrofia do ligamento colateral lateral o qual permite a rotação lateral da ulna. Em geral, o tratamento deve ser instituído o quanto antes para se evitar os problemas com as anormalidades do crescimento. Se ele for retardado até a maturidade do animal, a severa incongruência articular levará às alterações degenerativas secundárias com pobre retorno da função. Os métodos de redução cirúrgica incluem o uso de fios temporários de Kirschner dirigidos do olécrano para o úmero, osteotomia ulnar corretiva com posterior estabilização da articulação úmero-rádio-ulnar e uso de pino trans-articular de Kirschner. Este trabalho tem o objetivo de relatar o tratamento da luxação congênita do cotovelo (4 casos bilaterais) em 6 cães da raça Pinscher, com idade variando entre 30 e 40 dias. O exame físico revelou encurtamento tendíneo, rotação lateral dos membros torácicos e discreta atrofia muscular. O exame radiográfico confirmou a suspeita clínica de luxação congênita do cotovelo. O tratamento cirúrgico foi recomendado para todos os animais. Realizou-se acesso caudo-lateral e o procedimento cirúrgico consistiu na artrotomia úmero-rádio-ulnar com desmotomia lateral e capsulorrafia medial. Após redução da luxação as articulações foram estabilizadas por meio da inserção de agulhas hipodérmicas (25x7) transarticulares com posterior remoção dos canhões e discreta dobra na ponta. Foram aplicadas bandagens rígidas durante 14 dias e as agulhas foram retiradas após 21 dias. Os pacientes demonstraram apoio no pós cirúrgico imediato sugerindo a eficiência da estabilização articular com agulhas sem a necessidade do emprego de outros materiais ou técnicas cirúrgicas como a osteotomia ulnar.