




4

CONGRESSO
PAULISTA
DE CLÍNICOS
VETERINÁRIOS
DE PEQUENOS
ANIMAIS

29 DE SETEMBRO A 1º DE OUTUBRO DE 2004
HOTEL TRANSAMÉRICA • SÃO PAULO - SP • BRASIL

ANAIAS



Tumor venéreo transmissível (TVT) extragenital com envolvimento de tecido subcutâneo e baço em um cão

Giordano, P. P.,
Manzan, R. M.,
Duarte, R.,
Garros, R. M.,
Geraldo Jr, C. A.

1- Pontifícia Universidade Católica, Campus Poços de Caldas - MG, CREUPI, Espírito Santo do Pinhal - SP, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal - SP
2-CREUPI, Espírito Santo do Pinhal - SP

O tumor venéreo transmissível (TVT) é uma neoplasia de ocorrência natural em caninos, transmitida por contato sexual e ocorre na mucosa dos órgãos genitais, pênis e prepúcio dos machos e na vulva e vagina das fêmeas. É caracterizado por um baixo índice de metástases e a maioria é vista nos linfonodos regionais, inguinais e ilíacos. Apesar de pouco comum, o TVT tem sido descrito em várias localizações extragenitais, tais como ânus, tecidos cutâneo e subcutâneo, baço, fígado, globo ocular, cérebro entre outros. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de TVT extragenital com envolvimento de tecido subcutâneo e baço em um cão. Foi atendido no hospital veterinário do CREUPI, um cão, SRD, com 8 anos de idade que apresentava aumento de volume abdominal com consistência firme e neoformação lateral ao prepúcio. Observou-se formação nodular, localizada lateralmente ao pênis, com aproximadamente 5 cm de diâmetro sendo realizada punção aspirativa por agulha fina com diagnóstico de TVT. O exame radiográfico foi realizado em cavidade abdominal com laudo inconclusivo. Procedeu-se com ultra-som abdominal que revelou massa em cavidade de origem indeterminada. Foi realizada laparotomia exploratória seguida de esplenectomia e exérese do TVT cutâneo. O baço encontrava-se acentuadamente aumentado de volume, apresentando duas massas com aproximadamente 17 cm de diâmetro, coloração esbranquiçada e ao corte apresentava cavitações repletas de líquido avermelhado. Procedeu-se a punção aspirativa por agulha fina no tumor esplênico e fragmentos dos tumores do tecido subcutâneo e baço foram colocados em formol e remetidos para análise histopatológica. Ao exame citológico constatou-se um esfregaço com celularidade alta, constituído por células redondas, núcleos localizados centralmente, volumosos, cromatina reticulada, nucléolos evidentes, citoplasma em quantidade moderada e apresentando vacuolizações, diagnosticando assim tumor venéreo transmissível. A análise histopatológica confirmou o diagnóstico. O paciente recuperou-se bem, não apresentando recidiva das neoplasias.