

ISSN-0102-0935 (versão impressa)

ISSN-1678-4162 (versão on line)

ARQUIVO BRASILEIRO DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA

Brazilian Journal of Veterinary
and Animal Sciences

v.58, supl. 2, p.1-113, 2006
www.journal.vet.ufmg.br

Herniorrafia perineal em cães: estudo retrospectivo

[Herniorrhaphy in dogs: retrospective study]

P.P. Giordano^{1*}, F.B.J. Brasil²

¹Pontifícia Universidade Católica, Poços de Caldas, MG, ²UNIPINHAL, Espírito Santo do Pinhal, SP

*popak@uol.com.br

A hérnia perineal é observada em cães machos, inteiros, de várias idades. Resulta do enfraquecimento e separação dos músculos do diafragma pélvico com deslocamento dos órgãos para a região perineal. Várias técnicas têm sido descritas para a reconstrução do diafragma pélvico, como a herniorrafia tradicional (HT), a transposição do músculo obturador interno (TMO) e a utilização do peritônio bovino conservado em glicerina (MB). O objetivo deste estudo foi o de comparar, retrospectivamente, três técnicas de reparação da hérnia perineal, com suas evoluções e complicações. Foram estudados 35 cães machos, portadores de hérnia perineal, operados no Hospital Veterinário da UNIPINHAL. A maioria dos animais era SRD, com pesos variando de 4 a 51kg e idade média de 11,1 anos. Foi realizada a TMO em 21 pacientes, a HT em 10 e a MB em quatro cães, além da orquiectomia em todos eles. No pós-operatório foi prescrito, além dos cuidados básicos, lactulona (21 dias) para amolecer as fezes. Nas hérnias bilaterais (três), o intervalo entre as cirurgias foi de seis semanas. Em um único cão, que apresentou divertículo retal, foi realizada a saculectomia concomitante à herniorrafia. Em um intervalo médio de 41 dias, foram observadas cinco recidivas, quatro com HT e uma com MB. Todas os cães foram reoperados com a técnica da TMO e em um deles essa técnica foi associada à MB. Baseando-se nesses dados pode-se concluir que a TMO mostrou-se superior à HT e à MB, por não apresentar recidivas.

Palavras-chave: cão, herniorrafia, perineal.

Key words: dog, herniorrhaphy, perineal.

Hipoplasia renal unilateral associada à ectopia ureteral em cão

[Unilateral renal hypoplasia associated with ectopic ureter in dog]

J.G. Quitzan¹, S.C. Rahal^{1*}, P.R. Kawano¹, F.C. Santos¹, R.L. Amorim¹

FMVZ – UNESP, Botucatu, SP

*sheilacr@fmvz.unesp.br

Cães da raça Poodle estão entre os mais acometidos pela ectopia ureteral, porém não são os mais susceptíveis à ocorrência de hipoplasia renal. A presença conjunta dessas anormalidades é considerada rara. Relata-se o caso de uma cadela, raça Poodle, três anos de idade, com histórico de incontinência urinária, presente desde o nascimento, tratada periodicamente com sulfametoxazol e trimetoprima. Ao exame físico observou-se região perivulvar eritematosa e úmida. No hemograma constatou-se leucocitose com neutrofilia e a urinálise revelou presença de inúmeros leucócitos, bactérias, sangue oculto e células vesicais. As dosagens séricas de uréia e creatinina estavam normais. A urografia excretora sugeriu ectopia ureteral, associada à não evidência do rim esquerdo. Pela cistoscopia rígida o ureter direito desembocava na uretra, próximo ao colo vesical, e apresentava-se dilatado. Não foi visualizado o orifício ureteral distal esquerdo. O animal foi submetido à neo-ureterostomia e obstrução do segmento ureteral submucoso distal por meio de ligadura com fio inabsorvível. Durante a laparotomia exploradora, pode-se observar estrutura atrofiada na região anatômica do rim esquerdo, que foi excisada. O exame histológico revelou diferenciação assincrônica dos néfrons e persistência dos ductos metanéfricos, compatível com displasia renal. A incontinência urinária cessou a partir do 30º dia do pós-operatório, e assim prosseguiu até a última avaliação, seis meses após a cirurgia. Além de restabelecer a continência, o adequado fluxo de urina para a bexiga, obtido após correção da ectopia ureteral, evitou a ocorrência de pielonefrite, hidronefrose e o comprometimento da função renal, conseqüências consideradas graves, principalmente por se tratar de paciente com rim único.

Palavras-chave: cão, hipoplasia renal, ureter ectópico.

Key words: dog, renal hypoplasia, ectopic ureter.

Osteossíntese da tíbia com haste intramedular bloqueada em Grou Paraíso (*Grus sp*): relato de caso

[*Osteosynthesis of tibia with interlocking nail in paradise crane (Grus sp) - case report*]

P.P. Giordano^{1*}, J.F.A. Mattos²

¹PUC Poços de Caldas, MG. UNIPINHAL – Espírito Santo do Pinhal, SP; ²UNIPINHAL – Espírito Santo do Pinhal, SP

*popak@uol.com.br

Cirurgias ortopédicas em aves são consideradas desafiadoras aos veterinários devido à pouca cobertura de tecidos moles e à presença de cortical delgada. Pinos intramedulares, comumente utilizados nas aves, quando aplicados nos ossos longos, não resistem às forças rotacionais e compressivas, enquanto que as hastes intramedulares bloqueadas (HIB) previnem os movimentos de rotação e compressão axial. Este trabalho relata o uso da HIB na fratura da tíbia de um grou paraíso (*Grus sp*), adulto, macho, atendido no HV da UNIPINHAL. A ave, após acidente há uma semana, apresentava-se com impotência funcional do MPD. Ao exame radiográfico constatou-se fratura transversa no terço médio da tíbia. A indução foi feita com a associação de tiletamina e zolazepam e a manutenção anestésica com isoflurano, fornecido por sonda endotraqueal, diluído em oxigênio. Foi realizada osteossíntese com HIB de 6mm de diâmetro por 195mm de comprimento, com quatro parafusos corticais de 2,7mm. O foco da fratura foi aberto o suficiente para a passagem do implante e redução dos fragmentos, e os bloqueios distais e proximais foram realizados com o auxílio da guia de perfuração. O exame radiográfico PO revelou alinhamento do eixo ósseo e presença da HIB com os parafusos corretamente posicionados. A ave recuperou-se bem e iniciou o apoio do membro operado no mesmo dia. O relato do presente caso deve-se ao fato dessa cirurgia ser pioneira na medicina veterinária mundial, não havendo citações anteriores de uso da HIB como método de tratamento de fratura tibial nessa espécie de grou.

Palavras-chave: ave, osteossíntese, haste bloqueada.

Keywords: bird, osteosynthesis, blocked scapula.

Osteossíntese do úmero de cão utilizando fixador circular híbrido sfec-lotec

[*Ulnar fracture repair in dog with hybrid circular fixator sfec-lotec*]

C.R.A. Ferrigno¹, L. Romano²

¹FMVZ-USP; ²Aluno de pós-graduação - FMVZ-USP, SP

*lromano@usp.br

Os fixadores circulares híbridos são utilizados em fraturas do fêmur e úmero quando a montagem de aparelhos circulares convencionais não é possível, devido à proximidade da parede torácica e do abdômen. Relata-se o caso de uma cadela, SRD, de 13 anos de idade e 37 quilos de peso, vítima de trauma por projétil balístico, com fratura completa, múltipla no terço distal do úmero, com esquirolas adjacentes. Para o tratamento, utilizou-se a composição híbrida do sistema de fixação externa circular, idealizado pelo Laboratório de Ortopedia e Traumatologia Comparada da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (SFEC-LOTIC), com a montagem de uma anel em ferradura, com diâmetro interno de 118mm, fixo por fios de Krishiner de um milímetro de diâmetro, tensionados na região distal do úmero, e uma barra de fixador externo linear lateral, fixa com três pinos rosqueados, de 4,5 milímetros, presos ao anel. Ao exame radiográfico pós-operatório imediato notou-se adequada redução da fratura. O animal apoiou adequadamente o membro sete dias após a osteossíntese. Observou-se secreção abundante pelos pinos distais inseridos no anel, que cessou após administração de cefalexina na dose de 30mg/kg, a cada oito horas, por 10 dias. A consolidação iniciou-se com a formação de ponte óssea e aumento da radiopacidade no foco da fratura, com 21 dias de pós-operatório. Após 60 dias, obteve-se consolidação completa. O fixador circular híbrido mostrou-se adequado, com retorno precoce do membro à sua função e consolidação total no tempo desejado.

Palavras-chave: úmero, fixador circular, fratura

Key words: dog, humerus, circular fixator, fracture

Tratamento de fratura cominutiva em úmero de cão utilizando fixador externo sfec-lote

[Complex dog umeral fracture treatment with external fixator type sfec-lot]

L. Romano^{1*}, C.R.A. Ferrigno²

¹Aluno de pós-graduação – FMVZ - USP, São Paulo, SP; ² USP, São Paulo, SP

* lromano@usp.br

Relata-se o caso de um cão, SRD, nove anos de idade, vítima de trauma por projétil balístico na região articular distal de úmero, o comprometimento da fratura cominutiva compreendia tanto a articulação úmero-radio-ulnar como a diáfise, com grande quantidade de esquirolas. Optou-se pelo tratamento com fixador circular do tipo SFEC-LOT, com a montagem de um semi anel, um 2/3 de anel e um anel em ferradura, e pinos olivados, para aproximação dos côndilos umerais para a fixação da fratura do úmero e com o suporte de um anel completo, ligado por dobradiça, no radio. Todos os anéis utilizados tinham de 145mm de diâmetro. Os exames radiográficos em posições ortogonais revelaram eixo ósseo mantido, aproximação dos fragmentos e posicionamento adequado da superfície articular. O animal manteve apoio esporádico durante a primeira semana do pós-operatório, com retorno adequado da função do membro após 10 dias. Aos 30 dias, foi retirado o anel preso ao radio, o que permitiu a movimentação da articulação do cotovelo, pois havia ocorrido a consolidação dos côndilos. Após 70 dias do pós-operatório, o apoio foi normal, entretanto com formação pobre de calo ósseo. Nesse momento, foi realizado enxertia com proteína morfogenética óssea. Observaram-se consolidação secundária e aumento da radiopacidade no foco da fratura com 120 dias de pós-operatório e, após 150 dias, obteve-se consolidação completa, quando foi retirado o fixador. O uso de fixador circular para correção de fraturas cominutivas com envolvimento articular de úmero distal foi adequado, com retorno precoce do membro à sua função.

Palavras-chave: úmero, fixador circular, fratura.

Key words: umeral, circular fixation, fracture.

Trepanação nasal e criocirurgia como métodos de tratamento de adenocarcinoma nasal: relato de dois casos

[Resection of the nasal planum and cryosurgery for treatment of nasal adenocarcinoma: two cases report]

P.P. Giordano *, L.H.A. Machado, A.S. Peixoto, F. Elston, L.B. Elston

PUC-MG e Unipinhal-SP

popak@uol.com.br

Tumores intranasais representam aproximadamente 1% de todas as neoplasias que ocorrem nos cães. Devido à presença de diferentes tipos de tecidos nas paredes da cavidade nasal e seios paranasais, existe a possibilidade de ocorrer vários tipos de neoplasias. Nestes locais, os carcinomas representam cerca de 30% dos casos. Acometem principalmente cães idosos, com histórico de secreção nasal e dispnéia. O diagnóstico definitivo de neoplasia na cavidade nasal é obtido mediante exame histológico, embora o exame radiográfico e citológico também sejam importantes. O tratamento é baseado principalmente na radioterapia, que em diversos estudos promoveu o aumento na sobrevivência dos animais. Foram atendidos dois cães no Hospital Veterinária da PUC - Campus Poços de Caldas, SRD, adultos, machos com histórico de secreção nasal mucopurulenta, dificuldade respiratória e emagrecimento progressivo. Ambos apresentavam obstrução da cavidade nasal esquerda. Ao exame radiográfico, observou-se pequena assimetria entre os lados direito e esquerdo da cavidade nasal, com aumento da radiopacidade, sem lise óssea. O exame citológico revelou adenocarcinoma nos dois cães. Foi realizada a trepanação nasal, e por curetagem, retiraram-se as conchas dorsal e ventral afetadas, bem como todo o tecido anormal presente. Após a curetagem, foi feita a criocirurgia no local pelo método de derramamento direto do criógeno. Os pacientes apresentaram melhora do quadro clínico e ganho de peso. Este tratamento, apesar de não ser citado na literatura, resultou na melhora do quadro, com aumento da qualidade de vida, visto que a radioterapia não era um método disponível.

Palavras-chave: cão, nasal, adenocarcinoma.

Keywords: dog, nasal, adenocarcinoma.