

Area: **BUIATRIA**

APLICAÇÃO DE FIXADOR EXTERNO COM METIL-METACRILATO PARA TRATAMENTO DE FRATURAS DE METACARPOS EM BEZERROS. RELATO DE TRÊS CASOS.

Patricia Popak (PUC - MG Poços de Caldas); **Maria Célia Ramos Bellenzani** (PUC - MG Poços de Caldas); **João Francisco de Azevedo Mattos** (UNIPINHAL); **Sarah Guarnieri Dante** (UNIPINHAL); **Juliana Guarnieri Dante** (UNIPINHAL); **Natália Pereira Junqueira** (PUC - MG Poços de Caldas)

Resumo

As fraturas metacarpianas são comuns em bovinos de todas as idades. Vários métodos de imobilização foram descritos e a escolha em cada caso dependerá da configuração da fratura, do tipo de lesão em tecidos moles e da presença ou não de infecção. Dentre as técnicas utilizadas destacam-se o uso do penso gessado, a transfixação de pinos transcorticais com aplicação de gesso, o aparelho de Kirschner-Ehmer, o emprego de placas e parafusos com pinos intramedulares e fixadores externos. Foram atendidos três bezerros nelores machos, com 10, 21 e 25 dias de idade, pesando entre 30 e 50 kg, todos com fraturas nos metacarpos. O bezerro com 10 dias de idade apresentava fratura exposta há uma semana. Aos exames radiográficos, foram constatadas em dois animais fraturas transversas em terço médio e no último, fratura exposta oblíqua também em terço médio. Todos os bezerros foram submetido à anestesia geral inalatória com isoflurano, para a realização da osteossíntese com uso de fixador externo (FE) e metil-metacrilato, empregando-se seis pinos de Steinman de 5mm. No bezerro com fratura exposta, havia presença de grande quantidade de tecido necrótico no foco, o qual foi removido por curetagem e posterior lavagem com solução a 1% de iodo povidine. Foram prescritos curativos diários (iodo povidine e solução fisiológica), antibioticoterapia (cefalexina), repouso e antiinflamatório não esteroidal (flunixin meglumine) a todos eles. O FE foi removido após consolidação óssea confirmada radiograficamente em dois animais, o que ocorreu em dois meses e meio de pós-operatório (PO). O animal com fratura exposta apresentou deiscência da ferida que foi tratada com furacin e açúcar e apesar de ser o bezerro mais novo, o FE só foi retirado com três meses de PO e mesmo assim era visível a linha de fratura. A opção pela retirada do aparelho foi devido ao crescimento do animal, pois os pinos começaram a ficar muito próximos da pele dificultando a limpeza e lesionando o local. Este bezerro recebeu uma tala de PVC por mais 21 dias, período que radiograficamente foi confirmada a consolidação óssea. Os animais recuperaram-se totalmente sem sequelas. O FE mostrou ser um método adequado de tratamento, permitindo a consolidação óssea com baixo custo, o que é de suma importância nos animais de produção. Além disto, devido ao rápido crescimento dos bezerros, deve ser sempre avaliado o tamanho do aparelho para que as barras conectoras não lesionem a pele do animal.

Palavras-chave: fratura, metacarpo, bovino

Area: **CIRURGIA DE TECIDOS MOLES**

ESTUDO EXPERIMENTAL COMPARATIVO DA OCORRÊNCIA DE ADERÊNCIAS EM ENTERORRAFIAS NO JEJUNO DE CÃES, COM E SEM RECOBRIMENTO POR PERICÁRDIO EQUINO PRESERVADO EM GLICERINA

Patrícia Popak (PUC - MG Poços de Caldas); **Maria Célia Ramos Bellenzani** (Puc - MG Poços de Caldas); **Natália Pereira Junqueira** (PUC - MG Poços de Caldas); **Debora Caroline Rivera de Moraes** (PUC - MG Poços de Caldas); **Leticia Aparecida Duart Bastos** (PUC - MG Poços de Caldas); **Lilian Barreto Elston** (PUC - MG Poços de Caldas); **Marcelo Landin Brisola** (PUC - MG Poços de Caldas)

Resumo

Doenças abdominais são comuns na espécie canina e muitas vezes requerem correção cirúrgica. Uma das principais complicações das cirurgias intestinais é a formação de aderências, que podem acarretar novas obstruções, compressões e novos procedimentos cirúrgicos. Na tentativa de minimizar as aderências pós operatórias, foi utilizado o pericárdio de equino preservado em glicerina no recobrimento de enterorrafias no jejuno de 18 cães. Em cada animal foram realizadas duas enterorrafias eqüidistantes 20 cm uma da outra, a proximal foi a controle e a membrana foi aplicada recobrindo a distal. Esses animais foram submetidos à nova celiotomia 10 dias após o primeiro procedimento para avaliação macroscópica das aderências, que foram classificadas em graus (0, sem aderência até 4, aderência fibrosa com envolvimento de outros órgãos) e para coleta de material para exame histopatológico. Os resultados foram submetidos à análise estatística pelo teste não paramétrico de Wilcoxon. Macroscopicamente foi observado em todos os cães, aderência mais intensa e evidente sobre a incisão coberta pelo pericárdio. O grau médio da aderência no grupo controle foi 2,33 e no grupo do pericárdio foi 3,67. Microscopicamente, em 14 dos 18 cães foi observado nos segmentos com pericárdio maior quantidade de tecido de granulação com abundante neovascularização e intensa infiltração neutrofílica. No grupo pericárdio ocorreu maior reparação por granulação e presença de aderência a outros tecidos adjacentes, quando comparado à enterorrafia de controle do mesmo animal. Estatisticamente os tratamentos diferem ao nível de 1% de significância. Assim, concluímos que em enterorrafias o uso do pericárdio equino não só, não foi capaz de prevenir ou minimizar aderências, como aumentou a incidência de formação destas.

Palavras-chave: Aderência, Enterorrafia, cães

Area: **ANIMAIS SELVAGENS**

CASUISTICA DOS ANIMAIS SELVAGENS ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA PUC - POÇOS DE CALDAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2006 A JULHO DE 2008

Patricia Popak (PUC - MG Poços de Caldas); **Alexandre Paulo Resende Netto Armando** (Médico veterinário autônomo); **Ana Paula Franqueira Castello** (PUC - MG Poços de Caldas)

Resumo

A frequência do atendimento de animais selvagens nos consultórios, clínicas e hospitais veterinários vem aumentando nos últimos anos, tanto pelos animais provenientes de criatórios autorizados pelo Ibama, como devido à quantidade de pessoas que compram ilegalmente animais selvagens da fauna brasileira. Neste último caso, os animais sofrem devido aos cuidados inadequados tanto de manejo, como principalmente os nutricionais pela falta de informação a respeito das necessidades das espécies em questão. Nos últimos dois anos foram atendidos 42 animais selvagens no hospital veterinário da PUC de Poços de Caldas, entre aves, répteis e mamíferos. A classe das aves foi o grupo mais representativo com 78% dos atendimentos (32 aves), seguido pela classe dos mamíferos 14,5% (6 mamíferos) e por fim os répteis 7,5% (4 répteis). Das 32 aves atendidas entre as variadas espécies, o sistema locomotor representou 78% dos casos e os procedimentos cirúrgicos somaram 40% dos tratamentos. Nas osteossínteses, o pino intramedular (associado ou não às cerclagens com fios de aço) foi o implante mais utilizado, seguido da haste intramedular bloqueada. O tratamento conservador das fraturas foi realizado por meio das imobilizações com talas. Nas aves, os atendimentos de tecidos moles representaram 22% dos casos, incluindo a realização de pró-ventriculotomia para retirada de corpo estranho perfurante. Na classe dos mamíferos, a situação se inverteu e o sistema locomotor representou somente 34% dos atendimentos, com a realização de duas osteossínteses com haste bloqueada em dois lobos guarás. As cirurgias de tecidos moles representaram 66% dos atendimentos nos mamíferos, incluindo a realização de endoscopia diagnóstica em um leão. Por final, na classe dos répteis, com somente 4 casos, foi realizado um procedimento cirúrgico (25%) de correção de fratura de casco de tartaruga com polimetil-metacrilato, após incidente do réptil com um cão. O restante dos atendimentos (75%) foi baseado na correção do manejo e troca da dieta dos animais. Este levantamento foi realizado somente nos últimos dois anos e existe a tendência de crescimento da atuação do médico veterinário nesta área, que é insuficiente ou muitas vezes ausente na grade curricular dos cursos do Brasil.

Palavras-chave: fraturas, aves, osteossíntese