


2015 P1 Q4 (1) $g(t)$




$$\begin{aligned}\tilde{g}(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} g(t) e^{-i\omega t} dt = \\ &= \int_{-a}^a b e^{-i\omega t} dt = b \frac{i}{\omega} \left[e^{-i\omega t} \right]_{-a}^a = \\ &= b \frac{i}{\omega} \left[e^{-i\omega a} - e^{i\omega a} \right] = \\ &= \frac{b}{\omega} 2 \sin(a\omega)\end{aligned}$$

(a)

FOR $a(t)$: $b=1$
 $a=1$

$$\tilde{a}(\omega) = \frac{2}{\omega} \sin(\omega)$$

(b) $\tilde{f}(\omega) = \tilde{h}(\omega) \cdot \tilde{h}(\omega)$



$$f(t) = h(t) * h(t)$$

FOR $h(t)$: $b=1$
 $a=\frac{1}{2}$

$$\begin{aligned}\tilde{h}(\omega) &= \frac{1}{\omega} 2 \sin\left(\frac{\omega}{2}\right) \\ \tilde{f}(\omega) &= \frac{4}{\omega^2} \sin^2\left(\frac{\omega}{2}\right)\end{aligned}$$

$$\tilde{b}(\omega) = \tilde{a}(\omega) \cdot \tilde{f}(\omega)$$

$$= \frac{2}{\omega} \sin(\omega) \frac{4}{\omega^2} \sin^2\left(\frac{\omega}{2}\right) = \frac{8}{\omega^3} \sin(\omega) \sin^2\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

(c) $\tilde{r}(\omega) = \tilde{b}(\omega) + \alpha \widetilde{b(t-\tau)}$

FROM LECTURE NOTES: $g(x) = f(x-\alpha) \iff \tilde{g}(\xi) = e^{-i\xi\alpha} \tilde{f}(\xi)$

$$\widetilde{b(t-\tau)} = e^{-i\omega\tau} \tilde{b}(\omega)$$

$$\tilde{r}(\omega) = \frac{8}{\omega^3} \sin(\omega) \sin^2\left(\frac{\omega}{2}\right) + \alpha e^{-i\omega\tau} \frac{8}{\omega^3} \sin(\omega) \sin^2\left(\frac{\omega}{2}\right) =$$

$$= \left(1 + \alpha e^{-i\omega\tau}\right) \frac{8}{\omega^3} \sin(\omega) \sin^2\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

2015P1Q4(II)

$$(d) \Delta(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{\Delta}(\omega) e^{i\omega t} d\omega =$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} 2(1 + \epsilon \omega^2) e^{-\frac{\omega^2}{4}} e^{i\omega t} d\omega =$$

$$\downarrow \quad z = \frac{\omega}{2} + it \quad \longrightarrow \quad \frac{dz}{d\omega} = \frac{1}{2}$$

$$\begin{cases} 2(z + it) = \omega \\ 4(z + it)^2 = \omega^2 \end{cases}$$

$$z^2 = \frac{\omega^2}{4} - i\omega t - t^2$$

$$-z^2 = -\frac{\omega^2}{4} + i\omega t + t^2$$

$$d\omega = 2dz$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} 2(1 + \epsilon 4(z + it)^2) e^{-z^2} e^{-t^2} z dz =$$

$$= \frac{2}{\pi} e^{-t^2} \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{(1 + \epsilon 4z^2 - \epsilon 4t^2)}_{\text{EVEN}} + \underbrace{\epsilon 8zit}_{\text{ODD}} \underbrace{e^{-z^2}}_{\text{EVEN}} dz =$$

$$= \frac{2}{\pi} e^{-t^2} \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2} dz + \int_{-\infty}^{\infty} \epsilon 4z^2 e^{-z^2} dz - \epsilon 4t^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2} dz \right) =$$

$$= \frac{2}{\pi} e^{-t^2} \left((1 - 4\epsilon t^2) \sqrt{\pi} + \int_{-\infty}^{\infty} \epsilon 4z^2 e^{-z^2} dz \right) =$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} z^2 e^{-z^2} dz = \int_{-\infty}^{\infty} z \cdot z e^{-z^2} dz =$$

$$= \underbrace{\left[-\frac{1}{2} e^{-z^2} z \right]_{-\infty}^{\infty}}_{\rightarrow 0} - \int_{-\infty}^{\infty} -\frac{1}{2} e^{-z^2} dz = \frac{1}{2} \sqrt{\pi}$$

$$= \frac{2}{\pi} e^{-t^2} \left((1 - 4\epsilon t^2) \sqrt{\pi} + \epsilon 4 \frac{1}{2} \sqrt{\pi} \right) =$$

$$= \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-t^2} (1 - 4\epsilon t^2 + 2\epsilon)$$