		rax	rdx
and	rax, rdx	(13) 1101	(5) 0101
sub	rax, rdx	0101 − 0101 = 0	
and	rax, rdx	0 & 0 = 0	
dec	rax →	1111	
and	rax, rdx	0101 & 0101 (5)	

		rax	rdx
and	rax, rdx	(3) 0011	1100 (12)
sub	rax, rdx	0000 − 1100 = 0100	
and	rax, rdx	0100 & 1100 = 0100	
dec	rax →	0100 − 1 = 0011	
and	rax, rdx	0011 & 1100 = 0000 (0)	

the same ~~→ rax~~

ie sub A, B
and A, B
dec A
and A, B

} does nothing!

$rax_f = (((rax_0 \wedge rdx_0) - rdx_0) - 1) \wedge rdx_0$

ie $rax_f = rax_0 \iff \{ rax_0 = 16^k \in \mathbb{N} \wedge rdx_0 \neq 16^k \in \mathbb{N} \}$

ie no change (unless overflow)

```
and     rax, rdx    rax = rax0 ∧ rdx0
```

rax ≤ rdx ??

```
sub     rax, rdx    rax = (rax0 ∧ rdx0) − rdx0
and     rax, rdx
```

$rax = (((rax_0 \wedge rdx_0) - rdx_0) \wedge rdx_0) - 1$

```
dec     rax
and     rax, rdx
```

$rax = (((rax_0 \wedge rdx_0) - rdx_0) - 1) \wedge rdx_0$

empirical tests

$rax_0, rdx_0 \longrightarrow rax_f, rdx_f$

5,5 → 5,5
4,5 → 4,5
64,5 → 0,5
64,63 → 0,63
48,63 → 48,63
0x80,0x80 → 0x80,0x80
0x80,0x7f → 0, 0x7f

} ie same UNLESS $\{ rax = 16^k \in \mathbb{N} \wedge rdx \neq 16^k \in \mathbb{N} \}$ ⇓ rax → 0, rdx stays same