
a
single splicing view
GEX
median of 8 splicing views
LGG (378; 25 sites)
LGG_IDH (507; 26 sites)
ESCA (161; 18 sites)
BRCA_ER (1025; 39 sites)
BRCA_PAM50 (1073; 40 sites)
BRCA (952; 39 sites)
UCEC_TCGA (169; 28 sites)
STAD (227; 20 sites)
PCPG_mRNA (173; 17 sites)
PCPG (178; 18 sites)
MESO (76; 13 sites)
UCEC (162; 29 sites)
COAD_TCGA (235; 25 sites)
THYM (108; 18 sites)
PRAD_ETS (303; 26 sites)
STAD_TCGA (320; 21 sites)
TGCT (114; 14 sites)
HNSC_mRNA (278; 13 sites)
THCA (486; 22 sites)
CESC (285; 30 sites)
HNSC_HPV (112; 17 sites)
−0.025 0.000 0.025 0.050 0.075 0.100 0.125 0.150
loss of balanced accuracy when sites are held out
b
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.02
loss of balanced accuracy
HNSC_HPV
CESC
THCA
HNSC_mRNA
0.2
0.4
0.6
0.8
site–class association (Cramér's V)