

Identificación **Fecha**

OBJETIVO

- ☐ Normal, aparecen movimientos ocasionales de inquietud de las extremidades.
- ☐ Aparición de movimientos de inquietud característicos (movimientos como arrastrar los pies, pisotear repetidamente, o balancear una pierna estando sentado, y/o balancearse cambiando el apoyo de un pie a otro o caminar sobre el mismo sitio sin desplazarse mientras permanece de pie), pero estos movimientos están presentes menos de la mitad del tiempo de observación.
- ☐ Aparecen los mismos fenómenos descritos en el punto anterior, pero están presentes durante al menos la mitad del tiempo de observación.
- ☐ El paciente está constantemente ocupado en los movimientos de inquietud característicos, y/o es incapaz de permanecer sentado o de pie sin andar o marcar el paso durante el tiempo de observación.

SUBJETIVO

Conciencia de inquietud

- ☐ Ausencia de inquietud interior.
- ☐ Sensación de inquietud interior sin poder especificarla.
- ☐ El paciente es consciente de la incapacidad de mantener las piernas quietas, o de un deseo de mover las piernas y/o se queja de inquietud interior agravada específicamente al pedirle que permanezca de pie o sentado sin moverse.
- ☐ Conciencia de una intensa compulsión por moverse la mayor parte del tiempo y/o refiere un fuerte deseo de caminar o marcar el paso la mayor parte del tiempo.

Comunicación de discomfort (distress) en relación con la inquietud

- ☐ Ausencia de discomfort
- ☐ Discomfort medio
- ☐ Discomfort moderado
- ☐ Discomfort severo

Identificación **Fecha**

VALORACIÓN CLÍNICA GLOBAL DE LA ACATISIA

○ *Ausente*. No existe evidencia de conciencia de inquietud. La observación de los movimientos característicos de la acatisia en ausencia de la confirmación, por parte del paciente, de la presencia de inquietud interior o deseo compulsivo de mover las piernas, debería ser clasificado como pseudoacatisia.

○ *Cuestionable*. Movimientos de inquietud y tensión interna sin poder ser especificada.

○ *Acatisia media*. Conciencia de intranquilidad en las piernas y/o inquietud interior que empeora cuando se requiere al paciente que permanezca quieto de pie o sentado. Movimientos de inquietud presentes pero no necesariamente los característicos de la acatisia. Esta situación provoca poco o ningún discomfort (distress).

○ *Acatisia moderada*. Conciencia de inquietud, como la descrita más arriba para la acatisia media, combinada con movimientos característicos de acatisia como balanceo del cuerpo cambiando el apoyo de los pies. El paciente se queja de que la situación le produce discomfort.

○ *Acatisia marcada*. La experiencia subjetiva de inquietud incluye un deseo compulsivo de caminar o marcar el paso. Sin embargo, el paciente es capaz de permanecer sentado por lo menos durante 5 minutos. La situación produce un obvio discomfort.

○ *Acatisia severa*. El paciente refiere una fuerte compulsión por marchar arriba y abajo la mayor parte del tiempo. Es incapaz de permanecer sentado o acostado durante unos pocos minutos. El paciente refiere inquietud constante que se asocio a intenso discomfort e insomnio.

OBJETIVO:

SUBJETIVO:

VALORACIÓN GLOBAL: