

Identificación **Fecha**

I. Circunstancias objetivas

1.- Aislamiento:

- ☐ Alguien presente
- ☐ Alguien próximo o en contacto visual o verbal (ej. teléfono)
- ☐ Nadie cerca o en contacto

2.- Medición del tiempo:

- ☐ La intervención es muy probable
- ☐ La intervención es poco probable
- ☐ La intervención es altamente improbable

3.- Precauciones tomadas contra el descubrimiento y/o la intervención de otras personas:

- ☐ Ninguna
- ☐ Toma precauciones pasivas (ej. evita a los otros, pero no hace nada para prevenir su intervención, estar solo/a en la habitación, pero con la puerta sin cerrar)
- ☐ Toma precauciones activas (ej. cerrando la puerta)

4.- Actuación para conseguir ayuda durante o después del intento:

- ☐ Avisó a alguien que potencialmente podía prestarle ayuda
- ☐ Colaborador potencial contactado, pero no específicamente avisado
- ☐ No contactó, ni avisó a nadie

5.- Actos finales en anticipación de la muerte (legado, testamento, seguro...)

- ☐ Ninguno
- ☐ Preparación parcial, evidencia de alguna preparación o planificación para la tentativa
- ☐ Hizo planes definitivos o terminó los arreglos finales

6.- Preparación activa del intento:

- ☐ Ninguna
- ☐ Mínima o moderada
- ☐ Importante

7.- Nota suicida:

- ☐ Ninguna
- ☐ Nota escrita, pero rota, no terminada, pensó escribirla
- ☐ Presencia de nota

8.- Comunicación verbal (ideas, preocupaciones o planes suicidas)

- ☐ No comunicación verbal
- ☐ Comunicación ambigua (ej. "Estoy cansado de la vida", "Pienso estáis mejor sin mí", "Nada tiene obteto")
- ☐ Comunicación no ambigua (ej. "Quiero morir", "Siento como si quisiera matarme", "Tomar pastillas")

II. Autoinforme:

9.- Propósito supuesto del intento:

- ☐ Manipular a los otros, efectuar cambios en el entorno, conseguir atención, venganza.
- ☐ Componentes del punto anterior y del siguiente
- ☐ Escapar de la vida, buscar finalizar de forma absoluta, buscar solución irreversible a los problemas

10.- Expectativas sobre la probabilidad de muerte:

- ☐ Pensó que era improbable
- ☐ Posible, pero no probable
- ☐ Probable o cierta

Identificación **Fecha**

11.- Concepción de la letalidad del método:

- ☐ Hizo menos de lo que pensaba que sería letal
- ☐ No estaba seguro si lo que hacía era letal
- ☐ Igualó o excedió lo que pensaba que sería mortal

12.- Seriedad del intento:

- ☐ No intentó seriamente poner fin a su vida
- ☐ Inseguro
- ☐ Intentó seriamente poner fin a su vida

13.- Actitud ante el vivir / morir:

- ☐ No quería morir
- ☐ Componentes del punto anterior y del siguiente
- ☐ Quería morir

14.- Concepción de la capacidad de salvamento médico:

- ☐ Pensó que la muerte sería improbable si recibía atención médica
- ☐ Estaba inseguro si la muerte podía ser impedida por la atención médica
- ☐ Seguro de morir aunque recibiese atención médica

15.- Grado de premeditación:

- ☐ Ninguno, impulsivo
- ☐ Suicidio contemplado por 3 horas antes del intento
- ☐ Suicidio contemplado por > 3 horas antes del intento

III Otros Aspectos:

16.- Reacción frente al intento:

- ☐ Arrepentido/a de haber hecho el intento. Sentimientos de ridículo, vergüenza
- ☐ Acepta tanto el intento como su fracaso
- ☐ Rechaza el fracaso del intento

17.- Preconcepciones de la muerte:

- ☐ Vida después de la muerte, reunión con fallecidos
- ☐ Sueño interminable, oscuridad, final de las cosas
- ☐ No concepciones de / o pensamientos sobre la muerte

18.- Número de intentos de suicidio previos:

- ☐ Ninguno
- ☐ 1 ó 2
- ☐ 3 ó más

19.- Relación entre ingesta de alcohol e intento:

- ☐ alguna ingesta previa, pero sin relación con el intento, lo informado era insuficiente para deteriorar la capacidad de juicio, evaluando la realidad
- ☐ Ingesta suficiente para deteriorar la capacidad de juicio, evaluando la realidad y disminuyendo la responsabilidad
- ☐ Ingesta intencional de alcohol para facilitar llevar a cabo el intento

20.- Relación entre ingesta de drogas e intento (narcóticos, alucinógenos,...) cuando la droga NO es el método utilizado para el intento:

- ☐ alguna ingesta previa, pero sin relación con el intento, lo informado era insuficiente para deteriorar la capacidad de juicio, evaluando la realidad
- ☐ Ingesta suficiente para deteriorar la capacidad de juicio, evaluando la realidad y disminuyendo la responsabilidad
- ☐ Ingesta intencional de drogas para facilitar llevar a cabo el intento

PUNTUACIÓN: