


Hessisches Mittelgebirge

Gesamtdatenbericht

Erstellt am 2026-08-11

Hessen

NUTS-3-Regionen: DE721, DE722, DE723, DE724, DE725



Hintergrundkarte: © OpenStreetMap contributors © CARTO

Landwirtschaft

Kennzahlen

ACKERLAND	ANZAHL BETRIEBE	DURCHSCHNITTliche BETRIEBSGROSSE	ANTEIL OEKOLOGISCHER LANDBAU
113.215 ha	3.832 Anzahl	54,32 ha	23,1 %





Abbildung 1: Karte



landuse-croptypes

Abbildung 2: Diagramm

Übersicht

Vergleichsweise hohe Viehbesatzdichte. Hoher Anteil an Grünland. Hoher Waldanteil. Relativ kleine Betriebs- und Feldgrößen.

Herausforderungen

Futtermittelproduktion problematisch (Boden für den Anbau ungeeignet), daher vorwiegend Grünlandwirtschaft. Rückgang in der Milchviehhaltung (-6 % Milchkühe, -14 % Betriebe). Konkurrenz um Flächen durch die Energieerzeugung (Windkraft, Photovoltaik).


Klima

Kennzahlen


WAERMESUMME, JAHRESSUMME (BASIS 5 °C)	MITTLERE JAHRESTEMPERATUR	JAHRESNIEDERSCHLAG	NIEDERSCHLAG DES WAERMSTEN VIERTELJAHRES
1.802 °C·d +1.091 °C·d bis 2071-2100	8,7 °C +3,9 °C bis 2071-2100	862 mm +2,9 % bis 2071-2100	220 mm -8,6 % bis 2071-2100

GDD

Basiswert




°C-d




GDD

2071-2100




°C-d




Mitteltemp.

Basiswert




°C




Mitteltemp.

2071-2100



°C




Niederschlag

Basiswert




mm




Niederschlag

2071-2100




%




Sommerniederschlag

Basiswert




mm



Sommerniederschlag

2071-2100



%



über das Jahr summierte Wärme oberhalb von 5 °C - ein Maß dafür, wie viel Vegetationszeit eine Kultur erhält.
Mittlere jährliche Lufttemperatur, gemittelt über den Referenzzeitraum.
Über das Jahr summierter Gesamtniederschlag.
Niederschlag im wärmsten Vierteljahr - relevant für sommerlichen Trockenstress.

Abbildung 3: Karte




Abbildung 4: Diagramm


Übersicht

Der vorherrschenden Windrichtung ausgesetzt, Hangniederschläge, niedrigere Temperaturen im Vergleich zur Ebene.

Boden


Kennzahlen

STICKSTOFFUEBERSCHUSS	PHOSPHORUEBERSCHUSS	GRUNDWASSERENTNAHME (NICHTOEFFENTLICHE VERSORGUNG)
Keine Daten verfügbar kg N/ha LF	Keine Daten verfügbar kg P/ha LF	2.244 1000 cbm



gruppen dieses Living Labs; Farben folgen der semantischen Hauptgruppe, während Detailangaben erst im Tooltip erscheinen.

Abbildung 5: Karte



buek250

Abbildung 6: Diagramm

Übersicht

Die Bodenarten sind sehr unterschiedlich: podzolische Braunböden mit geringer Basensättigung, roter Sandstein, Braunböden mit hoher bis mittlerer Basensättigung, Pseudogley, Parabraunböden aus Löss mit hoher Basensättigung, Rendzina auf kalkhaltigen Standorten (lokal begrenzt).

Herausforderungen

Bodenerosion bei starken Regenfällen.

Sozioökonomie

Kennzahlen

BEVÖLKERUNG INSGESAMT	BRUTTOINLANDSPRODUKT JE EINWOHNER	ARBEITSLOSENQUOTE	VERFUEGBARES EINKOMMEN JE EINWOHNER
1.041.453 Personen	40.568 EUR	5,34 %	26.575,6 EUR





Abbildung 7: Karte



boris

Abbildung 8: Diagramm

Übersicht

Randgebiete — große Entfernungen zu regionalen Zentren. Bevölkerungsstruktur: Rückgang, Überalterung. Vergleichsweise geringes verfügbares Haushaltseinkommen.

Herausforderungen

Die Absatzmärkte für Produkte (Milch, Fleisch usw.) liegen weit entfernt, es gibt weniger Möglichkeiten für den Direktvertrieb, und die Entfernungen zu Schlachthöfen und Verarbeitungsbetrieben sind groß. Es herrscht Arbeitskräftemangel aufgrund von Abwanderung und einer alternden Bevölkerung.

Landschaft

Kennzahlen

WALDFLAECHE	NATURA-2000-FLAECHE	NATURSCHUTZGEBIETSFLAECHE	ANTEIL VERSIEGELTER FLAECHE
214.513 ha	134.837,9 ha	8.263,6 ha	15 %





Abbildung 9: Karte



io-lulc-landcover

Abbildung 10: Diagramm

Übersicht

Niedriggebirgsregionen in 400—1000 m Höhe mit hoher Reliefenergie.