

Rheingau

Gesamtdatenbericht

Erstellt am 2026-08-11

Hessen

NUTS-3-Regionen: DE71D




Hintergrundkarte: © OpenStreetMap contributors © CARTO

Landwirtschaft


Kennzahlen

ACKERLAND	ANZAHL BETRIEBE	DURCHSCHNITTLICHE BETRIEBSGRÖSSE
11.272 ha	601 Anzahl	33,5 ha
ANTEIL OEKOLOGISCHER LANDBAU		
10,9 %		

Karte



Diagramm



Übersicht

Der Weinbau prägt die Region: Rund 2.700 ha Rebfläche machen 14 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche des Kreises aus, davon etwa 85 % Riesling und 11 % Spätburgunder, bewirtschaftet von rund 280

Haupterwerbswinzern — überwiegend kleine Familienbetriebe neben historischen Einrichtungen wie Kloster Eberbach. Ackerland nimmt 55 % und Dauergrünland 31 % der rund 19.700 ha ein, die von etwa 620 Betrieben bewirtschaftet werden. Außerhalb der Weinberge sind Getreidebau, Schweinemast und Pensionspferdehaltung die wichtigsten Betriebszweige; rund 13 % der Betriebe wirtschaften ökologisch.

Herausforderungen

Der deutsche Weinbau steckt in einer strukturellen Absatzkrise: Die Fassweinpreise liegen unter den Produktionskosten, die Nachfrage nach alkoholischen Getränken geht seit Jahren zurück, und Handelshemmnisse erschweren den Export. Der Steillagenweinbau ist sehr arbeitsintensiv und qualifizierte Saisonkräfte sind schwer zu finden, sodass steigende Löhne, Energiekosten und bürokratische Auflagen dort am stärksten wirken, wo der Landschaftswert am größten ist. Spätfrost, Hagel, Starkregen und Trockenheit erhöhen das Risiko jedes Jahrgangs, und die dichten Trauben des Rieslings bleiben anfällig für Pilzkrankheiten und Schädlinge. Kleine, stark parzellierte Betriebe erschweren Mechanisierung und Hofnachfolge.

Klima



Kennzahlen

WAERMESUMME, JAHRESSUMME (BASIS 5 °C)	MITTLERE JAHRESTEMPERATUR	JAHRESNIEDERSCHLAG
1.834 °C·d +1.112 °C·d bis 2071-2100	8,9 °C +3,9 °C bis 2071-2100	726 mm +1,9 % bis 2071-2100
NIEDERSCHLAG DES WAERMSTEN VIERTELJAHRES		
199 mm -9,8 % bis 2071-2100		

Karte



GDD

Basiswert





GDD

2071-2100





Mitteltemp.

Basiswert





Mitteltemp.

2071-2100




Niederschlag

Basiswert





Niederschlag

2071-2100




Sommerniederschlag

Basiswert




Sommerniederschlag

2071-2100



das Jahr summierte Waerme oberhalb von 5 °C - ein Mass dafuer, wie viel Vegetationszeit eine Kultur erhaelt.
Mittlere jaehrliche Lufttemperatur, gemittelt ueber den Referenzzeitraum.
Ueber das Jahr summierter Gesamtniederschlag.
Niederschlag im waermsten Vierteljahr - relevant fuer sommerlichen Trockenstress.

Diagramm



Übersicht

Nach Norden durch den Taunuskamm vor kühlen Winden geschützt und vom Rhein begünstigt, der Wärme speichert und Licht auf die südexponierten Hänge reflektiert, zählt der Rheingau zu den mildesten Regionen Deutschlands: Die Jahresmitteltemperatur liegt bei rund 10,5 °C; milde Winter, warme Sommer und Herbstnebel begünstigen eine späte Traubenreife. Mit etwa 500—550 mm Jahresniederschlag ist die Region für deutsche Verhältnisse niederschlagsarm. Die Jahresmitteltemperatur in Hessen stieg von 8,2 °C (1961—1990) auf 9,3 °C (1991—2020); das Rhein-Main-Gebiet gehört zu den wärmsten Landesteilen.

Herausforderungen


Die Erwärmung bringt den Riesling an seine Komfortgrenze: früherer Austrieb und frühere Reife, höhere Zucker- und Alkoholgehalte sowie sinkende Säure gefährden den filigranen Stil, für den die Region bekannt ist. Der frühere Austrieb erhöht zugleich das Spätfrostisiko, und mehr heiße Tage führen zu Sonnenbrand an den Trauben. Das Klima verschiebt sich hin zu einem Wechsel aus längeren Trockenperioden und Starkregen, sodass sich die klimatische Wasserbilanz im Sommer verschlechtert und der Bewässerungsbedarf auf den flachgründigen Hangböden steigt.

Boden

Kennzahlen


STICKSTOFFUEBERSCHUSS	PHOSPHORUEBERSCHUSS	GRUNDWASSERENTNAHME (NICHTOEFFENTLICHE VERSORGUNG)
Keine Daten verfügbar kg N/ha LF	Keine Daten verfügbar kg P/ha LF	74 1000 cbm

Karte



engruppen dieses Living Labs; Farben folgen der semantischen Hauptgruppe, während Detailangaben erst im Tooltip erscheinen.

Diagramm



Übersicht

Die Böden wechseln auf kurzer Distanz. Tiefgründiger, fruchtbarer Löss und Lösslehm bedecken die flacheren Unterhänge und die Ebene am Rhein, Taunusquarzit prägt die höheren Lagen des mittleren und östlichen Rheingaus sowie den Raum Lorch, und Phyllit und Hunsrückschiefer tragen die Weinberge von Rüdesheim, Assmannshausen, Kiedrich, Martinsthal und Rauenthal. Unter der Lössdecke liegt meist schwach entkalkter Löss über tiefgründig verwittertem Phyllit-Saprolith. Die steinigen Hangböden sind flachgründig und speichern wenig Wasser, während die Lössböden der Ebene zu den ertragreichsten Ackerböden der Region zählen.

Herausforderungen


Starkregen führt auf den Steillagen zu Bodenerosion, insbesondere bei Rebzeilen in der Falllinie und offen gehaltenem Boden. Wärmere Böden mineralisieren schneller, sodass Humus gerade dort verloren geht, wo er für Wasserspeicherung und Nährstoffversorgung am wichtigsten ist. Befahrung verdichtet die Böden, und Nährstoffausträge ins Grundwasser bleiben in den Dauerkulturgebieten ein Thema.

Sozioökonomie


Kennzahlen

BEVÖLKERUNG INSGESAMT 186.050 Personen	BRUTTOINLANDSPRODUKT JE EINWOHNER 28.672 EUR	ARBEITSLOSENQUOTE 5,1 %
VERFÜGBARES EINKOMMEN JE EINWOHNER 31.202 EUR		

Karte



Diagramm



Übersicht

Im Kreis leben rund 185.700 Menschen bei einer Bevölkerungsdichte von 113 Einwohnern je km², am nordwestlichen Rand der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main. Die Wirtschaft ist mittelständisch geprägt, mit High-Tech-Betrieben in der Informations- und Kommunikationstechnik, Sensorik, Mess- und Regeltechnik sowie Medizin-, Oberflächen- und Umwelttechnik; rund 46.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort und etwa 8.000 Unternehmen stehen einem Auspendlerüberschuss gegenüber, vor allem in Richtung Wiesbaden, Mainz und Frankfurt. Wein und Tourismus sind die prägenden Branchen: rund 240.000 Gästeankünfte und 701.000 Übernachtungen (2021) sowie starke Tagesgästeströme, angezogen von Riesling, Rheinromantik und Veranstaltungen wie dem Rheingau Musik Festival.

Herausforderungen

Ganze Ortschaften hängen wirtschaftlich, sozial und kulturell am Wein: Verschwinden die Betriebe, bleiben nicht nur verbuschte Hänge, sondern auch leere Dörfer, geschlossene Straußwirtschaften und ein geschwächtes touristisches Angebot. Sinkende Weinpreise und steigende Kosten drücken die Margen, und die Betriebe konkurrieren mit dem weit größeren Arbeitsmarkt Rhein-Main um Fachkräfte, was zugleich Boden- und Wohnkosten treibt. Der Tourismus ist stark saison- und witterungsabhängig, und die peripheren Gemeinden im Taunus und in den Wispertälern liegen deutlich weiter von Zentren und Versorgungseinrichtungen entfernt als die Orte entlang der Rheinachse.

Landschaft


Kennzahlen

WALDFLAECHE	NATURA-2000-FLAECHE	NATURSCHUTZGEBIETSFLAECHE
43.842 ha	10.501,3 ha	1.221,7 ha


ANTEIL VERSIEGELTER FLAECHE

13,6 %

Karte



Diagramm



Übersicht

Ein west-östlich verlaufendes Band zwischen Rhein und Taunus mit südexponierten Hängen und Flussterrassen, auf denen Steillagen- und Terrassenweinbau unterhalb des bewaldeten Rheingaugebirges liegt. Der Waldanteil beträgt rund 56 % der Kreisfläche — deutlich über dem hessischen Durchschnitt —, und der etwa 21.000 ha große Hinterlandswald ist das größte zusammenhängende Waldgebiet Hessens. Der untere Rheingau von Rüdesheim bis Lorchhausen gehört zum UNESCO-Welterbe „Oberes Mittelrheintal“; mit dem Limes liegt ein zweites Welterbe im Kreis. Der Naturpark Rhein-Taunus, die Täler von Wisper, Aar und Wörsbach, Klöster wie Eberbach und historische Weinorte ergänzen eine vielschichtige Kulturlandschaft.

Herausforderungen

Steillagen und Terrassen lassen sich nur mit hohem Handarbeitsaufwand bewirtschaften; wird die Nutzung aufgegeben, gehen mit der Verbuschung sowohl die Terrassenkulturlandschaft als auch ihre trockenwarmen Lebensräume verloren. Denkmal- und Landschaftsschutz setzen neuer Infrastruktur enge Grenzen, während zugleich Flächen für erneuerbare Energien und Siedlungsentwicklung nachgefragt werden. Die kleinteilige Parzellierung erschwert die Flurneuordnung, und in den Wäldern zeigt sich zunehmender Trockenstress.