
15. Az *ABCD* paralelogramma *AB* oldala 6 cm, *AD* oldala 5 cm hosszú, a két oldal által bezárt szög 70°-os.



a) Számítsa ki az *ABCD* paralelogramma területét!

b) Számítsa ki a *BD* átló hosszát, valamint az ábrán jelölt β és γ szögek nagyságát!

Tekintsük a következő állítást:
„Ha egy négyszög tengelyesen szimmetrikus, akkor az a négyszög középpontosan is szimmetrikus.”

c) Döntse el, hogy az állítás igaz vagy hamis! Válaszát indokolja!

d) Fogalmazza meg az állítás megfordítását, és döntse el a megfordított állításról, hogy igaz vagy hamis! Válaszát indokolja!

a)	2 pont	
b)	6 pont	
c)	2 pont	
d)	3 pont	
Ö.:	13 pont	

B

A 16–18. feladatok közül tetszése szerint választott kettőt kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon lévő üres négyzetbe!

16. Emese süteményeket süt, amihez 5 kg cukrot vásárol. Ha 4 kg kristálycukrot és 1 kg barna cukrot vásárolna, akkor 2600 Ft-ot, ha 3 kg kristálycukrot és 2 kg barna cukrot vásárolna, akkor 3275 Ft-ot fizetne.

a) Mennyibe kerül 1 kg kristálycukor, és mennyibe kerül 1 kg barna cukor?

Emese egy angol nyelvű szakácskönyvből nézett ki egy receptet, amelyben a tömegek mérésére az uncia mértékegységet használják. A recept alapján 5 uncia cukrot kell kimérni. Tudjuk, hogy 1 kilogramm körülbelül 35,3 unciának felel meg.

b) Hány gramm cukrot kell Emesének kimérnie?
Válaszát tíz grammra kerekítve adja meg!

Emese 72 darab lekváros és 96 darab csokis linzerből egyforma összetételű csomagokat állít össze az iskolai vásárra: mindegyik csomagba azonos számú lekváros linzert tesz, és mindegyik csomagba azonos számú csokis linzert tesz úgy, hogy az összes süteményt felhasználja.

c) Legfeljebb hány csomagot állíthat össze így Emese?

Egy süteményesdobozban 10 darab lekváros és 15 darab csokis linzer van. A dobozból (visszatevés nélkül) véletlenszerűen kiveszünk 5 darab süteményt.

d) Számítsa ki annak a valószínűségét, hogy a kiválasztott sütemények között pontosan 2 darab lesz lekváros!

a)	6 pont	
b)	3 pont	
c)	4 pont	
d)	4 pont	
Ö.:	17 pont	