III. Élőlények csoportosítása 9 pont

Csoportosítsa a leírás alapján a fölsorolt fajokat! *A halmazábra megfelelő helyére írja be a faj sorszámát! (Egy szám csak egy helyre kerülhet. Ha több helyen is szerepel, nem adható rá pont!)*

1. A *törpefürkészek* csápjukkal azonosítják a hernyót, majd tojócsövükön át néhány petét juttatnak annak szervezetébe. A fürkész lárvái a hernyó belsejében élnek, legyengítik, többnyire el is pusztítják a gazdaszervezetet.
2. A *napraforgó szádorgóban* virágzása idején sincsenek zöld színtestek: a szerves anyagokat a napraforgóból szívja el.
3. Az *aranyos bábrablók* az erdők talaján gyorsan szaladnak három pár lábukkal, eközben nemcsak a rovarlárvákat, de a férgeket és csigákat is széttépik rágóikkal.
4. A *óriás szkarabeusz* bogarat az egyiptomiak szentként tisztelték. Fajtársaival együtt fontos szerepet játszik az állati ürülék lebontásában.
5. A *gyilkos galóca* a korhadó, elhalt fák szerves anyagát hasznosító veszedelmes mérgező gomba.
6. A *horgasfejű galandféreg* a háziállatok, sőt az ember bélcsatornájába is beköltözhet, a megemésztett tápanyagokat egész testfelületén át szívja föl.
7. Az *etruszk cickány* a legparányibb emlős. Hegyes fogaival testénél jóval nagyobb rovarokat is képes megragadni és fölfalni.
8. A *Katalin-moha* a gyertyános-tölgyesek jellemző faja. Gyakran fák kérgét is beborítja, de azt csak támaszként hasznosítja, a cellulózt nem bontja le.
9. A *nílusi víziló* éjszakánként gyakran elhagyja a nagy afrikai folyókat, hogy a parttól távolabb tenyésző növényi táplálékát legelhesse.



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen