VII. Lebontó folyamatok vizsgálata 9 pont

Laboratóriumban a következő két kísérletet végezzük el:

I. kísérlet: egy vízszintesen tartott kémcsőbe 6-8 szem csírázó borsószemet helyezünk. A kémcsövet egy kifúrt dugóval bedugjuk, amelynek furatába egy egyenes üvegcsövet illesztünk. Az üvegcső végébe néhány cseppnyi nátrium-hidroxid (NaOH) oldatot teszünk, amelyet fenolftaleinnel festünk meg. (A vízszintesen tartott csőből a folyadék a víz felületi feszültsége miatt nem folyik ki.) Figyeljük a változást. (A fenolftalein indikátor savas és semleges közegben színtelen, lúgos közegben bíbor színű.)

II. kísérlet: egy függőlegesen tartott kémcsőbe (1. kémcső) 5 cm^3 glükóz-oldatot öntünk. Ebbe egy darabka élesztőt rakunk, majd a kémcsövet 37 ºC-os vízfürdőbe helyezzük. A kémcsövet egy kifúrt dugóval bedugjuk, amelynek furatába egy „U”-alakban meghajlított üvegcsövet illesztünk. Az üvegcső másik végét egy telített meszes vizet tartalmazó kémcsőbe (2. kémcső) merítjük. Figyeljük a változást.

Hasonlítsa össze a két kísérletet, töltse ki a táblázat számokkal jelölt hiányzó rovatait! (Minden helyes válasz 1 pont)

Szempont	I. kísérlet	II. kísérlet
A kísérletben vizsgált lebontó biokémiai folyamat neve	**1.**	**2.**
A folyamat során keletkezett gázhalmazállapotú anyag neve	**3.**	**4.**
A kísérletben tapasztalt látható változás	Színváltozás a csőbe helyezett folyadékcseppben: **5.**	Változás a 2. kémcsőben**:** **6.**

7. Írja fel az ***I.*** kísérletben vizsgált biokémiai folyamat összesített (bruttó) egyenletét szőlőcukorból kiindulva! (1 pont)

..... + ... = ... + ...

8. Változik-e, s ha igen, hogyan az ***I.*** kísérletben a csőbe helyezett folyadékcsepp helyzete? Magyarázza meg a választ! (2 pont)

.....

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen