
VII. A dohányzás hatásai 11 pont



Az 1. ábra a tüdő egy részletét mutatja, egy tüdőhólyagocska és hajszálerek keresztmetszetét, valamint az azokat körülvevő kötőszöveti rostokat és sejteket.


1. A jellemzők alapján azonosítsa és nevezze meg az ábrán betűkkel jelölt részeket! *(Egy betű csak egy helyen szerepelhet, de azonos szövettípus többször is előfordulhat.)*
   A táblázat minden helyesen kitöltött sora 1 pont. (4 pont)

Jellemző	**Betűjele**	**Megnevezése**
Hajszáleret bélelő szövet:		
Hormonokat szállít:		
A vörös csontvelőben képződik:		
A léghólyagocskákat bélelő szövet:		

A dohányfüst élettani hatásáról egészítse ki értelemszerűen a hiányos mondatokat a felsorolt kifejezések közül a megfelelőkkel! (3 pont)

léghólyagocskák **hemoglobin** **hajszálerek** **tüdőartériák**
mitokondriumok **kevesebb** **miozin** **hörgők** **több**

Az aktív és passzív dohányosok szervezetébe bejutó füstszemcsék a (2)……. – ban/ben a légzőhám felületére rakódnak, ezzel csökkentik a légzőfelület nagyságát. A dohányosok vére 10%-kal (3) …… oxigént képes szállítani, mert a vérbe került szén-monoxid erősebben kötődik a (4)…….-hoz/höz, mint az oxigén.



2. ábra

A 2. ábrán látható grafikon 1911 és 1991 között mutatja a dohányos férfiak által évente elszívott cigaretták, illetve a tüdőrákban elhunyt férfiak számának változását.
A grafikon segítségével döntse le, melyek az igaz állítások az alábbiak közül!

5.	1911-ben egy dohányos angol férfi naponta átlagosan 10 cigarettánál kevesebbet szívott el.	
6.	A tüdőrákban elhunyt férfiak száma a II. világháború után rohamosan nőtt.	
7.	A tüdőrákban elhunytak számának jelentős növekedése körülbelül 25–30 évvel követte a dohányzás radikális növekedését.	
8.	A tüdőrákban szenvedők és elhunytak száma független a dohányzási szokásoktól.	

1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**összesen**