V. Egy reflexív elemei 10 pont

A feladat első részében egy reflexív elemeit és az abban lezajló folyamatokat kell azonosítania. *Írja a fogalom után a helyes meghatározás betűjelét!*

1.	Inger	
2.	Receptor	
3.	Ingerület	
4.	Végrehajtó egység	
5.	Válasz	
6.	Csúcspotenciál hullámsorozat	
7.	Központ	

A) Izomrost vagy mirigysejt.
B) Az ingert követő izomműködés vagy nedvkiválasztás.
C) Az idegsejt inger hatására megváltozott anyagcseréje, ioneloszlása.
D) Idegsejtek axonmembránján gyengítetlenül tovaterjedő állapotváltozás, ami jelentést hordoz más sejtek számára.
E) A sejtekre ható külső vagy belső (fizikai-kémiai) tényező és a sejt kölcsönhatása.
F) A választ megszervező idegsejt-csoport.
G) Bizonyos ingerre vagy ingerekre érzékeny sejt, mely reflexek érző idegsejtjével áll kapcsolatban.

8. A receptorokat aszerint különböztethetjük meg egymástól, hogy melyiknek mi a megfelelő (adekvát) ingere. Miben különbözik az adekvát inger más ingerektől? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe*!

A. A receptor csak az adekvát ingerre reagál.
B. Az adekvát inger azonos az ingerületi állapottal.
C. Erre a hatásra a legmagasabb a receptor ingerküszöbe.
D. Erre a hatásra a legalacsonyabb a receptor ingerküszöbe.

9. Melyik receptortípusba tartoznak az izom és ín megnyúlását érzékelő izom- és ínorsók?

A) Mechanikai B) Hő (termoreceptor) C) Fájdalom D) kémiai

A „reflex” szót Descartes használta először, de a fogalom mai értelmezését a cseh Prohaska adta meg. Prohaska megfigyelte, hogy a lefejezett béka is elrántja a lábát, ha azt kellemetlen inger éri. Az a béka viszont, melynek idegeit épen hagyta, de gerincvelejét elroncsolta, többé nem adott választ.

10. Mi következik ebből a kísérletből? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe*!

A. Bizonyos reflexek az agy közreműködése nélkül is kiválthatók.
B. Egyetlen reflexnek sem lehet központja az agyban.
C. Vannak reflexek, melyeknek központja a gerincvelőben van.
D. A gerincvelői idegek épsége feltétele a gerincvelői reflexek működésének.
E. Ha a gerincvelői idegek épek, a gerincvelői reflex mindig kiváltható.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen