II. Tolvajpoloskák 6 pont



Az ábrán két tolvajpoloska faj élőhelyének (lágy szárú növényzettel borított talajfelszín) mikroklimatikus jellemzőit figyelheti meg. A *Nabis flavomarginatus* faj jellemzően a 0–40 cm, a *Nabis ferus* pedig az 40–100 cm magassági zónában tartózkodik. Mindkét faj egyedei más ízeltlábúak testnedveit szívogatják.

1. Az ízeltlábúak melyik csoportjába (osztályába) tartoznak a poloskák? Nevezzen meg legalább egy, a rajzon is megfigyelhető jellegzetességet, amellyel válaszát igazolni tudja!

……...

A kutatók a két poloskafaj élőhelyén egy nyári napon egy meghatározott időpontban megmérték a levegő hőmérsékletét és relatív páratartalmát a talaj felszíne fölött különböző magasságokban. A mérési eredményeket ábrázolja a két grafikon. Ennek alapján töltse ki a táblázatot: a megfelelő betűjeleket írja az üres négyzetekbe.

A) *Nabis ferus* B) *Nabis flavomarginatus* C) mindkettőre igaz D) egyikre sem igaz

2.	Jellemző élőhelyén a mérés idején a levegő páratartalma meghaladta a 70%-ot.	
3.	A mérés idején nem fordult elő 28 °C-nál magasabb hőmérsékletű helyen.	
4.	Biztosan elviseli élőhelyén belül az 4 °C-os hőmérsékleti különbséget.	
5.	Élőhelyén a megfigyelés idején a mért páratartalom értékek különbsége elérte az 50%-ot is.	

6. Következik-e az ábra adataiból, hogy a *Nabis flavomarginatus* élettani optimuma a 80–90% körüli páratartalom? Válaszát indokolja!

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen
1	1	1	1	1	1	6