VIII. A magas vérnyomás kockázatai 12 pont

Olvassa el figyelmesen a szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre!

„Nemzetközi felmérések szerint azok a betegek, akiknek szisztolés (vagyis maximális) vérnyomását mindvégig a normális tartományon belül sikerült tartani, négyszer-ötször ritkábban kaptak agyvérzést, tízszer ritkább náluk a veseelégtelenség, mint azoknál a betegeknél, akiknek szisztolés vérnyomása meghaladja a normális értéket.

A vérnyomás egy higanymilliméterrel (Hgmm) való csökkenése a keringési betegség okozta halálozás valószínűségét átlagosan másfél százalékkal csökkenti. Ötvenéves korig a férfiaknál gyakrabban fordul elő a hipertónia*, 55-64 év közt a két nemben kiegyenlítődik, ám később már a nők veszélyeztetettebbek.

Az elhízás mértékétől függően is változik a hipertónia előfordulási gyakorisága. Normál testsúlyúaknál 24, túlsúlyosaknál 48, elhízottak esetében 55 százalék."

*hipertónia = magas vérnyomás

Fel nem ismert betegek. Magyar Hírlap, 2006. május 9.

1. A szövegben olvasottak alapján állapítsa meg, hogy az alább páronként felsorolt személyek közül statisztikailag melyiknél nagyobb a jelzett betegség kialakulásának esélye! Válaszát a négyzetekbe írt „<" vagy „>" jelek segítségével adja meg. Amennyiben az esély azonos, „=" jelet, ha pedig a szöveg információi alapján nem állapítható meg a kockázat mértéke, „0" jelet írjon. (4 pont)

A magas vérnyomás kialakulási esélye a 45 éves, túlsúlyos nők körében.		A magas vérnyomás kialakulási esélye a 45 éves, túlsúlyos férfiak körében.
A magas vérnyomás kialakulási esélye a 60 éves, elhízott nők körében.		A magas vérnyomás kialakulási esélye a 60 éves, túlsúlyos férfiak körében.
A veseelégtelenség kialakulásának kockázata a tartósan 160/100 Hgmm vérnyomású felnőttek körében.		A veseelégtelenség kialakulásának kockázata a tartósan 120/80 Hgmm vérnyomású felnőttek körében.
A veseelégtelenség kialakulásának kockázata a tartósan 120/80 Hgmm vérnyomású felnőttek körében.		Az agyvérzés kialakulásának kockázata a tartósan 120/80 Hgmm vérnyomású felnőttek körében.

2. A szívműködés melyik fázisában mérhető a szívben a szisztolés vérnyomás? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!* (2 pont)

A. A pitvarok összehúzódásakor.
B. A kamrák összehúzódásakor.
C. A vitorlás billentyűk záródását követően.
D. A zsebes billentyűk záródását követően.
E. A vitorlás billentyűk nyitódását követően.

3. Az alábbi hatások közül melyek emelik a vérnyomást? (2 pont)

A. A stresszhelyzet.
B. Az erek tágulása.
C. Az idegrendszerben eluralkodó paraszimpatikus hatás.
D. Az erek elmeszesedése.
E. A pupilla tágulása.

4. Nevezzen meg az agyvérzés fellépésekor jellemző tünetek közül *legalább kettőt*! (2 pont)

……

……

……

……

5. Adjon életmódbeli tanácsokat annak az irodai munkát végző nőnek, aki szeretné elkerülni, hogy magas vérnyomása alakuljon ki! Legalább *két javaslatot* tegyen, amely közül az egyik a táplálkozásra, a másik a követendő életvitelre vonatkozzon! (2 pont)

……

……

……

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	összesen