

VII. Dohányzás 11 pont

2005-ben debreceni háziorvosok a rendelésen jelentkező 10-18 éves fiatalok körében felmérést végeztek a dohányzási szokásokról. Az említett fiatalok közül 699 dohányos volt. Velük a felmérés után egy program keretében fél évig foglalkoztak, majd újra fölmérték dohányzási szokásaikat.


1. ábra A dohányzó fiatalok nemek szerinti megoszlása a vizsgált populációban




2. ábra A dohányzó fiatalok két korcsoport szerinti megoszlása a vizsgált populációban



3. ábra A napi rendszerességgel dohányzók megoszlása a korcsoportokon belül



4. ábra A program hatására megváltozott dohányzási szokások megoszlása



1. A fenti grafikonok figyelmes tanulmányozása után döntse el, mely állítások igazak a *vizsgált populáció* dohányzási szokásaira! *A megfelelő válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)*

A) A vizsgált fiatalok nagy többsége középiskolás korban kezd rendszeresen dohányozni.
B) Az általános iskolások között ötször annyi a rendszeresen dohányzó, mint a középiskolások között.
C) A dohányzás tekintetében a nemek szerinti különbség jóval kisebb volt, mint a két korosztály közötti.
D) A 14 évesnél fiatalabb dohányzó gyerekek körében a rendszeres dohányosok aránya meghaladta a 20%-ot.

2. A program hatására a vizsgált diákok hány százalékának dohányzási szokásai változtak kedvező irányban? …….

Olvassa el az alábbi szövegrészt, majd válaszolja meg a kérdéseket!

„A dohányzás egészségügyi kockázatai jól ismertek. A leggyakrabban előforduló, dohányzással összefüggő betegségek a tüdőrák, a keringési betegségek, a szájüregi, a hasnyálmirigy- és a hólyagrák. A krónikus légzőszervi megbetegedések a dohányfüst több mint 4000 vegyi anyagával függenek össze, amelyek irritálják a légutakat, asztmát okoznak, továbbá a tüdőfunkciók lényeges romlását eredményezik. A dohányosoknál a fertőzések előfordulása nagyobb. Megnő a hörgőgyulladás, tüdőgyulladás, garatfertőzés, középfülgyulladás gyakorisága. […] A trombózis előfordulásának esélye 10 évvel előrébb tolódik a cigarettázóknál, s ha cukorbetegség is társul hozzá, akkor a szövődménye sok esetben vesebetegség vagy végtagi romlás lehet, amelyek akár üszkösödéshez, végül végtag-amputációhoz vezethetnek.” *Galgóczi Dóra: Megoldás a dohányzásról való leszokás támogatására)*

3. Mi jellemző a szövegben előforduló betegségek közül az asztmára? (2 pont)

A) Erőteljes égető fájdalom a végtagokban.
B) Régi neve gümőkór, védőoltással megelőzhető.
C) A légutak szűkülete által okozott légzészavar, köhögés, légszomj.
D) Tokkal körülvett folyadék (ciszta) a felső légutakban.
E) A levegő áramlását nehezíti a légutakban fölszaporodó nyák és/vagy a hörgőcskék izmainak szűkülete.

4. Magyarázza meg, miért járnak gyakran együtt a felső léguti megbetegedések középfülgyulladással!

……

……

5. Mi jellemző a szövegben előforduló betegségek közül a trombózisra? (2 pont)

A) Olyan agyérgörcs, mely átmeneti agyi vérellátási zavart okoz.
B) A léghólyagok kitágulnak, faluk elvékonyodik, rugalmasságuk csökken.
C) Vérrög alakul ki a keringési rendszerben.
D) Érszűkület miatt elhalt végtagrészek eltávolítása.
E) A vérlemezkéknek és a véralavadási fehérjéknek fontos szerepe van kialakulásában.

6. Miként függ össze a trombózis kialakulása valamely végtag amputációjával?

……

……

7. Mit jelent a tüdőszűrés?

……..……

……

8. Nevezzen meg egy veszélyeztetett csoportot, akik körében különösen nagy jelentősége van a rendszeres tüdőszűrésnek!

……..……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen