VIII. Fenntartható erdőgazdálkodás 7 pont

Az utóbbi két évszázad során az erdők döntő részét Európa-szerte az úgynevezett vágásos üzemmód alkalmazásával kezelik. Ennek során egy-egy területről a teljes faállományt eltávolítják („véghasználat”), majd a fákat újratelepítik. Az erdőművelés másik módját, a szálalást régóta alkalmazták már például a Vend-vidéken, de elméletileg A. Möller alapozta meg a XIX. században. Möller célja az „örökerdő” fenntartása volt. Ennek egyik módja az, hogy az alkalmas korú fákat szálanként távolítják el, miközben az erdőborítás a terület egészében folyamatosan fennmarad.

1. Fogalmazza meg a szálalásos erdőművelés egy természetvédelmi előnyét és egy gazdasági hátrányát a „véghasználattal” (tarvágással) összehasonlítva! (2 pont)

   Előny: ……..

   ……

   Hátrány (a kisebb haszon oka):

   .....……

   ……

A kivágott fák pótlására is több módszert alkalmaznak. A természetes mageredetű újulat a fák elhullott magjaiból keletkezik. A sarjeredetű erdő a kivágott, de még élő fák sarjhajtásaiból újul meg. A mesterséges erdőfelújítás során máshonnan származó csemetéket telepítenek, amelyek vagy mageredetűek, vagy gyakran klónozás útján szaporított azonos fajú példányokból állnak. Hasonlítsa össze e három erdőfelújítási mód jellemzőit és következményeit! *A megfelelő betűt vagy betűket írja a négyzetekbe!*

A) A természetes mageredetű erdőfelújításra jellemző.
B) A (természetes) sarjeredetű erdőfelújításra jellemző.
C) A mesterséges, klónozott egyedekből álló erdőfelújításra jellemző.
D) Egyikre sem jellemző.

2.	Az új faegyedek ivaros szaporodás útján jönnek létre.	
3.	Az új faegyedek genetikailag azonosak egymással.	
4.	Az új faegyedek ivartalan úton jönnek létre, de genetikailag különbözhetnek egymástól.	
5.	Ez az erdőfelújítási mód biztosítja a legnagyobb genetikai változatosságot.	
6.	Az így létrehozott erdő lesz a legérzékenyebb a környezet megváltozására (például rovarpusztítás, széldöntés).	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen