VIII. Testnedveink 10 pont

1. Homeosztázisunk fenntartásában fontos szerep jut testnedveinknek. Ezek összetétele sok mindenben hasonló, de funkcióik miatt eltérések is vannak közöttük.
A táblázatos feladat egy fél napja nem táplálkozó *egészséges ember* testnedveire vonatkozik. Írjon a táblázatba *igen*-t, ha a megnevezett anyag előfordul, *nem*-et, ha nincs (vagy a vérplazmához képest csak elhanyagolhatóan kis mennyiségben van jelen) az adott testnedvben.
(4 pont)

	SZŰRLET (a nefron kezdeti szakaszában)	**VIZELET**	**VÉRSZÉRUM**	**SZÖVETI NEDV (a hajszálerek és ép sejtek környezetében)**
fehérjék				
glükóz				
nemi hormonok				
fibrinogén				

2. Mi igaz a leírtak közül? *A helyes állítások betűjeleit írja az üres négyzetekbe!* (2 pont)

A) A vérplazmából alakul ki a vérszérum.
B) A vérszérumból alakul ki a szűrlet.
C) A víz aktív transzporttal kerül a szűrletbe.
D) A glükóz aktív transzporttal jut a szöveti nedvbe.
E) A glükóz aktív transzporttal jut a szűrletből a vérplazmába.
F) A szöveti nedv összetétele megegyezik a vérplazmáéval.

3. A folyadékáramlás irányának megszabásában fontos szerepe van az ozmózisnak. Mely állítások igazak rá a felsoroltak közül? (2 pont)

A) A vérplazmában lévő plazmafehérjék miatt fellépő ozmotikus nyomás (szívóerő) eredményezi a szöveti nedv egy részének visszajutását a vérplazmába.
B) A vérplazma ozmotikus nyomásának fenntartásában a fibrinogén is szerepet játszik.
C) Ha a vérplazma ozmotikus nyomása nő, sok és híg vizelet keletkezik.
D) Ha a vérplazma ozmotikus nyomása csökken, fokozódik az ADH (vazopresszin) termelődése.
E) A fokozódó ADH-termelődés hatására nő a vérplazma ozmotikus nyomása.
F) A fokozódó ADH-termelődés hatására csökken a képződő szűrlet mennyisége.

4. Mi szükséges közvetlenül a fibrinnek a vérből történő kicsapódásához? (2 pont)

A) A protrombin.
B) A trombin.
C) A kalcium-ionok.
D) A kálium-ionok.
E) A hemoglobin.

1.	**2.**	**3.**	**4.**	**összesen**