
II. Virág és beporzója 7 pont



A rajzon egy virág részlete és egy azt beporzó méh feje látható.

1. A virágpor a porzókban keletkezik. Nevezze meg a porzó nyíllal megjelölt részét!

   ……..…….…….

2. Mi a neve a termő virágport megkötő részének?

   ……..…….…….

3. A hatszöges mintázat a rovar látószervére, és a hatszög alakú lárvabölcsőre is utalhat. Nevezze meg, hogy felépítése alapján, melyik típusba sorolható a rovarok szeme!

   ……..……..……

4. A méhek lárvabölcsőjének falát nagyrészt egy lipid, a méhviasz alkotja. Mi a lipidek közös jellemzője, ami miatt a viaszt is ide sorolják?

   ……

5. A méhek által készített méz alapanyaga nagyrészt a virágok nektárja. Ennek nádcukor (diszaharid) tartalmát begyük nedveivel részben átalakítják glükózzá és fruktózzá (monoszaharidokká). Milyen típusú folyamat ez? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

   A) (részleges) emésztés
   B) biológiai oxidáció
   C) diffúzió
   D) ozmózis
   E) antibiózis

   ☐

6. A kétszikű virág és a rovarok látószerve valószínűleg egyidejűleg, egymást erősítve alakult ki az evolúció során. A felsoroltak közül mely fogalmakkal magyarázható ez a folyamat? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

   A) szimbiózis
   B) asztalközösség
   C) adaptív evolúció
   D) divergens fejlődés
   E) analóg szerv

   ☐☐

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Összesen